

**UJI AKTIVITAS LARVASIDA EKSTRAK n-HEKSAN, ETIL ASETAT DAN
ETANOL 96% AKAR NAPAS TUMBUHAN BAKAU MINYAK
(*Rhizophora apiculata* Blume.) TERHADAP
LARVA NYAMUK *Aedes aegypti* L.**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

NURHIKMA SARI

NIM. 70100113091

ALAUDDIN

M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhikma Sari
NIM : 70100113091
Tempat, Tanggal Lahir : Lero Minralo, 14 September 1995
Jurusan : Farmasi
Alamat : Perumahan Bumi Permata Hijau Jl. Talasalapang
Judul : Uji Aktivitas Larvasida Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat dan Etanol 96% Akar Napas Tumbuhan Bakau Minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap Larva Nyamuk *Aedes aegypti* L.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Nurhikma Sari
NIM. 70100113091

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Larvasida Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat dan Etanol 96% Akar Napas Tumbuhan Bakau Minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap Larva Nyamuk *Aedes aegypti* L.” yang disusun oleh Nurhikma Sari, NIM: 70100113091, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 16 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **23 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 16 Agustus 2017 M
23 Dzulqa’idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)
Sekretaris : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing I : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing II : M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Penguji I : Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)
Penguji II : Dr. Wahyuddin G, M.Ag. (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad saw. yang termulia daripara Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Uji Aktivitas Larvasida Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat dan Etanol 96% Akar Napas Tumbuhan Bakau Minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap Larva Nyamuk *Aedes aegypti* L.”. Ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Hj. Nursida yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk materi, nasehat kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian curahkan

selama ini. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian. Semoga kita semua termasuk umat yang diberi syafa'at di hari akhir kelak, Amin.

Penulis tak lupa menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
5. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
6. Bapak M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
7. Bapak Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt. selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan

skripsi ini,

8. Bapak Dr. Wahyuddin G, M.Ag. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini,
9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,
10. Teman seperjuangan Farmasi Angkatan 2013 (FAR13ION) yang sangat luar biasa, terima kasih untuk semua kebersamaan dan kehangatan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun



Nurhikma Sari
NIM. 70100113091

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1-6
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7-32
A. Uraian Tumbuhan.....	7
B. Uraian Hewan Uji.....	10
C. Penyakit Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD).....	18
D. Larvasida.....	21
E. Pengantar Fitokimia	21
F. Tinjauan Islam.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33-37

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sampel	33
D. Instrumen Penelitian.....	33
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38-46
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Implikasi Penelitian.....	47
KEPUSTAKAAN.....	48-51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	52-77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hubungan LC ₅₀ dengan kategori toksisitas	26
2. Hasil ekstraksi sampel <i>Rhizophora apiculata</i> Blume.	38
3. Hasil uji aktivitas larvasida ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.).....	38
4. Hasil uji aktivitas larvasida ekstrak etil asetat akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.).....	39
5. Hasil uji aktivitas larvasida ekstrak etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.).....	39
6. Hasil identifikasi komponen senyawa ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.)	39
7. Jumlah larva <i>Aedes aegypti</i> L. yang mati akibat perlakuan ekstrak n-heksan <i>Rhizophora apiculata</i> Blume.	58
8. Jumlah larva <i>Aedes aegypti</i> L. yang mati akibat perlakuan ekstrak etil asetat <i>Rhizophora apiculata</i> Blume.	59
9. Jumlah larva <i>Aedes aegypti</i> L. yang mati akibat perlakuan ekstrak etanol 96% <i>Rhizophora apiculata</i> Blume.....	59
10. Pengaruh konsentrasi ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.) terhadap % mortalitas larva	60
11. Pengaruh konsentrasi ekstrak etil asetat akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.) terhadap % mortalitas larva	60
12. Pengaruh konsentrasi ekstrak etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.) terhadap % mortalitas larva	60
13. Probit (deviasi +5) sesuai dengan persentase dalam margin	60

14. Nilai probit ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.)	61
15. Nilai probit ekstrak etil asetat akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.)	61
16. Nilai probit ekstrak etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.)	61
17. Nilai LC ₅₀ ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.)	62
18. Nilai LC ₅₀ ekstrak etil asetat akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.)	62
19. Nilai LC ₅₀ ekstrak etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagian tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.)	8
2. Telur nyamuk <i>Aedes aegypti</i> L. perbesaran 100×	12
3. Larva nyamuk <i>Aedes aegypti</i> L.	12
4. Pupa nyamuk <i>Aedes aegypti</i> L.....	14
5. Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> L.	15
6. Siklus hidup nyamuk <i>Aedes aegypti</i> L.....	17
7. Tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.).....	73
8. Sampel segar akar napas <i>Rhizophora apiculata</i> Blume.....	73
9. Simplisia akar napas <i>Rhizophora apiculata</i> Blume.....	73
10. Simplisia 1 kg yang akan diekstraksi.....	73
11. Proses maserasi sampel	73
12. Filtrat n-heksan	73
13. Ekstrak n-heksan.....	74
14. Filtrat etil asetat	74
15. Ekstrak etil asetat.....	74
16. Filtrat etanol 96%.....	74
17. Ekstrak etanol 96%	74
18. Telur nyamuk <i>Aedes aegypti</i> L.....	74
19. Penyiapan larva uji.....	75
20. Larva nyamuk <i>Aedes aegypti</i> L. instar 3 berumur 5 hari	75
21. Larutan stok Abate 1000 ppm	75
22. Pembuatan DMSO 1% (v/v).....	75
23. Penimbangan 1000 mg ekstrak n-heksan <i>Rhizophora apiculata</i> Blume. ...	75

24. Penimbangan 1000 mg ekstrak etil asetat <i>Rhizophora apiculata</i> Blume....	75
25. Penimbangan 1000 mg ekstrak etanol 96% <i>Rhizophora apiculata</i> Blume	76
26. Larutan stok ekstrak n-heksan 10.000 ppm.....	76
27. Larutan stok ekstrak etil asetat 10.000 ppm	76
28. Larutan stok ekstrak etanol 96% 10.000 ppm	76
29. Larutan uji ekstrak n-heksan <i>Rhizophora apiculata</i> Blume	76
30. Larutan uji ekstrak etil asetat <i>Rhizophora apiculata</i> Blume	76
31. Larutan uji ekstrak etanol 96% <i>Rhizophora apiculata</i> Blume	77
32. Hasil identifikasi setelah penyemprotan pereaksi Asam Sulfat 10%	77
33. Hasil identifikasi setelah penyemprotan pereaksi Lieberman-Burchard	77
34. Hasil identifikasi setelah penyemprotan pereaksi Besi (III) Klorida 1%	77
35. Hasil identifikasi setelah penyemprotan pereaksi Aluminium Klorida	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema preparasi sampel	52
2. Skema determinasi sampel	52
3. Skema ekstraksi sampel.	53
4. Skema uji aktivitas larvasida.	54
5. Perhitungan % rendamen.....	55
6. Perhitungan pembuatan larutan stok 10.000 ppm.....	55
7. Perhitungan pembuatan larutan uji	55
8. Perhitungan % mortalitas larva.....	56
9. Aktivitas larvasida ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 96% akar napas <i>Rhizophora apiculata</i> Blume.....	58
10. Perhitungan nilai <i>Retention factor</i> (Rf).....	63
11. Kurva baku	64
12. Gambar penelitian.....	73

ABSTRAK

Nama : Nurhikma Sari
NIM : 70100113091
Judul : Uji Aktivitas Larvasida Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat dan Etanol 96%
Akar Napas Tumbuhan Bakau Minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)
terhadap Larva Nyamuk *Aedes aegypti* L.

Telah dilakukan penelitian uji aktivitas larvasida ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas larvasida ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L. Sampel diekstraksi dengan metode maserasi bertingkat menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat dan etanol 96% dan dilanjutkan dengan penguapan pelarut menggunakan *rotatory evaporator*. Ekstrak yang diperoleh diuji aktivitas larvasidanya terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L. instar III dan dilakukan analisis probit untuk mendapatkan nilai LC₅₀. Ekstrak yang memiliki toksisitas paling baik dilakukan identifikasi golongan senyawa menggunakan pereaksi identifikasi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh nilai LC₅₀ ekstrak n-heksan pada waktu 24, 48 dan 72 jam secara berturut-turut yaitu 87,28 ppm, 9,42 ppm, dan 1,77 ppm. Nilai LC₅₀ ekstrak etil asetat pada waktu 24, 48 dan 72 jam yaitu 464,52 ppm, 16,58 ppm, dan 1,88 ppm. Nilai LC₅₀ ekstrak etanol 96% pada waktu 24, 48 dan 72 jam yaitu 31,41 ppm, 6,85 ppm, dan 6,43 ppm. Ekstrak yang memiliki toksisitas paling baik adalah ekstrak n-heksan pada waktu pengamatan 72 jam. Berdasarkan hasil identifikasi golongan senyawa yang telah dilakukan, pada ekstrak n-heksan akar napas *Rhizophora apiculata* Blume. terdapat golongan senyawa steroid, terpenoid, tanin, fenolik dan flavonoid.

Kata kunci: Larvasida, *Aedes aegypti* L., *Rhizophora apiculata* Blume.

ABSTRACT

Name : Nurhikma Sari

Number : 70100113091

Title : Larvacidal Activity of n-Hexane, Ethyl Acetate and 96% Ethanol Extract from Mangrove Oil Plant (*Rhizophora apiculata* Blume.) Pneumatophora against Musquito's Larvae of *Aedes aegypti* L.

The study about larvacidal activity of n-hexane, ethyl acetate and 96% ethanol extract from mangrove oil plant (*Rhizophora apiculata* Blume.) pneumatophora against musquito's larvae of *Aedes aegypti* L. had been conducted. The purpose of this study is to know larvacidal activity of n-hexane, ethyl acetate and 96% ethanol extract from mangrove oil plant (*Rhizophora apiculata* Blume.) pneumatophora against musquito's larvae of *Aedes aegypti* L. Samples were extracted by multilevel maceration method using n-hexane, ethyl acetate and 96% ethanol solvent and followed by solvent evaporation using rotatory evaporator. The extract obtained will be tested its larvicidal activity against musquito's larvae of *Aedes aegypti* L. instar III and probit analysis to get LC₅₀ value. Extract that have the best toxicity will be identified its compounds using identification reagents.

Based on the results of the analysis, obtained LC₅₀ value of n-hexane extract at 24, 48 and 72 hours respectively 87.28 ppm, 9.42 ppm and 1.77 ppm. The LC₅₀ values of ethyl acetate extract at 24, 48 and 72 hours were 464.52 ppm, 16.58 ppm, and 1,88 ppm. The LC₅₀ value of 96% ethanol extract at 24, 48 and 72 hours were 31.41 ppm, 6.85 ppm, and 6.43 ppm. The extract that have the best toxicity is n-hexane extract at 72 hours. Based on the results of the identification of compounds that have been done, on n-hexane extract of *Rhizophora apiculata* Blume., there are classes of steroids, terpenoids, tannins, phenolic and flavonoids.

Key words: *Larvacidal, Aedes aegypti L, Rhizophora apiculata Blume.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus DEN-1, DEN-2, DEN-3, atau DEN-4 (baca: virus denggi tipe 1-4) yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* yang sebelumnya telah terinfeksi oleh virus *dengue* dari penderita DBD lainnya. Kedua jenis nyamuk *Aedes* ini, terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. Nyamuk *Aedes aegypti* merupakan penyebar penyakit (vektor) DBD yang paling efektif dan utama karena tinggal di sekitar permukiman penduduk (Ginanjari, 2007).

Di Indonesia, penyakit DBD kali pertama dicurigai di Surabaya pada 1968. Namun, konfirmasi pasti melalui isolasi virus baru diperoleh pada 1970. Di Jakarta, kasus pertama dilaporkan pada 1969. Kemudian DBD berturut-turut dilaporkan di Bandung dan Yogyakarta pada 1972. Epidemik pertama di luar Jawa dilaporkan pada 1972 di Sumatera Barat dan Lampung, disusul oleh daerah Riau, Sulawesi Utara dan Bali pada 1973. Pada 1974, wabah DBD dilaporkan di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Pada 1994, DBD telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, DBD menjadi endemi di banyak kota besar, bahkan sejak tahun 1975 penyakit ini telah sampai di pedesaan (Ginanjari, 2007).

Di Indonesia DBD telah menjadi masalah kesehatan masyarakat selama 41 tahun terakhir. Sejak tahun 1968 telah terjadi peningkatan persebaran jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang endemis DBD, dari 2 provinsi dan 2 kota, menjadi 32 (97%) dan 382 (77%) kabupaten/kota pada tahun 2009. Provinsi Maluku, dari tahun 2002 sampai tahun 2009 tidak ada laporan kasus DBD. Selain itu terjadi juga

peningkatan jumlah kasus DBD, pada tahun 1968 hanya 58 kasus menjadi 158.912 kasus pada tahun 2009 (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Secara teoritis ada empat cara untuk memutuskan rantai penularan DBD ialah melenyapkan virus, isolasi penderita, menghindari gigitan nyamuk (vektor) dan pengendalian vektor. Pengendalian vektor meliputi pengendalian tempat perindukan, larva, dan nyamuk dewasa (Chahaya, 2003).

Untuk mengatasi masalah penyakit DBD telah banyak usaha dilakukan antara lain dengan cara terapi spesifik dan pengembangan vaksin, tetapi sampai saat ini hasilnya masih belum memuaskan. Alternatif yang paling memberi harapan dan efektif untuk pemberantasan penyakit DBD adalah pengendalian vektor pada stadia larva. Pengendalian pada stadia larva biasanya menggunakan insektisida sintetik karena penggunaan insektisida sintetik sangat efektif, relatif murah, mudah dan praktis diaplikasikan. Akan tetapi penggunaan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan seperti kontaminasi terhadap manusia, hewan, satwa liar, ikan dan biota lainnya. Selain itu serangga menjadi resisten, resurgensi atau toleran terhadap insektisida sintetik tersebut. Insektisida sintetik seperti temefos (abate) diduga beracun dan dapat menyebabkan sakit kepala dan iritasi. Salah satu usaha untuk mengurangi dampak negatifnya adalah dengan mencari bahan nabati yang lebih selektif, aman dan berwawasan lingkungan. Insektisida nabati tidak meninggalkan residu di udara, air dan tanah serta mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan racun-racun anorganik. Hal ini disebabkan oleh susunan molekul insektisida nabati sebagian besar terdiri atas karbohidrat, nitrogen, oksigen dan hidrogen yang mudah terurai menjadi senyawa yang aman bagi lingkungan dan juga menurunkan peluang hewan yang bukan sasaran terkena residu (Rochmat dkk., 2007).

Tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) merupakan salah satu jenis mangrove yang mempunyai potensi yang sangat besar sebagai bahan tradisional insektisida. Mangrove kaya akan senyawa steroid, saponin, flavonoid dan tanin. Ekstrak dan bahan mentah dari mangrove telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk keperluan obat-obatan alamiah.

Dalam penelitian sebelumnya, Tukiran dan Arianti (2012) melaporkan bahwa ekstrak kloroform kulit kayu bakau minyak bersifat toksik terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L. karena mempunyai nilai LC₅₀ sebesar 338,364 mg/L. Halim dkk (2013) dalam penelitiannya juga melaporkan bahwa pada daun *Rhizophora apiculata* ditemukan kaya dengan 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol (26,45%) dan kaur-16-ene (3,37%). Komponen utama pada bunga yaitu 2-(ethoxyethoxy) ethanol (11,08%) dan butyl cyclohexyl ester 1,2-benzenedicarboxylic acid (3,48%). Sedangkan pada batang mengandung octadecamethyl cyclononasiloxane (5,24%), kaurene (3,39%) dan 1,2,3,4-tetramethoxy-5-(2-propenyl)-benzene (3,26%). Penelitian tentang akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) masih sangat jarang dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang uji aktivitas larvasida ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana aktivitas larvasida ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L.?

2. Ekstrak manakah yang memiliki toksisitas paling besar terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L.?

C. Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati, simplisia hewani, maupun simplisia mineral dengan menggunakan pelarut yang sesuai.
- b. Ekstraksi adalah proses penyarian zat aktif dari tumbuhan untuk menarik komponen kimia tertentu.
- c. Insektisida adalah racun yang digunakan untuk mengendalikan hama *insekta* (serangga), seperti hama wereng, belalang dan sebagainya.
- d. Larvasida adalah zat-zat yang dapat dipergunakan untuk membunuh larva.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pembuatan ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) dengan beberapa konsentrasi yaitu 2000, 4000, 6000 ppm kemudian diamati toksisitasnya terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L. untuk memperoleh % mortalitas kemudian dilakukan analisis probit berdasarkan tabel probit sehingga diperoleh nilai LC_{50} (*Lethal Concentration 50*). Ekstrak yang memiliki toksisitas yang paling baik dilakukan identifikasi golongan senyawa menggunakan pereaksi identifikasi. Bercak noda yang muncul dihitung nilai *Retention factor* (Rf)-nya.

D. Kajian Pustaka

Ariyanti dan Tukiran (2012) dalam penelitian “Biolarvasida dari Tumbuhan Bakau Minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) (RHIZOPHORACEAE)” melaporkan bahwa ekstrak kloroform kulit kayu bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

bersifat toksik karena mempunyai nilai LC_{50} sebesar 338,364 mg/L pada waktu pengamatan 24 jam.

Halim dkk (2013) dalam penelitian “Study of Chemical Compounds in *Rhizophora apiculata*” melaporkan bahwa pada daun *Rhizophora apiculata* ditemukan kaya dengan 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol (26,45%) dan kaur-16-ene (3,37%). Komponen utama pada bunga yaitu 2-(ethoxyethoxy) ethanol (11,08%) dan butyl cyclohexyl ester 1,2-benzenedicarboxylic acid (3,48%). Sedangkan pada batang mengandung octadecamethyl cyclononasiloxane (5,24%), kaurene (3,39%) dan 1,2,3,4-tetramethoxy-5-(2-propenyl)-benzene (3,26%).

Darlian dkk (2011) dalam penelitian “Skrining Bioaktivitas Ekstrak Kulit Akar *Rhizophora apiculata* Blume. terhadap Daya Hambat Pertumbuhan Koloni Bakteri *Streptococcus* sp.” melaporkan bahwa ekstrak kulit akar *Rhizophora apiculata* Blume. memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan koloni bakteri *Streptococcus* sp. yang ditandai dengan adanya zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram yang telah diresapkan ekstrak kulit akar *Rhizophora apiculata* Blume.

Rochmah dan Tukiran (2012) dalam penelitian “Uji Bioaktivitas Ekstrak Kloroform *Rhizophora apiculata* (Mangrove) terhadap *Spodoptera littura* Fabr. sebagai Insektisida Nabati” melaporkan bahwa Nilai LC_{50} dari uji bioaktivitas terhadap ulat grayak yaitu sebesar 4759,487 mg/L dengan mortalitas sebesar 55% Jadi, ekstrak kloroform *Rhizophora apiculata* efektif pada rentang konsentrasi 3200-6400 mg/L.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aktivitas larvasida ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 96

% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L.?

b. Untuk mengetahui ekstrak yang memiliki toksisitas paling besar terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu untuk memperoleh alternatif baru dalam pemberantasan larva nyamuk *Aedes aegypti* L. secara alami yang aman bagi makhluk hidup dan lingkungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan

1. Klasifikasi Tumbuhan Bakau Minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Regnum	: Plantae
Subregnum	: Tracheobionta
Superdivisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkelas	: Rosidae
Ordo	: Myrtales
Famili	: Rhizophoraceae
Genus	: <i>Rhizophora</i>
Spesies	: <i>Rhizophora apiculata</i> Blume.


(Plantamor, Database Tumbuhan).

2. Nama Daerah

Bakau merupakan nama umum untuk bermacam-macam spesies *Rhizophora*, famili *Rhizophoraceae* sangat umum terdapat dalam hutan pasang surut di Indonesia, terkenal sebagai penghasil kayu bakar dan zat penyamak yang berharga, yang diperoleh dari kulitnya (Franklin Book Programs Inc., 1977).

Tumbuhan bakau yang digunakan dalam penelitian ini adalah tumbuhan bakau yang memiliki nama setempat bakau minyak, bakau tandok, bakau akik, bakau puteh, bakau kacang, bakau leutik, akik, bangsa minyak, donggo akit, jankar, abat, parai, mangi-mangi, slengkren, tinjang, wako (Noor dkk., 2012).

3. Morfologi



Gambar 1. Bagian Tumbuhan Bakau Minyak (Noor dkk., 2012).

Memiliki pohon dengan ketinggian mencapai 30 m dengan diameter batang mencapai 50 cm. Memiliki perakaran yang khas hingga mencapai ketinggian 5 m, dan kadang memiliki akar udara yang keluar dari cabang. Kulit kayu berwarna abu-abu tua dan berubah-ubah (Noor dkk., 2012).

Daun berkulit, warna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan kemerahan di bagian bawah. Gagang daun panjangnya 17-35 mm dan warnanya kemerahan. Unit dan letak: sederhana dan berlawanan. Bentuk: elips menyempit.

Ujung: meruncing. Ukuran: 7-9 × 3,5-8 cm (Noor dkk., 2012).

Bunga biseksual, kepala bunga kekuningan yang terletak pada gagang berukuran <14 mm. Letak: di ketiak daun. Formasi: kelompok (2 bunga per kelompok). Daun mahkota: 4, kuning putih, tidak ada rambut, panjangnya 9-11 mm. Kelopak bunga: 4, kuning kecoklatan, melengkung. Benang sari: 11-12, tak bertangkai (Noor dkk., 2012).

Buah kasar berbentuk bulat memanjang hingga seperti buah pir, warna coklat, panjang 2-3,5 cm, berisi satu biji fertil. Hipokotil silindris, berbintil, berwarna hijau jingga. Leher kotiledon berwarna merah jika sudah matang. Ukuran: hipokotil panjang 18-38 cm dan diameter 1-2 cm (Noor dkk., 2012).

4. Kandungan

Spesies *Rhizophora* diketahui mengandung metabolit sekunder seperti alkaloid, glikosida, minyak esensial, dan konstituen organik lainnya (Rahim dkk., 2008).

Mangrove jenis *Rhizophora apiculata* L. mengandung tanin terkondensasi utama atau proantosianidin (Rahim dkk., 1935).

Rhizophora apiculata mengandung tanin, steroid, triterpen, dan komponen fenolik (Das dkk., 2015).

Analisis dari daun *Rhizophora apiculata* ditemukan kaya dengan 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol (26,45%) dan kaur-16-ene (3,37%). Komponen utama pada bunga *Rhizophora apiculata* yaitu 2- (ethoxyethoxy) ethanol (11,08%) dan butyl cyclohexyl ester 1,2-benzenedicarboxylic acid (3,48%). Sedangkan pada batang *Rhizophora apiculata* mengandung octadecamethyl cyclonasiloxane (5,24%), kaurene (3,39%) dan 1,2,3,4-tetramethoxy-5-(2- propenyl)-benzene (3,26%) (Halim dkk., 2013).

5. Kegunaan

Kulit kayu *Rhizophora apiculata* Blume. berguna sebagai antiemetik, antiseptik, diare, hemostatik, penyakit tifus dan menghentikan pendarahan. Kulit kayu, bunga, buah, dan daunnya digunakan untuk pengobatan hepatitis (Bandaranayake, 1998).

Secara tradisional, kulit kayu, bunga, buah dan daun *Rhizophora apiculata* digunakan sebagai astringen untuk diare, terapi mual-muntah, tifus, hepatitis, antiseptik dan insektisida (Bandaranayake, 2000).

Kayu dimanfaatkan untuk bahan bangunan, kayu bakar dan arang. Kulit kayu berisi hingga 30% tanin (persen berat kering). Cabang akar dapat digunakan sebagai jangkar dengan diberati batu. Di Jawa acapkali ditanam di pinggiran tambak untuk melindungi pematang. Sering digunakan sebagai tanaman penghijauan (Noor dkk., 2012).

B. Uraian Hewan Uji

1. Klasifikasi *Aedes aegypti* L.

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Arthropoda
Subphylum	: Hexapoda
Class	: Insecta
Superorder	: Holometabola
Order	: Diptera
Suborder	: Nematocera
Infraorder	: Culicomorpha
Family	: Culicidae
Subfamily	: Culicinae

Genus : *Aedes*
Species : *Aedes aegypti* L. (ITIS, 2003)

2. Morfologi Nyamuk *Aedes aegypti* L.

Nyamuk *Aedes aegypti* L. dikenal dengan sebutan *Black White Mosquito* atau *Tiger Mosquito* karena tubuhnya memiliki ciri yang khas yaitu adanya garis-garis dan bercak-bercak putih keperakan di atas dasar warna hitam, sedangkan yang menjadi ciri khas utamanya adalah ada dua garis lengkung yang berwarna putih keperakan di kedua sisi lateral dan dua buah garis putih sejajar di garis median dari punggungnya yang berwarna dasar hitam (*lyre shaped marking*) (Palgunadi, 2011).

Nyamuk *Aedes aegypti* L. betina memiliki tubuh berwarna hitam kecoklatan dengan ukuran 3-4 cm. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan garis-garis putih keperakan. Di bagian punggung (*dorsal*) tubuhnya tampak dua garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan. Sisik-sisik pada tubuh nyamuk umumnya mudah rontok atau terlepas (Ginanjari, 2007).

Nyamuk *Aedes aegypti* L. dewasa lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran nyamuk rumah (*Culex quinquefasciatus*), mempunyai warna dasar yang hitam dengan bintik putih pada bagian-bagian badannya terutama pada bagian kakinya. *Aedes aegypti* juga dikenal dari ciri morfologi yang spesifik yaitu mempunyai gambaran menyerupai bentuk (*lyre-form*) yang putih pada punggungnya (*mesonotumnya*) (Natadisastra, 2009).

Nyamuk *Aedes aegypti* L. mengalami metamorfosis sempurna dari telur, larva instar I, larva instar II, larva instar III, larva instar IV, pupa, hingga *imago* (dewasa) (Kardianan, 2004).

Adapun deskripsi metamorfosis sempurna dari nyamuk *Aedes aegypti* dari telur sampai nyamuk dewasa (*imago*) adalah sebagai berikut.

a. Telur



Gambar 2. Telur Nyamuk *Aedes aegypti* L. (Natadisastra, 2009)

Nyamuk *Aedes aegypti* L. memiliki telur yang berukuran sangat kecil dan berwarna hitam (Wahyuni, 1998). Telur-telur ini biasanya terletak di bagian yang tidak berdekatan langsung dengan tanah, tetapi berdekatan dengan permukaan air, misalnya di bak dengan air yang jernih (Kardinan, 2004).

Karakteristik telur nyamuk *Aedes aegypti* L. adalah berbentuk elips atau oval memanjang dengan permukaan yang poligonal, berwarna hitam, berukuran 0,5 sampai 0,8 mm, tidak memiliki alat pelampung, dan terletak di dinding bagian dalam dari tempat perindukannya (*breeding site*) satu per satu (Soegijanto, 2004). Telur yang terletak di dalam air akan menetas dalam waktu 1 sampai 3 hari pada suhu 30°C yang akan menjadi larva instar I. Telur ini dapat bertahan pada suhu 20°C-120°C selama berbulan-bulan. Akan tetapi, telur ini dapat menetas dalam waktu 4 hari apabila kelembaban udara telur rendah dan dapat membutuhkan waktu 7 hari pada suhu 16°C (Brown, 1979).

b. Larva



Gambar 3. Larva Nyamuk *Aedes aegypti* L. (Departemen Medical Entomology, 2002)

Larva nyamuk *Aedes aegypti* L. memiliki bentuk silinder dan tubuhnya terdiri dari tiga bagian yaitu kepala (*cephal*), dada (*thorax*), dan perut (*abdomen*) (Nurdian, 2003). Dalam perkembangannya larva mengalami 4 kali pergantian kulit (*molting/ecdysis*) dari larva instar I hingga instar IV, dan pupa (Soegijanto, 2004). Kepala berkembang baik sepasang antena maupun kepala majemuk, serta sikat mulut yang menonjol. *Abdomen* terdiri dari 9 ruas yang jelas, dan ruas terakhir dilengkapi tabung udara (*siphon*) untuk mengambil oksigen dan dilengkapi dengan *pectin* pada segmen yang terakhir dengan ciri pendek dan menggelembung. Pada segmen *abdomen* tidak terdapat rambut berbentuk kipas (*palmatus hairs*) pada setiap sisi *abdomen* segmen kedelapan terdapat *comb scale* sebanyak 8-21 atau berjajar 1 sampai 3 dan berbentuk duri. Pada sisi *thorax* terdapat duri yang panjang dengan bentuk kurva dan adanya sepasang rambut di kepala. Larva memperoleh makanan dengan bantuan sikat mulut yang berfungsi untuk menghasilkan aliran air yang dapat membawa makanan ke dalam mulut (Marianti, 2014).

Larva merupakan stadium makan pada perkembangan nyamuk *Aedes aegypti* L. Makanan ketika menjadi larva adalah bahan-bahan organik terlarut dalam air dan mikroorganisme lainnya. Larva memiliki pergerakan yang sangat lincah. Apabila larva sedang tidak melakukan aktivitas atau mengambil napas, maka posisi tubuhnya membentuk sudut dengan permukaan air dan *siphon* ditonjolkan ke arah permukaan air serta berkembang biak pada air jernih yang dasarnya bukan tanah (Nurdian, 2003).

Ada 4 tingkatan perkembangan (instar) larva *Aedes aegypti* L. sesuai dengan pertumbuhan larva yaitu :

1. Larva instar I: Ukuran sekitar 1-2 mm, duri-duri (*spinae*) pada dada belum jelas dan pada corong pernapasan masih belum jelas dan berlangsung 1-2 hari.

2. Larva instar II: Ukuran 2,5-3,5 mm, duri-duri belum jelas dan corong pernapasan mulai menghitam berlangsung 2-3 hari.

3. Larva instar III: Ukuran 4-5 mm, duri-duri dada mulai jelas dan corong pernapasan berwarna coklat kehitaman. Pada instar III ini memiliki *sifon* yang gemuk, gigi sisir pada segmen *abdomen* kedelapan mengalami pergantian kulit dan berlangsung 3-4 hari.

4. Larva instar IV: Ukuran 5-6 mm, dengan warna kepala gelap. Corong pernapasan pendek dan gelap kontras dengan warna tubuhnya, setelah 2-3 akan mengalami pergantian kulit dan berubah menjadi pupa berlangsung selama 2-3 hari (Marianti, 2014).

c. Pupa



Gambar 4. Pupa Nyamuk *Aedes aegypti* L. (Departemen Medical Entimology, 2002)

Pupa merupakan stadium terakhir yang berada dalam air dan tidak memerlukan makanan karena merupakan fase istirahat. Pupa mempunyai segmen-segmen pada bagian perutnya (struktur menyerupai dayung) sehingga terlihat menyerupai koma. Kepala dan dadanya menyatu dilengkapi dengan sepasang terompet pernapasan. Pupa memiliki daya apung yang besar. Pupa biasanya istirahat di permukaan air dengan posisi statis tetapi dapat berenang dengan baik. Fase pupa membutuhkan 2-5 hari akan muncul nyamuk dewasa (Hadi dkk., 2009). Total siklus yang dapat diselesaikan 9-12 hari. Pada fase pupa belum ada perbedaan antara jantan

dan betina. Pada umumnya nyamuk jantan menetas terlebih dahulu daripada nyamuk betina dan selanjutnya keluar dari air dan berkembang menjadi nyamuk (Mulyatno, 2011). Fase pupa pada nyamuk *Aedes aegypti* L. memiliki bentuk tubuh yang pendek, dengan bagian kepala-dada (*cephalothorax*) lebih besar dibandingkan bagian perutnya, sehingga bentuknya seperti tanda koma. Pupa ini bernapas di permukaan air melalui sepasang struktur seperti terompet yang kecil pada *toraks* (Borror dkk., 1992). Pupa juga memiliki sepasang alat pengayuh pada ruas perut kedelapan yang dapat berfungsi untuk berenang. Pupa merupakan fase nyamuk yang tidak makan, tetapi memiliki gerakan yang lebih lincah dibandingkan dengan larva (Wahyuni, 1998).

d. *Imago* (Nyamuk Dewasa)



Gambar 5. Nyamuk *Aedes aegypti* L. Dewasa (Suharmiati dan Handayani, 2007).

Nyamuk *Aedes aegypti* L. dewasa memiliki karakteristik tubuh berwarna hitam dengan belang-belang putih pada seluruh tubuhnya. Habitat nyamuk ini di alam bebas dan di sekitar rumah, bahkan dapat ditemukan di tempat umum. Nyamuk ini memiliki kemampuan terbang sampai 100 meter. Darah merupakan sumber protein untuk mematangkan telur. Dengan demikian yang aktif menggigit (menghisap) darah pada pagi hingga sore hari adalah nyamuk betina. Darah yang dihisap oleh nyamuk betina mengandung protein yang dapat membantu proses pematangan telur. Namun, setelah menghisap darah nyamuk ini akan mencari tempat

istirahat, sedangkan nyamuk jantan memenuhi nutrisi dalam tubuh dengan menghisap sari bunga tumbuhan yang mengandung gula (Syarifah, 2007).

Nyamuk *Aedes aegypti* L. betina memiliki mulut dengan tipe penusuk-penghisap (*piercing-sucking*) dan lebih menyukai manusia (*antropofagus*), sedangkan nyamuk jantan bagian mulutnya lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia, oleh karena itu nyamuk jantan lebih menyukai cairan tumbuhan (*phytopagus*) (Brown, 1979). Umur nyamuk *Aedes aegypti* L. betina berkisar antara 2 minggu sampai 3 bulan atau rata-rata 1,5 bulan, tergantung dari suhu dan kelembapan udara di sekelilingnya (Suroso, 1999).

Tubuh *imago Aedes aegypti* L. dewasa dibagi menjadi tiga bagian yaitu :


1. Kepala (*caput*) berbentuk seperti bola dan tertutup oleh sepasang mata *faset* dan tidak mempunyai mata *oselus* dan mata biasa. Kepala nyamuk juga tersusun atas antena yang panjangnya melebihi panjang dari *palpus maksila*, alat mulut nyamuk betina tipe penusuk-penghisap sedangkan jantan bagian mulutnya lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia, mata majemuk menyolok.

2. Dada (*thoraks*), terdapat sepasang sayap tanpa noda-noda hitam. Bagian punggung (*mesonotum*) ada gambaran garis-garis putih yang dapat dipakai untuk membedakan dengan jenis lain. Gambaran punggung nyamuk *Aedes aegypti* L. berupa sepasang garis lengkung putih pada tepinya dan sepasang garis submedian di tengahnya. Pasangan kaki ada yang panjang dan pendek. *Femur* bersisik putih pada permukaan posterior dan setengah basal, anterior dan tengah bersisik putih memanjang. *Tibia* semuanya hitam dan *tarsi* belakang berlingkaran putih pada segmen basal kesatu sampai keempat dan segmen kelima berwarna putih. Sayap berukuran 2,5-3,0 mm bersisik hitam.

3. Perut (*abdomen*), tersusun atas delapan segmen, segmen delapan nyamuk

jantan lebar dan berbentuk kerucut sedang pada nyamuk betina segmen delapan agak meruncing dengan *sersi* menonjol. Waktu istirahat posisi nyamuk *Aedes aegypti* L. ini tubuhnya sejajar dengan bidang permukaan yang dihinggapinya.

3. Siklus Hidup Nyamuk *Aedes aegypti* L.



Gambar 6. Siklus Hidup Nyamuk *Aedes aegypti* L. (Global Pest, 2013).

Nyamuk *Aedes aegypti* L. meletakkan telur pada permukaan air bersih secara individual. Setiap hari nyamuk *Aedes aegypti* L. betina dapat bertelur rata-rata 100 butir. Telurnya berbentuk elips warna hitam dan terpisah satu dengan yang lain. Telur menetas dalam satu sampai dua hari menjadi larva. Terdapat empat tahapan dalam perkembangan larva disebut instar. Perkembangan dari instar satu ke instar empat memerlukan waktu sekitar lima hari. Setelah mencapai instar keempat, larva berubah menjadi pupa dimana larva memasuki masa dorman (inaktif, tidur). Pupa bertahan selama dua hari sebelum akhirnya nyamuk dewasa keluar dari pupa. Perkembangan dari telur hingga nyamuk dewasa membutuhkan waktu tujuh hingga delapan hari, tetapi dapat lebih lama jika kondisi lingkungan tidak mendukung. Telur *Aedes aegypti* L. tahan terhadap kondisi kekeringan, bahkan bisa bertahan hingga

satu bulan dalam keadaan kering (Ginanjari, 2007).

C. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam berdarah *dengue* adalah penyakit akut yang disebabkan oleh infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* betina. Nyamuk tersebut pada umumnya menyerang pada musim panas dan musim hujan (Suharmiati dan Handayani, 2007).

Nyamuk *dengue* menggigit manusia pada pagi sampai sore hari, biasanya pukul 08.00-12.00 dan 15.00-17.00. Nyamuk mendapatkan virus dengue setelah menggigit orang yang terinfeksi virus *dengue* (Suharmiati dan Handayani, 2007).

Virus *dengue* termasuk genus *Flavivirus* dari keluarga *Flaviviridae*. Virus yang berukuran kecil (50 nm) ini mengandung RNA berantai tunggal. *Virion*-nya mengandung *nukleokapsid* berbentuk kubus yang terbungkus selubung *lipoprotein*. *Genome* virus *dengue* berukuran panjang sekitar 11.000 pasangan basa, dan terdiri dari tiga gen protein struktural yang mengodekan *nukleokapsid* atau protein inti (*core*, *C*), satu protein terikat membran (*membrane*, *M*), satu protein penyelubung (*envelope*, *E*), dan tujuh gen protein non struktural (*nonstructural*, *NS*). Selubung *glikoprotein* berhubungan dengan hemaglutinasi virus dan aktivitas netralisasi. Virus dengue membentuk kompleks yang khas di dalam genus *Flavivirus* berdasarkan karakteristik antigenik dan biologisnya. Ada empat serotipe virus yang kemudian dinyatakan sebagai DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4 (WHO, 2004).

Virus *dengue* bersifat labil terhadap panas (termolabil). Sifat ini mesti diperhatikan ketika kita hendak melakukan isolasi ataupun mengkultur virus (Ginanjari, 2007).

Virus ini dapat tetap hidup (*survive*) di alam lewat dua mekanisme, yaitu:

1. Mekanisme pertama, transmisi vertikal dalam tubuh nyamuk. Virus dapat

ditularkan oleh nyamuk betina pada telurnya, yang nantinya akan menjadi nyamuk. Virus juga dapat ditularkan dari nyamuk jantan ke nyamuk betina melalui kontak seksual.

2. Mekanisme kedua, transmisi virus dari nyamuk ke dalam tubuh makhluk vertebrata dan sebaliknya. Yang dimaksud dengan nyamuk vertebrata di sini adalah manusia dan kelompok kera tertentu.

Virus yang sampai ke dalam lambung nyamuk akan mengalami replikasi (memecah diri atau berkembang biak), kemudian akan bermigrasi dan akhirnya sampai di kelenjar ludah nyamuk. Empat hari kemudian virus akan memasuki sirkulasi darah dan saat itulah manusia yang terinfeksi akan mengalami gejala panas. Reaksi tubuh manusia terhadap virus ini berbeda-beda. Perbedaan reaksi ini juga akan mewujudkan perbedaan penampilan gejala klinis dan perjalanan penyakit (Suharmiati dan Handayani, 2007).

Setelah difagosit oleh makrofag, virus *dengue* akan melepaskan asam nukleatnya ke dalam sitoplasma sel inang dan mulai menginisiasi replikasi untuk membentuk anak-anak virus. Replikasi dimulai dengan RNA virus *dengue* menipu sistem kekebalan tubuh dengan bertindak menyerupai mRNA yang membawa kode protein untuk gen struktural dan non struktural. RNA virus ini akan diterjemahkan oleh sistem tubuh untuk membentuk protein struktural virus serta enzim virus. Penerjemahan RNA virus oleh sistem tubuh untuk mengkatalisis reaksi pembentukan virus. Pada saat bersamaan RNA Virus akan diduplikasi oleh enzim yang dihasilkan sebelumnya untuk membentuk anakan RNA virus. RNA anakan ini akan bergabung dengan protein struktural yang dibentuk untuk menghasilkan virus utuh yang belum aktif. Setelah partikel virus ini dilepaskan oleh sel yang terinfeksi, mereka menjadi virus yang siap menginfeksi sel lain (Wahid, 2014).

Virus *dengue* menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah, sehingga mengakibatkan pendarahan. Jika terjadi pendarahan yang tampak dari luar, bagian tubuh yang umumnya mengalami pendarahan adalah di rongga hidung dan gusi atau kulit. Pendarahan juga terjadi di bagian dalam tubuh yang tidak tampak dari luar (Suharmiati dan Handayani, 2007). Bentuk reaksi tubuh manusia terhadap keberadaan virus *dengue* sebagai berikut:

1. Terjadi netralisasi virus, disusul dengan mengendapnya bentuk netralisasi virus pada pembuluh darah kecil di kulit berupa gejala ruam (bercak merah kecil).
2. Terjadi gangguan fungsi pembekuan darah sebagai akibat dari penurunan jumlah dan kualitas komponen-komponen beku darah yang menimbulkan pendarahan.
3. Terjadi kebocoran pada pembuluh darah yang mengakibatkan keluarnya komponen plasma (cairan) darah dari dalam pembuluh darah menuju ke rongga perut berupa gejala *ascites* (adanya cairan dalam rongga perut) dan cairan di rongga selaput paru berupa gejala *efusi pleura* (adanya cairan di rongga selaput paru) (Suharmiati dan Handayani, 2007).

Penularan penyakit DBD dipengaruhi oleh interaksi tiga faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pejamu (target penyakit, inang), dalam hal ini adalah manusia yang rentan tertular penyakit DBD.
2. Faktor penyebar (vektor) dan penyakit (agen), dalam hal ini adalah virus DEN tipe 1-4 sebagai agen penyebab penyakit, sedangkan nyamuk *Aedes* berperan sebagai vektor penyebar penyakit DBD.
3. Faktor lingkungan, yakni lingkungan yang memudahkan terjadinya kontak penularan penyakit DBD (Ginanjari, 2007).

D. Larvasida

Larvasida merupakan golongan dari pestisida yang dapat membunuh serangga belum dewasa atau sebagai pembunuh larva. Larvasida berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu *lar* berarti serangga belum dewasa dan *sida* berarti pembunuh. Jadi larvasida dapat diartikan sebagai pembunuh serangga yang belum dewasa. Pemberantasan nyamuk menggunakan larvasida merupakan metode terbaik untuk mencegah penyebaran nyamuk. Parameter aktivitas larvasida suatu senyawa kimia dilihat dari kematian larva (Sudarmo, 1989).

Penggunaan larvasida alami memiliki beberapa keuntungan, antara lain penguraian yang cepat oleh sinar matahari, udara, kelembaban, dan komponen alam lainnya, sehingga mengurangi risiko pencemaran tanah dan air. Selain itu, umumnya larvasida alami memiliki toksisitas yang rendah pada mamalia karena sifat inilah yang menyebabkan larvasida alami memungkinkan untuk diterapkan pada kehidupan manusia (Novizan, 2002).

Pemilihan bahan yang akan digunakan sebagai larvasida tentunya harus aman terhadap manusia ataupun organisme lain, selain itu bahan juga mudah didapatkan, diharapkan dapat memberi dampak positif pada kesehatan manusia (Pratiwi, 2014).

E. Pengantar Fitokimia

1. Simplisia

Dalam "Materia Medika Indonesia" ditetapkan definisi bahwa simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan simplisia nabati (simplisia yang berasal dari tumbuhan), simplisia hewani (simplisia yang berasal dari hewan) dan simplisia pelikan (mineral) (Departemen Kesehatan RI, 2000).

2. Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Departemen Kesehatan RI, 2000).

Ada beberapa jenis ekstrak, yakni: ekstrak cair, ekstrak kental dan ekstrak kering. Ekstrak cair jika hasil ekstraksi masih bisa dituang, biasanya kadar air lebih dari 30%. Ekstrak kental jika memiliki kadar air antara 5-30%. Ekstrak kering jika mengandung air kurang dari 5% (Voight, 1994).

3. Ekstraksi

Salah satu metode yang digunakan untuk penemuan obat tradisional adalah metode ekstraksi. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya:

- a. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui
- b. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme
- c. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural

(Sarker SD dkk., 2006).

Adapun metode ekstraksi antara lain:

- a. Ekstraksi dengan Menggunakan Pelarut
 1. Cara Dingin
 - a) Maserasi

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara

ini sesuai baik untuk skala kecil maupun skala industri (Agoes, 2007).

Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Departemen Kesehatan RI, 2000).

b) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (*exhaustic extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Departemen Kesehatan RI, 2000).

2. Cara Panas

a) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Departemen Kesehatan RI, 2000).

b) Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Komponen alat terdiri dari labu alas bulat, klonsong, kondensor, dan pipa siphon (Departemen Kesehatan RI, 2000).

c) Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C (Departemen Kesehatan RI, 2000).

d) Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98°C selama waktu tertentu (15-20 menit) (Departemen Kesehatan RI, 2000).

e) Dekok

Dekok adalah ekstraksi dengan pelarut air pada waktu yang lebih lama ($\geq 30^\circ\text{C}$) dan temperatur sampai titik didih air (Departemen Kesehatan RI, 2000).

b. Destilasi Uap

Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa kandungan menguap (minyak atsiri) dari bahan (segar atau simplisia) dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial senyawa kandungan menguap dengan fase uap air dari ketel secara kontinu sampai sempurna dan diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran (senyawa kandungan menguap ikut terdestilasi) menjadi destilat air bersama kandungan senyawa yang memisah sempurna atau memisah sebagian. Terdiri dari komponen alat berupa 2 buah bejana, gelas kimia, dan pipa alonga (Departemen Kesehatan RI, 2000).

c. Cara Ekstraksi lainnya

1. Ekstraksi Berkesinambungan

Proses ekstraksi yang dilakukan berulang kali dengan pelarut yang berbeda atau resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali (Departemen Kesehatan RI, 2000).

2. Superkritikal Karbondioksida

Penggunaan prinsip superkritik untuk ekstraksi serbuk simplisia, dan umumnya digunakan gas karbondioksida.

3. Ekstraksi Ultrasonik

Getaran ultrasonik (>20.000 Hz) memberikan efek pada proses ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelombang spontan (*cavitation*) sebagai stress dinamik serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil ekstraksi bergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses ultrasonikasi (Departemen Kesehatan RI, 2000).

4. Ekstraksi Energi Listrik

Energi listrik digunakan dalam bentuk medan listrik, medan magnet serta *electrical-discharges* yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan hasil dengan prinsip menimbulkan gelombang spontan dan menyebarkan gelombang tekanan berkecepatan ultrasonik (Departemen Kesehatan RI, 2000).

5. Toksisitas

Penggolongan toksisitas suatu insektisida dilakukan oleh badan internasional seperti WHO dan EPA (*environmental protection agency*) yang merupakan referensi bagi industri insektisida maupun penggunaannya (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Toksisitas (*toxicity*) adalah suatu kemampuan yang melekat pada suatu bahan untuk menimbulkan keracunan atau kerusakan. Toksisitas biasanya dinyatakan dalam suatu nilai yang dikenal sebagai dosis atau konsentrasi mematikan pada hewan coba dinyatakan dengan *lethal dose* (LD) atau *lethal concentration* (LC) (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Uji toksisitas dimaksudkan untuk memaparkan adanya efek toksik dan meneliti batas keamanan dalam kaitannya dengan penggunaan senyawa yang

terdapat dalam tumbuhan tersebut (Agustin dkk., 2012).

LD₅₀ (*Median Lethal Dose 50*) adalah dosis mematikan/*lethal* yang mematikan 50% hewan coba jika diberikan melalui mulut (oral) atau diserap melalui kulit (dermal) atau bahkan terhisap melalui pernafasan (inhalasi), yang biasanya dinyatakan dalam mg suatu insektisida per kg berat badan (mg/kg bb) (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

LC₅₀ (*Median Lethal Concentration*) adalah konsentrasi suatu insektisida (biasanya dalam makanan, udara, atau air) untuk mematikan 50% hewan coba. LC₅₀ biasanya dinyatakan dalam mg/L atau mg/serangga. Semakin kecil nilai LD₅₀ atau LC₅₀ maka semakin beracun insektisida tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Sehubungan dengan pemanfaatan pestisida nabati, toksisitas akut dapat dinyatakan dengan LD₅₀ (*Lethal Dose 50*) dan LC₅₀ (*Lethal Concentration 50*). LD₅₀ adalah kadar pestisida yang diperkirakan dapat membunuh 50% hewan percobaan, satuannya ialah miligram bahan aktif suatu pestisida per kg berat hewan percobaan (mg/kg). Sedangkan LC₅₀ yaitu konsentrasi pestisida yang diperkirakan dapat membunuh 50% hewan percobaan dinyatakan dalam ppm atau ppb (Rumabar, 2009).

Hubungan LC₅₀ dengan kategori toksisitas yaitu:

Tabel 1. Hubungan LC₅₀ dengan kategori toksisitas (Lu, 1995)

Kategori	LC₅₀
Supertoksik	≤ 5 mg/kg
Sangat toksik	5-50 mg/kg
Toksik	50-500 mg/kg
Toksik sedang	0,5-5 g/kg
Toksik ringan	5-15 g/kg
Praktis tidak toksik	> 15 g/kg

Penelitian toksisitas subakut umumnya dilakukan selama 14-21 hari, bertujuan untuk memperluas uji toksisitas dengan menentukan dosis toksik minimal dan dosis maksimal yang dapat ditoleransi dan kemungkinan adanya toleransi dan

akumulasi. Dosis toksik minimal adalah dosis terkecil yang masih memberikan efek terapi. Dosis maksimal adalah dosis terbesar yang tidak menimbulkan gejala toksik. Cara pemberian obat dan besarnya dosis yang diberikan bergantung pada kebutuhan uji klinik (Harmita dan Radji, 2006).

Penelitian toksisitas kronis dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, dapat sampai beberapa bulan (Staf Pengantar Departemen Farmakologi, 2008). Percobaan jenis ini mencakup pemberian zat kimia secara berulang selama 3-6 bulan atau seumur hidup hewan (Harmita dan Radji, 2006).

F. Tinjauan Islam

Manusia dan tumbuhan sangat erat kaitannya dalam kehidupan. Banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah swt. karena itupun banyak juga nilai manfaat yang bisa diperoleh manusia dari tumbuhan. Akan tetapi, masih banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita yang belum diketahui manfaatnya sehingga manusia diperintahkan untuk mempelajari hal tersebut. Keberadaan tumbuhan merupakan berkah dan nikmat Allah swt. yang diberikan kepada makhluk-Nya. Allah swt. berfirman dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“dan apakah mereka tidak melihat ke bumi, berapa banyak Kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang yang tumbuh subur lagi bermanfaat?”

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah swt. senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengarahkan pandangan sepanjang, seluas, dan seantero bumi, *berapa banyak Kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenis yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat.*

Kata *ila/ke* pada firman-Nya di awal ayat ini: *awalam yara ila al-*

ardhl/apakah mereka tidak melihat ke bumi merupakan kata yang mengandung makna *batas akhir*. Dengan demikian, ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2007).

Kata *zauj* berarti *pasangan*. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah yang terhampar di bumi. Dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya. Yang jelas setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu, ayat di atas memulai dengan pertanyaan *apakah mereka tidak melihat*, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Shihab, 2007).

Kata *karim* antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2007).

Dari ayat di atas, kita diperintahkan untuk memahami dan mempelajari apa yang telah diciptakan oleh Allah swt. dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang subur dan bermacam-macam jenisnya. Tumbuhan tersebut akan bermanfaat jika kita mencari tau nilai manfaat dari tumbuhan tersebut.

Allah swt. juga menciptakan jenis-jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-An'am/6: 99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
 مِنْهُ خَضِرًا حُجْرًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Dia yang telah menurunkan air dari langit, lalu Kami mengeluarkan disebabkan olehnya segala macam tumbuh-tumbuhan, lalu Kami keluarkan darinya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan darinya butir yang saling bertumpuk; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman.”

Ayat ini merupakan lanjutan bukti-bukti kemahakusaan Allah swt. Ayat ini menegaskan bahwa Dan Dia juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni Allah, mengeluarkan, yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau (Shihab, 2007).

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya, ditegaskan lebih jauh bahwa, Kami keluarkan darinya, yakni dari tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau satu benih (Shihab, 2007).

Selanjutnya Allah swt. memberi contoh dengan mendahulukan menyebut sesuatu yang berkaitan dengan butir karena butir yang disebut pertama pada ayat

yang lalu (ayat 95), yaitu bahwa: *Dan dari mayan, yakni pucuk kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, yang mudah dipetik dan kebun-kebun anggur, dan Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa bentuk buahnya dan tidak serupa aroma dan kegunaannya. Perhatikanlah buah yang dihasilkannya dengan penuh penghayatan guna menemukan pelajaran melalui beberapa fase di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman* (Shihab, 2007).

Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya (Shihab, 2007).

Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan Allah. Zat hemoglobin yang diperlukan untuk pernapasan manusia dan sejumlah besar jenis hewan, berkaitan erat sekali dengan zat hijau daun. Atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen mengandung atom zat besi di dalam molekul hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri mengandung atom magnesium dalam molekul klorofil. Di dunia kedokteran, ditemukan bahwa klorofil, ketika diasimilasi oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Pencampuran itu kemudian memberikan tenaga dan kekuatan melawan bermacam bakteri penyakit. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari serangan segala macam penyakit (Shihab, 2007).

Di bagian akhir ayat ini disebutkan: *unzhuru ila tsamarihi idza atsmara wa yan'ihl/perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya.*

Perintah ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan (botanik) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya (Shihab, 2007).

Adapun ayat 99 yang ditutup dengan *liqaumin yu'minun/bagi kaum yang beriman*, ia ditutup demikian sebagai isyarat bahwa ayat-ayat ini atau tanda-tanda itu hanya bermanfaat untuk yang beriman. Memang bisa saja ada yang mengetahui rahasia di balik fenomena yang diuraikan ayat-ayat di atas, tetapi bila pengetahuannya tidak disertai iman kepada Allah, pengetahuan tersebut tidak akan bermanfaat. Atau, dapat juga penutup itu dipahami sebagai mengisyaratkan bahwa yang tidak mengetahui dengan dalam atau bahkan yang tidak mengetahui walau sepintas tentang bukti-bukti tersebut bukanlah orang yang beriman (Shihab, 2007).

Berdasarkan tafsiran ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia seharusnya bisa memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah swt. yang ada di sekitar kita sehingga bisa bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah swt. Karena dari tanda-tanda tersebut manusia bisa mencari nilai manfaat atas apa yang telah diciptakan oleh Allah swt. khususnya tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan oleh manusia dalam bidang pengobatan karena segala yang diciptakan oleh Allah swt. tidak ada yang sia-sia.

Tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt. tidak serta merta diciptakan tanpa manfaat. Nabi Muhammad saw. bersabda dalam sebuah hadis:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan untuk penyakit itu obatnya” (HR. Al-Bukhari no. 5678).

Nikmat yang diberikan oleh Allah swt. dalam hadis di atas yakni Allah memberikan obat bagi penyakit apa saja yang diderita oleh seorang hamba. Dan dari

hadis tersebut membuktikan bahwa betapa Maha pengasih dan Maha besar Allah telah memberikan obat atas segala macam penyakit.

Disebutkan pula dalam hadis:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءٌ بَرَأَ أَبِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit ada obatnya. Maka bila obat itu mengenai penyakit akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla” (HR. Muslim no. 5705)

Pada hadis ini, mengaitkan kesembuhan dengan penggunaan obat yang tepat untuk penyakit karena setiap penyakit memiliki obat yang menjadi penawarnya, yang dengannya penyakit itu diobati. Jika obat dan penggunaan obat yang digunakan sesuai dengan penyakit, insya Allah penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah swt.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara eksperimental laboratorium.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Biologi Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kepustakaan dan eksperimen. Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada teori-teori yang melingkupi masalah dan bidang penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan dari buku, jurnal penelitian dan lain-lain.

C. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) yang diperoleh dari hutan mangrove Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: cawan porselin, chamber, corong, corong buchner, desikator, gelas arloji, gelas kimia (Iwaki Pyrex[®]), gelas ukur (Iwaki Pyrex[®]), labu alas bulat (Schoot Duran[®]), labu tentukur

(Iwaki Pyrex[®]), mangkok, mesin penggiling, *microwave*, mortir, neraca analitik (Kern[®]), neraca ohaus, pipa kapiler, pipet mikro (Nesco Dragon Lab[®]), pipet tetes, *rotatory evaporator* (Ika[®]RV 100), pompa vakum (Rocker 300[®]), sendok besi, sendok tanduk, stamper, vial, vortex mixer (K VM-300), wadah maserasi, *waterbath* (Memmert) dan wadah penetasan telur nyamuk *Aedes aegypti* L.

2. Bahan yang digunakan

Bahan bahan yang digunakan yaitu abate, air suling, aluminium foil, dimetilsulfoksida (DMSO), etanol 70%, etanol 96%, etil asetat, kertas perkamen, kertas saring whattman, larva nyamuk *Aedes aegypti* L., lempeng KLT, n-heksan, pelet ikan, pereaksi aluminium klorida, asam sulfat 10%, besi (III) klorida 1%, dragendorf, kalium hidroksida etanolik dan lieberman-burchard, silika gel dan simplisia akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.).

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengambilan Sampel

Sampel akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) diambil dari hutan mangrove di Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

2. Determinasi Sampel

Bagian tumbuhan secara keseluruhan diambil dan dibuat herbarium kemudian dideterminasi di Divisi Botani Laboratorium Farmakognosi-Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia.

3. Pengolahan Sampel

Sampel segar akar napas tumbuhan bakau minyak yang telah diambil dibersihkan kemudian dipisahkan dari kotoran yang menempel, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian diangin-anginkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari

langsung. Setelah kering diserbukkan dengan menggunakan mesin penggiling kemudian sampel siap untuk diekstraksi.

4. Ekstraksi Sampel

Sampel akar napas tumbuhan bakau minyak yang telah diserbukkan, ditimbang sebanyak 1000 g kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi, lalu ditambahkan pelarut n-heksan hingga semua bagian sampel terendam secara keseluruhan (tingginya \pm 1-2 cm) dan ditutup rapat. Dibiarkan selama 2 \times 24 jam sambil diaduk sesekali. Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Filtrat n-heksan diuapkan pelarutnya dengan menggunakan *rotatory evaporator* hingga diperoleh ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak. Ampasnya kemudian direndam dengan etil asetat selama 2 \times 24 jam sambil diaduk sesekali. Disaring dan dipisahkan filtrat dan ampasnya. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Filtrat etil asetat diuapkan pelarutnya dengan *rotatory evaporator* hingga diperoleh ekstrak etil asetat akar napas tumbuhan bakau minyak. Ampasnya kemudian direndam dengan etanol 96% selama 2 \times 24 jam sambil diaduk sekali-kali. Disaring dan dipisahkan filtrat dan ampasnya. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Filtrat etanol 96% diuapkan pelarutnya dengan *rotatory evaporator* hingga diperoleh ekstrak etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak.

5. Penyiapan Larva Uji

Telur nyamuk *Aedes aegypti* L. yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Surabaya. Telur nyamuk *Aedes aegypti* L. yang dikirim dalam bentuk *paper egg*. Larva nyamuk *Aedes aegypti* L. disiapkan dengan cara merendam *paper egg* tersebut dalam wadah yang berisi air suling. Telur menetas dalam waktu \pm 24 jam menjadi larva nyamuk

instar 1 dan mencapai larva instar 3 pada umur 5 hari. Larva instar 3 memiliki ciri-ciri fisik yang dapat dilihat yaitu duri-duri dada (*spinae*) mulai jelas dan corong pernafasan (*siphon*) yang agak gemuk.

6. Pembuatan Larutan Uji

Pembuatan larutan uji dimulai dengan pembuatan larutan stok 10.000 ppm untuk masing-masing ekstrak (ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol 96%) akar napas tumbuhan bakau (*Rhizophora apiculata* Blume.) dengan cara ditimbang sebanyak 1000 mg untuk masing-masing ekstrak, kemudian ditambahkan DMSO 600 μ L, dihomogenkan hingga ekstrak larut, lalu dicukupkan volumenya dengan air suling hingga 100 ml. Kemudian dibuat larutan uji untuk masing-masing ekstrak pada konsentrasi 2000, 4000, dan 6000 ppm dengan kaidah rumus pengenceran.

7. Uji Aktivitas Larvasida

Pengujian aktivitas larvasida dimulai dengan memasukkan tiap konsentrasi larutan uji masing-masing ekstrak (ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol 96%) akar napas tumbuhan bakau (*Rhizophora apiculata* Blume.) sebanyak 3 replikasi untuk masing-masing konsentrasi ke dalam vial uji 20 mL. Sebagai kontrol positif digunakan Abate 100 ppm. Abate 100 ppm dibuat dengan cara memipet 2 mL larutan dari stok Abate 1000 ppm yang telah dibuat ke dalam vial 20 mL dan dicukupkan dengan air suling hingga volumenya 20 mL. Kontrol negatifnya yaitu DMSO 1% (v/v). DMSO 1% (v/v) dibuat dengan cara memipet 1 mL DMSO kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 mL. Pembuatan larutan kontrol negatif dilakukan dengan memipet larutan sebanyak 20 mL kemudian dimasukkan ke dalam vial uji 20 mL. Setelah pembuatan larutan uji, dimasukkan larva nyamuk *Aedes aegypti* L. sebanyak 10 ekor ke dalam masing-masing vial uji menggunakan pipet

tetes. Dihitung % mortalitas larva pada waktu pengamatan 24, 48 dan 72 jam untuk memperoleh nilai probit. Data pengamatan diolah untuk memperoleh nilai LC_{50} untuk mengetahui toksisitas larutan uji.

8. Analisis Data

Dihitung % mortalitas larva dengan rumus:

$$\% \text{ Mortalitas Larva} = \frac{\text{jumlah total larva yang mati} - \text{jumlah larva mati pada kontrol}}{\text{jumlah total larva hidup pengaruh perlakuan}} \times 100\%.$$

Setelah % mortalitas larva diketahui, dilakukan analisis probit. Analisis probit digunakan dalam pengujian biologis untuk mengetahui respon subyek yang diteliti oleh adanya stimulasi larvasida untuk mengetahui respon mortalitas. Dari data tersebut diperoleh persamaan garis $y = ax + b$ dan dihitung nilai LC_{50} sehingga diperoleh hasil analisis yaitu nilai LC_{50} setiap ekstrak pada waktu pengamatan 24, 48 dan 72 jam.

9. Identifikasi Golongan Senyawa

Identifikasi senyawa dilakukan dengan mengelusi ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) yang telah dilarutkan dengan pelarut n-heksan:etil asetat perbandingan 5:1 kemudian dilihat di bawah lampu UV 254 dan 366 nm. Selanjutnya dilakukan penyemprotan pereaksi identifikasi yaitu Aluminium Klorida, Asam Sulfat 10%, Besi (III) Klorida 1%, Dragendorff, Kalium Hidroksida Etanolik dan Lieberman-Burchard. Bercak noda yang muncul setelah penyemprotan pereaksi dihitung nilai R_f -nya dengan rumus:

$$R_f = \frac{\text{Jarak tempuh noda}}{\text{Jarak tempuh eluen}}$$

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Akar Napas Tumbuhan Bakau Minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Berat sampel segar akar napas *Rhizophora apiculata* Blume. yaitu 6,6 kg dan setelah dikeringkan menjadi 3,3 kg kemudian dilakukan penggilingan yang hasilnya 2,4 kg. Ekstraksi 1000 g akar napas *Rhizophora apiculata* Blume dengan pelarut n-heksan, etil asetat dan etanol 96% diperoleh berat ekstrak n-heksan 2,1 g dengan rendamen 0,21%, berat ekstrak etil asetat 2,7 g dengan rendamen 0,27%, dan berat ekstrak etanol 96% 89,55 g dengan rendamen 8,955 terhadap berat kering. Berat sampel yang digunakan untuk masing-masing ekstrak uji adalah 1000 mg.

Tabel 2. Hasil ekstraksi sampel Rhizophora apiculata Blume.

Sampel	Pelarut	Berat Ekstrak	Rendamen
Simplisia akar napas tumbuhan bakau minyak (<i>Rhizophora apiculata</i> Blume.) 1000 g	n-Heksan	2,1 g	0,21%
	Etil Asetat	2,7 g	0,27%
	Etanol 96%	89,55 g	8,955%

2. Uji Aktivitas Larvasida Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat dan Etanol 96% Akar Napas Tumbuhan Bakau Minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

*Tabel 3. Hasil uji aktivitas larvasida ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)*

Sampel	Konsentrasi (µg/mL) % Mortalitas Larva			Nilai Probit			LC ₅₀ (µg/mL)	Regresi Linear	R ²
	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm			
Ekstrak n-Heksan	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm			
24 jam	33,3	53,3	66,7	4,56	5,08	5,44	87,28	$y = 0,44x + 4,146$	0,989
48 jam	53,3	60	80	5,08	5,25	5,84	9,42	$y = 0,38x + 4,63$	0,907

72 jam	73,3	80	96,7	5,61	5,84	6,88	1,77	$y = 0,635x + 4,84$	0,880
--------	------	----	------	------	------	------	------	---------------------	-------

Tabel 4. Hasil uji aktivitas larvasida ekstrak etil asetat akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Sampel	Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$) % Mortalitas Larva			Nilai Probit			LC ₅₀ ($\mu\text{g/mL}$)	Regresi Linear	R ²
	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm			
Ekstrak Etil Asetat	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm			
24 jam	43,3	50	50	4,82	5,00	5,00	464,52	$y = 0,09x + 4,76$	0,75
48 jam	46,7	60	66,7	4,92	5,25	5,44	16,58	$y = 0,26x + 4,683$	0,976
72 jam	63,3	73,3	86,7	5,33	5,61	6,13	1,88	$y = 0,4x + 4,89$	0,970

Tabel 5. Hasil uji aktivitas larvasida ekstrak etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Sampel	Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$) % Mortalitas Larva			Nilai Probit			LC ₅₀ ($\mu\text{g/mL}$)	Regresi Linear	R ²
	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm			
Ekstrak Etanol 96%	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm	2000 ppm	4000 ppm	6000 ppm			
24 jam	46,7	53,3	60	4,92	5,08	5,25	31,41	$y = 0,165x + 4,753$	0,999
48 jam	50	63,3	66,7	5,00	5,33	5,44	6,85	$y = 0,22x + 4,816$	0,923
72 jam	53,3	66,7	80	5,08	5,44	5,84	6,43	$y = 0,38x + 4,693$	0,999

Tabel 6. Hasil identifikasi golongan senyawa ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Pereaksi Warna	Senyawa	Perlakuan	Hasil Positif dan Pustaka	Hasil Pengamatan	Nilai Rf	Ket
Asam Sulfat 10%	Senyawa organik	Dipanaskan dan sinar tampak	Noda berwarna coklat, abu- abu atau hitam (TLC Visualization Reagents)	Noda berwarna coklat dan abu-abu	Rf ₁ = 0,06 Rf ₂ = 0,1 Rf ₃ = 0,44	+

Dragendorff	Alkaloid	Sinar tampak	Noda berwarna jingga (Kumar et al, 2007)	-	-	-
Lieberman-Burchard	Steroid	Dipanaskan dan UV 366 nm	Noda berwarna hijau gelap (Kumar et al, 2007)	Noda berwarna hijau gelap	Rf = 0,16	+
	Terpenoid		Noda berwarna merah muda atau merah (Kumar et al, 2007)	Noda berwarna merah muda atau merah	Rf ₁ = 0,08 Rf ₂ = 0,26 Rf ₃ = 0,4 Rf ₄ = 0,5	+
Besi (III) Klorida 1%	Tanin dan fenolik	Sinar tampak	Noda berwarna coklat, abu-abu atau hitam (TLC Visualization Agents for TLC and PC)	Noda berwarna abu-abu	Rf = 0,04	+
Aluminium Klorida	Flavonoid	UV 366 nm	Noda fluoresensi kuning, hijau atau biru (Markham, 2005)	Noda berfluoresensi hijau	Rf = 0,48	+
Kalium Hidroksida Etanolik	Kumarin	Sinar tampak	Noda berwarna merah (TLC Visualization Reagents)	-	-	-

Keterangan: (+) = Ada, (-) = Tidak ada

B. Pembahasan

Demam berdarah merupakan penyakit yang masih menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Demam Berdarah *Dengue* (DBD) ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* L. yang merupakan vektor utamanya. Untuk mengatasi masalah penyakit demam berdarah di Indonesia telah puluhan tahun dilakukan berbagai upaya pengendalian vektor, tetapi hasilnya belum optimal. Cara pengendalian vektor yang

paling banyak digunakan adalah dengan memberantas jentik vektor dengan menggunakan larvasida. Penggunaan insektisida sintetik khususnya larvasida menimbulkan beberapa efek, diantaranya adalah resistensi terhadap vektor, pencemaran lingkungan dan residu insektisida. Untuk mengurangi efek tersebut, diupayakan penggunaan larvasida alami. Penggunaan larvasida alami memiliki keuntungan, antara lain penguraian yang cepat sehingga tidak mencemari lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia karena kandungan residu yang mudah hilang sehingga memungkinkan untuk diterapkan pada kehidupan manusia. Pemilihan bahan yang akan digunakan sebagai larvasida tentunya harus aman terhadap manusia ataupun organisme lain, selain itu bahan mudah diperoleh, dan diharapkan dapat memberi dampak positif pada kesehatan manusia.

Tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) merupakan salah satu jenis mangrove yang bisa saja digunakan sebagai larvasida alami karena mangrove kaya akan senyawa steroid, saponin, flavonoid, dan tanin. Karena hal tersebut dilakukan pengujian aktivitas larvasida terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.). Sampel segar diperoleh dari hutan mangrove Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Sampel segar yang diperoleh disortasi basah untuk memisahkan pengotor-pengotor seperti lumpur dan lain-lain. Setelah disortasi basah, dilakukan pencucian dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa pengotor.

Sampel segar yang telah dicuci ditimbang beratnya sehingga diketahui sebesar 6,6 kg. Sampel segar tersebut dirajang kemudian dikeringkan di dalam lemari pengering. Setelah kering dilakukan penggilingan menggunakan mesin penggiling

dan diperoleh berat serbuk simplisia sebesar 2,4 kg.

Sebanyak 1000 g serbuk simplisia diekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi bertingkat menggunakan 3 pelarut dengan tingkat kepolaran berbeda yaitu n-heksan, etil asetat dan etanol 96%. Ekstraksi bertingkat ini bertujuan untuk memperoleh komponen sampel sebagai hasil akhir yang bersifat non polar, semipolar dan polar. Dari hasil maserasi tersebut diperoleh ekstrak n-heksan sebanyak 2,1 g dengan rendamen 0,21%, ekstrak etil asetat sebanyak 2,7 g dengan rendamen 0,27% dan ekstrak etanol 96% sebanyak 89,55 g dengan rendamen 8,955%. Masing-masing ekstrak yang diperoleh dilakukan pengujian aktivitas larvasida terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L.

Telur nyamuk *Aedes aegypti* L. diperoleh dari Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Surabaya. Pengujian aktivitas larvasida diawali dengan pembuatan larutan stok 10.000 ppm untuk masing-masing ekstrak. Masing-masing ekstrak uji ditimbang sebanyak 1000 mg kemudian ditambahkan 600 μ L DMSO untuk meningkatkan kelarutan ekstrak. Setelah larut, dicukupkan volumenya menggunakan air suling dalam labu tentukur 100 mL. Larutan uji dibuat dengan mengencerkan larutan stok dengan kaidah rumus pengenceran sehingga diperoleh larutan uji dengan konsentrasi 2000 ppm, 4000 ppm dan 6000 ppm.

Kontrol positif yang digunakan yaitu Abate. Pembuatan kontrol positif diawali dengan pembuatan larutan stok Abate 1000 ppm kemudian dari larutan stok tersebut diencerkan dengan kaidah rumus pengenceran sehingga diperoleh konsentrasi Abate 100 ppm. Kontrol negatif yang digunakan yaitu DMSO 1% (v/v) yang dibuat dengan melarutkan 1 mL DMSO dalam air suling 100 mL.

Sebelum pengujian, dilakukan penyiapan larva uji dengan merendam *paper egg* nyamuk *Aedes aegypti* L. ke dalam wadah yang berisi air suling. Telur nyamuk

Aedes aegypti L. menetas dalam waktu ± 24 jam menjadi larva instar 1. Ditunggu hingga larvanya tumbuh menjadi larva instar 3 sekitar 4-5 dengan melihat ciri-ciri fisik larva. Setelah mencapai larva instar 3, larva telah siap diuji. Pengujian aktivitas larvasida dilakukan dengan memipet larutan stok dari masing-masing ekstrak ke dalam vial uji, kemudian volumenya dicukupkan dengan air suling hingga 20 mL. Setelah pembuatan larutan uji, larva instar 3 dimasukkan sebanyak 10 ekor ke dalam masing-masing vial uji dan vial kontrol. Setelah itu dilakukan pengamatan dalam waktu 24, 48 dan 72 jam. Dihitung % mortalitas larva untuk memperoleh nilai probit. Analisis probit digunakan dalam pengujian biologis untuk mengetahui respon subyek yang diteliti oleh adanya stimuli larvasida untuk mengetahui respon mortalitas. LC_{50} dihitung berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dari kurva nilai probit dan log konsentrasi. Dilakukan klasifikasi toksisitas ekstrak berdasarkan nilai LC_{50} untuk mengetahui kategori toksisitasnya.

Kontrol positif Abate 100 ppm yang digunakan menyebabkan kematian larva 100% dalam waktu 24 jam. Abate dengan bahan aktif temefos 1% yang digunakan merupakan insektisida golongan organofosfat yang secara umum digunakan sebagai larvasida di masyarakat. Pengaruh temefos terhadap larva diawali dengan kejadian kejang-kejang atau tremor. Tremor menyebabkan larva memerlukan energi yang lebih besar akibatnya larva kehabisan energi sehingga menyebabkan kematian larva. Kematian larva terjadi karena temefos menghambat enzim kolinesterase sehingga enzim ini tidak dapat menghidrolisis asetilkolin dan terjadi penimbunan asetilkolin pada ujung saraf yang menyebabkan gangguan pada aktivitas saraf dengan terjadinya kontraksi otot secara terus menerus yang menyebabkan kematian larva. Kontrol negatif DMSO 1% tidak menyebabkan kematian larva.

Nilai LC_{50} ekstrak n-heksan pada pengamatan 24 jam yaitu 87,28 ppm

termasuk dalam kategori toksik (50-500 mg/kg), pengamatan 48 jam yaitu ppm 9,42 ppm termasuk dalam kategori sangat toksik (5-50 mg/kg), dan pengamatan 72 jam yaitu 1,77 ppm termasuk dalam kategori supertoksik (≤ 5 mg/kg). Nilai LC_{50} ekstrak etil asetat pada pengamatan 24 jam yaitu 464,52 ppm termasuk dalam kategori toksik (50-500 mg/kg), pengamatan 48 jam yaitu 16,58 ppm termasuk dalam kategori sangat toksik (5-50 mg/kg) dan pengamatan 72 jam yaitu 1,88 ppm termasuk dalam kategori supertoksik (≤ 5 mg/kg). Nilai LC_{50} ekstrak etanol 96% pada pengamatan 24 jam yaitu 31,41 ppm termasuk dalam kategori sangat toksik (5-50 mg/kg), pengamatan 48 jam yaitu 6,85 ppm termasuk dalam kategori sangat toksik (5-50 mg/kg) dan pengamatan 72 jam yaitu 6,43 ppm termasuk dalam kategori sangat toksik (5-50 mg/kg).

Penelitian sebelumnya tentang biolarvasida dari kulit batang tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) diperoleh bahwa ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan bakau minyak bersifat toksik terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L. dengan nilai LC_{50} sebesar 338,364 mg/L setelah pengamatan 72 jam. Bila dibandingkan toksisitasnya, nilai LC_{50} ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume) memiliki toksisitas yang lebih besar pada pengamatan 72 jam dibandingkan dengan ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume) dengan nilai LC_{50} berturut-turut 1,77 mg/L, 1,88 mg/L dan 6,43 mg/L.

Sebagai pendeteksian awal untuk mengetahui komponen ekstrak yang berkhasiat larvasida terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L., dilakukan identifikasi golongan senyawa dengan penyemprotan beberapa pereaksi identifikasi seperti pereaksi Asam Sulfat 10% sebagai penampak bercak, pereaksi Dragendorf untuk mendeteksi golongan senyawa alkaloid, pereaksi Lieberman-Burchard untuk

mendeteksi golongan senyawa steroid dan terpenoid, pereaksi Besi (III) Klorida 1% untuk mendeteksi golongan senyawa tanin dan fenolik, pereaksi Aluminium Klorida untuk mendeteksi golongan senyawa flavonoid, dan pereaksi Kalium Hidroksida Etanolik untuk mengetahui kandungan kumarin. Identifikasi senyawa diawali dengan mengelusi ekstrak n-heksan akar napas *Rhizophora apiculata* Blume. yang telah dilarutkan dengan pelarut n-heksan kemudian ditotolkan pada lempeng aluminium dan dielusi dengan n-heksan:etil asetat perbandingan 5:1 dalam chamber setelah itu dilakukan penyemprotan pereaksi identifikasi. Identifikasi pertama yaitu penyemprotan dengan pereaksi Asam Sulfat 10% kemudian lempeng dipanaskan dan dilakukan pengamatan secara langsung. Diperoleh noda berwarna coklat dan abu-abu dengan nilai Rf berturut-turut 0,06, 0,1 dan 0,44 yang menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan *Rhizophora apiculata* Blume. mengandung senyawa organik. Identifikasi selanjutnya dengan penyemprotan pereaksi Dragendorf kemudian diamati secara langsung. Diperoleh hasil negatif yang menunjukkan tidak adanya golongan senyawa alkaloid pada ekstrak. Identifikasi selanjutnya dengan penyemprotan pereaksi Lieberman-Burchard lalu lempeng dipanaskan dan dilihat penampakan bercak noda pada lampu UV 366 nm. Diperoleh bercak noda berwarna hijau gelap dengan nilai Rf 0,16 yang menunjukkan adanya golongan senyawa steroid, juga terdapat bercak noda berwarna merah muda dan merah dengan nilai Rf 0,08, 0,26, 0,4 dan 0,5 yang menunjukkan adanya golongan senyawa terpenoid pada ekstrak. Identifikasi selanjutnya dengan penyemprotan pereaksi Besi (III) Klorida 1% kemudian lempeng diamati secara langsung. Diperoleh bercak noda berwarna abu-abu dengan nilai Rf 0,04 yang menunjukkan adanya golongan senyawa tanin dan fenolik pada ekstrak. Identifikasi selanjutnya dengan penyemprotan pereaksi Aluminium Klorida kemudian dilihat penampakan bercak noda pada lampu UV 366 nm. Diperoleh

bercak noda berfluoresensi hijau dengan nilai Rf 0,48 yang menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid pada ekstrak. Identifikasi terakhir dengan penyemprotan pereaksi Kalium Hidroksida Etanolik lalu diamati secara langsung. Diperoleh hasil negatif yang menunjukkan tidak adanya senyawa kumarin pada ekstrak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai LC₅₀ ekstrak n-heksan akar napas *Rhizophora apiculata* Blume. pada pengamatan 24 jam, 48 jam dan 72 jam berturut-turut yaitu 87,28 ppm, 9,42 ppm dan 1,77 ppm. Nilai LC₅₀ ekstrak etil asetat yaitu 464,52 ppm, 16,58 ppm, dan 1,88 ppm. Nilai LC₅₀ ekstrak etanol 96% yaitu 31,41 ppm, 6,85 ppm dan 6,43 ppm.
2. Ekstrak yang memiliki toksisitas paling besar terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L. adalah ekstrak n-heksan pada pengamatan 72 jam dengan nilai LC₅₀ sebesar 1,77 ppm.

B. Implikasi Penelitian

Diharapkan ada penelitian selanjutnya yang bisa melakukan isolasi terhadap akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) untuk mengetahui senyawa spesifik yang bersifat larvasida terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti* L.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

KEPUSTAKAAN

- Agoes, G. *Teknologi Bahan Alam*. Bandung: ITB Press, 2007.
- Agustin, J.M., Drok, S., Shinoda, T., Sanmiya, K., Nielsen, J.K., Khakimov, B., Olsen, C.E., Hansen, E.H., Kuzina, V., Ekstrom, C.T., Hauser, T., Bak, S., *UDP-Glycosyltransferases from the UGT73C Subfamily in Barbarea vulgaris Catalyze Sapogenin 3-O-Glucosylation in Saponin-Mediated Insect Resistance*. *Plant Physiology*, 2012.
- Arianti dan Tukiran. *Biolarvasida dari Tumbuhan Bakau Minyak (Rhizophora apiculata) (RHIZOPHORACEAE)*. Surabaya: Jurusan Kimia FMIPA-Universitas Surabaya, 2012.
- Bandaranayake, W.M. *Bioactivities, Bioactive Compounds and Chemical Constituents of Mangrove Plants*. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- Bandaranayake, W.M. *Traditional and Medical Uses of Mangroves*. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1998.
- Borrer, D.J., Charles, A.T., Norman, F.J. *Pengenalan Pelajaran Serangga Edisi VI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Brown, H.W. *Dasar Parasitologi Klinis Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia, 1979.
- Chahaya, I. *Pemberantasan Vektor Demam Berdarah di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara: Bagian Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2003.
- Darlian, L., Imran G., Fachruddin. *Skrining Bioaktivitas Kulit Akar Bakau (Rhizophora apiculata Blume.) terhadap Daya Hambat Pertumbuhan Koloni Bakteri Streptococcus sp.* Kendari: Universitas Haluoleo, 2011.
- Das, SK., Samantaray, D., Patra, J.K., Samanta, L., Thatoi, H. *Antidiabetic Potential of Mangrove Plants: A Review*. India: Taylor & Francis Group, 2015.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Farmakope Indonesia Edisi V*. Jakarta: Departemen Kesehatan, 2014.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Modul Pelatihan bagi Pengelolaan Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Indonesia*, 2007.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan, 2000.
- Departemen Medical Entomology. *Mosquitos Photograph*, 2002.
- E. Stahl, ed, Springer-Verlag. *Thin Layer Chromatography 2nd edition*. New York.

1969.

Franklin Book Programs Inc. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 1977.

Ginanjar, G. *Apa yang Dokter Anda Katakan tentang Demam Berdarah*. Bandung: B-First, 2007.

Global Pest. *Pengetahuan Dasar tentang Hama Nyamuk*, 2013.

Hadi, H.M., Tarwotjo, U., Rahadjan, R. *Biologi Insekta Entomologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Halim, N.H.A., Abidin, N.A.Z., Me, R. *Study Of Chemical Compounds in Rhizophora apiculata*. Malaysia: Faculty of Applied Sciences Universiti Teknologi MARA Negeri Sembilan, 2013.

Harmita dan Radji, M. *Buku Ajar Analisis Hayati*. Depok: Departemen Farmasi Fakultas MIPA Universitas Indonesia, 2004.

H. Jork, W. Funk, W. Fishcer, H. Wimmer, Wiley. *TLC Reagents & Detection Method – Physical & Chemical Detection Methods: Fundamentals, Reagents, I, Vol 1a*. New York. 1990.

H. Jork, W. Funk, W. Fishcer, & H. Wimmer, Wiley. *TLC Reagents & Detection Methods – Physical & Chemical Detection Methods: Activation Reactions, Reagent Sequences, Reagents, II, Vol 1b*. New York. 1994.

ITIS. *Aedes aegypti* L, 2003.

J.C. Touchstone, Wiley-Interscience. *Practice of Thin Layer Chromatography, 3rd edition*, New York. 1992.

Kardinan, A. *Tanaman Pengusir dan Pembasmi Nyamuk*. Bogor: Argomedia Pustaka, 2004.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Buletin Jendela Epidemiologi Demam Berdarah Dengue*. Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, 2010.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Penggunaan Insektisida (Pestisida) dalam Pengendalian Vektor*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, 2012.

Kumar, G.S., Jayaveera, K.N., Kumar, C.K.A., Sanjay, U.P., Swamy, B.M.V. and Kumar, D.V.K. *Antimicrobial Effects of Indian Medicinal Plants against Acne-Inducing Bacteria*. Trop. J. Pharm, 2007.

Lu, F.C. *Basic Toxicology*, 1995.

Marianti. *Pengaruh Granul Ekstrak Daun Sirih (Piper bettle Linn) terhadap*

- Mortalitas Larva Aedes aegypti*, 2014.
- Markham, K.R., Oyvind M. Andersen. *Flavonoid: Chemistry, Biochemistry and Application*. New York: Informa Taylor and Francis Group. 2005.
- Mulyatno. *Keracunan Akut Pestisida*. Jakarta: Widya Medika, 2011.
- Natadisastra, Djaenudin. *Parasitologi Kedokteran: Ditinjau dari Organ Tubuh yang diserang*. Jakarta: EGC, 2009.
- Noor, Y.R., Khazali, M., Suryadiputra, I.N.N. *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. Bogor: PHKA/WI-IP, 2012.
- Novizan. *Membuat dan Memanfaatkan Pestisida Ramah Lingkungan*. Jakarta: Agro Media Pustaka, 2002.
- Nurdian, Y. *Diklat Entomology Kedokteran Aspek Hospes, Ages, Vektor dan Lingkungan pada Infeksi Virus Dengue*. Jember: Laboratorium Parasitologi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jember, 2003.
- Palgunadi, B.U., Asih, R. *Aedes aegypti Sebagai Vektor Penyakit Demam Berdarah Dengue*. Jurnal, 2011.
- Plantamor Database. *Database Tumbuhan: Rhizophora apiculata Blume*.
- Pratiwi, A. *Studi Deskriptif Penerimaan Masyarakat terhadap Larvasida Alami*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Rahim, A.A., Rocca, E., Steinmetz, J., Kassim, M.J., Adnan, R., Ibrahim, M.S., Osman, H. *Antioxidant Activities of Mangrove Rhizophora apiculata Bark Extracts*. Food Chem, 2008.
- Rahim, A.A., Rocca, E., Steinmetz, J., Kassim, M.J., Adnan, R., Ibrahim, M.S. *Mangrove Tannins and Their Flavonoid Monomers as Alternative Steel Corrosion Inhibitors in Acidic Medium*. Corrosion Science, 2007.
- Rochmah, I.F dan Tukiran. *Uji Bioaktivitas Ekstrak Kloroform Rhizophora apiculata (Mangrove) terhadap Spodoptera littura Fabr. sebagai Insektisida Nabati*. Surabaya: Jurusan Kimia FMIPA-Universitas Surabaya, 2012.
- Rochmat, A., Nuryoto, R. *Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Bioaktif Tanaman Ceraken (Croton tiglium L.) Sebagai Larvasida Pencegah Demam Berdarah Dengue*, 2007.
- Rumabar, A. *Uji Toksisitas Tanin dari Biji Pinang (Areca catechu) sebagai Bahan Pestisida Alami*. Jayapura: Universitas Cenderawasih, 2005.
- Sarker, S.D., Latif, Z., Gray, A. *Natural Products Isolation, 2nd*. Totowa: Humana Press Inc, 2006.

- Shihab, M.Q., *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sudarmo, S. *Pestisida*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Soegijanto, S. *Demam Berdarah Dengue*. Surabaya: Airlangga University Press, 2004.
- Suharmiati., H.L. *Tanaman Obat dan Ramuan Tradisional untuk Megatasi Demam Berdarah Dengue*, 2007.
- Suroso. *Demam Berdarah Dengue*. Jakarta: UI-Press, 1999.
- Syarifah, U. *Analisis Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Jentik di RW III Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pendurungan Kota Semarang*, 2007.
- Voight, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Wahid, Isra. *Dengue*. Bagian Parasitologi: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2014.
- Wahyuni, D. *Perbedaan Toksisitas Isolat Basillus thuringiensis dengan Isolat Pumillus terhadap Larva Nyamuk Aedes aegypti L. dalam Kondisi Laboratorium*. Jember: Lemlit Universitas Jember, 1998.
- World Health Organization. *Situation of Dengue/Dengue Haemorrhagic Fever In South-East Asia Region: Prevention And Control Status In SEA Countries*. South East Asia Regional Office.
- World Health Organization. *Pencegahan dan Pengendalian Dengue dan Demam Berdarah Dengue: Panduan Lengkap*. Jakarta: EGC, 2004.


LAMPIRAN

A. Skema Kerja


1. Preparasi Sampel




2. Determinasi Sampel



3. Ekstraksi Sampel



4. Uji Aktivitas Larvasida



B. Perhitungan

1. % Rendamen

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{ekstrak kering}}{\text{bobot simplisia}} \times 100\%$$

a. Ekstrak n-Heksan

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{2,1 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 100\% = 0,21\%$$

b. Ekstrak Etil Asetat

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{2,7 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 100\% = 0,27\%$$

c. Ekstrak Etanol 96%

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{89,55 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 100\% = 8,955\%$$

2. Pembuatan Larutan Stok 10.000 ppm

$$\text{ppm} = \frac{\mu\text{g}}{\text{mL}} \text{ atau } \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$10.000 \text{ ppm} = \frac{\mu\text{g}}{100 \text{ mL}}$$

$$\mu\text{g} = 10.000 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL}$$

$$\mu\text{g} = 1.000.000 \mu\text{g} = 1000 \text{ mg}$$

3. Pembuatan Larutan Uji

a. 2000 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 10.000 \text{ ppm} = 20 \text{ mL} \times 2000 \text{ ppm}$$

$$10.000 V_1 = 40.000$$

$$V_1 = \frac{40.000}{10.000}$$

$$V_1 = 4 \text{ mL}$$

b. 4000 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 10.000 \text{ ppm} = 20 \text{ mL} \times 4000 \text{ ppm}$$

$$10.000 V_1 = 80.000$$

$$V_1 = \frac{80.000}{10.000}$$

$$V_1 = 8 \text{ mL}$$

c. 6000 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 10.000 \text{ ppm} = 20 \text{ mL} \times 6000 \text{ ppm}$$

$$10.000 V_1 = 120.000$$

$$V_1 = \frac{120.000}{10.000}$$

$$V_1 = 12 \text{ mL}$$

4. % Mortalitas Larva

$$\% \text{ Mortalitas Larva} = \frac{\text{jumlah total larva yang mati} - \text{jumlah larva mati pada kontrol}}{\text{jumlah total larva hidup pengaruh perlakuan}} \times 100\%$$

a. Ekstrak n-Heksan

1. Waktu Pengamatan 24 jam

$$\text{Konsentrasi 2000 ppm} = \frac{10-0}{30} \times 100\% = 33,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 4000 ppm} = \frac{16-0}{30} \times 100\% = 53,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 6000 ppm} = \frac{20-0}{30} \times 100\% = 66,7\%$$

2. Waktu Pengamatan 48 jam

$$\text{Konsentrasi 2000 ppm} = \frac{16-0}{30} \times 100\% = 53,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 4000 ppm} = \frac{18-0}{30} \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Konsentrasi 6000 ppm} = \frac{24-0}{30} \times 100\% = 80\%$$

3. Waktu Pengamatan 72 jam

$$\text{Konsentrasi 2000 ppm} = \frac{22-0}{30} \times 100\% = 73,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 4000 ppm} = \frac{24-0}{30} \times 100\% = 80\%$$

$$\text{Konsentrasi 6000 ppm} = \frac{29-0}{30} \times 100\% = 96,7\%$$

b. Ekstrak Etil Asetat

1. Waktu Pengamatan 24 jam

$$\text{Konsentrasi 2000 ppm} = \frac{13-0}{30} \times 100\% = 43,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 4000 ppm} = \frac{15-0}{30} \times 100\% = 50\%$$

$$\text{Konsentrasi 6000 ppm} = \frac{15-0}{30} \times 100\% = 50\%$$

2. Waktu Pengamatan 48 jam

$$\text{Konsentrasi 2000 ppm} = \frac{14-0}{30} \times 100\% = 46,7\%$$

$$\text{Konsentrasi 4000 ppm} = \frac{18-0}{30} \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Konsentrasi 6000 ppm} = \frac{20-0}{30} \times 100\% = 66,7\%$$

3. Waktu Pengamatan 72 jam

$$\text{Konsentrasi 2000 ppm} = \frac{19-0}{30} \times 100\% = 63,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 4000 ppm} = \frac{22-0}{30} \times 100\% = 73,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 6000 ppm} = \frac{26-0}{30} \times 100\% = 86,7\%$$

c. Ekstrak Etanol 96%

1. Waktu Pengamatan 24 jam

$$\text{Konsentrasi 2000 ppm} = \frac{14-0}{30} \times 100\% = 46,7\%$$

$$\text{Konsentrasi 4000 ppm} = \frac{16-0}{30} \times 100\% = 53,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 6000 ppm} = \frac{18-0}{30} \times 100\% = 60\%$$

2. Waktu Pengamatan 48 jam

$$\text{Konsentrasi 2000 ppm} = \frac{15-0}{30} \times 100\% = 50\%$$

$$\text{Konsentrasi 4000 ppm} = \frac{19-0}{30} \times 100\% = 63,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 6000 ppm} = \frac{20-0}{30} \times 100\% = 66,7\%$$

3. Waktu Pengamatan 72 jam

$$\text{Konsentrasi 2000 ppm} = \frac{16-0}{30} \times 100\% = 53,3\%$$

$$\text{Konsentrasi 4000 ppm} = \frac{20-0}{30} \times 100\% = 66,7\%$$

$$\text{Konsentrasi 6000 ppm} = \frac{24-0}{40} \times 100\% = 80\%$$

5. Aktivitas Larvasida Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat dan Etanol 96% Akar Napas *Rhizophora apiculata* Blume.

*Tabel 7. Jumlah larva *Aedes aegypti* L. yang mati akibat perlakuan ekstrak n-heksan akar napas *Rhizophora apiculata* Blume.*

Konsentrasi (µg/mL)	Jumlah Larva Total (N)	Jumlah total larva yang mati setelah pemaparan		
		24 jam	48 jam	72 jam
2000	10	3	7	8
		5	6	7
		2	3	7
Jumlah		10	16	22
4000	10	6	7	8
		6	6	8
		4	5	8
Jumlah		16	18	24
6000	10	7	8	10
		8	9	10
		5	7	9
Jumlah		20	24	29

Tabel 8. Jumlah larva *Aedes aegypti* L. yang mati akibat perlakuan ekstrak etil asetat akar napas *Rhizophora apiculata* Blume.

Konsentrasi (µg/mL)	Jumlah Larva Total (N)	Jumlah total larva yang mati setelah pemaparan		
		24 jam	48 jam	72 jam
2000	10	3	3	5
		6	6	7
		4	5	7
Jumlah		13	14	19
4000	10	5	6	7
		6	7	8
		4	5	7
Jumlah		15	18	22
6000	10	5	6	8
		6	7	10
		4	7	8
Jumlah		15	20	26

Tabel 9. Jumlah larva *Aedes aegypti* L. yang mati akibat perlakuan ekstrak etanol 96% akar napas *Rhizophora apiculata* Blume.

Konsentrasi (µg/mL)	Jumlah Larva Total (N)	Jumlah total larva yang mati setelah pemaparan		
		24 jam	48 jam	72 jam
2000	10	5	6	6
		5	5	5
		4	4	5
Jumlah		14	15	16
4000	10	6	7	7
		5	5	5
		5	7	8
Jumlah		16	19	20
6000	10	7	7	8
		6	6	8

		5	7	8
	Jumlah	18	20	24

Tabel 10. Pengaruh konsentrasi ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap % mortalitas larva

Konsentrasi (µg/mL)	Jumlah Larva Total (N)	% Mortalitas Larva		
		24 jam	48 jam	72 jam
2000	10	33,3	53,3	73,3
4000	10	53,3	60	80
6000	10	66,7	80	96,7

Tabel 11. Pengaruh konsentrasi ekstrak etil asetat akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap % mortalitas larva

Konsentrasi (µg/mL)	Jumlah Larva Total (N)	% Mortalitas Larva		
		24 jam	48 jam	72 jam
2000	10	43,3	46,7	63,3
4000	10	50	60	73,3
6000	10	50	66,7	86,7

Tabel 12. Pengaruh konsentrasi ekstrak etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.) terhadap % mortalitas larva

Konsentrasi (µg/mL)	Jumlah Larva Total (N)	% Mortalitas Larva		
		24 jam	48 jam	72 jam
2000	10	46,7	50	53,3
4000	10	53,3	63,3	66,7
6000	10	60	66,7	80

Tabel 13. Probit (deviasi normal +5) sesuai dengan persentase dalam margin

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59	3,66
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,92	3,96	4,01	4,05	4,08	4,12
20	4,16	4,19	4,23	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45
30	4,48	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69	4,72

40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95	4,97
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20	5,23
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47	5,50
70	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77	5,81
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18	6,23
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,88	7,05	7,33
99	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,58	7,65	7,75	7,88	8,09

Tabel 14. Nilai probit ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Ekstrak n-Heksan ($\mu\text{g/mL}$)	% Mortalitas Larva			Nilai Probit		
	24 jam	48 jam	72 jam	24 jam	48 jam	72 jam
2000	33,3	53,3	73,3	4,56	5,08	5,61
4000	53,3	60	80	5,08	5,25	5,84
6000	66,7	80	96,7	5,44	5,84	6,88

Tabel 15. Nilai probit ekstrak etil asetat akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Ekstrak Etil Asetat ($\mu\text{g/mL}$)	% Mortalitas Larva			Nilai Probit		
	24 jam	48 jam	72 jam	24 jam	48 jam	72 jam
2000	43,3	46,7	73,3	4,82	4,92	5,33
4000	50	60	73,3	5,00	5,25	5,61
6000	50	66,7	80	5,00	5,44	6,13

Tabel 16. Nilai probit ekstrak etanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Ekstrak Etanol 96% ($\mu\text{g/mL}$)	% Mortalitas Larva			Nilai Probit		
	24 jam	48 jam	72 jam	24 jam	48 jam	72 jam
2000	46,7	50	53,3	4,92	5,00	5,08
4000	53,3	63,3	66,7	5,08	5,33	5,44
6000	60	66,7	80	5,25	5,44	5,84

Tabel 17. Nilai LC_{50} ekstrak n-heksan akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Lama Pengamatan	LC_{50} ($\mu\text{g/mL}$)
24 jam	87,28
48 jam	9,42
72 jam	1,77

Tabel 18. Nilai LC_{50} ekstrak etil asetat akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Lama Pengamatan	LC_{50} ($\mu\text{g/mL}$)
24 jam	464,52
48 jam	16,58
72 jam	1,88

Tabel 19. Nilai LC_{50} ekstrak tanol 96% akar napas tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)

Lama Pengamatan	LC_{50} ($\mu\text{g/mL}$)
24 jam	31,41
48 jam	6,85
72 jam	6,43

6. Nilai *Retention factor* (Rf)

$$\text{Retention factor (Rf)} = \frac{\text{Jarak tempuh noda}}{\text{Jarak tempuh eluen}}$$

- a. Setelah penyemprotan pereaksi Asam Sulfat 10%

$$Rf_1 = \frac{0,3 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,06$$

$$Rf_2 = \frac{0,5 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,1$$

$$Rf_3 = \frac{2,2 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,44$$

- b. Setelah penyemprotan pereaksi Lieberman-Burchard

$$Rf = \frac{0,8 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,16$$

$$Rf_1 = \frac{0,4 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,08$$

$$Rf_2 = \frac{1,3 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,26$$

$$Rf_3 = \frac{2 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,4$$

$$Rf_4 = \frac{2,5 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,5$$

- c. Setelah penyemprotan pereaksi Besi (III) Klorida 1%

$$Rf = \frac{0,2 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,04$$


- d. Setelah penyemprotan pereaksi Aluminium Klorida

$$Rf = \frac{2,4 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,48$$

C. Kurva Baku

1. Ekstrak n-Heksan

a. Waktu Pengamatan 24 jam



$$y = ax + b \quad y = 5, \text{probit } 50 = 5$$

$$= 0,44x + 4,146 \quad LC_{50} = \text{antilog } x$$

$$5 = 0,44x + 4,146 \quad LC_{50} = \text{antilog } 1,889$$


$$0,44x = 5 - 4,146 \quad LC_{50} = 87,28 \text{ ppm}$$

$$0,44x = 0,854$$

$$x = \frac{0,854}{0,44}$$

$$x = 1,941$$

b. Waktu Pengamatan 48 jam



$$y = ax + b$$

$$= 0,38x + 4,63$$

$$5 = 0,38x + 4,63$$

$$0,38x = 5 - 4,63$$

$$0,38x = 0,37$$

$$x = \frac{0,37}{0,38}$$

$$x = 1,258$$

$$y = 5, \text{ probit } 50 = 5$$

$$LC_{50} = \text{antilog } x$$

$$LC_{50} = \text{antilog } 0,974$$


$$LC_{50} = 9,42 \text{ ppm}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

b. Waktu Pengamatan 72 jam



$$y = ax + b$$

$$= 0,635x + 4,84$$

$$5 = 0,635x + 4,84$$

$$0,635x = 5 - 4,84$$

$$0,635x = 0,16$$

$$x = \frac{0,16}{0,635}$$

$$x = 0,158$$

$$y = 5, \text{ probit } 50 = 5$$

$$LC_{50} = \text{antilog } x$$


$$LC_{50} = \text{antilog } 0,252$$

$$LC_{50} = 1,77 \text{ ppm}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2. Ekstrak Etil Asetat

a. Waktu Pengamatan 24 jam



$$y = ax + b$$

$$y = 5, \text{probit } 50 = 5$$

$$= 0,09x + 4,76 \quad LC_{50} = \text{antilog } x$$

$$5 = 0,09x + 4,76 \quad LC_{50} = \text{antilog } 2,667$$


$$0,09x = 5 - 4,76 \quad LC_{50} = 464,52 \text{ ppm}$$

$$0,09x = 0,24$$

$$x = \frac{0,24}{0,09}$$

$$x = 2,667$$

b. Waktu Pengamatan 48 jam



$$y = ax + b$$

$$= 0,26x + 4,683$$

$$5 = 0,26x + 4,683$$

$$0,26x = 5 - 4,683$$

$$0,26x = 0,317$$

$$x = \frac{0,317}{0,26}$$

$$x = 1,219$$


$$y = 5, \text{ probit } 50 = 5$$

$$LC_{50} = \text{antilog } x$$

$$LC_{50} = \text{antilog } 1,219$$

$$LC_{50} = 16,58 \text{ ppm}$$

c. Waktu Pengamatan 72 jam



$$y = ax + b$$

$$= 0,4x + 4,89$$

$$5 = 0,4x + 4,89$$

$$0,4x = 5 - 4,89$$

$$0,4x = 0,11$$

$$x = \frac{0,11}{0,4}$$

$$x = 0,275$$

$$y = 5, \text{ probit } 50 = 5$$


$$LC_{50} = \text{antilog } x$$

$$LC_{50} = \text{antilog } 0,275$$

$$LC_{50} = 1,88 \text{ ppm}$$

3. Ekstrak Etanol 96%

a. Waktu Pengamatan 24 jam



$$y = ax + b$$

$$y = 5, \text{probit } 50 = 5$$

$$= 0,165x + 4,753 \quad LC_{50} = \text{antilog } x$$

$$5 = 0,165x + 4,753 \quad LC_{50} = \text{antilog } 1,497$$


$$0,165x = 5 - 4,753 \quad LC_{50} = 31,41 \text{ ppm}$$

$$0,165x = 0,247$$

$$x = \frac{0,274}{0,165}$$

$$x = 1,497$$

b. Waktu Pengamatan 48 jam



$$y = ax + b$$

$$= 0,22x + 4,816$$

$$5 = 0,22x + 4,816$$

$$0,22x = 5 - 4,816$$

$$0,22x = 0,184$$

$$x = \frac{0,184}{0,22}$$

$$x = 0,836$$


$$y = 5, \text{ probit } 50 = 5$$

$$LC_{50} = \text{antilog } x$$

$$LC_{50} = \text{antilog } 0,836$$

$$LC_{50} = 6,85 \text{ ppm}$$

c. Waktu Pengamatan 72 jam



$$y = ax + b$$

$$= 0,38x + 4,693$$

$$5 = 0,38x + 4,693$$

$$0,38x = 5 - 4,693$$

$$0,38x = 0,307$$

$$x = \frac{0,307}{0,38}$$

$$x = 0,808$$

$$y = 5, \text{ probit } 50 = 5$$

$$LC_{50} = \text{antilog } x$$

$$LC_{50} = \text{antilog } 0,808$$

$$LC_{50} = 6,43 \text{ ppm}$$

M A K A S S A R

D. Gambar Penelitian



Gambar 7. Tumbuhan bakau minyak (*Rhizophora apiculata* Blume.)



Gambar 8. Sampel segar akar napas *Rhizophora apiculata* Blume.



Gambar 9. Simplisia akar napas *Rhizophora apiculata* Blume.



Gambar 10. Simplisia 1 kg yang akan diekstraksi



Gambar 11. Proses maserasi sampel



Gambar 12. Filtrat n-heksan



Gambar 13. Ekstrak n-heksan



Gambar 14. Filtrat etil asetat



Gambar 15. Ekstrak etil asetat



Gambar 16. Filtrat etanol 96%



Gambar 17. Ekstrak etanol 96%



Gambar 18. Telur nyamuk Aedes aegypti L.



Gambar 19. Penyiapan larva uji



Gambar 20. Larva nyamuk *Aedes aegypti L. instar 3* berumur 5 hari



Gambar 21. Larutan stok Abate 1000 ppm



Gambar 22. Pembuatan DMSO 1% (v/v)



Gambar 23. Penimbangan 1000 mg ekstrak n-heksan *Rhizophora apiculata* Blume.



Gambar 24. Penimbangan 1000 mg ekstrak etil asetat *Rhizophora apiculata* Blume.



Gambar 25. Penimbangan 1000 mg ekstrak etanol 96% *Rhizophora apiculata* Blume.



Gambar 26. Larutan stok ekstrak n-ekstrak etanol 96% *Rhizophora* heksan 10.000 ppm



Gambar 27. Larutan stok ekstrak etil asetat 10.000 ppm



Gambar 28. Larutan stok ekstrak etanol 96% 10.000 ppm



Gambar 29. Larutan uji ekstrak n-heksan




Gambar 30. Larutan uji ekstrak etil asetat




Gambar 31. Larutan uji ekstrak etanol 96%




Gambar 32. Hasil identifikasi setelah penyemprotan pereaksi Asam Sulfat 10%



Gambar 33. Hasil identifikasi setelah penyemprotan pereaksi Liebermann-Burchard



Gambar 34. Hasil identifikasi setelah penyemprotan pereaksi Besi (III) Klorida 1%



Gambar 35. Hasil identifikasi setelah penyemprotan pereaksi Aluminium Klorida

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Nurhikma Sari, lahir pada tanggal 14 September 1995 di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Baharuddin dan Ibunda Hj. Nursida. Memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 103 Lero Minralo dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Suppa dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pinrang. Pada tahun 2013 terdaftar sebagai seorang mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R