

BUKU DARAS  
UIN ALAUDDIN

Nursalam, S.Pd., M.Si.

---

# STATISTIKA PENDIDIKAN

---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2015

**BUKU DARAS**  
**STATISTIKA PENDIDIKAN**

Copyright@penulis 2015

Penulis  
Nursalam, S.Pd., M.Si.

Editor  
DR. Muh. Amri Tajuddin, M.A

Tata Letak  
Mutmainnah

x + 224 halaman  
15,5x23cm  
Cetakan I : Desember 2015

ISBN : 978-602-328-179-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini  
tanpa izin tertulis penerbit



Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

# SAMBUTAN REKTOR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Prof. Dr. H. Musafir pababbari, M.Si.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar pasca diresmikannya, pada tanggal 4 Desember 2005 adalah melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur. Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya.

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama, memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan dosen bidang umum dan agama.

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa negara.

Semoga buku ini yang juga merupakan buku dasar di UIN Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya, buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas

pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan dewasa ini.

Amin Ya Rabbal-Alamin.

Makassar, Desember 2015

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan dan kesabaran kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan Buku *Statistik Pendidikan*. Salam dan shalawat penulis kirimkan buat junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta serta yang telah membawa manusia pada masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menghasilkan draf kurikulum berbasis KKNI. Salah satu mata kuliah yang menjadi komponen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah Statistika Pendidikan. Mata kuliah Statistika Pendidikan disajikan diseluruh Jurusan/Program Studi yang ada di FTK UIN Alauddin yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Manajemen Pendidikan, Jurusan/Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan/Prodi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan Fisika, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Mata kuliah Statistika Pendidikan merupakan salah satu mata kuliah yang paling urgen diberikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di FTK UIN Alauddin karena mata kuliah ini memberikan kontribusi yang sangat besar khususnya dalam hal penyelesaian skripsi mahasiswa yang memilih pendekatan Kuantitatif disamping penelitian-penelitian ilmiah yang lain. Penelitian ilmiah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol dengan tujuan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai hubungan antara suatu kejadian dengan kejadian lain atau hubungan antara kondisi dengan fenomena, dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.

Buku Daras ini nantinya akan berisi tentang Konsep Dasar Statistika dan penggunaan atau terapan secara praktis dalam penelitian disamping itu disajikan cara menganalisis data dengan bantuan software statistika yaitu SPSS Statistics 20. Buku ini terdiri atas beberapa topik yang erat kaitannya dengan penelitian

khususnya penelitian kuantitatif dan sangat banyak digunakan oleh para peneliti, mahasiswa tingkat akhir dalam mengolah data hasil penelitian untuk skripsi, tesis, maupun disertasi.

Secara garis besar isi buku dasar Statistik Pendidikan terdiri atas sembilan bab, dan masing-masing bagian akan saling terkait dan ppada masiang-masing bagian akan diakhir dengan uji kompetensi. Gambaran umum dari buku ini adalah pada bagian pertama akan dibahas mengenai Konsep Dasar Statistik, Pengumpulan dan Penyajian Data, Ukuran Pemusatan dan Ukuran Letak, Ukuran Penyebaran, Teknik Sampling, Uji Hipotesis, Analisis Varians, Analisis Regresi dan Korelasi, dan Statistika Nonparametrik.

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari sumbangsih dari berbagai pihak, terkhusus kepada Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyusun buku dasar ini. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dan keperayaan hingga selesainya buku ini. Dan semoga buku ini bisa membantu pada pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun peneliti.

Penulis menyadari bahwa isi dari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran dari siapa saja yang bertujuan untuk memperbaiki isi buku ini akan kami sambut dengan senang hati. Mudah-mudahan buku ini akan memberikan manfaat bagi para pemakainya.

Makassar, November 2011

Nursalam

# DAFTAR ISI

Sambutan Rektor .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB 1. KONSEP DASAR STATISTIKA .....</b>	<b>1</b>
A. Standar Kompetensi .....	1
B. Uraian Materi .....	3
C. Populasi dan Sampel .....	7
D. Variabel .....	8
E. Pengukuran dan Skala Pengukuran .....	10
1. Skala Normal .....	10
2. Skala Ordinal .....	11
3. Skala Interval .....	12
4. Skala Rasio .....	12
F. Pemilihan Teknik Statistika.....	14
Uji Kompetensi .....	16
<b>BAB 2. PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengumpulan Data .....	17
B. Penyajian Data.....	24
1. Tabel Distribusi Frekuensi .....	24
2. Grafik dan Diagram .....	29
3. Diagram Pencar .....	33
4. Diagram Lingkaran .....	35
C. Penyajian Data dengan Aplikasi SPSS Statistic 20.....	37
Uji Kompetensi .....	53
<b>BAB 3. UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK ...</b>	<b>55</b>
A. Ukuran Pemusatan .....	55
B. Ukuran Letak.....	63
C. Aplikasi SPSS Statistics 20 untuk Ukuran Pemusatan dan Ukuran Letak.....	70
Uji Kompetensi .....	76
<b>BAB 4. UKURAN PENYEBERAN .....</b>	<b>80</b>
A. Ukuran Penyebaran untuk Data Tinggaal .....	80

1. Rentang .....	80
2. Rentang Antar Kuantil .....	81
3. Simpangan Kuantil .....	82
4. Rata-rata Simpangan .....	83
5. Standar Deviasi dan Varians .....	85
6. Koefisien Variansi .....	87
7. Koefisien Kemiringan .....	88
8. Koefisien Kurtosis .....	89
9. Skor Baku ( $z$ ) dan Skor $T$ .....	90
Uji Kompetensi .....	92
<b>BAB 5. TEKNIK SAMPLING .....</b>	<b>95</b>
A. Pengertian Samlling .....	96
B. Syarat dan Sampel yang Baik .....	97
C. Beberapa Istilah dalam Sampling .....	99
D. Ukuran Sampel .....	101
E. Jenis-jenis Sampling .....	103
Uji Kompetensi .....	119
<b>BAB 6. UJI HIPOTESIS .....</b>	<b>121</b>
A. Hipotesis Statistik .....	122
B. Uji Hipotesis Mengenai Rata-rata Satu Kelompok .....	125
C. Uji Hipotesis Mengeai Rat-rata Dua Kelompok .....	129
D. Uji Hipotesis Mengenai Proporsi .....	135
E. Uji Hipotesis Mengenai Variansi .....	136
F. Uji Hipotesis dengan Aplikasi SPSS Statistik 20 .....	141
Uji Kompetensi .....	147
<b>BAB 7. ANALISIS VARIANS .....</b>	<b>149</b>
A. Analisis Variansi Univariate Satu Jalur .....	150
B. Analisis Variansi Univariate Dua Jalur .....	154
C. Analisis Variansi dengan Menggunakan Paket SPSS Statistik 20 .....	162
Uji Kompetensi .....	168
<b>BAB 8. ANALISIS REGRESI DAN KORELASI.....</b>	<b>171</b>
A. Analisis Korelasi .....	171
B. Analisis Regresi Linear Sederhana .....	173
C. Analisis Regresi Linear Ganda .....	179



D. Pemilihan Model Terbaik .....	185
E. Contoh Analisis Korelasi dan Regresi dengan SPSS Statistik 20.....	186
Uji Kompetensi .....	197
<b>BAB 9. STATISTIKA NONPARAMETRIK .....</b>	<b>199</b>
A. Uji Chi-Square .....	200
B. Uji Tanda (sign-test) .....	204
C. Uji Wilcoxon .....	207
D. Uji Cochran .....	208
E. Analisis dengan SPSS Statistik 20 .....	211
Uji Kompetensi .....	217
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>219</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>223</b>



# BAB I

## KONSEP DASAR STATISTIKA



### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Peranan Statistika
2. Memahami perbedaan statistik dan statistika
3. Memahami konsep populasi dan sampel
4. Memahami konsep variabel
5. Memahami konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran
6. Memahami teknik pemilihan Analisis Statistika dengan tepat



### Uraian Materi

#### A. Peranan Statistika

Statistika sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Dalam aktivitas yang melibatkan angka-angka, tanpa disadari seringpula menggunakan statistika. Misalnya pernyataan kebanyakan penduduk bekerja sebagai petani, kebanyakan mahasiswa baru yang masuk dalam suatu perguruan tinggi adalah perempuan, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain.

Statistika juga banyak digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Statistika banyak digunakan dalam bidang pertanian, pendidikan, ekonomi, hukum, kedokteran dan lain-lain sebagainya. Dalam bidang pertanian statistika digunakan untuk melihat pola hubungan antara jenis pupuk dan

hasil pertanian. Dalam bidang pendidikan statistik digunakan untuk melihat hubungan antara motivasi belajar dan minat belajar dengan prestasi belajar siswa. Dalam bidang ekonomi statistika digunakan dalam bidang keuangan untuk melakukan prediksi/ramalan keadaan indeks harga saham dan lain-lain sebagainya.

Dalam bidang hukum, statistika banyak digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat pendidikan dan kesadaran hukum. Dalam bidang kedokteran statistika banyak digunakan untuk menjelaskan pengaruh penggunaan berbagai obat terhadap tingkat kesembuhan pasien, efektivitas obat bius untuk menghilangkan rasa sakit pasien, dan lain-lain sebagainya.

Statistika juga tidak bisa dilepaskan dalam paradigman atau pendekatan penelitian kuantitatif. Hal ini disebabkan karena penelitian kuantitatif menempatkan statistika sebagai alat/teknik analisis untuk menguji teori. Peranan statistika dalam penelitian kuantitatif secara rinci dapat dijelaskan melalui metode ilmiah yaitu (1) merumuskan atau memformulasikan masalah; (2) melakukan kajian/studi literatur berkenaan dengan masalah; (3) merumuskan atau menyusun hipotesis penelitian; (4) mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji hipotesis; dan (5) membuat inferensi atau kesimpulan. (Kadir, 2015: 2).

Secara umum dalam bidang penelitian, statistika menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui apakah metode baru akan lebih baik dari metode lama maka perlu dilakukan penilaian dengan menggunakan statistika. Pada kasus yang lain, statistika juga mampu menentukan apakah fakta yang satu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kemudian dengan menggunakan statistika, dapat diketahui seberapa besar hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa statistika memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi teknik analisis yang sangat handal untuk menjelaskan masalah-masalah penelitian dari berbagai sudut pandang keilmuan khususnya dalam bidang pertanian, pendidikan, ekonomi, hukum, kedokteran bahkan dalam bidang sosiologi, antropologi, farmasi, psikologi dan bidang-bidang kajian yang lain.

## B. Statistik dan Statistika

Statistik berasal dari bahasa latin yaitu *status* yang berarti keadaan politik, dan bahasa Italia *statista* ("negarawan" atau "politikus"). Pada awalnya statistika digunakan untuk data tentang keadaan politik, data sensus, data militer, data-data fiscal. Gottfried Achenwall (1749) menggunakan *Statistik* dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai "ilmu tentang negara (*state*)". Arti negara dimaknai secara luas yaitu keadaan data tentang bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara. Misalnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, hukum, pertanian, militer dan lain sebagainya. Dengan demikian statistik secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Penggunaan statistik pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang biologi dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistik dalam metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika (atau biostatistika), dan psikometrika.

Istilah statistik sering pula dikacaukan dengan istilah statistika. Dari penjelasan di atas jelas bahwa statistik diartikan untuk menunjukkan keadaan sesuatu misalnya statistik penduduk, statistik kecelakaan lalu lintas, statistik pendidikan, statistik pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa statistik lebih mengarah pada fakta dan deskripsi yang telah dikuantifikasi menjadi angka-angka atau skor yang lebih bersifat informatif, komunikatif, berguna atau praktis (Kadir, 2015: 5).

Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedang statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan

atau mendeskripsikan data; ini dinamakan statistika deskriptif. Sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsikan teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain: populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas.

Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam (misalnya astronomi dan biologi maupun ilmu-ilmu sosial (termasuk sosiologi dan psikologi), maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan; sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jajak pendapat atau *polling* (misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum), serta jajak cepat (perhitungan cepat hasil pemilu) atau *quick count*. Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan.

Statistika bekerja dengan angka-angka, oleh karena akan memaksa seseorang pemakai statistika untuk terlibat dalam permainan angka-angka. Di dalam statistika angka merupakan simbol atau pernyataan verbal atas objek yang akan dikemukakan. Kegunaan statistika tidak saja mendeskripsikan data yang diperoleh pada waktu lampau, misalnya jumlah penduduk, pendapatan perkapita masyarakat, hasil belajar siswa/mahasiswa, tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan statistik tersebut, angka-angka yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau untuk memprediksi suatu kejadian atau peristiwa dimasa yang akan datang.

Statistika banyak digunakan untuk catatan-catatan yang telah dibuat mengenai suatu data atau fakta dan telah disusun secara sistematis dengan tujuan agar orang yang membacanya dapat dengan mudah mamahami serta memperoleh gambaran tentang apa yang telah dikemukakan. Secara umum statistika dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Berdasarkan masalah penelitian, statistika dibagi menjadi tiga yaitu statistika penelitian deskriptif, statistika untuk penelitian korelasi, dan statistika untuk penelitian perbandingan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melibatkan

satu variabel saja. Misalnya prestasi belajar matematika siswa. Penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih variabel yang lainnya. Misalnya hubungan antara IQ siswa dengan prestasi belajar matematika siswa. Penelitian perbandingan adalah penelitian yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih kelompok dalam satu variabel. Misalnya prestasi belajar bahasa Inggris siswa yang berasal dari jurusan IPA dan jurusan IPS.

2. Berdasarkan sasaran penelitian, statistika dibagi menjadi dua yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial/induktif.

Statistika deskriptif adalah statistika dimana pengumpulan dan penyajian sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya mereduksi, menguraikan atau memberikan keterangan suatu data, fenomena, atau keadaan ke dalam beberapa besaran untuk disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti. Statistika ini hanya berguna untuk menguraikan dan menerangkan keadaan, persoalan tanpa menarik suatu kesimpulan terhadap data yang lebih luas atau populasi. Contoh statistika deskriptif adalah pada pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin terdapat 100 dosen yang mengajar. Dari 100 dosen tersebut terdapat 60 dosen berjenis kelamin laki-laki dan 40 orang dosen berjenis kelamin perempuan, terdapat 15 orang Professor, 45 orang bergelar Doktor, dan 40 orang bergelar Magister.

Statistika inferensial adalah bagian dari statistika yang membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data, fenomena, persoalan yang lebih luas atau populasi berdasarkan data sampel yang diambil secara acak dari populasi. Statistika inferensial membuat kesimpulan berdasarkan pendugaan dari sebagian atau sampel data dan pengujian hipotesis. Contoh statistika inferensial adalah seorang peneliti mengetahui prestasi Ujian Nasional siswa SMA pada mata pelajaran Matematika di Kota Makassar. Peneliti tidak perlu mengambil seluruh siswa sebagai subjek penelitian, tetapi cukup dengan mengambil sebagian dari anggota populasi sebagai sampel secara random. Misalnya terdapat 1500 siswa yang mengikuti UN mata pelajaran

matematika, diambil sampel secara acak sebanyak 150 siswa. Dari 150 siswa tersebut dihitung rata-rata dan simpangan baku hasil ujian matematika dan diperoleh nilai rata-rata 6,8 dan simpangan baku 3,2. Nilai rata-rata dan simpangan baku dari 150 siswa tersebut digunakan untuk menaksir rata-rata dan simpangan baku dari populasi yang berjumlah 1500 siswa.

3. Berdasarkan terpenuhinya asumsi, maka statistika dapat dibagi menjadi dua yaitu statistika parametrik dan statistika nonparametrik.

Statistika parametrik adalah statistika yang digunakan apabila berbagai asumsi yang dituntut terpenuhi. Pengolahan data meliputi dua kegiatan yaitu pengujian asumsi dan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi dilakukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Jika dalam pengujian asumsi menunjukkan bahwa asumsi yang dituntut tidak terpenuhi maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistika nonparametrik. Statistika nonparametrik adalah statistika yang digunakan bila hasil pengujian terhadap data menunjukkan tidak terpenuhinya asumsi.

Penggunaan statistika parametrik dan nonparametrik memberikan implikasi yang berbeda. Hasil pengolahan data dengan menggunakan statistika parametrik dapat diperluas kesimpulannya untuk populasi, sebab dengan terpenuhinya asumsi maka sampel menunjukkan sifat-sifat yang sama dengan populasi. Sebaliknya, dengan menggunakan statistika nonparametrik, hasil pengolahan data tidak dapat diperluas kesimpulannya untuk populasi.

Sejalan dengan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan modern ini, banyak kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para ahli terhadap statistika. Hal ini dapat dilihat dari munculnya beberapa cabang ilmu baru yang merupakan gabungan dari beberapa ilmu yang telah ada dengan statistika, antara lain: Psikometri (menggabungkan antara statistika dan ilmu psikologi), Sosiometri (menggabungkan antara statistika dan ilmu sosiologi), dan Ekonometrika (menggabungkan antara statistika dengan ilmu ekonomi).



### C. Populasi dan Sampel

Tujuan utama statistika adalah membuat kesimpulan mengenai hasil analisis informasi yang terdapat dalam suatu data sampel. Tujuan kedua adalah membuat penaksiran ketidakpastian yang terdapat pada kesimpulan. Tujuan ketiga adalah mendesain proses dan level sampling sehingga menghasilkan pengamatan yang tepat dan akurat. Desain proses dan level sampling merupakan tahap yang sangat penting karena mempengaruhi tingkat kebenaran dan ketepatan penelitian. Jika desain sampling tidak dilakukan dengan benar, penyimpangan informasi data yang dibuat dapat terjadi. Oleh karena itu, pengambilan sampel data sangat diperhatikan.


Populasi adalah seluruh objek yang menjadi target penelitian. Secara teknis, populasi menurut para statistikawan tidak hanya mencakup individu atau objek dalam suatu kelompok tertentu. Malahan mencakup hasil-hasil pengukuran yang diperoleh dari peubah atau variabel tertentu (Tiro, 1999: 3).

Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel itu. Besarnya sampel yang diperlukan bervariasi menurut tujuan pengambilannya dan tingkat kehomogenan populasi. Sampel yang dipilih harus mewakili (*representative*) terhadap populasi, karena sampel merupakan alat atau media untuk mengkaji sifat-sifat populasi.

Bila sampel tidak *representative*, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang memegang telinga gajah, maka ia menyimpulkan gajah seperti kipas. Orang kedua memegang badan gajah, maka ia menyimpulkan bahwa gajah seperti tembok besar. Satu orang lagi memegang ekornya, maka ia akan menyimpulkan bahwa gajah itu kecil seperti seutas tali. Demikian akibat yang akan terjadi jika pengambilan sampel tidak *representative*. Ibarat 3 orang buta yang akan membuat kesimpulan tentang gajah.

Sebagai ilustrasi tentang populasi dan sampel dapat dilihat gambar berikut:

## KONSEP DASAR STATISTIKA



Gambar 1. Illustrai Populasi dan Sampel

### D. Variabel

Pertanyaan yang sering muncul dalam melakukan dalam suatu penelitian adalah apa yang anda teliti. Maka pertanyaan ini mengarahkan kepada apa yang disebut dengan variabel penelitian, dan variabel penelitian inilah yang selalu didefinisikan secara operasional. Oleh karena itu variabel dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terkait hal tersebut.

Kerlinger (1973) mendefinisikan variabel sebagai konstrak atau sifat yang akan dipelajari atau diteliti. Dalam konteks lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel merupakan suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different values*). Apabila suatu variabel hanya memiliki satu nilai saja, maka disebut sebagai konstanta.

Beberapa contoh variabel yang sering diteliti adalah jenis kelamin yang mempunyai dua nilai yaitu laki-laki dan perempuan, Agama merupakan suatu variabel yang mempunyai nilai-nilai, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Tinggi badang merupakan suatu variabel yang mempunyai nilai 150 cm, 165 cm, dan seterusnya. Demikian pula dengan berat badan merupakan suatu variabel, karena mempunyai nilai misalnya 45 kg, 50 kg, dan seterusnya.

Variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel mempunyai nilai berhingga atau nilai-nilainya dapat didaftar. Contoh variabel diskrit adalah jenis kelamin, dan agama. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang mempunyai nilai tidak berhingga dan tidak dapat didaftar. Contoh variabel kontinu adalah tinggi badan dan berat badan.

Dalam konteks penelitian, variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti yang ditunjukkan berikut ini:

### 1. Variabel Independen

Variabel independen sering pula disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *antecedent* atau lebih dikenal dengan istilah variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

### 2. Variabel Dependen

Variabel ini sering pula disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen, atau lebih dikenal dengan istilah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

### 3. Variabel Moderator

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderator ini juga disebut sebagai variabel independen kedua.

### 4. Variabel Intervening

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan terukur. Variabel ini merupakan variabel antara/penyela yang terletak diantara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.

### 5. Variabel Kontrol

Variabel control adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen dan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti, bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan.

### **E. Pengukuran dan Skala Pengukuran**

Pengukuran menjadi hal yang sangat penting dalam analisis statistika. Pengukuran terhadap variabel merupakan penentuannya variasi nilai atau taraf ukuran dari variabel yang akan diukur. Variasi nilai tersebut merupakan hasil amatan terhadap subjek dari satuan-satuan penelitian berdasarkan indikator satuan-satuan tersebut. Hasil pengukuran menyediakan data yang selanjutnya akan diolah dengan teknik analisis statistika tertentu.

Sebelum melakukan analisis data, satu hal yang perlu diperhatikan adalah skala pengukuran data. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan untuk mengkuantitatifkan data pengukuran suatu variabel. Berdasarkan bentuk data yang dihasilkan dari suatu kegiatan pengukuran, maka skala pengukuran dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu:

#### **1. Skala Nominal**

Skala nominal adalah pengelompokan atau pengkategorisasian kejadian atau fenomena ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori, sehingga yang masuk ke dalam satu kelas atau kategori adalah sama adalah hal atribut atau sifatnya. Kelas atau kategori bersifat terpisah dan masing-masing kategori diberi nama untuk membedakan antara kategori atau kejadian atau peristiwa dengan kategori lain atau kejadian lain. Perbedaan kelas atau kategori sama sekali tidak menunjukkan adanya tingkatan di mana yang satu lebih rendah dari yang lain atau sebaliknya.

Skala Nominal disebut juga sebagai data kategori/atribut, misalnya jenis kelamin, warna, ya atau tidak, dan seterusnya. Pada skala nominal, data hanya bisa dibedakan berdasarkan sifat fisiknya, misalnya data jenis kelamin hanya akan ada laki-laki dan wanita; data warna, yaitu merah, hijau, putih.

Angka yang diberikan untuk skala nominal, misalnya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk wanita, tidak menjadikan bahwa 2 lebih besar dari 1, pemberian hanya bersifat label saja sehingga tidak dapat dioperasikan dalam artian bahwa  $1 + 2$  tidak sama dengan 3. Penelitian dengan skala nominal sebenarnya bukan kegiatan pengukuran, melainkan lebih kepada pengkategorisasian, pemberian nama, dan menghitung fakta-fakta dari objek yang sedang di ukur. Skala nominal akan menghasilkan data yang disebut data nominal atau data diskrit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skala nominal hanya membedakan satu jenis data dengan jenis data lainnya, tidak menunjukkan tingkatan besar kecil atau tinggi rendah, dan sebagainya.

### **2. Skala Ordinal**

Skala ordinal berasumsi bahwa nilai suatu variable dapat diurut berdasarkan tingkatan atribut atau sifat yang dimiliki oleh variable yang ada pada unit observasi. Pengukuran dengan skala ordinal dapat dilakukan bila perbedaan tingkat atau jumlah atribut dapat dideteksi. Skala ordinal merupakan hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan atau rangking. Angka yang diberikan terhadap taraf variable yang diselidiki adalah simbol dari kelompok-kelompok terpisah dan berurutan.

Salah satu contoh skala ordinal adalah tingkat pendidikan dan tingkat jabatan. Pada tingkat pendidikan, ada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Sarjana. Angka yang diberikan untuk skala ordinal menunjukkan nilai rangking dari objek, misalnya: 1 = SD/MI, 2 = SMP/MTs, 3 = SMA/MA, 4 = Sarjan. Ukuran bentuk seperti 1 = kecil, 2 = sedang, 3 = besar.

Data yang diperoleh dengan pengukuran skala ordinal adalah data ordinal, yaitu data yang berjenjang dimana jarak antara satu data dengan data yang lain tidak sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skala ordinal merupakan skala yang memberikan perbedaan antara satu jenis data dengan jenis data yang lain berdasarkan besar kecilnya, tinggi rendahnya, baik buruknya, dan sebagainya.

### 3. Skala Interval

Skala interval menunjukkan tingkatan karakter individu dalam suatu variable. Skala interval mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik-titik angka tertentu dengan nilai interval yang sama untuk setiap angka karena menggunakan unit pengukuran yang konsisten atau satuan yang sama. Pengukuran interval meliputi penetapan angka pada objek dengan cara tertentu, sehingga perbedaan angka yang sama mewakili perbedaan yang sama pula dalam tingkatan atribut yang diukur.

Skala Interval, suatu pemberian angka pada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah sifat lainnya, yaitu jarak yang sama pada pengukuran interval memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau objek yang diukur.


Ciri skala interval adalah mempunyai tingkatan/jarak dan memiliki nol tidak absolute, artinya tidak semua harus dimulai dengan nol. Contoh: tingkat kepuasan dimulai dari angka 1 sampai 10 (tidak harus mulai dari nol). Dalam penelitian sosial skala sikap biasanya diasumsikan berskala interval.

Data pengukuran yang diperoleh melalui skala interval adalah data interval. Yaitu data yang diidentikkan dengan bilangan bulat. Dengan demikian, angka dalam data interval dapat dioperasikan dengan operasi perhitungan, namun demikian dalam data interval tidak memiliki angka nol mutlak.

### 4. Skala Rasio

Skala rasio merupakan jenis pengukuran yang paling halus karena memiliki cirri-ciri yang tidak dimiliki oleh skala-skala yang lain. Skala rasio menunjukkan adanya tingkatan atribut variable, yakni dengan membandingkan nilainya. Skala rasio memiliki interval yang sama antar satu angka dengan angka yang lainnya seperti yang dimiliki oleh skala interval. Skala rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran skala interval ditambah dengan satu sifat yaitu skala yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio mempunyai titik nol absolut. Misalnya: berat badan, tinggi badan, dan lainnya.

## KONSEP DASAR STATISTIKA



Gambar 2.1. Jenis-Jenis Data

Dengan memperhatikan karakteristik masing-masing skala pengukuran tersebut di atas, maka tampak bahwa skala rasio mempunyai tingkatan tertinggi, kemudian skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Oleh karena itu, suatu skala pengukuran dapat dipandang sebagai skala pengukuran yang tingkatannya lebih rendah, namun tidak sebaliknya artinya bahwa skala rasio dipandang sebagai skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Skala interval dapat dipandang sebagai skala ordinal dan skala nominal, serta skala ordinal dapat dipandang sebagai skala nominal.

Skala yang dikemukakan di atas menjadi penting khususnya dalam teknik pemilihan analisis statistik yang akan digunakan dalam mengolah data dari variabel yang bersangkutan. Misalnya dalam melakukan analisis varians, dipersyaratkan bahwa variabel bebas harus berskala nominal, sedangkan variabel terikat harus berskala interval. Jika variabel bebasnya belum berskala nominal, maka harus dilakukan transformasi untuk membuat variabel tersebut berskala nominal.

Dari empat skala yang dikemukakan di atas, pada kenyataannya skala ordinal banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial, sedangkan pengukuran fenomena psikologi lebih banyak menggunakan skala rasio dan skala interval.

## KONSEP DASAR STATISTIKA

Selanjutnya secara umum dapat disajikan perbedaan skala pengukuran pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Skala Pengukuran

Skala	Klasifikasi	Peringkat	Jarak Sama	Nol Mutlak
Norminal	√			
Ordinal	√	√		
Interval	√	√	√	
Rasio	√	√	√	√

### F. Pemilihan Teknik Statistika

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam analisis statistika adalah pemilihan teknik statistika yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Kesalahan dalam menentukan alat statistika akan berimplikasi pada kesalahan dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan. Pemilihan teknik analisis statistika harus didasarkan pada jenis skala pengukuran yang digunakan yaitu pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio baik secara deskriptif maupun inferensial. Penggunaan teknik analisis statistika dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Teknik Analisis Statistika Deskriptif

Skala Pengukuran	Teknik Analisis Statistika
Nominal	Modul, Tabel Frekuensi, Persentasi dan Grafik
Ordinal	Minimum, Maksimum, Median, Tabel Frekuensi, Perentase, dan Grafik
Interval/Rasio	Rata-rata, minimum, maksimum, range, varians, simpangan baku, koefisien varians, kemiringan, kecembunban, dan grafik



KONSEP DASAR STATISTIKA

Tabel 1.2 Teknik Analisis Statistika Inferensial

Skala	Penelitian Assosiatif dan Komparatif					
	Assosiatif (hubungan)	Deskriptif (1 variabel)	Komparatif (2 sampel)		Komparatif (> 2 sampel)	
			Tak Bebas	Bebas	Tak Bebas	Bebas
Nominal	Soumer's d (ddy), Koefisien Kontongensi C, Gamma, Tau a, b, c	Binomial, $\chi^2$ untuk satu sampel	McNemar	Fisher Exact, $\chi^2$ untuk dua sampel	$\chi^2$ untuk sampel, Cochran Q	$\chi^2$ untuk sampel
Ordinal	Korelasi Peringkat Spearman, Kendall, Konkordansi	Uji Run	Uji Tanda, Uji Wilcoxon	Uji Median, Uji Mann-Whitney Kolmogorv Smirnov	Freadman, Anova 2 Jalur	Uji Median, Kruskal Willis, Anova 1 Jalur
Interval/rasio	Product Moment Pearson, Korelasi Parsial, Regresi	Uji-t Uji-z	Uji-t Bebas (korelasi)	Uji-t bebas Uji-z bebas	Uji-F dengan Anova 1 jalur, Anova $\geq 2$ jalan	Uji-F dengan Anova 1 jalur, Anova $\geq 2$ jalan



## Uji Kompetensi

1. Jelaskan pentingnya statistika dalam penelitian kuantitatif.
2. Uraikan hubungan antara statistika dan metode ilmiah serta berikan contoh.
3. Jelaskan perbedaan statistik dan statistika.
4. Jelaskan perbedaan antara populasi dan sampel dalam konteks inferensi dan kesimpulan penelitian
5. Jelaskan jenis-jenis variabel serta berikan beberapa contoh.
6. Jelaskan pentingnya pengukuran dalam penelitian ilmiah.
7. Mengapa makna suatu angka atau bilangan merupakan tanggungjawabn kegiatan pengukran?
8. Uraikan perbedaan serta ciri-ciri antara skala nominal, ordinal, interval, dan rasio.
9. Uraikanlah jenis-jenis analisis staistika deskriptif yang digunakan untuk jenis data nominal, ordinal, interval, dan rasio
10. Jika seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel tingkat pendapatan orang tua dengan prestasi belajar siswa, teknik analisis statistika apa yang digunakan? Berikan alasan.

# BAB II

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA



### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Cara Pengumpulan Data
2. Memiliki keterampilan dalam mengumpulkan data
3. Memahami Cara Menyajikan Data dalam bentuk Tabel dan Diagram
4. Memiliki keterampilan dalam Menyajikan Data dalam bentuk tabel dan diagram



### Uraian Materi

#### A. Pengumpulan Data

Dalam analisis statistika diperlukan data yang benar yaitu data yang betul-betul diyakini kebenarannya dan dapat dipercaya dengan kata lain bahwa data harus diperoleh dengan “jujur”. Proses pengumpulan data merupakan proses mencatat peristiwa, karakteristik, elemen nilai suatu variabel. Hasil pencatatannya menghasilkan data mentah yang kegunaannya masih terbatas. Agar data mentah tersebut dapat lebih bermakna, maka perlu diolah, disederhanakan, dan dianalisis.

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui suatu masalah. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes. Tes yang dimaksudkan adalah dengan menggunakan tes pilihan ganda, esai, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan non tes dapat dilakukan dengan menggunakan dokumentasi, angket, skala, wawancara dan observasi. Khusus untuk skala dapat

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

dilakukan dengan bentuk skala Likert, diferensial semantik, skala Thurstone, dan skala Gutman. Sementara dokumen adalah data sekunder, misalnya data tentang hasil Unian Nasional dapat diperoleh dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) atau misalnya data tentang hasil ujian masuk mandiri/ujian lokal seleksi masuk perguruan tinggi dapat diperoleh dari Pusat Pengujian dan Testing pada Perguruan Tinggi.

Berikut disajikan beberapa jenis skala yang biasa digunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

### 1) Skala Likert

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP). Untuk penilaian ekspektasi pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: Sangat Penting (SP) = 5, Penting (P) = 4, Ragu-ragu (R) = 3, Tidak Penting (TP) = 2, Sangat Tidak Penting (STP) = 1. Sedangkan untuk penilaian persepsi pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: Sangat Baik (SB) = 5, Baik (B) = 4, Ragu-ragu (R) = 3, Tidak Baik (TB) = 2, Sangat Tidak Baik (STB) = 1.

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Keuntungan skala Likert adalah mudah dibuat dan diterapkan, terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan masih sesuai dengan konteks permasalahan, jawaban suatu item dapat berupa alternative, sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas, dan reliabilitas pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item tersebut diperjelas.

## 2) Skala Guttman

Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas. diantaranya : 'ya' dan 'tidak'; 'benar-salah', dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Jadi, kalau pada Skala Likert terdapat 1,2,3,4,5 interval, dari kata 'sangat setuju' sampai 'sangat tidak setuju', maka pada Skala Guttman hanya ada dua interval yaitu 'setuju' atau 'tidak setuju'. Penelitian menggunakan Skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Jenis skala ini hanya mengukur satu dimensi dari satu variabel yang memiliki beberapa dimensi. Misalnya seorang peneliti ingin mengumpulkan data tentang kebutuhan mahasiswa, ditentukan 4 macam kebutuhan yaitu : ***Berteman, Belajar, Rekreasi dan istirahat***, salah satu dimensi dari keempat dimensi tadi akan dibagi menjadi 5 pernyataan dalam kuesioner. Maka Skala Guttman akan menggunakan kelima pernyataan tersebut sebagai item.

Contoh: dimensi ***belajar*** dibagi menjadi 5 pernyataan (dari kebutuhan yang paling rendah dahulu) :

- 1) Untuk mencari ilmu
- 2) untuk melanjutkan pendidikan
- 3) Untuk mendapatkan gelar
- 4) Untuk mendapatkan ijazah
- 5) Untuk syarat dalam mencari kerja

### Hirarki kebutuhan

- 1.) Kebutuhan akan syarat mencari kerja
- 2.) Kebutuhan akan ijazah
- 3.) Kebutuhan akan gelar
- 4.) Kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan
- 5.) Kebutuhan akan ilmu

Dalam bentuk pertanyaan :

1. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam mencari ilmu? (*Ya/Tidak*)
2. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam melanjutkan pendidikan? (*Ya/Tidak*)

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

3. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam mendapatkan gelar? (*Ya/Tidak*)
4. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam mendapatkan ijazah? (*Ya/Tidak*)
5. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam memenuhi syarat mencari kerja? (*Ya/Tidak*)

### 3) Semantic Differential

Skala ini merupakan salah satu dari skala factor yang dikembangkan untuk menganalisis dua masalah: Pengukuran populasi dan multidimensional pengungkapan dimensi yang belum dikenal atau belum diketahui. Metode skala ini dikembangkan khususnya untuk mengukur arti psikologis dari suatu objek di mata seseorang. Metode ini didasarkan pada proporsi bahwa suatu objek memiliki berbagai dimensi pengertian konotatif yang berada dalam ruang ciri multidimensi yang disebut ruang semantic.

Metode ini dibuat dengan menempatkan dua (dua) skala penilaian dalam titik ekstrim yang berlawanan yang biasa disebut *bipolar*. Biasanya di antara titik ekstrim di dadapati 5 atau 7 titik-titik butir skala dimana responden menilai suatu konsep atau lebih pada setiap butir skala.

Untuk lebih jelasnya tampilan butir-butir skala semantic diffrensial sebagai berikut :

Baik	--, --, --, --, --, ---, --	Buruk
Lambat	--, --, --, --, --, ---, --	Cepat

Skala pengukuran yang berbentuk Semantic Differential dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawaban "sangat positifnya" terletak di bagian kanan garis, dan jawaban "sangat negatif" terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang.

#### 4) Rating Scale

Rating Scale adalah alat pengumpul data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu atau situasi. Rating Scale adalah alat pengumpul data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku/sifat yang harus dicatat secara bertingkat. Rating Scale merupakan sebuah daftar yang menyajikan sejumlah sifat atau sikap sebagai butir-butir atau item. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian Rating Scale adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar yang berisi tentang sifat/ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki yang harus dicatat secara bertingkat.

Penilaian yang diberikan oleh observer berdasarkan observasi spontan terhadap perilaku orang lain, yang berlangsung dalam bergaul dan berkomunikasi sosial dengan orang itu selama periode waktu tertentu. Unsur penilaian terdapat dalam pernyataan pandangan pribadi dari orang yang menilai subyek tertentu pada masing-masing sifat atau sikap yang tercantum dalam daftar. Penilaian itu dituangkan dalam bentuk penentuan gradasi antara sedikit sekali dan banyak sekali atau antara tidak ada dan sangat ada.

Karena penilaian yang diberikan merupakan pendapat pribadi dari pengamat dan bersifat subyektif, skala penilaian yang diisi oleh satu pengamat saja tidak berarti untuk mendapatkan gambaran yang agak obyektif tentang orang yang dinilai. Untuk itu dibutuhkan beberapa skala penilaian yang diisi oleh beberapa orang, yang kemudian dipelajari bersama-sama untuk mendapatkan suatu diskripsi tentang kepribadian seseorang yang cukup terandalkan dan sesuai dengan kenyataan.

Kegunaan Pemakaian Rating Scale adalah hasil observasi dapat dikuantifikasikan beberapa pengamat menyatakan penilaiannya atas seorang siswa terhadap sejumlah alat/sikap yang sama sehingga penilaian-penilaian itu ( ratings ) dapat dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran yang cukup terandalkan.

Kesalahan-kesalahan dalam Rating Scale dapat berupa:

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

- a. pengamat membuat generalisasi mengenai sikap atau sifat seseorang karena bergaul akrab dengan siswa;
- b. Pengamat tidak berani untuk memberikan penilaian sangat baik atau sangat kurang dan karena itu menilai suatu item dalam daftar pada gradasi cukupan (*error of central tendency*);
- c. Pengamat membiarkan dirinya terpengaruh oleh penilaiannya terhadap satu dua sikap atau sifat yang dinilai sangat baik atau sangat kurang, sehingga penilaiannya terhadap item-item lain cenderung jatuh pula pada gradasi sangat baik atau sangat kurang (*hallo effect*). Misalnya bila guru sudah mempunyai kesan negatif terhadap seorang siswa (A) yang penampilannya kurang menarik dan kemudian memilih gradasi kurang pada item-item yang lain;
- d. Pengamat tidak menangkap maksud dari butir-butir dalam daftar dan kemudian mengartikannya menurut interpretasi sendiri (*logical error*);
- e. Pengamat kurang memisahkan jawaban terhadap butir yang satu dari jawaban terhadap butir yang lain (*carry over effect*).

### 5) Skala Thurstone

Skala Thurstone meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setuju dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Pada umumnya setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket tersebut. (Subana, 2000:34). Perbedaan skala Thurstone dan Skala Likert ialah pada skala Thurstone interval yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert tidak perlu sama.

Berikut ini disajikan contoh angket yang disajikan dengan menggunakan model skala Thurstone. *Petunjuk:* Pilihlah 5 (lima) buah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap pelajaran matematika, dengan cara membubuhkan tanda cek (✓) di depan nomor pernyataan di dalam tanda kurung.



## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

- ( ) 1. Saya senang belajar matematika.
- ( ) 2. Matematika adalah segalanya buat saya.
- ( ) 3. Jika ada pelajaran kosong, saya lebih suka belajar matematika.
- ( ) 4. Belajar matematika menumbuhkan sikap kritis dan kreatif.
- ( ) 5. Saya merasa pasrah terhadap ketidak-berhasilan saya dalam matematika.
- ( ) 6. Penguasaan matematika akan sangat membantu dalam mempelajari bidang studi lain.
- ( ) 7. Saya selalu ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam matematika.
- ( ) 8. Pelajaran matematika sangat menjemukan.
- ( ) 9. Saya merasa terasing jika ada teman membicarakan matematika.

Misalkan pembuat angket menentukan bahwa skor yang akan dipakai untuk pernyataan yang kontribusinya paling tinggi adalah 9 dan untuk yang paling rendah diberi skor 1, sehingga skor tengahnya sama dengan 5. Hasil pertimbangannya, ia menyatakan bahwa pernyataan yang paling tinggi kontribusinya terhadap sikap positif untuk matematika adalah pernyataan nomor 2 sehingga ia memberi bobot skor 9. Agar hasil pertimbangan itu lebih objektif, ia meminta bantuan kepada teman seprofesinya yang dianggap mampu atau lebih mampu daripada dirinya sendiri.

Misalkan ada 4 orang yang diminta pertimbangan itu, hasil pertimbangan untuk butir nomor 2 dari keempat orang itu masing-masing 8, 8, 9 dan 9. Dengan demikian skor untuk butir soal nomor 2 itu adalah

$$\frac{9 + 8 + 8 + 9 + 9}{5} = 8,6$$

Untuk butir nomor 8 pembuat angket memberi skor 2 karena ia menganggap kontribusinya rendah terhadap sikap siswa dalam matematika. Keempat teman lainnya masing-masing memberi skor 3, 4, 1, 2 sehingga skor untuk butir nomor 8 adalah

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

$$\frac{2+3+4+1+2}{5} = 2,4$$

Demikian seterusnya cara pemberian skor untuk setiap butir pernyataan. Misalkan skor untuk setiap butir soal, berturut-turut dari butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 9 adalah sebagai berikut : 9,0; 8,6; 8,2; 7,6; 4,5; 6,0; 7,6; 2,4; 4,0; 5,3 Setelah angket diberikan kepada responden (siswa), misalkan untuk subjek A memilih butir-butir nomor 1, 4, 6, 7 dan 10. Rerata skor dari subyek A adalah

$$\frac{9,0+7,6+6,0+7,6+5,3}{5} = 7,1$$

Ini berarti sikap A terhadap matematika positif, karena skornya lebih daripada skor tengah yaitu 5.

### B. Penyajian Data

Setiap data yang diperoleh dari hasil penelitian sedapat mungkin dapat disajikan dengan baik agar mampu memberikan informasi dengan baik kepada para pengguna informasi. Prinsipnya bahwa data yang telah dikumpulkan dan disajikan lebih bersifat komunikatif dan lengkap. Data yang telah terkumpul, baik yang berasal dari populasi ataupun sampel, untuk keperluan pembuatan laporan dan analisis, perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami.

Pada dasarnya terdapat dua cara untuk menyajikan data yaitu dengan cara tabel dan cara grafik. Pemilihan cara penyajian data sangat tergantung pada kebutuhan atau maksud peneliti. Kadang-kadang cara tabel lebih menguntungkan, namun untuk keperluan lain, cara grafik lebih praktis dan lebih menarik.

#### 1. Tabel Distribusi Frekuensi

Terdapat beberapa jenis tabel yang dikenal yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Penyajian data dengan menggunakan tabel biasanya memuat lima komponen yaitu judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel, dan sumber tabel. Penyajian data dengan menggunakan distribusi frekuensi merupakan cara penyajian data berdasarkan pengelompokan data

dalam kelas-kelas interval dengan frekuensi tertentu. Penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dilakukan dengan tujuan memudahkan membaca dan mengkomunikasikan sekumpulan data yang lebih besar.

Tabel distribusi frekuensi dapat disusun dalam bentuk distribusi frekuensi relatif, kumulatif, kumulatif relatif. Cara penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi dapat dilihat pada contoh berikut:

**Contoh 2.1**

Misalkan nilai ulangan matematika kelas X yang terdiri dari 40 siswa disajikan sebagai berikut:

75	64	55	75	63	87	67	67	80	87
67	86	55	74	81	84	57	72	89	76
75	57	73	84	65	80	79	81	64	55
85	57	79	75	58	83	60	76	76	80

Untuk mendapatkan deskripsi dari sebaran data pada contoh 2.1, maka skor-skor tersebut dapat disajikan menjadi lebih sederhana dan komunikatif dengan menggunakan distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengurutkan data dari skor terendah sampai skor tertinggi sebagai berikut:

55	55	55	57	57	57	58	60	63	64
64	65	67	67	67	72	73	74	75	75
75	75	76	76	76	79	79	80	80	80
81	81	83	84	84	85	86	87	87	89

- b. Menentukan rentang atau range (R) yaitu selisih skor tertinggi dengan skor terendah.

Nilai terendah adalah 55 dan nilai tertinggi adalah 89. Maka rentang (range) data tersebut adalah  $R = 89 - 55 = 34$ .

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

- c. Menentukan banyaknya kelas interval. Pada umumnya kelas interval paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 8 kelas atau dapat menggunakan aturan Sturges dengan menggunakan rumus:

$$\text{Banyak Kelas (BK)} = 1 + 3,3 \log n$$

Dimana  $n$  menunjukkan banyaknya data.

Untuk data pada contoh 2.1 di atas, maka dapat ditentukan banyaknya kelas (BK) yaitu:

$$\text{BK} = 1 + 3,3 \log 40$$

$$\text{BK} = 6,2868$$

Dengan demikian Banyak kelas untuk data pada contoh 2.1 adalah  $\text{BK} = 6$ .

- d. Panjang kelas ( $p$ ). Panjang kelas dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$p = \frac{\text{rentang (R)}}{\text{Banyak Kelas (BK)}}$$

dari contoh 2.1 di atas, maka panjang kelas dapat ditentukan yaitu:

$$p = \frac{34}{6} = 5,6667 \approx 6$$

hasil ini harus memenuhi syarat yaitu hasil kali banyaknya kelas dan panjang interval harus lebih besar dari rentang tambah satu:

$\text{BK} \times p \geq R + 1 = 6 \times 6 \geq 34 + 1 = 36 \geq 35$ . Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar.

- e. Menetapkan data pertama dengan cara menggunakan data terkecil sebagai data batass bawah kelas interval pertama atau data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya tidak melebihi dari setengah dari panjang kelas.

Misalnya dapat dipilih 55 - 60. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kelas-kelas interval adalah batass kelas interval terakhir harus smemuat data terbesar.

PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

- f. Menyusun kelas interval dengan tabell distribui frekuensi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Distribusi Frekuensi Hasi Tes Matematika kelas X

Skor	Turus	Frekuensi Absolut (f)
55 - 60	++++	8
61 - 66		4
67 - 72		4
73 - 78	++++	9
79 - 84	++++ +++++	10
85 - 90	++++	5
Jumlah		40

1) Tabel Distribusi Frekuensi relatif

Pada tabe 2.1 di atas, bilangan yang ditulis pada kolom frekuensi menyatakan banyaknya data yang terdapat pada setiap kelas interval dalam bentuk absolut (frekuensi absolut). Jika frekuensi masing-masing kelas dinyatakan dalam persen terhadap frekuensi total, maka diperoleh tabel distribusi frekuensi relatif.

Perhitungan frekuensi relatif menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Frekuensi absolut}}{n} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi ada tabel 2.1, maka dapat ditentukan dstribusi frekuensi relatif seperti pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Distribusi Frekuensi Relatif

Skor	Frekuensi Absolut (f)
55 - 60	20

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

61 – 66	10
67 – 72	10
73 – 78	22,5
79 – 84	25
85 – 90	12,5
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

### 2) Tabel Distribusi Frekuensi kumulatif

Tabel distribusi kumulatif dibuat dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas interval. Frekuensi kumulatif disimbolkan dengan  $f_{kum}$ . Frekuensi kumulatif dibedakan atas dua yaitu frekuensi kumulatif “kurang dari” dan frekuensi kumulatif “sama atau lebih”. Berdasarkan tabel 2.1 di atas, maka dapat disusun distribusi frekuensi kumulatif seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Distribusi Frekuensi Kumulatif “kurang dari”

<b>Skor</b>	<b>fkum</b>
Kurang dari 55	0
Kurang dari 61	8
Kurang dari 67	12
Kurang dari 73	16
Kurang dari 79	25
Kurang dari 85	35
Kurang dari 91	40

Jika data pada tabel 2.1 dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif sama atau lebih, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Distribusi Frekuensi Kumulatif “sama atau lebih”

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

Skor	$f_{\text{kum}}$
55 atau lebih	40
61 atau lebih	32
67 atau lebih	28
73 atau lebih	24
79 atau lebih	15
85 atau lebih	5
91 atau lebih	0

### 2. Grafik dan Diagram

Data pada umumnya sangat mudah dipahami dan mudah dibaca biasanya disajikan secara visual melalui bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram biasanya lebih menarik dibandingkan dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Namun demikian, data yang disajikan dalam bentuk diagram biasanya bukan data yang eksak (absolut), melainkan dalam bentuk aproksimasi (pendekatan).

Jika pada tabel judul ditulis pada bagian atas kepala kolom, maka judul pada diagram atau keterangan tentang diagram di tulis di bawah diagram dan bila diperlukan dicantumkan sumber dimana data tersebut diperoleh.

#### a. Diagram batang

Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang yang digambarkan berbentuk persegi panjang dengan posisi tegak atau posisi mendatar yang tingginya disesuaikan dengan kategori tertentu. Diagram batang biasanya digambarkan pada bidang Cartesius.


Setiap batang harus mempunyai lebar yang sama. Panjang atau tinggi batang berbanding dengan frekuensi dari tiap jenis data.

Tabel 2.5 Jumlah mahasiswa Pendidikan Matematika Menurut Angkatan

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

<b>Angkatan</b>	<b>Jumlah Mahasiswa</b>
Angkatan 2005/2006	120
Angkatan 2006/2007	115
Angkatan 2007/2008	90
Angkatan 2008/2009	95
Angkatan 2009/2010	85
Angkatan 2010/2011	80
Angkatan 2011/2012	120
Angkatan 2012/2013	110
Angkatan 2013/2014	80
Angkatan 2014/2015	75

Data tentang jumlah mahasiswa per angkatan sejak tahun 2005/2006 sampai dengan tahun 2014/2015 dapat disajikan pada diagram berikut:




Gambar 2.1 Jumlah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Per Angkatan



## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

Diagram batang pada gambar 2.1 di atas dapat juga ditampilkan dalam bentuk mendatar, seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Jumlah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Per Angkatan


Untuk membandingkan dua atau lebih klasifikasi dapat digunakan “diagram batang gugus”. Seperti contoh berikut:

Tabel 2.6 Banyaknya Mahasiswa Tahun Akademik 2011/2012 PMAT Menurut Jalur Seleksi dan Jenis SLTA

Jalur Seleksi	Jenis SLTA			Jumlah
	SMA	MA	SMK	
SNMPTN	10	7	4	21
SBMPTN	12	15	5	32
SPAN PTKIN	11	15	5	31
UMM	15	16	5	36

Penyajian data dalam bentuk diagram batang tabel 2.6 di atas adalah sebagai berikut:

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA



Gambar 2.3. Diagram banyaknya mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Berdasarkan Jenis Seleksi dan Jenis SLTA Tahun 2011/2012

### b. Diagram Garis

Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya berkesinambungan. Misalnya, jumlah mahasiswa yang diterima di jurusan Pendidikan Matematika FTK UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 seperti yang disajikan pada tabel 2.5. Seperti halnya diagram batang, diagram garis pun digambar pada bidang Cartesius. Penyajian data dengan menggunakan diagram garis data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA



Gambar 2.4 Jumlah Mahasiswa yang diterima tahun 2005 - 2014

### 3. Diagram Pencar

Untuk sekumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif, diagramnya dapat dibuat dalam bentuk kumpulan titik yang terpecah pada sumbu koordinat. Misalnya seorang peneliti mengukur tinggi dan berat badan 20 mahasiswa. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 2.7 Berat dan Tinggi Badan 20 Mahasiswa

No	Berat (kg)	Tinggi (cm)	No	Berat (kg)	Tinggi (cm)
1	48	150	11	75	170
2	54	165	12	70	168
3	50	160	13	56	165
4	45	160	14	54	150
5	45	165	15	46	155
6	60	150	16	48	157

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

7	65	17	17	50	164
8	58	160	18	52	156
9	57	165	19	70	168
10	63	175	20	75	170

Jika data tersebut di atas disajikan dalam bentuk diagram pencar, maka bentuk diagram pencarnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5. Diagram Pencar Hubungan Antara Berat dan Tinggi Badan Mahasiswa

#### 4. Diagram Lingkaran

Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data dalam sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring atau sektor. Dalam diagram lingkaran, keseluruhan luas daerah lingkaran, dipandang sebagai keseluruhan bagian dari data. Karena penyajiannya dalam lingkaran, sektor-sektor data terlebih dahulu dibagi ke dalam derajat yang merupakan pembagian dari  $360^\circ$ . Besarnya derajat sektor tergantung pada frekuensi

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

masing-masing data. Sebagai contoh perhatikan data pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Banyak mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika tahun 2011/2012 menurut jalur seleksi

Jenis Seleksi	Jumlah	Persen (%)
SNMPTN	21	17,50
SBMPTN	32	26,67
SPAN PTKIN	31	25,83
UMM	36	30,00

Untuk membentuk digram lingkaran pada tabel di atas, jumlah mahasiswa per jalur seleksi sama dengan luas sebuah daerah lingkaran. Untuk memperoleh porsi masing-masing daerah, harus membagi luas daerah lingkaran tersebut (melalui titik pusatnya) menjadi empat bagian yang luasnya masing-masing sebanding dengan banyaknya mahasiswa sesuai dengan jalur seleksi yaitu SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, dan UMM. Dengan demikian persentasasi dapat dihitung:

$$\text{SNMPTN diwakili oleh} \quad : \frac{21}{120} \times 360^\circ = 17,50 \% \times 360^\circ = 63^\circ$$


$$\text{SBMPTN diwakili oleh} \quad : \frac{32}{120} \times 360^\circ = 26,66 \% \times 360^\circ = 96^\circ$$

$$\text{SPAN PTKIN diwakili oleh} \quad : \frac{31}{120} \times 360^\circ = 25,30 \% \times 360^\circ = 93^\circ$$

$$\text{UMM diwakili oleh} \quad : \frac{36}{120} \times 360^\circ = 30,00 \% \times 360^\circ = 108^\circ$$


Dengan menggunakan busur derajat, dapat dilukis besarnya masing-masing sudut seperti gambar berikut:

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA



Gambar 2.6 Diagram Persentasi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Angakata 2011/2012 berdasarkan jalur masuk

Diagram lingkaran tersebut di atas, dapat dibuat dalam bentuk dimensi tiga yang biasanya disebut dengan diagram pastel seperti gambar berikut:



Gambar 2.7 Diagram Pastel Persentasi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Angakata 2011/2012 berdasarkan jalur masuk

### C. Penyajian Data dengan Aplikasi SPSS Statistics 20

Program SPSS pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1960 oleh Norman H. Nie, C., Hadley dan Dale Bent dari Stanford University. Pada tahun 1984 dikeluarkan SPSS/PC+ untuk personal computer (PC), sedangkan untuk versi Windows dirilis pada tahun 1992. Pada mulanya SPSS dibuat untuk pemecahan masalah pada ilmu-ilmu social sehingga SPSS merupakan singkatan dari *Statistical Package for the Social Science*. Seiring dengan waktu dan semakin populernya program SPSS sekarang ini, maka penggunaan program SPSS dapat diaplikasikan dalam semua bidang ilmu sehingga kepanjangan SPSS berubah menjadi *Statistical Product and Service Science*.

Penyajian data tabel dan grafik dalam jumlah besar dan bervariasi secara manua membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga untuk mengatasi hal ini digunakan program SPSS Statistics 20 dengan cepat dan hasil yang lebih akurat. Sebagai contoh penerapan adalah data prestasi belajar siswa, tingkat pendidikan orang tua, jenis kelamin , dan asal sekolah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Data Prestasi Belajar Mahasiswa Ditinjau dari Tingkat Pendidikan Orang Tua, Jenis Kelamin, dan asal sekolah

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Asal Sekolah	Prestasi Belajar
1	2	1	3	87
2	1	3	1	90
3	1	2	2	75
4	2	1	1	87
5	2	4	2	78
6	1	4	1	96
7	2	1	1	92
8	2	2	2	97

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

9	2	4	1	92
10	2	1	1	77
11	1	2	1	73
12	1	4	2	89
13	2	3	3	89
14	2	3	1	79
15	1	4	3	73
16	2	2	3	90
17	1	4	2	91
18	2	4	2	83
19	1	3	3	84
20	1	3	1	94

Keterangan:

Jenis Kelamin: 1 = Laki-laki ; 2 = Perempuan

Tingkat Pendidikan: 1 = SD; 2 = SMP ; 3 = SMA ; 4 = Sarjana

Asal Sekolah: 1 = SMA; 2 = MA; 3 = SMK

Penyajian data dengan menggunakan SPSS Statistics 20 dapat dilihat dengan menggunakan langkah berikut:

1. Buka tampilan SPSS Statistics 20
2. Input Variabel pada menu *Variable View*



## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

The screenshot shows the SPSS 'Value Labels' dialog box. The background is a variable list table with the following data:

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	JK	Numeric	8	0	Jenis Kelamin	{1. Laki-Laki...	None	8	Right	Nominal	Input
2	TP	Numeric	8	0	Tingkat Pendidid...	{1. SD}...	None	8	Right	Ordinal	Input
3	SEKOLAH	Numeric	8	0	Asal Sekolah	{1. SMA}...	None	8	Right	Nominal	Input
4	PRESTASI	Numeric	8	0	Prestasi Belajar	None	None	8	Right	Scale	Input

The 'Value Labels' dialog box contains the following information:

- Value: [ ]
- Label: [ ]
- Spelling... button
- Buttons: Add, Change, Remove
- Existing value labels list:
  - 1 = "SMA"
  - 2 = "MA"
  - 3 = "SMK"
- Buttons: OK, Cancel, Help


### 3. Input Data pada menu *Data View*

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA


	JK	TP	SEKOLAH	PRESTASI	var
1	2	1	3	87	
2	1	3	1	90	
3	1	2	2	75	
4	2	1	1	87	
5	2	4	2	78	
6	1	4	1	96	
7	2	1	1	92	
8	2	2	2	97	
9	2	4	1	92	
10	2	1	1	77	
11	1	2	1	73	
12	1	4	2	89	
13	2	3	3	89	
14	2	3	1	79	
15	1	4	3	73	
16	2	2	3	90	
17	1	4	2	91	
18	2	4	2	83	
19	1	3	3	84	
20	1	3	1	94	
21					
22					
23					

4. Untuk menyajikan data maka klik *Analyze*, pilih *Descriptive Statistics* kemudian *Frequencies* seperti tampilan berikut:

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA




Sehingga akan muncul tampilan berikut:



5. Karena variabel jenis kelamin, tingkat pendidikan, asal sekolah meruakan data nominal dan ordinal, maka dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan diagram batang atau


## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

lingkaran. Sedangkan variabel prestasi belajar datanya rasio maka lebih cocok dengan histogram. Sehingga langkah yang harus dilakukan untuk menyajikan data ini adalah klik Bart Chart dan Frequencies seperti gambar berikut



Dengan cara yang sama untuk data prestasi belajar dengan cara klik *Bar Chart* lalu *Histogram*, *Show normal curve on histogram* dan *frequencies*.

PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA



6. Untuk melihat hasilnya klik *Continu*.

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Statistics 20 dapat disajikan pada tabel berikut:

1. Frequency Table

**Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	9	45,0	45,0	45,0
Valid Perempuan	11	55,0	55,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

**Tingkat Pendidikan Orang Tua**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	4	20,0	20,0	20,0
SMP	4	20,0	20,0	40,0

PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

SMA	5	25,0	25,0	65,0
SARJANA	7	35,0	35,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

**Asal Sekolah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	9	45,0	45,0	45,0
MA	6	30,0	30,0	75,0
SMK	5	25,0	25,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

**2. Frequencies**


**Prestasi Belajar**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
73	2	10,0	10,0	10,0
75	1	5,0	5,0	15,0
77	1	5,0	5,0	20,0
78	1	5,0	5,0	25,0
79	1	5,0	5,0	30,0
83	1	5,0	5,0	35,0
84	1	5,0	5,0	40,0
87	2	10,0	10,0	50,0



## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

89	2	10,0	10,0	60,0
90	2	10,0	10,0	70,0
91	1	5,0	5,0	75,0
92	2	10,0	10,0	85,0
94	1	5,0	5,0	90,0
96	1	5,0	5,0	95,0
97	1	5,0	5,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

### 3. Bart Chart




## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA






#### 4. Hitogram




#### 5. Tabel Kontingensi

Tabel kontingensi atau Crosstabs merupakan penyajian data multiple variable. Langkah yang dapat dilakukan dengan menggunakan crosstabs sebagai berikut:

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA




Sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:



Klik Paste sehingga muncul tampilan berikut lalu blok kemudian Run

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA



Hasil dari analisis ini adalah:

### Jenis Kelamin \* Tingkat Pendidikan Orang Tua \* Asal Sekolah Crosstabulation

Count


Asal Sekolah			Tingkat Pendidikan Orang Tua				Total
			SD	SMP	SMA	SARJANA	
SMA	Jenis	Laki-Laki	0	1	2	1	4
	Kelamin	Perempuan	3	0	1	1	5
	Total		3	1	3	2	9
MA	Jenis	Laki-Laki		1		2	3
	Kelamin	Perempuan		1		2	3
	Total			2		4	6
SMK	Jenis	Laki-Laki	0	0	1	1	2
	Kelamin	Perempuan	1	1	1	0	3
	Total		1	1	2	1	5
Total	Jenis	Laki-Laki	0	2	3	4	9
	Kelamin	Perempuan	4	2	2	3	11
	Total		4	4	5	7	20

## 6. Stem and Leaf Plots and Box Plot


Untuk membuat diagram dahan dan daun (Stem and leaf ) dengan menggunakan SPSS Statistics 20 dimulai dengan

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

mengklik *Analyze* kemudian pilih *Descriptive Statistics* dan *Explore* seperti tampilan berikut:



Misalnya akan disajikan data prestasi belajar siswa berdasarkan jenis kelamin, maka masukkan variabel Prestasi Belajar pada kotak *Dependent List* dan variabel Jenis Kelamin pada kotak *Factor List*, pilih *Plots* kemudian klik *Stem-and-Leaf* seperti berikut:



Kemudian klik *Continue* dan *OK* maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

Prestasi Belajar Stem-and-Leaf Plot for  
JK= Laki-Laki

Frequency	Stem &	Leaf
2,00	7 .	33
1,00	7 .	5
1,00	8 .	4
1,00	8 .	9
3,00	9 .	014
1,00	9 .	6


Stem width: 10  
Each leaf: 1 case(s)

Prestasi Belajar Stem-and-Leaf Plot for  
JK= Perempuan

Frequency	Stem &	Leaf
3,00	7 .	789
1,00	8 .	3
3,00	8 .	779
3,00	9 .	022
1,00	9 .	7

Stem width: 10  
Each leaf: 1 case(s)

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA



Khusus untuk gambar Boxplot di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Siswa jenis kelamin laki-laki memiliki penyebaran data prestasi belajar mengumpul dinilai-nilai yang besar.
2. Siswa jenis kelamin perempuan memiliki penyebaran data prestasi belajar mengumpul dinilai-nilai yang besar dan sedikit di atas laki-laki.
3. Garis hitam menunjukkan median dan percentil 50, tampak bahwa siswa laki-laki mempunyai median lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.
4. Media untuk siswa laki-laki dan perempuan mediannya agak ke atas artinya distribusi negatif.



**Uji Kompetensi**

1. Bagaimana cara pengumpulan data dan apa yang harus diperhatikan dalam proses pengumpulan data?
2. Mengapa data perlu disajikan? Dan bagaimana cara penyajian data yang baik?
3. Diberikan data tentang hasil ujian matematika siswa sebagai berikut:

91    83    71    62    72    75    79    64    83    69  
 95    89    72    88    78    78    63    80    64    95  
 73    77    83    61    87    71    68    80    79    60  
 69    61    94    86    92    88    90    74    60    61

- a. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut
  - b. Buatlah histogram dan poligon frekuensinya
4. Suatu kelurahan terdiri dari 5 RW. Banyaknya warga untuk masing-masing RW disajikan pada tabel berikut:

RW	Banyaknya Penduduk	
	Laki-Laki	Perempuan
I	150	180
II	300	320
III	250	280
IV	200	250
V	185	265

Gambarlah diagram batang dari data tersebut, jika:


- a. Tanpa memperhatikan jenis kelamin
  - b. Dengan memperhatikan jenis kelamin
5. Pak Ali mengatur rencana pengeluaran untuk menutupi kebutuhan keluarganya dari penghasilan setiap bulan, sebagai berikut:

## PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

- Biaya pendidikan putra-putrinya sebesar 30%
- Biaya kebutuhan sehari-hari untuk makan 40%
- Biaya untuk pembayaran listrik, air, telepon 5%
- Biaya tabungan 10%
- Lain-lain (tak terduga) 15%

Buatlah diagram lingkaran data tersebut di atas.

- Menurut Anda, manakah yang lebih baik penyajian data dengan data tunggal atau dengan data berfrekuensi? Mengapa?
- Untuk menggambarkan sekelompok data, manakah yang paling baik diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran? mengapa?
- Buatlah interpretasi tentang prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua berdasarkan pada Boxplot berikut:





# BAB III

## UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK



### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Jenis Ukuran Pemusatan
2. Memahami konsep mean, median, dan modus
3. Memiliki keterampilan menentukan mean, median, dan modus dari sekumpulan data
4. Memahami jenis-jenis ukuran letak
5. Memahami konsep kuartil, desil, dan persentil
6. Memiliki keterampilan menentukan kuartil, desil, dan persentil dari sekumpulan data



### Uraian Materi

#### A. Ukuran Pemusatan

Dalam statistika ada beberapa ukuran pemusatan atau ukuran gejala pusat yang digunakan untuk mendeskripsikan data hasil penelitian. Diantara ukuran pemusatan yang dimaksud adalah rata-rata, median, dan modus. Masing-masing ukuran pemusatan tersebut akan dijelaskan satu persatu berikut ini:

##### 1. Mean

Dalam keseharian, kita sering mendengar istilah rata-rata, misalnya rata-rata pendapatan, rata-rata harga, rata-rata penjualan, rata-rata hasil ujian siswa, rata-rata berat badan, dan rata-rata tinggi badan siswa. Rata-rata dihitung dengan menggunakan semua data yang ada. Mean didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai data

## UKURAN PEMUSATAN DAN KUKURAN LETAK

dibagi dengan banyaknya data. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

dengan:

$\bar{X}$  = Mean (rata-rata)

$x_i$  = data ke-i sampai ke-n

$n$  = banyaknya data

### Contoh 3.1

Diketahui nilai ujian Aljabar 10 mahasiswa sebagai berikut: 85, 60, 75, 78, 80, 75, 67, 75, 78, 90. Dengan menggunakan rumus rata-rata di atas, maka dapat dihitung nilai rata-rata ujian Aljabar 10 mahasiswa sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{85 + 60 + 75 + 78 + 80 + 75 + 67 + 75 + 78 + 90}{10} = \frac{763}{10} = 76,3$$

Jadi rata-rata nilai ujian aljabar mahasiswa adalah 76,3.

Jika data yang disajikan merupakan data yang berfrekuensi, maka untuk mencari nilai rata-rata dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

dengan:

$\bar{X}$  = Mean (rata-rata)

$x_i$  = data ke-i sampai ke-n

$f_i$  = frekuensi masing-masing nilai  $x_i$

Persamaan di atas juga disebut sebagai rata-rata berbobot dengan frekuensi setiap nilai sebagai bobotnya. Dengan demikian,

## UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK

rata-rata ialah jumlah hasil kali frekuensi dan nilai data dibagi dengan jumlah frekuensinya.

### Contoh 3.2

Berikut diberikan nilai ujian Aljabar 20 mahasiswa sebagai berikut:

Tabel 3.1. Nilai Aljabar 20 mahasiswa

$x_i$	$f_i$	$x_i \cdot f_i$
50	3	150
65	4	260
68	5	340
76	4	304
80	2	160
85	2	170
Jumlah	20	1384

Dari tabel 4.1 di atas, diperoleh nilai  $\sum f_i = 20$ , dan  $\sum f_i \cdot x_i = 1384$ . Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$\bar{X} = \frac{1384}{20} = 69,2$$

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian aljabar dari 20 mahasiswa tersebut adalah 69,2.

### Contoh 3.3

Berikut diberikan data hasil ujian aljabar 100 mahasiswa:

## UKURAN PEMUSATAN DAN KUKURAN LETAK

Tabel 3.2. Nilai Aljabar untuk 100 mahasiswa

Nilai Ujian	Frekuensi ( $f_i$ )	Tanda Kelas ( $x_i$ )	$f_i \cdot x_i$
21 - 30	4	25.5	102
31 - 40	6	35.5	213
41 - 50	8	45.5	364
51 - 60	10	55.5	555
61 - 70	24	65.5	1572
71 - 80	25	75.5	1887.5
81 - 90	15	85.5	1282.5
91 - 100	8	95.5	764
Jumlah	100		6740

Dari tabel 4.2 di atas, diperoleh nilai  $\sum f_i = 100$ , dan  $\sum f_i \cdot x_i = 6779$ . Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$\bar{X} = \frac{6740}{100} = 67,40$$

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian aljabar dari 20 mahasiswa tersebut adalah 67,40.

### 2. Median

Bentuk ukuran gejala pusat atau ukuran pemusatan yang lainnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data terurut dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Median merupakan garis pembagi dari sekumpulan data menjadi dua bagian yang sama besarnya.

Untuk menentukan media suatu data tergantung pada banyaknya data. Jika banyaknya data ganjil maka median langung

ditentukan dengan melihat nilai paling tengah dari data setelah diurutkan. Sementara jika banyaknya data bernilai genap, maka setelah data diurutkan maka median ditentukan dengan menghitung nilai rata-rata dua data yang paling tengah.

**Contoh 3.4**

Data tentang hasil ujian statistika dari 9 mahasiswa adalah 8, 5, 7, 8, 9, 6, 5,7,6. Untuk menentukan nilai median dari kumpulan data tersebut adalah data terlebih dahulu diurutkan. Data setelah diurutkan diperoleh sebagai berikut: 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jumlah data (n) = 9, artinya banyaknya data bernilai ganjil. Karena banyaknya data bernilai ganjil, maka median dapat ditentukan langsung dengan melihat nilai paling tengah yaitu 7.

**Contoh 3.5**

Diperoleh suatu data hasil ujian Matematika 12 siswa Madrasah Aliyah “Al-Hidayah” sebagai berikut: 9, 7, 8, 6, 7, 6, 8, 5, 8, 9, 8, 7.

Untuk menentukan median maka data terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan hasilnya adalah: 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Karena banyaknya data (n) adalah 12 atau berjumlah genap, maka media ditentukan dengan mencari nilai rerata dari dua nilai yang paling tengah. Berdasarkan data tersebut, maka dua data yang paling tengah adalah 7 dan 8. Maka median dari kumpulan data tersebut adalah:

$$\text{Median} = \frac{7 + 8}{2} = \frac{15}{2} = 7.5$$

Jadi median dari kumpulan data tersebut adalah 7,5.

Untuk data yang tersusun dalam suatu data berkelompok atau data berfrekuensi, maka median dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Me} = b + p \left( \frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right)$$

## UKURAN PEMUSATAN DAN KUKURAN LETAK

Dimana:

Me = Median

b = batas bawah kelas median yaitu kelas dimana median terletak

p = panjang kelas media

n = ukuran sampel atau banyaknya data

F = jumlah semua frekuensi yang berada di bawah kelas interval

median

f = frekuensi kelas median

### Contoh 3.6

Nilai ujian Matematika 80 siswa Madrasah Tsanawiyah "Al-Barokah" disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 3.3. Distribusi Frekuensi Nilai Ujian Matematika  
MTs " Al-Barokah"

Nilai Ujian	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$	$f_k$
31 - 40	30,5	40,5	3	3
41 - 50	40,5	50,5	5	8
51 - 60	50,5	60,5	15	23
61 - 70	60,5	70,5	10	33
71 - 80	70,5	80,5	25	58
81 - 90	80,5	90,5	14	72
91 - 100	90,5	100,5	8	80

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh beberapa nilai yaitu:  $b = 80,5$ ;  $p = 10$ ;  $F = 3 + 5 + 15 + 10 = 33$ ;

Dengan menggunakan rumus menentukan nilai median untuk data berfrekuensi, maka median dapat dicari sebagai berikut:

$$Me = b + p \left( \frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right)$$

$$\begin{aligned} Me &= 80,5 + 10 \left( \frac{\frac{80}{2} - 33}{25} \right) = 80,5 + 10 \left( \frac{40 - 33}{25} \right) \\ &= 80,5 + 10(0,28) = 83,3 \end{aligned}$$

Jadi median untuk data hasil ujian matematika MTs “Al Barokah” adalah 83,3.

### 3. Modus

Ukuran gejala pusat yang lain yang sering digunakan adalah modus. Modus diartikan sebagai nilai yang sering muncul dari suatu kelompok data. Modus sering digunakan jika data berupa data nominal, karena dengan ukuran ini mampu memberikan informasi tentang adanya kategori tertentu yang mendominasi kategori lainnya dalam suatu pengamatan.

Penerapan modus untuk data hasil pengamatan dengan data nominal adalah:

- Kebanyakan pemuda di Makassar menghisap rokok
- Pada umumnya pegawai negeri tidak disiplin dalam bekerja
- Kebanyakan siswa di kelas VII adalah perempuan

#### Contoh 3.7

Hasil ujian Bahasa Inggris dari 10 siswa disajikan sebagai berikut:

7, 8, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 8

Untuk menentukan modus dari data tersebut, maka dapat digunakan tabel frekuensi sebagai berikut:

Tabel 3.4. Distribusi Frekuensi Data

$x_i$	$f_i$
6	2
7	3

## UKURAN PEMUSATAN DAN KUKURAN LETAK

8	5
9	2
Jumlah	12

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, maka tampak bahwa modus untuk data hasil ujian Bahasa Inggris adalah 8 karena memiliki frekuensi terbesar yaitu 5.

Jika data disajikan dalam suatu tabel distribusi frekuensi, maka modus dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Mo = b + p \left( \frac{b_1}{b_1 + b_2} \right)$$

Dimana:

$Mo$  = modus

$b$  = batas bawah kelas modus, kelas interval dengan frekuensi paling banyak

$p$  = panjang kelas interval modus

$b_1$  = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas interval modus

$b_2$  = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas interval modus

### Contoh 3.8

Diberikan suatu data tentang nilai hasil ujian matematika 80 siswa MTs "Al Barokah" disajikan pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:



Tabel 3.5. Distribusi Frekuensi Nilai Ujian Matematika  
MTs “ Al-Barokah”

Nilai Ujian	Batas Bawah	Batas Atas	f <sub>i</sub>
31 - 40	30,5	40,5	3
41 - 50	40,5	50,5	5
51 - 60	50,5	60,5	15
61 - 70	60,5	70,5	10
71 - 80	70,5	80,5	25
81 - 90	80,5	90,5	14
91 - 100	90,5	100,5	8
Jumlah			80

Untuk menentukan modus pada tabel 3.13 di atas, terlebih dahulu menentukan beberapa nilai berikut:  $b = 70,5$ ;  $p = 10$ ;  $b_1 = 25 - 10 = 15$ ;  $b_2 = 25 = 14 = 11$ . Nilai-nilai tersebut kemudian disubstitusikan pada persamaan berikut:

$$Mo = b + p \left( \frac{b_1}{b_1 + b_2} \right)$$

$$Mo = 70,5 + 10 \left( \frac{15}{15 + 11} \right) = 70,5 + 10 (0.6) = 70,5 + 6 = 76,5$$

Dengan demikian modus untuk data hasil ujian Matematika MTs “Al Barokah” adalah 76,5.

## B. Ukuran Letak

Salah satu ukuran dari gejala pusat atau ukuran pemusatan adalah median. Pada ukuran lokasi, median merupakan ukuran lokasi yang membagi dua bagian sama besarnya. Ukuran lokasi lain yang akan disajikan adalah kuartil, desil, dan persentil .

### 1. Kuartil

Kuartil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi empat bagian yang sama banyaknya berdasarkan data terurut. Kuartil biasanya disimbolkan dengan K. Kuartil (K) dibagi atas tiga

## UKURAN PEMUSATAN DAN KUKURAN LETAK

bagian yaitu kuartil ke-satu ( $K_1$ ), kuartil ke-dua ( $K_2$ ), dan kuartil ke-tiga ( $K_3$ ).

Untuk menentukan kuartil dari suatu data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Urutkan data dari terkecil ke terbesar
- Tentukan letak kuartil
- Hitung skor kuartil dengan menggunakan rumus berikut:

$$K_i = \frac{i(n+1)}{4}$$

dengan  $i$  = kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3, serta  $n$  = banyaknya data.

### Contoh 3.9

Hasil ujian akhir semester mata kuliah statistika 12 mahasiswa jurusan pendidikan matematika disajikan sebagai berikut:

56, 60, 68, 65, 70, 80, 95, 82, 75, 70, 60, 82.

Data setelah diurutkan menjadi:

56, 60, 60, 65, 68, 70, 70, 75, 80, 82, 82, 95

Maka:

Kuartil ke-1 diperoleh:

$K_1 = \text{data ke } \left(\frac{1(12+1)}{4}\right) = \left(\frac{13}{4}\right) = 3.25$ , artinya data berada diantara data ke-3 dan ke-4.

$$\text{Skor } K_1 = 60 + \frac{1}{4}(65 - 60) = 60 + 1.25 = 61.25$$

Kuartil ke-3 diperoleh:

$K_3 = \text{data ke } \left(\frac{3(12+1)}{4}\right) = \left(\frac{39}{4}\right) = 9.75$ , artinya data berada diantara data ke-9 dan ke-10.

$$\text{Skor } K_3 = 80 + \frac{3}{4}(82 - 80) = 80 + 1.5 = 81.5$$

Jika data berbentuk distribusi frekuensi, maka nilai kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK

$$K_i = b + p \left( \frac{\left(\frac{in}{4} - fb\right)}{f} \right)$$

Dengan  $i = 1, 2,$  dan  $3$

$b$  = batas bawah kelas interval  $K_i$

$p$  = panjang kelas interval  $K_i$

$fb$  = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval  $K_i$

$f$  = frekuensi kelas interval  $K_i$

**Contoh 3.10**

Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi Data berkelompok

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$	$f_k$
31 - 40	30,5	40,5	2	2
41 - 50	40,5	50,5	3	5
51 - 60	50,5	60,5	5	10
61 - 70	60,5	70,5	14	24
71 - 80	70,5	80,5	25	49
81 - 90	80,5	90,5	18	67
91 - 100	90,5	100,5	13	80

(sumber: Susetyo, *Statistika untuk analisis data penelitian*. hal. 51)

Untuk menentukan kuartil ke-1 terduga dengan menghitung  $\frac{1}{4} n$ , yaitu  $\frac{1}{4} \times 80 = 20$ . Nilai ini menunjukkan berada pada kelas interval ke-4 yaitu 61 - 70. Dari kelas interval  $K_4$  diperoleh nilai  $b = 60,5$ ;  $i = 10$ ;  $f = 14$ ;  $fb = 2 + 3 + 5 = 10$ . Dengan demikian kuartil ke-1 dapat dihitung sebagai berikut:

$$K_1 = 60,5 + 10 \left( \frac{20 - 10}{14} \right) = 60,5 + 10 \left( \frac{10}{14} \right) = 67,14$$

Dengan demikian K1 memperoleh skor 67,14 berarti terdapat  $\frac{1}{4}$  atau 25% mahasiswa memperoleh paling tinggi nilai 67,14 sedangkan yang memperoleh skor di atas 67,14 sebanyak 75%.

## 2. Desil

Desil merupakan sekumpulan data terurut yang dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama banyaknya. Terdapat sembilan desil (D) yang biasanya disimbolkan dengan D1 untuk desil ke-1, D2 untuk desil ke-2, D3 untuk desil ke-3, D4 untuk desil ke-4, sampai dengan D9 untuk desil ke-9.

Untuk menentukan desil dari suatu data, maka dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

- Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar
- Menentukan letak desil
- Menghitung skor desil dengan menggunakan rumus:

$$\text{Letak } D_i = \left( \frac{i(n+1)}{10} \right),$$

dengan  $i$  = desil ke-1, ke-2, sampai desil ke-9

### Contoh 3.11

Diberikan data hasil ujian matematika sebagai berikut: 60, 72, 55, 90, 85, 76, 70, 98, 50, 60, 75, 76. Maka untuk menentukan desil dari data tersebut adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar sebagai berikut:

Data terurut: 50, 55, 60, 60, 70, 72, 75, 76, 76, 85, 90, 98.

Maka desil ke-6 dari data tersebut adalah:

$$\text{Letak } D_6 = \left( \frac{6(12 + 1)}{10} \right) = \frac{78}{10} = 7,8$$

Hasil ini menunjukkan bahwa desil ke-6 terletak antara data ke-7 dan data ke-8.

D6 terletak pada skor  $75 + 0,8(76-75) = 75 + 0,8(1) = 75,8$ .

Desil dari suatu data yang berbentuk distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan:

UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK

$$D_i = b + p \left( \frac{\left( \frac{in}{10} - fb \right)}{f} \right)$$

dengan  $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$

$b$  = batas bawah kelas interval  $D_i$ , diduga terletak

$p$  = panjang kelas interval  $D_i$

$fb$  = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval  $D_i$

$f$  = frekuensi kelas interval  $D_i$

**Contoh 3.12**

Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi Data berkelompok

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$	$f_k$
31 - 40	30,5	40,5	2	2
41 - 50	40,5	50,5	3	5
51 - 60	50,5	60,5	5	10
61 - 70	60,5	70,5	14	24
71 - 80	70,5	80,5	25	49
81 - 90	80,5	90,5	18	67
91 - 100	90,5	100,5	13	80

(sumber: Susetyo, *Statistika untuk analisis data penelitian*. hal. 51)

Menentukan desil ke-5 terduga dengan menghitung  $5/10 \times n = (5/10) \times 80 = 40$ . Berdasarkan perhitungan tersebut maka diduga bahwa desil ke-5 berada pada kelas interval ke-5 yaitu 71 - 80. Dengan demikian diperoleh nilai  $b = 70,5$ ;  $p = 10$ ;  $f = 25$ ; dan  $fb = 2 + 3 + 5 + 14 = 24$

$$D_5 = 70,5 + 10 \left( \frac{(40 - 24)}{25} \right) = 76,9$$

Dengan demikian desil k-5 memperoleh skor 76,9. Artinya ada 5/10 atau 50% mahasiswa memperoleh paling tinggi 76,9 . sedangkan yang memperoleh skor di atas 76,9 sebanyak 50%.

### 3. Persentil

Persentil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi seratus bagian yang sama banyaknya setelah disusun secara terurut. Persentil biasanya disimbolkan dengan P. Terdapat sembilan puluh sembilan (99) buah persentil yaitu P1 untuk persentil ke-1, P2 untuk persentil ke-2 sampai dengan P99 untuk persentil ke-99.

Langkah-langkah untuk menghitung nilai persentil dari sekumpulan data adalah:

- Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar
- Menentukan letak persentil
- Menghitung skor persentil dengan menggunakan rumus:

$$\text{Letak } P_i = \left( \frac{i(n + 1)}{100} \right)$$

dengan i = persentil ke-1, ke-2, sampai persentil ke-99

#### Contoh 3.13

Diberikan data hasil ujian matematika sebagai berikut: 60, 72, 55, 90, 85, 76, 70, 98, 50, 60, 75, 76. Maka untuk menentukan persentil dari data tersebut adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar sebagai berikut:

Data terurut: 50, 55, 60, 60, 70, 72, 75, 76, 76, 85, 90, 98.

Maka persentil ke-60 dari data tersebut adalah:

$$\text{Letak } P_{50} = \left( \frac{60(12 + 1)}{100} \right) = \frac{780}{100} = 7,8$$

## UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK

Hasil ini menunjukkan bahwa persentil ke-60 terletak antara data ke-7 dan data ke-8.

$P_6$  terletak pada skor  $75 + 0,8(76-75) = 75 + 0,8(1) = 75,8$ .

Persentil dari suatu data yang berbentuk distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan:

$$P_i = b + p \left( \frac{\left( \frac{in}{100} - fb \right)}{f} \right)$$

dengan  $i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 99$

$b$  = batas bawah kelas interval  $P_i$ , diduga terletak

$p$  = panjang kelas interval  $P_i$

$fb$  = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval  $P_i$

$f$  = frekuensi kelas interval  $P_i$

### Contoh 3.14

Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Distribusi Frekuensi Data berkelompok

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$	$f_k$
31 - 40	30,5	40,5	2	2
41 - 50	40,5	50,5	3	5
51 - 60	50,5	60,5	5	10
61 - 70	60,5	70,5	14	24
71 - 80	70,5	80,5	25	49
81 - 90	80,5	90,5	18	67
91 - 100	90,5	100,5	13	80

(sumber: Susetyo, *Statistika untuk analisis data penelitian*. hal. 51)

## UKURAN PEMUSATAN DAN KUKURAN LETAK

Menentukan persentil ke-50 terduga dengan menghitung  $50/100 \times n = (5/10) \times 80 = 40$ . Berdasarkan perhitungan tersebut maka diduga bahwa persentil ke-50 berada pada kelas interval ke-5 yaitu 71 - 80. Dengan demikian diperoleh nilai  $b = 70,5$ ;  $p = 10$ ;  $f = 25$ ; dan  $fb = 2 + 3 + 5 + 14 = 24$

$$P_{50} = 70,5 + 10 \left( \frac{(40 - 24)}{25} \right) = 76,9$$

Dengan demikian persentil ke-50 memperoleh skor 76,9. Artinya ada 50/100 atau 50% mahasiswa memperoleh paling tinggi 76,9, sedangkan yang memperoleh skor di atas 76,9 sebanyak 50%.

### C. Aplikasi SPSS Statistics 20 untuk Menentukan Ukuran Pemusatan dan Ukuran Letak

Diberikan data hasil pengukuran kemampuan representasi matematika 20 siswa dan hasilnya disajikan pada tabel berikut:

No	JK	Kemampuan Representasi Matematika
1	2	89
2	2	96
3	2	75
4	1	72
5	1	79
6	1	68
7	1	90
8	2	90
9	2	74
10	1	81
11	2	97
12	1	67
13	2	86




## UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK

14	2	94
15	2	86
16	1	89
17	2	69
18	1	73
19	1	73
20	1	86

Keterangan: variabel JK menunjukkan: 1 = laki-laki dan 2 = perempuan


Untuk menganalisis secara deskriptif dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Input Data pada layar SPSS Statisticss 20
2. Klik Analyze kemudian pilih Descriptive Statistics dan pilih Frequencies seperti tampilan berikut:



## UKURAN PEMUSATAN DAN KUKURAN LETAK

- Klik Statistics kemudian beri tanda centang mean, median, modus, quartiles, percentiles, minimum, dan maksimum sehingga muncul kotak berikut:




- Klik Continu lalu tekan OK dan akan keluar hasilnya sebagai berikut:

<b>Statistics</b>		Representasi
Kemampuan Matematika		
N	Valid	20
	Missing	0
Mean		81,70
Median		83,50
Mode		86
Minimum		67
Maximum		97
Percentiles	25	73,00
	50	83,50
	75	89,75


## UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK

Dan jika akan dianalisis kemampuan representasi matematika siswa berdasarkan variabel jenis kelamin maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka File data “representasi”.
2. Klik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistics lalu pilih Explore sehingga tampil sebagai berikut:



3. Isi variabel Kemampuan Representasi pada Kotak Dependent List dan variabel Jenis Kelamin pada kotak Factor list, kemudian klik Statistics, maka akan tampak dilayar sebagai berikut:



UKURAN PEMUSATAN DAN KUKURAN LETAK

4. Klik Continuo lalo OK maka akan keluar output sebagai berikut:

**Case Processing Summary**

	Jenis Kelamin	Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kemampuan Representasi Matematika	Laki-Laki	10	100,0%	0	0,0%	10	100,0%
	Perempuan	10	100,0%	0	0,0%	10	100,0%

**Descriptives**

	Jenis Kelamin	Statistic	Std. Error	
Kemampuan Representasi Matematika	Laki-Laki	Mean	77,80	2,678
		95% Confidence Interval for Mean	71,74	
		Lower Bound	71,74	
		Upper Bound	83,86	
		5% Trimmed Mean	77,72	
		Median	76,00	
		Variance	71,733	
		Std. Deviation	8,470	
		Minimum	67	
		Maximum	90	
		Range	23	
		Interquartile Range	16	
Skewness	,272	,687		

UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK

Perempuan	Kurtosis	-1,475	1,334
	Mean	85,60	3,096
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	78,60
		Upper Bound	92,60
	5% Trimmed Mean	85,89	
	Median	87,50	
	Variance	95,822	
	Std. Deviation	9,789	
	Minimum	69	
	Maximum	97	
	Range	28	
	Interquartile Range	20	
	Skewness	-,593	,687
	Kurtosis	-,994	1,334



**Uji Kompetensi**

1. Jelaskan pengertian:

- a. Mean
- b. Median
- c. Modus
- d. Kuartil
- e. Desil
- f. Persentil

2. Diketahui data hasil tes kemampuan Literasi siswa sebagai berikut:

56	93	51	89	78	68	80	85	66	51
74	63	88	95	75	73	85	70	75	72
55	92	73	58	70	91	88	60	67	65
80	62	93	84	81	71	51	90	89	76
75	70	93	81	56	57	78	71	79	58

Tentukan:

- a. Buatlah distribusi frekuensinya
- b. Mean dengan data frekuensi
- c. Median dengan data frekuensi
- d. Modus dengan data frekuensi

3. Diketahui data hasil tes kemampuan matematika sebagai berikut:

5	3	6	7	7	3	3	5	7	2
2	3	2	3	4	6	3	8	4	7
6	5	4	9	4	9	9	7	9	6

Tentukanlah:

- a. Kuartil

## UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN LETAK

- b. Desil
  - c. Persentil
4. Tinggi badan dari sekelompok siswa yang ditetapkan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

Tinggi badan	Banyaknya Siswa
140 - 144	4
145 - 149	7
150 - 154	10
155 - 159	12
160 - 164	6
165 - 169	3

Dari tabel di atas tentukan:

- a. Rerata, median, dan modusnya
  - b. Kuartil-kuartil, Desil, dan persentilnya
5. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada soal no 4. Jelaskan makna dari masing nilai yang diperoleh (interpretasikan hasil perhitungan tersebut).
6. Menurut Anda, manakah yang lebih mudah, efektif, dan efisien dalam menentukan nilai mean, median, modus, kuartil, desil, perentil data tunggal atau data frekuensi? Jelaskan alasan Anda!.

## UKURAN PEMUSATAN DAN KUKURAN LETAK



# BAB IV

## UKURAN PENYEBARAN



### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Jenis Ukuran Penyebaran
2. Memahami konsep rentang, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar deviasi dan variansi, koefisien variansi, koefisien kemiringan, koefisien kurtosis, skor baku ( $z$ ) dan skor  $T$
3. Memiliki keterampilan menentukan konsep rentang, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar deviasi dan variansi, koefisien variansi, koefisien kemiringan, koefisien kurtosis, skor baku ( $z$ ) dan skor  $T$  untuk data tunggal dan data kelompok



### Uraian Materi

Ukuran penyebaran menunjukkan suatu variasi dari suatu distribusi data. Dengan mengetahui variasi suatu data maka kita bisa mengambil kesimpulan secara lebih tepat tentang distribusi suatu data. Pada ukuran nilai tengah, beberapa distribusi angka dengan *mean* (rerata) yang sama bisa memiliki ukuran variasi yang berbeda. Lihat ilustrasi berikut ini:

Tabel 4.1. Distribusi nilai Matematika Siswa

Mapel	Nilai Siswa					Mean
A	50	50	50	50	50	50
B	50	60	40	50	50	50
C	50	30	50	55	65	50
D	50	40	60	40	60	50

## UKURAN PENYEBARAN

Rerata nilai siswa untuk setiap mata pelajaran(A, B, C dan D) tersebut diatas adalah sama. Namun demikian kita akan memberikan interpretasi yang berbeda bila mencermati lebih jauh tentang variasi dari masing-masing matakuliah. Penghitungan ukuran penyebaran atau ukuran dispersi ini penting karena akan diperoleh informasi tambahan tentang penyebaran yang terjadi pada suatu distribusi, dapat menilai ketepatan ukuran nilai tengah dalam mewakili distribusinya. Bila suatu distribusi data memiliki dispersi yang besar maka ukuran nilai tengah kurang mewakili distribusinya, sebaliknya bila nilai dispersi semakin kecil maka semakin tepat nilai tengah mewakili distribusi datanya. Ukuran penyebaran yang akan dijelaskan adalah rentang, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar devisi dan variansi, keofisien variansi, keofisien kemiringan, koefisien kurtosis, skor baku (z) dan skor T baik untuk data tunggal maupun data berkelompok.

### A. Ukuran Penyebaran untuk Data Tunggal

#### 1. Rentang

Nilai rentang ini menunjukkan selisih antara data yang paling tinggi dengan data yang paling rendah. Dengan melihat ukuran ini maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai range ini sangat kasar, karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Rumus untuk mencari nilai rentang (range) adalah:

$$R = \text{data terbesar} - \text{data terkecil}$$

#### Contoh 4.1

Pada data tabel satu diperoleh *range* pada masing masing mata pelajaran adalah:

Tabel 4.2. Tabel Nilai mata pelajaran matematika

Mapel	Data Terbesar	Data Terkecil	Rentang
A	50	50	0
B	60	40	20

## UKURAN PENYEBARAN

C	65	30	35
D	60	40	20

Maka secara kasar dapat disimpulkan bahwa sebaran nilai pada mata pelajaran C paling bervariasi dibandingkan dengan nilai mata pelajaran A, B, dan D. Nilai range sama dengan 0 pada mata pelajaran A menunjukkan bahwa distribusi nilai A adalah homogen. Semakin besar nilai rentang maka distribusi data semakin bervariasi.

### 2. Rentang Antar Kuartil

Rentang antar kuartil (RAK) adalah nilai kuartil ke-3 dikurangi dengan nilai kuartil ke-1 yang dituliskan sebagai berikut:

$$\text{RAK} = K_3 - K_1$$

#### Contoh 4.2

Diberikan data tunggal sebagai berikut:

4    5    5    6    6    7    7    7    8    8    9  
                   $K_1$                                    $K_2$    $K_3$

Dari data tersebut, diperoleh nilai RAK sebagai berikut:

$$\text{RAK} = K_3 - K_1 = 8 - 5 = 3$$

Sementara itu, untuk menghitung Rentang Antar Kuartil untuk data berkelompok atau berfrekuensi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menghitung kuartil seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu pada ukuran letak. Untuk lebih memahami dapat dilihat pada contoh berikut:

#### Contoh 4.3

Berikan suatu data hasil tes kemampuan matematika yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut:

## UKURAN PENYEBARAN

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi Data Kemampuan Matematika

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$	$f_k$
31 - 40	30,5	40,5	2	2
41 - 50	40,5	50,5	3	5
51 - 60	50,5	60,5	5	10
61 - 70	60,5	70,5	14	24
71 - 80	70,5	80,5	25	49
81 - 90	80,5	90,5	18	67
91 - 100	90,5	100,5	13	80

Untuk menentukan RAK maka langkah yang harus dilakukan adalah menghitung Kuarti pertama dan kuartil ketiga dengan menggunakan rumus:

$$K_i = b + p \left( \frac{\left( \frac{in}{4} - fb \right)}{f} \right)$$

$$K_1 = 60,5 + 10 \left( \frac{20 - 10}{14} \right) = 60,5 + 10 \left( \frac{10}{14} \right) = 67,14$$

$$K_3 = 80,5 + 10 \left( \frac{260 - 49}{18} \right) = 80,5 + 10 \left( \frac{11}{18} \right) = 86,61$$

Dengan demikian diperoleh:

$$RAK = K_3 - K_1 = 86,61 - 67,14 = 19,47$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa siswa yang memperoleh skor 67,14 adaah skor terendah dalam renatang antar kuartil dan skor paling tinggi adalah 86,61.

### 3. Simpangan Kuartil

Simpangan kuartil atau sering disebut rentang semi anta kuartil merupakan setengah dari rentang antar kuartil (RAK) yang dapat dituliskan sebagai berikut:

## UKURAN PENYEBARAN

$$SK = \frac{1}{2} (K_3 - K_1)$$

### Contoh 4.4

Diberikan data tunggal sbagai berikut:

4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9
		$K_1$			$K_2$			$K_3$		

Dari data tersebut, diperoleh nilai RAK sebagai berikut:

$$RAK = K_3 - K_1 = 8 - 5 = 3$$

Maka Simpangan Kuartil (SK) diperoleh:

$$SK = \frac{1}{2} (3) = 1,5$$

## 4. Rata-Rata Simpangan

Untuk menutup kekurangan dari nilai range maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata (Mean Deviation). Simpangan rata-rata (SR) memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Rumus untuk mencari rerata deviasi atau simpangan rata-rata adalah:

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

dengan:

$x_i$  = data ke-i

$\bar{x}$  = nilai rerata distribusi data

$n$  = jumlah data

### Contoh 4.5

Hasil ujian Matematika 5 siswa MTs 'Al Barokah' adalah sebagai berikut: 7, 9, 8, 7, 9.

## UKURAN PENYEBARAN

Untuk menentukan simpangan rata-rata dari data tersebut, maka langkah yang harus dilakukan adalah menentukan nilai rerata dari data tersebut.

$$\bar{x} = \frac{7 + 9 + 8 + 7 + 9}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{40}{5} = 8$$

Dengan menggunakan rumus SR di atas, maka diperoleh:

$$SR = \frac{|7 - 8| + |9 - 8| + |8 - 8| + |7 - 8| + |9 - 8|}{5}$$

$$SR = \frac{1 + 1 + 0 + 1 + 1}{5} = \frac{4}{5} = 0.8$$

Dengan demikian nilai SR untuk ujian matematika siswa MTs "Al Barokah" adalah 0.8.

Sementara untuk menentukan Rata-Rata Simpangan untuk data berfrekuensi atau data berkelompok, maka persamaan yang digunakan adalah:

$$RS = \frac{\sum f|X_i - \bar{X}|}{n} \text{ atau } RS = \frac{\sum f|x|}{n}$$

Untuk lebih memahami tentang Rata-Rata Simpangan khususnya untuk data berkelompok atau data frekuensi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Skor Hasil Ujian Aljabar

Skor (X)	f	$(X_i - \bar{X} = x)$	$f X_i - \bar{X} $
20	1	-16,5	16,5
24	3	-12,5	12,5
26	4	-10,5	10,5
30	5	-6,5	6,5
35	7	-1,5	1,5

## UKURAN PENYEBARAN

40	10	3,5	3,5
45	6	8,5	8,5
47	4	10,5	10,5
48	3	11,5	11,5
50	1	13,5	13,5
Jumlah	44		95

Dengan menggunakan rumus rata-rata simpangan maka diperoleh nilai:

$$RS = \frac{\sum f|X_i - \bar{X}|}{n}$$
$$RS = \frac{95}{44} = 2,16$$

Rata-rata simpangan memberikan makna bahwa jika rata-rata simpangan bernilai besar, maka informasi yang dapat diberikan adalah skor siswa dalam ujian menunjukkan adanya penyebaran atau jarak yang jauh dari rata-ratanya. Sebaliknya jika rata-rata simpangan kecil ha ini menunjukkan bahwa data semakin mengumpul di sekitar pusat atau rata-rata hitung.

### 5. Standar Deviasi dan Varians

Salah satu ukuran penyimpangan yang sering digunakan untuk menjelaskan data hasil penelitian adalah simpangan baku dan variansi. Simpangan baku sering dilambangkan dengan  $s$  untuk sampel dan  $\sigma$  untuk populasi. Jika simpangan baku dikuadratkan atau berpangkat dua maka disebut sebagai variansi. Variansi biasa disimbolkan dengan  $s^2$  untuk sampel dan  $\sigma^2$  untuk populasi.

Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Ukuran ini dikenalkan oleh *Karl Pearson*. Dengan menggunakan simpangan rata-rata hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun demikian karena dalam penghitungan menggunakan

## UKURAN PENYEBARAN

nilai absolut maka tidak dapat diketahui arah penyebarannya. Maka dengan simpangan baku kelemahan ini dapat diatasi, yakni dengan cara membuat nilai pangkat 2, sehingga nilai negatif menjadi positif. Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut (untuk sampel):

$$S = \sqrt{\frac{\sum fx_i^2 - (\sum fx_i)^2/n}{n - 1}}$$

Sedangkan rumus yang digunakan untuk populasi hampir sama, namun pembagiannya tanpa dikurangkan dengan angka 1, yaitu:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum fx_i^2 - (\sum fx_i)^2/n}{n}}$$

Sebagai contoh pada data Tabel berikut dapat dihitung standar deviasinya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Nilai Aljabar Siswa

$X_i$	$f_i$	$X_i^2$	$f_i * X_i$	$f_i * X_i^2$
20	1	400	20	400
24	3	576	72	1728
26	4	676	104	2704
30	5	900	150	4500
35	7	1225	245	8575
40	10	1600	400	16000
45	6	2025	270	12150
47	4	2209	188	8836
48	3	2304	144	6912
50	1	2500	50	2500



## UKURAN PENYEBARAN

Jumlah	44	14415	1643	64305
--------	----	-------	------	-------

Dengan menggunakan rumus standar deviasi dan variansi di atas, maka diperoleh:

$$S = \sqrt{\frac{\sum fx_i^2 - (\sum fx_i)^2/n}{n-1}} = \sqrt{\frac{64305 - (1643)^2/44}{44-1}} = 8,288247 \text{ dan } S^2 = 68,69503$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum fx_i^2 - (\sum fx_i)^2/n}{n}} = \sqrt{\frac{64305 - (1643)^2/44}{44}} = 8,193521 \text{ dan } S^2 = 67,13378$$

Simpangan baku atau *standard deviation* merupakan bentuk akar pangkat 2 dari Variansi. Biasanya ukuran variansi ini diberi simbol sebagai  $s^2$ . Sebenarnya yang merupakan ukuran simpangan adalah simpangan baku, namun demikian ukuran variansi ini merupakan ukuran pangkat dua dari simpangan baku, sehingga bisa juga dianggap sebagai ukuran penyebaran.

### 6. Koefisien Variansi

Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Kalau kita membandingkan berbagai variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut.

Sebagai contoh pada suatu pengukuran tinggi badan mahasiswa diperoleh rerata 165 cm dengan standar deviasi 2,5 cm dan hasil penimbangan diperoleh rerata berat badannya adalah 56 kg dengan standar deviasi 1,2 kg. Dari hasil pengamatan ini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa tinggi badan mahasiswa lebih bervariasi bila dibandingkan dengan berat badannya.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka harus dihitung suatu ukuran penyebaran relative, yakni Koefisien Variansi (KV). Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$KV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%$$

## UKURAN PENYEBARAN

Untuk lebih memahami tentang koefisien variansi dapat dilihat pada contoh berikut dengan menggunakan data pada tabel 4.3, maka diperoleh koefisien dapat dihitung sebagai berikut:

$$KV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%$$

Koefisien variansi untuk sampel:


$$KV = \frac{8,288247}{37,34091} \times 100\% = 22,19616$$

Koefisien variansi untuk populasi:

$$KV = \frac{8,193521}{37,34091} \times 100\% = 21,94248$$

### 7. Koefisien Kemiringan ( $\alpha_3$ )

Distribusi yang tidak simetris disebut miring (skewness). Distribusi miring ada dua yaitu miring kanan dan miring kiri. Distribusi miring kanan bila ekor kanan lebih panjang dari ekor kiri. Sedangkan distribusi miring kiri jika ekor kiri lebih panjang dari ekor kanan.



Koefisien kemiringan pearson dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$\alpha_3 = \frac{3(\bar{x}-me)}{s} \text{ atau } \alpha_3 = \frac{3(\bar{x}-mo)}{s}$$

Dengan menggunakan data

4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9

## UKURAN PENYEBARAN

Diperoleh rata-rata ( $\bar{x}$ ) = 6,55 dan  $m_0 = 7$ . Dengan demikian koefisien kemiringan dapat dihitung yaitu:

$$\alpha_3 = \frac{3(\bar{x} - m_0)}{s} = \frac{3(6,55 - 7)}{1,508} = -2,98$$

Karena nilai koefisien kemiringan bernilai negatif, maka distribusi data miring kiri artinya kecenderungan data mengumpu di atas rata-rata.

### 8. Koefisien Kurtosis ( $\alpha_4$ )

Koefisien kurtosis adalah ukuran keruncingan dari distribusi data. Makin runcing suatu kurva data makin kecil simpangan baku sehingga data makin mengelompok atau homogen. Ukuran keruncingan suatu distribusi dinyatakan dengan koefisien kurtosis, dengan rumus sebagai berikut:

$$\alpha_4 = \frac{\frac{1}{2}(K_3 - K_1)}{P_{90} - P_{10}}$$

dengan:


- $K_1$  = Kuartil pertama
- $K_3$  = Kuartil ketiga
- $P_{90}$  = Persentil ke-90
- $P_{10}$  = Persentil ke-10

Kriteria untuk koefisien  $\alpha_4$  sebagai berikut:

- a. Jika  $\alpha_4 > 0,263$  maka model kurva runcing (leptokurtis)
- b. Jika  $\alpha_4 = 0,263$  maka model kurva normal (mesokurtis)
- c. Jika  $\alpha_4 < 0,263$  maka model kurva datar (platikurtis)

Gambaran tentang ketiga moodel ini dapat dilihat ada gambar berikut:

## UKURAN PENYEBARAN



(a) leptokurtis

(b) mesokurtis

(c) platikurtis

Untuk contoh dengan menggunakan data

4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9
		$K_1$			$K_2$			$K_3$		

Diperoleh  $K_1 = 5$ ;  $K_3 = 8$ ;  $P_{90} = 8,8$ ; dan  $P_{10} = 4,2$ . Maka koefisien kurtosis dapat dihitung sebagai berikut:

$$\alpha_4 = \frac{\frac{1}{2} (K_3 - K_1)}{P_{90} - P_{10}} = \frac{\frac{1}{2} (8 - 5)}{8,8 - 4,2} = 0,326$$

Nilai  $\alpha_4 = 0,326$  lebih besar dari  $0,263$  hal ini menunjukkan bahwa model kurvanya adalah runcing (leptokurtis).

### 9. Skor Baku (z) dan Skor T

Skor baku atau nilai baku suatu kumpulan data dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$z_i = \frac{X_i - \bar{X}}{s}, i = 1, 2, \dots, n$$

dengan:

$z_i$  = skor baku ;  $X_i$  = skor siswa ; dan  $\bar{X}$  = rata-rata

## UKURAN PENYEBARAN

Sementara skor T ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$T = 10z_i + 50$$

Untuk lebih memahami tentang skor baku dan skor T, maka dapat diperhatikan pada contoh berikut:

Kelas Interval	Nilai Tengah (X)	f <sub>i</sub>	f <sub>i</sub> .Xi	f <sub>i</sub> .Xi <sup>2</sup>	Mean	Stdev	Zt	T
31 - 40	35,5	2	71,0	2520,50	75,875	14,359	-2,81183	21,882
41 - 50	45,5	3	136,5	6210,75	75,875	14,359	-2,1154	28,846
51 - 60	55,5	5	277,5	15401,25	75,875	14,359	1,41897	35,81
61 - 70	65,5	14	917,0	60063,50	75,875	14,359	0,72254	42,775
71 - 80	75,5	25	1887,5	142506,25	75,875	14,359	0,02612	49,739
81 - 90	85,5	18	1539,0	131584,50	75,875	14,359	0,67031	56,703
91 - 100	95,5	13	1241,5	118563,25	75,875	14,359	1,36674	63,667
Jumlah		80	6070	476850,00				

Berikut contoh menentukan nilai skor z dan skor T

$Z_1 = z_1 = \frac{35,5-75,875}{14,359} = -2,81183$ . Berdasarkan nilai z ini, maka nilai T dapat dihitung sebagai berikut:

$$T_1 = 10.z_1 + 50$$

$T_1 = (10 \times -2,81183) + 50 = 21,882$ . Demikian seterusnya untuk memperoleh nilai skor z dan skor T pada tabel tersebut di atas.



**Uji Kompetensi**

1. Jelaskan pengertian:
  - a. Rentang
  - b. Rentang Antar Kuartil
  - c. Simpangan Kuartil
  - d. Rata-Rata Simpangan
  - e. Standar Deviasi
  - f. Variansi
  - g. Koefisien Variansi
  - h. Koefisien Kemiringan
  - i. Koefisien Kurtosis

2. Diketahui data hasil tes kemampuan statistika siswa sebagai berikut:

74	63	88	95	75	73	85	70	75	72
80	62	93	84	81	71	51	90	89	76

Tentukan:

- a. Rentang, Rentang Antar Kuartil, dan Simpangan Kuartil
  - b. Rata-rata simpangan, standar deviasi, dan variansinya
  - c. Koefisien variansi, skewness, dan kutrosis
3. Hasil pengkurukan 50 orang peserta didik mengikuti tes kecepatan membaca diperoleh rentang sebesar 10. Jelaskan makna dari rentang tersebut.
4. Diberikan data hasil tes kemampuan Bahasa Inggris sebagai berikut:
 

91	71	82	87	71	66	66	71	69	72
69	68	89	91	84	72	90	74	93	65

## UKURAN PENYEBARAN

84 75 90 81 92 74 66 83 86 86

Tentukanlah:

- Standar deviasi
  - Koefisien Varians
  - Keofisien kemiringan
  - Keoofisien Kurtosis
5. Data hasil ujian akhir semester akhir mata kuliah statistika diperoleh seperti yang disajikan ppada tabel distribusi frekuensi berikut:

Kelas Interval	$f_i$	...	...	...	...	...	...
31 - 40	4						
41 - 50	3						
51 - 60	8						
61 - 70	15						
71 - 80	25						
81 - 90	20						
91 - 100	15						

Tentukanlah:

- Simpangan baku dan variansi data tersebut.
- Tentukanlah rata-rata simpangan data tersebut
- Tentukan skor z dan t data tersebut

## UKURAN PENYEBARAN



# BAB V

## TEKNIK SAMPLING



### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami pengertian sampling
2. Mengetahui jenis-jenis teknik sampling
3. Memahami cara menentukan sampling



### Uraian Materi

Pada hakekatnya teknik sampling dikembangkan dengan tujuan untuk membantu para peneliti dalam upaya untuk melakukan generalisasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Generalisasi bisa dilakukan lewat penaksiran (*estimation*) parameter populasi maupun generalisasi lewat pengujian hipotesis (*testing of hypothesis*) tentang keadaan parameter di populasi.


Yang dimaksud dengan generalisasi dalam pengertian statistika adalah penarikan kesimpulan dari hal yang jumlah elemennya lebih sedikit atau dikenal dengan *sampel* ke hal yang jumlah elemennya lebih banyak atau lebih luas atau dikenal dengan *populasi*. Generalisasi dikenal juga dengan istilah *inferensi*. Dari istilah ini dikenal istilah *statistik inferensial* yaitu semua perhitungan dari sampel yang digunakan untuk generalisasi, sedangkan *statistik deskriptif* yaitu semua perhitungan yang hanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena tanpa melakukan generalisasi. Seseorang bisa melakukan generalisasi bila prinsip *random* dipakai dalam pengambilan sampel. Makna *random* pada hakekatnya adalah kondisi di mana setiap elemen atau individu mendapat

kesempatan yang sama untuk terpilih dalam proses pengambilan sampel.

Dengan demikian, seseorang baru bisa melakukan generalisasi bila batasan populasi jelas. Yang dimaksud populasi adalah semua kumpulan elemen atau individu di mana pengamatan akan dilakukan oleh peneliti, tentunya pengamatan tidak dilakukan terhadap populasinya, namun lewat sampel yang diambilnya. Yang dimaksud sampel adalah bagian dari populasi. Populasi dinyatakan dengan memasukkan tiga unsur, isi (*content*), luas (*extent*) dan waktu (*time*).

### A. Pengertian Sampling

Earl Babbie (1986) mengemukakan bahwa sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan sampel. Dalam kegiatan observasi ditunjukkan pada populasi sosial.



Gambar 5.1. Logika Sampling

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus. Idealnya, agar hasil penelitiannya lebih bisa dipercaya, seorang peneliti harus melakukan sensus. Namun karena sesuatu hal peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan elemen tadi, maka yang bisa dilakukannya adalah meneliti sebagian dari keseluruhan elemen atau unsur tadi.

Berbagai alasan yang masuk akal mengapa peneliti tidak melakukan sensus antara lain adalah, (a) populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti; (b) keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, membuat peneliti harus puas jika meneliti sebagian dari elemen penelitian; (c) penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel terhadap populasi - misalnya, karena elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan. (Uma Sekaran, 1992); (d) jika elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal, misalnya untuk meneliti kualitas jeruk dari satu pohon jeruk.

Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa dipercaya dalam arti masih bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik pengambilan sampel.

Elemen/unsur adalah setiap satuan populasi. Kalau dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. Artinya dalam populasi tersebut terdapat 30 elemen penelitian. Jika populasinya adalah pabrik sepatu, dan jumlah pabrik sepatu 500, maka dalam populasi tersebut terdapat 500 elemen penelitian. Jika populasinya mahasiswa suatu perguruan tinggi misalnya UIN Alauddin Makassar dan jumlah mahasiswa UIN Alauddin misalnya 20.000 mahasiswa, maka dalam populasi tersebut terdapat 20.000 elemen penelitian.

### **B. Syarat Sampel yang Baik**

Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Kalau yang ingin diukur adalah masyarakat Sunda sedangkan yang dijadikan sampel adalah hanya orang Banten saja, maka sampel tersebut tidak valid, karena tidak

mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (orang Sunda). Sampel yang valid ditentukan oleh dua pertimbangan.

Pertama: Akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan “bias” (kekeliruan) dalam sample. Dengan kata lain makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolok ukur adanya “bias” atau kekeliruan adalah populasi. Cooper dan Emory (1995) menyebutkan bahwa “*there is no systematic variance*” yang maksudnya adalah tidak ada keragaman pengukuran yang disebabkan karena pengaruh yang diketahui atau tidak diketahui, yang menyebabkan skor cenderung mengarah pada satu titik tertentu. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui rata-rata luas tanah suatu perumahan, lalu yang dijadikan sampel adalah rumah yang terletak di setiap sudut jalan, maka hasil atau skor yang diperoleh akan bias. Kekeliruan semacam ini bisa terjadi pada sampel yang diambil secara sistematis.

Contoh *systematic variance* yang banyak ditulis dalam buku-buku metode penelitian adalah jajak-pendapat (polling) yang dilakukan oleh *Literary Digest* (sebuah majalah yang terbit di Amerika tahun 1920-an) pada tahun 1936. (Copper & Emory, 1995, Nan lin, 1976). Mulai tahun 1920, 1924, 1928, dan tahun 1932 majalah ini berhasil memprediksi siapa yang akan menjadi presiden dari calon-calon presiden yang ada. Sampel diambil berdasarkan petunjuk dalam buku telepon dan dari daftar pemilik mobil. Namun pada tahun 1936 prediksinya salah. Berdasarkan jajak pendapat, di antara dua calon presiden (Alfred M. Landon dan Franklin D. Roosevelt), yang akan menang adalah Landon, namun meleset karena ternyata Roosevelt yang terpilih menjadi presiden Amerika.

Setelah diperiksa secara seksama, ternyata *Literary Digest* membuat kesalahan dalam menentukan sampel penelitiannya. Karena semua sampel yang diambil adalah mereka yang memiliki telepon dan mobil, akibatnya pemilih yang sebagian besar tidak memiliki telepon dan mobil (kelas rendah) tidak terwakili, padahal Rosevelt lebih banyak dipilih oleh masyarakat kelas rendah tersebut. Dari kejadian tersebut ada dua pelajaran yang diperoleh: (1) keakuratan prediktibilitas dari suatu sampel tidak selalu bisa dijamin dengan banyaknya jumlah sampel; (2) agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi (Nan Lin, 1976).

Kedua: Presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Contoh : Dari 300 pegawai produksi, diambil sampel 50 orang. Setelah diukur ternyata rata-rata perhari, setiap orang menghasilkan 50 potong produk "X". Namun berdasarkan laporan harian, pegawai bisa menghasilkan produk "X" per harinya rata-rata 58 unit. Artinya di antara laporan harian yang dihitung berdasarkan populasi dengan hasil penelitian yang dihasilkan dari sampel, terdapat perbedaan 8 unit. Makin kecil tingkat perbedaan di antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel, maka makin tinggi tingkat presisi sampel tersebut.

Belum pernah ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu dalam setiap penarikan sampel senantiasa melekat keasalahan-kesalahan, yang dikenal dengan nama "*sampling error*" Presisi diukur oleh simpangan baku (*standard error*). Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel (S) dengan simpangan baku dari populasi makin tinggi pula tingkat presisinya. Walau tidak selamanya, tingkat presisi mungkin bisa meningkat dengan cara menambahkan jumlah sampel, karena kesalahan mungkin bisa berkurang kalau jumlah sampelnya ditambah (Kerlinger, 1973 ).

### C. Beberapa Istilah dalam Sampling

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit-unit observasi yang karakteristiknya akan diduga. Populasi dibedakan menjadi dua yaitu populasi sampling dan populasi sasaran. Sebagai contoh adalah apabila kita mengambil rumah tangga sebagai unit sampling, sedangkan yang diteliti adalah anggota rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan sudah menikah, seluruh rumah tangga disebut populasi sampling, sedangkan seluruh perempuan yang sudah menikah disebut populasi sasaran.

#### 2. Unit Sampling

Unit sampling adalah unit-unit yang akan dijadikan sebagai unit sampel. Unit sampling dapat dibedakan menjadi unit sampling

## TEKNIK SAMPLING

pertama (*primary sampling units*), unit sampling kedua (*secondary sampling unit*), unit sampling terakhir (*final sampling unit*).

Misalnya seorang peneliti mendesain wilayah penelitian menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama wilayah penelitian adalah kabupaten disebut unit sampling pertama, tahap kedua adalah desa disebut unit sampling kedua, dan tahap terakhir adalah RT/RW disebut unit sampling terakhir.

### 3. Kerangka Sampling

Kerangka sampling adalah sebuah daftar yang berisi-unit sampling yang akan dijadikan sebagai unit sampel. Dalam kerangka sampling dicantumkan nomor unit sampling, identitas unit sampling, alamat unit sampling dan keterangan. Unit-unit sampling yang dimasukkan dalam kerangka sampling hendaknya memenuhi syarat yaitu *up to date*, tidak ada unit sampling yang tercatat dua kali, dan dapat dilacak di lapangan.

### 4. Koefisien Kepercayaan

Koefisien kepercayaan ( $t$ ) sering ditemui ketika akan mendesain ukuran sampel dan menentukan sampling error. Berdasarkan koefisien kepercayaan untuk masing-masing peluang kepercayaan (*confidence probability*) adalah berbeda, dan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.1. Koefisien Kepercayaan

Taraf Kepercayaan (%)	Koefisien Kepercayaan
50	0.67
80	1.28
90	1.64
95	1.96
99	2.58
Catatan: untuk ilmu sosial disarankan menggunakan koefisien kepercayaan 1.96. (Sumber: Cochran, 1977: 27)	

#### D. Ukuran Sampel

Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi persoalan yang penting manakala jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi. Walau jumlahnya sedikit tetapi jika kaya akan informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat.

Dikaitkan dengan besarnya sampel, selain tingkat kesalahan, ada lagi beberapa faktor lain yang perlu memperoleh pertimbangan yaitu, (1) derajat keseragaman, (2) rencana analisis, (3) biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia . (Singarimbun dan Effendy, 1989). Makin tidak seragam sifat atau karakter setiap elemen populasi, makin banyak sampel yang harus diambil. Jika rencana analisisnya mendetail atau rinci maka jumlah sampelnya pun harus banyak. Misalnya disamping ingin mengetahui sikap konsumen terhadap kebijakan perusahaan, peneliti juga bermaksud mengetahui hubungan antara sikap dengan tingkat pendidikan. Agar tujuan ini dapat tercapai maka sampelnya harus terdiri atas berbagai jenjang pendidikan SD, SLTP. SMU, dan seterusnya. Makin sedikit waktu, biaya, dan tenaga yang dimiliki peneliti, makin sedikit pula sampel yang bisa diperoleh. Perlu dipahami bahwa apapun alasannya, penelitian haruslah dapat dikelola dengan baik (*manageable*).

Misalnya, jumlah bank yang dijadikan populasi penelitian ada 400 buah. Pertanyaannya adalah, berapa bank yang harus diambil menjadi sampel agar hasilnya mewakili populasi?, 30?, 50?, 100?, 250?. Jawabnya tidak mudah. Ada yang mengatakan, jika ukuran populasinya di atas 1000, sampel sekitar 10 % sudah cukup, tetapi jika ukuran populasinya sekitar 100, sampelnya paling sedikit 30%, dan kalau ukuran populasinya 30, maka sampelnya harus 100%.

Ada pula yang menuliskan, untuk penelitian deskriptif, sampelnya 10% dari populasi, penelitian korelasional, paling sedikit 30 elemen populasi, penelitian perbandingan kausal, 30 elemen per kelompok, dan untuk penelitian eksperimen 15 elemen per kelompok (Gay dan Diehl, 1992).

## TEKNIK SAMPLING

Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1992) memberikan pedoman penentuan jumlah sampel sebagai berikut :

1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen
2. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel (laki-laki/perempuan, SD/SLTP/SMU, dsb), jumlah minimum sub sampel harus 30
3. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah variable yang akan dianalisis.
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 s/d 20 elemen.

Krejcie dan Morgan (1970) dalam Uma Sekaran (1992) membuat daftar yang bisa dipakai untuk menentukan jumlah sampel sebagai berikut (Lihat Tabel).

Tabel 5.2. Daftar Penentuan Jumlah Ukuran Sampel

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335



## TEKNIK SAMPLING

70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Sebagai informasi lainnya, Champion (1981) mengatakan bahwa sebagian besar uji statistik selalu menyertakan rekomendasi ukuran sampel. Dengan kata lain, uji-uji statistik yang ada akan sangat efektif jika diterapkan pada sampel yang jumlahnya 30 s/d 60 atau dari 120 s/d 250. Bahkan jika sampelnya di atas 500, tidak direkomendasikan untuk menerapkan uji statistik.

### E. Jenis-Jenis Sampling

Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, sampel acak atau *random sampling/probability sampling*, dan sampel tidak acak atau *nonrandom sampling/nonprobability sampling*.

## TEKNIK SAMPLING

Yang dimaksud dengan *random sampling* adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Artinya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan  $25/100$  untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan *nonrandom sampling* atau *nonprobability sampling*, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Lima elemen populasi dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah peneliti, sedangkan yang lainnya, karena jauh, tidak dipilih; artinya kemungkinannya 0 (nol).

Dua jenis teknik pengambilan sampel di atas mempunyai tujuan yang berbeda. Jika peneliti ingin hasil penelitiannya bisa dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi, atau istilahnya adalah melakukan generalisasi maka seharusnya sampel representatif dan diambil secara acak. Namun jika peneliti tidak mempunyai kemauan melakukan generalisasi hasil penelitian maka sampel bisa diambil secara tidak acak. Sampel tidak acak biasanya juga diambil jika peneliti tidak mempunyai data pasti tentang ukuran populasi dan informasi lengkap tentang setiap elemen populasi. Contohnya, jika yang diteliti populasinya adalah konsumen teh botol, kemungkinan besar peneliti tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah konsumennya, dan juga karakteristik konsumen. Karena dia tidak mengetahui ukuran populasi yang tepat, bisakah dia mengatakan bahwa 200 konsumen sebagai sampel dikatakan "representatif"? Kemudian, bisakah peneliti memilih sampel secara acak, jika tidak ada informasi yang cukup lengkap tentang diri konsumen?. Dalam situasi yang demikian, pengambilan sampel dengan cara acak tidak dimungkinkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali sampel diambil dengan cara tidak acak atau *nonprobability sampling*, namun dengan konsekuensi hasil penelitiannya tersebut tidak bisa digeneralisasikan. Jika ternyata dari 200 konsumen teh botol tadi merasa kurang puas, maka peneliti tidak bisa mengatakan bahwa sebagian besar konsumen teh botol merasa kurang puas terhadap teh botol.

Di setiap jenis teknik pemilihan tersebut, terdapat beberapa teknik yang lebih spesifik lagi. Pada sampel acak (*random sampling*) dikenal dengan istilah *simple random sampling*, *stratified*

*random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan area sampling.* Pada nonprobability sampling dikenal beberapa teknik, antara lain adalah *convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, snowball sampling.*

## 1. Probability/Random Sampling

Syarat pertama yang harus dilakukan untuk mengambil sampel secara acak adalah memperoleh atau membuat kerangka sampel atau dikenal dengan nama "*sampling frame*". Yang dimaksud dengan kerangka sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Elemen populasi bisa berupa data tentang orang/binatang, tentang kejadian, tentang tempat, atau juga tentang benda. Jika populasi penelitian adalah mahasiswa perguruan tinggi "A", maka peneliti harus bisa memiliki daftar semua mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi "A" tersebut selengkap mungkin. Nama, NRP, jenis kelamin, alamat, usia, dan informasi lain yang berguna bagi penelitiannya. Dari daftar ini, peneliti akan bisa secara pasti mengetahui jumlah populasinya (N). Jika populasinya adalah rumah tangga dalam sebuah kota, maka peneliti harus mempunyai daftar seluruh rumah tangga kota tersebut. Jika populasinya adalah wilayah Jawa Barat, maka peneliti harus mempunyai peta wilayah Jawa Barat secara lengkap. Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kampung. Lalu setiap tempat tersebut diberi kode (angka atau simbol) yang berbeda satu sama lainnya.

Di samping *sampling frame*, peneliti juga harus mempunyai alat yang bisa dijadikan penentu sampel. Dari sekian elemen populasi, elemen mana saja yang bisa dipilih menjadi sampel?. Alat yang umumnya digunakan adalah Tabel Angka Random, kalkulator, atau undian. Pemilihan sampel secara acak bisa dilakukan melalui sistem undian jika elemen populasinya tidak begitu banyak. Tetapi jika sudah ratusan, cara undian bisa mengganggu konsep "acak" atau "random" itu sendiri.

**a) Simple Random Sampling atau Sampel Acak Sederhana**

William G. Cochran (1979) menyatakan bahwa sampling acak sederhana adalah sebuah metode seleksi terhadap unit-unit populasi, unit-unit tersebut diacak seluruhnya. Masing-masing unit atau unit satu dengan unit lainnya memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini cocok untuk populasi yang homogen.

Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi bukan merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada wanita dan pria, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan gender, status kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta perbedaan-perbedaan lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan demikian, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan ukuran sampel dalam sampling acak sederhana adalah perlu mempertimbangkan parameter ukurannya. Umumnya dalam penelitian sosial menggunakan parameter untuk menaksir proporsi (%). Ukuran sampel taksir proporsi dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{n_0}{1 + \left(\frac{n_0}{N}\right)}, \text{ dimana } n_0 = \frac{t^2(p.q)}{d^2}$$

Keterangan:

- n : ukuran sampel
- n<sub>0</sub> : sampel asumsi
- t : koefisien kepercayaan
- d : sampling error
- p dan q : parameter proporsi binomial
- N : populasi

## TEKNIK SAMPLING

Sampel asumsi dapat diperoleh dari penelitian orang lain yang serupa. Jika tidak, sampel asumsi dapat ditentukan sendiri oleh si peneliti dengan ketentuan sebagai berikut: peneliti diperbolehkan memberikan asumsi terhadap proporsi binomial pada penelitiannya sendiri, jika tidak dapat, bisa menggunakan 50% : 50% untuk  $p$  dan  $q$ . jika sampling error dari penelitian orang lain tidak didapatkan, maka peneliti diperbolehkan memberikan asumsi terhadap sampling error. Disini peneliti tidak dibenarkan untuk secara langsung memberikan ukuran sampel asumsi.

Untuk menentukan unit-unit sampel ada beberapa teknik yang bisa dilakukan yaitu:

a. Undian

Cara undian dilakukan dengan membuat suatu daftar yang berisi semua subjek/individu yang dibuatkan kode masing-masing individu kemudian dikocok, dan diambil sampel tanpa pilih kasih. Hal ini bisa dilakukan dengan catatan bahwa anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

b. Pengacakan dari tabel bilangan acak

Cara ini yang paling banyak digunakan oleh para ahli statistika dan para peneliti dalam penentuan sampel karena prosedurnya sangat sederhana. Table angka random memiliki kapasitas yang bermacam-macam, ada yang 2500 random digit, 7000 random digit, 100.000 random digit, bahkan ada yang 1.000.000 random digit.

Berikut contoh tabel bilangan acak memiliki jumlah kolom 40 (1 - 40) dan jumlah baris 30 (1 - 30)

TEKNIK SAMPLING

Tabel 5.3 Tabel Angka Kacak

Baris	Kolom							
	(1-5)	(6-10)	(11-15)	(16-20)	(21-25)	(26-30)	(31-35)	(36-40)
1	88347	17286	78607	56395	57187	49184	28747	93067
2	57140	14727	84858	96891	08337	06006	76040	43189
3	74686	19219	00336	86883	08091	96975	99600	41765
4	68013	47831	62237	74722	43311	60190	71402	49379
5	57477	01083	54076	77307	26245	59383	27506	11435
6	89127	45794	03047	73555	87278	87625	39942	55841
7	26519	83872	10046	49016	05970	01984	35931	85044
8	48045	49132	75138	25685	41636	70667	40490	52848
9	22531	68140	13975	65441	93559	31206	83363	07989
10	84887	87900	00791	61499	53797	61331	80790	71516
11	72047	48575	21528	54526	84353	33201	68711	60202
12	19645	36289	93465	20199	19112	70685	93244	71864
13	46884	63010	30571	82783	56243	42667	26171	49649
14	92289	01728	65175	30663	96081	86740	29708	46615
15	87133	26124	14968	11719	39303	58438	45386	19563
16	66728	11287	19905	20395	79462	98550	44596	01662
17	56636	04443	52824	99026	11819	76162	30298	92028
18	42224	86999	72902	99394	64085	21825	24947	33337
19	14389	30953	45220	41383	09655	31034	68660	54083
20	17048	11974	16576	51277	39785	19552	26973	80023

## TEKNIK SAMPLING

21	97337	79867	34371	53896	45620	24155	86855	34738
22	46831	74781	56344	63419	36559	19287	61378	33382
23	03522	71406	64001	85922	75172	64592	45163	22801
24	48585	35386	97609	16065	97566	30677	11324	55655
25	91018	27021	61216	48095	66462	84802	77208	01767
26	98387	72577	04516	28437	54038	26162	91111	17775
27	90502	13519	65359	47759	59304	55141	39551	01590
28	47324	00186	11443	39140	24755	55372	61637	79151
29	54232	47656	58123	64142	92755	27102	33215	17953
30	99559	91771	51621	20072	79971	26908	68670	67839

### c. Penggunaan kalkulator/computer

Penggunaan bilangan acak dapat pula ditemukan pada berbagai kalkulator yang dilengkapi dengan fungsi tersebut. Demikian halnya dengan paket computer banyak dilengkapi dengan fungsi pengambilan bilangan acak. Cara pengacakannya dijelaskan oleh masing-masing buku petunjuk dari paket yang bersangkutan.

### b) Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Berstrata

Sampling strata merupakan modifikasi dari sampling acak sederhana. Oleh karenanya sampling strata yang sering digunakan adalah sampling acak berstrata (*Stratified Random Sampling*). Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap satu kebijakan perusahaan. Dia menduga bahwa manajer tingkat atas cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Agar dapat menguji dugaannya tersebut maka sampelnya harus terdiri atas paling tidak


## TEKNIK SAMPLING

para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Dengan teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut dipilih sampel secara acak.

Pada saat menentukan jumlah sampel dalam setiap stratum, peneliti dapat menentukan secara (a) proposional, (b) tidak proposional. Yang dimaksud dengan proposional adalah jumlah sampel dalam setiap stratum sebanding dengan jumlah unsur populasi dalam stratum tersebut. Misalnya, untuk stratum manajer tingkat atas (I) terdapat 15 manajer, tingkat menengah ada 45 manajer (II), dan manajer tingkat bawah (III) ada 100 manajer. Artinya jumlah seluruh manajer adalah 160. Kalau jumlah sampel yang akan diambil seluruhnya 100 manajer, maka untuk stratum I diambil  $(15:160) \times 100 = 9$  manajer, stratum II = 28 manajer, dan stratum 3 = 63 manajer.

Jumlah dalam setiap stratum tidak proposional. Hal ini terjadi jika jumlah unsur atau elemen di salah satu atau beberapa stratum sangat sedikit. Misalnya saja, kalau dalam stratum manajer kelas atas (I) hanya ada 4 manajer, maka peneliti bisa mengambil semua manajer dalam stratum tersebut, dan untuk manajer tingkat menengah (II) ditambah 5, sedangkan manajer tingkat bawah (III), tetap 63 orang.

Untuk memperjelas gambaran tentang sampling berstrata, berikut diberikan gambaran ilustrasi yaitu:



Gambar 5.2. Ilustrasi Sampling Berstrata (*Stratified Sampling*)



## TEKNIK SAMPLING

Keterangan:

- N = populasi
- N<sub>1</sub> = Subpopulasi pertama
- N<sub>2</sub> = Subpopulasi kedua
- N<sub>L</sub> = Subpopulasi ke-L
- n = sampel
- n<sub>1</sub> = Sampel pada Subpopulasi pertama
- n<sub>2</sub> = Sampel pada Subpopulasi kedua
- n<sub>L</sub> = Sampel pada Subpopulasi ke-L

Untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling berstrata, dilakukan dua langkah, yaitu mencari ukuran sampel untuk populasi dan mencari ukuran sampel untuk masing-masing subpopulasi. Ukuran sampel dengan parameter proporsi (%) digunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{n_0}{1 + \left(\frac{n_0}{N}\right)}, \text{ dengan } n_0 = \frac{\sum W_h \cdot p_h \cdot q_h}{V}, W_h = \frac{N_h}{N}, V = \left(\frac{d}{t}\right)^2$$

Keterangan:

- n = sampel
- n<sub>0</sub> = sampel asumsi
- t = koefisien kepercayaan
- d = sampling error
- p & q = parameter proporsi binomial
- N = populasi
- N<sub>h</sub> = subpopulasi

Selanjutnya untuk mencari ukuran sampel untuk subpopulasi dengan parameter proporsi (%) digunakan rumus sebagai berikut:

$$n_h = \frac{N_h}{N} \times n$$

Keterangan:

## TEKNIK SAMPLING

$n_h$  = sampel pada populasi ke-h

$n$  = sampel

$N_h$  = subpopulasi ke-h

$N$  = populasi

Pemilihan unit-unit yang akan dijadikan unit sampel dilakukan pada masing-masing subpopulasi. Karena itu masing-masing subpopulasi memiliki kerangka sampling. Setelah kerangka sampling dibuat, unit-unit secara keseluruhan dicatat, maka langkah selanjutnya adalah seperti pada pemilihan unit sampel acak sederhana.

### c) Cluster Sampling atau Sampel Gugus

Dalam sampling cluster dikenal istilah *stage* (tahap), misalnya *one-stage* (satu tahap), *two-stage* (dua tahap), dan *multi-stage* (lebih dari dua atau tiga tahap dan seterusnya). Pada sampling cluster, populasi dibagi ke dalam sub-sub unit yang berukuran lebih kecil. Sampel tahap pertama diperoleh dari pemilihan sebagian atas unit-unit atau lebih dikenal dengan nama unit primer, dan sampel tahap kedua, diperoleh dengan pemilihan unit didalam unit primer terpilih.


Teknik cluster sampling biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak yang distratifikasikan, dimana setiap unsur dalam satu stratum memiliki karakteristik yang homogen (stratum A: laki-laki semua, stratum B: perempuan semua), maka dalam sampel gugus, setiap gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Misalnya, dalam satu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik berbeda pula. Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatnya, beda tingkat manajerialnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai terhadap suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan, maka peneliti

## TEKNIK SAMPLING

dapat menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya sampel hanya dari satu atau dua departemen saja.

Dalam cluster sampling dikenal istilah *two-stage cluster sampling*, proses sampling dilakukan dua tahap dan masing-masing tahap memperhitungkan sampling error. Setiap sub-unit dinamakan kelas dan diantara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya tidak memiliki perbedaan karakteristik populasi. Kelas-kelas umumnya didesain atas pertimbangan area penelitian.

Misalnya, area penelitian adalah kota Makassar. Disini area kota Makassar dibagi ke dalam area-area yang lebih kecil yang dinamakan kecamatan ( $N$ ) = 40; ( $n$ ) = 5; selanjutnya di dalam kecamatan terpilih area yang lebih kecil yang dinamakan kelurahan ( $M$ ) = 25; ( $m$ ) = 3. Contoh ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 5.3. Sampling Cluster Dua Tahap (*Two-Stage Cluster Sampling*)

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa tahap pertama (*one-stage*) terdiri atas 40 unit sampling primer ( $N$ ), dan 5 unit sampling primer terpilih ( $n$ ). dan pada tahap kedua (*two-stage*)

terdiri atas 25 unit sampling sekunder (M) dan 3 unit sampling sekunder terpilih (m).

**d) Systematic Sampling atau Sampel Sistematis**

Sampling sistematis agak berbeda dengan sampling acak sederhana. Unit-unit populasi di catat seluruhnya secara tersusun. Untuk seleksi unit-unit yang akan dijadikan unit sampel digunakan aturan sistematis, hanya unit pertama saja yang digunakan cara seleksi acak, untuk unit berikutnya atau unit terpilih yang kedua dan seterusnya menggunakan aturan sistematis.

Untuk menentukan ukuran sampel sistematis, prosesnya sama dengan mencari ukuran sampel acak sederhana. Tetapi dalam menentukan unit-unit sampel terdapat perbedaan dengan sampel acak sederhana. Salah satu metode untuk menentukan unit sampel pada sampel sistematis adalah dengan menggunakan metode linear (*linear systematic sampling*).

Penentuan unit sampel dengan metode linear dilakukan jika sampling intervalnya adalah bilangan bulat. Untuk menentukan sampling interval digunakan persamaan berikut:

$$\text{Sampling interval (I)} = \frac{\text{size of population}}{\text{size of sample}}$$

Misalnya:

Ukuran populasi (N) = 2000; n = 20, maka:

$$I = \frac{2000}{20} = 100 \text{ (bilangan bulat)}$$

Langkah-langkah penentuan unit sampel dengan metode linear adalah sebagai berikut:

a) Tentukan angka pilihan pertama.

Sebelum angka-angka pilihan selanjutnya, penting diperhatikan ketentuan berikut:

$$001 \leq \text{angka pilihan pertama} \leq \text{sampling interval}$$

Maka untuk contoh:  $001 \leq \text{angka pilihan pertama} \leq 100$

Angka pilihan pertama dapat ditentukan sendiri oleh peneliti misalnya, angka pilihan pertama adalah 0095

b) Untuk nomor unit pilihan kedua dan seterusnya secara berturut-turut dengan menambah bilangan interval 100, maka nomor-nomor pilihan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. 0095                 | (nomor pilihan pertama)         |
| 2. $0095 + 100 = 0195$  | (nomor pilihan kedua)           |
| 3. $0195 + 100 = 0295$  | (nomor pilihan ketiga)          |
| 4. $0295 + 100 = 0395$  | (nomor pilihan keempat)         |
| 5. $0395 + 100 = 0495$  | (nomor pilihan kelima)          |
| 6. $0495 + 100 = 0595$  | (nomor pilihan keenam)          |
| 7. $0595 + 100 = 0695$  | (nomor pilihan ketujuh)         |
| 8. $0695 + 100 = 0795$  | (nomor pilihan kedelapan)       |
| 9. $0795 + 100 = 0895$  | (nomor pilihan kesembilan)      |
| 10. $0895 + 100 = 0995$ | (nomor pilihan kesepuluh)       |
| 11. $0995 + 100 = 1095$ | (nomor pilihan kesebelas)       |
| 12. $1095 + 100 = 1195$ | (nomor pilihan keduabelas)      |
| 13. $1195 + 100 = 1295$ | (nomor pilihan ketigabelas)     |
| 14. $1295 + 100 = 1395$ | (nomor pilihan keempatbelas)    |
| 15. $1395 + 100 = 1495$ | (nomor pilihan kelimabelas)     |
| 16. $1495 + 100 = 1595$ | (nomor pilihan keenambelas)     |
| 17. $1595 + 100 = 1695$ | (nomor pilihan ketujuhbelas)    |
| 18. $1695 + 100 = 1795$ | (nomor pilihan kedelapanbelas)  |
| 19. $1795 + 100 = 1895$ | (nomor pilihan kesembilanbelas) |
| 20. $1895 + 100 = 1995$ | (nomor pilihan keduapuluh)      |

**e) Area Sampling atau Sampel Wilayah**

Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah. Misalnya, seorang marketing manajer sebuah stasiun TV ingin mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Sulawesi Selatan atas sebuah tayangan, teknik pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat. Prosedurnya :

- a. Susun *sampling frame* yang menggambarkan peta wilayah (Sulawesi Selatan) – Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa.

- b. Tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel (Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa)
- c. Tentukan berapa wilayah yang akan dijadikan sampel penelitiannya.
- d. Pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara acak atau random.
- e. Kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang harus diambil datanya, bagi lagi wilayah yang terpilih ke dalam sub wilayah.

## 2. Nonprobability/Nonrandom Sampling atau Sampel Tidak Acak

Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.

### a) Convenience Sampling atau sampel yang dipilih secara kebetulan

Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan/kebetulan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Oleh karena itu ada beberapa penulis menggunakan istilah *accidental sampling* – tidak disengaja – atau juga *captive sample* (*man-on-the-street*) Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penajakan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak (*random*). Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini, hasilnya ternyata kurang obyektif.

Beberapa contoh sampel yang dapat dikategorikan sebagai sampel kebetulan adalah:

- a. Sampel dipilih dari orang-orang yang sedang lewat di depan kampus dan ditanya pendapatnya tentang aksi tawuran yang

dilakukan oleh mahasiswa. Jadi siapa saja yang lewat pada waktu itu dan ditempat tersebut akan menjadi anggota sampel.

- b. Sampel dipilih secara sembarangan. Untuk memilih lima ekor kelinci dalam suatu kandang yang besar, maka peneliti dapat menangkap kelinci mana saja yang bisa tertangkap segera tanpa perencanaan.

### **b) Purposive Sampling atau Judgmental Sampling**

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. *Judgment Sampling* adalah Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya.

Misalnya untuk memperoleh data tentang bagaimana satu proses produksi direncanakan oleh suatu perusahaan, maka manajer produksi merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. Jadi, *judgment sampling* umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai *information rich*. Contoh lain adalah poling yang dilakukan oleh surat kabar Republika tahun 2011 tentang pendapat masyarakat mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, apakah Presiden SBY melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II karena alasan kinerja atau yang lainnya.

Dalam program pengembangan produk (*product development*), biasanya yang dijadikan sampel adalah karyawannya sendiri, dengan pertimbangan bahwa kalau karyawan sendiri tidak puas terhadap produk baru yang akan dipasarkan, maka jangan terlalu berharap pasar akan menerima produk itu dengan baik. (Cooper dan Emory, 1992).

### **c) Quota Sampling**

Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proposional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan saja. Misalnya, di sebuah kantor

terdapat pegawai laki-laki 60% dan perempuan 40%. Jika seorang peneliti ingin mewawancari 30 orang pegawai dari kedua jenis kelamin tadi maka dia harus mengambil sampel pegawai laki-laki sebanyak 18 orang sedangkan pegawai perempuan 12 orang. Sekali lagi, teknik pengambilan ketiga puluh sampel tadi tidak dilakukan secara acak, melainkan secara kebetulan saja.

Russel L. Ackoff (1953) memberikan tiga langkah dalam mendesain sampling kuota sebagai berikut:

- i. Membuat klasifikasi populasi berdasarkan karakteristik-karakteristiknya
- ii. Menentukan proporsi (%) populasi untuk masing-masing kelas atau mengestimasi komposisi populasi
- iii. Menetapkan kuota untuk masing-masing observer atau interviewer (*enumerator*).

Contoh desain sampling Kuota adalah Suatu lembaga survey "X" melakukan jajak pendapat dalam polling kandidat presiden RI pada tahun 2009. Lembaga survey "X" tersebut membuat klasifikasi populasi berdasarkan karakteristik pemilihnya, seperti jenis kelamin, usia pemilih, tingkat pendidikan, dan lain-lain sebagainya yang relevan dengan studi. Kemudian mendesain proporsi untuk masing-masing karakteristik populasi tersebut.

Sumber data yang diambil atau diacu dalam sampling kuota berbeda dengan sampling purposive. Dalam sampling kuota sumber data yang diacu adalah sumber data yang lebih akurat, seperti data sensus ataupun data kependudukan lainnya.

### **d) Snowball Sampling - Sampel Bola Salju**

Sampling bola salju adalah sebuah metode sampling yang proses pengambilan sampelnya dengan cara sambung menyambung informasi dari unit satu dengan unit yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel



pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel.

Misalnya, peneliti ingin mengetahui perilaku pecandu narkoba. Kemudian peneliti atau observer menemui salah satu pecandu narkoba, lalu dari satu pecandu narkoba diperoleh informasi pecandu narkoba lainnya, demikian seterusnya hingga makin banyak. Contoh lainnya adalah, peneliti hendak mengetahui motif pencurian buku-buku perpustakaan. Kemudian peneliti atau observer menemui satu pelaku, lalu dari satu pelaku diperoleh informasi pelaku-pelaku yang lainnya, begitu seterusnya hingga makin banyak.



### Uji Kompetensi

1. Jelaskan yang dimaksud dengan teknik sampling.
2. Apa pentingnya pemilihan sampel dalam suatu penelitian.
3. Jelaskan perbedaan mendasar antara stratified sampling dan cluster sampling serta berikan contoh.
4. Jelaskan masing-masing teknik non probability sampling serta berikan contoh aplikasi dalam bidang sosial dan pendidikan.
5. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang diajar di luar kota, pinggi kota, dan dalam kota. menurut Anda teknik sampling apa yang cocok untuk digunakan peneliti tersebut? Jelaskan alasan Anda.

## TEKNIK SAMPLING

# BAB VI

## UJI HIPOTESIS



### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep hipotesis
2. Memahami uji hipotesis rata-rata satu kelompok
3. Memahami uji hipotesis rata-rata dua kelompok
4. Memahami uji hipotesis proporsi
5. Memahami uji hipotesis variansi



### Uraian Materi

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan pengalaman hidup, dari pengalaman hidup tersebut kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Misalnya setiap kali kita ke kantor kita sering menemukan lebih banyak orang yang menggunakan angkutan umum sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa lebih banyak orang yang menggunakan angkutan umum dari pada kendaraan pribadi. Akan tetapi kesimpulan tersebut belum tentu benar karena hanya didasarkan pada apa yang kita saksikan sehari-hari. Selain itu kita juga tidak tahu seberapa banyak orang yang menggunakan angkutan umum dari pada kendaraan pribadi.

Dugaan kita bahwa ada sesuatu dibalik peristiwa yang kita saksikan biasanya disebut hipotesis. Dalam pengertian statistik, hipotesis adalah asumsi atau dugaan atau anggapan mengenai sesuatu hal yang dibuat berdasarkan teori, pengalaman atau ketajaman berfikir dan menjelaskan hal itu melalui sebuah pengecekan atau pembuktian. Untuk membuktikan bahwa asumsi

atau dugaan atau anggapan tersebut benar maka kita harus mengujinya. Langkah-langkah dalam melakukan pengujian tersebut biasa dikenal dengan pengujian hipotesis.

Hipotesis memiliki peranan yang penting dalam penelitian kuantitatif. Hal ini disebabkan karena dengan adanya hipotesis, maka arah penelitian yang akan dilakukan menjadi lebih jelas, terutama dalam membuat suatu kesimpulan. Uji hipotesis merupakan prosedur yang berisi sekumpulan aturan yang menuju kepada suatu keputusan apakah akan menolak atau tidak menolak (menerima) hipotesis nol yang telah dirumuskan. Kesimpulan pada uji hipotesis dapat saja salah kalau dikonfrontasikan kepada seluruh anggota populasi. Artinya,  $H_0$  yang ditolak pada suatu uji hipotesis, dapat saja pada populasi,  $H_0$  tersebut benar. Atau sebaliknya, pada uji hipotesis,  $H_0$  tidak ditolak, tetapi kenyataannya pada populasinya  $H_0$  tersebut salah. Kesalahan jenis pertama disebut kesalahan Tipe I dan kesalahan jenis kedua disebut kesalahan Tipe II.

### A. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik merupakan pernyataan sementara tentang satu populasi atau lebih. Dalam statistika, pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting untuk mengambil keputusan. Dengan melakukan pengujian hipotesis seorang peneliti akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menyatakan penolakan atau penerimaan terhadap hipotesis. Kebenaran hipotesis secara pasti tidak pernah diketahui kecuali jika dilakukan pengamatan terhadap seluruh anggota populasi. Untuk melakukan hal ini sangatlah tidak efisien apalagi bila ukuran populasinya sangat besar.

Penarikan sejumlah sampel acak dari suatu populasi, diamati karakteristiknya dan kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang diajukan merupakan suatu langkah melakukan uji hipotesis. Apabila sampel acak ini memberikan indikasi yang mendukung hipotesis yang diajukan maka hipotesis tersebut diterima, sedangkan bila sampel acak itu memberikan indikasi yang bertentangan dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis tersebut ditolak.

## UJI HIPOTESIS

Dalam pengujian hipotesis ada dua jenis tipe kesalahan yaitu kesalahan jenis I dan kesalahan jenis kedua. Kesalahan jenis I adalah kesalahan yang terjadi akibat menolak  $H_0$  padahal  $H_0$  benar, sedangkan kesalahan jenis II adalah kesalahan yang terjadi akibat menerima  $H_0$  padahal  $H_1$  benar. Secara ringkas tabel dari dua jenis tipe kesalahan tersebut adalah :

		$H_0$ benar	$H_0$ salah
Keputusan	Terima $H_0$	Keputusan benar	Kesalahan Tipe II
	Tolak $H_0$	Kesalahan Tipe I	Keputusan benar

Peluang terjadinya kesalahan Tipe I dilambangkan dengan  $\alpha$  dan disebut tingkat signifikansi atau tingkat kebermaknaan uji tersebut. Di sisi lain, peluang terjadinya kesalahan Tipe II dilambangkan dengan  $\beta$ . Kuantitas  $(1-\beta)$  disebut kekuatan atau daya (*power*) uji hipotesis tersebut. Pada pengujian hipotesis sangat diinginkan untuk memperoleh baik  $\alpha$  maupun  $\beta$  yang kecil.

Pada umumnya uji hipotesis dilakukan dengan melewati langkah-langkah berikut.

1. *Rumuskan  $H_0$  dan  $H_1$ .* Perhatikanlah bahwa  $H_0$  adalah negasi dari  $H_1$ , dan sebaliknya  $H_1$  adalah negasi dari  $H_0$ .
2. *Tentukan taraf signifikansi, yaitu  $\alpha$ , yang akan dipakai untuk uji hipotesis.* Besarnya  $\alpha$  yang diambil tergantung kepada urgensi penelitian yang dilakukan. Namun demikian, pada praktiknya perlu juga diingat bahwa kita tidak dapat mengambil  $\alpha$  sembarang, sebab akan berkaitan dengan pemakaian tabel statistik. Kalau di tabel tidak ada  $\alpha$  yang sesuai, maka peneliti akan mengalami kesulitan. Hanya kalau peneliti menggunakan paket program statistik untuk melakukan uji hipotesis,  $\alpha$  yang mana saja yang diambil tidak ada masalah.

## UJI HIPOTESIS

3. *Pilihlah statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.* Pemilihan statistik uji ditentukan oleh beberapa hal, misalnya ukuran sampel, diketahui atau tidaknya variansi-variansi, dan sama atau tidaknya variansi-variansi populasi.
4. *Hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data observasi (amatan) yang diperoleh dari sampel.* Penghitungan nilai statistik uji ini dapat dilakukan secara manual, namun dapat pula dengan menggunakan paket program statistik yang dewasa ini telah beredar secara luas. Beredarnya banyak paket program statistik di pasaran memudahkan peneliti untuk menganalisis datanya, karena peneliti tidak lagi disibukkan untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang kadang-kadang amat melelahkan, terutama bagi mereka yang tidak terlalu suka melihat angka-angka. Namun, penggunaan paket program statistik juga mendorong orang untuk tidak mau mempelajari prosedur uji statistik secara runtut. Akibatnya, peneliti tidak mengetahui asal usul hasil perhitungan dan kadang-kadang merasa kesulitan untuk menafsirkan hasil uji statistiknya secara cermat. Walaupun peneliti menggunakan paket program statistik, peneliti tetap harus mengetahui cara penghitungannya secara manual.
5. *Tentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan.* Penentuan nilai kritis dan daerah kritis ini mendasarkan kepada statistik uji yang dipilih dengan melihat tabel statistik yang bersesuaian. Jika digunakan paket program statistik, langkah kelima ini tidak perlu dilakukan.
6. *Tentukan keputusan uji mengenai  $H_0$ , yaitu  $H_0$  ditolak atau  $H_0$  diterima.* Penentuan keputusan ini dilakukan dengan melihat apakah nilai statistik uji amatan berada di daerah kritis atau tidak. Jika nilai statistik uji amatan berada di daerah kritis, maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika nilai statistik uji amatan tidak berada di daerah kritis, maka  $H_0$  diterima. Jika digunakan paket program statistik, penentuan apakah  $H_0$  diterima atau tidak didasarkan atas perbandingan antara tingkat signifikansi yang telah ditetapkan pada Langkah 2 dengan tingkat signifikansi amatan yang diperoleh. Tingkat signifikansi amatan (yang biasanya disajikan dengan  $p$  atau  $P$  atau Prob) ditampilkan oleh

## UJI HIPOTESIS

komputer bersama-sama dengan nilai statistik uji amatan. Jika  $p < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika  $p \geq \alpha$ , maka  $H_0$  diterima.

7. *Tuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Sebaiknya, kesimpulan dirumuskan dengan bahasa sehari-hari (bukan dalam terminologi statistik) dan koheren dengan permasalahan yang dirumuskan di awal penelitian. Banyak dijumpai kesimpulan penelitian yang masih dalam bahasa statistik, sehingga orang yang tidak memahami statistik dengan baik akan kesulitan menafsirkan kesimpulan penelitian tersebut.*

### B. Uji Hipotesis Mengenai Rata-rata Satu Kelompok

Untuk melakukan uji univariat mengenai rata-rata pada satu kelompok, biasanya digunakan statistik uji  $t$ , yang rumus statistiknya adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

Statistik uji tersebut digunakan jika diasumsikan bahwa populasinya berdistribusi normal dan variansi populasi tidak diketahui. Berikut disajikan suatu tabel uji hipotesis untuk rata-rata satu kelompok:

Hipotesis	Statistik Uji	Kriteria Keputusan
$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$	Jika $\sigma$ diketahui $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$  Jika $\sigma$ tidak diketahui $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	Jika $\sigma$ diketahui, $H_0$ ditolak jika $z < -z_{\frac{\alpha}{2}}$ atau $z > z_{\frac{\alpha}{2}}$  Jika $\sigma$ tidak diketahui, $H_0$ ditolak jika $t < -t_{\frac{\alpha}{2}; n-1}$ atau $t > t_{\frac{\alpha}{2}; n-1}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0 : \mu = \mu_0</math></li> <li><math>H_1 : \mu &gt; \mu_0</math></li> </ul>		Jika $\sigma$ diketahui, $H_0$ ditolak jika $z > z_{\alpha}$  Jika $\sigma$ tidak diketahui,

## UJI HIPOTESIS

Atau • $H_0$ : $\mu \leq \mu_0$ $H_1$ : $\mu > \mu_0$		$H_0$ ditolak jika $t > t_{\alpha; n-1}$
• $H_0$ : $\mu = \mu_0$ $H_1$ : $\mu < \mu_0$ Atau • $H_0$ : $\mu \geq \mu_0$ $H_1$ : $\mu < \mu_0$		Jika $\sigma$ diketahui, $H_0$ ditolak jika $z < -z_\alpha$ Jika $\sigma$ tidak diketahui, $H_0$ ditolak jika $t < -t_{\alpha; n-1}$

### Contoh 6.1

Untuk melihat apakah rata-rata nilai matapelajaran Matematika siswa kelas XII MA Madani lebih dari 65, secara random dari populasinya, diambil 12 siswa. Ternyata nilai-nilai keduabelas siswa tersebut adalah sebagai berikut.

51 71 76 81 67 98 58 69 87 74 79 81

Jika diambil  $\alpha = 1\%$  dan dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai-nilai di populasi normal, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut?

#### Solusi:

Dicari dulu rata-rata dan deviasi baku pada sampel.

Dari perhitungan diperoleh:  $\Sigma X = 892$ ;  $\Sigma X^2 = 68044$ , sehingga

$$\bar{X} = \frac{392}{12} = 74.333 \text{ dan } s = \sqrt{\frac{(12)(68044) - (892)^2}{(12)(11)}} = 12.572$$

Prosedur pengujian hipotesis adalah:



## UJI HIPOTESIS

a.  $H_0: \mu \leq 65$  (rata-rata nilai siswa tidak lebih dari 65)

$H_1: \mu > 65$  (rata-rata nilai siswa lebih dari 65)

b.  $\alpha = 0.01$

c. Statistik uji yang digunakan:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

d. Komputasi:

$$\begin{aligned} t_{\text{obs}} &= \frac{74.333 - 65.000}{12.572/\sqrt{12}} \\ &= \frac{9.333}{12.572/3.464} = \frac{9.333}{3.629} = 2.572 \end{aligned}$$

e. Daerah Kritis:

$$t_{0.01;11} = 2.718;$$

$$DK = \{t \mid t > 2.718\}; \text{ dan}$$

$$t_{\text{obs}} = 2.572 \notin DK$$

f. Keputusan Uji:  $H_0$  diterima.

g. Kesimpulan:

Rataan nilai Matematika kelas tiga SMU "Entah-Mana" tidak lebih daripada 65.

Jika diasumsikan variansi populasinya diketahui (atau dapat dicari atau dapat diasumsikan sama dengan nilai tertentu), maka rumus statistik ujinya adalah sebagai berikut.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

### Contoh 6.2

Seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kilogram. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Untuk itu, peneliti tersebut mengambil

## UJI HIPOTESIS

sampel berukuran 50 dan setelah diuji di laboratorium, ternyata diperoleh rata-rata daya tahan 7.8 kilogram. Jika deviasi baku populasinya sebesar 0.5 kilogram, bagaimana kesimpulan uji tersebut, jika diambil  $\alpha = 1\%$ ?

### Solusi:

Dalam kasus ini, deviasi baku populasi diketahui, yaitu sebesar 0,5, yang berarti juga variansi populasi diketahui. Oleh karena itu, digunakan uji Z.

a.  $H_0: \mu = 8$  (klaim pengusaha benar)

$H_1: \mu \neq 8$  (klaim pengusaha tidak benar)

b.  $\alpha = 0.01$

c. Statistik uji yang digunakan:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

d. Komputasi:

$$z_{\text{obs}} = \frac{7.8 - 8}{0.5 / \sqrt{50}} = \frac{-0.2}{0.5 / 7.071} = \frac{-0.2}{0.071} = -2.817$$

e. Daerah Kritis:

$$z_{0.005} = 2.575$$

$$DK = \{z \mid z < -2.575 \text{ atau } z > 2.575\}$$

$$z_{\text{obs}} = -2.817 \in DK$$

f. Keputusan Uji:  $H_0$  ditolak.

g. Kesimpulan:

Klaim pengusaha tidak benar. Malahan terlihat bahwa rata-rata ketahanan senar tersebut kurang dari 8 kilogram.

### C. Uji Hipotesis Mengenai Rata-rata Dua Kelompok

Untuk menguji apakah apakah dua populasi independen mempunyai rerata yang sama, jika variansi populasi tidak diketahui, maka digunakan uji t. Pada dasarnya ada dua jenis uji t, yaitu: dengan asumsi: (a) variansi populasi sama dan (b) variansi populasi tidak sama. Pada kedua kasus, masing-masing populasi harus berdistribusi normal. Uji homogenitas variansi dan uji normalitas populasi tersebut harus dilakukan dulu, sebelum menggunakan uji t.

Jika diasumsikan variansi populasi sama ( $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ), maka rumus uji statistiknya adalah sebagai berikut.

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{(n_1+n_2-2)}$$

dengan

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Statistik uji itu berdistribusi t dengan derajat bebas  $n_1 + n_2 - 2$  dengan  $n_1$  adalah banyaknya anggota sampel pertama dan  $n_2$  adalah banyaknya anggota sampel kedua.  $s_p^2$  adalah variansi gabungan (*pooled variance*).

Jika diasumsikan variansi populasi tidak sama ( $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ), maka rumus uji statistiknya adalah sebagai berikut.

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t(v)$$

Statistik uji itu berdistribusi t dengan derajat bebas  $v$ , yang  $v$ , dapat dicari dari formula berikut.

## UJI HIPOTESIS

$$v = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

Banyak penelitian yang membandingkan antara dua keadaan atau tepatnya dua populasi, misalnya membandingkan dua cara mengajar, daya sembuh obal dan lain-lain. Misalkan kita mempunyai dua populasi normal dengan rata-rata masing-masing  $\mu_1$  dan  $\mu_2$  sedangkan simpangan bakunya  $\sigma_1$  dan  $\sigma_2$ . Secara **independen** dari masing-masing populasi diambil sampel acak berukuran  $n_1$  dan  $n_2$  sehingga diperoleh  $\bar{x}_1, s_1$  dan  $\bar{x}_2, s_2$ . akan diuji rata-rata  $\mu_1$  dan  $\mu_2$ .

Hipotesis	Statistik Uji	Kriteria Keputusan
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	Jika $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ dan $\sigma$ diketahui $z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ Jika $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ dan $\sigma$ tidak diketahui $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ Dengan $s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$	Jika $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ dan $\sigma$ diketahui $H_0$ ditolak jika $z < -z_{\frac{\alpha}{2}}$ atau $z > z_{\frac{\alpha}{2}}$ Jika $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ dan $\sigma$ tidak diketahui atau data berpasangan $H_0$ ditolak jika $t < -t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ atau $t > t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ Jika data independen, derajat kebebasan adalah $n_1 + n_2 - 2$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0 : \mu_1 = \mu_2</math></li> <li><math>H_1 : \mu_1 &gt; \mu_2</math></li> <li>Atau</li> <li>• <math>H_0 : \mu_1 \leq</math></li> </ul>	Jika data berpasangan (dependen)	Jika $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ dan $\sigma$ diketahui $H_0$ ditolak jika $z > z_{\alpha}$ Jika $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ dan $\sigma$ tidak diketahui atau data berpasangan $H_0$ ditolak jika $t >$

## UJI HIPOTESIS

$\mu_2$ $H_1$ : $\mu_1 >$ $\mu_2$	$t = \frac{\bar{B}}{s_B / \sqrt{n}}$	$t_{\alpha; n-1}$ Jika data independen, derajat kebebasan adalah $n_1 + n_2 - 2$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0</math> :  <math>\mu_1 = \mu_2</math></li> <li><math>H_1</math> :  <math>\mu_1 &lt;</math>  <math>\mu_2</math></li> <li>Atau</li> <li>• <math>H_0</math> :  <math>\mu_1 \geq</math>  <math>\mu_2</math></li> <li><math>H_1</math> :  <math>\mu_1 &lt;</math>  <math>\mu_2</math></li> </ul>	Dengan $\bar{B}$ adalah rata-rata $x_1 - x_2$ (masing-masing data kelompok satu dikurangi kelompok dua) $s_B$ adalah simpangan baku selisish pasangan	$t_{\alpha; n-1}$ Jika $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ dan $\sigma$ diketahui $H_0$ ditolak jika $z < -z_\alpha$ Jika $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ dan $\sigma$ tidak diketahui atau data berpasangan $H_0$ ditolak jika $t < -t_{\alpha; n-1}$ Jika data independen, derajat kebebasan adalah $n_1 + n_2 - 2$

### Contoh 6.3

Seseorang ingin melihat apakah terdapat beda tinggi badan antara anak wanita dan pria pada umur 9 tahun. Data mengenai tinggi badan tersebut adalah sebagai berikut.

Wanita : 51 71 76 81 67 98 58 69 87 74 79 81

Pria : 68 72 77 79 68 80 54 63 89 74 66 86 77 73 74 87

Jika diasumsikan bahwa sampel-sampel tadi diambil dari populasi-populasi normal yang *variansi-variansinya sama* tetapi tidak diketahui dan dengan  $\alpha=5\%$ , bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? ( $\alpha$  disebut tingkat signifikansi)

### Solusi:

Setelah dihitung, diperoleh rataan dan deviasi baku sebagai berikut:

Wanita:  $\Sigma X = 892$ ;  $\Sigma X^2 = 68044$ ;  $\bar{X} = 74.333$ ;  $s = 12.572$

Pria :  $\Sigma X = 1187$ ;  $\Sigma X^2 = 89339$ ;  $\bar{X} = 74.188$ ;  $s = 9.232$

## UJI HIPOTESIS

Misalnya  $\mu_1$  adalah rata-rata tinggi anak wanita dan  $\mu_2$  adalah rata-rata tinggi anak pria.

1.  $H_0: \mu_1 = \mu_2$  (anak wanita dan pria sama tingginya)

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$  (anak wanita dan pria tidak sama tingginya)

2.  $\alpha = 0.05$

3. Statistik uji yang digunakan:

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{(n_1+n_2-2)}$$

4. Komputasi:

$$\begin{aligned} s_p^2 &= \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} \\ &= \frac{(11)(12.572)^2 + (15)(9.232)^2}{12+16-2} \\ &= \frac{3017.054}{26} = 116.041 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_p &= \sqrt{116.041} = 10.772; & t &= \\ \frac{74.333 - 74.188}{10.772 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{16}}} &= \frac{0.145}{4.113} = 0.035 \end{aligned}$$

5. Daerah Kritis:

$$t_{0.025;26} = 2.056;$$

DK =  $\{t \mid t < -2.056 \text{ atau } t > 2.056\}$ ; dan

$$t_{\text{obs}} = 0.035 \notin \text{DK}$$

6. Keputusan Uji:  $H_0$  diterima.


7. Kesimpulan: Tinggi badan anak-anak wanita dan pria sama.

Jika persoalan pada Contoh 4.3 dikerjakan dengan menggunakan SPSS, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:

## UJI HIPOTESIS

- (1) menginput data yang dipersoalkan ke dalam data editor di SPSS,
- (2) mengeksekusi data tersebut dengan memilih statistik uji yang cocok, dan
- (3) menafsirkan tampilan (*output*) dari program SPSS untuk menyimpulkan hasilnya.


Data pada Contoh 6.3, diinputkan pada data editor seperti pada Gambar 6.1.



	jk	tb	var	var
1	1	51		
2	1	71		
3	1	76		
4	1	81		
5	1	67		
6	1	98		
7	1	58		
8	1	69		
9	1	87		
10	1	74		
11	1	79		
12	1	81		
13	2	68		
14	2	72		
15	2	77		
16	2	79		
17	2	68		

Gambar 6.1

Pada Gambar 6.1, terdapat dua variabel, yaitu variabel jenis kelamin (JK) yang menyatakan jenis kelamin dan bernilai 1 (wanita) dan 2 (pria) dan variabel tinggi badan (TB) yang menyatakan tinggi badan. Pada beberapa editor, pada variabel jenis kelamin dapat diisikan nilai wanita dan pria dengan terlebih dulu mengubah data variabel jenis kelamin dari tipe numeric ke tipe string.



Gambar 6.2

## UJI HIPOTESIS

Setelah data *diinputan* ke dalam data editor seperti di atas, lalu dilakukan akses pada *main dialog* dengan memilih **Analyze** ⇒ **Compare Means** ⇒ **Independent-Samples T-Test**, seperti yang terlihat pada Gambar 2.2. Variabel *tinggi\_b* dimasukkan ke kotak **Test Variable(s)** dan variabel *jenis\_k* dimasukkan ke kotak **Grouping Variable**. Selanjutnya pada kotak **Define Groups**, Group 1 diisi dengan 1 dan Group 2 diisi dengan 2. Untuk menutup kotak **Define Group**, di-klik kotak **Continue** kemudian klik **OK**. dan hasil output SPSS adalah sebagai berikut:

**Group Statistics**

Jenis Kelamin		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Tinggi Badan	Wanita	12	74.33	12.572	3.629
	Pria	16	74.19	9.232	2.308

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-Test for Equality of Means						
		F	Sig.						95% Confidence Interval of the Difference	
				t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Tinggi Badan	Equal variances assumed	.839	.368	.035	26	.972	.146	4.114	-8.310	8.602
	Equal variances not assumed			.034	19.373	.973	.146	4.301	-8.845	9.136

Berdasarkan Tabel di atas tampak bahwa  $t = 0,035$  dengan  $p = 0,972$ . Pada SPSS,  $p$  ditunjukkan oleh kolom sig. Perhatikanlah bahwa jika hipotesisnya satu ekor, maka  $p = \frac{0,972}{2} = 0,486$ .

Jika dengan menggunakan paket program statistik, untuk memutuskan apakah  $H_0$  ditolak atau diterima (tidak ditolak), peneliti tinggal membandingkan nilai  $p$  dengan nilai  $\alpha$ . Jika  $p < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak, sedangkan jika  $p \geq \alpha$ , maka  $H_0$  tidak ditolak (diterima).

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh  $p = 0,972 > 0,05 = \alpha$ . Dengan demikian, kesimpulan uji hipotesisnya pada persoalan Contoh 6.3 adalah  $H_0$  tidak ditolak (diterima). Kesimpulannya, tinggi badan anak wanita dan anak pria sama.



**D. Uji Hipotesis mengenai Proporsi**

**1. Pengujian parameter proporsi satu populasi**

Jika suatu proporsi kejadian A dinyatakan dengan  $\pi$ , dan ada suatu informasi bahwa ada dugaan nilai proporsi tersebut adalah  $\pi_0$ , maka ada tiga pasang hipotesis yang dapat diuji sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Hipotesis	Statistik Uji	Kriteria Keputusan
<ul style="list-style-type: none"> <li><math>H_0 : \pi = \pi_0</math></li> <li><math>H_1 : \pi \neq \pi_0</math></li> </ul>	$z = \frac{\bar{x}/n - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1 - \pi_0)}{n}}}$	$H_0$ ditolak jika $z < -z_{\frac{\alpha}{2}}$ atau $z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
<ul style="list-style-type: none"> <li><math>H_0 : \pi = \pi_0</math></li> <li><math>H_1 : \pi &gt; \pi_0</math></li> </ul>		$H_0$ ditolak jika $z > z_{\alpha}$
<ul style="list-style-type: none"> <li><math>H_0 : \pi = \pi_0</math></li> <li><math>H_1 : \pi &lt; \pi_0</math></li> </ul>		$H_0$ ditolak jika $z < -z_{\alpha}$

**2. Pengujian Kesamaan Dua Proporsi**

Jika kita memiliki dua populasi dengan masing-masing terdapat proporsi kejadian A sebesar  $\pi_1$  dan  $\pi_2$ . Kemudian dari populasi pertama kita ambil sampel acak berukuran  $n_1$  dan didalamnya terdapat proporsi kejadian A sebesar  $x_1/n_1$ . Dari populasi kedua diambil secara acal sampel berukuran  $n_2$  yang memuat proporsi kejadian A sebesar  $x_2/n_2$ . Kedua sampel diambil secara bebas, maka dalam hal ini hipotesis yang dapat diuji sebagaimana dalam tabel berikut beserta dengan statistik uji dan kriteria keputusannya.

## UJI HIPOTESIS

Hipotesis	Statistik Uji	Kriteria Keputusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0 : \pi_1 = \pi_2</math></li> <li><math>H_1 : \pi_1 \neq \pi_2</math></li> </ul>	$z = \frac{x_1/n_1 - x_2/n_2}{\sqrt{pq \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$	$H_0$ ditolak jika $z < -z_{\frac{\alpha}{2}}$ atau $z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0 : \pi_1 = \pi_2</math></li> <li><math>H_1 : \pi_1 &gt; \pi_2</math></li> </ul>	Dengan $p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$ $q = 1 - p$	$H_0$ ditolak jika $z > z_{\alpha}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0 : \pi_1 = \pi_2</math></li> <li><math>H_1 : \pi_1 &lt; \pi_2</math></li> </ul>		$H_0$ ditolak jika $z < -z_{\alpha}$

### E. Uji Hipotesis Mengenai Variansi

Variansi merupakan ukuran penyebaran yang paling populer dan serign digunakan karena dapat menjelaskan mengenai penyebaran data, dapat digunakan untuk menguji hipotesis, dan menentukan sampel untuk mencapai tingkat keketelitian tertentu. Berikut akan ditunjukkan beberapa uji hipotesis yang berkaitan dengan variansi diantaranya pengujian parameter variansi satu populasi dan kesamaan dua variansi

#### 1. Pengujian parameter variansi satu populasi

Ketika menguji rata-rata untuk populasi normal, di mana simpangan baku diketahui. Harga yang diketahui diperoleh dari pengalaman, untuk menentukan besarnya perlu diadakan pengujian.

## UJI HIPOTESIS

Hipotesis	Statistik Uji	Kriteria Keputusan
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	$H_0$ ditolak jika $\chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}$ atau $\chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$ Derajat kebebasan $(n-1)$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2</math>  <math>H_1 : \sigma^2 &gt; \sigma_0^2</math></li> <li>Atau</li> <li>• <math>H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2</math>  <math>H_1 : \sigma^2 &gt; \sigma_0^2</math></li> </ul>		$H_0$ ditolak jika $\chi^2 > \chi^2_{\alpha}$ Derajat kebebasan $(n-1)$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2</math>  <math>H_1 : \sigma^2 &lt; \sigma_0^2</math></li> <li>Atau</li> <li>• <math>H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2</math>  <math>H_1 : \sigma^2 &lt; \sigma_0^2</math></li> </ul>		$H_0$ ditolak jika $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha}$ Derajat kebebasan $(n-1)$

### 3. Pengujian kesamaan dua variansi

Dalam menguji kesamaan dua rata-rata, berulang kali diperlukan informasi tentang kesamaan variansi dari dua populasi agar proses pengujian dapat dilakukan. Kalau variansi tidak sama, pengujian dilakukan dengan cara pendekatan. Sehingga dalam situasi tertentu, sebelum pengujian kesamaan rata-rata terlebih dahulu diuji kesamaan variansi. Populasi dengan variansi yang sama besar disebut populasi dengan variansi homogen, dan lawannya disebut populasi dengan variansi heterogen (Arif Tiro, 2007).

Berikut ini disajikan tabel pengujian hipotesis untuk kesamaan dua variansi:

Hipotesis	Statistik Uji	Kriteria Keputusan
$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$		$H_0$ ditolak jika $F < F_{(1-\frac{\alpha}{2}; \nu_1, \nu_2)}$ atau $F >$

## UJI HIPOTESIS

$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$	$F(\frac{\alpha}{2}; \nu_1, \nu_2)$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2</math>  <math>H_1 : \sigma_1^2 &gt; \sigma_2^2</math>                      Atau</li> <li>• <math>H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2</math>  <math>H_1 : \sigma_1^2 &gt; \sigma_2^2</math></li> </ul>	Dengan $s_1^2$ adalah variansi populasi pertama beukuran $n_1$  $s_2^2$ adalah variansi populasi kedua beukuran $n_2$	$H_0$ ditolak jika $F > F(\alpha; \nu_1, \nu_2)$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2</math>  <math>H_1 : \sigma_1^2 &lt; \sigma_2^2</math>                      Atau</li> <li>• <math>H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2</math>  <math>H_1 : \sigma_1^2 &lt; \sigma_2^2</math></li> </ul>		$H_0$ ditolak jika $F < F(1-\alpha; \nu_1, \nu_2)$

### Contoh 6.4

Sampel acak mengenai satu jenis barang telah diambil dari dua kumpulan yang dihasilkan mesin A dan B. Dari mesin A diambil 200 produk. 19 produk rusak. Dari mesin B diambil 100 produk dan 5 produk rusak. Ujilah dengan  $\alpha = 0,01$ , apakah ada **perbedaan kualitas produk yang dihasilkan mesin A dan mesin B?**

#### Solusi:

1. Hipotesis:

$$H_0 : \pi_1 = \pi_2$$

$$H_1 : \pi_1 \neq \pi_2$$

## UJI HIPOTESIS

2.  $\alpha = 0,01$

3. Statistik uji:

$$z = \frac{x_1/n_1 - x_2/n_2}{\sqrt{pq \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

dengan,

$$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

$$q = 1 - p$$

4. Komputasi

$$p = \frac{19 + 5}{200 + 100} = 0,08$$

$$q = 1 - 0,08 = 0,92$$

$$z = \frac{19/200 - 5/100}{\sqrt{0,08 \cdot 0,92 \left( \frac{1}{200} + \frac{1}{100} \right)}} = 1,3543$$

5. Kriteria Pengujian:

$$H_0 \text{ ditolak jika } z < -z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ atau } z > z_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$H_0 \text{ ditolak jika } z < -2,575 \text{ atau } z > 2,575$$

6. Keputusan Uji

Karena  $z = 1,3543 < 2,575$  maka  $H_0$  diterima atau  $\pi_1 = \pi_2$

7. Kesimpulan

Jadi belum cukup bukti bahwa ada perbedaan kualitas produk yang dihasilkan mesin A dan mesin B

### Contoh 6.5

Penelitian terhadap dua metode penimbangan menghasilkan  $s_1^2 = 25,4$  gram dan  $s_2^2 = 30,7$  gram. Penimbangan masing-masing dilakukan sebanyak 13 kali. Ada anggapan bahwa metode kesatu

## UJI HIPOTESIS

menghasilkan penimbangan dengan variabilitas lebih kecil. Benarkah hal tersebut? Ujilah dengan  $\alpha = 0,05$

### Solusi:

1. Hipotesis:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$$

2.  $\alpha = 0,05$

3. Statistik uji:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

4. Komputasi

$$F_{\text{obs}} = \frac{25,4}{30,7} = 0,83$$

5. Kriteria Pengujian:

$$H_0 \text{ ditolak jika } F_{\text{obs}} < F_{(1-\alpha; v_1, v_2)}$$

$$H_0 \text{ ditolak jika } F_{\text{obs}} < F_{(1-0,05; 12,12)}; F_{\text{tab}} = 0,37$$

6. Keputusan Uji:

$$\text{Karena } F = 0,83 > 0,37 \text{ maka } H_0 \text{ diterima atau } \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

7. Kesimpulan

Jadi tidak cukup bukti bahwa metode kesatu menghasilkan penimbangan dengan variabilitas lebih kecil.

### Contoh 6.6

Ada dua macam pengukuran kelembapan suatu zat. Cara ke I dilakukan 10 kali menghasilkan variansi 24,7 dan cara ke II dilakukan 13 kali dengan variansi 37,2. Dengan  $\alpha = 0,1$ , tentukan apakah kedua cara pengukuran memiliki variansi yang homogen?

### Solusi:

## UJI HIPOTESIS

1. Hipotesis:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

2.  $\alpha = 0,1$

3. Statistik uji:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

4. Komputasi

$$F = \frac{24,7}{37,2} = 0.664$$

5. Kriteria Pengujian

$$H_0 \text{ ditolak jika } F < F_{(1-\frac{\alpha}{2}; \nu_1, \nu_2)} \text{ atau } F > F_{(\frac{\alpha}{2}; \nu_1, \nu_2)}$$

$$H_0 \text{ ditolak jika } F < F_{(1-0,05; 9,12)} \text{ atau } F > F_{(0,05; 9,12)}$$

$$H_0 \text{ ditolak jika } F < \frac{1}{F_{(0,05;12,9)}} = \frac{1}{3,07} = 0,328 \text{ atau } F > 2,8$$

6. Keputusan Uji

Karena  $F = 0,664 > 0,328$  maka  $H_0$  diterima atau  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

7. Kesimpulan

Jadi cukup bukti bahwa variansi kedua metode homogen.

## F. Uji Hipotesis dengan Aplikasi SPSS Statistkc 20

### Contoh 6.7

Pengaruh Metode Pembelajaran terhadap Kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Diambil dua kelompok perlakuan yaitu metode pembelajaran Inkuiri dan Drill. Secara random dipilih 10 siswa untuk metode inkuiri dan 12 siswa untuk metode Drill. Skor kemampan matematis setelah diberi pembelajaran disajikan sbb:

siswa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inkuiri	9	9	9	8	8	8	7	7	7	7		

## UJI HIPOTESIS


<b>Drill</b>	9	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	5
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Uji Hipotesis berikut dengan  $\alpha = 0.05$ :

“Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode Inkuiri lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode Drill”

Langkah penyelesaiannya dengan menggunakan SPSS Statistics 20 adalah sebagai berikut:

1. Buka Program SPSS Statistics 20.
2. Klik menu Variable View kemudian definisikan variabel yang akan dianalisis yaitu metode dan kemampuan berpikir kritis matematika siswa.



The screenshot shows the SPSS Variable View window. The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Direct Marketing, Graphs, Utilities, Add-ons, Window, and Help. The toolbar contains icons for file operations, data manipulation, and analysis. The variable list table is as follows:

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align
1	metode	Numeric	8	0	Metode	{1, Inkuiri}...	None	8	Right
2	kritis	Numeric	8	2	Kemampuan B...	None	None	8	Right
3									
4									


3. Klik Data View kemudian input Data seperti contoh berikut:



## UJI HIPOTESIS


	metode	kritis	v
1	1	9,00	
2	1	9,00	
3	1	9,00	
4	1	8,00	
5	1	8,00	
6	1	8,00	
7	1	7,00	
8	1	7,00	
9	1	7,00	
10	1	7,00	
11	2	9,00	
12	2	8,00	
13	2	8,00	
14	2	8,00	
15	2	7,00	
16	2	7,00	
17	2	7,00	

4. Klik Analyze, pilih Compare Mean, klik Independent Samplet-tests sehingga muncul tampilan berikut:



## UJI HIPOTESIS

- Klik “Kritis” ke dalam kotak Test Variable(s) dan ‘Metode’ ke Grouping Variable dan klik Define Variable sehingga akan tampak seperti berikut:



- Klik Continuu lalu tekan OK dan hasilnya sebagai berikut:

Group Statistics					
	Metode	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kemampuan Berpikir Kritis	Inkuiri	10	7,9000	,87560	,27689
	Drill	12	6,7500	1,35680	,39167

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kemampuan Berpikir Kritis	Equal variances assumed	2,640	,120	2,305	20	,032	1,15000	,49887	,10937	2,19083
	Equal variances not assumed			2,398	18,956	,027	1,15000	,47966	,14590	2,15410

- Uji Asumsi Varians Sama dan Lavene's Tets for Equality Variance p value = 0,120 > 0.05 maka varians kedua kelompok homogen.
- Karena varians data homogen, maka pilih kolom Equal variances assumed
- Pada baris t-test for equality means diperoleh harga t = 2,305, db = 20 dan sig.(2 tailed) atau p-value 0,32/2 = 0.016 < 0,05.

## UJI HIPOTESIS

- Artinya  $H_0$  di tolak atau dengan kata lain bahwa Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode Inkuiri lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode Drill


### Contoh 6.8

Untuk mempelajari perbedaan hasil belajar geometri siswa sebelum dan sesudah diberi media tiga dimensi secara acak diambil 10 siswa untuk diberi pembelajaran dengan media tersebut. Skor hasil belajar geometri sebelum dan sesudah media tersebut diimplementasikan disajikan data sebagai berikut:

sebelum	6	7	5	8	7	6	6	6	8	5
sesudah	8	7	8	9	9	8	8	9	10	7


Analisis dengan SPSS adalah sebagai berikut:

1. Masukkan data pada program SPSS, kemudian lakukan langkah seperti gambar berikut:



2. Masukkan variabel Sesudah ke variabel 1 dan Sebelum ke variabel 2.

## UJI HIPOTESIS



3. Klik OK dan hasilnya sebagai berikut:

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Post Test	8,3000	10	,94868	,30000
	Pre Test	6,4000	10	1,07497	,33993

Interpretasi:

- Rata-Rata sebelum diberi perlakuan = 6,40 dengan stdev = 1,075
- Rata-Rata setelah diberi perlakuan = 8,30 dengan stdev = 0,949
- Artinya secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah diberi pembelajaran dengan media tiga dimensi.

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Post Test & Pre Test	10	,632	,050

Tabel paired sample correlation, diperoleh koefisien korelasi skor hasil belajar sebelum dan setelah diberi media sebesar 0,632 dengan angka sig.  $0,05 \leq 0,05$

## UJI HIPOTESIS

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Post Test - Pre Test	1,90000	,87560	,27689	1,27364	2,52636	6,862	9	,000

- Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai sig. (2-tailed) = 0.000/2 < 0,05 atau Ho ditolak
- Artinya ada perbedaan hasil belajar geometri siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan media tiga dimensi dalam pembelajaran.



### Uji Kompetensi

1. Menurut pendapat Anda, kapan statistik uji-t digunakan? Dan apa jelaskan persyaratannya.
2. Uraikanlah langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis.
3. Jelaskan perbedaan sampel homogen dan sampel tidak homogen.
4. Mengapa uji homogenitas varians diperlukan dalam pengujian hipotesis untuk perbandingan rata-rata dua kelompok sampel?
5. Dari hasil tes matematika standar pada suatu populasi diperoleh rata-rata 70. Seorang peneliti mencoba suatu metode baru dengan harapan bahwametode baru tereut dapat meningkatkan prestasi matematika siswa. Setelah metode baru tersebut dicobakan, secara random diambil 6 siswa. Nilai amereka setelah di tes matematika sebagai berikut:

70   71   68   80   84   53

Jika  $\alpha = 5\%$ , apakah dapat disimpulkan bahwa metode baru tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar siswa?

6. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah prestasi anak laki-laki lebih baik dari anak perempuan. Peneliti mengambil 15 anak laki-laki dan 21 anak perempuan sebagai sampel penelitian.

## UJI HIPOTESIS

setelah diberikan tes yang sama, rerata anak laki-laki adalah 75 dengan standar deviasi 12 dan rerata anak perempuan adalah 73 dengan standar deviasi 10. Jika diambil  $\alpha = 5\%$  dan mengasumsikan bahwa variansi kedua populasi sama, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut.

# BAB VII

## ANALISIS VARIANS



### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep Anava satu jalur
2. Memahami konsep Anava Dua Jalur
3. Terampil melakukan analisis data dengan Analisis Variansi secara manual dan menggunakan software.



### Uraian Materi

Analisis variansi (Anava) atau *analysis of variance* (Anova) digunakan untuk menguji hipotesis apakah  $k$  populasi mempunyai rerata sama. Analisis varians dilakukan karena adanya variasi-variasi yang muncul karena adanya beberapa perlakuan (*treatment*) untuk menyimpulkan ada atau tidaknya perbedaan rerata pada  $k$  populasi.

Jika dikaitkan dengan rancangan eksperimen, prosedur ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek beberapa perlakuan (faktor) terhadap variabel terikat. Misalnya seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh waktu mengajar terhadap prestasi belajar siswa, waktu mengajar yang dimaksud adalah pagi, siang, dan sore. Variabel bebas dalam kasus ini adalah waktu mengajar dan prestasi belajar adalah variabel terikat. Jika pada uji ini hipotesis nol diterima, maka waktu belajar memberikan efek yang sama artinya waktu belajar pada pagi, siang, dan sore menghasilkan rerata prestasi yang sama. Jika hipotesis nolnya ditolak, maka variabel waktu mengajar tidak seluruhnya memberikan efek yang sama. Karena pada eksperimen ini hanya

ada satu variabel bebas yang diselidiki, maka analisis variansi yang dipakai untuk uji hipotesis ini adalah analisis variansi satu jalur.

Jika ditambahkan suatu variabel bebas lain selain waktu belajar misalnya adalah pengaruh ukuran kelas (kelas besar dan kelas kecil) pengaruhnya terhadap prestasi belajar, maka tampak bahwa di sini ada dua variabel bebas yaitu waktu belajar dan ukuran kelas serta satu variabel terikat yaitu prestasi belajar. Untuk menganalisisnya digunakan analisis varians dua jalur. Penting untuk diketahui bahwa analisis varians dapat digunakan hanya jika setiap variabel bebas berskala nominal dan variabel terikat berskala interval.

### A. Analisis Variansi Univariante Satu Jalur

Analisis varians satu jalur untuk menganalisis data jika hanya terdapat satu variabel bebas yang berskala nominal. Misalnya variabel bebas tersebut mempunyai  $k$  nilai. Pada pelaksanaan penelitian dengan uji ini diambil  $k$  sampel dengan masing-masing sampel berukuran sama, yaitu  $n$ . masing-masing sampel diambil dari populasinya sendiri-sendiri, sehingga dalam kasus ini terdapat  $k$  populasi.

Definisi  $k$  populasi berbeda dengan populasi pada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek yang diinginkan untuk diteliti. Misalnya peneliti ingin mengetahui pengaruh waktu mengajar terhadap prestasi belajar matematika siswa-siswa SMA se Kota Makassar, maka populasi penelitian tersebut adalah seluruh siswa SMA se Kota Makassar, sehingga dalam penelitian ini hanya ada satu populasi yaitu seluruh siswa SMA se Kota Makassar. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, dengan teknik tertentu dibentuk tiga kelompok, misalnya kelompok A, B, dan C. Kelompok A diberi pelajaran Matematika di pagi hari, kelompok B diberi pelajaran matematika pada siang hari, dan kelompok C diberi pelajaran matematika pada sore hari. Dalam penelitian ini, bisa saja ketiga kelompok tersebut bersama-sama disebut sampel penelitian, sehingga konteks penelitian, terdapat satu sampel. Dalam konteks analisis varians, masing-masing kelompok merupakan sampel dari



populasinya sendiri-sendiri, sehingga pada kasus ini terdapat tiga sampel, yang berarti juga terdapat tiga populasi.

Pada analisis variansi, ada beberapa persyaratan analisis yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Setiap sampel diambil random dari populasinya.

Pengambilan sampel dari populai secara random dimaksudkan agar diperoleh sampel yang dapat mewakili populasinya. Secara probabilistic, sampel akan mewakili populasinya apabila sampel tersebut diambil secara random dari populasinya

- b) Masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya.

Independensi dimaksudkan agar perlakuan yang diberikan kepada masing-masing sampel independen antara satu dengan yang lainnya. Misalnya yang ada pada data penelitian bukanlah perlakuan tetapi klasifikasi (misalnya jenis kelamin menjadi pria dan wanita), maka masing-masing populasi berdasarkan klasifikasi tersebut harus independen satu dengan yang lain. Selain populasi harus independen, masing-masing data amatan juga harus independen di dalam kelompoknya. Artinya kesalahan yang terjadi pada satu amatan harus independen dengan kesalahan yang terjadi pada data amatan yang lain. Misalnya siswa menyontek hasil pekerjaan temannya, maka independensi data amatan tersebut tidak terpenuhi.

- c) Setiap populasi berdistribusi normal (sifat normalitas populasi).

Persyaratan normalitas populasi harus dipenuhi karena analisis variansi pada dasarnya adalah uji beda rerata, seperti halnya dengan menggunakan *t test* yang mensyaratkan normalitas populasi. Apabila masing-masing sampel berukuran besar dan diambil dari populasi yang berukuran besar. Biasanya masalah normalitas ini tidak menjadi masalah karena populasi yang berukuran besar cenderung bersitribusi normal.

Jika normalitas populasi tidak terpenuhi, peneliti dapat melakukan formasi hingga data yang baru memenuhi persyaratan normalitas populasi. Kemudian data yang baru tersebut diuji dengan analisis variansi.

## ANALISIS VARIANS

- d) Populasi-populasi mempunyai variansi yang sama (sifat homogenitas variansi populasi).

Persyaratan homogenitas variansi populasi harus terpenuhi dalam analisis variansi karena di dalam analisis variansi tersebut dihitung gabungan (*pooled variance*) dari variansi-variansi kelompok. Hal ini berkaitan dengan uji F pada analisis variansi, Apabila variansi-variansi populasi tidak sama maka uji F tidak dapat dilakukan.

Jika persyaratan homogenitas variansi populasi tidak terpenuhi, peneliti tidak diperkenankan menggunakan analisis variansi. Sebagai gantinya peneliti dapat menggunakan metode statistika nonparametric untuk melakukan analisis data.

Pada uji statistic dengan analisis variansi satu jalur, didefinisikan jumlah kuadrat antar kelompok (JKA) atau *between sum of square* ( $SS_B$ ) atau *treatment sum of squares* ( $SS_{tr}$ ), jumlah kuadrat galat (JKG) atau *within sum of squares* ( $SS_W$ ) atau *error of squares* ( $SS_{err}$ ), dan jumlah kuadrat total (JKT) atau *total sum of squares* ( $SS_T$ ), yang dedefinisikan sebagai berikut:

$$JKA = \sum_{j=1}^k n_j (\bar{X}_j - \bar{X})^2$$

$$JKG = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2$$

$$JKT = JKA + JKG = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2$$

Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan, biasanya digunakan formula berikut:

$$JKA = \sum_{j=1}^k \frac{T_j^2}{n_j} - \frac{G^2}{N}$$

$$JKG = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - \sum_{j=1}^k \frac{T_j^2}{n_j}$$

Dengan  $G$  adalah *grand total* (jumlah semua data)

Statistik uji pada analisis variansi adalah  $F = \frac{\frac{JKA}{k-1}}{\frac{JKG}{N-k}}$  dengan derajat bebas  $k - 1$  dan  $N - k$  dengan  $k$  adalah banyaknya sampel (kelompok) dan  $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ . asumsi-asumsi yang harus diuji paa analisis variansi adalah: (1) populasi-populasi berdistribusi normal (sifat normalitas populasi), dan (2) variansi-variansi populasi harus sama (sifat homogenitas variansi).

**Contoh 7.1**

Seorang guru melakukan eksperimen mengenai metode pembelajaran untuk melihat metode A, metode B, dan metode C akan memberikan efek yang sama dalam pembelajaran dan metode mana yang paling efektif. Data yang diperoleh sebagai berikut:

Metode A : 4, 7, 6, 7

Metode B : 5, 1, 3, 5, 3, 4

Metode C : 8, 6, 8, 9, 5

Jika dipilih  $\alpha$  adalah 5%, bagaimanakan kesimpulan penelitian tersebut?

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

$$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C$$

$H_1$  : paling sedikit ada dua rerata yang tidak sama

2.  $\alpha = 0.05$
3. Statistik Uji yang digunakan:

$$F = \frac{MS_B}{MS_W}$$

4. Komputasi:

$$SS_B = \frac{23^2}{4} + \frac{21^2}{6} + \frac{36^2}{5} - \frac{80^2}{15} = 464.95 - 426.667 = 38.283$$

## ANALISIS VARIANS

$$SS_W = (4^2 + 7^2 + 6^2 + \dots + 9^2 + 5^2) - \left( \frac{23^2}{4} + \frac{21^2}{6} + \frac{36^2}{5} \right) \\ = 492 - 464.95 = 27.050$$

$$F_{\text{obs}} = \frac{\frac{38.283}{2}}{\frac{27.050}{12}} = 8.49$$

### 5. Daerah Kritik

$$F_{0.05;2;12} = 3.89$$

$$DK = \{F \mid F > 3.89\} \text{ dan } F_{\text{obs}} \in DK$$

### 6. Keputusan Uji

Nikai  $F_{\text{obs}} = 8.49 > F_{\text{tabel}} = 3.89$  berarti  $H_0$  ditolak

### 7. Kesimpulan

Tidak benar bahwa ketiga metode memberikan efek yang sama.

Untuk menentukan metode mana yang paling efektif pada contoh 5.1 di atas, maka dilakukan uji *post hoc*. Misalnya dengan menggunakan metode Scheffe.

## B. Analisis Variansi Univariate Dua Jalur

Misalkan faktor A terdiri dari a klasifikasi, faktor B terdiri dari b klasifikasi, dan ukuran setiap sel adalah n. dalam tata letak data, biasanya faktor A dinyatakan dalam baris dan faktor B dinyatakan dalam kolom.

Model analisis variansi dua jalur dapat dituliskan sebagai berikut:

$$X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Dengan:

$X_{ijk}$  = data (nilai) ke - k pada baris (faktor A) ke - i dan kolom (faktor) ke - j

$\mu$  = rerata dari seluruh data

$\alpha_i$  = efek baris ke - i pada variabel terikat

## ANALISIS VARIANS

$\beta_j$  = efek kolom ke - j para variabel terikat

$(\alpha\beta)_{ij}$  = interaksi baris ke - i dan kolom ke-j pada variabel terikat

$\varepsilon_{ijk}$  = deviasi data  $X_{ijk}$  terhadap rerata populasinya ( $\mu_{ij}$ ) yang berdistribusi normal dengan rerata 0

i = 1, 2, 3, ..., a; banyaknya baris (klasifikasi faktor A)

j = 1, 2, 3, ..., b; banyaknya kolom (klasifikasi faktor B)

k = 1, 2, 3, ..., n; banyaknya data amatan pada setiap sel.

Pada model tersebut perlu diperhatikan bahwa:

$$\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0; \quad \sum_{j=1}^b \beta_j = 0$$
$$\sum_{i=1}^a (\alpha\beta)_{ij} = 0; \quad \sum_{j=1}^b (\alpha\beta)_{ij} = 0$$

### Hipotesis

Pada analisis variansi dua jalur terdapat tiga pasang hipotesis sebagai berikut:

$H_{0A}$  :  $\alpha_i = 0$  untuk setiap  $i = 1, 2, 3, \dots, a$ .

$H_{1B}$  : paling sedikit ada satu  $\alpha_i$  yang tidak nol

$H_{0B}$  :  $\beta_j = 0$  untuk setiap  $j = 1, 2, 3, \dots, b$ .

$H_{1B}$  : paling sedikit ada satu  $\beta_j$  yang tidak nol

$H_{0AB}$  :  $(\alpha\beta)_{ij} = 0$  untuk setiap  $i = 1, 2, 3, \dots, a$ , dan  $j = 1, 2, 3, \dots, b$

$H_{1AB}$  : paling sedikit ada satu  $(\alpha\beta)_{ij}$  yang tidak nol

Ketiga pasang hipotesis tersebut di atas, ekuivalen dengan hipotesis berikut:

$H_{0A}$  : Tidak ada perbedaan efek antara baris terhadap variabel terikat

## ANALISIS VARIANS

$H_{1A}$  : ada perbedaan efek antara baris terhadap variabel terikat

$H_{0B}$  : Tidak ada perbedaan efek antara kolom terhadap variabel terikat

$H_{1B}$  : ada perbedaan efek antara kolom terhadap variabel terikat

$H_{0AB}$  : Tidak ada interaksi antara baris dan kolom terhadap variabel terikat

$H_{1AB}$  : ada interaksi antara baris dan kolom terhadap variabel terikat

Pada analisis variansi univariate dua jalur, rangkuman tabel analisis variansinya (Anava) adalah sebagai berikut:

Sumber Variasi	Jumlah Kuadrat (Sum of Square)	Derajat Kebebasan
Faktor A	$JK_A = SS_A = \sum_{i=1}^a nb(\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X})^2$	$a - 1$
Faktor B	$JK_B = SS_B = \sum_{j=1}^b nb(\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X})^2$	$b - 1$
Interaksi	$JK_{AB} = SS_{AB} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b n(\bar{X}_{ij} - \bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{\cdot j} + \bar{X})^2$	$(a - 1)(b - 1)$
Galat	$JK_G = SS_{res} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (X_{ijk} - \bar{X}_{ij})^2$	$ab(n - 1)$
Total	$JK_T = SS_{tot} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (X_{ijk} - \bar{X})^2$	$abn - 1$

Untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek faktor A, statistik ujinya adalah:

## ANALISIS VARIANS

$$F_A = \frac{\frac{JK_A}{a-1}}{\frac{JK_G}{ab(n-1)}} \sim F(a-1, ab(n-1))$$

Untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek faktor B, statistik ujinya adalah:

$$F_B = \frac{\frac{JK_B}{b-1}}{\frac{JK_G}{ab(n-1)}} \sim F(b-1, ab(n-1))$$

Untuk menguji ada atau tidaknya interaksi antara faktor A dan faktor B, statistik ujinya adalah:

$$F_{AB} = \frac{\frac{JK_{AB}}{(a-1)(b-1)}}{\frac{JK_G}{ab(n-1)}} \sim F((a-1)(b-1), ab(n-1))$$

### Uji Lanjut (Post Hoc Test)

Salah satu metode untuk melakukan uji lanjut setelah melakukan analisis variansi dua jalur adalah metode Scheffe. Dalam konteks anava dua jalur, ada 4 jenis uji lanjut yaitu komparasi rerata antara: (1) baris ke - i dan baris ke - j; (2) kolom ke - i dan kolom ke - j; (3) sel ij dan sel kj (sel-sel pada kolom ke - j) dan (4) sel ij dan sel ik (sel-sel pada baris ke - i). perlu diketahui bahwa tidak ada komparasi ganda antara sel pada baris dan kolom yang tidak sama.

### Komparasi Rerata Antar Baris

Uji Scheffe untuk komparasi rerata antar baris adalah:

$$F_{i.-j.} = \frac{(\bar{X}_i. - \bar{X}_j.)^2}{RKG \left( \frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

Dengan:

$F_{i.-j.}$  = nilai  $F_{obs}$  pada perbandingan baris ke - i dan baris ke - j

$\bar{X}_i.$  = rerata pada baris ke - i

## ANALISIS VARIANS

$\bar{X}_j$  = rerata pada baris ke - j

RKG = rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi

$n_i$  = ukuran sampel baris ke - i

$n_j$  = ukuran sampel baris ke - j

Daerah kritik untuk uji tersebut adalah  $DK = \{F \mid F > (a - 1)F_{\alpha;a-1,N-pq}\}$

### Komparasi Rerata Antar kolom

Uji Schefee untuk komparasi rerata antar kolom adalah:

$$F_{i-j} = \frac{(\bar{X}_i - \bar{X}_j)^2}{RKG \left( \frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

Dengan:

$F_{i-j}$  = nilai  $F_{obs}$  pada perbandingan kolom ke - i dan kolom ke - j

$\bar{X}_i$  = rerata pada kolom ke - i

$\bar{X}_j$  = rerata pada kolom ke - j

RKG = rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi

$n_i$  = ukuran sampel kolom ke - i

$n_j$  = ukuran sampel kolom ke - j

Daerah kritik untuk uji tersebut adalah  $DK = \{F \mid F > (b - 1)F_{\alpha;b-1,N-pq}\}$

### Komparasi Rerata Antar Sel Pada Kolom yang Sama

Uji Schefee untuk komparasi rerata antar sel pada kolom yang sama adalah:



## ANALISIS VARIANS

$$F_{ij-kj} = \frac{(\bar{X}_{ij} - \bar{X}_{kj})^2}{\text{RKG} \left( \frac{1}{n_{ij}} + \frac{1}{n_{kj}} \right)}$$

Dengan:

$F_{ij-kj}$  = nilai  $F_{\text{obs}}$  pada perbandingan rerata pada sel ij dan rerata pada sel kj

$\bar{X}_{ij}$  = rerata pada sel ij

$\bar{X}_{kj}$  = rerata pada sel kj

RKG = rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi

$n_{ij}$  = ukuran sampel sel ij

$n_{kj}$  = ukuran sampel sel kj

Daerah kritik untuk uji tersebut adalah  $DK = \{F \mid F > (ab - 1)F_{\alpha, ab-1, N-pq}\}$

### Komparasi Rerata Antar Sel Pada Baris yang Sama

Uji Scheffe untuk komparasi rerata antar sel pada baris yang sama adalah:

$$F_{ij-ik} = \frac{(\bar{X}_{ij} - \bar{X}_{ik})^2}{\text{RKG} \left( \frac{1}{n_{ij}} + \frac{1}{n_{ik}} \right)}$$

Dengan:

$F_{ij-ik}$  = nilai  $F_{\text{obs}}$  pada perbandingan rerata pada sel ij dan rerata pada sel ik

$\bar{X}_{ij}$  = rerata pada sel ij

$\bar{X}_{ik}$  = rerata pada sel ik

RKG = rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi

$n_{ij}$  = ukuran sampel sel ij

$n_{ik}$  = ukuran sampel sel ik

## ANALISIS VARIANS

Daerah kritik untuk uji tersebut adalah  $DK = \{F \mid F > (ab - 1)F_{\alpha; ab-1, N-pq}\}$

### Contoh 7.2

Seorang guru melakukan penelitian untuk membandingkan efektivitas metode melalui metode diskusi dan metode ceramah. Pada saat yang bersamaan membandingkan efektivitas kelas ukuran kecil dan ukuran besar. Secara random dari populasinya, diambil empat kelas yang masing-masing beranggotakan 8 siswa sebagai sampel. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Metode Pembelajaran (A)	Ukuran Kelas (B)	
	Kecil	Besar
Diskusi	8, 8, 9, 7, 7, 7, 8, 9	6, 7, 7, 5, 7, 6, 7, 8
Ceramah	7, 6, 6, 5, 6, 8, 7, 6	9, 8, 9, 8, 8, 8, 7, 7

Dilakukan analisis variansi dan uji lanjut setelah analisis variansi (jika diperlukan) dan dengan mengambil  $\alpha = 5\%$ . Setelah dilakukan perhitungan diperoleh jumlah-jumlah kuadrat sebagai berikut:

$$JK_A (\text{metode}) = 0.031$$

$$JK_B (\text{ukuran kelas}) = 0.281$$

$$JK_{AB} (\text{interaksi}) = 16.531$$

$$JK_G (\text{galat}) = 20.626$$

$$JK_T (\text{total}) = JK_A + JK_B + JK_{AB} + JK_G$$

$$= 0.031 + 0.281 + 16.531 + 20.626 = 37.469$$

Berdasarkan jumlah-jumlah kuadrat tersebut, diperoleh tabel anava sebagai berikut:

Sumber Variasi	JK	Dk	RK	F <sub>obs</sub>	F <sub>α</sub>	Keputusan Uji
Metode (A)	0.031	1	0.031	0.042	4.20	H <sub>0A</sub> diterima

## ANALISIS VARIANS

Ukuran Kelas (B)	0.281	1	0.281	0.381	4.20	$H_{0B}$ diterima
Interaksi (AB)	16.531	1	16.531	22.430	4.20	$H_{0AB}$ diterima
Galat (G)	20.626	28	0.737			
Total (T)	37.469	31				

Karena terdapat interaksi antara metode dan ukuran kelas, maka diperlukan uji lanjut pasca anava (*post hoc tests*) untuk melihat perbandingan antara sel pada kolom yang sama atau perbandingan antara sel pada baris yang sama. Misalnya dengan metode Scheffee. Untuk melakukan uji tersebut, terlebih dahulu dihitung rerata sel tersebut sebagai berikut:

Metode	Ukuran Kelas		
	Kecil	Besar	
Diskusi	7.8750	6.6250	7.2500
Ceramah	6.3750	8.0000	7.1875
	7.1250	7.3125	

Hasil uji lanjut tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

$H_0$	$H_1$	$F_{obs}$	DK	Keputusan Uji
$\mu_{11} = \mu_{21}$	$\mu_{11} \neq \mu_{21}$	$F_{11-21} = 12.212$	$\{F \mid F > 8.85\}$	$H_0$ ditolak
$\mu_{12} = \mu_{22}$	$\mu_{12} \neq \mu_{22}$	$F_{12-22} = 10.261$	$\{F \mid F > 8.85\}$	$H_0$ ditolak
$\mu_{11} = \mu_{12}$	$\mu_{11} \neq \mu_{12}$	$F_{11-12} = 8.480$	$\{F \mid F > 8.85\}$	$H_0$ diterima
$\mu_{21} = \mu_{22}$	$\mu_{21} \neq \mu_{22}$	$F_{21-22} = 14.332$	$\{F \mid F > 8.85\}$	$H_0$ ditolak

Kesimpulan:

## ANALISIS VARIANS


1. Tanpa memperhatikan ukuran kelas, metode diskusi sama efektifnya dengan metode ceramah, tetapi pada ukuran kelas kecil, metode diskusi lebih efektif daripada metode ceramah dan pada ukuran kelas besar, metode ceramah lebih efektif daripada metode diskusi.
2. Tanpa memperhatikan metode pembelajaran, ukuran kelas kecil sama efektifnya dengan ukuran kelas besar. Tetapi khusus untuk metode ceramah, ukuran kelas besar lebih efektif dari ukuran kelas kecil.

### **C. Analisis Variansi dengan Menggunakan Paket SPSS Statistics 20**


Untuk melakukan analisis variansi data pada contoh 7.1 di atas dengan menggunakan SPSS Statistics 20 tersebut, data diinput pada data editor, seperti tampak pada gambar 7.1. Pada kolom metode, dilakukan pengkodean, misalnya metode Inquiry (A) dinyatakan dengan 1, metode Penugasan (B) dinyatakan dengan 2, dan metode Ekspositori (C) dinyatakan dengan 3. Analisis variansi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klik Analyze
2. Pilih Compare Mean
3. Pilih One-way ANOVA

## ANALISIS VARIANS




4. Pada kotak Dependent List masukkan variabel Hasil dan pada kotak Factor masukkan variabel metode




5. Klik Menu Option lalu pilih Descriptive dan Homogeneity of Variance

## ANALISIS VARIANS



6. Klik menu Post Hock dan pilih Scheffe



7. Klik Continu dan OK

Hasil SPSS Statistics 20 adalah sebagai berikut:


### Descriptives

Hasil Belajar

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Inquiry	4	6,0000	1,41421	,70711	3,7497	8,2503	4,00	7,00
Penugasa	6	3,5000	1,51658	,61914	1,9085	5,0915	1,00	5,00
Ekspositori	5	7,2000	1,64317	,73485	5,1597	9,2403	5,00	9,00
Total	15	5,4000	2,19740	,56737	4,1831	6,6169	1,00	9,00

## ANALISIS VARIANS

Berdasarkan output SPSS pada tabel Descriptive di atas, menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis matematika dengan menerapkan metode Inquiry adalah 6.00, metode Penugasan adalah 3.50, dan metode Ekspositori adalah 7.2. hal ini menunjukkan bahwa metode ekspositori memberikan rata-rata hasil belajar yang paling tinggi dibandingkan metode inkuiri dan metode penugasan. Secara visual dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 7.1. Rata-Rata Kemampuan Berpikir Kritis Siswa

### Test of Homogeneity of Variances

Hasil Belajar



Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,254	2	12	,779

Berdasarkan output SPSS pada tabel Test of Homogeneity of Variance dapat dilihat bahwa  $H_0$  mengenai homogenitas variansi diterima pada  $\alpha = 0.05$  karena nilai  $p = 0.779 > 0.05$ . artinya variansi metode inkuiri, metode penugasan, dan metode ekspositori adalah sama.

Untuk menguji apakah persyaratan normalitas populasi terpenuhi atau tidak, maka dilakukan analisis uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (uji K-S) dengan langkah-langkah sebagai berikut: Analyze  $\rightarrow$  Nonparametric Test  $\rightarrow$  1-Sample K-S, lalu masukkan variabel metode inkuiri, metode

## ANALISIS VARIANS

penugasan, metode ekspositori pada kotak Test Variables List seperti berikut:



Output SPSS adalah sebagai berikut:



## ANALISIS VARIANS

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		inkuiri	penugasan	ekspositori
N		4	6	5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	6,00	3,50	7,20
	Std. Deviation	1,414	1,517	1,643
Most Extreme Differences	Absolute	,260	,204	,287
	Positive	,240	,161	,167
	Negative	-,260	-,204	-,287
Kolmogorov-Smirnov Z		,520	,500	,641
Asymp. Sig. (2-tailed)		,949	,964	,805

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tampilan uji K-S tersebut dapat dilihat bahwa data pada sampel metode inkuiri diambil dari populasi yang bersitribusi normal karena nilai  $p = 0.949 > 0.05$ . demikian pula untuk metode penugasan ( $p = 0.964 > 0.05$ ) dan metode ekspositori ( $p = 0.805 > 0.05$ ).

Untuk mengetahui apakah metode inkuiri, metode penugasan, dan metode ekspositori memberikan efek yang berbeda terhadap prestasi belajar, maka dapat dilihat pada tabel berikut (output SPSS).

### ANOVA

Hasil Belajar

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	39,300	2	19,650	8,332	,005
Within Groups	28,300	12	2,358		
Total	67,600	14			

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dilihat bahwa  $H_0$  ditolak pada  $\alpha = 0.05$  karena nilai  $p = 0.005 < 0.05$ . hal ini menunjukkan bahwa tidak benar bahwa ketiga metode pembelajaran memberikan efek yang sama terhadap prestasi belajar.

Untuk mengetahui metode manakah yang memberikan efek yang plaing besar, maka dilakukan uji Post Hoc dengan metode Scheffee. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

## ANALISIS VARIANS

### Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil Belajar  
Scheffe

(I) Metode Pembelajaran	(J) Metode Pembelajaran	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Inquiry	Penugasa	2,50000	,99128	,078	-,2633	5,2633
	Ekspositori	-1,20000	1,03017	,526	-4,0717	1,6717
Penugasa	Inquiry	-2,50000	,99128	,078	-5,2633	,2633
	Ekspositori	-3,70000*	,92990	,006	-6,2922	-1,1078
Ekspositori	Inquiry	1,20000	1,03017	,526	-1,6717	4,0717
	Penugasa	3,70000*	,92990	,006	1,1078	6,2922

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Berdasarkan tabel perbandingan berganda di atas, tampak bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan metode ekspositori lebih baik dibandingkan dengan metode penugasan dan inkuiri.



### Uji Kompetensi

1. Menurut Anda kapan digunakan teknik analisis statistika dengan Analisis Varians? Mengapa?
2. Jelaskan perbedaan analisis varians satu jalur dengan analisis varians dua jalur.
3. Seorang peneliti melakukan eksperimen mengenai metode pembelajaran untuk melihat metode A, metode B, dan metode C akan memberikan efek yang sama dalam pembelajaran dan metode mana yang paling efektif. Data yang diperoleh sebagai berikut:

Metode A : 6, 7, 6, 7, 5, 6

Metode B : 5, 2, 3, 5, 3, 4

Metode C : 8, 6, 8, 9, 5, 7

Jika dipilih  $\alpha$  adalah 5%, bagaimanakan kesimpulan penelitian tersebut?

4. Seorang guru melakukan penelitian untuk membandingkan efektivitas metode melalui metode diskusi dan metode ceramah. Pada saat yang bersamaan membandingkan efektivitas kelas ukuran kecil dan ukuran besar. Secara random dari populasinya,

## ANALISIS VARIANS

diambil empat kelas yang masing-masing beranggotakan 8 siswa sebagai sampel. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Metode Pembelajaran (A)	Ukuran Kelas (B)	
	Kecil	Besar
Diskusi	9, 7, 9, 7, 7, 7, 8, 9	6, 7, 6, 5, 7, 6, 7, 8
Ceramah	7, 6, 6, 8, 6, 8, 7, 6	9, 8, 7, 8, 8, 8, 6, 7

Dilakukan analisis variansi dan uji lanjut setelah analisis variansi (jika diperlukan) dan dengan mengambil  $\alpha = 5\%$ . Apa kesimpulan yang dapat diperoleh dari data tersebut di atas setelah dilakukan analisis.

5. Berdasarkan soal pada nomor 3 dan nomor 4. Lakukan analisis dengan menggunakan bantuan SPSS Statistics 20. Bandingkan hasil antara jawaban no 3 dan 4 dengan output SPSS yang Anda peroleh.

## ANALISIS VARIANS

# BAB VIII

## ANALISIS REGRESI DAN KORELASI



### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep Analisis Regresi
2. Memahami konsep Analisis Korelasi
3. Terampil menganalisis data dengan teknik analisis regresi dan korelasi



### Uraian Materi

Tujuan analisis regresi adalah menentukan model statistik yang dapat dipakai untuk memperediksi nilai-nilai variabel terikat (disebut juga variabel respons/variabel dependen)  $Y$  berdasarkan nilai-nilai dari variabel bebas (variabel prediktor/variabel independen)  $X_1, X_2, \dots, X_k$ . disisi lain analisis korelasi bertujuan untuk menentukan kekuatan hubungan (*the strength of association*) antara variabel  $X_1, X_2, \dots, X_k$  dengan  $Y$ .

Analisis regresi dan korelasi yang akan dibahas pada bagian ini adalah regresi dan korelasidari variabel-variabel yang berskala interval. Artinya variabel predictor berskala interval dan juga variabel responsn berskala interval.

### A. Analisis Korelasi

Korelasi merupakan analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi/hubungan (*measures of association*). Teknik ini termasuk dalam kelompok teknik statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua

variabel. Teknik pengukuran untuk assosiasi pada era sekarang ini yang populer adalah korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Sepearman, namun pada kesempatan ini akan dibahas korelasi Pearson Product Moment. Hal ini karena, teknik tersebut termasuk dalam kelompok statistika parametric.

Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variable dengan skala pengukuran tertentu. Untuk korelasi Pearson Product Moment seorang peneliti harus menggunakan skala pengukuran interval atau rasio. Dalam korelasi tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung karena sifat hubungan independen. Artinya variabel satu tidak tergantung pada variabel lainnya.

Pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel dilihat dari seberapa besar koefisien korelasi yang diberikan dari hasil perhitungan dari rumus:

$$r_{XY} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Formula di atas disebut sebagai formula koefisien korelasi produk momen Karl Pearson. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan koefisien korelasi adalah:

1. Koefisien korelasi bernilai paling kecil -1 dan paling besar +1, atau dapat ditulis  $-1 \leq r_{XY} \leq +1$
2.  $r_{XY}$  adalah *dimensionales quantity* (kuantitas tak berdimensi), artinya  $r_{XY}$  independen terhadap satuan pengukuran X dan Y

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan dua variabel penelitian, maka diberikan kriteria sebagai berikut:

- 0 : tidak ada korelasi antara dua variabel
- > 0 - 0.25 : Korelasi sangat lemah
- > 0.25 - 0.5 : Korelasi cukup
- > 0.5 - 0.75 : Korelasi kuat
- > 0.75 - 0.99 : Korelasi sangat kuat
- 1 : Korelasi sempurna

Hal lain yang harus diperhatikan dalam korelasi selain dari kekuatan hubungan antar variabel adalah bagaimana arah hubungan itu, dalam menginterpretasikan hasil perhitungan, yang kita kenal arah korelasi berdasarkan koefisien korelasi yang diberikan. Jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel searah, artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Sedangkan, jika koefisien korelasi negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak searah, dengan kata lain jika variabel X nilainya meningkat, maka variabel Y akan turun. Dalam statistika parametric terdapat tiga jenis korelasi yang sering digunakan yaitu:

1. Korelasi Bivariat, yaitu korelasi antara satu variabel Y dengan satu variabel X.
2. Korelasi parsial, yaitu korelasi dari suatu variabel Y dengan lebih dari satu variabel X.
3. Korelasi Kanonikal, yaitu korelasi dari lebih dari satu variabel Y dengan lebih satu variabel X.

## **B. Analisis Regresi Linear Sederhana**

Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memperediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati (2006) mendefinsikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut variabel yang diterangkan (*the explained variable*) dengan satu variabel yang menerangkan (*the explanatory*). Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda.

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematik antara variabel output/dependent ( $y$ ) dengan satu variabel input/independen ( $x$ ). Hubungan matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai output ( $y$ ) berdasarkan nilai input ( $x$ ) tertentu. Dengan analisis regresi, akan diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi variabel dependen. Model linear sesungguhnya mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel

dependen dengan variabel independen. Hubungan linear ini secara matematis digambarkan dalam rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

dengan:

- a = intercept
- b = Koefisien regresi
- X = Variabel independen
- Y = Variabel dependen
- e = error/residual

### Asumsi Analisis Regresi

Dalam penggunaannya, analisis regresi senantiasa memperhatikan asumsi-asumsi yang mesti dipenuhi diantaranya:

#### Asumsi 1: Existence (eksistensi)

*Untuk sebaran nilai X yang tertentu, Y adalah variabel random dengan distribusi probabilitas tertentu yang mempunyai rerata dan variansi berhingga.*

Rerata distribusi tersebut dilambangkan dengan  $\mu_{Y|X}$  dan variansi distribusi tersebut dilambangkan dengan  $\sigma^2_{Y|X}$ . Asumsi ini berlaku untuk semua model regresi baik linear maupun tidak.

#### Asumsi 2: Independence (Independensi)

*Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya*

Asumsi 2 ini tidak dipenuhi, misalnya jika observasi yang berbeda diambil pada orang yang sama pada saat yang berbeda. Misalnya tinggi badan seseorang diukur pada waktu yang berbeda (yang jaraknya relative lama). Pada kasus yang seperti ini, data tentang tinggi badan yang pertama akan berhubungan dengan tinggi badan yang kedua.

#### Asumsi 3: Linearity (Linieritas)

*Rerata Y yaitu  $\mu_{Y|X}$  merupakan fungsi linear dari X*

Asumsi 3 mengatakan bahwa jika titik-titik yang menghubungkan rerata  $\mu_{Y|X}$  pada X yang berbeda-beda dihubungkan, maka



diperoleh sebuah garis lurus. Asumsi ini juga dapat dituliskan dalam suatu formula matematis yaitu:

$$Y = a + bX + e$$

Dengan  $e$  adalah variabel random yang mempunyai rerata nol untuk sembarang nilai  $X$  tertentu. Dengan kata lain  $\mu_{e|X} = 0$  untuk sembarang  $X$ .

**Asumsi 4: Homoscedasticity (Homoskedastisitas)**

*Varians dari Y adalah sama untuk sembarang X*

Asumsui 4 ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\sigma^2_{Y|X} = \sigma^2 \text{ untuk setiap } X$$

Jika asumsi homoskedastisitas tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa terjadi *heterescedasticity* (heteroskedastisitas).

**Asumsi 5: Normal Distribution (Berdistribusi Normal)**

*Untuk sembarang nilai X, nilai-nilai Y berdistribusi normal*

Asumsi 5 ini memberikan peluang untuk melakukan uji signifikansi hubungan antara  $X$  dan  $Y$ .

Model persamaan regresi linear sederhana

$$\hat{Y} = a + bX$$

Secara teknis nilai  $a$  dan  $b$  yang merupakan koefisien-koefisien regresi regresi dapat dicari dengan formula:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

dan

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Dengan demikian persamaan regresinya menjadi:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} + \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} X$$

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

Dapat dibuktikan bahwa:

$$b = \frac{\sum(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sum(X - \bar{X})^2}$$

dan

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = \bar{Y} - b\bar{X} + \left( \frac{\sum(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sum(X - \bar{X})^2} \right) X$$

### Contoh 8.1

Carilah persamaan regresi Y pada X dari data pada tabel berikut:

Tabel 8.1 Nilai Matematika dan Fisika

No	Mat (X)	Fis (Y)	XY	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>
1	65	70	4550	4225	4900
2	45	65	2925	2025	4225
3	65	80	5200	4225	6400
4	50	75	3750	2500	5625
5	85	90	7650	7225	8100
6	60	80	4800	3600	6400
7	75	85	6375	5625	7225
8	84	90	7560	7056	8100
9	60	75	4500	3600	5625
10	85	95	8075	7225	9025
11	80	85	6800	6400	7225
12	70	80	5600	4900	6400
Jumla h	∑X = 824	∑Y = 970	∑XY = 67785	∑X <sup>2</sup> = 58606	∑Y <sup>2</sup> = 79250

Berdasarkan tabel 6.1, diperoleh nilai a dan b sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{(970)(58606) - (824)(67785)}{(12)(58606) - (824)^2}$$

$$= \frac{992980}{24296} = 40.8701$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{(12)(67785) - (824)(970)}{(12)(58606) - (824)^2} = \frac{14140}{24296}$$

$$= 0.5819$$

Jadi persamaan regresinya adalah:

$$\hat{Y} = 40.8701 + 0.5819X$$

### Variasi Pada Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui seberapa baik variabel bebas dapat memprediksi variabel terikat, maka diperlukan beberapa ukuran variasi. Ukuran variasi pertama adalah *variasi total*, yaitu ukuran variasi nilai-nilai  $Y$  amatan di sekitar rataannya. Variasi total mengukur variabilitas nilai-nilai  $Y$  tanpa memperhatikan nilai  $X$ . Dalam variasi total ini, variabilitas  $Y$  diukur dari selisihnya terhadap  $\bar{Y}$ .

Variasi total sering pula disebut dengan jumlah kuadrat total terhadap rataannya (*total sum of square*) atau jumlah kuadrat total (JKT) yang didefinisikan sebagai berikut:

$$JKT = \sum (Y - \bar{Y})^2$$

Variasi total dapat dipartisi atau dibagi menjadi dua yaitu:

1. Variasi yang dapat dijelaskan yang disebut sebagai jumlah kuadrat karena regresi (*sum of squares due to regression*) atau disingkat dengan JKR atau SSR.
2. Variasi yang tidak dapat dijelaskandisebut sebagai jumlah kuadrat galat (*sum of square due to error*) atau disingkat dengan JKG atau SSE.

Hubungan antar JKT, JKR, dan JKG dapat dituliskan sebagai berikut:

$$JKT = \sum (Y - \bar{Y})^2 = \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2 + \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$JKT = JKR + JKG$$

Dengan:

$$JKT = \sum(Y - \bar{Y})^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$JKR = \sum(\hat{Y} - \bar{Y})^2 = b_0 (\sum Y) + b_1 (\sum XY) - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$JKG = \sum(Y - \hat{Y})^2 = \sum Y^2 - b_0 (\sum Y) - b_1 (\sum XY)$$

Jika semua titik terletak pada garis regresi, maka  $JKR = JKT$  dan  $JKG = 0$ . Sebaliknya jika semakin banyak titik yang menjauh dari garis regresi, maka  $JKG$  semakin besar. Ada dua faktor yang menyebabkan besarnya nilai  $JKG$  yaitu (1) terdapat kemungkinan variasi data, artinya  $\sigma^2$  besar, dan (2) asumsi model linear tidak cocok.

Jika model memenuhi asumsi linear, maka kemungkinan penyebab besarnya nilai  $JKG$  adalah  $\sigma^2$  yang besar. Oleh karena itu, diperlukan estimasi untuk  $\sigma^2$  dengan menggunakan  $JKG$ . Estimasi ini diperlukan untuk melakukan uji signifikansi mengenai regresi yang benar-benar linear. Estimasi untuk  $\sigma^2$  dapat ditentukan dengan formula:

$$S^2_{Y|X} = \frac{1}{n-2} (Y - \hat{Y})^2 = \frac{1}{n-2} JKG$$

Akar kuadrat dari variansi disebut kesalahan baku (Standar) taksiran atau *standard error of estimate*, sehingga kesalahan baku taksiran dirumuskan oleh formula berikut:

$$S_{Y|X} = S_{Y|X} = \sqrt{\frac{(Y - \hat{Y})^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{JKG}{n-2}}$$

### Pendekatan Analisis Variansi Pada Analisis Regresi Linear Sederhana

Kesimpulan mengenai analisis regresi, baik linear maupun tidak, dapat diperoleh dari tabel analisis variansi (*analysis of variance*) atau dikenal dengan tabel ANOVA. Untuk melakukan pendekatan analisis variansi (Anava) pada analisis regresi, digunakan jumlah kuadrat total (JKT), jumlah kuadrat karena regresi (JKR) dan jumlah kuadrat galat (JKG).

Dari ukuran jumlah kuadrat tersebut akan diperoleh rerata kuadrat (RK). Dengan JKT diperoleh RKT (rerata kuadrat total), dari JKR diperoleh RKR (rerata kuadrat karena regresi), dan dari JKG diperoleh RKG (rerata kuadrat karena galat) dengan masing-masing derajat kebebasan (*degree of freedom*) adalah  $n - 1$ ,  $1$ , dan  $n - 2$ . Rerata kuadrat dapat dihitung sebagai berikut:

$$RKR = \frac{JKR}{1} \text{ dan } RKG = \frac{JKG}{n-2}$$

Dengan statistic uji:  $F = \frac{RKR}{RKG}$  yang merupakan variabel random berdistribusi F dengan drajat kebebasan  $a$  dan  $n - 2$ .

### C. Analisis Regresi Linear Ganda

Analisis regresi linear ganda merupakan perluasan dari analisis regresi linear sederhana karena melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi linear ganda bertujuan untuk mencarhubungan linear antara satu variabel terikat (Y) dan k variabel bebas  $X_1, X_2, \dots, X_k$ . secara umum model analisis regresi ganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \dots + \beta_kX_k + e$$

Dengan  $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_k$  adalah koefisien regresi yang akan diestimasi. Variabel  $X_1, X_2, \dots, X_k$  merupakan variabel bebas.

#### Asumsi-Asumsi Pada Regresi Linear Ganda

##### Asumsi 1: Existence (Eksistensi)

*Untuk setiap nilai kombinasi spesifik dari variabel independen  $X_1, X_2, \dots, X_k$ , Y adalah variabel random univariat dengan distribusi probabilitas tertentu yang mempunyai rerata dan variansi berhingga*

##### Asumsi 2: Independence (Independensi)

*Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya*

##### Asumsi 3: Linearity (Linieritas)

*Rerata Y untuk setiap kombinasi dari variabel independen  $X_1, X_2, \dots, X_k$  merupakan fungsi linear dari  $X_1, X_2, \dots, X_k$ . ini berarti bahwa:*

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

$$\mu_{Y|X_1, X_2, \dots, X_k} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k$$

Atau

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + e$$

Dengan  $e$  adalah error yang menyatakan selisih antara respon amatan dengan respon  $\mu_{Y|X_1, X_2, \dots, X_k}$

### Asumsi 4: Homoscedasticity (homoskedastisitas)

Variansi dari  $Y$  adalah sama untuk setiap kombinasi tertentu dari  $X_1, X_2, \dots, X_k$  yang berarti:

$$\sigma^2_{Y|X_1, X_2, \dots, X_k} = \text{var}(Y|X_1, X_2, \dots, X_k) = \sigma^2$$

Atau

$$\sigma^2_{E|X_1, X_2, \dots, X_k} = \sigma^2$$

### Asumsi 5: Normal Distribution (Distribusi Norma)

Untuk sembarang kombinasi tertentu dari  $X_1, X_2, \dots, X_k$ , nilai-nilai  $Y$  berdistribusi normal.

Atau

$Y \sim N(\mu_{Y|X_1, X_2, \dots, X_k}, \sigma^2)$  yang ekuivalen dengan  $E \sim N(0, \sigma^2)$ .

### Menentukan Persamaan Regresi Linear Ganda

Salah satu cara untuk mencari persamaan regresi linear ganda dengan dua predictor (variabel bebas)  $X_1$  dan  $X_2$  adalah sebagai berikut:

Misalnya persamaan regresi dengan dua variabel bebas adalah:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dengan metode kuadrat terkecil, koefisien  $b_0, b_1,$  dan  $b_2$  dapat dicari dengan 3 variabel berikut:

$$\begin{array}{rclcl} nb_0 & + & b_1 \sum X_1 & + & b_2 \sum X_2 & = & \sum Y \\ b_0 \sum X_1 & + & b_1 \sum X_1^2 & + & b_2 \sum X_1 X_2 & = & \sum X_1 Y \\ b_0 \sum X_2 & + & b_1 \sum X_1 X_2 & + & b_2 \sum X_2^2 & = & \sum X_2 Y \end{array}$$

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

Konstanta  $b_0$ ,  $b_1$ , dan  $b_2$  dapat dicari dengan metode substitusi dan eliminasi, dengan invers matriks, atau dengan cara lain dari sistem persamaan linear.

### Contoh 8.2

Diketahui data sebagai berikut:

<b>X1</b>	6	7	5	6	7	8	7	5	7	6	5	6
<b>X2</b>	6	8	7	9	7	8	7	8	9	7	8	8
<b>Y</b>	7	8	6	7	9	8	7	8	8	7	9	8

untuk mencari persamaan regresinya dapat dilakukan dengan cara berikut:

Tabel 8.2. Tabel Kerja untuk mencari persamaan regresi

NO	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub>	X <sub>1</sub> Y	X <sub>2</sub> Y	X <sub>1</sub> <sup>2</sup>	X <sub>2</sub> <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>
1	6	6	7	36	42	42	36	36	49
2	7	8	8	56	56	64	49	64	64
3	5	7	6	35	30	42	25	49	36
4	6	8	7	48	42	56	36	64	49
5	7	7	9	49	63	63	49	49	81
6	8	8	8	64	64	64	64	64	64
7	7	7	7	49	49	49	49	49	49
8	5	7	8	35	40	56	25	49	64
9	7	8	8	56	56	64	49	64	64
10	6	7	7	42	42	49	36	49	49
11	5	6	9	30	45	54	25	36	81
12	6	8	8	48	48	64	36	64	64
Jumlah	75	87	92	548	577	667	479	637	714

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

Berdasarkan tabel 6.2 di atas, diperoleh:

$\Sigma X_1$	$= 75$	$\Sigma X_2$	$= 87$	$\Sigma Y$	$= 92$
$\Sigma X_1 X_2$	$= 546$	$\Sigma X_1 Y$	$= 577$	$\Sigma X_2 Y$	$= 667$
$\Sigma X_1^2$	$= 479$	$\Sigma X_2^2$	$= 637$	$\Sigma Y^2$	$= 714$

Dari nilai-nilai di atas, diperoleh:

$$\begin{aligned} 12b_0 + 75b_1 + 87b_2 &= 92 \\ 75b_0 + 479b_1 + 546b_2 &= 577 \\ 87b_0 + 546b_1 + 637b_2 &= 667 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan eliminasi atau substitusi, diperoleh nilai  $b_0 = 7.308$ ,  $b_1 = 0.272$ , dan  $b_2 = -0.185$ , sehingga persamaan regresinya adalah  $Y = 7.308 + 0.272X_1 - 0.185X_2$ .

Untuk lebih memudahkan dalam menyelesaikan system persamaan linear di atas, maka perlu melibatkan deviasi dari masing-masing variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Y$ . masing-masing deviasi dari variabel tersebut adalah:

$$\begin{aligned} x_1 &= X_1 - \bar{X}_1 \\ x_2 &= X_2 - \bar{X}_2 \\ Y &= Y - \bar{Y} \end{aligned}$$

Seperti halnya dengan regresi linear sederhana, regresi linear ganda juga melalui centroidnya, sehingga memenuhi:

$$\bar{Y} = b_0 + b_1\bar{X}_1 + b_2\bar{X}_2$$

Kemudian dicari nilai  $b_0$  dengan cara:

$$b_0 = \bar{Y} - b_1\bar{X}_1 - b_2\bar{X}_2$$

Nilai  $b_1$  dan  $b_2$  dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{(\Sigma x_2^2)(\Sigma x_1 y) - (\Sigma x_1 x_2)(\Sigma x_2 y)}{(\Sigma x_1^2)(\Sigma x_2^2) - (\Sigma x_1 x_2)^2} \\ b_2 &= \frac{(\Sigma x_1^2)(\Sigma x_2 y) - (\Sigma x_1 x_2)(\Sigma x_1 y)}{(\Sigma x_1^2)(\Sigma x_2^2) - (\Sigma x_1 x_2)^2} \end{aligned}$$



## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

Nilai jumlah kuadrat deviasi untuk masing-masing besaran dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\sum x^2 = \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n} \quad \text{dan}$$

$$\sum x_1x_2 = \sum X_1X_2 - \frac{(\sum X_1)(\sum X_2)}{n}$$

### Contoh 8.3

Tentukan persamaan regresi linear data berikut:

<b>X1</b>	5	4	7	6	4	6	7	5	6	8	6	4
<b>X2</b>	5	5	8	6	5	5	5	4	7	7	5	7
<b>Y</b>	6	5	8	6	5	6	6	5	7	8	6	5

Berdasarkan data di atas diperoleh:

$$\begin{array}{llll} \sum X_1 & = 68 & \sum X_2 & = 69 & \sum Y & = 73 \\ \sum X_1X_2 & = 398 & \sum X_1Y & = 427 & \sum X_2Y & = 430 \\ \sum X_1^2 & = 404 & \sum X_2^2 & = 413 & \sum Y^2 & = 457 \end{array}$$

Dari nilai-nilai tersebut, akan diperoleh:

$$\bar{X}_1 = 5.667 ; \bar{X}_2 = 5.750 ; \bar{Y} = 6.083$$

$$\sum x_1^2 = 404 - \frac{68^2}{12} = 404 - 385.333 = 18.667$$

$$\sum x_2^2 = 413 - \frac{69^2}{12} = 413 - 396.750 = 16.250$$

$$\sum x_1x_2 = 398 - \frac{(68)(73)}{12} = 398 - 391 = 7$$

$$\sum x_1y = 427 - \frac{(68)(73)}{12} = 427 - 413 = 13.333$$

$$\sum x_2y = 430 - \frac{(69)(73)}{12} = 430 - 419.750 = 10.250$$

Dengan demikian nilai  $b_0$ ,  $b_1$ , dan  $b_2$  dapat dihitung sebagai berikut:

$$b_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1y) - (2.25)(\sum x_2y)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1x_2)^2}$$

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

$$b_1 = \frac{(16.250)(13.333) - (7)(10.250)}{(18.667)(16.250) - (7)^2} = \frac{144.91125}{254.33875} = 0.570$$

$$b_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (2.25)^2}$$

$$b_1 = \frac{(18.667)(10.250) - (7)(13.333)}{(18.667)(16.250) - (7)^2} = \frac{98.00575}{254.33875} = 0.385$$

$$b_0 = \bar{Y} - b_1 \bar{X}_1 - b_2 \bar{X}_2$$

$$b_0 = 6.083 - (0.570)(5.667) - (0.385)(5.750) = 0.639$$

Jadi persamaan regresinya adalah  $\hat{Y} = 0.639 + 0.570X_1 + 0.385X_2$

### Pendekatan Anava pada Regresi Linear Ganda

Seperti halnya pada regresi linear sederhana, pada analisis regresi linear ganda didefinisikan JKT, JKR, dan JKG masing-masing sebagai berikut:

$$JKT = \sum (Y - \bar{Y})^2 = \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2 + \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$JKT = JKR + JKG$$

Dengan:

$$JKT = \sum (Y - \bar{Y})^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}, \text{ dengan } dkT = n - 1$$

$$JKR = \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2 = b_1 \sum x_{1y} + b_2 \sum x_{2y} + b_3 \sum x_{3y} + \dots + b_k \sum x_{ky} \text{ dengan } dkR = k$$

$$JKG = JKT - JKR \text{ dengan } dkG = n - k - 1$$

$$\text{Perlu diketahui bahwa } \sum x_i y = \sum x_i Y - \frac{(\sum x_i)(\sum Y)}{n}$$

Kesalahan baku taksiran pada regresi linear ganda dapat ditentukan dengan formula berikut:

$$S_{Y|X_1, X_2, X_3, \dots, X_k} = \sqrt{\frac{(Y - \hat{Y})^2}{n - k - 1}} = \sqrt{\frac{JKG}{n - k - 1}}$$

Sedangkan kesalahan baku koefisien regresi ganda dengan dua variabel bebas misalnya  $X_1$  dan  $X_2$  dapat dituliskan dalam formula berikut:

$$s_{\hat{\beta}_i} = \sqrt{\frac{s_{Y|X_1, X_2}^2}{(\sum X_i^2)(1 - r_{12}^2)}}$$

Dengan  $r_{12}$  adalah koefisien korelasi antara  $X_1$  dan  $X_2$

#### D. Pemilihan Model Terbaik

Salah satu tujuan di dalam analisis regresi adalah untuk mendapatkan model terbaik yang menjelaskan hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*, model terbaik adalah model yang seluruh koefisien regresinya berarti (*significant*) dan mempunyai kriteria model terbaik optimum. Beberapa kriteria model terbaik adalah :

Nomor	Kriteria	Formula	Optimum
1	SSE	$\sum (Y - \hat{Y})^2$	Minimum
2	MSE	$\sum (Y - \hat{Y})^2 / (n - p - 1)$	Minimum
3	$R^2$	$\frac{\sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2}{\sum (Y - \bar{Y})^2} 100\%$	Maksimum
4	Adjusted $R^2$	$1 - [1 - R^2] \frac{(n - 1)}{(n - p)}$	Maksimum
5	$C_p$ Mallow	$\frac{SSE}{MSE} - (n - 2p)$	Minimum
6	AIC	$\ln(SSE/n) + 2p/n$	Minimum
7	SBC	$\ln(SSE/n) + p/n \ln(n)$	Minimum

Untuk memperoleh model terbaik, ada beberapa metode yang biasa digunakan yaitu :

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

<b>Metode</b>	<b>Penjelasan</b>
<i>Backward</i>	Mulai dengan model lengkap, kemudian variabel <i>independent</i> yang ada dievaluasi, jika ada yang tidak <i>significant</i> dikeluarkan yang paling tidak <i>significant</i> , dilakukan terus menerus sampai tidak ada lagi variabel <i>independent</i> yang tidak <i>significant</i>
<i>Forward</i>	Variabel <i>independent</i> yang pertama kali masuk ke dalam model adalah variabel yang mempunyai korelasi tertinggi dan <i>significant</i> dengan variabel <i>dependent</i> , variabel yang masuk kedua adalah variabel yang korelasinya dengan variabel <i>dependent</i> adalah tertinggi kedua dan masih <i>significant</i> , dilakukan terus menerus sampai tidak ada lagi variabel <i>independent</i> yang <i>significant</i>
<i>StepSwise</i>	Gabungan antara metode <i>forward</i> dan <i>backward</i> , variabel yang pertama kali masuk adalah variabel yang korelasinya tertinggi dan <i>significant</i> dengan variabel <i>dependent</i> , variabel yang masuk kedua adalah variabel yang korelasi parsialnya tertinggi dan masih <i>significant</i> , setelah variabel tertentu masuk ke dalam model maka variabel lain yang ada di dalam model dievaluasi, jika ada variabel yang tidak <i>significant</i> maka variabel tersebut dikeluarkan
<i>Best subset regression</i>	Metode ini tersedia di dalam program paket MINITAB. Metode ini menyajikan k buah model terbaik untuk model dengan $1, 2, \dots, p$ variabel <i>independent</i> .

### E. Contoh Analisis Korelasi dan Regresi dengan SPSS Statistics 20

#### Kasus 1:

Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kemampuan matematika terhadap pemahaman fisika. Kemudian dikumpulkan data dan disajikan pada tabel berikut:

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

No	Matematika	Fisika
1	65	70
2	45	65
3	65	80
4	50	75
5	85	90
6	60	80
7	75	85
8	84	90
9	60	75
10	85	95
11	80	85
12	70	80

Untuk menyelesaikan masalah ini, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan yaitu:

### Tahap I: Merumuskan Masalah

- Apakah ada hubungan antara hasil tes matematika dengan nilai fisika siswa?
- Berapa besar hubungan antara hasil tes matematika dengan nilai fisika siswa?


### Tahap II: Membuat desain Variabel

Untuk membuat desain variabel, masuk ke perintah **Variable view**. Desain variabel sebagai berikut:

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	mat	Numeric	8	2	Matematika	None	None	8	Right	Scale	Input
2	fis	Numeric	8	2	Fisika	None	None	8	Right	Scale	Input
3											

### Tahap III : Memasukkan data ke SPSS

Untuk memasukkan data, masuk ke perintah **Data View**. Setelah Itu memasukkan data variabel tes matematika dengan nilai fisika, seperti berikut:



The screenshot shows the SPSS Data Editor interface. The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, and Analyze. Below the menu bar is a toolbar with icons for opening files, saving, printing, and navigating between views. The main window displays a data table with the following data:

	mat	fis	va
1	65,00	70,00	
2	45,00	65,00	
3	65,00	80,00	
4	50,00	75,00	
5	85,00	90,00	
6	60,00	80,00	
7	75,00	85,00	
8	84,00	90,00	
9	60,00	75,00	
10	85,00	95,00	
11	80,00	85,00	
12	70,00	80,00	
13			

### Tahap IV: Menganalisis Data di SPSS


Untuk melakukan analisis, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klik Analysis\Correlate\Bivariate.
2. Masukkan variabel nilai Kalkulus dan skor psiko test dalam kolom **Variable**.
3. **Correlation Coefficient**: pilih **Pearson**.
4. **Test of Significance** : pilih **Two Tailed**.
5. Cek **Flag Significant correlation**.
6. Option: Missing Values, pilih: **Exclude cases pairwise**, tekan **Continue**


## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

7. Klik OK untuk diproses.


Perhatikan tampilan berikut:



Kemudian tampil:



## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI



Hasil setelah diproses:

### Correlations

		Matematika	Fisika
Matematika	Pearson Correlation	1	,903**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	12	12
Fisika	Pearson Correlation	,903**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	12	12

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Tahap V: Interpretasi Hasil Analisis

Jika dilihat dari hasil perhitungan maka korelasi antara variabel skor matematika dengan fisika adalah 0,903, dari criteria yang ada hubungan tersebut berada pada kategori sangat kuat. Untuk mengetahui apakah angka korelasi tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis:

$H_0$  : tidak ada hubungan antara variabel tes matematika dengan fisika

$H_1$  : ada hubungan antara variabel tes matematika dengan fisika

Criteria pengujian:




$H_0$  ditolak jika  $p < 0.05$ , artinya ada hubungan antara variabel tes matematika dengan fisika

Dari hasil perhitungan diperoleh  $p = 0.000$ , hal ini menunjukkan bahwa  $p < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  variabel skor matematika dengan variabel nilai fisika mempunyai hubungan dan searah, dan memiliki kekuatan hubungan yang sangat kuat.

## Kasus II: Regresi Linear Sederhana

Dengan menggunakan data pada kasus 1 di atas untuk melakukan teknik analisis regresi linear sederhana, maka tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS sebagai berikut:

1. Untuk memasukkan data, masuk ke perintah **Data View**. Setelah itu memasukkan data variabel tes matematika dengan nilai fisika, seperti berikut:




	mat	fis	va
1	65,00	70,00	
2	45,00	65,00	
3	65,00	80,00	
4	50,00	75,00	
5	85,00	90,00	
6	60,00	80,00	
7	75,00	85,00	
8	84,00	90,00	
9	60,00	75,00	
10	85,00	95,00	
11	80,00	85,00	
12	70,00	80,00	
13			

2. Menganalisis Data di SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI


- a. Klik **Analysis\Regression\Linear...**
- b. Masukkan variabel jumlah produk terjual dalam kolom **Dependent**.
- c. Masukkan variabel jumlah biaya promosi dalam kolom **Independent**.
- d. Klik **Statistics**: pilih **Durbin-Watson** dan **Descriptive**, tekan **Continue**
- e. Klik **Plot**: pilih **Histogram** dan **Normal Probability plot**, tekan **Continue**
- f. Masukkan variabel **Sdresid** ke kolom Y dan **Zpred** ke kolom X
- g. Klik **Save** pilih: **Residual/Standardized**, tekan **Continue**
- h. Klik **OK** untuk diproses.

Perhatikan tampilan berikut:



## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

Kemudian tampil:



Hasil setelah diproses:

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Fisika	80,8333	8,74729	12
Matematika	68,6667	13,56689	12

Interpretasi:

Statistik deskriptif menggambarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel dependen dan variabel independen. Rata-rata hasil tes Fisika adalah 80,83 dengan standar deviasi sebesar 8,75. Rata-rata tes Matematika adalah 68,667 dengan standar deviasi sebesar 13,57.

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

### Correlations

		Fisika	Matematika
Pearson Correlation	Fisika	1,000	,903
	Matematika	,903	1,000
Sig. (1-tailed)	Fisika	.	,000
	Matematika	,000	.
N	Fisika	12	12
	Matematika	12	12

Interpreasi:

Tabel korelasi di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi antara nilai matematika dengan nilai Fisika sebesar 0,903 atau berkorelasi positif. Artinya semakin tinggi nilai matematika siswa ada kecenderungan nilai Fisika juga akan meningkat. Sementara nilai p-value sebesar  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara nilai tes Matematika dan Nilai Fisika siswa.

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	40,870	6,132		6,665	,000	
	Matematika	,582	,088	,903	6,633	,000	1,000

a. Dependent Variable: Fisika

Dari tabel Coefficient di atas, tampak bahwa nilai konstanta  $b_0 = 40,870$ , koefisien regresi  $b_1 = 0,582$ . Dengan demikian persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\hat{Y} = 40,870 + 0,582X$$

Dari hasil analisis diperoleh nilai  $t_{hit} = 6,633$  dengan nilai sig.  $0.000 < 0.05$ . dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan matematika siswa berpengaruh positif terhadap kemampuan Fisikan siswa.

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	685,777	1	685,777	43,991	,000 <sup>b</sup>
	Residual	155,890	10	15,589		
	Total	841,667	11			

a. Dependent Variable: Fisika

b. Predictors: (Constant), Matematika

Tabel Anova di atas dapat digunakan untuk melakukan uji signifikansi persamaan regresi. Berdasarkan tabel diperoleh nilai  $F_{hit} = 43,991$  dengan nilai  $sig. = 0,000 < 0,05$  yang berarti kemampuan matematika siswa berpengaruh terhadap kemampuan Fisika siswa.

**Model Summary<sup>b</sup>**



Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,903 <sup>a</sup>	,815	,796	3,94829	1,376

a. Predictors: (Constant), Matematika

b. Dependent Variable: Fisika

Uji signifikansi koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel Model Summary di atas. Pada tabel tampak bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,903. Koefisien determinasi terlihat pada nilai R square yaitu sebesar 0,815. Hal ini berarti bahwa sekitar 81,5% variabel kemampuan matematika mempengaruhi kemampuan Fisika siswa.

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI



Pengujian asumsi normalitas dapat dilihat dari P-P Plot. Apabila setiap pencarian data residual berada di sekitar garis lurus melintang, maka dikatakan bahwa residual mengikuti fungsi distribusi normal. Dari hasil grafik normal P-P Plot, diketahui bahwa pencarian residual berada pada garis lurus melintang, maka dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal.



**Uji Kompetensi**

1. Jelaskan tujuan utama analisis regresi dan analisis korelas.
2. Jelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear.
3. Diberikan data sebagai berikut:

<b>No</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>X</b>	60	55	65	50	85	60	75	84	60	85	80	80
<b>Y</b>	75	65	80	75	90	75	85	95	75	95	85	80

- a. Hitunglah nilai korelasi antara variabel X dengan variabel Y
- b. Interpretasikan hasil yang Anda peroleh
4. Diberikan data tentang Tingkat Kecemasan (X) dan Hasil tes Matematika (Y) sebagai berikut:

<b>Y</b>	8	9	7	7	9	8	8	6	9	6
<b>X</b>	4	6	5	7	6	7	7	5	10	9

- a. Tentukan persamaan regresinya
- b. Lakukan pengujian apakah regresi linear dan signifikan pada  $\alpha = 0,05$
- c. Hitung koefisien korelasi dan uji signifikansinya
5. Tentukan persamaan regresi data berikut:

<b>X1</b>	6	7	5	6	7	8	7	5	7	6	5	6
<b>X2</b>	6	8	7	9	7	8	7	8	9	7	8	8
<b>Y</b>	7	8	6	7	9	8	7	8	8	7	9	8

Kemudian uji:

- a. Signifikansi regresi ganda
- b. Hitung dan uji signifikansi korelasi Y atas X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>
- c. Hitung koefisien determinasi Y dengan X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>

## ANALISIS REGRESI DAN KOLERASI



# BAB IX

## STATISTIKA NONPARAMETRIK



### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami cara pengujian dengan analisis Chi-Square
2. Memahami cara pengujian dengan analisis uji tanda (sign test)
3. Memahami cara pengujian dengan analisis uji Wilcoxon
4. Memahami cara pengujian dengan analisis uji Cochran



### Uraian Materi

Dalam inferensi statistik, persoalan yang muncul adalah bagaimana menarik kesimpulan tentang sejumlah peristiwa berdasarkan pengamatan terhadap sebagian dari suatu peristiwa. Statistik menyediakan alat-alat untuk menformalkan dan menstandarkan prosedur-prosedur untuk menarik suatu kesimpulan. Prosedur-prosedur inferensi statistik memperkenalkan langkah-langkah untuk mengambil suatu kesimpulan berdasarkan fakta yang disajikan pada sampel.

Dalam perkembangan metode-metode statistik modern, teknik-teknik inferensi yang pertama muncul adalah teknik-teknik yang membuat sejumlah besar asumsi mengenai sifat populasi darimana skor-skor diperoleh yang kemudian dikenal dengan istilah statistik parametric. Namun demikian ada teknik-teknik statistik yang tidak ketat memperhatikan asumsi-asumsi mengenai populasi yang kemudian dikenal dengan istilah teknik statistik nonparametric. Beberapa teknik statistik nonparametric yaitu tes binomial, tes chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Run Tes, McNemar,

Wilcoxon, Walsh, Q Cochran, tes medan, U Mann-Withney, dan Kruskal-Wallis. Namun demikian pada bagian ini tidak semua dari uji statistic nonparametric tersebut dijelaskan.

### A. Uji Chi-Square

Dalam statistika nonparametrik, uji chi-square dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel dan juga menguji hipotesis komparatif dua sampel independen. Berikut akan diuraikan teknik pengujian hipotesis dengan menggunakan uji chi-square.

#### 1. Uji Hipotesis Deskriptif untuk satu sampel

Sering Terjadi penelitian dijalankan untuk mengetahui banyak subyek, obyek, jawaban respon, yang terdapat dalam berbagai kategori. Misalnya sekelompok anak-anak yang diklasifikasikan menurut cara bermain yang sering mereka lakukan, untuk menguji hipotesis bahwa frekuensi cara-cara permainan yang satu berbeda dengan frekuensi cara bermain yang lainnya.

Chi-square ( $\chi^2$ ) satu sampel, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas, data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Yang dimaksud dengan hipotesis deskriptif adalah estimasi terhadap ada tidaknya perbedaan frekuensi antara kategori satu dan kategori lain dalam sebuah sampel tentang sesuatu hal.

Persamaan dari uji Chi-Square adalah:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_0 - f_h)^2}{f_h}$$

Dimana:

$\chi^2$  = chi-square

$f_0$  = frekuensi yang diobservasi

$f_h$  = frekuensi yang diharapkan

Berikut diberikan suatu contoh penggunaan uji chi-square untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel yang terdiri atas dua kategori/kelas beserta langkah-langkahnya:

**Contoh 9.1**

Perusahaan cat mobil ingin tahu warna cat yang harus diproduksi lebih banyak. Berdasar pengamatan di jalan utama terhadap mobil pribadi ditemui data 1000 warna biru, 900 merah, 600 putih, 500 warna lain. Buat hipotesis yang tepat untuk kasus tersebut dan ujilah hipotesis anda pada taraf signifikansi 5%.

**Solusi:**

a. Hipotesis:

$H_0$  : Jumlah masyarakat yang memilih empat warna mobil tidak berbeda (peluang empat warna cat untuk dipilih masyarakat adalah sama atau  $p_1 = p_2 = p_3 = p_4$ )

$H_a$  : Jumlah masyarakat yang memilih empat warna mobil berbeda (peluang empat warna cat untuk dipilih masyarakat adalah tidak sama atau  $p_1 \neq p_2 \neq p_3 \neq p_4$ )

b. Tingkat Signifikansi =  $\alpha = 5\% = 0.05$

c. Komputasi:

Rumus Chi-Square adalah:

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(F_o - F_h)^2}{F_h}$$

No	Warna	Frek Observasi (F <sub>o</sub> )	Frek Harapan (F <sub>h</sub> )	F <sub>o</sub> - F <sub>h</sub>	(F <sub>o</sub> - F <sub>h</sub> ) <sup>2</sup>	(F <sub>o</sub> - F <sub>h</sub> ) <sup>2</sup> /F <sub>h</sub> <sup>2</sup>
1	Biru	1000	750	250	62500	83.333
2	Merah	900	750	150	22500	30.000
3	Putih	600	750	-150	22500	30.000
4	Warna Lain	500	750	-250	62500	83.333
<b>Jumlah</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>226.667</b>

Frekuensi harapan (F<sub>h</sub>) untuk setiap kategori adalah  $\frac{3000}{4} = 750$ .

d. Kriteria Pengujian

$H_0$  diterima jika chi-square hitung < chi-square table.

e. Keputusan:

Berdasar tabel di atas diperoleh nilai chi-square = 226,667

Dari table chi-square dengan  $df = k - 1 = 4 - 1 = 3$  dan  $\alpha = 5\%$  diperoleh nilai chi square tabel = 7,82.

Karena nilai chi square hitung = 226.667 > chi square tabel = 7,82, maka  $H_0$  ditolak.

f. Kesimpulan:

Jumlah masyarakat yang memilih empat warna mobil berbeda (peluang empat warna cat untuk dipilih masyarakat adalah tidak sama)

**2. Uji Hipotesis untuk dua sampel independen**

Kalau dua penelitian terdiri dari frekuensi-frekuensi dengan kategori-kategori yang diskrit, maka tes  $\chi^2$  dapat digunakan untuk menetapkan signifikansi perbedaan-perbedaan antara dua kelompok independen. Data berbentuk nominal sampelnya besar. Cara perhitungan dapat menggunakan tabel kontingensi 2 x 2 atau menggunakan rumus yang disajikan berikut ini:

Tabel 9.1. Tabel Kontingensi

Sampel	Frekuensi Pada		Jumlah Sampel
	Obyek 1	Obyek 2	
Sampel A	a	b	a + b
Sampel B	c	d	c + d
Jumlah	a + c	b + d	n

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu:

$$\chi^2 = \frac{n \left( |ad - bc| - \frac{1}{2}n \right)^2}{(a + b)(a + c)(b + d)(c + d)}$$

dengan n adalah jumlah sampel

**Contoh 9.2**

Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SMA/MA dan lulusan PTAIN/PTAIS. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SMA/MA, dan sampel kedua lulusan PTAIN/PTAIS sebanyak 70 orang. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SMA/MA, dari 80 orang tersebut terdapat 60 orang yang memilih bank pemerintah dan terdapat 20 orang yang memilih bank swasta. Selanjutnya dari sampel kedua terdapat 30 orang yang memilih bank pemerintah dan 40 orang memilih bank swasta. Buat hipotesis yang tepat untuk kasus tersebut dan ujilah hipotesis anda pada taraf signifikansi 5%.

**Solusi:**

a. Hipotesis:

$H_0$  : tidak terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank.

$H_a$  : perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank.

b. Tingkat Signifikansi =  $\alpha = 5\% = 0.05$

2) Komputasi:

Rumus Chi-Square adalah:

$$\chi^2 = \frac{n \left( |ad - bc| - \frac{1}{2}n \right)^2}{(a + b)(a + c)(b + d)(c + d)}$$

Sampel	Frekuensi Pada		Jumlah Sampel
	Bank Pemerintah	Bank Swasta	
Lulusan SMA/MA	60	20	80
Lulusan PTAIN/PTAIS	30	40	70
Jumlah	90	60	150

$$\chi^2 = \frac{150 \left( |2400 - 600| - \frac{1}{2} 150 \right)^2}{(80)(90)(60)(70)} = 14.76$$

3) Kriteria Pengujian

Jika chi-square hitung > chi-square table, maka  $H_0$  ditolak

4) Keputusan:

Berdasar perhitungan di atas diperoleh nilai chi-square = 14.76

Dari table chi-square dengan  $df = 1$  dan  $\alpha = 5\%$  diperoleh nilai chi square tabel = 3.841.

Karena nilai chi square hitung = 14.76 > chi square tabel = 3.841, maka  $H_0$  ditolak.

5) Kesimpulan:

Terdapat perbedaan tingkat pendidikan dalam memilih jenis bank untuk menyimpan uang, terdapat kecenderungan bahwa lulusan SMA/MA lebih memilih bank pemerintah disbanding dengan bank swasta.

**B. Uji Tanda (sign test)**

Uji tanda digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. Disebut uji tanda karena data yang akan dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda positif dan tanda negative. Uji tanda bermanfaat untuk penelitian dimana pengukuran kuantitatif tidak dapat dijalankan, tetapi masih dapat ditentukan tingkatan bagi kedua anggota setiap pasangan antara kedua sampel. Hipotesis nol yang akan diuji dengan menggunakan uji tanda adalah:

$$p(X_A > X_B) = p(X_A < X_B) = 0.5$$

dengan  $X_A$  adalah nilai setelah ada perlakuan (treatment) dan  $X_B$  adalah nilai sebelum ada perlakuan. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika tanda positif lebih banyak dari tanda negative atau sebaliknya maka  $H_0$  ditolak.  $H_0$  juga dapat diketahui berdasarkan median dari kelompok yang diobservasi. Bila jarak

## STATISTIKA NONPARAMETRIK

antara media dengan tanda positif dan negative sama dengan nol maka  $H_0$  diterima.

### Contoh 9.3

Penelitian dilakukan di daerah percontohan pemberian makanan bergizi. 20 keluarga disampel secara acak kemudian diobservasi sebelum dan sesudah program. Hasilnya:

Sebelum	2	3	1	3	2	2	1	3	2	1	1	2	2	3	4	3	2	2	4	3
Sesudah	4	4	2	3	3	4	2	4	2	2	3	3	4	5	5	2	3	3	3	2

Buat hipotesis dan bagaimana hasilnya.

Solusi:

a. Hipotesis:

$H_0$  : tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian makanan bergizi

$H_a$  : ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian makanan bergizi

b. Taraf Signifikansi = 0.05

c. Komputasi:

Lokasi	Sebelum	Sesudah	Tanda
1	2	4	Minus
2	3	4	Minus
3	1	2	Minus
4	3	3	0
5	2	3	Minus
6	2	4	Minus
7	1	2	Minus

STATISTIKA NONPARAMETRIK

8	3	4	Minus
9	2	2	0
10	1	2	Minus
11	1	3	Minus
12	2	3	Minus
13	2	4	Minus
14	3	5	Minus
15	4	5	Minus
16	3	2	Plus
17	2	3	Minus
18	2	3	Minus
19	4	3	Plus
20	3	2	Plus
TANDA PLUS =			15
TANDA MINUS =			3

Jumlah tanda yang paling sedikit adalah  $h_{hitung} = 3$  (tanda minus)

Nilai kritis  $h$  pada taraf signifikansi 0.05 dengan  $N = 18$  adalah  $h_{tabel} = 4$

d. Kriteria Pengujian:

Jika nilai hitung  $\leq h_{tabel}$  maka terima  $H_0$ , sebaliknya jika  $h_{hitung} \geq h_{tabel}$  maka tolak  $H_0$ .

Karena nilai hitung  $= 3 \leq h_{tabel} = 4$ , maka  $H_0$  diterima.

e. Kesimpulan:

Karena  $H_0$  diterima, berarti terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian makanan bergizi.



**C. Uji Wilcoxon**

Uji Wilcoxon merupakan penyempurnaan dari uji tanda (*sign test*) kalau dalam uji tanda besarnya selisih nilai angka antara positif dan negative tidak diperhitungkan, sedangkan dalam uji Wilcoxon ini menjadi perhatian.

**Contoh 9.4**

Dengan menggunakan data pada contoh 10.3. ujilah hipotesis dengan menggunakan uji Wilcoxon.

**Solusi:**

a. Hipotesis:

$$H_0 : \text{Harga } j (+) = \text{harga } j (-)$$

$$H_a : \text{Harga } j (+) \neq \text{harga } j (-)$$

b. Taraf Signifikansi = 0.05

c. Komputasi:

LOKASI	SEBELUM (X)	SESUDAH (Y)	TANDA	X-Y	RANK	TANDA (+)	TANDA (-)
4	3	3	0	0	1		
9	2	2	0	0	2		
3	1	2	-	1	3		8.5
5	2	3	-	1	4		8.5
7	1	2	-	1	5		8.5
8	3	4	-	1	6		8.5
10	1	2	-	1	7		8.5
12	2	3	-	1	8		8.5
15	4	5	-	1	9		8.5
16	3	2	+	1	10	8.5	
17	2	3	-	1	11		8.5
18	2	3	-	1	12		8.5

## STATISTIKA NONPARAMETRIK

19	4	3	+	1	13	8.5	
20	3	2	+	1	14	8.5	
1	2	4	-	2	15		15
2	3	4	-	1	16		16
6	2	4	-	2	17		18.5
11	1	3	-	2	18		18.5
13	2	4	-	2	19		18.5
14	3	5	-	2	20		18.5
JUMLAH						25.5	181.5

Harga j kecil (+) = 25.5, nilai tabel G pada  $\alpha = 0,05$  dan  $N = 18$  adalah 40.

### d. Kriteria Pengujian:

Jika  $J_{hitung} > J_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya jika  $J_{hitung} < J_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima.

Karena nilai  $J_{hitung} = 25.5 < J_{tabel} = 40$ , maka  $H_0$  diterima

### f. Kesimpulan:

Karena  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian makanan bergizi.

## D. Uji Cochran

Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif k sampel berpasangan jika data berbentuk nominal dan frekuensi dikotomi. Bentuk respon dikotomi yaitu benar - salah, sukses - gagal, ya - tidak, dan lain-lain. Artinya respon yang diberikan hanya ada dua kemungkinan. Selanjutnya respon tersebut diberi skor misalnya benar diberi skor 1 dan salah diberi skor 0.

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah:

$$Q = \frac{(k - 1) \left[ k \sum_{j=1}^{10} G_j^2 - \left( \sum_{j=1}^{10} G_j \right)^2 \right]}{k \sum_{i=1}^n L_i - \sum_{i=1}^n L_i^2}$$

## STATISTIKA NONPARAMETRIK

Distribusi  $Q$  mendekati distribusi *chi-square*. Sehingga dalam melakukan pengujian nilai  $Q_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai *chi-square*. Kriteria pengujian adalah jika nilai  $Q_{hitung}$  lebih besar atau sama dengan *chi-square* tabel maka  $H_0$  ditolak.

### Contoh 9.5

Terdapat 10 siswa disuruh mengerjakan 3 butir tes dengan hasil sebagai berikut:

Siswa ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Butir 1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
Butir 2	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
Butir 3	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1

Buat hipotesis dan bagaimana kesimpulan hasil ujiinya!

**Solusi:**

a. Hipotesis

$H_0$  : Tidak ada perbedaan skor dari ketiga butir (Skor Butir 1 = Skor Butir 2 = Skor Butir 3)

$H_a$  : Paling sedikit ada satu pasang skor butir yang tidak sama

b. Taraf signifikansi  $\alpha = 0.05$

c. Komputasi

Siswa ke	Butir 1	Butir 2	Butir 3	$L_i$	$L_i^2$
1	1	1	1	3	9
2	1	1	0	2	4
3	1	0	0	1	1
4	0	1	0	1	1
5	1	0	1	2	4
6	0	1	1	2	4
7	1	1	1	3	9

STATISTIKA NONPARAMETRIK

8	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1
10	1	1	1	3	9
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>43</b>

$$Q = \frac{(k - 1) \left[ k \sum_{j=1}^{10} G_j^2 - \left( \sum_{j=1}^{10} G_j \right)^2 \right]}{k \sum_{i=1}^n L_i - \sum_{i=1}^n L_i^2}$$

$$Q = \frac{(3 - 1)[3(7^2 + 7^2 + 5^2) - (19)^2]}{(3)(19) - (43)}$$

$$Q = \frac{(2)[3(123) - 361]}{57 - 43}$$

$$Q = \frac{(2)[369 - 361]}{14}$$

$$Q = 1.1429$$

d. Kriteria Pengujian

Jika nilai  $Q > \chi^2_{\text{tabel}}$  maka tolak  $H_0$ .

Nilai  $\chi^2_{\text{tabel}}$  untuk  $df = 2$  dan  $\alpha = 0.05$  adalah 5.99. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $Q = 1.1429 < \chi^2 = 5.99$ . Artinya  $H_0$  diterima.

e. Kesimpulan

Tidak perbedaan skor yang diperoleh siswa pada masing-masing butir atau ada kecenderungan Skor Butir 1 = Skor Butir 2 = Skor Butir 3

**E. Analisis dengan SPSS Statistics 20**

Misalkan ada 80 orang telah terpilih secara acak sebagai sampel, terdiri atas 35 pria dan 45 wanita. Tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut:

Tingkat Pendidikan	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
SMP	12	10	22
SMA	13	20	33
Sarjana	10	15	25
Jumlah	35	45	80

Jika dipilih  $\alpha = 5\%$ . Ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa “Terdapat hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan.

Langkah analisis dengan SPSS

1. Definisikan variabel pada *variable view*


	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	gender	Numeric	8	2	Jenis Kelamin	{1,00, Pria}...	None	8	Right	Nominal	Input
2	Pendidikan	Numeric	8	2	Tingkat Pendid...	{1,00, SMP}...	None	8	Right	Ordinal	Input
3	Frek	Numeric	8	2	Frekuensi	None	None	8	Right	Scale	Input
4											
5											
6											

2. Input Data


	gender	Pendidikan	Frek	var	var
1	1,00	1,00	12,00		
2	1,00	2,00	13,00		
3	1,00	3,00	10,00		
4	2,00	1,00	10,00		
5	2,00	2,00	20,00		
6	2,00	3,00	15,00		
7					
8					

## STATISTIKA NONPARAMETRIK

3. Klik *Data* dan pilih *Weight Cases* kemudian klik *Weight Cases by* dan isikan frekuensi ke kotak *Frequency variable*, seperti tampilan berikut:




Kemudian




4. Pada menu utama klik *Analyze*, pilih *Descriptive Statistics* dan *Crosstabs*

## STATISTIKA NONPARAMETRIK




Sehingga akan tampil:




## STATISTIKA NONPARAMETRIK

5. Klik *Cells* dan pada *Counts* pilih *Observed* dan *Expected* dan klik *Continue*.



6. Klik *Statistics*, pilih *Chi-Square* dan pada *Nominal* pilih *Contingency Coefficient*, seperti tampilan berikut:





7. Klik *Continu* lalu ketik OK, maka tampil output SPSS.

**Output SPSS analisis dengan Chi-Square:**

**Tingkat Pendidikan \* Jenis Kelamin Crosstabulation**

			Jenis Kelamin		Total
			Pria	Wanita	
Tingkat Pendidikan	SMP	Count	12	10	22
		Expected Count	9,6	12,4	22,0
	SMA	Count	13	20	33
		Expected Count	14,4	18,6	33,0
	Sarjana	Count	10	15	25
		Expected Count	10,9	14,1	25,0
Total	Count	35	45	80	
	Expected Count	35,0	45,0	80,0	

## STATISTIKA NONPARAMETRIK

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada baris *count* menunjukkan frekuensi observasi tingkat pendidikan menurut gender. Sedangkan *Expected Count* menunjukkan frekuensi harapan tingkat pendidikan menurut gender.

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,439 <sup>a</sup>	2	,487
Likelihood Ratio	1,432	2	,489
Linear-by-Linear Association	,939	1	,333
N of Valid Cases	80		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,63.

Pada tabel Chi-Square tests, baris Pearson Chi-Square menunjukkan bahwa harga chi-square 1,439, dengan db = 2 dan p-value = 0,487 > 0,05 menunjukkan bahwa Hipotesis Null ditolak. Artinya terdapat hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan.

### Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	,133	,487
N of Valid Cases	80	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Berdasarkan tabel Symmetric Measures, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien kontingensi sebesar 0,133 menunjukkan tingkat keeratan hubungan gender dengan tingkat pendidikan.



**Uji Kompetensi**

1. Jelaskan jenis-jenis teknik analisis data statistika nonparametrik dan asumsi yang harus dipenuhi.
2. Kapan digunakan teknik analisis data statistika nonparametrik?
3. Diberikan data berikut tentang 100 orang terpilih secara acak dari populasi terdiri atas 53 Wanita dan 47 Pria dan tingkat pendidikan mereka disaikan sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
SMP	10	20	30
SMA	15	23	38
Sarjana	22	10	32
Jumlah	47	53	100

Ujilah hipotesis berikut:

“terdapat hubungan gender dengan tingkat pendidikan” dengan mengambil nilai  $\alpha = 5\%$ . Apa kesimpulan Anda.

4. Penelitian dilakukan didaerah binaan kampus peradaban dengan pemberian makanan bergizi. 20 keluarga disampel secara acak kemudian diobservasi sebelum dan sesudah program. Hasilnya:

Sebelum	3	2	1	3	2	2	1	3	2	1	2	2	2	3	4	3	2	2	3	3
Sesudah	4	3	2	3	3	4	2	4	2	3	3	3	4	5	5	2	3	3	3	2

Buat hipotesis dan bagaimana hasilnya.

5. Terdapat 10 siswa disuruh mengerjakan 4 butir tes dengan hasil sebagai berikut:

Siswa ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Butir 1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1

## STATISTIKA NONPARAMETRIK

<b>Butir 2</b>	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1
<b>Butir 3</b>	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
<b>Butir 4</b>	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1

Buat hipotesis dan bagaimana kesimpulan hasil ujinya!

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian*. Solo: UNS Press.
- Cochran, W. G. (1979). *Sampling Technique*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons.
- Draper, N. & Smith, H. (1981). *Applied Regression Analysis, Second Edition*. John Wiley & Sons, Inc. New York
- Gouri K. Bhattacharyya & Richard A. (1977). *Statistical Concepts and Methods*. New York. John Wiley & Sons, Inc.
- Hardjodipuro, S. (1988). *Aplikasi Komputer dan Analisis Multivariat: Analisis Faktor*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud.
- Kadir. 2015. *Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lehmann, E.L. (1986). *Testing Statistical Hypotheses, Second Edition*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Madyana. (2005). *Dasar Penentuan Sampel dalam Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Mendenhall, W dan Terry, S. (2003). *A Second Course In Statistics: Regression Analysis, Six Edition*. Unites States of America: Pearson Education, Inc.
- Mark L. Berenson, David M. Levine, Matthew Goldstein. (1983). *Intermediate Statistical Methods and Applications. (A Computer Package Approach)*. United States Of America. Prentice-Hall.
- Mendenhall, W. & Sincich, T. 2003. *A Second Course In Statistic: Regression Analysis*. Pearson Education International.
- Myers, (1990). *Classical & Modern Regression", 2nd edition*, PWS/Kent Publishing,
- Nisfiannoor, M., (2009). *Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nursalam. (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Makassar: Alauddin Press.

- Nursalam. (2013). *Pengukuran dalam Pendidikan*. Makassar: Alauddin Press
- Nursalam. (2014). *Statistika dan Pengukuran untuk Guru dan Dosen: Teori dan Aplikasi dalam Bidang Pendidikan*. Makassar: Alauddin Press.
- Pedhazur, E. J. (1997). *Multiple Regression in Behavioral Research*. Toronto: Thomson Learning, Inc.
- Prijana & Semendison. (2005). *Metode Sampling Terapan untuk Penelitian Sosial*. Bandung: Humaniora.
- Purwanto. (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ronald E. Walpole. (1995). *Pengantar Statistika*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rusdin. (2004). *Statistika Penelitian Sebab Akibat*. Bandung: CV. Pustaka Bani Quaraisy.
- Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2004). *A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling: Second Edition*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 2 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Siegel, S. (1994). *Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soepono, B. (2002). *Statistik Terapan: Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. RIneka Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Statistik Nonparametrik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto. (2007). *Teknik Sampling untuk Survey dan Eksperimen*. Jakarta: PT. RIneka Cipta.

- Susetyo, B. (2010). *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tiro, M. A. (2007). *Dasar-Dasar Statistika: Edisi Revisi*. Makassar: State University of Makassar Press.
- Yamin, S dan Kurniawan. (2009). *SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek.





## BIODATA PENULIS



Nursalam, lahir di Sinjai pada tanggal 29 Desember 1980. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri No 92 Panaikang pada tahun 1986-1992. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Panaikang pada tahun 1992-1995. Pada tahun yang sama penulis memasuki jenjang Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sinjai dari tahun 1995-1998. Penulis kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2003. Selama menjadi mahasiswa Penulis juga diangkat sebagai asisten Dosen pada mata kuliah Teori Bilangan dan Kalkulus. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi tenaga pengajar pada prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada tahun 2005 Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Institut teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada jurusan Statistika dan selesai pada tahun 2007. Dan saat ini (sejak September 2010) sedang menempuh pendidikan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Penulis juga pernah mengikuti *Short Course* selama 4 bulan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta kerjasama dengan Departemen Agama RI.

Pengalaman kerja, selain sebagai Dosen Tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FTK UIN Alauddin Makassar, sebagai Trainer pada program LAPIS PGMI (*Learning Assistance Program For Islamic School*) tahun 2008 sampai 2010. Fasilitator Nasional USAID PRIORITAS untuk Praktik yang Baik dalam Pembelajaran dan Manajemen Berbasis Sekolah, selain itu juga sebagai Assessor

sertifikasi Guru Rayon LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar (2009 – sekarang). Konsultan Penelitian pada Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan (2015)

Dalam bidang pengajaran, penulis aktif mengajarkan materi Pembelajaran Matematika, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Teori Bilangan, Analisis Time Series, Teknik Sampling, Stokastik Proses, Analisis Data Statistika, Statistika Pendidikan. Dalam bidang penulisan buku ajar, penulis telah menyusun buku perkuliahan diantaranya Persamaan Diferensial Biasa: Teori dan Aplikasi (2007); Ilmu Bilangan (2009), Tim Penulis sekaligus Editor Buku Matematika 1 (2008) dan Matematika 2 (2009) yang disusun oleh Konsorsium LAPIS PGMI, Strategi Pembelajaran (2011), Statistika untuk Penelitian (2011), Pengukuran dalam Bidang Pendidikan (2012), Strategi Pembelajaran Matematika: Teori dan Aplikasi bagi Mahasiswa PGMI (2013), Statistika dan Pengukuran untuk Guru dan Dosen: Teori dan Aplikasi dalam Bidang Pendidikan (2014). dan buku yang sekarang ini anda baca dan gunakan yaitu Statistika Pendidikan. Selain itu, penulis juga aktif dalam menyusun Buku Sumber untuk LPTK dalam bidang Pendidikan Matematika yakni Pembelajaran Matematika di SMP/MTs (2014) dan Pembelajaran Matematika di SD/MI (2015).