

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM PADA NY “R”
DENGAN NYERI LUKA PERINEUM DI PUSKESMAS SOMBA OPU
GOWA (RAWAT INAP) TANGGAL 27 APRIL S/D 6 JUNI 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

OLEH :

ROSNANI

NIM: 70400114052

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosnani
Nim : 70400114052
Tempat / Tgl. Lahir : Mangkutana, 20 Oktober 1996
Jurusan / Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas / Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Diploma
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum Pada Ny “R” Dengan Nyeri Luka Perineum di Puskesmas Somba Opu Gowa (rawat Inap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar diperoleh batal demi hukum.

Samata – Gowa, September 2017

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Rosnani
NIM: 70400114052

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

JUDUL

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM PADA NY "R"
DENGAN NYERI LUKA PERINEUM DI PUSKESMAS SOMBA OPU GOWA
(RAWAT INAP)

Telah Disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI)
Mahasiswa Kebidanan

Menyetujui,
Pembimbing :

(Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.Sit, M-keb.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pembimbing :

ALAUDDIN
M A K A S S A R

(dr. Darmawansyah, M.kes.)

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum pada Ny "R" dengan Nyeri Luka Perineum di Puskesmas Somba Opu (Rawat Inap) Kabupaten Gowa Tahun 2017", yang disusun oleh **Rosnani NIM: 70400114052**, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 25 Agustus 2017 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 25 Agustus 2017 M

3 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Anieq Mumthiah Alkautsar, S.SiT, M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **dr. Darmawansyih., M.Kes** (.....)

Penguji I : **dr. Miswani Mukani Syuaib., M.Kes** (.....)

Penguji II : **Dr. Sohra, M.Ag** (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini yang mengambil judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum Dengan Nyeri Luka Perineum di Puskesmas Somba Opu Gowa (Rawat Inap)”

Terselesainya Tulisan Karya Ilmiah (KTI) ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tulisan Karya Ilmiah (KTI) ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan

4. Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb selaku pembimbing I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan penuh keikhlasan
5. Ibu dr. Darmawansyih., M.Kes selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberi saran-saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bapak dr. Tihardimanto., M.Kes selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibu Dr. Hj. Sohrah., M.Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar
9. Direktur Puskesmas Somba Opu Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Orang tuaku tercinta yang tidak henti-hentinya selalu memberi do'a dan dukungan kepada saya, ayahanda Muh. Tahir dan ibunda Rosmini
11. Kakanda Sahbudin S.Pd.I yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
12. Kak Dian Astriani., S.Fam selaku pembimbing Murabbiah dalam Tarbiyah mingguan yang selalu sabar dan ikhlas mengajarkan dan

membagi ilmunya tentang ajaran-ajaran islam. Dan teman-teman tarbiyah yang saling mengingatkan satu sama lain untuk menuju kebaikan


13. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2014. Dan terlebih khusus kepada Muliati, Ira Ayu Lestari, Nurhikma, Zuhriani HS, Geni Liskantari, Sunarti, dan Raras Puspa Dewi.

Segala kegiatan manusia di dunia pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kehidupan yang indah. Bila diungkapkan dengan bahasa ungkapan maka dapat dikatakan bahwa ilmu merupakan bunga-bunga ibadah. Ilmu merupakan penghias ibadah manusia kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Ketika ilmu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diamalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar maka akan sangat indah manfaat yang diraih. Namun bila ilmu dipelajari dengan setengah-setengah dan dimanfaatkan semaunya tanpa tahu tujuannya benar atau tidak, maka ilmu itu akan merusak citra keindahan. Inilah yang sangat penting kita pahami agar tidak sembarangan mempergunakan ilmu dalam kehidupan kita. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dipelajari dengan niat baik dan tulus untuk diamalkan di jalan Allah SWT melalui kehidupan umat manusia sebagai perantaranya. Dan “Berpikir Positif Akan Menghasilkan Semangat yang Luar Biasa” kalimat-kalimat itulah yang selalu menjadikan inspirasi bagi penulis auntuk menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap

kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..Amin..Amin Yarobbal Alamin

Samata/Gowa, Agustus 2017

Penulis



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar kegiatan kosul
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
- Lampiran III : Surat Izin/Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur Puskesmas Somba Opu Gowa
- Lampiran IV : Surat keterangan selesai penelitian dari Puskesmas Somba Opu Gowa
- Lampiran V : Daftar riwayat hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang lingkup penulisan.....	8
C. Tujuan penulisan.....	8
D. Manfaat penulisan.....	9
E. Metode penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan umum tentang masa nifas.....	13
1. Pengertian masa nifas.....	13
2. Tujuan asuhan masa nifas.....	13
3. Peran dan tanggung jawab bidan pada masa nifa.....	14
4. Periode masa nifas.....	15

5. Perubahan masa nifas.....	15
6. Program dan kebijakan teknis masa nifas.....	20
7. Tanda bahaya masa nifas.....	21
8. Perawatan masa nifas.....	22
9. Infeksi masa nifas.....	26
B. Tinjauan khusus tentang nyeri luka /ruptur perineum.....	26
a. Nyeri.....	26
1. Pengertian nyeri.....	26
2. Nyeri perineum pascasalin.....	26
3. Dampak nyeri perineum.....	27
4. Intensitas nyeri.....	27
b. Luka/ruptur perineum.....	28
1. Pengertian luka/ruptur perineum.....	28
2. Faktor penyebab ruptur perineum.....	29
3. Tingkatan ruptur perineum.....	31
4. Perawatan ruptur perineum.....	31
C. Proses manajemen asuhan kebidanan.....	33
1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan.....	33
2. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP)	38
D. Tinjauan umum nifas dengan nyeri luka perineum menurut isla.....	40
1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 222.....	43
2. Al-Qur'an surah Ar-Rahman/55: 13.....	46

BAB III STUDI KASUS	47
Langkah I. Identifikasi data dasar.....	47
Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	53
Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	55
Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi.....	57
Langkah V. Rencana tindakan/intervensi	57
Langkah VI. Implementasi.....	62
Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	64
SOAP kunjungan I.....	66
SOAP kunjungan II.....	72
SOAP kunjungan III.....	76
SOAP kunjungan IV.....	79
BAB IV PEMBAHASAN	81
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Perubahan normal uterus selama post partum.....	16
Tabel 2 :	Program dan kebijakan teknis masa nifas.....	20
Tabel 3 :	Derajat robekan/laserasi perineum.....	31
Tabel 4 :	Riwayat persalinan terdahulu.....	50



ABSTRAK

Nama : Rosnani
Nim : 70400114052
**Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum pada Ny “R”
dengan Nyeri Luka Perineum di Puskesmas Somba Opu Gowa
(Rawat Inap) Tahun 2017**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi asuhan kepada ibu dengan keluhan nyeri luka perineum, dimana nyeri luka perineum diakibatkan karena terjadinya ruptur pada saat proses persalinan, di Puskesmas Somba Opu Gowa (rawat inap). Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus, dengan metode penelitian manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan keluhan nyeri luka perineum diakibatkan karena terjadinya ruptur pada saat proses persalinan dan ibu mendapat jahitan pada perineum sebanyak 6 jahitan, setelah dilakukan pengumpulan data di puskesmas, maka penulis menetapkan diagnosa nyeri luka perineum yang memiliki komplikasi bagi ibu jika tidak ditangani dengan baik yaitu salah satunya infeksi, yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Penanganan pada kasus nyeri luka perineum yaitu memberikan obat oral seperti obat analgetik, antibiotik, dan vitamin C, serta mengajarkan ibu cara teknik relaksasi dan mengajarkan tentang personal hygiene. Setelah dilakukan pengkajian dengan melakukan kunjungan masa nifas sebanyak 4 kali, Maka ditemukan bahwa tidak ada tanda-tanda infeksi luka jahitan pada ibu.

Dari hasil studi kasus dapat disimpulkan mulai dari kunjungan 1 sampai kunjungan ke 4 tidak didapatkan kesenjangan antara teori dengan yang didapatkan di lapangan.

Kata kunci: post partum, nyeri luka/ ruptur perineum.

ABSTRACT

Name : Rosnani
Student ID Number : 70400114052
Title : **Post Partum Midwifery Care on Ny "R" with Perineal Wound Pain at Somba Opu Gowa Public Health Center (Inpatient) in 2017**

The purpose of this study was to provide care to mothers with complaints of perineal wound pain, where the pain of perineal wound caused by the occurrence of rupture at the time of delivery, at Somba Opu Gowa Public Health Center (inpatient). The type of research used is case study approach, with research method of midwifery care management with seven steps varney.

The results showed that mothers with perineal wound pain were caused by rupture at the time of delivery and mother got sutures on the perineum as much as 6 stitches, after data collection at puskesmas, the authors determined the diagnosis of perineal wound pain which had complication for mother if not handled with either one infection, which can cause death if not treated properly. Handling in cases of perineal wound pain is to give oral medications such as analgesic drugs, antibiotics, and vitamin C, and teach the mother how to relaxation techniques and teach about personal hygiene. After the assessment by doing the puerperium four times, it was found that there were no signs of wound infection in the mother.

From the case study results can be concluded from 1st visit to 4th visit there is no gap between the theory and the obtained in the field.

Keywords: post partum, wound pain / perineal rupture

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah 2 jam post partum dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, biasanya berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan baik secara fisiologis maupun psikologis akan pulih dalam waktu 3 bulan. Jika secara fisiologis sudah terjadi perubahan pada bentuk semula (sebelum hamil), tetapi secara psikologis masih terganggu maka dikatakan masa nifas tersebut belum berjalan dengan normal atau sempurna. Masa nifas atau post partum disebut juga puerperium yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “puer” yang artinya bayi dan “parous” berarti melahirkan. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim karena sebab melahirkan atau setelah melahirkan. (Nurjannah, dkk, 2013: 2).

Nyeri merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang dan ekstensinya diketahui bila seorang pernah mengalaminya. Nyeri yang terjadi pada ibu post partum yang mengalami ruptur spontan dan dilakukan tindakan episiotomi dapat mempengaruhi kondisi ibu seperti ibu kurang beristirahat, cemas akan kemampuannya merawat bayi, stress dan ibu sukar tidur, bahkan bisa menjadi pemicu terjadinya *post partum blues*. Selain itu pemenuhan ASI pada bayi berkurang dan keluarga akan repot untuk mengurus ibu dan bayinya. (Utami, 2015: 1)

Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada perineum sewaktu persalinan. Perineum merupakan kulit dan otot yang terletak diantara vagina dan anus. Robekan perineum dapat terjadi pada hampir semua persalinan pertama (primipara) dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Bahaya dan komplikasi robekan perineum antara lain perdarahan, infeksi dan disparenia (nyeri selama berhubungan seksual). Perdarahan pada robekan perineum dapat menjadi hebat khususnya pada robekan derajat dua dan tiga atau jika robekan perineum meluas ke samping atau naik ke vulva mengenai klitoris. (Rahayu, dkk, 2015: 729). Sekitar 85% wanita yang melahirkan spontan pervaginam mengalami trauma perineum berupa 32-33% karena tindakan episiotomi dan 52% merupakan laserasi spontan. Laserasi perineum ada yang ringan sampai berat, Laserasi perineum dibedakan menjadi derajat laserasi, dari laserasi derajat 1 sampai laserasi derajat 4. Tentu saja semakin dalam dan lebar laserasi perineum akan semakin menyebabkan nyeri. (Mulati, 2016: 2)

Menurut *World Health Organisation* (WHO) setiap menit seorang perempuan meninggal karena komplikasi terkait dengan kehamilan dan post partum. Dengan kata lain 1.400 perempuan meninggal setiap hari atau lebih dari 500.000 perempuan meninggal setiap tahun karena kehamilan, persalinan dan nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) di negara ASEAN lainnya, seperti di Thailand pada tahun 2011 adalah 44/100.000 kelahiran hidup, di Malaysia 39/100.000 kelahiran hidup dan Singapura 6/100.000 kelahiran hidup. (Timbawa, dkk. 2015: 2). Menurut Admin ,2011 Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu, yang terjadi 90% pada saat persalinan dan segera setelah

persalinan, yaitu perdarahan (28%), infeksi (11%), komplikasi perineum (8%), eklamsia (24%), partus macet 5%, abortus 5%, trauma obstetrik 5%, emboli 3%, dan lain-lain 11%.(Rosmawar, 2013: 28)

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, beberapa faktor penyebab langsung kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan (42%), infeksi (11%), eklamsia/preeklamsia (13%), abortus (11%), partus lama/persalinan macet (9%), dan penyebab lain (15%). Sedangkan faktor tidak langsung penyebab kematian ibu karena faktor terlambat yaitu terlambat mengenali tanda bahaya persalinan, terlambat rujuk ke fasilitas kesehatan, dan terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan. Ini semua terkait dengan faktor akses, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun angka kematian ibu yang disebabkan infeksi hanya 10%, yang ditandai dengan rubor, dolor, calor, tumor, fungsi. hal tersebut ikut menyumbang kenaikan angka kematian ibu di Indonesia.(Yuni, dkk, 2014: 1).

Menurut DEPKES RI 2016 secara nasional penyebab langsung kematian ibu dengan penyumbang AKI terbesar adalah perdarahan 24 orang%, komplikasi perineum 8%, infeksi 11%, partus macet 5%. (Wulansari, dkk, 2016 : 1). Anita (2012) juga mengatakan Sebagian besar AKI terjadi saat persalinan terutama karena perdarahan. Ibu bersalin umumnya mengalami robekan pada vagina dan perineum yang menimbulkan perdarahan dalam jumlah bervariasi dan banyak. Sehingga robekan perineum tersebut memerlukan penjahitan yang banyak. Luka dan jahitan pada perineum harus dirawat dengan baik karena bila tidak akan menimbulkan masalah baru seperti infeksi dan nyeri.(Makzizatunnisa, dkk, 2014:

2).

Jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 menurut profil kesehatan Kabupaten / Kota jumlah kematian ibu yang dilaporkan menjadi 115 orang atau 78.38 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu nifas 38 orang (33,04%), kematian ibu hamil 18 orang (15,65%), dan kematian ibu bersalin 59 orang (51,30%). sedangkan Tahun 2014 jumlah kematian ibu yang dilaporkan menjadi 138 orang atau 93.20 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu nifas 69 orang (50,00%). kematian ibu hamil 15 orang (10,86%), dan kematian ibu bersalin 54 orang (39,13%). (Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2014 : 27)

Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Infeksi masa nifas masih berperan sebagai penyebab utama kematian ibu terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini, masalah itu terjadi akibat dari pelayanan kebidanan yang masih jauh dari sempurna. Faktor penyebab lain terjadinya infeksi nifas diantaranya, daya tahan tubuh yang kurang, perawatan nifas yang kurang baik, kurang gizi / mal nutrisi, anemia, hygiene yang kurang baik, serta kelelahan. (Tulas, dkk, 2017: 2).

Akibat perawatan perineum yang kurang baik mengakibatkan kondisi perineum yang terkena lokhia menjadi lembab dan akan sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum yang dapat menghambat proses penyembuhan luka. Biasanya penyembuhan luka pada robekan perineum ini akan sembuh bervariasi, ada yang sembuh normal dan ada yang mengalami kelambatan dalam penyembuhannya. (Ma'rifa dan yeni, 2015

: 2). Penyembuhan luka yang mengalami kelambatan di sebabkan karena bebarapa masalah diantaranya perdarahan yang disertai dengan perubahan tanda-tanda vital, infeksi seperti kulit kemerahan, demam dan timbul rasa nyeri, pecahnya luka jahitan sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya trauma serta menonjolnya organ bagian dalam ke arah luar akibat luka tidak segera menyatu dengan baik.(Trisnawati dan Mei muhartati, 2015: 5).

Luka perineum pada kenyataannya sering membuat ibu nifas sangat tidak nyaman bahkan mengalami ketakutan untuk melakukan mobilisasi dini. Padahal mobilisasi dini sangat penting untuk melancarkan pengeluaran lochia, mengurangi infeksi pada luka, mempercepat involusio alat kandungan, melancarkan peredaran darah, mencegah tromboflebitis dan akan mempercepat penyembuhan luka. Selain itu nyeri luka perineum akan mengganggu ibu berinteraksi dengan bayinya, membuat ibu lebih rentan terkena infeksi dan kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perdarahan jika luka perineum tidak dipantau dengan baik. Nyeri luka perineum jelas akan menimbulkan dan mempengaruhi kesejahteraan perempuan secara fisik, psikologis dan sosial pada periode postnatal baik secara langsung maupun dalam jangka panjang.(Mulati, 2016: 2).

Setelah melahirkan ibu juga akan mengalami berbagai gangguan psikologi meliputi gangguan libido 38,2%, orgasme 56,4%, dan yang terbanyak adalah gangguan nyeri yang mencapai 70,9%. Penyebab utama nyeri tersebut adalah jahitan perinium, dari hasil penelitian tersebut dampak nyeri yang timbul antara lain pada psikologis adalah stress, bahkan traumatik, takut terluka, dan

depresi.(Makzizatunnisa, dkk, 2014: 1). Tidak mengherankan bila ibu mengalami sedikit perubahan perilaku dan sesekali merasa kerepotan. Adapun gangguan psikologis yang dialami ibu diantaranya yaitu ibu mengalami depresi post partum seperti sering merasa marah, sedih yang berlarut-larut, kurang nafsu makan, terlalu mencemaskan keadaan bayinya. Dan ibu juga mengalami *post partum blues*.(Rukiyah, dkk,2012: 45-46).

Menurut Yeti (2014), Untuk mencegah timbulnya infeksi atau komplikasi lainnya pada masa nifas utamanya dengan ruptur pada perineum dapat dilakukan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan antara lain perawatan perineum secara intensif. Asuhan masa nifas ini sangat diperlukan terutama pada 24-48 jam pertama. Perdarahan pasca persalinan, infeksi masa nifas, demam, payudara berubah merah, panas, nyeri, infeksi pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium adalah perubahan yang dapat terjadi pada masa nifas. Sedangkan menurut Rukhiyah, A. (2011) asuhan kebidanan yang perlu dilakukan pada masa nifas yaitu seperti perawatan luka post partum untuk pencegahan infeksi dengan tehnik aseptik, untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu post partum.(Wulansari, dkk, 2016: 1). Oleh karena itu, menurut Afandi dkk, 2014. Ibu post partum membutuhkan mobilisasi dini untuk mempercepat pemulihan ruptur perineum, karena Mobilisasi yang cukup lebih berpeluang mempercepat kesembuhan luka perineum dibandingkan dengan mobilisasi yang kurang. (Wulansari, dkk, 2016: 2).

Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada periode bulan Mei tahun 2014 di Puskesmas Susukan Kabupaten Semarang, terdapat 54 Ibu bersalin,

sebanyak 13 ibu bersalin dengan luka jahitan derajat satu dan 41 ibu bersalin dengan luka jahitan derajat dua.(Yuni, dkk, 2014: 1). Survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di BPM Sri Wardani Desa Kajoran, salah satu BPM di wilayah Kabupaten Klaten, di temukan bahwa dari 7 ibu post partum, 5 orang mengalami laserasi perineum dengan klasifikasi laserasi dari derajat 1 sampai 2. Pada ibu post partum yang megalami laserasi perineum tersebut, 1 orang meraskan nyeri ringan, 3 orang merasakan nyeri sedang dan 1 orang merasakan nyeri berat.

Menurut data yang diperoleh dari Puskesmas Tanah Jambo Aye pada tahun 2012 dari bulan Januari sampai bulan Maret ibu bersalin yang melahirkan sebanyak 140 orang, dari 140 orang tersebut yang mengalami laserasi pada persalinan sebanyak 30 orang.(Rosmawar, 2013: 28). Berdasarkan hasil survei di BPM Hj. Wiwin Wintarsih Kota Tasikmalaya, data yang diperoleh dari bulan Januari- April 2016 terdapat 34 ibu bersalin, 20 diantaranya mengalami luka pada perineum, dan mengalami rupture derajat II.(Wulansari, dkk, 2016: 3).

Berdasarkan data rekam medik di puskesmas rawat inap Somba Opu Gowa, data yang diperoleh dari bulan Januari 2016 - April 2017 terdapat 359 ibu bersalin, 263 diantaranya mengalami luka jahitan perineum, dan mengalami nyeri pada luka jahitan perineum yang dialami. Dari uraian latar belakang, maka penulis tertarik membahas secara spesifik mengenai masalah ini dengan menggunakan metode pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum dengan Nyeri luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Adapun ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis ini adalah Penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa.

C. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis ini tujuan yang di harapkan adalah sebagai Berikut :

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan kebidanan Post Partum dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan sesuai dengan kewenangan bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian data pada ibu dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual pada ibu dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial pada ibu dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa
- d. Diidentifikasikannya tindakan segera dan kolaborasi pada ibu dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa
- e. Direncanakannya asuhan kebidanan pada ibu dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa.

- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada ibu dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa.
- g. Dievaluasikannya hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa
- h. Dilakukannya pendokumentasian semua hasil asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan pada ibu dengan Nyeri Luka Perineum (Tingkat II) di Puskesmas Somba Opu Gowa

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin .Makassar

2. Manfaat Ilmiah

Diharapkan Karya Tulis ini dapat memperluas pola pikir dan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan inspirasi penulis selanjutnya.

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan acuan atau pedoman bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmia selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman yang berharga penerapan Manajemen Asuhan kebidanan khususnya nyeri luka Perineum.

E. Metode Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ini, berdasarkan teori Ilmiah yang dipadukan dengan praktek dan pengalaman penulis memerlukan data yang objektif dan relevan dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisa dalam pemecahan masalah. Untuk itu penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku/literatur dan data internet yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sebagai dasar teori yang digunakan dalam pembahasan Karya Tulis ilmiah ini.

2. Studi Kasus

Yaitu melaksanakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang meliputi pengkajian analisa, perumusan diagnosa masalah aktual dan potensial, merencanakan tindakan segera dan kolaborasi. menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi serta mendokumentasikan asuhan kebidanan Untuk memperoleh data/informasi akurat, penulis menggunakan teknik:

a) Anamnese

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, suami, dan keluarga yang terlibat langsung guna mendapatkan data yang diperlukan untuk memberikan asuhan kebidanan pada klien tersebut.

b) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin diperolehnya data yang lengkap mulai dan kepala sampai kaki (head to toe)

meliputi inspeksi palpasi, auskultasi, perkusi dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan diagnostik lainnya dengan menggunakan format yang telah di susun sebelumnya.

c) Pengkajian Psikososial

Pengkajian status emosional, Respon terhadap kondisi serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan, lingkungan, serta pengetahuan tentang kesehatan.

3. Studi Dokumenter

Studi dokumenter dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, pegawai, petugas laboratorium. Dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam menyelesaikan Karya Tulis ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan bidan yang menangani langsung klien tersebut serta mengadakan diskusi dengan dosen pengasuh pembimbing Karya Tulis ini.

F. Sistematika Penulisan

Pada bab I ini terdiri dari latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan yang terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Pada bab II terdiri dari tinjauan umum tentang masa nifas yang terbagi atas pengertian masa nifas, tujuan asuhan masa nifas, periode masa nifas, peran dan tanggung jawab bidan pada masa nifas, perubahan masa nifas yang terbagi atas dua yaitu fisiologi dan psikologi,

program dan kebijakan teknis masa nifas, tanda bahaya masa nifas, perawatan masa nifas, dan infeksi masa nifas serta tinjauan tentang nyeri luka/ruptur perineum yang terdiri dari poin pertama yaitu nyeri yang terdiri dari pengertian nyeri, nyeri perineum pasca salin, dampak nyeri perineum, dan intensitas nyeri. Poin kedua yaitu terdiri dari pengertian ruptur perineum, faktor penyebab ruptur perineum, tingkatan ruptur perineum, dan perawatan ruptur perineum.

Serta proses manajemen asuhan kebidanan dan pendokumentasian asuhan kebidanan terdiri dari langkah I (pengumpulan data dasar), Langkah II (Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual), Langkah III (Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial), Langkah IV (Tindakan Segera/Kolaborasi Asuhan Kebidanan), Langkah V (Rencana Asuhan Kebidanan), Langkah VI (Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan), Langkah VII (Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan Mendokumentasikan Hasil Asuhan Kebidanan). Dan tinjauan nifas dengan nyeri luka perineum menurut islam.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan umum Tentang Masa Nifas

1. Pengertian Masa Nifas

Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu.

Masa nifas merupakan masa selama persalinan dan segera setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil yang normal. Masa nifas adalah masa setelah seorang ibu melahirkan bayi yang dipergunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali yang umumnya memerlukan waktu 6-12 minggu.(Nugroho. dkk, 2014: 1)

2. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Asuhan masa nifas bertujuan menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikis; melaksanakan skrining yang komprehensif; mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu dan bayi; memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi, perawatan bayi agar tetap sehat; dan memberikan pelayanan keluarga berencana.(Roito. Dkk, 2013: 1)

3. Peran dan Tanggung Jawab Bidan Pada Masa Nifas

Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian asuhan post partum. Adapun peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas antara lain:

- a) Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas.
- b) Memberikan dukungan serta memantau kesehatan fisik ibu dan bayi.
- c) Mendukung dan memantau kesehatan psikologis, emosi, social, serta memberikan semangat kepada ibu.
- d) Sebagai promotor antara ibu dan bayi serta keluarga.
- e) Memantau ibu dalam menyusui bayinya dan mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman.
- f) Membangun kepercayaan diri ibu dalam perannya sebagai ibu.
- g) Membuat kebijakan, perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak mampu melakukan kegiatan administrasi.
- h) Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan.
- i) Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara pencegahan perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman.
- j) Melakukan manajemen asuhan dengan mengumpulkan data, menetapkan diagnosan dan rencana tindakan serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas.

k) Memberikan asuhan secara profesional.(Nurjannah. dkk. 2013: 3-4).

4. Periode Masa Nifas

Adapun periode masa nifas yaitu sebagai berikut

- a. Puerperium dini, suatu masa kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan.
- b. Puerperium intermedial, suatu masa dimana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih enam minggu.
- c. Remote puerperium, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi.(Maritalia. 2014: 12).

5. Perubahan Masa Nifas

a. Perubahan fisiologi

1. Perubahan Uterus

Involusio uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil. Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil. Perubahan-perubahan normal pada uterus selama postpartum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan normal uterus selama post partum

Involusio uteri	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus	Diameter Uterus
Plasenta lahir	Setinggi pusat	1000 gram	12,5 cm
7 hari (minggu 1)	Pertengahan pusat dan simpisis	500 gram	7,5 cm
14 hari (minggu 2)	Tidak teraba	350 gram	5 cm
6 minggu	Normal	60 gram	2,5 cm

Sumber : Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb III)

2. Lokia

Adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa nifas, biasanya berlangsung 40 hari. Tahapan-tahapan masa nifas ini, vagina akan terus-menerus mengeluarkan darah. Biasanya darah tersebut mengandung trombosit, sel-sel tua, sel-sel mati (nekrosis), serta sel-sel dinding rahim (endometrium), yang disebut lokia. Ibu pasca melahirkan akan mengalami empat tahapan perubahan lokia dalam masa nifas ini. (Marmi, 2012: 140)

- 1) Merah segar (Lokia rubra). Tahapan pertama ini akan berlangsung selama tiga hari pertama setelah melahirkan. Darah pada tahapan pertama ini berpotensi mengandung banyak kuman penyakit.
- 2) Merah dan berlendir (Lokia Sanguinolenta). Untuk tahapan kedua ini biasanya berlangsung selama satu hingga dua minggu.
- 3) Kuning kecoklatan lalu merah muda (Lokia Serosa). Cairan yang berwarna seperti ini biasanya mulai keluar dua minggu hingga satu bulan setelah melahirkan

4) Kekuningan lalu bening (Lokia Alba). Cairan ini keluar sekitar dua minggu, yakni dari minggu keempat sampai minggu keenam. Bila cairan lochia sudah berwarna bening, tandanya masa nifas berlangsung normal. Kebersihan yang kurang terjaga dimasa nifas bukan hanya dapat mengundang infeksi pada vagina tapi juga rahim.

3. Perubahan vagina dan perineum

a) Serviks

Setelah persalinan, bentuk serviks agak menganga seperti corong. Bentuk ini disebabkan oleh corpus uteri yang dapat mengadakan kontraksi sedangkan serviks tidak berkontraksi. Warna serviks merah kehitam-hitaman karena pembuluh darah. Konsistensinya lunak, kadang-kadang terdapat perlukaan- perlukaan kecil. Setelah bayi lahir, tangan masih bisa masuk ke rongga rahim, setelah 2 jam dapat dilalui oleh 2-3 jam dan setelah 7 hari dapat dilalui dengan 1 jari.

b) Vagina

Pada minggu ke tiga, vagina mengecil dan timbul vugae (lipatan- lipatan atau kerutan- kerutan) kembali.

c) Perubahan pada perineum

Robekan perineum umumnya terjadi di garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin melewati pintu bawah panggul dengan ukuran yang lebih besar. Dalam penyembuhan luka memiliki fase-fase pada keluhan yang dirasakan ibu pada hari pertama sampai hari ke-3 ini merupakan fase inflamasi, dimana pada fase ini ibu akan merasakan nyeri pada luka jahitan di perineum, hal ini akan

terjadi sampai 4 hari post partum.(Wulansari, dkk. 2016: 11)

4. Perubahan Tanda-tanda Vital

a) Suhu badan

Dua puluh empat jam post partum suhu badan akan naik sedikit (37,5-38oC) sebagai akibat kerja keras waktu melahirkan, kehilangan cairan dan kelelahan. Apabila keadaan normal, suhu badan menjadi biasa. Biasanya hari ke-3 suhu badan naik lagi karena ada pembentukan ASI dan payudara menjadi bengkak, berwarna merah karena banyaknya ASI. Bila suhu tidak turun kemungkinan adanya infeksi pada endometrium, mastitis, traktus genitalia, atau sistem lain.

d) Nadi

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80x/menit. Sehabis melahirkan denyut jantung biasanya lebih cepat.

e) Tekanan Darah

Biasanya tidak berubah, kemungkinan tekanan darah akan rendah setelah melahirkan karena ada perdarahan. Tekanan darah tinggi pada post partum menandakan terjadinya preeklamsi post partum.

f) Pernafasan

Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas.(Bahiyatun, 2013: 62)

b. Perubahan Psikologis Ibu Masa Nifas

Perubahan yang mendadak dan dramatis pada status hormonal menyebabkan ibu yang berada dalam masa nifas menjadi sensitif terhadap

faktor-faktor yang dalam keadaan normal mampu diatasinya. Disamping perubahan hormonal, cadangan fisiknya sering sudah terkuras oleh tuntutan kehamilan serta persalinan, keadaan kurang tidur, lingkungan yang asing baginya dan oleh kecemasannya akan bayi, suami atau anak-anaknya yang lain. Adaptasi psikologi masa nifas yang terbagi atas 4 tahapan yaitu:

- 1) *Taking On* : pada fase ini disebut meniru, pada *takin in fantasi* wanita tidak hanya meniru tapi sudah membayangkan peran yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Pengalaman yang berhubungan dengan masa lalu dirinya (sebelum proses) yang menyenangkan, serta harapan untuk masa yang akan datang. Pada tahap ini wanita akan meninggalkan perannya pada masa lalu.
- 2) *Taking In* : periode ini terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan, ibu baru pada umumnya pasif dan tergantung, perhatiannya tertuju pada tubuhnya. Peningkatan nutrisi ibu mungkin dibutuhkan karena selera makan ibu biasanya bertambah, kurangnya nafsu makan menandakan tidak berlangsung normal.
- 3) *Taking Hold* : periode ini berlangsung pada hari 2-4 post partum ibu menjadi orang tua yang sukses dengan tanggung jawab terhadap bayinya. Pada masa ini ibu akan sensitif dan merasa tidak mahir melakukan hal-hal tersebut. Cenderung menerima nasihat bidan.
- 4) *Letting Go* : periode yang biasanya terjadi setiap ibu pulang kerumah, pada ibu yang bersalin diklinik dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarganya. Dan depresi post partum terjadi pada periode ini. (Sugihantono. 2015: 137-138)

6. Program Dan Kebijakan Teknis Masa Nifas

Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas di lakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani Masalah-masalah yang terjadi.(Roito, dkk. 2013: 2-4)

Tabel 2.2 Program dan kebijakan teknis masa nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri - Mendeteksi dan merawat penyebablain perdarahan rujuk bila perdarahan berlanjut. - Memberi konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena anaiomi Uteri - Pemberian ASI awal - Melakukan hubungan antar ibu dan bayi baru lahir - Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia
		<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan involusio uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau. - Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal

		- Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat
2	6 hari setelah persalinan	- Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan tanda-tanda penyulit - Membenarkan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat. menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari
3	2 minggu setelah persalinan	Sama seperti diatas (6 hari setelah persalinan)
4	6 minggu setelah persalinan	- Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia alami pada bayinya - Memberikan konseling untuk KB secara dini

Sumber : Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Deteksi Dini Komplikasi

7. Tanda Bahaya Masa Nifas

Tanda-tanda bahaya masa nifas menurut (Maulani, dkk. 2016: 22-23) antara lain:

- Perdarahan hebat atau peningkatan darah secara tiba-tiba atau pembalut penuh dalam waktu setengah jam telah mengganti 2 kali pembalut.
- Pengeluaran cairan vaginal dengan bau busuk
- Rasa nyeri diperut bagian bawah atau punggung
- Sakit kepala yang terus menerus atau, nyeri epigastrik, atau masalah penglihatan
- Pembengkakan pada wajah dan tangan

- f) Demam, muntah, rasa sakit pada waktu pembuangan air seni, atau merasa tidak enak badan
- g) Payudara yang merah, panas, atau sakit.

8. Perawatan Masa Nifas

Perawatan masa nifas dimaksudkan agar pada saat keluar dan rumah sakit. Ibu berada dalam keadaan sehat dengan anak yang serial dan mengetahui cara merawat anaknya. Tujuan ini akan tercapai jika ibu mendapatkan cukup istirahat menghindari infeksi yang dapat menghambat kesembuhan jaringan yang cedera, dapat melaksanakan pemberian ASI secara memuaskan dan belajar merawat bayinya, mengganti pakaian, memberikan susu dan membujuk bayinya ketika rewel atau menangis. adapun hal-hal yang perlu diperhatikan selama perawatan masa nifas antara lain:

a) Mobilisasi Dini (*early mobilization*)

Kini perawatan masa nifas lebih aktif dengan di anjurkan untuk melakukan pergerakan (*early mobilization*). Perawatan mobilisasi dini mempunyai keuntungan

- 1) Melancarkan pengeluaran lochea, mengurangi infeksi perineum
- 2) Mempercepat involusio alat kandungan
- 3) Memperlancar fungsi alat gastrointestinal dan perkemihan
- 4) Meningkatkan kelancaran peredaran darah, sehingga mempercepat fungsi

ASI dan pengeluaran sisa metabolisme

b) Rawat gabung (*Rooming in*)

Perawatan ibu dan bayi dalam satu ruangan bersama-sama sehingga ibu

lebih banyak memperhatikan bayinya, segera dapat memberikan ASI, sehingga kelancaran pengeluaran ASI lebih terjamin.

c) Gizi

Ibu menyusui harus mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari (anjurkan ibu untuk minum setia kali menyusui) . Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya 40 hari pasca persalinan. Minum kapsul vitamin A (200.000 unit) agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI.

d) Kebersihan diri

Anjurkan kebersihan seluruh tubuh, mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ia mengerti untuk membersihkan daerah disekitar vulva terlebih dahulu, dari depan kebelakang, baru kemudian membersihkan daerah disekitar anus. Nasehatkan ibu untuk membersihkan diri setiap kali selesai buanag air kecil atau besar.

Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain setidaknya dua kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik, dan dikeringkan dibawah matahari atau disetrika sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari daerah luka.

e) Istirahat

Menurut Dewi (2011), Istirahat pada ibu selama masa nifas beristirahat

cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Kebutuhan istirahat sangat dibutuhkan oleh ibu beberapa jam setelah melahirkan. Kebutuhan tidur rata-rata orang dewasa 7-8 jam per 24 jam. Kurangnya istirahat dapat mempengaruhi ibu dalam beberapa hal: mengurangi jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan, menyebabkan depresi dan ketidak mampuan mengurus bayi dan dirinya sendiri.

f) Perawatan payudara

Perawatan payudara telah dimulai sejak wanita hamil supaya puting susu lemas, tidak keras, dan kering, sebagai persiapan untuk menyusui bayinya. Sebelum menyusui, lakukan masase dan bersihkan areola pada puting susu barulah bayi disusui.

g) Laktasi

Kelenjar *mammae* telah dipersiapkan semenjak kehamilan umumnya produksi air susu ibu (ASI) baru terjadi hari kedua atau ketiga pasca persalinan pada hari pertama keluar kolostrum. Cairan kuning yang lebih kental dan pada air susu mengandung banyak protein albumin, globulin, dan kolostrum.

h) Hubungan seksual

Setelah 2 minggu post partum, hubungan seksual dapat dilaksanakan kembali berdasarkan keinginan dan kenyamanan pasien ibu harus diberitahu bahwa menyusui akan menyebabkan periode supresi produksi estrogen yang memanjang sehingga yang mengakibatkan atrofi dan kekeringan vagina keadaan fisiologis ini akan menyebabkan penurunan lubrikasi vagina selama perangsangan hormonal.

i) Keluarga berencana

Idealnya pasangan harus menunggu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum ibu hamil kembali setiap pasangan harus menentukan sendiri kapan dan bagaimana mereka ingin merencanakan tentang keluarganya. (Bahiyatun, 2013)

j) Latihan senam nifas

Menurut sari dan rimadhini (2014) latihan/senam nifas penting dilakukan untuk mengembalikan otot-otot perut dan panggul menjadi normal. Ibu merasa lebih kuat dan ini menyebabkan otot perutnya menjadi lebih kuat sehingga mengurangi rasa sakit pada punggung. Tujuan senam nifas:

- 1) Membantu mempercepat proses pemulihan ibu
- 2) Mempercepat proses involusi uterus
- 3) Membantu memulihkan dan mengencangkan otot panggul, perut dan perineum
- 4) Memperlancar pengeluaran lochea
- 5) Membantu mengurangi rasa sakit
- 6) Mengurangi kelainan dan komplikasi masa nifas
- 7) Merelaksasikan otot-otot yang menunjang proses kehamilan dan persalinan.

Manfaat senam nifas adalah :

- 1) Membantu memperbaiki sirkulasi darah.
- 2) Memperbaiki sikap tubuh dan punggung pasca persalinan.
- 3) Memperbaiki otot tonus, pelvis dan pereganga otot abdomen.
- 4) Membantu ibu lebih rileks dan segar pasca persalinan.
- 5) Memperbaiki dan memperkuat otot panggul. (Wulansari, dkk. 2016: 14-15)

9. Infeksi Nifas

Menurut wijaya 2011, nfeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genetalia, terjadi sesudah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu sampai 38 °C atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan dengan mengecualikan 24 jam pertama yang disebabkan oleh organisme yang menyerang bekas implantasi plasenta atau laserasi akibat persalinan adalah penghuni normal serviks dan jalan lahir mungkin juga dari luar. Infeksi nifas di bagi dengan 2 golongan yaitu:

- a) Infeksi yang terbatas pada perineum, vulva, vagina, dan seviks.
- b) Penyebaran dan tempat-tempat tersebut melalui vena-vena, jalan limfe. dan permukaan endometrium. (Tulas, dkk, 2017: 2).

B. Tinjauan Tentang Nyeri Luka/Ruptur Perineum

1. Nyeri

a. Pengertian Nyeri

Menurut *Internasional association for study of pain (IASP)*, nyeri adalah sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadi kerusakan. (Utami, 2015: 30)

b. Nyeri Perineum Pascasalin

Nyeri perineum (*perineal pain*) didefinisikan sebagai nyeri yang terjadi pada badan perineum (*perineal body*), daerah otot dan jaringan fibrosa yang menyebar dari simpisis pubis sampai ke coccygis oleh karna adanya robekan yang terjadi baik yang disengaja ataupun ruptur spontan. Kondisi nyeri

ini dirasakan ibu berbeda dengan nyeri lainnya. Nyeri perineum cenderung lebih jelas dirasakan oleh ibu dan bukan seperti rasa nyeri dialami saat berhubungan (*intercourse*). Nyeri perineum akan dirasakan setelah persalinan sampai beberapa hari persalinan. Nyeri ini berbeda dengan dispareunia yaitu nyeri atau rasa tidak nyaman yang terjadi selama hubungan seksual (*sexual intercourse*), termasuk nyeri saat penetrasi. (Utami, 2015: 30)

c. Dampak Nyeri Perineum

Menurut penelitian Rahayuningsih (2013) akibat dari laserasi perineum yang terjadi pada ibu post partum adalah adanya nyeri perineum sebanyak 70,9%. Dampak nyeri perineum tersebut adalah stress, traumatik, takut terluka, tidak nafsu makan, sulit tidur dan depresi, Sehingga ibu post partum mengalami keterlambatan mobilisasi, gangguan rasa nyaman pada saat duduk, berdiri, berjalan dan bergerak, sehingga berdampak pada gangguan istirahat ibu post partum dan keterlambatan kontak awal antara ibu dan bayinya. (Utami, 2015: 31)

d. Intensitas Nyeri

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri yang dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual dan kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda. Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif yang paling mungkin adalah menggunakan respon fisiologik tubuh terhadap nyeri itu sendiri.

Skala intensitas nyeri numerik yaitu :

1. 0-3 : Tidak nyeri
2. 4-8 : Nyeri sedang, secara objektif klien dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendiskripsikannya, dapat mengikuti perintah dengan baik.
3. 9-10 : Nyeri hebat, secara objektif terkadang klien tidak dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendiskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang. (Utami, 2015: 27)

2. Luka/Ruptur Perineum

a. Pengertian Luka/Ruptur Perineum

1. Ruptur perineum adalah luka pada perineum yang di akibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat proses persalinan
2. Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada perineum sewaktu persalinan
3. Robekan yang terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan juga persalinan lanjutan yang mengakibatkan terputusnya kontinuitas jaringan pada perineum
4. Robekan perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama, dan tidak jarang juga persalinan berikutnya. bentuknya semua laserasi perineum, kecuali yang sangat superficial akan disertai perlukaan vagina bagian bawah dengan derajat yang bervariasi. Robekan semacam itu mencapai kedalaman tertentu itu sehingga mengenai muskulus spingterani dapat

meluas dinding vagina dengan berbagai kedalam. (Nurasiah. dkk. 2014).

b. Faktor Penyebab Ruptur Perineum

a) Faktor ibu

1) Partus presipitatus

Adalah persalinan yang terjadi terlalu cepat yakni kurang dari tiga jam. Sehingga seorang petugas belum siap untuk menolong persalinan dan ibu mengejan kuat tidak terkontrol. Kepala janin terjadi defleksi terlalu cepat keadaan ini akan memperbesar kemungkinan ruptur perineum.

2) Primigravida

Pada primigravida pemaksaan ditemukan tanda-tanda perineum utuh, vulva tertutup. Himen pervoratus vagina sempit dengan rugae pada persalinan akan terjadi penekanan pada jalan lahir lunak oleh kepala janin. Dengan perineum yang masih utuh pada primi akan mudah terjadi robekan perineum

3) Varikosa pada pelvis maupun jaringan parut pada perineum dan vagina

Jaringan parut pada jalan lahir akan menghalangi atau menghambat kemajuan persalinan, sehingga episiotomi pada kasus ini akan dapat dipertimbangkan

4) Persalinan operatif pervaginam (ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, versi dan ekstraksi, serta embriotomi). Episiotomi tidak melindungi perineum, malahan menyebabkan inkontinensia sfingter anus dengan cara meningkatkan resiko robekan derajat tiga dan empat

b) Faktor janin

1) Berat Badan Bayi Baru lahir

Berat badan lahir adalah berat badan bayi yang ditimbang 24 jam pertama kelahiran. Semakin besar berat bayi yang dilahirkan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum. Bayi besar adalah bayi yang begitu lahir memiliki bobot 4000 gram.

2) Presentasi

Presentasi digunakan untuk menentukan bagian yang ada di bagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pada pemeriksaan dalam.

Macam- macam presentasi dapat dibedakan menjadi:

a) Presentasi Muka

Presentasi muka atau presentasi dahi letak janin memanjang, sikap ekstensi sempurna dengan diameter pada waktu masuk panggul atau diameter submento bregmatika sebesar 9,5 cm. Bagian terendahnya adalah bagian antara glabella dan dagu.

b) Presentasi Dahi

Presentasi dahi adalah sikap ekstensi sebagian (pertengahan), hal ini berlawanan dengan presentasi muka yang ekstensinya sempurna. Bagian terendahnya adalah daerah diantara margo orbitalis dengan bregma dengan penunjuknya adalah dahi.

c) Presentasi Bokong

Presentasi bokong memiliki letak memanjang dengan kelainan dalam

polaritas. Panggul janin merupakan kutub bawah dengan penunjuknya adalah sacrum.

c) Faktor penolong persalinan

Pimpinan persalinan yang salah merupakan salah satu penyebab terjadinya ruptur perineum, kerja sama dengan ibu dan penggunaan perasal manual yang tepat dapat mengatur kecepatan kelahiran bayi dan mencegah terjadinya laserasi pengendalian kecepatan dan pengaturan diameter kepala saat melalui introitus vagina dan perineum dapat mengurangi kemungkinan terjadinya robekan. (Nurasiah. dkk. 2014).

b) Tingkatan Ruptur perineum

Ruptur perineum dibagi atas 4 tingkatan (Baston dan Jennifer, 2013: 170) yaitu:

Table 2.3: derajat robekan/laserasi perineum

a) Tingkat I	Robekan terjadi hanya pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum
b) Tingkat II	Robekan mengenai selaput lendir vagina dan otot perineum transversalis. tetapi tidak mengenai otot sfingterani
c) Tingkat III	Robekan mengenai perineum sampai dengan otot sfingterani
d) Tingkat IV	Robekan mengenai perineum sampai dengan otot sfingterani dan mukosa vagina.

Sumber : (Midwifery Essentials: Persalinan, Volume 3: 170)

c) Perawatan Ruptur Perineum

Perawatan perineum adalah pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan daerah antara paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu yang dalam masa antara

kelahiran plasenta sampai kembalinya organ genetik seperti waktu sebelum hamil. Adapun tujuan dari perawatan luka perineum adalah mencegah terjadinya infeksi sehubungan dengan penyembuhan jaringan, untuk mencegah terjadinya infeksi didaerah vulva, perineum, maupun didalam uterus. Untuk penyembuhan luka perineum (jahitan perineum), untuk kebersihan perineum dan vulva. Penyembuhan luka perineum adalah mulai membaiknya luka perineum dengan terbentuknya jaringan baru yang menutupi luka perineum dalam jangka waktu 6-7 hari post partum (Lailiyana, dkk. 2012: 78).

Waktu perawatan perineum sebaiknya dilakukan saat (Hasanah dan Irma Damayanti, 2012: 1)

a) Saat mandi

Pada saat mandi, ibu post partum pasti melepas pembalut, setelah terbuka maka ada kemungkinan terjadi kontaminasi bakteri pada cairan yang tertampung pada pembalut, untuk itu maka perlu dilakukan penggantian pembalut, demikian pula pada perineum ibu, untuk itu dilakukan pembersihan perineum.

b) Setelah buang air kecil

Pada saat buang air kecil, kemungkinan besar terjadi kontaminasi air seni pada rektum akibatnya dapat memicu pertumbuhan bakteri pada perineum. Untuk itu, dilakukan pembersihan perineum.

c) Setelah buang air besar

Pada saat buang air besar, diperlukan pembersihan sisa-sisa kotoran di sekitar anus, untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dari anus keperineum yang letaknya bersebelahan maka diperlukan proses pembersihan anus dan

perineum secara keseluruhan.

Menurut Rahayu (2012) Perawatan luka perineum yaitu :

1. Membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu dari depan ke belakang, setelah BAB dan BAK, dengan menggunakan air dingin dan sabun.
2. Mengganti pembalut 2x sehari.
3. Merawat luka perineum dengan tehnik septik aseptik yaitu dibersihkan dengan air bersih dan kassa steril.
4. Mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan kelamin.
5. Tetap menjaga personal hygiene

C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Asuhan Kebidanan

Menurut Tresnawati (2012), Prosedur tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dalam lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan dengan memperhatikan pengaruh-pengaruh sosial, budaya, psikologis, emosional, spiritual, fisik, etik, dan kode etik serta hubungan interpersonal dan hak dalam mengambil keputusan dengan prinsip kemitraan dengan perempuan dan mengutamakan keamanan ibu, janin dan penolong serta kepuasan perempuan dan keluarganya. (Wulansari, dkk, 2016: 22).

a) Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. (Roito, dkk. 2013: 95).

Manajemen asuhan kebidanan menurut varney (7 Langkah), meliputi :

1) Langkah I : pengumpulan data/ analisa data

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Yang termasuk data subjektif antara lain biodata, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan dan nifas, biopsikologi spritual, pengetahuan klien.

Data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, hasil laboratorium dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus. Data objektif terdiri dari pemeriksa fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi), pemeriksaan penunjang (laboratorium, catatan baru dan sebelumnya).

Data objektif adalah menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik pasien. Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum, pada saat dilakukan pemeriksaan fisik pasien yang meliputi: kadaan umum ibu baik serta kesadaran composmentis. Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, pemeriksaan fisik yang terfokus yaitu mata dari hasil pemeriksaan inspeksi konjungtiva merah muda serta sclera putih (tidak ikterus). Wajah dari hasil pemeriksaan inspeksi tidak ada colasma gravidarum dan hasil pemeriksaan palpasi tidak ada oedema. Payudara dari

hasil pemeriksaan inspeksi puting susu menonjol dan terdapat hiperpigmentasi areola mammae dan hasil pemeriksaan palpasi tidak ada nyeri tekan, massa, dan benjolan, serta pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI. Abdomen dari hasil pemeriksaan inspeksi tidak ada luka bekas operasi dan hasil pemeriksaan palpasi tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 1 jari dibawah pusat. Genetalia dari hasil pemeriksaan inspeksi tidak ada varices, tampak pengeluaran lochia rubra, tampak jahitan pada perineum rupture tingkat II (jumlah jahitan sebanyak 6) masih basah dan hasil pemeriksaan palpasi tidak ada oedema. Ekstremitas dari hasil pemeriksaan inspeksi tidak ada varices, jari-jari ekstremitas atas dan bawah lengkap dan hasil pemeriksaan palpasi tidak ada oedema. Serta pemeriksaan penunjang (laboratorium) Hb 10 gr%.

2) Langkah II : Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan.

Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum dilakukan identifikasi diagnosa kebidanan yaitu pada data subjektif ibu mengeluh perutnya terasa mules dan nyeri pada luka perineum. Pada data objektif keadaan perineum ibu tidak terdapat tanda-tanda infeksi kemerahan atau berbau. Dan kebutuhan pada ibu nifas dengan perawatan luka penjahitan perineum post partum yaitu cara mengurangi rasa nyeri.

3) Langkah III : Identifikasi diagnosa/ masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap diagnosa atau masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum masalah yang biasa timbul jika nyeri luka perineum tidak diatasi dapat menimbulkan infeksi.

4) Langkah IV : Tindakan emergensi/ kolaborasi

melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien.

Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum untuk mengantisipasi tanda-tanda infeksi dapat dilakukan pemberian analgetik atau anti inflamasi dan antibiotik bila perlu, memberikan nasehat tentang kebersihan dan pemakaian pembalut yang bersih dan sering diganti.

1. Langkah V : Rencana tindakan (merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi.

Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum rencana asuhan

yang akan diberikan yaitu mengobservasi keadaan umum, tanda-tanda vital, observasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lochia, observasi tanda-tanda infeksi pada luka perineum, mengajarkan ibu teknik relaksasi untuk mengatasi nyeri yaitu menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut jika timbul rasa sakit, menganjurkan pada ibu agar menjaga kebersihan vulva (genitalia), yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap selesai BAK dan BAB, menganjurkan pada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang terutama makanan yang mengandung protein seperti telur, ikan atau daging terutama ikan gabus yang sangat baik untuk proses penyembuhan luka, sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan, serta menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi obat oral yang diberikan sesuai dosisnya (Amoxicilin 3x1, vit. C 3x1, tablet Fe 1x1)

5) Langkah VI : Implementasi (melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang di uraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Walau bidan tidak melakukan sendiri ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya.

Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan pada langkah ke lima

6) Langkah VII : Evaluasi.

Pada langkah ini dilakukan evaluasi ke efektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dianggap efektif jika memang benar dalam pelaksanaannya.

Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum mengevaluasi kembali dari asuhan yang telah diberikan yaitu tanda-tanda vital normal, TFU 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras, lochia rubra, tidak terdapat tanda-tanda infeksi, ibu mengerti dan bersedia melakukan hal yang telah dianjurkan, dan ibu bersedia mengkonsumsi obat yang telah diberikan.

b) Metode yang digunakan dalam pendokumentasian data perkembangan asuhan kebidanan ini adalah SOAP :

1. S : Subyektif

Data dari pasien didapat dari anamnesa yang merupakan langkah I Varney.

2. O : Obyektif

Hasil pemeriksaan fisik pemeriksaan diagnostik dan pendukung lain untuk mendukung asuhan.

3. A : Assesment atau analisa data

Kesimpulan apa yang dibuat dari data subyektif dan obyektif tersebut merupakan langkah II, III, IV Varney.

4. P : Planning atau penatalaksanaan

Menggambarkan pelaksanaan dari tindakan dan evaluasi perencanaan

berdasarkan assessment sebagai langkah V, VI, VII Varney.

Adapun planning yang dapat dilakukan pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum adalah :

Kunjungan I (6-8 jam setelah persalinan): Mengobservasi tanda- tanda vital ibu serta mengobserfasi kontraksi uterus dan TFU ibu, mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genetalianya, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, menganjurkan pada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya, melakukan hubungan antar ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat dengan cara memandikan dan membedong bayi.

Kunjungan II (6 hari setelah persalinan): Memastikan involusio uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau, Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal, memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan tanda-tanda penyulit, membenkan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tadi pusat. Menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.

Kunjungan ke III (2 minggu setelah persalinan): yang dilakukan pada kunjungan ketiga sama halnya dengan kunjungan kedua. Kunjungan ke IV (6 minggu setelah persalinan): Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia alami, memberikan konseling untuk KB secara dini.

D. Tinjauan Nifas dengan nyeri luka perineum Menurut Islam

Nifas adalah darah yang keluar dari perempuan ketika dan setelah melahirkan, sekalipun wanita itu melahirkan sebelum genap bulan kandungan, seperti yang terjadi pada kondisi keguguran. Tidak ada batasan waktu tertentu bagi nifas, seandainya seorang wanita melahirkan, lalu darahnya berhenti sama sekali setelah melahirkan, walau hanya sejam atau beberapa menit saja, maka selesailah nifasnya dan wajiblah ia melakukan apa yang wajib dilakukan oleh wanita-wanita yang dalam keadaan suci, yaitu shalat, puasa, dan sebagainya. (Asy-Syarbashi, 2007: 35-36)

1. Hal-hal yang dilarang dilakukan wanita yang sedang nifas.

a) Shalat

Ummu Salamah ra mengatakan “orang yang nifas di masa Rasulullah tidak melakukan shalat selama empat puluh hari”. Mengomentari hadis ini, Imam at-Tirmidzi mengatakan, “ahli ilmu dari para sahabat Nabi saw para tabi’in dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita yang sedang nifas itu meninggalkan shalat selama empat puluh hari, kecuali apabila ia suci sebelum itu, maka ia harus segera mandi dan melakukan shalat”. Jika ia masih melihat darah selama empat puluh hari, kebanyakan ahli ilmu mengatakan bahwa setelah itu shalat tidak boleh lagi di tinggalkan.

Sekalipun dalam keadaan nifas wanita haram melakukan shalat, tetapi tidak perlu mengqada shalat-shalat yang luput pada waktu nifas. Itu adalah untuk menghilangkan kesulitan, karena shalat banyak berulang (waktunya dapat berulang). Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw berkata kepada Fatimah Binti abi

Hubaisy ra, “tinggalkanlah sholat selama hari-hari haidmu, kemudian (selesai setelah haid) mandilah dan sholatlah”. Hadis ini sekalipun berkaitan dengan haid juga mencakup nifas, karena nifas itu seperti haid berdasarkan ijmak sahabat.(Asy-Syarbashi, 2007: 36)

b) Puasa

Wanita yang sedang mendapatkan nifas dilarang menjalankan puasa dan untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya di hari yang lain.

c) Tawaf

Imam Ahmad, Turmuzi, dan Abu Daud telah meriwayatkan sebuah hadis dari ‘Abdullah Bin ‘Abbas ra, dimana dalam hadis tersebut Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya wanita yang sedang haid atau nifas boleh mandi dan berihram, dan kemudian melaksanakan semua amalan-amalan ibadah haji; hanya saja mereka tidak boleh melakukan tawaf disekitar Ka’bah hingga mereka suci.” Dari penjelasan hadis ini, para fukaha sepakat memahami bahwa seseorang yang melakukan tawaf mengelilingi Ka’bah harus suci dari hadas dan najis. Haram hukumnya seseorang yang mempunyai hadas kecil melakukan tawaf, sehingga ia berwudhu. Demikian juga haram hukumnya seseorang yang berhadas besar melakukan tawaf mengelilingi Ka’bah. Siti Aisyah ra meriwayatkan sebuah hadis, dimana dia mengatakan,

Rasulullah saw mendatangi sementara aku sedang menangis (itu terjadi tatkala Siti Aisyah tengah melaksanakan ibadah haji bersama Nabi saw), lalu Rasulullah saw bertanya kepadaku, “apakah engkau sedang haid? Aku menjawab, “Ya.” Rasulullah saw kemudian berkata, “sesungguhnya hal itu adalah ketetapan yang Allah SWT telah tetapkan bagi anak-anak perempuan Nabi Adam. Lakukanlah apa-apa yang harus dilakukan dalam

ibadah haji, namun jangan engkau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah hingga engkau mandi.

Hadis ini dengan jelas mengatakan bahwa seorang wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah hingga darah haid atau nifas berhenti dan kemudian mandi. (Asy-Syarbashi, 2007: 191-193)

- d) Menyentuh Mushaf dan Membawanya
- e) Larangan bersenggama (berhubungan seks) dan haram pula bagi suaminya untuk menikmati segala sesuatu dan tubuhnya antara pusat dan lutut. Larangan ini didasarkan pada firman Allah SWT.



Dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh Katakanlah “Haidh itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dan wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci Apabila mereka telah suci. Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2010).

Pertanyaan tersebut muncul karena pria-pria Yahudi menghindari wanita-wanita yang sedang haid, bahkan tidak makan bersama mereka dan meninggalkan rumah pada saat mereka sedang haid atau datang bulan. Dengan demikian, pertanyaan mereka pada hakikatnya bukan tentang apa itu haid. Tetapi bagaimana tuntutan Ilahi kepada suami pada saat istrinya sedang haid. Jawaban diatas sangat singkat namun menginformasikan tentang keadaan wanita yang sedang mengalami haid, dan bagaimana menghadapi mereka kala itu. Sesaat setelah turunnya ayat ini, Nabi saw. menyampaikan maksud jawaban Ilahi ini dengan menyatakan kepada para penanya dan seluruh umat islam, “lakukanlah segala sesuatu (yang selama ini dibenarkan) kecuali hubungan seks”. (Shihab, 2002: 582). Sedangkan segi kesehatan melarang berhubungan seks karena berhubungan seksual selama masa nifas mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko. Mudah terkena infeksi kuman yang hidup diluar akibat hubungan seksual ketika mulut rahim masih terbuka, bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi. Dan jika ibu mengalami masa nifas dan mendapatkan luka

jahitan ibu merasakan nyeri, maka disaat suami meyetubuhi istrinya pada saat masa nifas maka ibu mengalami nyeri yang bertambah, dan jahitan pada perineum dapat terlepas karena adanya gesekan dari alat kelamin suami. Karena itulah islam sangat berkeinginan agar kaum muslim terbiasa dengan kebersihan fisik dan jiwa, kesucian rohani dan jasmani, kemurnian hati dan tubuh. Allah SWT mengatakan *“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih”* (Q.S at-Taubah: 108). Allah juga mengatakan yang artinya *“Allah tidak berkehendak membuat kesulitan bagi kalian dalam menjalankan agama, tetapi ia berkehendak untuk mensucikan kalian”* (Q.S al-Ma’idah: 6). Sedangkan Rasulullah saw mengatakan *“ Bersuci itu adalah setengah dari iman”* (Asy-Syarbashi: 5)

Dapat dipahami bahwa nifas atau darah yang keluar setelah perempuan mengalami persalinan, ini merupakan siklus biologis normal yang dialami perempuan. Istilah nifas itu sendiri seperti haid, adalah bahasa yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia. Namun nifas dan haid memiliki arti tersendiri akan tetapi haid dan nifas mempunyai kesamaan larangan-larangan dalam islam. Adapun perbedaan arti nifas dan haid yaitu nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu sesudahnya atau sebelumnya (2 atau 3 hari) yang disertai dengan rasa sakit. Ibnu Taimiyah mengatakan: *“darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah nifas”* beliau tidak memberikan batasan 2 atau 3 hari, dan maksudnya adalah rasa sakit yang kemudian disertai kelahiran. Jika tidak, maka itu bukan nifas.(Dahri, 2015: 3)

Sedangkan haid menurut bahasa (etimologi) adalah mengalir. Seorang

wanita disebut haid jika darahnya mengalir. Adapun yang dimaksud disini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan. Warna hitam atau merah kental (tua) adalah warna darah haid menurut kesepakatan ulama. Darah yang berwarna kuning atau keruh yang dikatakan haid, hanya bila datangnya pada hari-hari haid. Jika pada hari-hari lain maka tidaklah dianggap haid, berdasarkan hadis Ummu' Athiyah r.a, ia berkata:

“kami tidak menganggap haid (darah) yang berwarna kuning dan keruh setelah suci”

Yang dimaksud haid telah selesai adalah seandainya dimasukkan kapas kedalam *farji* (kemaluan) sampai pada tempat yang tidak wajib dibasuh kala istinja' darah tidak keluar sama sekali. Tapi jika dioleskan kapas kedalam *farji* (kemaluan) masih ada darah walaupun sedikit tidak dapat dikatakan habis masa haid. Jika wanita itu dalam keadaan demikian melakukan mandi wajib, maka hukumnya tidak syah. (Saputra, 2015: 83)

Menurut penelitian Tumiran et al (2013), Terapi musik religi merupakan penggabungan antara terapi musik dengan spiritual. Penelitian yang telah dibuktikan oleh eksperimen mengukuhkan bahwa Al-Qur'an memiliki pengaruh yang menenangkan dalam 97% eksperimen. Dalam hal ini, eksperimen tersebut menunjukkan penurunan tingkat ketegangan system saraf otomatis. Sama seperti terapi musik, suara melodi dari AlQur'an memiliki efek terapeutik terhadap emosioanal, kognitif, dan kebutuhan sosial individu. Salah satu surah di dalam Al-Qur'an yang memiliki efek terapeutik adalah surah Ar-Rahman ayat 1- 78.

Dasar pemilihan surah dalam penelitian karena telah dibuktikan oleh penelitian Wahida et al (2015), yaitu terapi murottal Al-Qur'an surah dapat menurunkan nyeri secara signifikan. Surah Ar-Rahman memiliki makna mengenai sifat pemurah dan sifat kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya serta terdapat ayat yang sering diulang sampai 31 kali yaitu:

Dalam Q.S. Ar-Rahman/55: 13

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)

Terjemahnya:

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?” (Q.S. Ar-Rahman/55:13).

Menurut susanto (2015), Terapi Murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dengan keteraturan irama, tempo lambat, lembut penuh penghayatan dan bacaan yang benar juga merupakan sebuah musik yang mampu mendatangkan ketenangan, meminimalkan kecemasan, dan dapat menimbulkan suatu respon relaksasi. Lantunan surah Ar-Rahman merupakan bagian dari suara manusia yang merupakan instrument penyembuhan yang menakjubkan. Pemberian murottal ini dapat mengalihkan nyeri yang dirasakan ibu, perasaan ibu menjadi tenang dan nyaman,serta rasa sakit yang ibu rasakan juga akan berkurang. (Lasalo. 2016 : 3).

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM PADA NY “R” DENGAN
 NYERI LUKA PERINEUM DI PUSKESMAS SOMBA OPU GOWA (RAWAT INAP)
 TANGGAL, 27 APRIL S/D 06 JUNI 2017

No Register : 44xxx
 Tanggal Partus : 27 April 2017 Jam 04.25 WITA
 Tanggal Masuk Ruang Nifas : 27 April 2017 Jam 06.25 WITA
 Tanggal Pengkajian : 27 April 2017 Jam 06.25 WITA
 Pengkaji : Rosnani

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas istri/suami

Nama : Ny “R” / Tn “M”
 Umur : 23 tahun / 25 tahun
 Nikah/Lamanya : 1 kali / 6 tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMP / SD
 Alamat : Jl. Beringin Kab. Gowa

2. Keluhan Utama

Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitannya

3. Riwayat Keluhan Utama

Nyeri pada daerah perineum dirasakan ibu sejak selesai bersalin yaitu tanggal 27 April 2017 jam 04.25 WITA, karena adanya laserasi pada jalan

lahir. Sifat nyeri hilang timbul (tidak menetap). ibu mengatakan ASInya masih kurang, ibu belum BAB dan BAK.

4. Riwayat kesehatan Lalu dan sekarang

Tidak ada riwayat menderita penyakit serius seperti penyakit jantung, Diabetes Melitus (DM), hepatitis, tumor, hipertensi, Penyakit Menular Seksual (PMS), dan tuberkulosis (TBC). Tidak ada riwayat penyakit yang menyertai kehamilan seperti sakit kepala yang hebat, nyeri perut yang hebat, dan kejang. Tidak ada riwayat ketergantungan obat, alkohol, dan merokok. Serta keluarga tidak memiliki penyakit menular dan menurun.

5. Riwayat Reproduksi

- a. *Menarche* : 13 tahun
- b. Siklus Haid : Tidak teratur
- c. Lamanya Haid : 03-05 hari
- d. Keluhan Haid : Tidak Ada

6. Riwayat Kehamilan Sekarang

- a. Ibu mengatakan ini adalah anak yang kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya
- b. HPHT Tanggal 25-07-2016
- c. TP Tanggal 02-05-2017
- d. Ibu telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali di Puskesmas Somba Opu dan telah mendapat imunisasi sebanyak 2 kali yaitu TT I pada tanggal 26 -09-2016 dan TT II tanggal 26-10-2016

7. Riwayat Persalinan /Kelahiran

Kala I

Kala I berlangsung 8 Jam

Kala II

Kala II berlangsung 20 menit. Ibu melahirkan secara normal (pervaginam) dengan tenaga mengedan ibu sendiri.

Kala III

Dilakukan manajemen aktif kala III. Plasenta lahir lengkap (selaput dan kotiledon lengkap), perdarahan 300 cc, ruptur perineum kala II, lamanya kala III adalah 10 menit.

Kala IV

Kala IV berlangsung normal, pemantauan kala IV dilakukan sampai dengan 2 jam post partum.

Data Bayi

- a. BBL : 3.000 gr
- b. PBL : 50 cm
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Apgar Score : 8/10
- e. Kulit kemerahan
- f. Konjungtiva merah muda
- g. Sklera tidak ikterus
- h. Tali pusat masih basah dan terjepit dengan penjepit tali pusat, tidak ada tanda-tanda infeksi.

- i. BAK: 3 kali, BAB: 2 kali (sejak kelahiran)
- j. Bayi kuat menetek, reflex menghisap dan menelan baik
- k. Bayi terlihat tidur nyenyak
- l. Tanda-tanda vital
 - 1) Suhu : 36,8 C
 - 2) Pernapasan : 40 kali/menit
 - 3) DJB : 130 kali/menit

8. Riwayat Persalinan Terdahulu

Table 3.4 Riwayat persalinan terdahulu

Anak	Tahun	Tempat	Jenis	Penolong	BBL	PBL	JK	Keadaan
Ke		Persalinan	Persalinan					
1	2012	BPS	Normal	Bidan	2.700	47 cm	L	Hidup

Sumber: Data primer

9. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi akseptor KB jenis suntik 3 bulan (Depoprogestin), sejak 4 tahun, ibu tidak pernah mengalami keluhan selama memakai KB jenis suntik 3 bulan (Depoprogestin), ibu tidak pernah ganti KB selama 4 tahun karena ibu merasa tidak ada keluhan yang ia alami selama memakai KB jenis suntik 3 bulan.

10. Data psikososial, ekonomi dan Spiritual.

- a. Ibu dan keluarga sangat senang dengan kelahiran bayinya
- b. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami
- c. Hubungan antara keluarga baik.

- d. Penghasilan suami mencukupi kebutuhan sehari-hari
- e. Ibu mengerjakan urusan rumah tangga.
- f. Selama kehamilan, proses persalinan dan masa nifas ini ibu senantiasa berdoa dan berserah diri pada Allah SWT.

11. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Nutrisi

Pola makan ibu teratur dengan frekuensi 3 kali sehari dengan jenis makanan nasi, sayur, lauk pauk, dan buah. Ibu minum 7-8 gelas/hari.

b. Eliminasi

Ibu BAK sebanyak 3-4 kali/hari, berwarna kuning muda dengan bau khas amoniak. BAB sebanyak 1-2 kali/hari

c. Istirahat

Ibu tidur siang kurang lebih 1 jam/ hari dan tidur malam 7-8 jam / hari

d. Personal Hygiene

Ibu mandi 2 kali sehari memakai sabun, keramas tiap rambut kotor dengan menggunakan shampoo, sikat gigi 2 kali dalam sehari.

12. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Mata

Inspeksi : Konjungtiva merah muda, sclera putih

b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedeme

c. Payudara

Inspeksi : Puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI

d. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 1 jari dibawah pusat, kandung kemih kosong.

e. Genetalia

Inspeksi : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lochia rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah

Palpasi : Tidak ada oedema, ada nyeri tekan pada perineum

f. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varices, jari-jari ekstremitas atas dan bawah lengkap

Palpasi : Tidak ada oedema

13. Pemeriksaan menunjang (laboratorium) : Hb 2 jam post partum; 10,5 gr%

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL

Diagnosa : P₁₁ A₀, post partum hari pertama, dengan nyeri luka perineum

1. P₁₁ A₀

Data subjektif

Ibu mengatakan ini anak yang kedua

Ibu tidak pernah keguguran

Data objektif

Tidak ada luka bekas operasi

Tidak ada nyeri tekan

Kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 1 jari dibawah pusat, kandung kemih kosong

Analisa dan Interpretasi data :

Involusio uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil. Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil. TFU akan turun 1 cm tiap hari. (Marmi, 2012: 140)

2. Post partum hari 1.

Data subjektif:

Ibu melahirkan secara normal (pervaginam) tanggal 27 April 2017 jam 04.25 wita.

Data objektif

- a. Tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat
- b. Tanpak pengeluaran lokhia rubra
- c. Kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar

Analisa dan interpretasi data:

- a. Lokhia adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa nifas, biasanya berlangsung 40 hari. Tahapan-tahapan masa nifas ini, vagina akan terus-menerus mengeluarkan darah. Biasanya darah tersebut mengandung trombosit, sel-sel tua, sel-sel mati (nekrosis), serta sel-sel dinding rahim (endometrium), yang disebut lokia. (Marmi, 2012: 140)
- b. Involusio uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil. Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil. TFU akan turun 1 cm tiap hari. (Marmi, 2012: 140)

3. Nyeri perineum

Data subjektif:

Ibu merasa nyeri pada daerah perineum bila bergerak.

Data objektif

- a. Ekspresi wajah tampak meringis bila bergerak.
- b. Jahitan perineum tampak basah
- c. Nyeri tekan pada perineum

- d. Tampak pengeluaran lochia rubra
- e. Tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah.

Analisa dan Interpretasi data :

Nyeri perineum (*perineal pain*) didefinisikan sebagai nyeri yang terjadi pada badan perineum (*perineal body*), daerah otot dan jaringan fibrosa yang menyebar dari simpisis pubis sampai ke coccygis oleh karena adanya robekan yang terjadi baik yang disengaja ataupun ruptur spontan. (Utami, 2015: 30).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL

1. Potensial terjadi infeksi luka jahitan perineum

Data Subjektif

- a. Ibu baru saja bersalin dan mendapat jahitan pada perineum
- b. Adanya pengeluaran darah pada jalan lahir

Data Objektif

- a. Jahitan perineum tampak basah
- b. Pengeluaran lochia warna merah (rubra) dan berbau amis

Analisa Dan Interpretasi Data :

Infeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia, terjadi sesudah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu sampai 38 oC atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan dengan

mengecualikan 24 jam pertama yang disebabkan oleh organisme yang menyerang bekas implantasi plasenta atau laserasi akibat persalinan adalah penghuni normal serviks dan jalan lahir mungkin juga dari luar. Infeksi nifas dibagi dengan 2 golongan yaitu infeksi yang terbatas pada perineum, vulva, vagina, dan serviks dan penyebaran dan tempat-tempat tersebut melalui vena-vena, jalan limfe. dan permukaan endometrium. (Tulas, dkk, 2017: 2).

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan analgetik, antibiotik, dan vitamin

E. LANGKAH V : RENCANA/INTERVENSI

Tujuan

1. Masa nifas hari 1 berlangsung normal
2. Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri
3. Tidak terjadi infeksi pada luka jahitan perineum

Kriteria

1. Masa nifas hari 1 berlangsung normal
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 1. Tekanan Darah : Sistol 110/130 mmHg, distol 70-90 mmHg
 2. Nadi : 60 – 90 kali/menit
 3. Suhu : 36,5-37,5 C

4. Pernapasan : 16-24 kali/ menit
 - b. Kontraksi uterus baik : Teraba keras dan bundar
 - c. TFU turun 1 cm/ hari
 - d. Pengeluaran lochia rubra dan berbau normal (amis)
2. Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri
- Wajah ibu tampak ceria (tidak meringis)
3. Tidak terjadi infeksi pada luka jahitan perineum
- Tidak terdapat tanda-tanda infeksi: Seperti peningkatan suhu tubuh yang melebihi 37,5 C, luka jahitan perineum bengkak, berwarna merah, dan pengeluaran lochia yang berbau.

Rencana Asuhan

1. Masa nifas normal hari 1
 - a. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
Rasional: Hal ini dapat mencegah terjadinya infeksi silang
 - b. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya
Rasional: Dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, ibu dapat mengerti tentang keadaannya dan dapat mengurangi kecemasan ibu.
 - c. Jelaskan pada ibu cara mengetahui baik tidaknya kontraksi uterus
Rasional: Dengan memberi penjelasan tentang kontraksi uterus yang baik, ibu dapat mengetahui seperti apa kontraksi yang baik dan bisa mengantisipasi terjadinya perdarahan post partum (atonia uteri)

bila kontraksi tidak baik

d. Observasi tanda-tanda vital ibu

Rasional: Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ibu

e. Observasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia setiap hari

Rasional:

1. TFU merupakan salah satu indikator untuk mengetahui bahwa proses involusio berlangsung normal, normalnya TFU mengalami penurunan 1 cm/ hari yang teraba keras dan bundar
2. Dengan mengobservasi kontraksi uterus dapat mengetahui apakah uterus berkontraksi dengan baik atau tidak, karena apabila uterus kurang berkontraksi akan menyebabkan perdarahan dan memperlambat proses involusio
3. Perubahan warna, bau, banyaknya, dan perpanjangan lochia merupakan terjadinya infeksi yang disebabkan oleh involusio yang kurang baik.

f. Anjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampoo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Rasional: dengan menjaga kebersihan diri ibu merasa nyaman, dan mencegah kemungkinan terjadinya infeksi pada luka yang terdapat pada diri ibu.

- g. Anjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Rasional: Mobilisasi dini bertujuan agar sirkulasi darah ke jaringan lancar sehingga mencegah terjadinya tromboflebitis dan mempercepat proses involusio uteri

- h. Ajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah.

Rasional: Dengan cara ini ibu dapat mengerti dan melakukan sendiri perawatan perineum yang baik dan benar. Dengan menjaga kebersihan vulva dengan teratur dapat mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh kuman-kuman patogen

- i. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (*on demand*) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Rasional: Dengan sesering mungkin menyusui akan memacu hormon prolaktin yang akan memperlancar produksi ASI

- j. Ajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar serta cara perawatan payudara yang baik dan benar

Rasional: Dengan posisi menyusui yang benar bayi dapat lebih baik dan mudah menghisap ASI dan agar payudara ibu tidak lecet, serta dengan perawatan payudara yang baik dan benar ibu dapat menjaga kebersihan daerah payudaranya dan mencegah terjadinya bendungan ASI

- k. Anjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang

Rasional: Makanan yang mengandung gizi seimbang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu, sehingga ASInya dapat lancar dan makanan yang mengandung serat dapat memperlancar BAB ibu

- l. Beri konseling tentang KB

Rasional: Dengan memberikan konseling dini tentang KB pada ibu sebelum kembali kerumah ibu dapat dipasangkan KB yang ia pilih.

2. Nyeri perineum

- a. Jelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karena adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Rasional: Dengan menyampaikan kepada ibu penyebab nyeri yang dialami ibu akan dapat mengetahui penyebab nyeri yang dialami.

- b. Ajarkan dan anjurkan ibu melakukan teknik relaksasi

Rasional: Teknik relaksasi dapat mengurangi ketegangan pada otot-otot dan meningkatkan suplai oksigen ke jaringan

- c. Bantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Rasional: Hal ini dapat mengurangi rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman pada ibu

- d. Pemberian obat Analgetik, Antibiotik, dan vitamin C

Rasional: Antibiotik berfungsi mencegah terjadinya infeksi, analgetik untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan ibu,

sedangkan vitamin C berfungsi untuk mempercepat penyembuhan jaringan atau sel-sel yang rusak

3. Potensial terjadi infeksi pada luka jahitan perineum
 - a. Ajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva
Rasional: Menjaga kebersihan vulva dengan teratur dapat mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh kuman-kuman patogen
 - b. Observasi adanya tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum
Rasional: Tanda-tanda infeksi merupakan indikator untuk mengetahui keadaan ibu dan menentukan tindakan selanjutnya

F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Tanggal 27 April 2017 jam 06.30 WITA

1. Masa nifas normal hari 1
 - a. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
Hasil: Tangan telah dicuci dan tangan dalam keadaan bersih
 - b. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya.
Hasil: Ibu memahami dan mengerti dengan keadaannya.
 - c. Menjelaskan pada ibu cara mengetahui baik tidaknya kontraksi uterus
Hasil: Ibu mengerti bahwa kontraksi baik apabila perut teraba keras dan bundar

d. Observasi tanda-tanda vital ibu

Hasil:

1. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
2. Nadi : 80 kali/ menit
3. Suhu : 36,5 C
4. Pernafasan : 22 kali/ menit

e. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia setiap hari

Hasil: TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), pengeluaran lochia rubra

f. Mengajarkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampoo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

g. Mengajarkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu miring kanan dan kiri diatas tempat tidurnya dan sudah bisa jalan ke kamar mandi untuk berkemih

h. Mengajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

- i. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil: Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin

- j. Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar serta cara perawatan payudara yang baik dan benar

Hasil: Ibu mengerti dan mau mempraktekkannya di puskesmas dan sesampainya dirumah

- k. Mengajarkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang seperti makanan yang mengandung protein dan banyak mengandung serat

Hasil: Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang diberikan

- l. Memberi konseling tentang KB pada ibu

Hasil: Ibu mengerti dan mau berKB sebelum kembali ke rumah (KB PP implant)

2. Nyeri perineum

- a. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karna adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- b. Mengajarkan dan anjurkan ibu melakukan teknik relaksasi

Hasil: Ibu mengerti dan langsung melakukan teknik relaksasi yang telah dianjurkan

- c. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Hasil: Ibu memilih posisi miring kekanan

- d. Memberikan obat Analgetik, Antibiotik, dan vitamin C

Hasil: Amoxicilin 3 x 1

Hermafor 1 x 1

Vitamin C 3 x 1

3. Potensial terjadi infeksi pada luka jahitan perineum

- a. Mengajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

- b. Mengobservasi adanya tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum

Hasil: Tidak ada tanda-tanda infeksi yang ditemukan, suhu tubuh normal: 36,5 °C, luka jahitan tidak merah dan pengeluaran lochia tidak berbau

G. LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 27 April 2017 Jam 06.30 WITA

1. Masa nifas normal hari I, ditandai dengan:

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
- c. TFU 1 jari dibawah pusat
- d. Lochia rubra tidak berbau busuk

e. Tanda-tanda vital dalam batas normal

1. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
2. Nadi : 80 kali/ menit
3. Suhu : 36,5 °C
4. Pernafasan : 22 kali/ menit

2. Nyeri perineum

a. Nyeri belum teratasi: Ibu masih merasakan nyeri bila bergerak, wajah masih tampak meringis

3. Potensial terjadinya infeksi luka jahitan perineum

a. Tidak ada tanda-tanda infeksi yang ditemukan: Suhu tubuh normal 36,5 °C, luka jahitan tidak merah dan pengeluaran lochia tidak berbau

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
PADA NY "R" DENGAN NYERI LUKA PERINEUM
DI PUSKESMAS SOMBA OPU (RAWAT INAP)
TANGGAL 27 APRIL 2017

No Register : 44xxx
Tanggal Partus : 27 April 2017 Jam 04.25 WITA
Tanggal Masuk Ruang Nifas : 27 April 2017 Jam 06.25 WITA
Tanggal Pengkajian : 27 April 2017 Jam 06.30 WITA
Pengkaji : Rosnani

Identitas istri/suami

Nama : Ny "R" / Tn "M"
Umur : 23 tahun / 25 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / 6 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SD

Alamat : Jl. Beringin Kab. Gowa

Data Subjektif (S)

1. Ini merupakan anak yang kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya
2. Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitannya
3. Ibu mengatakan HPHTnya tanggal 25-07-2016
4. Ibu melahirkan pada tanggal 7 April 2017 jam 04.25 wita dengan JK: perempuan, BBL: 3.000 gr, PBL: 50 cm A/S: 8/10

5. ASI belum lancar
6. Ibu belum BAB dan BAK
7. Tidak ada riwayat menderita penyakit serius seperti jantung, DM, Hepatitis, tumor, hipertensi, PMS, dan TBC.
8. Tidak ada riwayat ketergantungan obat, alkohol, dan merokok.
9. Ibu dan keluarga tidak memiliki penyakit menular maupun menurun.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Ekspresi ibu meringis saat bergerak
3. Ada pengeluaran ASI saat puting susu dipencet
4. TFU 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Luka perineum masih basah
6. Kandung kemih kosong
7. Pengeluaran lochia rubra
8. Tanda-tanda vital:
 - a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 80 kali/ menit
 - c. Suhu : 36,5 °C
 - d. Pernafasan : 22 kali/ menit
9. Pemeriksaan laboratorium
Hb : 10,5 gr%

Assesment (A)

P_{II} A₀, post partum hari pertama, dengan nyeri luka perineum, antisipasi terjadinya infeksi luka jahitan

Planning (P)

Tanggal 27 April 2017 Jam 06.30 WITA

1. Masa nifas normal hari 1
 - a. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
 - b. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya: Ibu memahami dan mengerti dengan keadaanya.
 - c. Menjelaskan pada ibu cara mengetahui baik tidaknya kontraksi uterus: Ibu mengerti bahwa kontraksi baik apabila perut teraba keras dan bundar
 - d. Observasi tanda-tanda vital ibu
 1. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
 2. Nadi : 80 kali/ menit
 3. Suhu : 36,5 °C
 4. Pernafasan : 22 kali/ menit
 - e. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lokhia setiap hari: TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), pengeluaran lokhia rubra
 - f. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun,

keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampoo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

- g. Mengajarkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini: Ibu miring kanan dan kiri di atas tempat tidurnya dan sudah bisa jalan ke kamar mandi untuk berkemih
- h. Mengajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri
- i. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri: Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin
- j. Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar serta cara perawatan payudara yang baik dan benar: Ibu mengerti dan mau mempraktekkannya di puskesmas dan sesampainya dirumah
- k. Mengajarkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang: Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang diberikan
- l. Memberi konseling tentang KB: Ibu mengerti dan mau berKB sebelum kembali kerumah (KB PP implant)

2. Nyeri perineum

- a. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karna adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
- b. Mengajarkan dan anjurkan ibu melakukan teknik relaksasi: Ibu mengerti dan langsung melakukan teknik relaksasi yang telah dianjurkan
- c. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman: Ibu memilih posisi miring kekanan
- d. Memberikan obat Analgetik, Antibiotik, dan vitamin C: amoxicilin 3 x 1, Hermafor 1 x 1, Vitamin C 3 x 1

3. Potensial terjadi infeksi pada luka jahitan perineum

- a. Mengajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri
- b. Mengobservasi adanya tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum: Tidak ada tanda-tanda infeksi yang ditemukan, suhu tubuh normal 36,5 C, luka jahitan tidak merah dan pengeluaran lochia tidak berbau

4. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah untuk memantau perkembangan kesehatan ibu pada tanggal 03 Mei 2017 (6 hari setelah persalinan): Ibu bersedia untuk dilakukan

kunjungan rumah dan ibu menjelaskan alamat rumahnya, dan ibu memberikan No HPnya 0853 4224 3878



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST
PARTUM HARI KE 6 PADA NY "R" TANGGAL 03 MEI 2017

Hari/tanggal : Rabu, 03 Mei 2017 Jam 03.00 WITA

Tempat : Rumah Ny "R"

Pengkaji : Rosnani

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ASInya sudah lancar
2. Ibu mengatakan nyeri pada luka jahitannya masih terasa namun agak berkurang
3. Ibu merasakan perih jika buang air kecil
4. Ada pengeluaran darah pada jalan lahir
5. Ibu mengatakan bayinya tidur dengan nyenyak dan aktif menyusui
6. Ibu sudah sering BAB

Data Objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu tampak senang
2. Keadaan umum baik
3. Keluar ASI saat puting susu dipencet
4. TFU pertengahan simpisis pusat, kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Luka perineum masih basah
6. Kandung kemih kosong
7. Pengeluaran lochia sanguilenta
8. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg

- b. Nadi : 82 kali/ menit
- c. Suhu : 36,5 °C
- d. Pernafasan : 20 kali/ menit

Assessment (A)

P_{II} A₀, post partum hari keenam, dengan sedikit nyeri luka perineum, antisipasi terjadinya infeksi luka jahitan

Planning (P)

Tanggal 03 Mei 2017 Jam 03.00 WITA

1. Masa nifas normal hari ke 6
 - a. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan bayi dalam keadaan sehat: Ibu mengerti dan merasa senang
 - b. Megobservasi tanda-tanda vital
 1. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
 2. Nadi : 82 kali/ menit
 3. Suhu : 36,5 °C
 4. Pernafasan : 20 kali/ menit
 - c. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia: TFU pertengahan simpisis pubis, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
 - d. Mengingatnkan kembali pada ibu untuk selalu memperhatikan kebersihan diri, dan genetalianya mengganti pembalut bila merasa lembab, dan senantiasa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang

untuk ibu menyusui: Ibu bersedia untuk melakukan anjuran yang diberikan

- e. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand): Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin
 - f. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumahnya terutama tempat tidur bayinya: Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
 - g. Mengajarkan kembali teknik menyusui yang baik dan benar: Ibu menyusui seperti yang diajarkan
 - h. Menjelaskan pada ibu tentang perawatan payudara yaitu membersihkan tiap kali mandi: Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
2. Nyeri perineum
- a. Menganjurkan kembali pada ibu untuk melakukan teknik relaksasi apabila masih merasa nyeri pada luka jahitannya: Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikandan
 - b. Mengajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri
 - c. Mengobservasi adanya tnda-tanda inveski pada luka jahitan perineum: Tidak ada tanda-tanda inveksi yang ditemukan, suhu tubuh normal, luka jahitan tidak merah dan pengeluaran lokhia sanguilenta.

3. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan ibu dan bayinya yaitu tanggal 11 Mei 2017: Ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
2 MINGGU PADA NY "R" TANGGAL 11 MEI 2017

Hari/tanggal : Kamis, 11 Mei 2017 Jam 03.30 WITA

Tempat : Rumah Ny "R"

Pengkaji : Rosnani

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan keadaanya sudah agak membaik
2. Nyeri yang dirasakan sudah berkurang dari sebelumnya
3. ASI sudah lancar dan banyak
4. Bayi sering menetek
5. Bayi tidak rewel dan tidur nyenyak
6. Ada pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna merah dan berlendir

Data Objektif (O)

1. Ekspresi ibu tampak ceria
2. Payudara banyak mengeluarkan ASI
3. TFU tidak teraba
4. Kandung kemih kosong
5. Luka perineum tampak lebih kering dari sebelumnya
6. Pengeluaran lochia serosa
7. Mengukur tanda-tanda vital
 - a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 82 kali/ menit
 - c. Suhu : 36,5 °C

d. Pernafasan : 20 kali/ menit

8. Bayi kuat menetek, reflex menghisap dan menelan pada bayi baik

Assessment (A)

P_{II} A₀, post partum 2 minggu, dengan keadaan umum baik

Planning (P)

Tanggal 11 Mei 2017 Jam 03.30 WITA

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ibu dalam keadaan sehat: Ibu mengerti dan merasa senang
2. Memotivasi ibu agar selalu memberikan ASI pada bayinya tanpa diselingi susu formula atau makanan tambahan lainnya: Ibu mengerti dan mau melakukannya
3. Memberitahu ibu tentang keuntungan ASI eksklusif yaitu sebagai imunitas bayi, bayi tidak mudah sakit, meningkatkan kecerdasan, membentuk ikatan batin antara ibu dan anak, mudah didapat, kandungan gizinya tidak disamakan dengan susu formula lainnya, serta mempercepat pemulihan rahim: Ibu mengerti dan bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayinya
4. Menganjurkan kembali pada ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya dan bayinya serta lingkungan sekitarnya: Ibu bersedia melakukannya
5. Menganjurkan ibu untuk membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi jika bayi berusia 1 bulan: Hasil ibu bersedia membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi
6. Memberitahu ibu untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum masa nifas selesai: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

7. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah yang terakhir untuk mengetahui dan memantau kesehatan ibu pada tanggal 6 Juni 2017: Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
6 MINGGU PADA NY "R" TANGGAL 06 JUNI 2017

Hari/tanggal : Selasa, 06 Juni 2017 Jam 08.30 WITA

Tempat : Rumah Ny "R"

Pengkaji : Rosnani

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dialami sekarang
2. Ibu sudah membawa bayinya imunisasi pada tanggal 27 Mei 2017 di puskesmas
3. Ibu mengatakan KB yang dipakai tidak ada masalah dan tidak ada keluhan
4. Ada pengeluaran darah yang berwarna kuning dari jalan lahir
5. Ibu sudah aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah

Data Objektif (O)

1. Ekspresi ibu tampak ceria
2. Payudara banyak mengeluarkan ASI
3. TFU tidak teraba
4. Kandung kemih kosong
5. Luka perineum sudah kering
9. Pengeluaran lochia alba
10. Mengukur tanda-tanda vital
 - a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg
 - b. Nadi : 82 kali/ menit
 - c. Suhu : 36,5 °C

d. Pernafasan : 20 kali/ menit

11. Bayi kuat menetek, reflex menghisap dan menelan pada bayi baik

Assessment (A)

P_{II} A₀, post partum 6 minggu, dengan keadaan umum baik

Planning (P)

Tanggal 06 Juni 2017 Jam 08.30 WITA

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu, bahwa ibu dalam kondisi baik: Ibu merasa senang dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan
2. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya dan bayinya: Ibu bersedia melakukannya
3. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan apapun, dan setelah bayi berusia 6 bulan menganjurkan ibu untuk memberikan makanan pendamping ASI, tetapi tetap memberikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun: Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
4. Menganjurkan ibu untuk datang ke puskesmas apabila sudah waktunya untuk mengganti KB implant yang digunakan, atau apabila ibu mengalami keluhan terhadap KB yang digunakan: Ibu bersedia datang kembali ke puskesmas sesuai anjuran yang diberikan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada BAB ini penulis akan membandingkan antara konsep dasar dan tinjauan kasus dalam penerapan proses manajemen kebidanan pada Ny. “R” masa nifas dengan nyeri luka perineum yang dirawat di Puskesmas Somba Opu (rawat inap).

Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen kebidanan yang terdiri dari 7 langkah yaitu langkah I pengumpulan data/analisa data dasar, langkah II identifikasi diagnosa/ masalah aktual, langkah III identifikasi diagnosa/ masalah potensial, langkah IV tindakan emergensi/ kolaborasi, langkah V rencana tindakan (merencanakan asuhan yang menyeluruh), langkah VI implementasi (melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan), langkah VII evaluasi. Adapun penatalaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. LANGKAH I. PENGUMPULAN DATA/ ANALISA DATA DASAR

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Adapun yang termasuk data subjektif antara lain biodata, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan dan nifas, biopsikologi spritual, pengetahuan klien. Data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, hasil

laboratorium dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus. Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak menemukan masalah / hambatan yang berarti karena baik dari keluarga pasien maupun dari pasien itu sendiri selalu terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan sehingga mempermudah dalam pengumpulan data.

Dalam tinjauan pustaka tertera bahwa jahitan perineum dapat terjadi disebabkan adanya ruptur perineum. Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada perineum sewaktu persalinan. Perineum merupakan kulit dan otot yang terletak di antara vagina dan anus. Robekan perineum dapat terjadi pada hampir semua persalinan pertama (primipara) dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. (Rahayu, dkk, 2015: 729). Ruptur perineum disebabkan oleh faktor ibu seperti partus presipitatus, primigravida, dan varikosa pada pelvis maupun jaringan parut pada perineum dan vagina, persalinan operatif pervaginam (ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, versi dan ekstraksi, serta embriotomi), faktor janin seperti berat badan bayi baru lahir, presentasi (presentasi muka, presentasi dahi, dan presentasi bokong), dan faktor persalina.

Adapun uraian dari ruptur perineum yang disebabkan oleh faktor ibu yaitu: Partus presipitatus adalah persalinan yang terjadi terlalu cepat yakni kurang dari tiga jam. Sehingga seorang petugas belum siap untuk menolong persalinan dan ibu mengejan kuat tidak terkontrol. Kepala janin terjadi defleksi terlalu cepat keadaan ini akan memperbesar kemungkinan ruptur perineum. Primigravida, pada primigravida pemaksaan ditemukan tanda-tanda perineum utuh, vulva tertutup. Himen pervoratus vagina sempit dengan rugae pada

persalinan akan terjadi penekanan pada jalan lahir lunak oleh kepala janin. Dengan perineum yang masih utuh pada primi akan mudah terjadi robekan perineum. Varikosa pada pelvis maupun jaringan parut pada perineum, Jaringan parut pada jalan lahir akan menghalangi atau menghambat kemajuan persalinan, sehingga episiotomi pada kasus ini akan dapat di pertimbangkan. Dan vagina persalinan operatif pervaginam (ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, versi dan ekstraksi, serta embriotomi), Episiotomi tidak melindungi perineum, malahan menyebabkan inkontmnesia sfingter anus dengan cara meningkatkan resiko robekan derajat tiga dan empat.

Adapun uraian Ruptur perineum yang disebabkan oleh faktor janin yaitu: Berat badan bayi baru lahir, berat badan lahir adalah berat badan bayi yang ditimbang 24 jam pertama kelahiran. Semakin besar berat bayi yang dilahirkan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum. Bayi besar adalah bayi yang begitu lahir memiliki bobot 4000 gram. Presentasi, presentasi digunakan untuk menentukan bagian yang ada di bagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pada pemeriksaan dalam. Adapun macam- macam presentasi dapat dibedakan menjadi: Presentasi muka, presentasi muka atau presentasi dahi letak janin memanjang, sikap ekstensi sempurna dengan diameter pada waktu masuk panggul atau diameter submento bregmatika sebesar 9,5 cm. Bagian terendahnya adalah bagian antara glabella dan dagu. Presentasi dahi, presentasi dahi adalah sikap ekstensi sebagian (pertengahan), hal ini berlawanan dengan presentasi muka yang ekstensinya sempurna. Bagian terendahnya adalah daerah diantara margo orbitalis dengan bregma dengan

penunjuknya adalah dahi. Dan presentasi bokong, presentasi bokong memiliki letak memanjang dengan kelainan dalam polaritas. Panggul janin merupakan kutub bawah dengan penunjuknya adalah sacrum.

Adapun uraian ruptur perineum yang disebabkan oleh faktor penolong persalinan yaitu Pimpinan persalinan yang salah merupakan salah satu penyebab terjadinya ruptur perineum, kerja sama dengan ibu dan penggunaan perasal manual yang tepat dapat mengatur kecepatan kelahiran bayi dan mencegah terjadinya laserasi pengendalian kecepatan dan pengaturan diameter kepala saat melalui introitus vagina dan perineum dapat mengurangi kemungkinan terjadinya robekan. (Nurasiah. dkk. 2014).

Berdasarkan studi kasus pada Ny "R" dengan nyeri luka perineum ditemukan data yaitu berat bayi 3.000 gram, hal ini sesuai dengan teori faktor janin yaitu berat badan bayi baru lahir merupakan salah satu faktor terjadinya ruptur pada perineum. Sehingga apa yang dijelaskan pada tinjauan pustaka dengan studi tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

2. LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam menegakkan suatu diagnosa atau masalah klien, harus berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif dari hasil pengkajian. Dalam tinjauan pustaka dijelaskan bahwa terjadinya ruptur perineum disebabkan oleh faktor ibu seperti partus presipitatus, primigravida, dan varikosa pada pelvis maupun

jaringan parut pada perineum dan vagina, persalinan operatif pervaginam (ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, versi dan ekstraksi, serta embriotomi). Faktor janin seperti berat badan bayi baru lahir, presentasi (presentasi muka, presentasi dahi, dan presentasi bokong), dan faktor persalinan.(Nurasiah. dkk. 2014).

Menurut penelitian Rahayuningsih (2013) akibat dari laserasi perineum yang terjadi pada ibu post partum adalah adanya nyeri perineum sebanyak 70,9%. Dampak nyeri perineum tersebut adalah stress, traumatik, takut terluka, tidak nafsu makan, sulit tidur dan depresi, Sehingga ibu post partum mengalami keterlambatan mobilisasi, gangguan rasa nyaman pada saat duduk, berdiri, berjalan dan bergerak, sehingga berdampak pada gangguan istirahat ibu post partum dan keterlambatan kontak awal antara ibu dan bayinya. (Utami, 2015: 31).

Sedangkan studi kasus Ny "R" mendapat jahitan perineum, dimana ruptur perineum adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat proses persalinan. Dan salah satu faktor terjadinya ruptur karena faktor janin, seperti berat badan bayi baru lahir pada kasus yaitu 3.000 gram. Sehingga pada kasus ini ditegakkan diagnosa masa nifas normal dengan masalah nyeri luka perineum, dengan demikian tidak terdapat kesenjangan antara teori dan data yang diperoleh.

3. LANGKAH III. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Antisipasi adanya masalah potensial yang mungkin terjadi pada Ny "R" berdasarkan pengumpulan, pengamatan yang cermat dan observasi jika ada kondisi yang tidak normal apabila tidak mendapat penanganan segera, akan membawa dampak yang berbahaya sehingga mengancam kondisi Ny "R".

Akibat perawatan perineum yang kurang baik mengakibatkan kondisi perineum yang terkena lokhia menjadi lembab dan akan sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum yang dapat menghambat proses penyembuhan luka. Biasanya penyembuhan luka pada robekan perineum ini akan sembuh bervariasi, ada yang sembuh normal dan ada yang mengalami kelambatan dalam penyembuhannya. (Ma'rifa dan Yeni, 2015: 2). Penyembuhan luka yang mengalami kelambatan disebabkan karena beberapa masalah diantaranya perdarahan yang disertai dengan perubahan tanda-tanda vital, infeksi seperti kulit kemerahan, demam dan timbul rasa nyeri, pecahnya luka jahitan sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya trauma serta menonjolnya organ bagian dalam ke arah luar akibat luka tidak segera menyatu dengan baik. (Trisnawati dan Meihartati, 2015: 5).

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny "R" dilahan penelitian dapat diantisipasi masalah potensial yaitu potensial terjadinya infeksi luka

jahitan perineum. Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan manajemen kebidanan pada kasus ini ada kesamaan sehingga tidak ada diagnosa potensial terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus

4. LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCI/ KOLABORASI

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum penulis melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan seperti obat analgetik, antibiotik, dan vitamin. Adapun kegunaan dari obat antibiotik berfungsi mencegah terjadinya infeksi, obat analgetik untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan ibu, sedangkan vitamin C berfungsi untuk mempercepat penyembuhan jaringan atau sel-sel yang rusak

5. LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN (MERENCANAKAN ASUHAN YANG MENYELURUH)

Pada langkah ini direncanakan usaha yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Dalam konsep manajemen kebidanan bahwa perawatan nifas harus disetujui oleh klien, oleh sebab itu harus didiskusikan kebenarannya bersama klien sesuai situasi dan kondisi serta tindakan harus dapat dianalisa secara teoritis.

Menurut Yeti (2014), Untuk mencegah timbulnya infeksi atau komplikasi lainnya pada masa nifas utamanya dengan ruptur pada perineum dapat dilakukan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan antara lain perawatan

perineum secara intensif. Asuhan masa nifas ini sangat diperlukan terutama pada 24-48 jam pertama. Perdarahan pasca persalinan, infeksi masa nifas, demam, payudara berubah merah, panas, nyeri, infeksi pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium adalah perubahan yang dapat terjadi pada masa nifas. Sedangkan menurut Rukhiyah, A. (2011) asuhan kebidanan yang perlu dilakukan pada masa nifas yaitu seperti perawatan luka post partum untuk pencegahan infeksi dengan tehnik aseptik, untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu post partum. (Wulansari, dkk, 2016: 1). Oleh karena itu, menurut Afandi dkk, 2014. Ibu post partum membutuhkan mobilisasi dini untuk mempercepat pemulihan ruptur perineum, karena Mobilisasi yang cukup lebih berpeluang mempercepat kesembuhan luka perineum dibandingkan dengan mobilisasi yang kurang. (Wulansari, dkk, 2016: 2).

Rencana asuhan yang diberikan pada Ny "R" masa nifas normal dengan nyeri luka perineum adalah sebagai berikut:

1. Masa nifas normal
 - a. Cuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan
 - b. Sampaikan pada ibu tentang kondisi yang ia alami
 - c. Jelaskan pada ibu cara mengetahui baik tidaknya kontraksi uterus
 - d. Observasi tanda-tanda vital ibu dan bayi
 - e. Observasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia setiap hari
 - f. Ajarkan dan anjurkan ibu untuk melakukan perawatan luka perineum dan menjaga kebersihan vulva
 - g. Anjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang

- h. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand)
 - i. Ajarkan cara menyusui yang baik dan benar secara bergantian serta cara perawatan payudara yang baik dan benar
 - j. Beri konseling pada ibu tentang KB.
 - k. Beritahu ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah sebanyak tiga kali, kunjungan pertama yaitu 6 hari setelah persalinan, kunjungan kedua yaitu dua minggu setelah persalinan, dan kunjungan ke tiga yaitu enam minggu setelah persalinan.
2. Nyeri perineum
- a. Ajarkan dan anjurkan ibu melakukan teknik relaksasi
 - b. Anjurkan ibu untuk mencari posisi yang nyaman
 - c. Ajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva
 - d. Penatalaksanaan pemberian analgetik, antibiotik, dan vitamin C
3. Potensial terjadinya infeksi
- a. Ajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva
 - b. Observasi adanya tnda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum
- Dari data diatas, terdapat kesesuaian antara teori dan kasus

6. LANGKAH VI. IMPLEMENTASI (MELAKSANAKAN PERENCANAAN DAN PENATALAKSANAAN)

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman yaitu:

1. Masa nifas normal

- a. Mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan
- b. Menyampaikan pada ibu tentang kondisi yang ia alami
- c. Menjelaskan pada ibu cara mengetahui baik tidaknya kontraksi uterus
- d. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu dan bayi
- e. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia setiap hari
- f. Mengajarkan dan anjurkan ibu untuk melakukan perawatan luka perineum dan menjaga kebersihan vulva
- g. Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang
- h. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand)
- i. Mengajarkan cara menyusui yang baik dan benar secara bergantian serta cara perawatan payudara yang baik dan benar
- j. Memberi konseling pada ibu tentang KB.
- k. Memberitahu ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah sebanyak tiga kali, kunjungan pertama yaitu 6 hari setelah persalinan,

kunjungan kedua yaitu dua minggu setelah persalinan, dan kunjungan ke tiga yaitu enam minggu setelah persalinan.

2. Nyeri perineum

- a. Mengajarkan dan anjurkan ibu melakukan teknik relaksasi
- b. Menganjurkan ibu untuk mencari posisi yang nyaman
- c. Mengajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva
- d. Melakukan penatalaksanaan pemberian analgetik, antibiotik, dan vitamin C

3. Potensial terjadinya infeksi

- a. Mengajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva
- b. Mengobservasi adanya tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum.

Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Pada tahap pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny "R" dari tinjauan pustaka penulis melaksanakan tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan perencanaan yaitu melakukan kunjungan masa nifas sebanyak empat kali yaitu kunjungan pertama empat sampai enam jam setelah persalinan, kunjungan kedua enam hari setelah persalinan, kunjungan ketiga dua minggu setelah persalinan dan kunjungan keempat enam minggu setelah persalinan.(Roito, dkk. 2013: 2-4)

Pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus.

7. LANGKAH VII. EVALUASI

Pada langkah ini dilakukan evaluasi ke efektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dianggap efektif jika memang benar dalam pelaksanaannya. Proses evaluasi merupakan langkah akhir dari proses Manajemen Asuhan Kebidanan yaitu penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang diberikan kepada klien dengan berpedoman pada masalah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil evaluasi setelah asuhan kebidanan yang dilaksanakan selama 40 hari yakni pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017, dengan 4 kali kunjungan yaitu kunjungan pertama enam sampai delapan jam setelah persalinan yaitu tanggal 27 April 2017 di puskesmas, kunjungan kedua enam hari setelah persalinan yaitu tanggal 3 Mei 2017 dirumah klien, kunjungan ketiga dua minggu setelah persalinan yaitu tanggal 11 Mei 2017 yang dilakukan di rumah klien, kunjungan keempat enam minggu setelah atau kunjungan akhir persalinan yaitu tanggal 6 Juni

2017 di rumah klien.

Pada kasus post partum dengan nyeri luka perineum Ny "R" Pada hari pertama masalah yang dialami akan diatasi dengan mengajarkan teknik relaksasi yaitu menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut jika ibu merasakan nyeri pada luka jahitannya, membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman, serta pemberian obat oral seperti amoxicilin 3 x 1, Hermafor 1 x 1, Vitamin C 3 x 1, kemudian pada evaluasi kunjungan kedua keadaan ibu sudah mengalami kemajuan dan membaik ditandai dengan mengurangnya rasa nyeri yang ibu rasakan dari sebelumnya, luka jahitan tidak menimbulkan adanya tanda-tanda infeksi, dan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu TD 110/70 mmHg, nadi 82 kali/menit, suhu 36,5 °C, dan pernafasan 20 kali/menit, kunjungan ketiga keadaan ibu jauh lebih membaik dari sebelumnya karena nyeri yang ibu rasakan sudah berkurang dan luka jahitan sudah mulai mengering, ibu sudah mulai mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan, dan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali/ menit, Suhu 36,5 °C, pernafasan 20 kali/ menit, serta pada kunjungan ke empat atau kunjungan akhir keadaan ibu sudah kembali normal membaik, luka jahitan kering dan ibu sudah tidak mengalami nyeri.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan hari pertama sampai dengan enam minggu setelah persalinan yang dilakukan secara bertahap. Maka ibu dengan nyeri luka perineum yang disebabkan oleh ruptur perineum tidak ada diagnosa terjadinya infeksi luka jahitan dan tidak

ada komplikasi yang terjadi sehingga semuanya berlangsung normal. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.



BAB V

PENUTUP

Setelah membahas dan menguraikan kasus Ny “R” masa nifas dengan nyeri luka perineum di Puskesmas Somba Opu Gowa (Rawat Inap) maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

A. Kesimpulan

1. Melaksanakan pengkajian pada Ny “R” masa nifas melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian data yang diperoleh di analisis menjadi data subjektif dan objektif.
2. Mengidentifikasi diagnosa / masalah aktual pada Ny “R” masa nifas dengan nyeri perineum dan diagnosa / masalah potensial adalahantisipasi terjadinya infeksi luka jahitan perineum.
3. Dari diagnosa / masalah pada Ny “R” diperlukan adanya kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan oral yaitu analgetik, antibiotik, dan vitamin
4. Merencanakan asuhan kebidanan pada Ny “R” pada masa nifas dengan nyeri perineum dan potensial terjadinya infeksi pada jahitan perineum.
5. Melaksanakan asuhan kebidanan pada Ny “R” masa nifas dengan nyeri perineum dari masa nifas 1 hari, 6 hari, 2 minggu, 6 minggu pasca persalinan.
6. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan pada Ny “R” masa nifas dengan nyeri perineum bahwa masalah tersebut dapat diatasi.

7. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan pada Ny “R” masa nifas dengan nyeri perineum dalam bentuk SOAP.
8. Mengintegrasikan menurut Islam pada Ny “R” masa nifas dengan nyeri perineum dalam bentuk ayat suci Al-Qur’an dan terjemahan.

B. Saran

1. Untuk Klien
 - a. Diharapkan pada setiap ibu nifas agar mengkonsumsi makanan yang bergizi karena makanan yang bergizi akan memenuhi kebutuhan energi, juga untuk mempercepat proses penyembuhan dan pengembalian alat reproduksi mendekati keadaan sebelum hamil serta untuk memperbanyak produksi ASI.
 - b. Diharapkan pada setiap ibu nifas agar senantiasa menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genetaliaanya untuk mencegah terjadinya infeksi pada diri ibu.
 - c. Diperlukan keterlibatan suami/keluarga dalam perawatan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antar pasien dengan bayinya demi menambah pengetahuan dan bimbingan sebagai kelanjutan perawatan dirumah.
2. Untuk Bidan
 - a. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan diharapkan senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih

profesional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagai bidan sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari kline.
- c. Diharapkan bidan dalam memberikan asuhan kepada klien menerapkan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan.
- d. Dalam pandangan Islam dalam memberikan asuhan kepada klien harus menerapkan kaidah agama di dalamnya agar klien dapat mengerti tentang larangan dalam melakukan hubungan badan antara suami istri apabila dalam keadaan haid atau nifas.

3. Untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Somba Opu Gowa (rawat inap)

Sebaiknya pihak Puskesmas Somba Opu Gowa khususnya yang bertugas di rawat inap, lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin agar tidak terjadi ruptur pada proses persalinan serta menerapkan program dan kebijakan teknis masa nifas yaitu melakukan kunjungan masa nifas sebanyak empat kali.

4. Untuk institusi

Menyediakan tenaga pengajar yang professional yang dapat membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syarbashi Ahmad. *Yas'Alunaka Tanya Jawab Lengkap Agama Dan Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Lentera. 2007
- Asy-Syarbashi Ahmad. *Yas'Alunaka Tanya Jawab Lengkap Agama Dan Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Lentera. 2008
- Bahiyatun. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal*. Jakarta: EGC. 2013
- Baston Helen dan Jennifer Hall. *Midwifery Essentials: Persalinan, Volume 3 (Midwifery Essentials: Labour, Volume 3)*. Jakarta: EGC Medical Publisher. 2014
- Dahri Nurdeni. "Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam (Tinjauan Terhadap, Haid, Nifas, Dan Istihadhah)". 2015
- Departemen Agama, RI. *Al Qur'an & Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro, 2010
- Hasana Nur dan Irma Damayanti. "Hubungan Antara Perawatan Luka Perineum Dengan Penyembuhan Luka Perineum Ibu Post Partum". *Jurnal Midpro*. 2012
- Lailiyana dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta: EGC. 2012
- Lasalo Narmin. "Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman Terhadap Skala Nyeri Post Sectio Caesarea Di Rsud Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta". 2016
- Ma'rifah Asirotul dan Yeni Dwi Pratiwi. "Hubungan Perawatan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Dengan Lama Penyembuhan Luka Jahitan Perineum Ibu Nifas Diruang Lingkup Bpm Sanadah, Sst Mojogeneng Mojokerto". 2015
- Makzizatunnisa dkk. "Efektifitas Senam Kegel Dan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Nyeri Perinium Pada Ibu Post Partum Di Bpm Prima Boyolali". 2014
- Maritalia Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Marmi. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peurperium Care"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Maulani Selli Septia dkk. "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan Perawatan Luka Perineum Di Bpm Bd. Siti Fatimah, Sst Kota Tasikmalaya." 2015

- Mulati Triwik Sri. "Pengaruh Derajat Laserasi Perineum Terhadap Skala Nyeri Perineum Pada Ibu Post Partum". 2016
- Nugroho Taufan dkk. *Konsep Dasar Masa Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2014
- Nurasiah Ai dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012
- Nurjanah Siti Nunung dkk. "Asuhan Kebidanan Postpartum. Bandung: PT Refika Aditama". 2013
- Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2014
- Rahayu Sri dkk. "Perbedaan Hasil Masase Perineum dan Kegel Exercise terhadap Pencegahan Robekan Perineum pada Persalinan di Bidan". *Jurnal Riset Kesehatan* Vol. 4 No. 2, Mei 2015
- Roito Juraida dkk. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas & Deteksi Dini Komplikasi*. Jakarta: EGC. 2013
- Rosmawar Cut. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Laserasi Pada Persalinan Normal Di Puskesmas Tanah Jambo Aye Pantan Labu". *Jurnal Ilmiah STIKes U'Budiyah* Vol.2, No.1, Maret 2013
- Rukiyah Ai Yeyeh dkk, *Aasuhan Kebidanan III (nifas)*. Jakarta: CV. Trans Info Media. 2012
- Saputra H. Agus Romdlon. "Pemahaman Tentang Taharah Haid Nifas Dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo". *Justitia Islamica*, vol. 12/No. 1/jan.-juni 2015
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sugihantono Anung. "Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Anak". Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 2015
- Timbawa Sriani dkk. "Hubungan Vulva Hygiene Dengan Pencegahan Infeksi L Post Partum Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Gmim Manado". *E-journal Keperawatan (e-Kp)* Volume 3 Nomor 2. 2015
- Trisnawati dan Mei Muhartati. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penyembuhan Luka Jahitan Perineum pada Ibu Nifas di Puskesmas Mergangsan Yogyakarta". 2015

- Tulas Verby Divini Prety dkk. "Hubungan Perawatan Luka Perineum Dengan Perilaku Personal Hygiene Ibu Post Partum Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Gmim Manado". e-Journal Keperawatan (e-Kp) Volume 5 Nomor 1, Februari 2017
- Utami Sri. "Perbedaan Tingkatan Nyeri pada Ibu Post Partum yang Mengalami Episiotomi dengan Ruptur Spontan di RSUD Panembahan Senopati Bantul". 2015
- Wulansari sinta dkk. "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan *Ruptur Perineum* Di Bpm Hj.Wiwin Wintarsih, Am.Keb Kota Tasikmalaya". 2016
- Yuni Viska Windah dkk." Hubungan Perawatan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Dengan Lama Penyembuhan Luka Jahitan Perineum Ibu Nifas Di Puskesmas Susukan Kabupaten Semarang". 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syarbashi Ahmad. *Yas'Alunaka Tanya Jawab Lengkap Agama Dan Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Lentera. 2007
- Bahiyatun. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal*. Jakarta: EGC. 2013
- Baston Helen dan Jennifer Hall. *Midwifery Essentials: Persalinan, Volume 3 (Midwifery Essentials: Labour, Volume 3)*. Jakarta: EGC Medical Publisher. 2014
- Dahri Nurdeni. "Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam (Tinjauan Terhadap, Haid, Nifas, Dan Istihadhah)". 2015
- Departemen Agama, RI. *Al Qur'an & Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro, 2010
- Hasana Nur dan Irma Damayanti. "Hubungan Antara Perawatan Luka Perineum Dengan Penyembuhan Luka Perineum Ibu Post Partum". *Jurnal Midpro*. 2012
- Lailiyana dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta: EGC. 2012
- Lasalo Narmin. "Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman Terhadap Skala Nyeri Post Sectio Caesarea Di Rsud Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta". 2016
- Ma'rifah Asirotul dan Yeni Dwi Pratiwi. "Hubungan Perawatan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Dengan Lama Penyembuhan Luka Jahitan Perineum Ibu Nifas Diruang Lingkup Bpm Sanadah, Sst Mojogeneng Mojokerto". 2015
- Makzizatunnisa dkk. "Efektifitas Senam Kegel Dan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Nyeri Perinium Pada Ibu Post Partum Di Bpm Prima Boyolali". 2014
- Maritalia Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Marmi. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peurperium Care"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Maulani Selli Septia dkk. "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan Perawatan Luka Perineum Di Bpm Bd. Siti Fatimah, Sst Kota Tasikmalaya." 2015
- Mulati Triwik Sri. "Pengaruh Derajat Laserasi Perineum Terhadap Skala Nyeri Perineum Pada Ibu Post Partum". 2016

- Nugroho Taufan dkk. *Konsep Dasar Masa Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2014
- Nurasiah Ai dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012
- Nurjanah Siti Nunung dkk. "Asuhan Kebidanan Postpartum. Bandung: PT Refika Aditama". 2013
- Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2014
- Rahayu Sri dkk. "Perbedaan Hasil Masase Perineum dan Kegel Exercise terhadap Pencegahan Robekan Perineum pada Persalinan di Bidan". *Jurnal Riset Kesehatan* Vol. 4 No. 2, Mei 2015
- Roito Juraida dkk. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas & Deteksi Dini Komplikasi*. Jakarta: EGC. 2013
- Rosmawar Cut. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Laserasi Pada Persalinan Normal Di Puskesmas Tanah Jambo Aye Pantan Labu". *Jurnal Ilmiah STIKes U'Budiyah* Vol.2, No.1, Maret 2013
- Rukiyah Ai Yeyeh dkk, *Aasuhan Kebidanan III (nifas)*. Jakarta: CV. Trans Info Media. 2012
- Saputra H. Agus Romdlon. "Pemahaman Tentang Taharah Haid Nifas Dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo". *Justitia Islamica*, vol. 12/No. 1/jan.-juni 2015
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sugihantono Anung. "Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Anak". Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 2015
- Timbawa Sriani dkk. "Hubungan Vulva Hygiene Dengan Pencegahan Infeksi L Post Partum Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Gmim Manado". *E-journal Keperawatan (e-Kp)* Volume 3 Nomor 2. 2015
- Trisnawati dan Mei Muhartati. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penyembuhan Luka Jahitan Perineum pada Ibu Nifas di Puskesmas Mergangsan Yogyakarta". 2015
- Tulas Verby Divini Prety dkk. "Hubungan Perawatan Luka Perineum Dengan Perilaku Personal Hygiene Ibu Post Partum Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Gmim Manado". *e-Journal Keperawatan (e-Kp)* Volume 5 Nomor 1, Februari 2017

Utami Sri. “Perbedaan Tingkatan Nyeri pada Ibu Post Partum yang Mengalami Episiotomi dengan Ruptur Spontan di RSUD Panembahan Senopati Bantul”. 2015

Wulansari sainta dkk. “Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan *Ruptur Perineum* Di Bpm Hj.Wiwin Wintarsih, Am.Keb Kota Tasikmalaya”. 2016

Yuni Viska Windah dkk.” Hubungan Perawatan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Dengan Lama Penyembuhan Luka Jahitan Perineum Ibu Nifas Di Puskesmas Susukan Kabupaten Semarang”. 2014



Nomor : B-1946 /FKIK/PP.00.9/07/2017
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Makassar, 07 Juli 2017

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.
di-
Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Rosnani
NIM : 70400114052
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Partum Dengan Nyeri Perineum di Puskesmas Somba Opu Gowa.
Tempat Penelitian : Puskesmas Somba Opu Gowa
Dosen Pembimbing : 1. Anieq Mumthia Alkautsar, S.SiT., M.Keb.
2. dr. Darmawansyih, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

an. **Dekan,**
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

- 1.Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
- 2.Masing-masing Pembimbing
- 3.Mahasiswa yang bersangkutan.
- 4.Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7214/S.01P/P2T/05/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.779A/FKIK/PP.00.9/05/2017 tanggal 28 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ROSNANI**
Nomor Pokok : 70400114052
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM DENGAN NYERI LUKA PERINEUM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Mei s/d 26 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 Mei 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 2 Juni 2017

Kepada

Nomor : 070/544 /BKB.P/2017

Yth. Puskesmas Somba Opu

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 7214/S.01.P/P2T/05/2017 tanggal 20 Mei 2017 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ROSNANI**
Tempat/Tanggal Lahir : Mangkutana, 20 Oktober 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Samata Gowa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM DENGAN NYERI LUKA PERINEUM**"

Selama : 26 Mei 2017 s/d 26 Juni 2017
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,



DRS. BAHARUDDIN.T

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kadis Kesehatan Kab.Gowa;
3. Dekan Fak.Kedokteran Dan Ilmu UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SOMBA OPU

Jl. Mesjid Raya No. 20 Sungguminasa, Gowa
email : puskesmassombaopu@gmail.com
Somba Opu 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 440.1/238 /PKM-SO/VIII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Puskesmas Somba Opu menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :


N a m a : **Rosnani**
Tempat/Tgl Lahir : Mangkutana, 20 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3)
A l a m a t : S a m a t a

Adalah benar telah mengadakan penelitian / pengumpulan data yang berjudul : **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM DENGAN NYERI LUKA PERINEUM"**

Selama : 26 Mei 2017 s/d 26 Juni 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 07 Agustus 2017
Kepala Puskesmas


drg. Is Poedji Harijati
NIP. 19611114 198711 2 002

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Rosnani
Nim : 70400114052
TTL : Mangkutana, 20 Oktober 1996
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Desa Woomparigi Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara
Prov. Sulawesi Tengah

Nama orang tua :

Ayah : Muh. Tahir

Ibu : Rosmini

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2000-2007 SD Negeri 1 Losong
2. Tahun 2007-2010 SMP Negeri 2 Bungku Utara
3. Tahun 2010-2013 SMA Negeri 1 Bungku Utara
4. Tahun 2014-2017 UIN Alauddin Makassar