

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN  
ABORTUS INKOMPLIT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA  
TAHUN 2017**



**Karya Tulis Ilmiah**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar Ahli Madya  
Diploma Kebidanan di Universitas Islam Negeri  
(UIN) Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**ROSMANENGI**  
NIM. 70400114068  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIA

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, September 2017

Penyusun



**ROSMANENGS**  
NIM. 70400114068

UNIVERSITAS ISLAM  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : Rosmanengsi

Nim : 70400114068

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Abortus  
Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017

Karya tulis ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar hasil program studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Samata, 33 Agustus 2017

Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dr.Hj.Sitti Saleha, S.Sit, SKM, M.Kes

Pembimbing II

dr.Darmawansyah, M.Kes

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH**

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Abortus Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017”, yang disusun oleh **Rosmanengsi NIM: 70400114068**, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 28 Agustus 2017 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 Agustus 2017 M  
6 Dzulhijjah 1438 H

**DEWAN PENGUJI:**

- Ketua : **Dr. dr. H. Andi Army Nurdin, M.Sc** (.....)
- Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT, M.Keb** (.....)
- Pembimbing I : **Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M.Keb** (.....)
- Pembimbing II : **dr. Darmawansyih, M.Kes** (.....)
- Penguji I : **dr. Andi Tihardimanto, M.Kes** (.....)
- Penguji II : **Dr. Dudung Abdullah, M.Ag** (.....)

*aw* Dekan



**Dr. dr. H. Andi Army Nurdin, M.Sc**  
NIP: 19550203 198312 1 001

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatu*

Menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Ibu Hamil Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Gowa.”

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan kepada Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai persyaratan penulis untuk menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan dan memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

4. Kepala Ruangan antenatal care dan postnatal care dan stafnya serta staf-staf rekam medik di RSUD Syekh Yusuf Gowa yang telah membantu dalam pengambilan data dan studi kasus yang penulis butuhkan.
5. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,SKM.,M.Keb, selaku pembimbing satu dan Ketua Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibunda dr.Darmawansyih, M.,Kes, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
7. dr.Andi Tihardimanto, M.Kes, selaku penguji yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi dan memberikan saran.
8. Dr. Dudung Abdulla, M.Ag, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
9. Dosen-dosen dan staf Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan kebidanan, menyelesaikan pendidikan hingga selesainya karya tulis ilmiah ini.
10. Orang tua tercinta yang tetap semangat memberikan dorongan dan do'a yang takhenti-hentinya Ibunda Nurdiana dan Ayahanda Basi.
11. Kepada saudaraku tercinta kakak terhebatku Tutiwarni, S.Si dan kedua adekku Jeri dan Dedi.

12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 (Durable) kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

13. Pihak-pihak yang tak sempat disebutkan, terima kasih atas bantuan dan dukungannya yang tak terhingga.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengembangan ilmu di bidang kebidanan pada umumnya. Penulis menyadari kekurangan yang tak dapat dihindari pada karya tulis ilmiah ini, sehingga kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.

Samata-Gowa, 28 Agustus 2017

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**ROSMANENCSI**  
**NIM. 70400114068**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran II : Surat izin/rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- Lampiran III : Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa
- lampiran IV : Daftar riwayat hidup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penulisan .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan .....	13
1. Pengertian Kehamilan .....	13
2. Yerubahan Yang Terjadi Pada Wanita Hamil .....	14
3. Perubahan Psikologis Pada Wanita Hamil .....	17
4. Tandadan Gejala Kehamilan .....	18

B. Tinjauan Umum Tentang Abortus.....	20
1. Pengertian Abortus .....	20
2. Macam-Macam Abortus .....	21
3. Etiologi.....	24
4. Patofisiologi .....	26
5. Diagnosis Abortus .....	26
6. Tatalaksana Umum .....	28
7. Komplikasi pada Abortus.....	30
C. Tinjauan Khusus Tentang Abortus Inkomplit.....	31
1. Pengertian Abortus Inkomplit .....	31
2. Tanda-Tanda Abortus Inkomplit .....	31
3. Diagnosis.....	31
4. Penanganan Abortus Inkomplit .....	32
5. Komplikasi Abortus Inkomplit.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Abortus Menurut Pandangan Islam .....	36
E. Tinjauan Manajemen Kebidanan	
1. Pengertian.....	42
2. Proses Manajemen Kebidanan .....	42
<b>BAB III STUDI KASUS.....</b>	
A. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	66
B. Langkah IV : Tindakan Emergensi/Kolaborasi.....	68
C. Langkah V : Rencana Tindakan/Intervensi.....	72

D. Langkah VI : Implementasi.....	72
E. Langkah VII : Evaluasi.....	75
F. Pendokumentasian SOAP.....	76
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>87</b>
A. Hasil Penelitian .....	87
B. Pembahasan.....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel3.1 Riwayatkehamilandannifas yang lalu.....	59
--	----



## ABSTRAK

**Rosmanengsi : 70400114068**

**Pembimbing I : Sitti Saleha**

**Pembimbing II : Darmawansyih**

**Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Abortus  
Inkomplit Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017**

---

Abortus merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Salah satu penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan berupa komplikasi yang disebabkan oleh abortus. Angka Kematian Ibu (AKI) di seluruh dunia yaitu satu dari 8 kematian ibu, diperkirakan 13% atau 67.000 kematian, diakibatkan oleh aborsi yang tidak aman. Hampir 95% aborsi yang tidak aman berlangsung di negara berkembang dan diperkirakan bahwa diseluruh dunia, hampir 80.000 wanita meninggal tiap tahun akibat komplikasi setelah abortus. Diperkirakan bahwa diantara 10% dan 50% dari seluruh wanita yang mengalami aborsi yang tidak aman memerlukan pelayanan medis akibat komplikasi. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah aborsi inkomplit, sepsis, hemoragi, dan cedera intra abdomen. Abortus inkomplit (keguguran tidak lengkap) adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Abortus Inkomplit Di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP yaitu langkah I pengkajian data, langkah II interpretasi data, langkah III identifikasi diagnosa atau masalah potensial, langkah IV antisipasi masalah atau tindakan segera, langkah V menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VI implementasi, langkah VII evaluasi.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan Ny "R" abortus inkomplit, tidak ditemukan hambatan pada saat memberikan asuhan. Asuhan dilakukan selama 3 hari kurang lebih 2 bulan, selama penelitian ditemukan ibu mengalami abortus inkomplit dan pada hari kedua ibu dikuret, mengeluh masih sedikit nyeri, masih ada pengeluaran darah dari jalan lahir, pada hari ketiga masih ada sedikit pengeluaran darah dan pada tanggal 30 mei 2017 ibu sudah sehat dan pulang dengan selamat.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang di gunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada Ny "R" abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017 dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny "R" dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan.

**Daftar pustaka : 32 (2010-2016)**

**Kata kunci : Ibu Hamil Dengan Abortus, Abortus Inkomplit, 7 Langkah Varney.**

## ABSTRACT

**Name** : Rosmanengsi  
**Student Reg. No.** : 70400114068  
**Supervisor I** : Sitti Saleha  
**Supervisor II** : Darmawansyih  
**Title** : **Midwifery Care Management of a Pregnant Mother with Incomplete Abortus in Regional Public Hospital Syekh Yusuf Gowa Year 2017**

---

Abortion is a public health problem because it can cause maternal morbidity and mortality. One of the main causes of maternal death is a complicated bleeding caused by the abortus. Maternal Mortality Rate (MMR) world wide which is one in eight maternal deaths, an estimated 13% or 67,000 deaths, is caused by unsafe abortion. Nearly 95% of unsafe abortions are in developing countries and it is estimated worldwide, nearly 80,000 women die every year after abortion. It is estimated that between 10% and 50% of all women have unsafe abortions with medical services due to complications. The most frequent complications are incomplete abortion, sepsis, hemorrhage, and intra-abdominal injury. The incomplete abortus is a part of the fetus in the week before 20 weeks which remains in the womb.

This study aims to implement maternity midwifery care on incomplete abortus in regional public hospital Syekh Yusuf Gowa Year 2017 following 7 steps Varney and SOAP which include data assessment in step I, data interpretation in step II, diagnosis identification or potential problem in step III, anticipation problem or immediate treatment in step IV, preparation of a comprehensive treatment plan in step V, implementation in step VI, and evaluation in step VII.

The result of the case study conducted on Mrs "R" with incomplete abortus shows no obstacles during the treatment. The treatment was carried out for 3 days approximately 2 months. During the study, it was found that the mother had an incomplete abortion. On the second day, the mother was curetted and she suffered a little pain while blood still came out of the birth canal. On the third day, blood clot still occurred, and on 30<sup>th</sup> May 2017, the mother was healthy and went home safely.

The conclusion of the case study on the 7 steps Varney and SOAP which is used for the process of obstetrics problem solving shows that an assessment on it had been carried out, and the data analysis on Mrs. "R" with incomplete abortus in regional public hospital Syekh Yusuf Gowa 2017 had been through a documental study of all findings and treatments that had been given to Mrs. "R" with the result of not gap found.

**References:** 32 (2010-2016)

**Keywords:** Pregnant Women with Abortus, Incomplete Abortus, 7 Steps Varney.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Menurut *World Health Organization* (WHO) bahwa aborsi termasuk dalam masalah kesehatan reproduksi yang perlu mendapatkan perhatian dan merupakan penyebab penderitaan wanita di seluruh dunia.”Masalah aborsi menjadi suatu pokok perhatian dalam kesehatan masyarakat karena pengaruhnya terhadap morbiditas dan mortalitas maternal” (Sarwono, 2014: 7).

WHO tahun 2012 menjelaskan bagaimana Pengadilan Nasional dan badan-badan Hak Asasi Manusia (HAM) Regional dan Internasional, termasuk badan pemantau perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah semakin menerapkan prinsip-prinsip HAM untuk memfasilitasi akses transparan perempuan terhadap layanan aborsi yang aman. Sebagai aborsi elektif yang tidak aman adalah masalah multifaset yang melibatkan politisi, pengacara, kelompok agama dan staf medis, menangani HAM perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan (Fathala, 2012: 1).

Angka Kematian Ibu (AKI) di seluruh dunia yaitu satu dari 8 kematian ibu, diperkirakan 13% atau 67.000 kematian, diakibatkan oleh aborsi yang tidak aman. Hampir 95% aborsi yang tidak aman berlangsung di Negara berkembang dan diperkirakan bahwa diseluruh dunia, hampir 80.000 wanita meninggal tiap tahun akibat komplikasi setelah abortus, diperkirakan bahwa diantara 10% dan 50% dari

seluruh wanita yang mengalami aborsi yang tidak aman memerlukan pelayanan medis akibat komplikasi. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah aborsi inkomplit, sepsis, hemoragi, dan cedera intra abdomen (WHO, 2012:32-33).

Berdasarkan data Survey Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI di Indonesia masih tinggi sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Target global *Millenium Development Goals* (MDGs) ke-5 adalah menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Mengacu dari kondisi ini mencapai target MDGs ke-5 untuk menurunkan AKI adalah diperlukan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk mencapainya (Kemenkes RI, 2014:1).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Sri yaitu 12,1% remaja memiliki perilaku seksual berisiko terjadi Kehamilan tidak Diinginkan (KTD). Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja adalah religiusitas, sikap terhadap seksualitas, akses dan kontak dengan media informasi, sikap teman dekat serta perilaku seksual pranikah teman dekat. Adapun faktor yang paling dominan mempengaruhi dan menjadi prediktor perilaku seksual pranikah pada remaja adalah perilaku seksual teman dekat, sikap mereka terhadap seksualitas dan tingkat religiusitas. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan langsung maupun tidak langsung dari teman dekat untuk melakukan hubungan seks pranikah menyebabkan seseorang menjadi bersikap permisif dan memungkinkan untuk melakukannya (Wulandari Sri, 2016: 83).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adil Ferdinand pada tahun 2012 yaitu Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh dokter untuk menggugurkan

kandungan dengan alasan kesehatan itu terutama adalah faktor medis dan faktor non medis yang berpengaruh sebelum kehamilan dan selama kehamilan calon ibu. Faktor medis dalam kehamilan yang dapat menimbulkan resiko tinggi meliputi umur ibu, umur kehamilan, tinggi badan, dan berat badan. Faktor medis semalam kehamilan misalnya tekanan darah tinggi, pendarahan akibat pelepasan plasenta sebelum waktunya, kematian bayi dalam kandungan yang sebabnya tidak diketahui yang merupakan ancaman serius terhadap ibu. Sedangkan faktor nonmedis seperti misalnya pendidikan rendah, korban perkosaan, tempat tinggal yang terpencil dari fasilitas yang memadai, tingkat sosial ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap AKI.

Penerapan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar orang yang sengaja mengobati seorang perempuan untuk menggugurkan kandungan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya, empat tahun dan pidana penjara tujuh tahun, apabila dilakukan dalam jabatannya dan dapat dipecat dari pekerjaannya maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 299 KUHP yakni merawat, menyarankan untuk mendapatkan suatu perawatan, memberitahukan atau memberi harapan bahwa dengan perawatan tersebut kehamilan seorang wanita dapat gugur haruslah terbukti di sidang pengadilan. Pasal 347 (1) KUHP barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Adil Ferdinand, 2012: 1).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriza 2013, abortus sebanyak 5% dan perdarahan sebanyak 28% adalah penyebab langsung AKI di Indonesia terkait

kehamilan dan persalinan. Penyebab lain yaitu preeklamsia dan eklamsia 24%, infeksi sebanyak 11%, partus lama sebanyak 5% (Andriza, 2013: 1).

Sampai saat ini aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) akibat kehamilan yang tidak diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya AKI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan.

Tindakan aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target agenda pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat diwujudkan (Susiana Sali, 2016: 9).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susiana Sali yang berjudul “Aborsi dan hak Reproduksi Perempuan” menyatakan bahwa tingginya kasus *unsafe abortion* mengindikasikan bahwa masalah kesehatan reproduksi merupakan masalah yang bersifat lintas sektor dan tidak dapat ditangani oleh Kementerian dan Dinas yang menangani bidang kesehatan saja (Susiana Sali, 2016: 12).

Distribusi penyebab kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 karena perdarahan yang didalamnya termasuk kasus abortus karena dalam laporan hanya disebutkan pendarahan atau sepsis sebanyak 55 orang (39,85%), infeksi sebanyak 3 orang (2,17%), karena gangguan system peredaran darah sebanyak 2 kasus (1,44%), dan karena penyebab lain sebanyak 34 kasus (24,63%) (Profil Dinkes Sul-Sel, 2014).

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Maliana Andesia tahun 2016 bahwa faktor resiko yang paling dominan sebagai penyebab abortus inkomplit dari hasil uji statistik multivariat, variabel umur dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 1.985 (95% CI 1.218-3.236), ibu dengan umur berisiko (<20 atau >35 tahun) 2 kali lebih tinggi terjadi abortus inkomplit dibandingkan ibu dengan umur tidak berisiko (Maliana Andesia, 2016:20-35).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy (2014) menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2014 ditemukan ibu hamil dengan abortus inkomplit sebanyak 52 orang. Umur ibu yang mengalami abortus inkomplit lebih banyak pada umur resiko rendah sebanyak 31 responden (59,6%) dan umur resiko tinggi sebanyak 21 responden (40,4%), responden paritas ibu yang mengalami abortus inkomplit lebih banyak pada paritas resiko rendah sebanyak 28 responden (53,8%) dan paritas resiko tinggi sebanyak 24 responden (46,2%). Karena masih tingginya angka kejadian abortus inkomplit di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang diharapkan pada ibu hamil agar untuk bisa lebih aktif memeriksakan kehamilannya dan bertanya tentang kehamilannya agar meningkatkan informasi ibu

dan mencegah terjadinya kehamilan dengan resiko terjadinya abortus inkomplit (Sandi, 2014:1).

Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari hasil temuan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2015 didapatkan angka kejadian abortus adalah 225 orang, pada tahun 2016 kejadian kasus abortus berjumlah 291 orang, diantaranya terdapat abortus inkomplit 192 orang, abortus imminiens 57 orang, abortus insipiens 8 orang, abortus propokatus 4 orang dan *missed abortion* 30 orang. Pada tahun 2017 kejadian abortus dari bulan 1-3 berjumlah 106 orang diantaranya terdapat abortus inkomplit 83 orang, abortus imminiens 14 orang, abortus insipiens 3 orang, abortus komplit 2 orang, abortus propokatus 1 orang dan *missed abortion* 3 orang.

Kejadian kasus abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa masih sangat tinggi. sehinggapenulis mengangkat judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Abortus Inkomplit” karena penanganan secara dini oleh petugas kesehatan sangat di perlukan khususnya bidan.

### ***B. Ruang Lingkup***

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Abortus Inkomplit.

### ***C. Tujuan penelitian***

#### **1. Tujuan Umum**

Dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Abortus Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa melalui pendekatan manajemen kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Dilaksanakannya pengkajiandan analisis data ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- b. Dirumuskannya diagnosa/ masalah aktual pada ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- d. Diidentifikasi tindakan segera dan kolaborasi ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan pada ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- g. Diketahuinya hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.

- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.

#### ***D. Manfaat Penulisan***

Adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah:

##### **1. Manfaat Praktis**

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program KIA.

##### **2. Manfaat Institusi**

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan Asuhan kebidanan Ibu Hamil dengan Abortus Inkomplit.

##### **3. Manfaat Ilmiah**

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

##### **4. Manfaat Bagi Penulis**

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang Abortus Inkomplit.

## **5. Manfaat Bagi Pembaca**

Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang Abortus Inkomplit.

### ***E. Metode Penulisan***

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu studi kasus.

#### **1. Studi Kepustakaan**

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan ibu hamil khususnya dengan Abortus Inkomplit.

#### **2. Studi Kasus**

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/ masalah aktual, Identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan segera/ kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

##### **a. Anamnesa**

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

#### b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi, merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengatur tekanan darah sedangkan lenec digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

#### c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan mempelajari status kesehatan klien, baik yang bersumber dari catatan, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

#### **4. Diskusi**

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

#### ***F. Sistematika Penulisan***

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari bab I sampai bab V, yaitu: pada bab I yaitu pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada babII yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan mengenai tinjauan umum kehamilan, tinjauan umum tentang abortus, tinjauan khusus tentang abortus inkomplit, tinjauan abortus menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III yaitu studi kasus, pada bab ini akan diuraikan tentang 7langkahvarney yaitu identifikasi data dasar/ pengakajian), interpretasi data (interpretasi data: identifikasi masalah atau diagnosa), mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial, kebutuhan terhadap tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan yang menyeluruh, penatalaksanaan asuhan, evaluasi hasil asuhan.

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan pada ibu hamil dengan abortus inkomplit.

Pada babV yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan sarandari asuhan yang dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan umum tentang Kehamilan***

##### **1. Pengertian Kehamilan**

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender Internasional (Sarwono, 2014: 213).

Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Setiap wanita yang memiliki organ reproduksi sehat, yang telah mengalami menstruasi, dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang organ reproduksinya sehat sangat besar kemungkinannya akan mengalami kehamilan (Mandriwati, 2012:3).

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan, triwulan pertama dimulaisejak 0-3 bulan, triwulan kedua dari 4-6 bulan, triwulan ketiga dari 7-9 bulan (Pudiastuti, 2012: iii).

## 2. Perubahan yang terjadi pada Wanita Hamil

### a. Perubahan Fisik

#### 1) Rahim

Rahim: perubahan yang amat jelas adalah pembesaran rahim untuk menyimpan bayi yang ditumbuh. Peningkatan ukuran ini disebabkan uterus membesar dan meregang yang disebabkan oleh rangsanagan estrogenserta progesterondan terjadi akibat tekanan mekanik dari dalam yaitu janin, plasenta serta cairan ketuban akan memerlukan lebih banyak ruangan.

#### 2) Vagina

Vagina sampai minggu ke-8, meningkatnya *vaskularisasi* dan pengaruh hormone estrogen pada vagina menyebabkan tanda kehamilan yang khas disebut tanda *chadwigck's*, yang berwarna kebiru-biruan yang dapat terlihat oleh pemeriksa. Respon lain pengaruh hormonal adalah sekresi sel-sel vagina meningkat, sekresi tersebut berwarna putih yang bersifat sangat asam, dikenal dengan istila “putih” atau *leucorrhoea*.

#### 3) Ovarium

Ovarium merupakan sumber hormone estrogen dan progesteron pada wanita tidak hamil. Pada kehamilan ovulasi berhenti, *corpusluteum* terus tumbuh sampai terbentuk plasenta yang mengambilalih pengeluaran hormone estrogen dan progesteron. Plasenta juga membenruk hormon yang lain: *human chorionic gonadotropin (HCG)*, *human plasenta*

*lactogen (HPL)*, juga disebut *human chorionic somammotropin (hCS)* dan *human chorionic thyrotropin (hCT)*.

#### 4) Dinding perut

Dinding perut dengan pembesaran rahim menimbulkan peregangan dan menyebabkan robeknya serabut elastis di bawah kulit, maka timbullah *strie gravidarum*. Kulit perut pada *linia alba* (garis putih) bertambah pigmentasinya disebut *linia nigra*.

#### 5) Kulit

Kulit: akibat membesarnya rahi dan pertumbuhan janin, perut menonjol keluar. Serabut-serabut elastis dari lapisan kulit terdalam terpisah dan terputus karena regangan. Tanda regangan yang disebut *strie gravidarum* terlihat pada abdomen dan bokong terjadi pada 50% wanita hami dan menghilang menjadi bayangan lebih terang setelah melahirkan. Perubahan deposit pigmeng dan *hiperpigmentasi* karena pengaruh rangsangan hormone *melanophore*.

#### 6) Payudara

Payudara terjadi perubahan secara bertahap mengalami pembesaran karena peningkatan pertumbuhan jaringan *alveoli* dan suplay darah. Puting susu menjadi menonjol dan keras, perubahan ini yang membawa fungsi laktasi, disebabkan oleh peningkatan kadar hormon estrogen, progesteron, *laktogen* dan *prolactin*.

#### 7) Sistem Sirkulasi darah

Sistem sirkulasi darah sebagaimana kehamilan berlanjut, volume darah meningkat bertahap sampai mencapai 30% sampai 50% diatas tingkat pada keadaan tidak hamil.

#### 8) Sistem pernapasan

Wanita hamil kadang-kadang mengeluh sesak dan pendek nafas, dikarenakan pada wanita hamil terjadi perubahan sistem respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Disamping itu terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar pada umur kehamilan 32 minggu.

#### 9) Sistem Gastrointestinal

Sistem gastrointestinal dapat terpengaruh oleh karena kehamilan, penyebabnya adalah faktor hormonal dan mekanis. Tingginya kadarprogesteron mengganggu keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolesterol darah dan melambatkan kontraksi otot-otot polos.

#### 10) Sistem Urinaria

Sistem urinaria pada awal kehamilan suplai darah ke kandung kemih meningkat dan pembesaran uterus menekan kandung kemih, menyebabkan sering kemih. Terjadinya hemodilusi menyebabkan metabolisme air makin lancar sehingga pembentukan air senipun bertambah.

#### 11) Berat Badan

Berat badan pada wanita hamil peningkatan berat badan normalnya sama dengan 25% dari berat badan sebelumnya, peningkatan yang utama adalah pada trimester kedua kehamilan.

#### 12) Sistem Muskuloskeletal

Selama masa kehamilan wanita membutuhkan kira-kira membutuhkan lebih banyak kalsium dan fosfor, dengan makan makanan yang seimbang kebutuhan tersebut akan terpenuhi. Postur tubuh pada wanita mengalami perubahan secara bertahap karena janin membesar bertahap dalam rahim (Sunarti, 2013:43-49).

### **3. Perubahan psikologis pada wanita hamil**

Perubahan psikologis pada wanita hamil merupakan salah satu dari tiga perubahan dalam hidupnya, ialah pubertas, kehamilan dan menopause. Perubahan yang terjadi merupakan suatu respon terhadap kehamilannya, akibat peningkatan hormon dapat mempengaruhi suasana hati dan karena yang kadarnya yang naik turun maka demikian juga suasana hati wanita, biasanya wanita menjadi labil, lebih emosional, mudah tersinggung, mudah adanya depresi, marah, sedih, takut, khawatir, tingkah laku berubah tidak sama sebelum hamil perubahan ini harus di hadapi sekalipun agak membingungkan sementara waktu.

Perubahan selama kehamilan tidak dapat di hindari, sering dalam waktu yang singkat, ada beberapa sosial dan ahli klinis menyatakan bahwa kehamilan

adalah salah satu tipe krisis, terdapat teori krisis yaitu pada awalnya mengalami syok dan menyangkal, kebingungan dengan masalah yang mengganggu. Pada periode ini, berbagai alternatif seperti aborsi, atau adopsi yang menjadi pertimbangan, legal etik, moral dan ekonomi agar dapat menerima keadaan ini membutuhkan waktu 1-6 minggu untuk mengatasinya membutuhkan dukungan situasional yang mereka harapkan (Jannah, 2013: 54-55).

#### 4. Tanda dan Gejala Kehamilan

Tanda-tanda wanita hamil dibagi menjadi dua yaitu tanda pasti dan tanda tidak pasti.

a. Tanda-tanda pasti yaitu tanda-tanda yang memastikan bahwa wanita itu pasti hamil. Tanda-tanda pasti ini diketahui setelah umur kehamilan 16 minggu atau lebih.

- 1) Terdapat bunyi jantung janin tanda-tanda pasti baru timbul setelah kehamilan lanjut diatas 4 bulan dengan *ultrasound* bunyi jantung janin dapat didengar pada kehamilan 12 minggu.
- 2) Melihat, meraba atau mendengar pergerakan anak saat melakukan pemeriksaan.
- 3) Melihat rangka janin pada pemeriksaan radiologi atau ultrasonografi.

b. Tanda-tanda tidak pasti dibagi lagi menjadi:

Tanda-tanda subjektif

Tanda subjektif ini hanya dirasakan oleh penderita terdiri dari :

- 1) *Ammenorhoe* (tidak datang bulan), semua wanita hamil akan mengalami *amminorhoe* tetapi *ammenorhoe* terjadi pula pada keadaan yang lain: wanita yang mengalami gangguan emosi, penyakit kronis seperti tuberkulose, anemia, gangguan fungsi ovarium, pergantian lingkungan dan lain-lain.
- 2) Mual dipagi hari (*Morning sickness*)  
*Morning sickness* ialah perasaan mual diwaktu pagi. Kejadian ini ialah perasaan mual, meriang, muntah-muntah, pusing kepala umumnya dipagi dari bangun tidur sampai kira-kira jam 10.00 pagi. Adanya perasaan mual belum dipastikan wanita ini hamil. Keadaan ini biasa juga terjadi pada penyakit lain seperti: *hepatitis*, *tiroid adominalis*, *ulcus peptikum* dan lain-lain.
- 3) Merasa adanya pergerakan anak  
Pergerakan janin yang pertama ini belum menjadi tanda pasti karena perasaan ini adalah subjektif yang dirasakan oleh wanita itu sendiri. Wanita yang sangat menginginkanketurunan mungkin akan merasakan adanya *quickenig* biarpun sesungguhnya wanita itu tidak hamil.
- 4) Sering buang air kemih  
Sering buang air kemih oleh karena pembesaran rahim menekan kandung kemih. Keadaan ini tidak menjadi tanda yang pasti sebab dapat juga disebabkan oleh hal lain yang ada gangguan pada kandung kemih yang

menyebabkan volume menjadi sedikit dan menimbulkan rangsangan untuk buang air kemih, misalnya tumor dan penyakit lain.

#### 5) Perubahan payudara

Perubahan payudara terjadi karena pengaruh hormonal, payudara menjadi lebih besar, tegang. Pada kehamilan 4 minggu keluar cairan jernih yang disebut kolostrum dapat dikeluarkan pada kehamilan 16 minggu. Perubahan payudara yang membesar dapat disebabkan oleh penyakit lain dan cairan yang keluar dari payudara dapat pula disebabkan oleh tumor atau *ovarial cysta* (Sunarti, 2013: 59-61).

### ***B. Tinjauan Umum tentang Abortus***

#### **1. Pengertian Abortus**

Abortus adalah terancamnya atau keluarnya buah kehamilan baik sebagian ataupun keseluruhan pada umur kehamilan lewat dari 20 minggu. Kematian janin dalam rahim disebut *Intra Uterine Fetal Death (IUFD)*, yakni kematian yang terjadi saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau pada trimester kedua dan atau yang beratnya 500 gram. Jika terjadi pada trimester pertama disebut keguguran atau abortus (Setiawati, 2013:189-190).

Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan akibat faktor tertentu atau sebelum kehamilan tersebut berusia 20 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup diluar kandungan (Yulaikha Lily, 2015: 72).

## 2. Macam-macam Abortus

Abortus dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Abortus Spontan (terjadi dengan sendiri, keguguran): merupakan  $\pm 20\%$  dari semua abortus.

Abortus spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. WHO mendefinisikan sebagai embrio atau janin seberat 500 gram atau kurang, yang biasanya sesuai dengan usia janin (usia kehamilan) dari 20 hingga 22 minggu atau kurang. Abortus spontan terjadi pada sekitar 15%-20% dari seluruh kehamilan yang diakui, dan biasanya terjadi sebelum usia kehamilan memasuki minggu ke-13 (Fauziyah, 2012: 37).

Gejala abortus spontan adalah kram dan pengeluaran darah dari jalan lahir adalah gejala yang paling umum terjadi pada abortus spontan. Kram dan pendarahan vagina yang mungkin terjadi sangat ringan, sedang, atau bahkan berat. Tidak ada pola tertentu untuk berapa lama gejala akan berlangsung. Selain itu gejala lain yang menyertai abortus spontan yaitu nyeri perut bagian bawah, nyeri pada punggung, pembukaan leher rahim dan pengeluaran janin dari dalam rahim.

Berdasarkan gambaran klinisnya, abortus dibagi menjadi:

- 1) Abortus *Imminens* (keguguran mengancam). Abortus ini baru mengancam dan masih ada harapan untuk mempertahankannya. Pada

abortus ini terjadinya pendarahan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu, janin masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks. Diagnosisnya terjadi pendarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mual, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan. Serviks belum membuka, dan tes kehamilan positif.

- 2) Abortus *incipiens* (keguguran berlangsung). Abortus ini sudah berlangsung dan tidak dapat dicegah lagi. Pada abortus ini peristiwa peradangan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks. Diagnosisnya rasa mulas menjadi lebih sering dan kuat, pendarahan bertambah
- 3) Abortus *incompletes* (keguguran tidak lengkap). Sebagian dari buah kehamilan telah dilahirkan tapi sebagian (biasanya jaringan plasenta) masih tertinggal di dalam rahim. Pada abortus ini pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Pada pemeriksaan vaginal, servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalam kavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol dari ostium uteri eksternum. Pendarahan tidak akan berhenti sebelum sisa janin dikeluarkan, dapat menyebabkan syok.
- 4) Abortus komplit (keguguran lengkap). Seluruh buah kehamilan telah dilahirkan dengan lengkap. Pada abortus ini, ditemukan pendarahan sedikit, ostium uteri telah menutup, uterus sudah mengecil dan tidak

memerlukan pengobatan khusus, apabila penderita anemia perlu diberi sulfat ferrosus atau transfusi (Fauziyah, 2012: 42-45).

- 5) *Missed Abortion* (keguguran tertunda) ialah keadaan dimana janin telah mati sebelum minggu ke-22. Pada abortus ini, apabila buah kehamilan yang tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Sekitar kematian janin kadang-kadang ada perdarahan sedikit sehingga menimbulkan gambaran abortus imminens (Sulistiyawati, 2013:123).
  - 6) Abortus *habitualis* (keguguran berulang-ulang), ialah abortus yang telah berulang dan berturut-turut terjadi: sekurang-kurangnya 3X berturut-turut.
  - 7) Abortus *infeksiosus*, *abortus septik*  
Abortus *infeksiosus* ialah abortus yang disertai infeksi pada alat genitalia. Abortus septik ialah abortus yang disertai penyebaran infeksi pada peredaran darah tubuh (Sarwono, 2014: 467-473).
- b. Abortus Provocatus (disengaja, digugurkan): 80 % dari semua abortus dibagi atas 2 yaitu:
- 1) Abortus *provocatus artificialis* atau abortus *therapeuticus*.  
Abortus *provocatus artificialis* atau *abortus therapeuticus* ialah pengguguran kehamilan biasanya dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan membawa maut bagi ibu, misalnya karena ibu berpenyakit berat misalnya: penyakit jantung, *hypertensi essentialis*, *carcinoma* dari serviks.

## 2) Abortus *Provocatus criminalis*

Abortus buatan kriminal (abortus *provocatus criminalis*) adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah atau oleh orang yang tidak berwenang dan dilarang oleh hukum (Feryanto, 2014: 41). Abortus *provocatus criminalis* adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum. Abortus *provocatus* dapat dilakukan dengan pemberian prostaglandin atau *curettage* dengan penyedotan (Vacuum) atau dengan sendok kuret (Pudiastuti, 2012: 41-42).

### 3. Etiologi

Penyebab keguguran sebagian besar tidak diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor sebagai berikut:

Ada beberapa faktor-faktor penyebab abortus adalah

- a. Faktor pertumbuhan hasil konsepsi. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi dapat menyebabkan kematian janin dan cacat bawaan yang menyebabkan hasil konsepsi dikeluarkan. Gangguan pertumbuhan hasil konsepsi dapat terjadi karena :
  - 1) Faktor kromosom. Gangguan terjadi sejak semula pertemuan kromosom termasuk kromosom seks.
  - 2) Faktor lingkungan endometrium
    - a) Endometrium yang belum siap untuk menerima implantasi hasil konsepsi.
    - b) Gizi ibu kurang karena anemia atau jarak kehamilan terlalu pendek.

3) Pengaruh luar.

- a) Infeksi endometrium, endometrium tidak siap menerima hasil konsepsi.
- b) Hasil konsepsi berpengaruh oleh obat dan radiasi menyebabkan pertumbuhan hasil konsepsi terganggu.

b. Kelainan pada plasenta

- 1) Infeksi pada plasenta dengan berbagai sebab, sehingga plasenta tidak dapat berfungsi. Gangguan pembuluh dara plasenta diantaranya diabetes mellitus.
- 2) Hipertensi menyebabkan gangguan peredaran dara plasenta sehingga menimbulkan keguguran.

c. Penyakit ibu.

Penyakit ibu dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan melalui plasenta.

- 1) Penyakit infeksi seperti pneumonia, tifus abdominalis, malaria dan sifilis
- 2) Anemia ibu melalui gangguan nutrisi dan gangguan peredaran O<sub>2</sub> menuju sirkulasi retroplasenter.
- 3) Penyakit menahun ibu seperti hipertensi, penyakit ginjal. Penyakit hati, dan penyakit diabetes mellitus kelainan yang terdapat dalam rahim. Rahim merupakan tempat tumbuh kembangnya janin dijumpai keadaan abnormal dalam bentuk mioma uteri, uterus arkuatus, uterus septus, retropleksia uteri, serviks inkompeten, bekas operasi pada serviks

(kolisasi, amputasi, serviks), robekan serviks postpartum (Manuaba, Ida Ayu Candranita dkk, 2013 :288-289).

#### 4. Patofisiologi

Pada awal abortus, terjadi pendarahan dalam desidua basalis kemudian diikuti oleh nekrosis jaringan sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan hasil konsepsi terlepas sebagian atau seluruhnya sehingga merupakan benda asing dalam uterus. Keadaan ini menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan isinya. Pada kehamilan kurang dari 8 minggu, hasil konsepsi itu biasanya dikeluarkan seluruhnya karena *vili korialis* belum menembus desidua secara mendalam.

Pada kehamilan antara 8 dan 14 minggu, *vili korialis* menembus desidua lebih dalam dan umumnya plasenta tidak dilepaskan dengan sempurna sehingga dapat menyebabkan banyak pendarahan. Pada kehamilan 14 minggu ke atas, umumnya yang dikeluarkan setelah ketuban pecah adalah janin, disusul setelah beberapa waktu kemudian adalah plasenta. Pendarahan tidak banyak jika plasenta segera terlepas dengan lengkap. Peristiwa abortus ini menyerupai persalinan dalam bentuk miniatur (Yulaikha, 2015:75).

#### 5. Diagnosis Abortus

Sebagai seorang bidan pada kasus perdarahan awal kehamilan yang harus dilakukan adalah memastikan arah kemungkinan keabnormalan yang terjadi berdasarkan hasil tanda dan gejala yang ditemukan, yaitu melalui

a. Anamnesa

- 1) Usia kehamilan ibu (kurang dari 20 minggu).
- 2) Adanya kram perut atau mules daerah atas symphysis, nyeri pinggang akibat kontraksi uterus.
- 3) Perdarahan pervaginam mungkin disertai dengan keluarnya jaringan hasil konsepsi.

b. Pemeriksaan fisik

Hasil pemeriksaan fisik di dapat:

- 1) Biasanya keadaan umum (KU) tampak lemah.
- 2) Tekanan darah normal atau menurun.
- 3) Denyut nadi normal, cepat atau kecil dan lambat.
- 4) Suhu badan normal atau meningkat.
- 5) Pembesaran uterus sesuai atau lebih kecil dari usia kehamilan.

c. Pemeriksaan ginekologi

Hasil pemeriksaan ginekologi didapat:

Inspeksi vulva untuk menilai perdarahan pervaginam dengan atau tanpa jaringan hasil konsepsi.

- 1) Pemeriksaan pembukaan serviks.
- 2) Inspekulo menilai ada/tidaknya perdarahan dari cavum uteri, ostium uteri terbuka atau tertutup, ada atau tidaknya jaringan di ostium.

- 3) *Vagina Toucher* (VT) menilai portio masih terbuka atau sudah tertutup teraba atau tidak jaringan dalam cavum uteri, tidak nyeri adneksa, kavum doglas tidak nyeri.
- d. Pemeriksaan penunjang dengan ultrasonografi (USG) oleh dokter (Irianti, 2014: 76-77).

## 6. Tatalaksana umum

Klasifikasi Abortus dan Penanganannya:

Sebelum penanganan sesuai klasifikasinya, abortus memiliki penanganan secara umum antara lain:

- a. Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, pernapasan, suhu).
- b. Pemeriksaan tanda-tanda syok (akral dingin, pucat, takikardi, tekanan sistolik <90 mmHg). Jika terdapat syok, lakukan tatalaksana awal syok. Jika tidak terlihat tanda-tanda syok, tetap fikirkan kemungkinan tersebut saat penolong melakukan evaluasi mengenai kondisi ibu karena kondisinya dapat memburuk dengan cepat.
- c. Bila terdapat tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, berikut kombinasi antibiotika sampai ibu bebas demam untuk 48 jam:
  1. Ampisilin 2 g IV/IM kemudian 1 g diberikan setiap 6 jam.
  2. Gentamicin 5 mg/kgBB IV setiap 24 jam
  3. Metronidazol 500 mg IV setiap 8 jam
- d. Segerah rujuk ibu ke rumah sakit.

- e. Semua ibu yang mengalami abortus perlu mendapat dukungan emosional dan konseling kontrasepsi pasca keguguran.
- f. Lakukan tatalaksana selanjutnya sesuai jenis abortus (WHO, 2013:84).
  1. Abortus imminens adalah Penanganannya:
    - a) Berbaring, cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan sehingga rangsang mekanik berkurang.
    - b) Pemberian hormon progesteron
    - c) Pemeriksa ultrasonografi (USG).
  2. Abortus Insiptens adalah pengeluaran janin dengan kuret vakum atau cunam ovum, disusul dengan kerokan. Pada kehamilan lebih dari 12 minggu bahaya perforasi pada kerokan lebih besar, maka sebaiknya proses abortus dipercepat dengan pemberian infus oksitosin. Sebaliknya secara digital dan kerokan bila sisa plasenta tertinggal bahaya perforasinya kecil.
  3. Abortus inkomplit adalah begitu keadaan hemodinamik pasien sudah dinilai dan pengobatan dimulai, jaringan yang tertahan harus diangkat atau perdarahan akan terus berlangsung. Oksitosik (oksitosin 10 IU/500ml larutan dekstrosa 5% dalam larutan RL IV dengan kecepatan kira-kira 125 ml/jam) akan membuat uterus berkontraksi, membatasi perdarahan, membantu pengeluaran bekuan darah atau jaringan dan mengurangi kemungkinan perforasi uterus selama dilatasi dan kuretase.

#### 4. Abortus komplit dan abortus tertunda (*missed Abortion*)

Pengobatan terbaru *missed abortion* adalah induksi persalinan dengan supositoria prostaglandin E<sub>2</sub>, jika perlu dengan oksitosin IV (C.Benson, 2013: 302).

### 7. Komplikasi pada Abortus

Komplikasi yang terjadi pada abortus yang di sebabkan oleh abortus kriminalis dan abortus spontan adalah sebagai berikut:

- a. Perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfusi darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak di berikan pada waktunya.
- b. Infeksi kadang-kadang sampai terjadi sepsis, infeksi dari tuba dapat menimbulkan kemandulan.
- c. Faal ginjal rusak disebabkan karena infeksi dan syok. Pada pasien dengan abortus diurese selalu harus diperhatikan. Pengobatan ialah dengan pembatasan cairan dengan pengobatan infeksi.
- d. Syok bakteril: terjadi syok yang berat rupa-rupanya oleh toksin-toksin. Pengobatannya ialah dengan pemberian antibiotika, cairan, corticosteroid dan heparin.
- e. Perforasi: ini terjadi karena curratage atau karena abortus kriminalis (Pudiastuti,2012: 49-50).

### ***C. Tinjauan khusus tentang Abortus Inkomplit***

#### **1. Pengertian Abortus Inkomplit**

Abortus inkomplit (keguguran tidak lengkap) adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Pada pemeriksaan vaginal, servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalam kavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol dari ostium uteri eksternum. Pendarahan tidak akan berhenti sebelum sisa janin dikeluarkan, dapat menyebabkan syok (Irianti, 2012: 43).

#### **2. Tanda-tanda Abortus Inkomplit**

- a. Setelah terjadi abortus dengan pengeluaran jaringan, pendarahan berlangsung terus.
- b. Sering cervix tetap terbuka karena masih ada benda di dalam rahim yang dianggap corpus allieum, maka uterus akan berusaha mengeluarkannya dengan mengadakan kontraksi. Tetapi kalau keadaan ini dibiarkan lama cerviksakan menutup kembali (Pudiasuti, 2012: 45).

#### **3. Diagnosis**

- a. Perdarahan memanjang, sampai terjadi keadaan anemis.
- b. Perdarahan mendadak banyak menimbulkan keadaan gawat.
- c. Terjadi infeksi ditandai suhu tinggi.
- d. Dapat terjadi degenerasi ganas.
- e. Pada pemeriksaan dijumpai gambaran:
  - 1) Kanalis servikalis terbuka

- 2) Dapat diraba jaringan dalam rahim.
- 3) Lakukan pemeriksaan bimanual: ukuran uterus, dilatasi, nyeri tekan, penipisan serviks, serta kondisi ketuban.
- 4) Jika hasil pemeriksaan negatif, lakukan pemeriksaan denyut jantung janin untuk menentukan kelangsungan hidup janin dan tenangkan keadaan ibu.
- 5) Jika perdarahan terus berlanjut, khususnya jika ditemui uterus lebih besar dari yang harusnya mungkin menunjukkan kehamilan ganda atau molahidatidosa.
- 6) Jika perdarahan berhenti, lakukan asuhan antenatal seperti biasa dan lakukan penilaian jika terjadi perdarahan lagi.
- 7) Konsultasi dan rujuk ke dokter spesialis jika terjadi perdarahan hebat, kram meningkat atau hasil pemeriksaan menunjukkan hasil abnormal (Yulaikhah, 2015:79-80).

#### **4. Penanganan Abortus Inkomplit**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngot Thi Nuh Nguyen, 2013 adalah 300 terdaftar antara bulan September 2009 dan Mei 2010. Hampir semua Peserta (96,3%) berhasil menyelesaikan pemeriksaan dengan menggunakan dosis tunggal misoprostol 400 mcg. Mayoritas wanita (87,2%) menemukan efek samping yang bisa ditoleransi atau mudah ditolerir. Sebagian besar wanita (84,3%) merasa puas atau sangat puas. Dengan perlakuan yang mereka terima: hanya satu yang tidak puas (0.3%).

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa 400 mcg sublingual misoprostol efektif mengevakuasi uterus untuk sebagian besar. Wanita mengalami aborsi tidak lengkap. Tingginya tingkat kepuasan dan tolerabilitas efek samping juga membuktikan kemudahan penggunaan metode ini. Dari data tersebut dan diberikan consensus Internasional seputar keefektifan misoprostol untuk perawatan aborsi yang tidak lengkap, tampaknya tepat waktu penggunaan obat untuk indikasi ini diperluas secara luas baik di seluruh Vietnam maupun dimanapun akses terhadap perawatan aborsi terbatas (Ngot Thi Nuh Nguyen dkk, 2013: 1).

Abortus Inkomplit harus segera dibersihkan dengan *curettage* atau secara digital. Selama masih ada sisa-sisa plasenta akan terus terjadi pendarahan (Pudiastuti, 2012: 48).

a. penanganan

- 1) Terapi abortus dengan curetase
- 2) Perawatan pasca tindakan
- 3) Pemantauan pasca abortus

b. penanganan

- 1) Lakukan konseling.
- 2) Jika perdarahan ringan atau sedang dan usia kehamilan kurang dari 16 minggu, gunakan jari atau forsep cincin untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang mencuap dari serviks.

- 3) Jika perdarahan berat atau usia kehamilan kurang dari 16 minggu, lakukan evaluasi isi uterus. Aspirasi vacuum manual (AVM) adalah metode yang dianjurkan. Kuret tajam sebaiknya hanya dilakukan bila AVM tidak tersedia. Jika evaluasi tidak dapat segera dilakukan, berikan ergometri 0,2 mg IM (dapat di ulang 15 menit kemudian bila perlu).
- 4) Jika usia kehamilan lebih dari 16 minggu, berikan infus 40 IU oksitosin dalam satu liter NaCl 0,9% atau ringer laktat dengan kecepatan 40 tetes/menit untuk membantu pengeluaran hasil konsepsi.
- 5) Lakukan evaluasi tanda vital pasca tindakan setiap 30 menit selama 2 jam. Bila kondisi ibu baik, pindahkan ibu ke ruang rawat.
- 6) Lakukan pemeriksaan jaringan secara makroskopis dan kirimkan untuk pemeriksaan patologi kelaboratorium.
- 7) Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, tanda akut abdomen, dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar hb > 8 g/dl, ibu dapat diperbolehkan pulang (WHO, 2013: 87).

#### **4. Komplikasi abortus inkomplit**

##### **a. Perdarahan**

Perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfusi darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada waktunya.

b. Perforasi

Perforasi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus pada posisi hiperretrofleksi. Dengan adanya dugaan atau kepastian terjadi perforasi, laparotomi harus segera dilakukan untuk menentukan luasnya perlukaan pada uterus dan apakah ada perlukaan alat-alat lain.

c. Infeksi

Infeksi dalam uterus dan sekitarnya dapat terjadi disetiap abortus, tetapi biasanya ditemukan pada abortus inkomplit dan lebih sering pada abortus buatan yang dikerjakan tanpa memperhatikan aseptis dan antisepsis.

d. Syok

Syok pada abortus biasa terjadi karena perdarahan dan karena infeksi berat.

e. Kematian

Abortus berkontribusi terhadap kematian ibu sekitar 15%. Data tersebut sering kali tersembunyi di balik data kematian ibu akibat perdarahan. Data lapangan menunjukkan bahwa sekitar 60% -70% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, dan sekitar 60% kematian akibat perdarahan tersebut, atau sekitar 35-40% dari seluruh kematian ibu, disebabkan oleh perdarahan postpartum. Sekitar 15-20% kematian disebabkan oleh perdarahan (Irianti, 2014:77-78).

#### **D. Tinjauan Umum tentang Abortus Menurut Pandangan Islam**

Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Setiap wanita yang memiliki organ reproduksi sehat, yang telah mengalami menstruasi, dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang organ reproduksinya sehat sangat besar kemungkinannya akan mengalami kehamilan. Apa bila kehamilan ini di rencanakan, akan memberi rasa kebahagiaan dan penuh harapan (Mandriwati, 2012: 3). Tidak semua pasangan usia subur bisa hamil walaupun itu semua termasuk cita-cita para pasangan suami istri, tanpa adanya anugerah dari Allah swt.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan ibu hamil dengan abortus ialah (Qs.Al-anfall/ 8: 27).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu (Kementrian agama, 2010: 180).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman diingatkan agar tidak mengabaikan perintah, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan juga jangan mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW atas amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu seperti halnya yang diberikan amanat

atau kepercayaan untuk hamil, berarti Allah menitipkan kepercayaan kepadanya dan merasa aman bahwa sesuatu yang dititipkan itu akan dipelihara olehnya dengan baik. Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah Swt. Termasuk keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya. Dalam ayat ini pula ditegaskan bahwa siapa yang mengkhianati amanat berarti mengkhianati Allah dan Rasulnya dan sama halnya mengkhianati dirinya sendiri.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Anfaal/ 8:28.

عَظِيمًا جَرُّعِنْدَهُ رُلُّهُ وَأَنَّ فِتْنَةً وَأَوْلَادُكُمْ مَوَالِكُمْ أَنَّمَا وَعَلَّمُوا

Terjemahnya:

dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (kementerian agama, 2010: 180).

Ayat ini juga menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah suatu ujian dan cobaan, manusia diingatkan jangan sampai lemah dalam menghadapi ujian itu dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad dan tanggung jawab dan amanat. Mengabaikan hal ini adalah khianat kepada Allah dan Rasul serta khianat terhadap diri sendiri, peringatan itu disertai dengan mengingatkan bahwa di sisi Allah terdapat ganjaran yang besar, lebih besar dari pada harta benda dan anak-anak. Karena itu, jangan sampai anak dan harta menjadikan kamu melanggar sehingga kamu mendapat siksa maka bersyukur dan berserah dirilah kepada Allah karena sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar. Sebagaimana kita sebagai anak harus hormat kepada kedua orangtua kita.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam (QS.Al-Ahqaf/ 46: 15) yang berbunyi.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمَلُهُ  
 وَفَصَلُّهُ ط ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ط وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ط  
 إِنَّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri" (Kementerian agama RI, 2010: 504).

Ayat diatas menyatakan sesungguhnya Kami telah memerintahkan pada manusia agar taat kepada kami sepanjang hidup mereka dan Kami telah mewasiatkan yakni memerintahkan dan berpesan kepada manusia agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya siapa pun dan apapun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orangtuanya. Ini antara lain karena ayahnya terlibat dalam kejadiannya dan setelah sang Ayah mencampakkan sperma kedalam rahim ibunya sang ibu mengandungnya dengan susah paya sambil mengalami aneka kesulitan bermula dari mengidam, dan aneka gangguan fisik dan psikis dan melahirkannya dengan susah payah setelah berlalu masa kehamilan.

Kami jadikan *dari nuthfah* yakni setetes mani, kemudian setetes mani itu setelah bertemu dengan indung telur berubah menjadi '*alaqah* yakni sesuatu yang berdempet di dinding rahim, *kemudian* '*alaqah* itu mengalami proses dalam rahim ibu, hingga menjadi *mudhghah* yakni sesuatu berupa sekerat daging kecil, sebesar apa yang dapat dikunyah; ada *mudhghah yang sempurna kejadiannya* hingga dapat berproses hingga lahir manusia sempurna, *danada juga yang tidak sempurna kejadiannya*. Proses ini Kami kemukakan *agar Kami jelaskan kepada kamu* kuasa menciptakan dari tiada menjadi ada, dan dari mati menjadi hidup, sekaligus menjadi bukti kuasa Kami membangkitkan kamu setelah kematian. Bukanlah perpindahan tanah yang mati kenuthfah sampai akhirnya menjadi bayi yang segar bugar adalah bukti yang tidak dapat diragukan tentang terjadinya peralihan yang mati menjadi hidup?

Ayat di atas setelah perhentian di atas untuk menunjukkan lebih banyak lagi bukti-bukti kekuasaan-Nya dengan menyatakan bahwa Kami tetapkan bagi *mudhghah yang tidak sempurna kejadiannya* itu untuk gugur *dan kami tetapkan dalam rahim* bagi *mudhghah yang sempurna kejadiannya* untuk berlanjut proses kejadiannya sesuai *apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan* oleh Allah untuk kelahirannya antara enam dan sembilan bulan lebih, *kemudian Kami keluarkan masing-masing kamu* dari perut ibu kamu masing-masing *sebagai bayi, kemudian* kemudian dengan berangsur-angsur kamu Kami pelihara *agar kamu mencapai masa terkuat kamu*, yakni puncak kedewasaan dan kekuatan fisik, mental dan pikiran, *dan diantara kamu ada yang diwafatkan*

sebelum mencapai tahap-tahap yang disebut itu *dan ada pula diantara kamu ada yang* berlanjut usianya hingga *dikembalikan sampai keumur yang rendah* kualitasnya, yakni usia lanjut, dan menjadi pikun *hingga akhirnya* tidak memiliki daya dan *dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun* yang penting bagi kemaslahatan hidup *yang dahulu telah diketahuinya*. Kami yang menciptakan kamu sekalian demikian itu tidak akan memiliki sedikit kesulitan pun untuk mengembalikan kamu dan semua manusia untuk hidup kembali setelah meninggalkan dunia yang fana ini.

Sebagaimana disebutkan dalam surah dibawah ini (QS.Al-Isra/ 17: 31)

كَبِيرًا خَطَاكَانَ قَتَلَهُمْ إِنَّ وَآيَاكُمْ نَزَرُ قُهُمْ نَحْنُ إِمْلَقِ خَشِيَةَ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Kementerian agama RI, 2010: 285).

Ayat diatas menjelaskan larangan membunuh anak-anak karena faktor kemiskinanakan menimpa mereka. Jangan khawatir rezeki mereka dan rezeki kamu, karena Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing yang penting disertai usaha untuk memperolehnya. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Tafsir Al-Misbah, 2009: 77).

Menurut Shaleh Muhammad Al-Djufri tahun 2015 dalam disertasinya yang berjudul “Aborsi dalam Perspektif Kedokteran dan Hukum Islam” yaitu dalam

dunia kedokteran, aborsi tidak diperbolehkan atau dilarang keras, karena dianggap telah membunuh janin, sedangkan pelakunya bisa dikenai hokum pidana, kecuali bila mengancam nyawa ibu. Sedangkan, hokum aborsi dalam perspektif hokum islam yaitu bahwa para ulamasepakat menghukumi haram jika abortus tersebut dilakukan setelah peniupan ruh yaitu setelah 120 hari, sedangkan jika aborsi tersebut dilakukan sebelum peniupan ruh maka ada perbedaan pendapat.

Aborsi di perbolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat:

- a) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
  - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cavern dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim dokter.
  - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
- b) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat yang membolehkan aborsi adalah:
  - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang yang kalau lahir kelak sulit sembuhkan.
  - 2) Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang, yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban dokter dan ulama.
  - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf 2 harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Secara teoritis, pelarangan agama maupun undang-undang terhadap praktek aborsi adalah untuk menjaga kelangsungan hidup sijnin yang yang secara hukum islam hubungan tersebut masuk dalam kategori zina atau hubungan diluar nikah (Al-Djufri Shaleh Muhammad, 2015: 206-209).

### ***C. Tinjauan Manajemen Kebidanan***

#### **1. Pengertian**

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan, dalam rangkaian/tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang berfokus pada klien (Jannah, 2012: 193).

#### **2. Proses Maanajemen Kebidanan**

Proses manajemen kebidanan merupakan urutan langkah yang saling berhubungan, bersambungan, dan berulang kembali untuk bias mengevaluasi efektifitas dari rencana asuhan diperlukan proses dalam pengumpulan data, mengevaluasi dan membuat rencana asuhan kembali. Proses tersebut berlangsung setiap kali memberikan asuhan kepada klien. Karena itu terdapat hubungan yang dinamis menurut antara masing-masing langkah (Jannah, 2012: 193-194).

Manajemen kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan, yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi.

Langkah-langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang biasa diaplikasikan dalam semua situasi. Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut Varney.

a. Langkah I (Pengumpulan data/ pengakajian)

Langkah ini mengumpulkan semua informasi yang akurat, lengkap dari semua sumber yang berkaitan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa: (Jannah, 2012: 195).

1) Biodata

Adalah identitas untuk mengetahui status klien secara lengkap sehingga sesuai dengan sasaran. Identitas meliputi:

- a) Nama: untuk mengetahui dan mengenal pasien
- b) Umur: untuk mengetahui faktor resiko dan tingkat kesuburan.
- c) Agama: untuk mengetahui kepercayaan yang dianut oleh pasien
- d) Suku bangsa: dikaji untuk mengetahui lebih jauh tentang sosial budaya pasien.
- e) Pendidikan: untuk mengetahui tingkat pendidikan yang nantinya penting dalam pemberia KIE (kongseling informasi dan edukasi).
- f) Pekerjaan: untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi keluarga.
- g) Alamat: dikaji untuk mengetahui keadaan sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal budaya.

## 2) Data subjektif

Adalah data yang di dapat dari klien sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi data klien. Data tersebut tidak dapat di tentukan oleh petugas kesehatan secara independen tapi melalui suatu interaksi atau komunikasi.

## 3) Alasan masuk

Untuk mengetahui alasan yang membuat pasien datang yang berhubungan dengan abortus inkomplit.

### Keluhan utama

Untuk mengetahui masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan masa kehamilan misalnya ada pengeluaran darah dari jalan lahir, pada kasus abortus biasa terjadi yaitu pengeluaran darah dari jalan lahir, badan terasa lemas, nyeri perut dan penglihatan berkunang-kunang.

## 4) Riwayat penyakit

### a) Riwayat penyakit sekarang

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya riwayat penyakit yang diderita pada saat ini yang ada hubungannya dengan keadaannya sekarang.

### b) Riwayat kesehatan yang lalu

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya riwayat atau penyakit akut, kronis seperti jantung, DM, hipertensi, asma yang dapat mempengaruhi pada masa nifas ini.

c) Riwayat kesehatan keluarga

Data ini diperlukan untuk mengetahui apakah dalam keluarga ada yang menderita penyakit menurun seperti asma, hepatitis dan DM serta penyakit menular seperti TBC dan hepatitis.

d) Riwayat menstruasi

Ibu mengetahui menarche, siklus haid, lamanya, jumlah darah yang dikeluarkan dan pernahkah disminorhea.

e) Riwayat perkawinan

Untuk mengetahui status perkawinannya, lama perkawinan, sah atau tidak, sudah berapakah menikah dan berapa jumlah anaknya.

f) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Untuk mengetahui jumlah kehamilan dan kelahiran, riwayat persalinan yaitu jarak antara dua kelahiran, tempat kelahiran, lamanya melahirkan dan cara melahirkan. Riwayat kelahiran anak mencakup berat badan bayi sewaktu lahir, adakah kelainan bawaan bayi, jenis kelamin bayi, keadaan bayi hidup/mati saat dilahirkan.

g) Riwayat KB

Untuk mengetahui apakah pasien pernah ikut KB dengan kontrasepsi jenis apa, berapa lama adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi serta rencana KB setelah dikuret dan beralih kontrasepsi apa.

#### h) Riwayat kehamilan sekarang

Untuk mengetahui keadaan kesehatan ibu selama hamil ada atau tidaknya penyakit serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut.

- 1) Hari pertama, haid terakhir serta kapan taksiran persalinannya.
- 2) Keluhan-keluhan pada trimester I, II, III
- 3) Dimana ibu biasa memeriksakan kehamilannya.
- 4) Selama hamil berapa kali ibu peiksa kehamilan
- 5) Penyuluhan yang pernah ibu dapat selama kehamilan berapa minggu.
- 6) Imunisasi TT: sudah/belum imunisasi, berapa kalitelah dilakukan imunisasi TT selama hamil.

#### 2. Data obyektif

Adalah menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik pasien yang meliputi:

##### a) Pemeriksaan fisik

###### 1) Status generalis

- (a)Keadaan umum: untuk mengetahui keadaan umum ibu apakah baik, sedang, buruk. Keadaan ibu setelah dilakukan kuretase, adalah sedang. Berdasarkan tanda-tanda pasien post kuret yaitu adanya ibu merasakan nyeri danada darah keluar dari jalan lahir dan ibu merasa lemas.

(b) Kesadaran: untuk mengetahui tingkat kesadaran yaitu apakah kompos mentis, apatis, samnolen atau koma.

(c) Tanda vital

1) Tekanan darah: untuk mengetahui atau mengukur batas normal tekanan darah antara sistolik 90-130 mmHg, diastolik 70-90 mmHg. Sedangkan tekanan darah pada diagnosa abortus normal atau menurun

2) Suhu: untuk mengetahui suhu basal pada ibu, suhu badan yang normal  $36,5^{\circ}\text{C}$  -  $37,5^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan pada kasus abortus suhu badan normal atau meningkat.

3) Nadi: untuk mengetahui denyut nadi pasien. Berdasarkan kasus abortus denyut nadi normal, cepat, kecil dan lambat (Irianti Bayu, 2014: 77)

4) Respirasi: untuk mengetahui frekuensi pernafasan yang dihitung dalam menit. Sedangkan respirasi pada ibu abortus cenderung lebih lambat. Pada abortus inkomplit, kuman dapat bermigrasi pada daerah abdomen hingga menyebabkan infeksi dalam rahim, syok dan perdarahan jika kontraksi dan sisah hasil konsepsi belum keluar semua. Tanda-tanda infeksi pada ibu post kuret yaitu suhu tubuh meningkat, nadi cepat dan nyeri perut bagian bawah.

(d)Tinggi badan: untuk mengetahui tinggi badan pasien.

(e)Lingkar lengan atas: untuk mengetahui status gizi atas pasien.

Pada kasus post kuret dengan dengan riwayat abortus inkomplit, pengeluaran darah dari jalan lahir merupakan salah satu terjadinya abortus inkomplit.

#### 5) Inspeksi

Pemeriksaan klien dengan melihat ujung rambut sampai dengan ujung kaki.

(a)Rambut: untuk mengetahui kebersihan rambutnya, kondisi kulit kepala bersih, rontok atau tidak.

(b) Wajah: untuk mengetahui keadaan wajah pucat atau tidak, ada oedema atau tidak dan ada kloasma gravidarum atau tidak.

(c) Mata: kongjungtiva pucat atau tidak, sklera putih atau tidak dan mata cekung atau tidak.

(d) Mulut dan gigi: untuk mengetahui keadaan mulut bersih atau tidak, gusi ada stomatitis atau tidak, ada caries pada gigi atau tidak.

(e) Abdomen: untuk mengetahui ada bekas luka operasi atau tidak. Pada kasus abortus pembesaran uterus sesuai atau lebih kecil dari usia kehamilan.

- (f) Vulva: untuk menilai perdarahan pervaginam dengan atau tanpa jaringan hasil konsepsi.
- (g) Anus: untuk mengetahui apakah ada hemorroid.

#### 6) Palpasi

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meraba.

- (a)Leher: untuk mengetahui ada pembesaran kelenjar tyroid atau kelenjar gondok.
- (b)Dada: untuk mengetahui ada benjolan pada payudara atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak, ada kelainan bentuk atau tidak, putting susu menonjol.
- (c)Abdomen: untuk mengetahui keadaan kontraksi uterus, tinggi fundus uteri berapa jari dibawah pusat.
- (d)Genetalia: pemeriksaan pembukaan serviks, inspekulo menilai ada/tidaknya perdarahan dari cavum uteri, ostium uteri terbuka atau tertutup, ada atau tidaknya jaringan di ostium.

*Vagina toucher* (VT) menilai portio masih terbuka atau sudah tertutup, teraba atau tidak jaringan dalam kavum uteri, tidak nyeri adneksa, kavum doglas tidak nyeri (Husin Farid, 2014: 77).

Ekstremitas untuk mengetahui ada tidaknya varices

### 3. Data penunjang

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendukung pencegahan diagnosa seperti pemeriksaan laboratorium (hemoglobin, golongan darah, protein urin, glukosa urine), pemeriksaan USG (Jannah Nurul, 2012: 203)

#### b. Langkah II Interpretasi data: identifikasi masalah atau diagnosa.

Pemeriksaan fisik, meliputi:

keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu. Klien yang mengalami abortus inkomplit biasanya menunjukkan klien pucat, nyeri perut yang hebat dan perdarahan.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

#### 1. Diagnosa kebidanan

Diagnosa kebidanan yang disimpulkan oleh bidan (Jannah, 2012: 204).

Diagnos pada kasus ini ditegakkan Ny.xPxAx umur x tahun hamil denan abortus inkomplit post kuretase hari beberapa.

Dasar:

a) Data subyektif

- 1) Ibu mengatakan keadaan setelah kuretase
- 2) Ibu mengatakan merasa cemas dan rasa tidak nyaman setelah kuretase.

b) Data objektif

1) Keadaan umum

Keadaan umum ibu setelah dilakukan tindakan kuretase, adalah sedang

2) Kesadaran ibu setelah dilakukan tindakan kuretase adalah sedang.

3) Tanda-tanda vital

(a) Tekanan darah

Ibu hamil dengan abortus inkomplit post kuretase tekanan darahnya teratur atau tidak. Tekanan darah ibu post kuretase 90/70 mmHg- 130/90 mmHg.

(b) Suhu

Ibu hamil dengan abortus inkomplit post kuretase suhu tubuhnya normal atau tidak. Suhu pada ibu post kuretase adalah 36,5<sup>0</sup>c- 37,5<sup>0</sup>c.

## (c) Nadi

Ibu hamil dengan abortus inkomplit post kuretase nadinya normal atau tidak. Nadi pada ibu post kuretase adalah 50-90 x/menit.

## (d) Respirasi

Ibu hamil dengan abortus inkomplit post kuretase respirasinya cenderung lebih cepat atau lambat. Respirasi ibu pada ibu post kuretase 16-24 x/menit.

4) Tinggi fundus uteri pada ibu post kuretase

5) Pemeriksaan hemoglobin perlu dilakukan karena biasanya setelah melakukan kuretase terjadi penurunan hemoglobin.

## 2. Masalah

Masalah adalah problem yang dialami ibu tetapi tidak termasuk kedalam kategori standar nomenklatur diagnosa kebidanan, misalnya rasa cemas, dan problem ekonomi. Masalah memerlukan penanganan yang dituangkan kedalam rencana asuhan.

## 3. Kebutuhan

Kebutuhan adalah suatu yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan klien, misalnya pendidikan kesehatan, dan promosi kesehatan.

## c. Langkah III (Identifikasi diagnosa/masalah potensial)

Identifikasi diagnosa/masalah potensial adalah mengidentifikasi masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi.

Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/ masalah potensial terjadi. Diagnosa yang mungkinginterjadi adalah syok dan perdarahan.

d. Langkah IV (Identifikasi tindakan segera/ Kolaborasi)

Tindakan segera terhadap kondisi yang diperkirakan akan membahayakan klien. Oleh karena itu, bidan harus bertindak segera untuk menyelamatkan jiwa ibu dan anak. Tindakan ini dilaksanakan secara kolaborasi dan rujukan sesuai dengan kondisi klien. Faktor yang berperang terhadap komplikasi abortus inkomplit post kuretase adalah dalam proses pemberian layanan asuhan pasca abortus, harus diingat bahwa pasien ini membutuhkan konseling, perhatian, pemahaman, serta empati selama pemberian asuhan.

Dalam memberikan asuhan pasca abortus hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengatasi situasi segera, yaitu perdarahan dan syok. Setelah kondisi ibu stabil, hal selanjutnya yang sama pentingnya adalah memberikan asuhan tindak lanjut yang penting, meliputi peredaan nyeri, dukungan psikologis, konseling pasca abortus dan pemeriksaan lebih lanjut yang mungkin diperlukan (WHO, 2012: 95). Pada pasien abortus dengan abortus inkomplit dapat di berikan penanganan syok dengan cara: tindakan universal, oksigen, cairan, obat, identifikasi penyebab syok dan atasi sesuai penyebabnya. Selanjutnya adalah penenangan perdarahan melibatkan

langkah-langkah berikut manajemen syok, identifikasi lokasi perdarahan, evakuasi atau pengosongan uterus, pemeriksaan produk konsepsi, perbaikan laserasi saluran genital atau serviks, manajemen perforasi uterus dan rujukan transfer atau pemindahan.

e. Langkah V (Rencana Asuhan yang menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan untuk pemecahan masalah dibagi menjadi tujuan, rencana pelaksanaan dan evaluasi. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah dan diagnosa potensial) berkaitan dengan semua aspek asuhan kebidanan.

Rencana dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta evidence terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

f. Langkah VI (Pelaksanaan Asuhan )

Kegiatan yang dilakukan bidan di komunitas adalah mencakup rencana pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Pemberian asuhan dapat dilakukan oleh bidan, klien/ keluarga, atau tim kesehatan lainnya namun tanggung jawab utama tetap pada bidan untuk mengarahkan pelaksanaannya. Asuhan yang dilakukan secara efisien yaitu hemat waktu, hemat biaya, dan mutu meningkat.

g. Langkah VII (Evaluasi Hasil Asuhan)

Pada langkah ini, kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan asuhan kebidana yang diberikan. Hasil evaluasi dapat menjadi

data dasar untuk menegakkan diagnosa dan rencana selanjutnya. Yang di evaluasi adalah apakah diagnosa sesuai, rencana asuhan efektif, masalah teratasi, masalah telah berkurang, timbul masalah baru, dan kebutuhan telah terpenuhi. Evaluasi asuhan kebidanan pada abortus inkomplit post kuretase antara lain keadaan umum baik dan tanda-tanda vital normal, tidak ada tanda-tanda syok dan perdarahan pada jalan lahir (Jannah Nurul, 2012: 185-211).

**a. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)**

SOAP adalah sebuah cara untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah pasien, merupakan suatu yang membutuhkan manajemen atau diagnostik termasuk medis, social, ekonomi dan masalah demografis. Bidan melakukan pencatatan secara lengkap, sigkat dan jelas mengenai keadaan /kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikn asuhan kebidanan. Ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP.

**S : Subjektif**

1. Data subjektif (observasi klien)
2. Menggambarkan pendokumentasian hanya pengumpulan data klien melalui anamnesa.
3. Tanda gejala subjektif diperoleh dari hasil bertanya dari klien, suami atau keluarga (identitas umum, keluhan, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat penyakit, riwayat

penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, riwayat psikologis dan pola hidup).

4. Catatan ini berhubungan dengan masalah sudut pandang pasien. Ekspresi klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya di catat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa.

### **O: Objektif**

1. Data objektif ( observasi dan pemeriksaan)
2. Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien, hasil laboratorium dan tes diagnostik lainnya yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung analisis.
3. Tanda gejala objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan (tanda KU, *vital sign*, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kebidanan, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang). Pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi.
4. Data ini memberi bukti gejala klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. Data fisiologis, hasil observasi yang jujur, informasi kajian, teknologi (hasil laboratorium, sinar X, rekam CTG, dan lain-lain). Apa yang di observasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosis yang ditegakkan.

### **A: Assesment**

1. Masalah atau diagnosis yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif maupun objektif dikumpulkan atau disimpulkan. Karena keadaan

pasien harus berubah dan selalu ada informasi baru baik subjektif maupun objektif dan sering diungkapkan secara terpisah-pisah, proses pengkajian adalah suatu proses dinamik. Nenganalisa adalah suatu yang penting dalam mengikuti perkembangan klien dan menjamin suatu perubahan baru yang cepat diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang cepat.

2. Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dalam suatu identifikasi.
  - a. Diagnosa/masalah
    - 1) Diagnosis adalah rumusan dari hasil pengkajian kondisi klien: hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Berdasarkan hasil analisa data yang didapat.
    - 2) Masalah segala sesuatu yang menyimpang sehingga kebutuhan klien terganggu, kemungkinan mengganggu kehamilan/ kesehatan tetapi tidak masuk dalam diagnosis.
  - b. Antisipasi masalah lain/ diagnosa potensial.

**P: Planning**

Membuat rencana tindakan saat itu atau yang akan datang. Untuk mengusahakan tercapainya kondisi klien yang sebaik mungkin atau menjaga mempertahankan kesejahteraannya. Proses ini termasuk tujuan tertentu dari kebutuhan pasien yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu. Perencanaan diambil harus membantu klien mencapai kemajuan dalam kesehatan dan harus

sesuai dengan instruksi dokter. Dalam perencanaan harus tertuang asuhan yang akan direncanakan, bagaimana pelaksanaan dan hasil dari suatu asuhan yang telah diberikan (Irianti Bayu,2014:337-339).



**BAB III**  
**STUDI KASUS**

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN  
ABORTUS INKOMPLIT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TGL 27 MEI 2017

No Registrasi : XXXXooo  
Tanggal Masuk : 27 Mei 2017, jam 11:30 wita  
Tanggal pengkajian : 27 Mei 2017, jam 11:30 wita  
Pengkaji : Rosmanengsi

**LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR**

**A. Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny''R'' / Tn''Z''  
Umur : 36 tahun/ 46 tahun  
Nikah/lamanya : 1 kali / 19 tahun  
Suku : Makassar/ Makassar  
Agama : Islam/ Islam  
Pendidikan : SMP/ SMA  
Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta  
Alamat : Dato Rigentungan

**B. Data Biologis Fisiologis**

1. Keluhan Utama : keluar darah dari jalan lahir dan menggumpal.
2. Riwayat keluhan utama
  - a. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak tiga hari yang lalu yakni dari tanggal 24 Mei 2017, awalnya sedikit kemudian bertambah banyak sejak malam hari pada tanggal 26 Mei 2017, pukul 23.00 wita.
  - b. Lokasi keluhan perut bagian bawah
  - c. Tidak ada riwayat hubungan seksual sebelum terjadi perdarahan.

**C. Riwayat Kesehatan yang lalu**

1. Tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun
2. Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, paru-paru, diabetes militus (DM) dan hipertensi.
3. Tidak ada riwayat alergi terhadap makanan dan obat-obatan
4. Tidak ada riwayat ketergantungan obat-obat terlarang, alkohol ataupun rokok.

**D. Riwayat Reproduksi**

1. Riwayat haid
  - a. Menarche : 14 tahun
  - b. Lamanya : 3-5 hari
  - c. Siklus : 28-30 hari
  - d. Tidak ada disminorhea

2. Riwayat kehamilan sekarang

- a. GIII PII Ao
- b. Ibu mengatakan ini kehamilannya yang ketiga dan tidak pernah keguguran.
- c. Ibu mengatakan tidak pernah kedukun.
- d. Ibu mengatakan sering bekerja berat.
- e. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Tabel 3.1. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu.

kehamilan	Persalinan						Nifas	
	Tahun Lahir	JK	BBL (gr)	Proses	Tempat Persalinan	Penolong	Kondisi	ASI (bln)
I	2000	P	2.800	Normal	BPS	Bidan	Hidup	± 6
II	2005	L	3.200	Normal	BPS	Bidan	Hidup	± 9
III	2017	Kehamilan sekarang (Abortus)						

3. Riwayat ginekologi

Ibu tidak pernah menderita penyakit infeksi, PMS (penyakit menular seksual), dan tumor pada alat kandungan.

4. Riwayat keluarga berencana (KB)

Ibu pernah menjadi akseptor KB selama 10 tahun.

**E. Riwayat Sosial Ekonomi**

1. Ibu mengatakan ini pernikahannya yang pertama dengan suaminya yang sekarang.
2. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.

**F. Riwayat Psikososial**

1. Ekspresi wajah tampak cemas
2. Klien menanyakan mengenai keadaannya.
3. Klien dan keluarga ingin cepat ditolong dan cepat sembuh

**G. Riwayat Spiritual**

1. Ibu dan keluarga beribadah semauanya
2. Ibu banyak berdo'a untuk keselamatan dirinya.

**H. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

1. Kebutuhan nutrisi
  - a. Menu makanan sehari-hari nasi dan lauk pauk
  - b. Frekuensi 3x sehari
  - c. Nafsu makan baik
  - d. Kebutuhan minum 6-7 gelas/ hari.
2. Kebutuhan Eliminasi
  - a. Buang air kecil (BAK)
    - 1) Warnah kuning jernih
    - 2) Bau amoniak
  - b. Buang air besar (BAB)
    - 1) Frekuensi 1x sehari
    - 2) Konsistensi padat

3. Personal hygiene
  - a. Mandi 2x sehari dengan menggunakan sabun mandi
  - b. Sikat gigi 2x sehari
  - c. Keramas 3x seminggu
  - d. Mengganti pakaian tiap habis mandi
4. Ibu tidak dapat istirahat/tidur dengan baik karena mengeluh nyeri pada perut bagian bawah.

#### **I. Pemeriksaan Fisik**

1. Pemeriksaan secara umum
  - a. Klien tampak lemah, kesadaran komposmentis
  - b. Tanda-tanda vital (TTV)
    - 1) Tekanan darah (TD): 100/70 mmHg
    - 2) Suhu (S) : 36,8°C
    - 3) Nadi (N) : 78x/ menit
    - 4) Pernapasan (P) : 20x/menit
2. Pemeriksaan khusus
  - a. Kepala: rambut bersih, gelombang, tidak ada rontok dan tidak ada massa,benjolan dan nyeri tekan.
  - b. Wajah: tidak ada oedema dan kloasma
  - c. Mata: kongjungtiva pucat dan sklera putih
  - d. Telinga: tidak ada serumen
  - e. Hidung: tidak ada polip

- f. Mulut dan gigi: bibir pucat, tidak ada sariawan, mulut dan gigi bersih tidak ada caries pada gigi.
- g. Leher: tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.
- h. Dada: payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hiperpigmentasi pada areola mammae, dan tidak ada massa benjolan dan nyeri tekan.
- i. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, tinggi fundus uteri tidak teraba.
- j. Ekstremitas: simetris kiri dan kanan, tidak ada varices dan tidak ada oedema.
- k. Genitalia: tidak ada varices, tidak ada kelainan pada vulva, nampak pengeluaran darah dari vagina.

Pemeriksaan *Vagina toucher* (VT) tanggal 27 Mei 2017, pukul 11:15  
 wita oleh dr. J.

- 1) Keadaan vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- 2) Portio : lunak, tebal
- 3) Ostium uteri eksterna/ostium uteri interna (OUE/OUI): terbuka 2cm
- 4) Uterus : retrofleksi
- 5) Pelepasan : darah

### 3. Pemeriksaan penunjang

#### a. Pemeriksaan Laboratorium tgl 27 mei 2017

- 1) Hemoglobin : 11,4 gr%
- 2) Leukosit : 6.500/mm<sup>3</sup>
- 3) Eritrosit : 4.62x10<sup>6</sup>/mL
- 4) Hematokrit : 37,7%
- 5) Trombosit : 279.000/mm<sup>3</sup>
- 6) Plano test : positif (+)

#### b. Pemeriksaan ultrasonografi (USG), pukul 12:00 wita

Hasil USG: kesan sisa jaringan

### **LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL**

Diagnosa aktual : G<sub>III</sub> P<sub>II</sub> A<sub>0</sub> Gestasi 16 minggu 5 hari, Abortus Inkomplit,

Masalah aktual : Nyeri perut bagian bawah.

#### **A. G<sub>III</sub> P<sub>II</sub> A<sub>0</sub>**

##### 1. Data subjektif

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilannya yang ketiga.

##### 2. Data objektif

- a. Tampak linea nigra
- b. Tonus otot tampaktegang

##### 3. Analisi dan interpretasi data

Pada usia kehamilan 16 minggu uterus membesar setinggi simfisis dan janin berukuran 15 cm ini merupakan awal ditrimester ke-2. Kulit janin masih

transparan, telah mulai tumbuh lanugo (rambut janin). Janin bergerak aktif, yaitu menghisap dan menelan air ketuban. Telah terbentuk mekonium (feses) dalam usus. Jantung berdenyut 120-150 x/menit (Sarwono,2014: 158).

### **B. Gestasi 16 minggu 5 hari**

#### 1. Data subjektif

Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir (HPHT) tanggal 20 februari 2017

#### 2. Data objektif

a. Hari tafsiran pesalinan (HTP) tanggal 27 november 2017

b. pengkajian tanggal 27 mei 2017

#### 3. Analisis dan interpretasi data

Dari HPHT tanggal 20 februari 2017 sampai tanggal 25 mei 2017 maka umur kehamilan diperoleh 16 minggu 5 hari.

### **C. Abortus inkomplit**

#### 1. Data subjektif

Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu yakni tanggal 24 mei 2017, awalnya sedikit kemudian bertambah banyak sejak malam hari pada tanggal 26 mei 2017.

#### 2. Data objektif

a. Tampak pengeluaran darah dari vagina dan menggumpal

b. Hasil pemeriksaan VT tanggal 27 mei 2017, pukul 11: 15 wita oleh dr"J"

1) Keadaan vulva dan vagina : tidak ada kelainan

2) Portio : lunak, tebal

- 3) OUE/OUI : terbuka 2cm
- 4) Uterus : retrofleksi
- 5) Pelepasan : darah

### 3. Analisis dan interpretasi data

Abortus inkomplit didiagnosa apabila sebagian dari hasil konsepsi telah lahir atau teraba pada vagina, tetapi sebagian tertinggal (biasanya jaringan plasenta) masih tertinggal dalam rahim. Perdarahan terus berlangsung banyak, dan membahayakan ibu (Feryanto, 2014: 41-42).

## D. Nyeri perut bagian bawah

### 1. Data subjektif

Klien mengeluh nyeri perut bagian bawah

### 2. Data objektif

Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna kehitaman dan menggumpal.

### 3. Analisa dan interpretasi data

Pada abortus inkomplit sering serviks terbuka karena masih ada benda di dalam rahim yang dianggap sebagai benda asing (*corpus alienum*). Oleh karena itu, uterus akan berusaha mengeluarkannya dengan mengadakan kontraksi sehingga ibu merasakan nyeri (Feryanto, 2014: 42).

### LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL

#### A. Antisipasi terjadi infeksi pada jalan lahir

##### 1. Data subjektif

- a. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu yakni tanggal 24 Mei 2017, awalnya sedikit kemudian bertambah banyak dan bergumpal yakni tanggal 26 Mei malam hari.
- b. Ibu mengeluh sakit perut bagian bawah.

##### 2. Data objektif

- a. Keadaan umum ibu lemah
- b. Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna kehitaman dan bergumpal
- c. TTV
  - 1) TD : 100/70 mmhg
  - 2) S : 36,8<sup>0</sup>C
  - 3) N : 78x/ menit
  - 4) P : 20x/menit

##### 3. Analisis dan interpretasi data

Terbukanya jalan lahir dan adanya perdarahan merupakan media perkembangannya mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi.

Infeksi dalam uterus dan sekitarnya dapat terjadi disetiap abortus tetapi biasanya ditemukan pada abortus inkomplit dan lebih sering pada abortus

buatan yang dikerjakan tanpa memperhatikan aseptisi dan antiseptis (Irianti Bayu dkk, 2014: 77).

## **B. Antisipasi terjadi Anemia**

### 1. Data subjektif

Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu yakni tanggal 24 mei 2017, awalnya sedikit kemudian bertambah banyak dan bergumpal yakni tanggal 26 mei malam hari.

### 2. Data objektif

- a. Keadaan umum ibu lemah
- b. Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna hitam dan bergumpal
- c. TTV
  - 1) TD : 100/70 mmhg
  - 2) S : 36,8°C
  - 3) N : 78x/ menit
  - 4) P : 20x/menit

### 3. Analisis dan interpretasi data

Anemia pada abortus biasa terjadi karena perdarahan (Irianti Bayu dkk, 2014:78).

**LANGKAH IV: TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI****A. Kolaborasi dengan dokter untuk tindakan selanjutnya**

1. Penatalaksanaan pemberian cairan infus ringer laktat (RL), drips oxytocin 20 unit dalam 500 cc cairan IV, dengan 28 tetes/menit.
2. Rencana kuret tanggal 28 mei 2017, pukul 11:00 wita

**B. Penataklasanaan pemberian obat**

1. Antibiotik (ceftriaxone 1gr/12 jam/IV).
2. Analgetik (Asam Mefenamat 500 mg/8 jam/oral).
3. Penambah darah (SF 300 mg/24 jam/oral).
4. Misoprostol 2 tablet/vagina

**LANGKAH V: RENCANA/INTERVENSI**

A. Diagnosa : GIII PII Ao, gestasi 16 minggu 5 hari, Abortus Inkomplit

B. Masalah aktual : Nyeri perut bagian bawah

C. Masalah potensial :

1. Antisipasi terjadinya infeksi jalan lahir
2. Antisipasi terjadinya anemia

D. Tujuan:

1. Abortus inkomplit dapat teratasi
2. Nyeri perut dapat teratasi
3. Keadaan ibu baik
4. Infeksi tidak terjadi
5. Anemia tidak terjadi

E. Kriteria:

1. Perdarahan pervaginam berhenti
2. Ibu tidak mengeluh nyeri dan tidak ada nyeri tekan pada perut
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
  - a) TD : sistole 90-140 mmHg, diastole 60-90 mmHg
  - b) N : 60-100 kali/ menit
  - c) S : 36,5-37,5°c
  - d) P : 16-24 kali/ menit

F. Rencana tindakan :

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya  
 Rasional: dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, ibu dapat mengerti tentang keadaannya dan dapat mengurangi kecemasan ibu.
2. Observasi tanda-tanda vital  
 Rasional: tanda-tanda vital merupakan indikator dari keadaan umum klien dan menentukan intervensi selanjutnya.
3. Beri informasi kepada klien tentang penyebab perdarahan  
 Rasional: agar ibu mengerti tentang keadaannya sekarang
4. Jelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan kuret, jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 28 mei 2017, pukul 11:00 wita.

Rasional: dengan penjelasan kepada klien/keluarganya diharapkan dapat menyetujui rencana tindakan kuret dan ibu dapat menyiapkan fisik dan psikis.

5. Informed consent untuk pelaksanaan tindakan kuretase

Rasional: sebagai pernyataan persetujuan dari ibu/keluarga untuk tindakan dan sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan bidan dalam melakukan tindakan.

6. Anjurkan ibu untuk istirahat.

7. Persiapan pelaksanaan tindakan kuretase

Rasional: dengan persiapan yang dilakukan yakni dengan persiapan alat, penolong dan persiapan pasien maka akan memudahkan dalam melakukan prosedur kerja sesuai dengan protap.

8. Kaji tingkat nyeri

Rasional: mengkaji tingkat nyeri dapat membantu menentukan tindakan selanjutnya.

9. Berikan penjelasan tentang penyebab nyeri pada perut bagian bawah yang dirasakan oleh ibu.

Rasional: agar ibu dapat mengerti bahwa nyeri yang dirasakan akibat dari kontraksi uterus sehingga ibu dapat menerima keadaannya sebagai hal yang fisiologis.

10. Bantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien

Rasional: mengatur posisi yang diinginkan akan memberikan rasa nyaman pada ibu.

11. Anjurkan teknik relaksasi jika timbul rasa nyeri

Rasional: teknik relaksasi merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan perhatian klien terhadap nyeri yang dirasakan dan meningkatkan suplai oksigen yang masuk kedalam tubuh diteruskan keotak yang akan menghambat/ mengurangi rangsangan nyeri yang timbul.

12. Beri kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya.

Rasional: dengan mengungkapkan perasaannya dan mendengarkan keluhannya klien akan merasa diperhatikan sehingga ia akan lebih tenang

13. Beri dorongan spiritual kepada ibu

Rasional: dengan dorongan spiritual memberikan ketenangan hati bahwa segala tindakan yang diberikan untuk proses penyembuhan dan tetap berdoa kepada yang maha kuasa.

14. Libatkan orang terdekat klien selama perawatan

Rasional: klien akan merasa nyaman dan aman bila didampingi oleh orang terdekatnya khususnya suami.

15. Anjurkan pada ibu untuk meningkatkan kebersihan diri dengan dengan mengganti doek atau pembalut setiap kali basa.

Rasional: dengan menjaga kebersihan diri akan memberi rasa nyaman dan mencegah berkembangnya kuman pathogen penyebab infeksi.

16. Bekerja secara septik dan antiseptik selama melakukan perawatan pada klien.

Rasional: untuk mencegah infeksi silang/kontaminasi dengan benda-benda tidak steril.

### 17. Penatalaksanaan pemberian obat analgetik dan antibiotik

Rasional: analgetik akan membantu mengurangi rasa nyeri yang dirasakan ibu dan antibiotik akan membantu mencegah terjadinya infeksi.

### LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya.

Hasil: ibu memahami dan mengerti dengan keadaanya.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

- a. TD : 100/70 mmhg
- b. S : 36,8<sup>0</sup>C
- c. N : 78x/ menit
- d. P : 20x/menit

3. Memberikan informasi kepada klien tentang penyebab pendarahan

Hasil: klien mengerti dengan apa yang diinformasikan

4. Menjelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan kuret jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 28 mei 2017, pukul 11:00 wita.

Hasil: ibu/keluarga mengerti dan setuju, maka akan dilakukan tindakan kuretase.

5. Informet consent untuk pelaksanaan tindakan kuretase.

Hasil: suami setuju dan telah menandatangani persetujuan tindakan kuret, rencana kuret tanggal 28 mei 2017, pukul 11:00 wita.

6. Mengajukan ibu untuk istirahat sebelum dikuret

Hasil: ibu mengerti dan melakukannya.

7. Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretasi yakni berupa persiapan alat, penolong dan persiapan pasien

a) Persiapan alat kuret

- 1) Handscoen 2 pasang
- 2) Kain kasa secukupnya
- 3) Duk steril 1 buah
- 4) Kateter 1 buah
- 5) Spekulum anterior dan posterior
- 6) Tampongtan
- 7) Tenakulum
- 8) Sonde uterus
- 9) Abortus tang
- 10) Kuret tajam dan kuret tumpul
- 11) Kapas DTT
- 12) Larutan betadin

b) Persiapan penolong

- 1) Masker
- 2) Celemek
- 3) Kacamata
- 4) Tutup kepala

5) Sepatu boot

c) Persiapan alat-alat lain

1) Tempat darah

2) Tempat sampah

3) Larutan klorin

4) Lampu sorot

5) Tabung oksigen

d) Persiapan pasien

Hasil: persiapan kuret telah dilaksanakan

8. Memberikan penjelasan tentang penyebab nyeri pada perut bagian bawah yang dirasakan oleh ibu

Hasil: ibu mengerti dengan keadaanya sekarang

9. Membantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien

Hasil: ibu merasa nyaman dengan posisinya sekarang

10. Mengajarkan teknik relaksasi bila timbul rasa nyeri

Hasil: ibu melakukan tehnik relaksasi dengan menarik nafas dalam melalui hidung dan menghembuskan secara perlahan-lahan lewat mulut.

11. Memberi kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya

Hasil: ibu merasa tenang telah mengungkapkan perasaannya

12. Memberikan dorongan spiritual kepada ibu

Hasil: ibu mengerti dan tampak mulai berdoa

13. Melibatkan orang terdekat klien selama perawatan

Hasil: klien didampingi oleh suami

14. Menganjurkan pada ibu untuk meningkatkan kebersihan diri dengan mengganti doek atau pembalut setiap kali basah.

Hasil: ibu mengerti dan melakukannya

15. Bekerja secara septik selama melakukan perawatan pada klien

16. Penatalaksanaan pemberian obat analgetik dan antibiotik

Hasil:

- a. Ceftriaxone 1 gr /12 jam/IV
- b. Asam mefenamat 500/8 jam/oral.
- c. SF 300 mg/24 jam/oral.

#### **LANGKAH VII : EVALUASI**

1. Nyeri perut bagian bawah telah berkurang ditandai dengan

- a. Ibu mengatakan nyeri yang dialami telah berkurang
- b. Ekspresi wajah ibu tidak meringis bila bergerak

2. Abortus inkomplit teratasi ditandai dengan

- a. Telah dilakukan tindakan kuretase
- b. Perdarahan pervaginam berkurang

3. Keadaan ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal

- a. TD : 100/ 70 mmHg
- b. P : 20x/ menit
- c. N : 80x/ menit

- d. S : 36,4°c
4. Infeksi jalan lahir belum dapat diintervensi
5. Anemia tidak terjadi ditandai dengan
- a. Kesadaran komposmentis
- b. TTV dalam batas normal
- 1) TD : 100/ 70 mmHg
- 2) P : 20x/ menit
- 3) N : 80x/ menit
- 4) S : 36,4°c
- c. Hemoglobin (Hb) 11,4 gr%

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN  
ABORTUS INKOMLIT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TGL 28 MEI 2017

No Registrasi : XXXXooo  
Tanggal Masuk : 27 Mei 2017, jam 11: 30 wita  
Tanggal pengkajian : 28 Mei 2017, jam 08: 10 wita  
Pengkaji : Rosmanengsi

**Identifikasi Data Dasar**

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”R” / Tn”Z”  
Umur : 36 tahun/ 46 tahun  
Nikah/lamanya : 1 kali / 19 tahun  
Suku : Makassar/ Makassar  
Agama : Islam/ Islam  
Pendidikan : SMP/ SMA  
Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta  
Alamat : Dato Rigentungan

**A. DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan ini kehamilannya yang ketiga
2. HPHT tanggal 20 februari 2017

3. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu sedikit-sedikit kemudian banyak, bergumpal dan berwarna kehitaman
4. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah
5. Keluhan yang dirasakan sangat mengganggu aktivitas sehingga ibu takut bergerak banyak.

#### **B. DATA OBJEKTIF (O)**

1. HTP tanggal 27 november 2017
2. Ibu tampak lemah
3. Tampak ekspresi wajah ibu meringis
4. Nyeri tekan pada daerah simpisis
5. Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna kehitaman dan bergumpal.
6. Tanda-tanda vital
  - a. TD : 100/70 mmHg
  - b. S : 36,8<sup>0</sup>C
  - c. N : 78x/ menit
  - d. P : 20x/menit
7. Hasil pemeriksaan VT tanggal 27 mei 2017, pukul 11: 15 wita oleh dr''J''
  - a. Keadaan vulva dan vagina: tidak ada kelainan
  - b. Portio : lunak, tebal
  - c. Uterus : retrofleksi
  - d. OUE/OUI : terbuka 2cm

e. Pelepasan : darah

7. Pemeriksaan Laboratorium tgl 27 mei 2017

- a. Hb : 11,4 gr%
- b. Leukosit : 6.500 mm<sup>3</sup>
- c. Eritrosit : 4.62x10<sup>6</sup>/mm<sup>3</sup>
- d. Hematokrit : 37,7 %
- e. Trombosit : 279.000 mm<sup>3</sup>
- f. Plano test : positif (+)

8. Pemeriksaan penunjang

USG : kesan sisa jaringan

**C. ASSESMENT (A)**

GIIPIIA1 Gestasi 16 minggu 5 hari, Abortus Inkomplit, masalah nyeri perut bagian bawah

**D. PLANNING (P)**

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: ibu mengerti tentang apa yang disampaikan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil:

- a. TD : 100/70 mmHg
- b. P : 22x/menit
- c. N : 80x/menit

d. S : 36,8<sup>0</sup>C


3. Memberikan informasi kepada klien tentang penyebab pendarahan
4. Menjelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan kuret jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 28 Mei 2017 jam 11:00 wita.
5. Informed consent untuk pelaksanaan tindakan kuretase
6. Menganjurkan ibu untuk istirahat sebelum dikuret
7. Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretase yakni berupa persiapan alat, penolong dan persiapan pasien
  - a. Persiapan alat kuret
    - 1) Handscoen 2 pasang
    - 2) Kain kasa secukupnya
    - 3) Duk steril 1 buah
    - 4) Kateter 1 buah
    - 5) Speculum anterior dan posterior
    - 6) Tampongtan
    - 7) Tenakulum
    - 8) Sonde uterus
    - 9) Abortus tang
    - 10) Kapas deteksi.
    - 11) Kuret tajam dan kuret tumpul.
    - 12) Kapas deteksi tingkat tinggi (DTT).

- b. Persiapan penolong
    - 1) Masker
    - 2) Celemek
    - 3) Kacamata
    - 4) Tutup kepala
    - 5) Sepatu boot
  - c. Persiapan alat-alat lain
    - 1) Tempat darah
    - 2) Tempat sampah
    - 3) Larutan klorin
    - 4) Lampu sorot
    - 5) Tabung oksigen
  - d. Persiapan pasien: klien dianjurkan untuk istirahat dan berpuasa.
8. Memberikan penjelasan tentang penyebab nyeri pada perut bagian bawah yang dirasakan oleh ibu.
  9. Membantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien.
  10. Mengajarkan teknik relaksasi bila timbul rasa nyeri.
  11. Mengajarkan teknik relaksasi bila timbul rasa nyeri.
  12. Memberi kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya.
  13. Memberi dorongan spiritual kepada ibu.
  14. Melibatkan orang terdekat klien selama perawatan
  15. Bekerja secara septik dan antiseptik selama melakukan perawatan pada klien

16. Menganjurkan pada ibu untuk meningkatkan kebersihan diri dengan mengganti doek/pembalut setiap kali basah.
17. Penatalaksanaan pemberian obat analgetik, antibiotik dan penambah darah.

Hasil:

- a. Ceftriaxone 1 gr/12 jam/IV
- b. Asam Mefenamat 500 mg/8 jam/oral
- c. SF 300 mg/24 jam/oral



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN  
ABORTUS INKOMPLIT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TGL 29 MEI 2017

No Registrasi : XXXXoooo  
Tanggal Masuk : 27 Mei 2017, jam 11:30 wita  
Tanggal pengkajian : 29 Mei 2017, jam 11:00 wita  
Pengkaji : Rosmanengsi

**Identifikasi Data Dasar**

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny'R' / Tn'Z'  
Umur : 36 tahun/ 46 tahun  
Nikah/lamanya : 1 kali / 19 tahun  
Suku : Makassar/ Makassar  
Agama : Islam/ Islam  
Pendidikan : SMP/ SMA  
Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta  
Alamat : Dato Rigentungan

**A. DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu mengatakan bahwa keadaannya mulai membaik
2. Ibu merasa masih ada darah yang keluar dari jalan lahir dan perut masih terasa nyeri.
3. Klien bisa beristirahat dengan baik.

**B. DATA OBJEKTIF**

1. Post kuret abortus inkomplit tanggal 28 mei 2017
2. Ekspresi wajah tampak tenang dan cerah
3. Keadaan umum ibu baik
  - a) TD : 100/70 mmHg
  - b) N : 82x/menit
  - c) S : 36,6<sup>0</sup>C
  - d) P : 22x/menit
4. Tampak masih ada sedikit pengeluaran darah dari vagina
5. Masih ada sedikit nyeri tekan pada perut bagian bawah.
6. Pemberian obat-obat dilanjutkan berdsarkan instruksi dokter
  - a) Antibiotik (cefadroxil 500 mg/12 jam/oral).
  - b) Analgetik (asam mefenamat 500 mg/8 jam/oral).
  - c) Penambah darah (SF 300 mg/24 jam/oral).
7. Hb post kuret 12,7 gr%

### C. ASSESMENT (A)

Post kuret abortus inkomplit hari kedua dengan nyeri perut bagian bawah

### D. PLANNING (P)

1. Menganjurkan pada ibu untuk istirahat yang banyak

Hasil: ibu bersedia melakukannya

2. Menganjurkan pada ibu untuk menjaga kebersihannya

Hasil: ibu bersedia tetap menjaga kebersihannya

3. Menganjurkan pada ibu untuk makan-makanan yang bergizi

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

3. Observasi perdarahan dan TTV

a) Tampak pengeluaran darah sedikit

b) TTV

1) TD : 100/70 mmHg

2) N : 82x/menit

3) P : 22x/menit

4) S : 36,6<sup>0</sup>C

4. Mengingatkan pada ibu untuk teratur minum obat.

a) Cefadroxil 500 mg/12 jam/oral

b) Asam mefenamat 500 mg/8 jam/oral

c) Sf 300 mg/24 jam/oral.

5. Melakukan pemeriksaan laoratorium pada tanggal 30 mei 2017

Hasil: Hb pada tanggal 30 mei 2017 12,7 gr%

6. Tanggal 30 mei 2017, pukul 11:00 pasien pulang dengan sehat.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa selama 3 hari asuhan di ruangan antenatal care (ANC) dan ruangan postnatal care (PNC) dan dilakukan pemantauan dimulai tanggal 27 sampai dengan 30 Mei 2017 tanggal 30 Mei 2017.

Penulis akan menguraikan berdasarkan SOAP dan langkah Varney. Bab ini, penulis akan membandingkan antara tinjauan kasus pada Ny”R” dengan Abotus Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan teori tentang penanganan Abortus Inkomplit.

Pembahasan ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah, yaitu pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

#### **Langkah-langkah Penatalaksanaan Menurut Varney Yaitu:**

##### **1. Identifikasi Data Dasar**

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan

wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Nuurhayati dkk, 2013).

Tahap ini dilakukan Identifikasi data dasar (pengkajian) merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis yang meliputi biodata bertujuan memperjelas identitas pasien, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan sekarang dan riwayat psikososial untuk mendapatkan informasi tentang keluhan-keluhan yang biasa dialami oleh ibu dan kekhawatiran khusus yang muncul akibat adanya perubahan psikologis maupun psikologi.

Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital juga pemeriksaan khusus yang meliputi pemeriksaan inspeksi untuk mengamati penampilan ibu, emosi serta sikap. Palpasi yaitu pemeriksaan dengan meraba. Auskultasi bertujuan untuk mengetahui usia kehamilan, keadaan janin dalam kandungan dan mendorong menentukan posisi anak.

Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium dan USG. Pengkajian pada kasus ini maka dilanjutkan dengan perencanaan kuretase. Pada tahap ini disebabkan karena respon ibu dalam memberikan informasi begitu pula dengan keluarga, bidan dan dokter yang merawat sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh secara terfokus pada masalah klien sehingga intervensinya juga lebih terfokus sesuai keadaan klien.

Ny "R", usia 36 tahun, G1I1P1A0, datang kerumah sakit dengan keluhan ada pengeluaran darah sejak 3 hari yang lalu yakni dari tanggal 25 Mei 2017, awalnya

sedikit kemudian bertambah banyak sejak malam hari pada tanggal 26 Mei 2017, pukul 23:00 wita yang disertai dengan nyeri perut bagian bawah.

Dalam tinjauan pustaka dikemukakan gejala atau tanda abortus inkomplit berupa adanya riwayat amenorhea, perdarahan dari jalan lahir yang bisa sedikit atau banyak disertai gumpalan darah, serta terdapat nyeri perut bagian bawah. Pada pemeriksaan dalam akan didapati pembukaan serviks dan kadang-kadang dapat diraba sisa-sisa jaringan dalam kanalis servikalis.

Berdasarkan studi kasus pada Ny"R" maka data yang diperoleh dari hasil pengkajian atau anamnesa pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum lemah, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 78x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,8°C. Ekspresi wajah tampak cemas, pucat dan meringis menahan sakit serta tidak ada oedema dan pembengkakan pada wajah, kedua konjungtiva mata tidak anemis, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis, payudara tampak simetris, hiperpigmentasi pada areola mammae.

HPHT tanggal 20 Februari 2017 dengan usia kehamilan 16 minggu 5 hari, perdarahan mula-mula sedikit kemudian banyak, bergumpal dan berwarna merah kehitaman, nyeri perut bagian bawah pada pemeriksaan laboratorium didapatkan pemeriksaan darah rutin yang normal yaitu hemoglobin 11,4 gr%, leukosit  $6.500/\text{mm}^3$ , eritrosit  $4.62 \times 10^6/\text{mm}^3$ , hematokrit 37,7%, trombosit  $279.000/\text{mm}^3$ , plano test positif dan pada pemeriksaan obstetrik TFU tidak dapat diraba, serta pada pemeriksaan dalam terdapat pembukaan 2 cm dan sisa-sisa jaringan dapat diraba

dalam kanalis servikalis atau kavum uteri dan pada pemeriksaan USG didapatkan kesan sisa jaringan.

Pasien tidak pernah memeriksakan kehamilan selama hamil, pasien sudah mengetahui bahwa dirinya hamil tetapi dengan sumber kebiasaannya yang dijadikan sebagai acuan yang biasanya memeriksakan kehamilannya pada umur kehamilan  $\pm$  5 bulan, tetapi pasien yakin bahwa janinnya akan tumbuh dan lahir dengan baik dan sehat. Pasien tidak pernah mengalami trauma selama hamil, pasien tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, asma jantung dan diabetes, riwayat mengonsumsi obat-obatan selama hamil. Selama hamil, nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, istirahat cukup, aktivitas pasien tetap melakukan pekerjaan sebagai perias pengantin sehingga tidak ada waktu untuk istirahat, pasien tidak ada riwayat hubungan seksual sebelum terjadi perdarahan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus abortus inkomplit. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

## **2. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual**

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik (Nurhayati dkk, 2013).

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam

langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah. Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien.

Hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis abortus inkomplit. Pasien datang dengan keluhan keluar darah mula-mula sedikit kemudian banyak, bergumpal dan berwarna merah kehitaman, nyeri perut bagian bawah pada pemeriksaan laboratorium didapatkan plano test positif dan pada pemeriksaan obstetrik TFU tidak dapat diraba, serta pada pemeriksaan dalam terdapat pembukaan 2 cm dan sisa-sisa jaringan dapat diraba dalam kanalis servikalis atau kavum uteri dan pada pemeriksaan USG didapatkan kesan sisa jaringan.

Hal tersebut sesuai dengan teori kasus abortus inkomplit merupakan perdarahan dari uterus pada kehamilan kurang dari 20 minggu disertai keluarnya sebagian hasil konsepsi (sebagian tertinggal dalam uterus). Pada tinjauan pustaka, diagnosa abortus inkomplit dapat ditegakkan apabila ditemukan ada riwayat amenorrhoe, terjadinya perdarahan melalui jalan lahir sampai keadaan anemis, dapat terjadi infeksi ditandai dengan suhu tinggi, perdarahan disertai nyeri perut bagian bawah diikuti dengan pengeluarn hasil konsepsi dan pada pemeriksaan plano test didapatkan hasil positif, kemudian pada pemeriksaan ginekologi didapatkan serviks terbuka, dapat diraba jaringan di kanalis servikalis (Yulaikhah, 2015: 76-77).

Pada Ny”R” dengan diagnosa abortus inkomplit, kehamilan 16 Minggu 5 hari dengan masalah aktual adalah nyeri perut bagian bawah disebabkan karena sisa jaringan yang tertinggal dalam uterus, menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan isinya. Hal inilah yang menyebabkan nyeri perut bagian bawah.

Berdasarkan uraian diatas maka diagnosis pada kasus tersebut adalah GIIPIIA0, gestasi 16 minggu 5 hari, dengan abortus inkomplit. Demikian penerapan tinjauan pustaka dan kasus pada Ny “R” secara garis besar tampak adanya persamaan antara teori dengan diagnosis aktual yang ditegaskan sehingga memudahkan memberikan tindakan selajutnya.

### **3. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial**

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Mangkuji dkk, 2013). Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Kondisi pasien saat ini dengan nyeri perut bagian bawah, ibu tampak bersedih karena bayinya tidak bisa diselamatkan. Pemeriksaan dalam tidak ada kelainan, pembukaan 2 cm dan ada pelepasan darah. Pasien berpotensi terjadi anemia jika tidak segerah ditangani dan infeksi. Pasien dengan abortus harus

segerah diberi tahu. Sikap dan empati yang ditunjukkan oleh bidan dan dokter akan memberi pengaruh psikologis ibu dan keluarga.

Terbukanya jalan lahir dan adanya perdarahan merupakan media perkembangannya mikroorganisme pathogen yang dapat menyebabkan infeksi dalam uterus dan sekitarnya dapat terjadi disetiap abortus tetapi biasanya ditemukan pada abortus inkomplit dan lebih sering pada abortus buatan yang dikerjakan tanpa memperhatikan aseptis dan antiseptis (Irianti Bayu dkk, 2014: 77).

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa pada kasus Ny”R” dengan diagnosa abortus inkomplit masalah potensial yang dapat terjadi adalah potensial infeksi jalan lahir. Data yang mendukung yaitu pada pemeriksaan dalam ostium uteri terbuka satu jari longgar, ada teraba sisa jaringan atau darah yang tertinggal.

Pada kasusu Ny”R” dengan diagnosa abortus inkomplit masalah potensial yang dapat terjadi adalah potensial terjadi anemia. Data yang mendukung yaitu perdarahan sedikit-sedikit, kemudian banyak sehingga menimbulkan keadaan anemis. Sebagian hasil konsepsi masih tertinggal dalam uterus dimana pada pemeriksaan vagina, kanalis servikalis masih terbuka dan teraba jaringan pada cavum uteri. Perdarahan biasanya masih terjadi jumlahnya pun bisa banyak atau sedikit bergantung pada sisa jaringan yang tersisa, sehingga perdarahan berjalan

terus. Pasien dapat jatuh dalam keadaan anemia (Prawirohardjo, 2014: 469-470). Nampak ada persamaan dan tidak di temukan adanya kesengjangan.

#### **4. Tindakan Segera/ Kolaborasi**

Pada langkah ini beberapa data menunjukkan situasi emergensi, di mana bidan perlu bertindak segerah demi keselamatan ibu dan bayi. Beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Tindakan tersebut mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan megevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan (Nurhayati dkk, 2013: 143).

Tindakan segera dan kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya, dalam kasus ini, tidak ada indikasi untuk dilakukannya tindakan segera. Akan tetapi, kolaborasi dengan dokter ahli kandungan dilakukan untuk menetapkan diagnosa dengan pemeriksaan USG, pemeriksaan laboratorium dan rencana kuretase.

Adanya nyeri perut dan keluarnya darah yang banyak dari jalan lahir disertai dengan gumpalan-gumpalan dapat menyebabkan infeksi apabila tidak ditangani dengan segerah. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk tindakan selanjutnya yaitu penatalaksanaan pemberian cairan infus RL, rencana kuret pada tanggal 28 mei 2017 dan penatalaksanaan pemberian obat.

Pada Ny''R'' dilakukan tindakan dengan pemasangan infus dengan cairan RL dengan 28 tetes/menit, rencana kuret pada tanggal 28 mei 2017 pukul 11:00 wita, dan penatalaksanaan pemberian obat yaitu ceftriaxone 1gr/12 jam/IV, misoprostol 2 tab/vagina, asam mefenamat 500 mg/8 jam/oraldan Sf 300 mg/24jam/oral.

Adapun kriteria anemia pada laki-laki dewasa dengan kadar Hb <13g/dl, wanita dewasa yang tidak hamil dengan kadar Hb <12 g/dl, wanita hamil dengan kadar Hb <11g/dl, anak umur 6-14 tahun dengan kadar Hb <12 g/dl dan anak umur 6 bulan-6 tahun dengan kadar Hb <11 g/dl. Berdasarkan kadar Hb pembagian anemia pada ibu hamil yaitu: anemia ringan Hb 9-10 gr%, anemia sedang Hb 7-8 gr%, anemia berat Hb < 7 gr% (Jannah,2012: 190).

Pengeluaran hasil konsepsi biasanya dengan aman dengan blok paraserviks pada fasilitas rawat jalan. Namun, faktor yang membatasi adalah kemampuan mengobservasi pasien secara memadai setelah tindakan. Pada kasus dengan perdarahan hebat atau jika abortus terjadi pada trimester kedua, biasanya diperlukan rawat inap (C.Benson Ralph dan Martin L.Pernoll, 2013: 302).

Pada kasus abortus inkomplit memerlukan tindakan segerah yaitu kolaborasi atau berkonsultasi dengan dokter, dengan demikian ada kesamaan antara tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus dilahan praktek dan ini berarti tidak ada kesenjangan.

## 5. Rencana Tindakan Asuhan

Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen kebidanan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Suatu rencana tindakan harus disetujui pasien dan bidan agar menjadi efektif. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan alasan yang benar berlandaskan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, serta telah divalidasi dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Rencana asuhan disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan pencegahan masalah/diagnosa potensial. Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan yang berisi sasaran/target dan hasil yang akan dicapai dalam penerapan asuhan kebidanan pada kasus kematian janin dalam rahim (Nurhayati dkk, 2013).

Dalam membuat perencanaan ini ditemukan tujuan dan kriteria yang akan dicapai dalam menerapkan asuhan kebidanan Ibu Hamil pada Ny”R” dengan Abortus Inkomplit tidak berbeda dengan teori dimana rencana asuhan kebidanan dikembangkan berdasarkan pada intervensi dan rasional sesuai dengan masalah aktual dan potensial pada ibu hamil dengan abortus Inkomplit.

Pada kasus Ibu hamil Ny”R” penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial yang dilakukan di Rumah Sakit berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Pada langkah ini, informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi yaitu sebagai berikut: cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan klien, mendengar keluhan, menjelaskan keadaan

yang dialami, memberikan motivasi, menganjurkan agar melakukan pemeriksaan secara teratur, menganjurkan untuk beristirahat yang teratur, pemeriksaan laboratorium, memberikan informasi tentang perubahan fisik dan psikologis.

Observasi tanda-tanda vital, kaji adanya tanda infeksi dan anemia, *memberikan health education*, mendiskusikan pada ibu dan keluarga tentang perencanaan kuretase, menjelaskan pada ibu pentingnya dilakukan kuretase dan jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 11:00 wita, memberikan dukungan psikologis dan spiritual.

Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretase yakni berupa persiapan alat kuret (handscoen 2 pasang, kasa secukupnya, duk steril satu buah, kateter 1 buah, speculum anterior dan posterior, tampon tampon, kuret tajam dan kuret tumpul, kapas DTT, larutan betadin), persiapan penolong (penutup kepala, kacamata, masker, celemek dan sepatu tertutup), dan persiapan pasien yaitu pasien dianjurkan untuk istirahat dan berpuasa, kolaborasi dengan dokter pemberian obat antibiotik, analgetik dan obat penambah darah.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan pemantauan selama dirawat di rumah sakit untuk memantau keadaan klien apakah nyeri perut dan pengeluaran darahnya berhenti atau tidak. Rencana asuhan yang diberikan yaitu memantau tanda-tanda vital, memberikan *Health education* yaitu menganjurkan ibu menjaga kebersihan dan mengonsumsi makanan yang bergizi, menjelaskan teknik relaksasi bila timbul nyeri, mengingatkan pada ibu untuk teratur mengonsumsi obatnya.

Berdasarkan tinjauan teoritis asuhan yang diberikan ibu hamil dengan abortus inkomplit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah adalah tindakan umum pada abortus inkomplit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Secara umum yaitu penanganan nyeri perut bagian bawah dan penanganan pengeluaran darah dari jalan lahir karena ibu hamil dengan keluhan tersebut rentan mengalami anemia dan infeksi. Adapun prinsip-prinsip pencegahan infeksi adalah dengan cuci tangan sebelum melakukan tindakan, pengeluaran hasil konsepsi dengan kuretase karena dengan keluarnya seluruh hasil konsepsi maka tidak ada rangsangan untuk kontraksi, pengeluaran darah akan berhenti dan serviks akan menutup.

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Penanganan abortus inkomplit jika kehamilan lebih dari 16 minggu berikan infus oksitosin 20 unit dalam 500 ml cairan RL/IV dengan kecepatan 40 tetes/menit sampai terjadi ekspulsi hasil konsepsi dan jika perlu berikan misoprostol 200 mcg pervaginam setiap empat jam sampai terjadi ekspulsi hasil konsepsi (maksimal 800 mcg), pastikan untuk tetap memantau kondisi ibu setelah penanganan (Saifuddin, 2014: M-16).

Rencana tindakan asuhan sudah disusun berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara tinjauan

teori dan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktik.

## **6. Implementasi Asuhan Kebidanan**

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta kerjasama dengan tim kesehatan atau dokter dengan demikian bidan harus bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut (Mangkuji dkk, 2013). Pada saat dilakukan tindakan pada klien, yang pertama dilakukan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan untuk pencegahan terjadinya infeksi.

Pada studi kasus Ny”R” dengan abortus inkomplit, semua tindakan yang telah direncanakan seperti penanganan nyeri dan pencegahan pengeluaran darah dari jalan lahir yaitu tindakan pertama adalah memberikan cairan infus RL, memberikan obat analgetik, antibiotik dan penambah darah telah diberikan (cefadroxil 500 mg/12 jam/oral, asam mefenamat 500 mg/8 jam/oral dan SF 300 mg/24 jam/oral), memberikan misoprostol 2 tab/vagina, dilakukan tindakan kuretase dan ibu setuju, kuret dilakukan pada tanggal 28 mei 2017, pukul 11:00 wita. obat injeksi lainnya yaitu tanggal 27 Mei-28 Mei 2017, pukul 06:00 wita memberikan ceftriaxone 1gr/12 jam/IV, melakukan pemanantauan tanda-tanda vital, kuretase dilakukan pada tanggal 28 mei 2017, pukul 11:00 wita, dan memberikan dukungan psikologis dan spiritual ibu dan keluarga selama di rumah

sakit, dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di ruang ANC dan PNC di RSUD Syech Yusuf Gowa.

Pada kasus ini Ny "R", usia 36 tahun dengan diagnosa abortus inkomplit. Pada kasus ini, diagnosis abortus inkomplit ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pelaksanaan asuhan untuk mengatasi masalah yang dialami klien adalah dengan kuretase. Pada kasus Ny"R" dilakukan tindakan dengan kuretase.

Pada hari pertama Ny"R" memberikan cairan pada ibu dengan memasang infus RL drips oksitocin 2 unit dengan 28 tetes/menit, memberikan obat analgetik (asam mefenamat 500 mg/12 jam/oral), antibiotik (ceftriaxone 1 gr/12/IV), dan penambah darah telah diberikan (SF 300 mg/24 jam/oral), misoprostol 2 tab/vagina, ibu mengerti bahwa abortus inkomplit harus dilakukan tindakan kuretase dan ibu bersedia dikuret pada tanggal 28 mei 2017, pukul 11:00 wita, ibu berpuasa dan beristirahat sebelum dikuret, ibu menjaga personl higienenya, melakuakan persiapan pelaksanaan kuret yaitu persiapan alat, persiapan penolong dan persiapan pasien.

Pada hari kedua stadi kasus Ny"R" mengobservasi tanda-tanda vital, pengeluaran darah masih terjadi, menjelaskan pada ibu penyebab perdarahan dan nyeri perut bagian bawah, memberikan dukungan psikologis dan spiritual ibu dengan menganjurkan pada ibu untuk meminta kepada ibu untuk selalu mengingat

Allah SWT, memberikan penyuluhan pada ibu tentang personal hygiene yaitu dengan cara mengganti pembalut setiap kali basa atau setiap 2 jam, istirahat yang cukup yaitu tidur siang  $\pm$  2 jam, tidur malam  $\pm$  8 jam, ibu sudah istirahat tetapi ibu tidak istirahat dengan tenang karena rasa nyeri yang dirasakan dan membuat ibu terganggu, ibu melakukan puasa untuk persiapan kuretase, ibu bersedia di kuret pada pukul 10:30 wita mendorong klien ke ruang ok, membawa alat dan status klien, melanjutkan pemberian obat antibiotik (ceftriaxone 1 gr/12 jam/IV), analgetik (asam mefenamat 500 mg/8 jam/oral), penambah darah (SF 300 mg/24 jam/oral) yaitu pemantauan tanda-tanda vital, mengingatkan pada ibu untuk mengonsumsi obatnya.

Pada hari ketiga yaitu pada tanggal 29 mei 2017 dengan post kuret hari kedua mengganti cairan infuse RL dengan 28 tetes/menit pada pukul 00:00 wita, melanjutkan pemberian obat antibiotik (cefadroxil 500 mg/12 jam/oral), analgetik (asam mefenamat 500 mg/8 jam/oral), penambah darah (SF 300 mg/24 jam/oral). Memantau tanda-tanda vital, keadaan ibu baik ditandai dengan TTV dalam batas normal, walaupun ibu sudah sehat tetap memberikan konseling tentang *health education* pada ibu yaitu makan makanan yang bergizi seperti nasi, ikan, sayur-sayuran hijau dan buah-buahan, personal hygiene yaitu dengan menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genitalia dengan cara sering mengganti pakaian dalam, pembalut setiap 2 jam atau setiap selesai BAB/BAK, istirahat yang cukup yaitu dengan menganjurkan pada ibu untuk tidur siang  $\pm$  2 jam pada siang hari dan tidur  $\pm$ 8 jam pada malam hari. Mengingatkan pada ibu untuk teratur

minum obatnya. Setelah dilakukan pembimbingan pada ibu, ibu mengerti dan melakukan apa yang dianjurkan. Pada tanggal 30 Mei Hb ibu 12,7 gr% dan ibu pulang dalam keadaan sehat.

Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

## **7. Evaluasi Asuhan Kebidanan**

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi efektivitas dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi bantuan pemenuhan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar kreatif dalam penatalaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut sudah efektif, sedangkan sebagian lagi belum. Manajemen kebidanan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali lagi dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen tidak efektif, serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan berikutnya (Nurhayati, 2013:144).

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasikan, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap

ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi.

Hasil evaluasi setelah asuhan kebidanan yang dilaksanakan selama 3 hari yakni pada tanggal 27 april sampai tanggal 30 april 2017 yaitu pada hari pertama masalah yang dialami oleh klien akan diatasi dengan pengeluaran sisa-sisa jaringan melalui kuretase, tidak terjadi komplikasi selama pemberian asuhan dan penanganan, nyeri perut teratasi, abortus inkomplit teratasi ditandai dengan telah dilakukan tindakan kuretase dan tampak pengeluaran darah sedikit, kemudian pada evaluasi hari kedua keadaan ibu sudah mengalami kemajuan dan membaik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal dan Hb dalam batas normal dan pada tanggal 30 mei 2017 Hb dalam batas normal dan ibu pulang dalam keadaan sehat.

Berdasarkan studi Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Abotus Inkomplit tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus NY”R” secara garis besar tidak ditemukan kesenjangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah penulis mempelajari teori dan pengamatan langsung dari lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Telah dilaksanakan pengkajian dan analisis data ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
2. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa/masalah aktual ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
3. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa/masalah potensial ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan hasil dilakukan tindakan segera dengan memasang infus untuk memperbaiki keadaan umum ibu mengingat keadaan pasien pada saat pelaksanaan manajemen dalam keadaan darurat atau bahaya.

6. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan hasil penulisan merencanakan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial.
7. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan yang telah disusun pada ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
8. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan hasil yaitu tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka.
9. Pendokumentasian dilaksanakan mulai tanggal 27 mei sampai 30 mei 2017, pengkajian pertama sampai ketiga tanggal 27 mei-30 mei 2017 dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

## **B. SARAN**

1. Saran untuk klien
  - a. Menganjurkan kepada ibu agar banyak beristirahat.
  - b. Menganjurkan kepada ibu untuk mengomsumsi makanan dengan gizi seimbang.
  - c. Menganjurkan kepada ibu untuk mengomsumsi obat secara teratur sesuai instruksi dokter.
  - d. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan organ genetaliaanya.
  - e. Menganjurkan kepada ibu untuk mobilisasi dini.

## 2. Saran untuk bidan

- a. Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang professional sehingga dapat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI). Oleh karena itu bidan harus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, melalui program pendidikan, pelatihan-pelatihan, seminar agar menjadi bidan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan (IPTEK).
- b. Bidan harus memberikan asuhan sesuai wewenang untuk itu manajemen kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang mendasari bagi bidan untuk memecahkan masalah klien dan berbagai kasus.
- c. Seorang bidan hendaknya menganggap bahwa semua ibu hamil mempunyai resiko untuk komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu dan janin, oleh karena itu bidan diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya tanda-tanda bahaya kehamilan dan menganjurkan ibu dan keluarga segerah ke pelayanan kesehatan bila mengalami hal tersebut.

## 3. Saran untuk institusi kebidanan

- a. Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang profesional untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Untuk pelayanan yang lebih berkualitas sesuai dengan kemajuan teknologi, sebaiknya bidan yang sudah bertugas diberi kesempatan untuk melanjutkan atau semacam pelatihan-pelatihan.

- c. Demi mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan perlu kiranya penyediaan fasilitas/alat-alat yang memadai untuk penunjang pelaksanaan tugas-tugas kebidanan dan untuk meningkatkan keterampilan bidan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Ferdinand. "Kajian yuridis tentang pengguguran kandungan karena alasan kesehatan ibu menurut pasal 299 KUH Pidana" *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.
- Al-Djufri, Shaleh Muhammad. "Aborsi dalam Perspektif Kedokteran dan Hukum Islam". Makassar .2015.
- Andriza. "hubungan Umur dengan Paritas Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus Inkomplit di Rumah sakit Muhammadiyah Palembang 2013" *Jurnal Harapan Bangsa* Vol.1 No. 1, Juli 2013.
- C.Benson Ralph dan Martin L.Pernoll. *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: EGC.2013.
- Fauziah, Yulia. *Obstetri Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Fathala, Mahmoud dan Rebecca J Cook. "women, Abortion and the new Thecnical and Policy Guidance from WHO" Competing interests: None declared. *Bull World Health Organ* 2012;90:712 doi:10.2471/BLT.12.107144.
- Feryanto Achmad dan Padlun. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta: Salemba Medika.2014.
- Jannah, Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kehamilan*. Yogyakarta: ANDI. 2012.
- Irianti, Bayu dkk. *Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti*. Jakarta : Sagung Seto.2014.
- Kemenkes RI. "Pusat Data dan Informasi Kementerian kesehatan RI" Jakarta. 2014.
- Kementerian Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung :Jabal. 2010.
- Manguji, Abetty dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP*. Jakarta: EGC.2013.
- Manriwati. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta: EGC.2012.
- Manuaba, Ida Ayu Chandranita dkk. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*, Jakarta: EGC. 2013.
- Maliana, Andesia "Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus inkomplit di ruang kebidanan" *Jurnal Kesehatan*, Volume VII, Nomor 1, April 2016.

- Ngot Thi Nuh Nguyen dkk “*Results from a study using misoprostol formangement of incomplete abortion in Vietnamese hospitals: implications for task shifting*” Ngoc et al. BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:118 <http://www.biomedcentral.com/1471-2393/13/118>.
- Nurhayati dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Permenkes RI. “*Tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi ke daruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan*. Jakarta: Permenkes RI No.3, 2016.
- Pudiasuti, Ratna Dewi. *Asuhan Kebidanan Pada Hamil Normal Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: P.T. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014.
- Reskiyah Septi Yanti dan Fruriolina Ariani. *Manajemen Abortus Inkomplit*. Jakarta: EGC. 2012.
- Saifuddin, Abdul Bari. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternadan Neonatal*. Jakarta: PT Bina Sarwono Prawirohardjo. 2014.
- Sandi, DebyMatia, “*Gambaran Umum dan Paritas Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus Inkomplit di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang*” *Jurnal Harapan Bangsa* Vol 2. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lenterahati, 2009.
- Sulistyawati Ari. *Asuhan Kebidanan pada masa Kehamilan*. Jakarta: salemba medika. 2013.
- Sunarti. *Asuhan Kehamilan*. Jakarta: In Media. 2013.
- Susiana, Sali. “*Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*” Studi khusus Gender pada bidang kesejahteraan social” Badan Keahlian DPR RI. Vol. VIII, No 06/II/P3D/Maret/2016.
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Syahrirdkk. “*profil kesehatan provinsi Sulawesi Selatan 2014*”. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar 2016.

WHO, *Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Jakarta:Unicef, 2013.

WHO (*World Health*), *Manajemen Abortus Inkomplit*. Jakarta. EGC. 2012.

Wulandari, Sri. "Perilaku Seksual Pranikah Berisiko terhadap Kehamilan tidak Diinginkan pada Remaja SMKN Tandun Kabupaten Rokan Hulu" *Jurnal Maternity and Neonatal* Volume 2 No 2, 2016.

Yulaikha, Lili. *Seri Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta: EGC. 2012.



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan izin Pengambilan Data Awal

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan izin Penelitian.

Lampiran 4. Surat Rekomendasi penelitian

Lampiran 5. Surat keterangan Selesai Meneliti

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup





KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)864924 Fax.(0411) 864923 Samata-Gowa  
 Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.(0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-179/FKIK/PP.00.9/ 06 /2017

Gowa, 21 Juni 2017

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth.  
**Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa**  
 di-  
 Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rosmanengsi  
 NIM : 70400114068  
 Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Abortus Inkomplit.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam  
 An Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.**  
 Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9510/S.01P/P2T/06/2017  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.  
 Bupati Gowa

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.1280/FKIK/PP.00.9/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ROSMANENGSI**  
 Nomor Pokok : 70400114068  
 Program Studi : Kebidanan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)  
 Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN ABORTUS INKOMPLIT "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Juni s/d 20 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 22 Juni 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A.M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
 2. *Portinggal*.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 11 Juli 2017

K e p a d a

Nomor : 070/GI /BKB.P/2017

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

T e m p a t

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel  
 Nomor: 9510/S.01.P/P2T/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ROSMANENGI**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Towa, 25 Mei 1994  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)  
 Alamat : Samata

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN ABORTUS INKOMPLIT**"

Selama : 22 Juni 2017 s/d 20 Juli 2017

Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA BADAN,**

**DRS. BAHARUDDIN.T**

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP. 19600124 197911 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kadis Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF**  
 JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor :159/Diklat.RSUD-SY/ VIII /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Rosmanengsi  
 N i m : 70400114068  
 Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Poliklinik KIA , Ruang Nifas( ANC, PNC ) Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul "**Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Abortus Inkomplit Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017** " pada tanggal 27 Mei 2017 S/D 08 Juli 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungguminasa, 03 Agustus 2017

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR  
 Ketua Diklat  
 Koordinator Bagian Penelitian



**Dr. Dr. Ramli Rauf, Bsc. MMRS**  
 Nip. 19830710 198703 2 019

ALAUDDIN  
 M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama : Rosmanengsi  
Nim : 70400114068  
TTL : Tanah Towa, 25 Mei 1994  
Suku : Kongjo  
Agama : Islam  
Alamat : Kajang Kab. Bulukumba  
Nama orang tua :  
a. Ibu : Nurdiana  
b. Ayah : Basi'

### B. Riwayat pendidikan

1. Tahun 2000-2007 SD Negeri 192 Tanah Towa
2. Tahun 2007-2010 SMP Negeri 21 Bulukumba
3. Tahun 2010-2013 SMA Negeri 13 Bulukumba
4. Tahun 2014-2017 kuliah di Jurusan Kebidanan fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar