

**UJI AKTIVITAS ANTIMIKROBA HASIL FRAKSINASI EKSTRAK DAUN  
CEMPEDAK (*Artocarpus champeden L*) TERHADAP MIKROBA PATOGEN**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi (S. Farm)  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:  
Nur Amalia Sahib  
NIM: 70100113036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

**UJI AKTIVITAS ANTIMIKROBA HASIL FRAKSINASI EKSTRAK DAUN  
CEMPEDAK (*Artocarpus champeden L*) TERHADAP MIKROBA PATOGEN**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi (S. Farm)  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:  
Nur Amalia Sahib  
NIM: 70100113036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia Sahib  
NIM : 70100113036  
Tempat, Tanggal Lahir : Manokwari, 20 Juni 1995  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : Jalan Hertasning baru Perumahan Graha Cipta  
Hertasning Blok A4 No. 9  
Judul : Uji Aktivitas Antimikroba Hasil Fraksinasi Ekstrak  
Daun Cempedak (*Artocarpus champeden* L) Terhadap  
Mikroba Patogen

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Agustus 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**

M A K A S S A R  
Nur Amalia Sahib  
70100113036

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antimikroba Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) Terhadap Mikroba Patogen” yang disusun oleh Nur Amalia Sahib, NIM: 70100113036, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 21 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **28 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 21 Agustus 2017 M

28 Dzulqa’idah 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing I : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Andi Armisman E.P., S.Farm., M.Si., Apt. (.....)

Penguji I : A. Tenriugi, S.Si., M.Si. (.....)

Penguji II : Dr. H. Supardin, M.HI. (.....)

Dekan



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP. 19550901198312 1 001

**KATA PENGANTAR**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia kearah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antimikroba Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Cempedak (*Artocarpus champeden* L) Terhadap Mikroba Patogen” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terimakasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda H. Muhammad Sahib dan Ibunda Hj.Syamsiah dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudaraku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Ibu Dr. NurHidayah, S. Kep., Ns., M. Kes selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M. Kes selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Ibu Haeria, S. Si., M. Si selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang tak hentinya memberikan arahan serta dorongan pada Mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
5. Ibu Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN UIN Alauddin Makassar sekaligus selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian ampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu luangnya untuk mengarahkan serta mengoreksi hal-hal yang perlu dikoreksi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu A.Tenriugi, S.Si., M.Si selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Supardin, M. Hi selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.

10. Para Laboran Farmasi UIN terutama kak Azwar Nasir S.Farm yang selalu sabar menunggu hingga malam, membimbing, memberikan saran, Kak Sukri S.Farm dan kak Ansari Masri S.Farm., M.Si., Apt yang telah meluangkan waktunya.
11. Kakanda Andri Anugrah Pratama S. Farm., M.si, Kakanda Muhammad Rais S.Farm., Apt., Kakanda Alm. Mulyanti Amrullah S. Farm., yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-Teman Farbion 2013, yang selama hampir empat tahun terakhir telah memberikan dukungan, semangat, doa, rasa nyaman, mengukir banyak cerita, tawa, masalah terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini, Kalian Luar Biasa.
13. Teman-teman penelitianku selama di Lab Ayu, Arman, Cia, Niar, Fira, Nikma, Arwan, Yuda, Imma, Upi, Fitrah, Musfirah, Ningsih, Ana, Isma, Mita.
14. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin serta pihak-pihak yang yang juga selalu member penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermantaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalam.

Gowa, 21 Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8-31
F. Uraian Tanaman.....	8
1. Klasifikasi Tanaman.....	8
2. Nama Daerah.....	8
3. Morfologi Tanaman.....	8

4. Kandungan Kimia.....	9
5. Manfaat Tumbuhan.....	9
G. Uraian Mikroba Uji.....	11
H. Escherichia coli.....	11
1. Bacillus subtilis.....	12
2. Pseudomonas aeruginosa.....	13
3. Staphylococcus aureus.....	14
4. Staphylococcus epidermidis.....	15
5. Streptococcus mutans.....	16
6. Salmonella typhi.....	17
7. Vibrio colera.....	18
8. Candida albicans.....	19
I. Uraian Umum Antimikroba.....	20
1. Definisi Antimikroba.....	20
2. Sifat Antimikroba.....	20
3. Pembagian Antimikroba.....	20
4. Sifat Antiikroba.....	20
5. Pembagian Antimikroba.....	20
6. Prinsip Kerja Antimikroba.....	21
7. Mekanisme Kerja Antimikroba.....	21
8. Uji Efektivitas Antimikroba.....	22
J. Metode Sterilisasi.....	23
1. Pengertian.....	23

2. Cara-Cara Sterilisasi.....	23
K. Ekstraksi Simplisia.....	24
1. Pengertian .....	24
2. Tujuan Ekstraksi.....	25
3. Metode Pemisahan Secara Kromatografi Lapis Tipis.....	25
L. KLT-Biautografi.....	27
M. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Menjadi Obat.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32-38</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Populasi dan Sampel.....	32
1. Populasi Penelitian.....	32
2. Sampel Penelitian.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
1. Alat Yang Digunakan.....	33
2. Bahan Yang Digunakan.....	33
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	33
1. Pengambilan Sampel .....	33
2. Pengolahan Sampel ....	34

3. Ekstraksi Sampel.....	34
4. Sterilisasi Alat.....	34
5. Penyiapan Mikroba Uji.....	35
6. Pembuatan Suspensi Kultur Mikroba Uji.....	35
7. Skrining Aktivitas Antibakteri.....	35
8. Fraksinasi Ekstrak Aktif Dengan Kromatografi Cair Vakum.....	36
9. Penyiapan Kromatogram Ekstrak.....	36
10. Uji Aktifitas Fraksi Teraktif Dan Uji Antimikroba KLT- Bioautografi.....	37
11. Identifikasi Bercak Aktif Dengan Beberapa Penampakan Bercak..	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39-55</b>
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Hasil Ekstraksi Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden L</i> ).....	39
2. Hasil Pengujian Skrining Antibakteri.....	40
3. Hasil Fraksi Ekstrak Etil Asetat Melalui KCV.....	43
4. Hasil Pengujian Skrining Aktivitas Hasil Fraksinasi.....	46
5. Hasil Uji KLT-Bioautografi Dan Identifikasi Komponen Senyawa.....	48
B. Pembahasan.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56

KEPUSTAKAAN.....	57-59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60-79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Ekstraksi Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden L.</i> ).....	39
2. Hasil Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden L.</i> ) Terhadap Beberapa Bakteri Uji.....	40
3. Nilai Rf bercak Profil KLT Fraksi Etil Asetat Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden L.</i> ).....	43
4. Hasil Skrining Hasil Fraksinasi Etil Asetat Daun ( <i>Artocarpus champeden L.</i> ).....	46
5. Hasil Uji KLT-Bioautografi Fraksi D Terhadap Bakteri Uji dan Identifikasi Komponen Senyawa.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hasil Uji Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak N-Heksan Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.) konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm Pada Bakteri Uji.....	69
2. Hasil Uji Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.) konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm Pada Bakteri Uji.....	70
3. Hasil Uji Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.) konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm Pada Bakteri Uji.....	71
4. Hasil Identifikasi Profil KLT Ekstrak Etil Asetat Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.).....	72
5. Hasil Fraksinasi Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.) Dengan Eluen Heksan : Etil Asetat (3:1) menggunakan KCV.....	73
6. Uji Skrining Aktivitas Hasil Fraksinasi Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.) .....	74
7. Hasil Uji KLT-Biautografi Fraksi Aktif Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.) Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> .....	75
8. Hasil Uji KLT-Biautografi Fraksi Aktif Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.) Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i> .....	76
9. Hasil Uji KLT-Biautografi Fraksi Aktif Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.) Terhadap Bakteri <i>Streptococcus mutans</i> .....	77
10. Hasil Uji KLT-Biautografi Fraksi Aktif Daun Cempedak ( <i>Artocarpus champeden</i> L.) Terhadap Bakteri <i>Salmonella thyposa</i> .....	78

11. Hasil Identifikasi Fraksi Aktif Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*)

Dengan Pereaksi Identifikasi .....79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Ekstraksi Daun Cempedak .....	61
2. Skema Kerja Pengujian Skrining Antibakteri.....	62
3. Skema Kerja Fraksinasi Sampel.....	64
4. Skema Kerja Uji Aktivitas Hasil Fraksinasi.....	65
5. Skema Kerja KLT-Bioautografi.....	66
6. Skema Kerja Identifikasi Senyawa Kimia.....	67
7. Perhitungan Konsentrasi Dan Pengenceran Dari Ekstrak Dan Fraksi n-Heksan, Etil Asetat Dan Etanol 96%.....	68

## ABSTRAK

Nama Penulis : Nur Amalia Sahib  
NIM : 70100113036  
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antimikroba Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Cempedak (*Artocarpus champeden* L) Terhadap Mikroba Patogen

---

Telah dilakukan penelitian Fraksinasi Senyawa Antimikroba Daun Cempedak (*Artocarpus champeden* L). Penelitian ini dilakukan dengan uji KLT-Bioautografi untuk menentukan fraksi paling aktif yang mempunyai daya hambat terhadap bakteri uji lalu diidentifikasi senyawa fraksi paling aktif untuk menentukan senyawanya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui komponen kimia dan aktivitas antimikroba dari ekstrak paling aktif daun cempedak terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio colera* dan jamur *Candida albicans*.

Ekstrak daun cempedak (*Artocarpus champeden* L) diperoleh dengan cara maserasi menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat dan etanol 96%. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan uji skrining menggunakan mikroba uji terhadap ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 96% dari daun cempedak (*Artocarpus champeden* L) konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm. Lalu diuji kembali fraksi paling aktif menggunakan KLT-Biautografi dan diidentifikasi senyawanya.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Fraksi D ekstrak etil asetat memberikan hambatan yang baik pada konsentrasi 1000 ppm dengan luas zona hambat 1,24 cm untuk *Streptococcus mutans*, 0,76 cm untuk *Staphylococcus epidermidis*, 0,75 cm untuk *Staphylococcus aureus*, 0,74 cm untuk *Salmonella thyposa*. Setelah diidentifikasi komponen kimia menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun cempedak (*Artocarpus champeden* L) mengandung senyawa Flavonoid dan Fenol.

Kata kunci: daun cempedak (*Artocarpus champeden* L), antimikroba

## ABSTRACT

Name : Nur Amalia Sahib  
NIM : 70100113036  
Script Title : Antimicrobial Activity Test Results of Fractionation of  
Cempedak Leaves Extract (*Artocarpus champeden* L)  
Against Pathogenic Microbes

---

A study has been conducted on Fractionation of Antimicrobial Compounds of Cempedak Leaves (*Artocarpus champeden* L). This research was conducted by KLT-Bioautografi test to determine the most active fraction which has inhibitory power to test bacteria and then identified the most active fraction compound to determine its compounds. The purpose of this research is to know the chemical components and antimicrobial activity of the most active extract of cempedak leaves to *Escherichia coli* bacteria, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio cholera* and *Candida albicans* fungi.

Cempedak leaf extract (*Artocarpus champeden* L) was obtained by maceration using n-hexane solvent, ethyl acetate and ethanol 96%. Preliminary research was performed by screening test using microbial test on n-hexane, ethyl acetate and ethanol extract 96% from cempedak leaf (*Artocarpus champeden* L) concentration 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm. Then tested the most active fraction using TLC-Biography and identified its compounds.

The results obtained showed that Fraction D of ethyl acetate extract gave a good constraint on the concentration of 1000 ppm with 1.24 cm inhibition zone for *Streptococcus mutans*, 0.76 cm for *Staphylococcus epidermidis*, 0.75 cm for *Staphylococcus aureus*, 0.74 cm For *Salmonella typhosa*. After identification of chemical components showed that the extract of ethyl acetate of cempedak leaf (*Artocarpus champeden* L) contains Flavonoid and Phenol compounds.

Keywords: cempedak leaf (*Artocarpus champeden* L), antimicrobial

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Obat tradisional merupakan produk yang terbuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam dan secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Penggunaan bahan alam dalam obat tradisional terutama yang bersumber dari tumbuhan atau bagian dari tumbuhan yang mengandung banyak sekali senyawa didalamnya. Keberagaman senyawa dalam keberagaman tumbuhan yang terdapat di negeri ini mengharuskan kita untuk mengetahui senyawa kimia yang mampu memberikan efek terapeutik dari tumbuhan tadi untuk kemudian disintesis menjadi senyawa obat baru dalam laboratorium (Oktora, 2006).

Bakteri patogen merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan penyakit pada manusia. Bakteri patogen dapat dihambat pertumbuhannya atau dibunuh dengan proses fisik (misalnya dengan pemanasan) atau bahan kimia (misalnya dengan antibiotika). Tetapi antibiotika beberapa tahun lalu dinyatakan berhasil dalam mengatasi penyebaran bakteri patogen. Permasalahan yang sedang dihadapi, penggunaan antibiotik dengan dosis dan waktu terapi yang tidak tepat dapat menimbulkan resistensi bakteri (Liana, 2013).

Antibiotik dengan penggunaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan resistensi terhadap bakteri dan diketahui bahwa bakteri dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya. Sehingga perlu penelusuran antimikroba baru ini untuk mengobati infeksi khususnya yang berasal dari alam yang sering digunakan sebagai obat yaitu tumbuhan. Dimana tumbuhan merupakan anugerah Allah swt.

Meskipun resistensi itu begitu berbahaya, tetapi bukan berarti tidak dapat diobati dengan antimikroba baru karena telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

*Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari: 5678).*

Dari penjelasan diatas, kita dapat pahami meskipun resistensi antibakteri itu membuat bakteri kebal terhadap antimikroba tetapi tidak menutup kemungkinan ada senyawa lain yang dapat mengobati resistensi tersebut.

Penelitian antimikroba telah banyak dilakukan termasuk dengan menggunakan tumbuhan. Tumbuhan yang digunakan untuk obat tradisional dapat dijadikan alternatif pencarian antimikroba, karena pada umumnya memiliki senyawa aktif yang sangat berperan dalam bidang kesehatan (Swandi, 1991).

Cempedak adalah salah satu jenis tumbuhan yang banyak ditanam di daerah tropis (Ashari, 2006). Daun cempedak sering dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat Kalimantan di Indonesia sebagai bedak dingin dan penghilang flek hitam pada wajah. Ekstrak kasar dan fraksi etil asetat daun cempedak memiliki aktivitas antioksidan dan mengandung metabolit sekunder berupa flavonoid (Rahmawati, 2013).

(Whenny, Rolan, & Laode, 2015) menguji “Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Daun Cempedak (*Artocarpus Champeden* L.)”. Hasil penelitian menunjukkan daun cempedak (*Artocarpus Champeden* L.) memiliki potensi beraktivitas sebagai tabir surya karena mengandung senyawa flavonoid yang memiliki sifat fotoprotektif sehingga mampu menyerap sinar ultraviolet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kategori aktivitas tabir surya dari ekstrak daun cempedak. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa aktivitas tabir surya ekstrak daun cempedak

berdasarkan persentase transmisi eritema terdiri atas kategori *sunblock*, proteksi ekstra dan *suntan* standar, sedangkan aktivitas tabir surya ekstrak daun cempedak berdasarkan persentase transmisi pigmentasi termasuk kategori *sunblock*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun cempedak mengandung senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang bersifat sebagai antibakteri. Hal ini sebagai salah satu landasan untuk melakukan penelitian aktivitas antimikroba terhadap tumbuhan cempedak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aktivitas antimikroba hasil fraksinasi dari daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) terhadap bakteri patogen ?
2. Komponen kimia apakah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada hasil fraksinasi dari daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) ?

## **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Definisi Operasional**

#### **a. Aktivitas antibakteri**

Merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh ekstrak tumbuhan baik dari daun, korteks, biji, bunga, akar, umbi dan buah yang dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri.

#### **b. Bakteri patogen**

Merupakan suatu biakan bakteri yang bersifat merugikan bagi kesehatan manusia.

#### **c. Ekstrak**

Merupakan suatu hasil dari proses ekstraksi yang mengandung senyawa-senyawa kimia aktif baik itu dari tumbuhan, hewan, dan mineral.

d. Etanol 96%

Merupakan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi sampel cempedak.

e. n-Heksan

Merupakan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi sampel daun cempedak.

f. Fraksi

Merupakan suatu hasil dari proses pemisahan komponen-komponen kimia yang terkandung dalam ekstrak yang dipisahkan melalui beberapa metode tertentu.

g. Partisi

Merupakan suatu proses pemisahan ekstrak yang sederhana menjadi beberapa fraksi sesuai dengan kepolaran. Terdapat dua jenis metode partisi yaitu partisi cair-cair dan partisi cair-padat.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Fitokimia dan Mikrobiologi Farmasi.

### D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya.

1. (Whenny, Rolan, & Laode, 2015) menguji “Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Daun Cempedak (*Artocarpus Champeden L.*)”. Hasil penelitian menunjukkan daun cempedak (*Artocarpus Champeden L.*) memiliki potensi beraktivitas sebagai tabir surya karena mengandung senyawa flavonoid yang memiliki sifat fotoprotektif sehingga mampu menyerap sinar ultraviolet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kategori

aktivitas tabir surya dari ekstrak daun cempedak. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa aktivitas tabir surya ekstrak daun cempedak berdasarkan persentase transmisi eritema terdiri atas kategori *sunblock*, proteksi ekstra dan *suntan* standar, sedangkan aktivitas tabir surya ekstrak daun cempedak berdasarkan persentase transmisi pigmentasi termasuk kategori *sunblock*.

2. (Aty Widyawaruyanti, 2011) menguji “Mekanisme Dan Aktivitas Antimalaria Dari Senyawa Flavonoid Dari cempedak (*Artocarpus ChampedenL.*). Dari penelitian ini dapat bahwa senyawa artoindonesianin R, artoindonesianin A-2 dan senyawa baru artocarpon A mempunyai mekanisme aksi menghambat jalur permeasi baru (NPP) pada membran eritrosit yang diinduksi oleh parasit. Sedangkan senyawa lainnya memiliki aktivitas antimalaria dengan mekanisme yang berbeda. Senyawa flavonoid pada kulit batang cempedak (*Artocarpus Champeden L*) memiliki aktivitas antimalaria poten dengan mekanisme melalui hambatan jalur permeasi baru serta mekanisme lain yang belum diketahui. Oleh karena itu, senyawa obat antimalaria baru baik dalam bentuk sediaan fitofarmaka maupun sediaan sintesisnya.
3. (Sari, 2013) “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Nangka (*Artocarpus Heterophyllus*) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*” Dari hasil penelitian didapat bahwa ekstrak etanol daun nangka mempunyai aktivitas antibakteri yang bersifat bakteriostatik. Konsentrasi yang memberikan daya hambat terbesar yaitu pada konsentrasi 80% untuk *Staphylococcus aureus* dan 100% untuk *Pseudomonas aeruginosa*. Hasil dari skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak daun nangka mengandung saponin, tanin dan flavonoid.

4. (I Made Dira Swantara, 2011) “Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Kulit Batang nangka (*Artocarpus heterophyllus*, Lam.)” Dari 735,55 kulit batang nangka menghasilkan 500,25 g ekstrak kasar metanol. Hasil partisi dari ekstrak metanol menggunakan petroleum eter, etil asetat dan n-butanol kemudian diuapkan menghasilkan ekstrak kasar petroleum eter yang berwarna hijau kekuningan sebanyak 4,11 gram, ekstrak etil asetat yang berwarna hijau kecoklatan sebanyak 2,11 gram dan ekstrak n-butanol berwarna hijau kehitaman sebanyak 1,17 gram. Hasil uji bioaktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Eschericia coli* menunjukkan ekstrak etil asetat memiliki zona hambat pertumbuhan bakteri paling besar. Terhadap ekstrak etil asetat dilakukan pemisahan dan pemurnian dengan kromatografi kolom menghasilkan fraksi yang aktif bersifat antibakteri yaitu fraksi C.
5. (Mulyanti, 2008) “Uji Antibakteri Ekstrak n-Heksan Kulit Batang Cempedak (*Artocarpus champeden* L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa*”. Bahan yang digunakan serbuk kulit batang cempedak (*Artocarpus champeden* L), diekstraksi dengan metode maserasi kinetik menggunakan pelarut n-heksan sehingga diperoleh ekstrak n-heksan kental dan diuji daya antibakterinya dengan metode difusi Agar menggunakan cylinder cup. Sebagai control positif digunakan tetrasiklin HCl. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada konsentrasi 1000 ppm, 15.000 ppm, 30.000 ppm, 75.000 ppm, 150.000 ppm dan 300.000 ppm tidak memiliki daya antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa*. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan skrining kandungan senyawanya

dengan menggunakan cara kromatografi lapis tipis (KLT) dan diperoleh hasil positif untuk golongan minyak atsiri.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri hasil fraksinasi dari ekstrak daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) terhadap beberapa bakteri patogen.
- b. Untuk mengetahui komponen kimia yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri.

### **2. Manfaat Penelitian**

Melalui aktualisasi penelitian ini diharap memberikan manfaat, yaitu:

- a. Menambah informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan dan pengolahan khasiat penggunaan daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) sebagai antibakteri terhadap beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit.
- b. Memperkaya khazanah ilmiah tanaman Indonesia yang bermanfaat dalam Islam untuk menunjang kesehatan.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### A. Uraian Tanaman

#### 1. Klasifikasi (Stokes, 1812)

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Sub class : Dilleniidae

Ordo : Urticales

Familia : Moraceae

Genus : *Artocarpus*

Spesies : *Artocarpus champeden L*



#### 2. Nama daerah (Heyney, 1987)

Nangka beurit, nongko cino, comedak (Jawa), tiwadak, tuadak, mangkahai (Kalimantan), cimpedak (Bali), tembedak, kakan, bikara, cubadak (Sumatera), campada, nangka balanda, tabodoko, nanakan, cidu, panasa (Sulawesi), tambadak (Papua), naka wara (Flores), nakane, tawedak (Seram), tuada (Ternate dan Tidore).

#### 3. Morfologi

Cempedak (*Artocarpus champeden* Lour.) merupakan tumbuhan buah tropik dari famili *Moraceae*, yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Cempedak merupakan buah kedua paling khas di Asia Tenggara setelah durian (Verheij & Coronel, 1997). Buah Cempedak menjadi salah satu primadona unggulan yang banyak digemari masyarakat karena memiliki rasa, aroma dan bentuk yang khas serta kandungan gizi yang cukup tinggi. Buah cempedak merupakan buah yang memiliki serat dan gizi yang tinggi terutama vitamin A (NAH, 2011).

Tumbuhan cempedak ini merupakan tanaman berumah satu atau *monoecious*. Tumbuhan cempedak ini memiliki pohon yang kelihatan selalu hijau, pucuk dan ranting-rantingnya terdapat rambut halus dan kaku (PCM, 1997). Tumbuhan cempedak memiliki daun yang berbeda dengan tumbuhan nangka, pada tumbuhan cempedak, daunnya memiliki bulu yang kasar (H, 2010). Buah cempedak merupakan buah semu majemuk (Verheij & Coronel, 1997). Pada umumnya hasil buah cempedak di Indonesia mencapai 60 sampai 400 buah per pohon per tahun (NAH, 2011). (Cempedak umumnya dijumpai pada hutan sekunder dan berkelompok banyak dijumpai di hutan hujan primer dataran rendah, pada habitat alaminya. Cempedak dapat tumbuh dengan baik di ketinggian lebih dari 500 m dpl, daerah beriklim lembab tanpa musim kering yang jelas (Verheij & Coronel, 1997).

#### **4. Kandungan Kimia**

Daun Cempedak (*Artocarpus champaden L*) memiliki kandungan senyawa Flavonoid dan fenol, protein, lemak, karbohidrat, fosfor, kalium, besi, vitamin C, vitamin B1 (Ashari, 2006).

#### **5. Manfaat Cempedak**

Secara tradisional tumbuhan cempedak digunakan sebagai bedak dingin dan penghilang flek hitam pada wajah (Rahmawati, 2013). Cempedak membantu menyehatkan mata, membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan menekan angka kolesterol dalam dara. Daun muda cempedak juga banyak digunakan sebagai sayuran. Biji buahnya biasanya diolah, digoreng, atau direbus seperti biji nangka. Akarnya biasa digunakan sebagai campuran jamu tradisional untuk ibu - ibu yang baru melahirkan. Kulit kayunya yang berserat dapat digunakan sebagai bahan tali, dan getahnya untuk memukat burung. Kulit batangnya dapat digunakan sebagai anti tumor dan anti malaria. Buahnya

biasanya dikonsumsi karena banyak mengandung kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan (Direktorat Gizi Departemen RI, 1981).



## **B. Uraian Mikroba Uji**

### **1. *Escherichia coli***

#### a. Klasifikasi (M. & G, 2014)

Domain : Bacteria  
Filum : Proteobacteria  
Kelas : Gammaproteobacteria  
Bangsa : Enterobacteriales  
Suku : Enterobacteriaceae  
Marga : *Escherichia*  
Jenis : *Escherichia coli*

#### b. Sifat dan morfologi

*Escherichia coli* adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus, 1,1-1,5  $\mu\text{m}$  x 2,0-6,0  $\mu\text{m}$ , motil dengan flagellum peritrikum atau non motil. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrient sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas, ada pula yang tidak memfermentasi glukosa dan maltose. Dapat ditemukan dalam usus mamalia dan tumbuh optimal pada suhu 37°C (Pelczar & Chan, 2008)

## 2. *Bacillus subtilis*

### a. Klasifikasi (M. & G, 2014)

Domain	: Bacteria
Filum	: Firmicutes
Kelas	: Bacilli
Bangsa	: Bacillales
Suku	: Bacillaceae
Marga	: <i>Bacillus</i>
Jenis	: <i>Bacillus subtilis</i>

### b. Sifat dan morfologi

*Bacillus subtilis* merupakan bakteri Gram positif memiliki sel batang 0,3 - 2,2  $\mu\text{m}$  x 1,27-7,0  $\mu\text{m}$ . Sebagian besar motil, flagelum khas lateral. Membentuk endospora tidak lebih dari satu dalam sel spongarium. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi. Aerobik sejati atau anerobik fakultatif (Pelczar & Chan, 2008).

### 3. *Pseudomonas aeruginosa*

#### a. Kasifikasi (M. & G, 2014)

Domain	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria
Kelas	: Gammaproteobacteria
Bangsa	: Pseudomonadales
Suku	: Pseudomonadaceae
Marga	: <i>Pseudomonas</i>
Jenis	: <i>Pseudomonas aeruginosa</i>

#### b. Sifat dan morfologi

*Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri Gram negatif berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5 - 1,0  $\mu\text{m}$ . Motil dengan flagelum polar, monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya stadium istirahat. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan  $\text{H}_2$  sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan (Pelczar & Chan, 2008).

#### 4. *Staphylococcus aureus*

##### a. Klasifikasi (M. & G, 2014)

Domain	: Bacteria
Filum	: Firmicutes
Kelas	: Bacilli
Bangsa	: Bacillales
Suku	: Staphylococcaceae
Marga	: <i>Staphylococcus</i>
Jenis	: <i>Staphylococcus aureus</i>

##### b. Sifat dan morfologi

Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu jenis peracunan makanan yang sering terjadi. Sel-sel *Staphylococcus aureus* berbentuk Gram positif tersusun dalam tandan khas. *Staphylococcus* dapat tumbuh baik pada kondisi aerobik tetapi umumnya tidak mampu bersaing dengan mikrobia lain yang ada dalam makanan. Strain tertentu dari *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan penyakit yaitu yang menghasilkan enterotoksin. Suatu enterotoksin yang dihasilkan oleh strain bakteri dapat dibentuk satu atau lebih dari lima tipe antigenik yang berbeda dari enterotoksin tersebut. Umumnya penularan oleh *Staphylococcus aureus* tidak di dalam tubuh tetapi nampak dipermukaan tubuh, biasanya di dalam hidung dan bisul-bisul (Ali, 2005).

## 5. *Staphylococcus epidermidis*

### a. Klasifikasi (M. & G, 2014)

Domain	: Bacteria
Filum	: Firmicutes
Kelas	: Bacilli
Bangsa	: Bacillales
Suku	: Staphylococcaceae
Marga	: Staphylococcus
Jenis	: <i>Staphylococcus epidermidis</i>

### b. Sifat dan morfologi

*Staphylococcus epidermidis* adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 - 1,5  $\mu\text{m}$ , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35 - 40°C. Terutama berosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas (Pelczar & Chan, 2008).

Koloninya berwarna putih atau kuning dan bersifat anaerob fakultatif. Kuman ini tidak mempunyai protein A pada dinding selnya. Bersifat koagulasa negatif meragi glukosa, dalam keadaan anaerob tidak meragi manitol (Pelczar & Chan, 2008).

## 6. *Streptococcus mutans*

### a. Klasifikasi (M. & G, 2014)

Domain : Bacteria  
Filum : Firmicutes  
Kelas : Bacilli  
Bangsa : Lactobacillales  
Suku : Streptococcaceae  
Marga : *Streptococcus*  
Jenis : *Streptococcus mutans*

### b. Sifat dan morfologi

*Streptococcus mutans* termasuk bakteri Gram positif berbentuk bola sampai lonjong, berdiameter 0,5-1,5  $\mu\text{m}$ , kolom bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 45°C dan suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein dan asam lipokoat (Pelczar & Chan, 2008).

## 7. *Salmonella typhi*

### a. Klasifikasi (M. & G, 2014)

Domain	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria
Kelas	: Gammaproteobacteria
Bangsa	: Enterobacteriales
Suku	: Enterobacteriaceae
Marga	: <i>Salmonella</i>
Jenis	: <i>Salmonella typhi</i>

### b. Sifat dan morfologi

*Salmonella typhi* adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus dengan ukuran 0,7-1,5  $\mu\text{m}$ , biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagel peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37°C dan berkembang baik pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan (Pelczar & Chan, 2008).

## 8. *Vibrio colera*

### a. Klasifikasi (M. & G, 2014)

Domain	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria
Kelas	: Gammaproteobacteria
Bangsa	: Vibrionales
Suku	: Vibrionaceae
Marga	: <i>Vibrio</i>
Jenis	: <i>Vibrio colera</i>

### b. Sifat dan morfologi

*Vibrio colera* adalah bakteri Gram negatif. Batang pendek, tidak membentuk spora, sumbuhnya melengkung atau lurus,  $0,5 \mu\text{m} \times 1,5-3,0 \mu\text{m}$ , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar, hanya sesekali non motil. Seringkali mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Tidak tahan asam, Tidak membentuk kapsul., Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrisi baku, Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi (menggunakan oksigen) dan fermentatif, Anaerobik fakultatif, Suhu optimum berkisar dari  $18-37^{\circ}\text{C}$  (Pelczar & Chan, 2008).

## 9. *Candida albicans*

### a. Klasifikasi (Kurniawan, 2009: 7-8)

Domain	: Thallophyta
Filum	: Fungi
Kelas	: Ascomycetes
Bangsa	: Moniliales
Suku	: Cryptococaceae
Marga	: <i>Candida</i>
Jenis	: <i>Candida albicans</i>

### b. Sifat dan Morfologi

Sel jamur *Candida albicans* berbentuk bulat, lonjong atau bulat lonjong. Koloninya pada medium padat sedikit menimbul dari permukaan medium, dengan permukaan halus, licin atau berlipat-lipat, berwarna putih kekuningan dan berbau ragi. Besar koloni bergantung pada umur. Pada tepi koloni dapat dilihat hifa semu sebagai benang-benang halus yang masuk ke dalam medium. Pada medium cair jamur biasanya tumbuh pada dasar tabung.

Bentuk selnya bermacam-macam. Menghasilkan banyak pseudomiselium. Dapat terbentuk miselium sejati dan klamidospora. Blastospora dapat dijumpai pada posisi yang khas menurut masing-masing spesies. Perkembangbiakan vegetatif ialah melalui penguncupan multilateral. Dismilasi mungkin oksidatif, tetapi pada banyak spesies juga sangat fermentatif. Didalam medium cair dapat terbentuk endapan, sering kali berbentuk cincin, dan partikel (Pelczar & Chan, 2008).

### **C. Uraian Umum Antimikroba**

#### **1. Definisi antimikroba**

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia, termasuk golongan ini yang akan dibicarakan yang berhubungan dengan bidang farmasi antara lain antibiotika, antiseptika, desinfektansia, preservatif (Sartini, 2008).

Antimikroba adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia. Disini, mikroba yang dimaksud terbatas pada jasad renik yang tidak termasuk kelompok parasit (Ganiswarna, 1995).

#### **2. Sifat antimikroba**

##### **a. Bakteriostatik**

Yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroba (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi multiplikasi atau berkembang biak.

##### **b. Bakterisida**

Yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak (Sartini & H, 2008).

#### **3. Pembagian antimikroba**

Antimikroba berdasarkan spektrum atau kisaran kerja antimikroba dapat dibedakan menjadi:

- a. Spektrum sempit yaitu antimikroba yang hanya mampu menghambat satu golongan bakteri saja, contohnya hanya mampu membunuh atau menghambat bakteri dari Gram negatif saja atau Gram positif saja.

- b. Spektrum luas yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh bakteri baik gram negatif, maupun gram positif (Pratiwi, 2008).

#### **4. Prinsip Kerja Antimikroba**

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksis terhadap mikroorganisme dibandingkan pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi-reaksi biokimia penting dalam sel parasit lebih unggul daripada pengaruhnya terhadap sel hospes.

Disamping itu juga struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (hospes, inang) (Sartini D. M., 2008).

#### **5. Mekanisme Antimikroba**

Antimikroba mempunyai mekanisme kerja utama ada lima antara lain sebagai berikut:

- a. Pengaktifan enzim tertentu

Pengaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptika dan desinfektansia, seperti turunan aldehida, amida, karbanilida, etilen oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa amonium kuartener.

- b. Denaturasi protein

Turunan alkohol, halogen dan halogenator, senyawa merkuri, peroksida, turunan fenol dan senyawa amonium kuartener bekerja sebagai antiseptika dan desinfektan dengan cara denaturasi dan konjugasi protein sel bakteri.

- c. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turunan fenol dan senyawa amonium kuartener. Dengan mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri, senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel yang esensial, sehingga bakteri mengalami kematian.

d. Penghambatan fungsi permeabilitas membran sel

Disini antimikroba bekerja secara langsung pada membran sel yang mempengaruhi permeabilitas dan menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler mikroorganisme (bakteri). Dalam ini antimikroba dapat : (1) berinteraksi dengan sterol membran sitoplasma pada sel jamur, (2) merusak membran sel bakteri gram negatif.

e. Penghambatan terhadap sintesa dinding sel

Antimikroba golongan ini dapat menghambat aktivitas enzim yang dapat merusak dinding sel mikroorganisme (Sartini D. M., 2008).

## 6. Uji Efektivitas Anti Mikroba

Pengukuran aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode dilusi (pengenceran) atau dengan metode difusi (Jawertz & Melnick, 1996).

a. Metode dilusi

Zat antibakteri dengan konsentrasi yang berbeda-beda dimasukkan pada media cair. Media tersebut langsung diinokulasi dengan bakteri dan diinkubasi. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan konsentrasi terkecil suatu zat antibakteri dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri uji. Metode dilusi agar membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya sehingga jarang digunakan.

b. Metode difusi

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar dengan menggunakan cakram kertas, cakram kaca, pencetak lubang. Prinsip metode ini adalah mengukur zona hambatan pertumbuhan bakteri yang terjadi akibat difusi zat yang bersifat sebagai antibakteri didalam media padat melalui pencadang. Daerah hambatan pertumbuhan bakteri adalah daerah jernih disekitar cakram.

Luas daerah berbanding lurus dengan aktivitas antibakteri, semakin kuat daya aktivitas antibakteri maka semakin luas daerah hambatnya.

#### **D. Metode Sterilisasi**

##### **1. Pengertian**

Sterilisasi dalam mikrobiologi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme (protozoa, fungi, bakteri, *mycoplasma*, virus) yang terdapat di dalam suatu benda. Proses ini melibatkan aplikasi *biocidal agent* atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme (Pratiwi, Mikrobiologi Farmasi, 2008).

##### **2. Cara-cara Sterilisasi**

Pada prinsipnya sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara mekanik, fisik dan kimiawi.

- a. Sterilisasi secara mekanik (filtrasi) menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil (0,22 mikron atau 0,45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang tahan panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik.
- b. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran:
  - 1) Pemanasan
    - a) Pemijaran (dengan api langsung): membakar alat pada api secara langsung, contoh alat: jarum inokulum, pinset.
    - b) Panas kering: pada proses ini terjadi dehidrasi sel mikroorganisme, sterilisasi dengan oven kira-kira 160-180°C selama 1,5-2 jam dengan sistem udara yang statis. Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca misalnya Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan petri.
    - c) Uap air panas: konsep ini mirip dengan mengukus. Air mendidih atau uap air pada suhu 100°C dapat membunuh bentuk vegetatif dari mikroorganisme dan

virus dalam waktu 5 menit. Masih banyak spora bakteri yang tahan terhadap pemanasan ini dan masih tetap hidup setelah dilakukan perebusan selama beberapa jam.

- d) Uap air panas bertekanan: menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Ini dilakukan untuk membunuh spora bakteri yang paling tahan panas. Cara ini dilakukan untuk mensterikan alat-alat yang tidak tahan pemanasan seperti spuit

2) Penyinaran dengan UV

Sinar Ultra Violet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior Safety cabinet dengan disinari lampu UV. Radiasi UV menyebabkan kesalahan dalam replikasi DNA dan mempunyai aktivitas mutagenik pada sel-sel yang masih hidup. Sinar Ultra Violet (UV) yang dipancarkan dari lampu uap merkuri sering digunakan untuk menyinari ruangan-ruangan tertentu, sehingga dapat mengurangi kontaminasi mikroorganisme di udara dalam ruang bedah dirumah sakit dan ruang pengolahan di pabrik-pabrik obat.

c. Sterilisasi secara kimiawi

Biasanya menggunakan senyawa antiseptik dan desinfektan contohnya antara lain alkohol dan formalin (Anonim, 2008).

**E. Ekstraksi Simplisia**

**1. Pengertian**

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani yang menggunakan simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih

belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni (Dirjen POM, 1997).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi bau yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995).

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif, yang semula berada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik jika permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin luas (Mulyanti E. S., 2009).

## **2. Tujuan Ekstraksi**

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Mulyanti E. S., 2009).

## **3. Metode Pemisahan Secara Kromatografi Lapis Tipis**

Kromatografi merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk memisahkan dan memurnikan komponen-komponen dari campuran lainnya. Pemisahan komponen-komponen itu terjadi atas dasar distribusi 2 fase yaitu fase diam yang sering disebut adsorben dan fase gerak atau cairan pengelusi. Kromatografi yang biasa digunakan adalah kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, kromatografi kolom dan kromatografi gas (Satroamidjojo, 1985: 30).

### 1. Fase Diam

Fase diam adalah suatu lapisan yang dibuat dari bahan-bahan berbutir-butir halus yang ditempatkan pada lempengan. Sifat-sifat umum dari penyerap KLT adalah ukuran partikel dan homogenitasnya. Ukuran partikel yang biasa digunakan adalah 1-25 mikron. Adapun macam-macam fase diam adalah silica gel, alumina, selulosa, resin, kieselguhr, magnesium silikat.

### 2. Fase Gerak

Fase gerak adalah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Fase ini bergerak didalam fase diam karena adanya gaya kapiler. Macam-macam fase gerak antara lain heksana, toluen, eter, kloroform, aseton, etil asetat, asetonitril, etanol, methanol dan air.

Pemisahan secara kromatografi dilakukan dengan memperhatikan secara langsung beberapa sifat fisika dari zat yang terlibat adalah:

- b. Kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan
- c. Kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus
- d. Kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah ke keadaan uap

Manfaat dilakukan kromatografi pada hakekatnya adalah dengan tujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa apa saja yang ada (kualitatif), berapa kadarnya (kuantitatif) dan bagaimana memperoleh yang murni (Gritter & Schwerting, 1991).

Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah salah satu cara untuk memisahkan suatu komponen berdasarkan adsorpsi dan partisi. Adsorben yang digunakan berupa bubuk halus dari silika gel yang dibuat serba rata diatas lempeng kaca. Ukuran partikel adsorben halus, agar lapisan adsorben pada lempeng kaca berbentuk rata dan homogen, sehingga rembesan dari cairan pengelusi cepat dan rata dan homogen, sehingga rempesan dari cairan pengelusi cepat dan rat, dengan

demikian komponen dapat terpisah baik. Perbandingan kecepatan Bergeraknya komponen terlarut dalam fase gerak adalah dasar untuk mengidentifikasi komponen yang dipisahkan, perbandingan kecepatan ini dinyatakan dalam  $R_f$  (*Retardation of Factor*).

$$R_f = \frac{\text{jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik awal sampai noda yang terbentuk}}{\text{jarak yang ditempuh oleh eluen dari titik asal sampai batas asal}}$$

Nilai  $R_f$  nilai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Ukuran partikel dari adsorben
- b. Derajat keaktifan dari lapisan adsorben
- c. Kemurnian pelarut
- d. Konsentrasi pelarut
- e. Kejenuhan ruang elusi
- f. Temperatur
- g. Keterampilan bekerja

Kromatografi lapis tipis (KLT) memiliki beberapa kelebihan yaitu pemisahan senyawa yang amat berbeda seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintetik, kompleks anorganik-organik dan bahkan ion anorganik, dapat dilakukan dalam beberapa menit dengan alat yang harganya tidak terlalu mahal. Selain itu pelarut dan cuplikan yang digunakan jumlahnya sedikit (Gritter & Schwerting, 1991).

#### **F. KLT-Bioautografi**

Bioautografi berasal dari kata bio= makhluk hidup, autografi = melakukan aktivitas sendiri. Menurut Betina (1972), bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisasi aktivitas antimikroba tersebut pada suatu

kromatogram. Metode ini memanfaatkan pengertian kromatografi lapis tipis (KLT). Pada bioautografi ini didasarkan atas efek biologi berupa antibakteri, antiprotozoa, antitumor dan lain-lain dari substansi yang diteliti. Ciri khas dari prosedur bioatografi adalah didasarkan atas teknik difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di sekeliling dari spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambatan ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang diperiksa terhadap penumbuhan mikroorganisme uji. Bioautografi dapat dipertimbangkan karena paling efisien untuk mendeteksi komponen antimikroba, sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun dalam senyawa aktif tersebut terdapat dalam bentuk senyawa kompleks dan dapat pula diisolasi langsung dari komponen yang aktif. KLT Bioautografi dapat di bagi 3 kelompok yaitu:

1. Bioautografi langsung, yaitu dimana mikroorganismenya tumbuh secara langsung di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT).
2. Bioautografi kontak, dimana senyawa antimikroba dipindahkan dari lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka secara merata dan melakukan kontak langsung.
3. Bioautografi pencelupan, di mana medium agar telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri dituang di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT) (Sartini & H, 2008).

### ***G. Tinjauan Islam***

Di atas Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim di era kejayaan islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obatan sederhana dan

campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat Muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli dibidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Allah swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan (Shihab, 2009).

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia, demikian sabda Nabi saw. Kesehatan merupakan hak bagi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia makan islam menegakkan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama islam. Salah satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (Ar-Rumaikhon & Sulaiman, 2008).

Metode penyembuhan Rasul mengatakan sebuah prinsip dasar dalam pengobatan untuk setiap penyakit adalah perawatan. Hal ini mendorong kita untuk mencari cara pengobatan. Dengan demikian, tradisi pengobatan ala Nabi tidak hanya berhenti pada pengajaran pengobatan oleh Rasulullah, melainkan mendorong manusia agar terus mencari dan bereksperimen dengan ilmu pengobatan baru.

Tumbuhan obat menjadi salah satu alternatif obat yang dipilih oleh masyarakat luas. Hal ini karena tumbuhan obat tidak mempunyai efek samping yang besar bila dibandingkan dengan obat modern yang terbuat dari bahan kimia sintesis. Selain itu, tumbuhan obat pun semakin populer dengan makin meluasnya informasi dan penanganan medis secara tradisional yang ditayangkan di televisi sehingga membuat masyarakat luas makin tertarik untuk mencoba dan memanfaatkan tumbuhan obat (Raina, 2011).

Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, kulit, bunga, buah dan bijinya, tercantum dalam Q.S. Asy-Syu' araa Ayat 7:

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu' araa Ayat 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya:

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”* (Kementerian Agama, 2014).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Sebagian orang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan umat manusia. Hal ini disebabkan didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohaniyah dan tidak memperhatikan aspek-aspek jasmaniyah. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrawi, dan lalai terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama islam. Sebab pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan dunia dan ukhrawi. Jadi dalam hal ini islam sebenarnya sangat memperhatikan yang namanya kesehatan. Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nahl Ayat 10:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝١٠

Terjemahnya:

*Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu* (An-Nahl: 10).

Dari ayat diatas jelaslah bahwa Allah swt telah menyiapkan tanaman dan beraneka ciptaan-Nya untuk manusia dan mengembangkan bagi orang-orang yang berilmu hingga dapat diambil manfaatnya, seperti dalam ilmu pengobatan yang

berasal dari alam, baik itu berasal dari tumbuhan maupun yang berasal dari hewan.



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan adalah lebih mendekati kearah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Ekperimental merupakan metode penelitian yang ingin mengetahui hubungan sebab-akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya.

### ***C. Populasi dan Sampel***

#### **1. Populasi Penelitian**

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tumbuhan cempedak yang berada di Masamba, Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **2. Sampel Penelitian**

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel dari bahan tumbuhan yaitu daun cempedak (*Artocarpus champedenL.*) yang telah dikeringkan dan diserbukkan.

### ***D. Metode Pengumpulan data***

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan

suatu teknik cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti dari gejala yang ada (Syaodih Sukmadinata, 2005).

## **E. Instrumen Penelitian**

### **1. Alat yang digunakan**

Alat yang digunakan adalah alat maserasi, autoklaf, cawan petri, cawan porselin, chamber, gelas Erlenmeyer 100 ml, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 5 ml, 10 ml dan 50 ml, inkubator, kompor, lampu spiritus, lampu UV 254 nm dan 366 nm, Laminary Air Flow (LAF), lemari pendingin, mikropipet 1-10  $\mu$ l ose bulat, ose lurus, oven, penangas air, *rotary evaporator*, spoit, tabung reaksi, timbangan analitik, water bath, vial, vortex mixer (K) dan wadah maserasi.

### **2. Bahan yang digunakan**

Bahan yang digunakan adalah agar, air suling, biakan murni mikroba *Escherchia coli*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Vibrio colera*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida albicans*, DMSO (Dimetil Sulfoksida), HCL 0,1%,  $H_2SO_4$  10%, lempeng silica gel 60 GF<sub>254</sub>, medium Nutrient Agar (NA), medium Potato Dekstrosa Agar (PDA), sampel ekstrak daun cempedak (*Artocarpus champeden* L.), pelarut n-heksan, pelarut etil asetat, pelarut etanol 96%, Reagen  $AlCl_3$  5%, Reagen  $FeCl_3$  5%, Reagen Dragendorf dan Reagen Liebermann-Burchard.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengambilan sampel**

Bahan diperoleh dari Masamba, Provinsi Sulawesi Selatan. Berupa daun cempedak (*Artocarpus champeden* L.).

## 2. Pengolahan sampel

Sebelum dilakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) di sortasi basah. Setelah proses pencucian, kemudian daun di angin-anginkan di dalam ruangan yang terlindung oleh cahaya matahari langsung karena dapat merusak kandungan kimia yang terkandung dalam daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*)

## 3. Ekstraksi sampel

Sampel diekstraksi dengan pelarut n-heksan etil asetat, etil asetat dan etanol 96%. Sampel daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) yang telah kering ditimbang dan dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan pelarut n-heksan hingga terendam seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dan disimpan  $\pm$  24 jam ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan n-heksan yang baru. Filtrat n-heksan yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya dengan *rotary evaporator* sampai diperoleh ekstrak n-heksan kental. Dengan cara yang sama, ampas yang telah diperoleh dari proses ekstraksi pertama dimaserasi kembali dengan etil asetat dengan cara yang sama seperti n-heksan hingga diperoleh ekstrak etil asetat kental. Kemudian dengan cara yang sama, ampas yang telah diperoleh dari proses ekstraksi kedua dimaserasi kembali dengan etanol 96% dengan cara yang sama seperti n-heksan dan etil asetat hingga diperoleh ekstrak etanol 96% kental.

## 4. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan merendam menggunakan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka, setelah kering

dibungkus dengan aluminium foil. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm.

### **5. Penyiapan Mikroba Uji**

Bakteri uji digunakan dalam penelitian ini meliputi *Escherchia coli*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeroginosa*, *Vibrio colera*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida albicans*. Mikroba yang berasal dari kultur koleksi Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C untuk bakteri dan dalam medium Potato Dekstrosa Agar (PDA) miring dan diinkubasi selama 3 x 24 jam pada suhu kamar untuk jamur.

### **6. Pembuatan Suspensi Kultur Mikroba Uji**

Mikroba uji yang telah diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA) miring dan medium Potato Dekstrosa Agar (PDA) miring disuspensikan dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) kemudian diukur serapannya 25% T untuk bakteri dan 75% T untuk jamur pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 580 nm untuk bakteri dan jamur.

### **7. Skrining Aktivitas Antibakteri**

#### **a. Pembuatan Larutan Stok**

Sebanyak 20 mg ekstrak n-heksan dan ekstrak etanol 96% masing-masing dilarutkan dalam 0,2 ml DMSO, kemudian dicampurkan dengan 9,8 ml air steril hingga volume akhir 10 ml (2000 ppm) kemudian dibuat dalam konsentrasi 1000, 750, 500, 250 ppm.

b. Uji Skrining Aktifitas Antibakteri

Sebanyak 20 µl mikroba uji ditambahkan 10 ml medium NA untuk bakteri dan medium PDA untuk jamur. Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan kedalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Sampel diteteskan diatas paper disk dengan konsentrasi 1000 ppm, 750 ppm, 500 ppm dan 250 ppm. kemudian diletakkan diatas medium yang telah diinokulasi bakteri kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam untuk bakteri dan pada suhu kamar selama 3 x 24 jam untuk jamur.

### **8. Fraksinasi Ekstrak Aktif Dengan Kromatografi Cair Vakum**

Ekstrak etil asetat daun cempedak (*Artocarpus champeden* L) yang memiliki aktivitas antimikroba yang paling besar ditimbang sebanyak 5 gram dan ditambahkan silika gel 60 gram. Dilarutkan ekstrak etil asetat dengan pelarut yang sesuai, kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit hingga terbentuk bubur silika. Dimasukkan silika gel kedalam senter glass dengan cara vakum lalu diratakan dan dimampatkan kemudian dimasukkan bubur silika diatasnya. kemudian di elusi dengan eluen yang pertama kali digunakan yaitu n-Heksan. Profil KLT yang digunakan yaitu n-heksan : etil asetat (3 : 1). Fraksi yang memiliki kromatogram dan warna yang sama digabungkan kemudian diuji aktivitas antibakteri metode KLT-Bioautografi.

### **9. Penyiapan Kromatogram Ekstrak**

Lempeng KLT yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifkan dengan pemanasan dalam oven pada suhu 105°C selama 5-10 menit. Ditotolkan ekstrak teetil asetat pada lempeng KLT menggunakan pipa kapiler. Kemudian dielusi dengan cairan pengelusi yang sesuai di dalam chamber. Lempeng dikeluarkan dari chamber dan diangin-anginkan hingga cairan pengelusnya menguap. Kemudian

kromatogram yang dihasilkan diamati nodanya dibawah sinar UV 254 nm dan 366 nm serta penampak bercak H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%.

#### **10. Uji Akifitas Fraksi Teraktif Dan Pengujian Antimikroba Secara KLT-Bioautografi**

##### a. Uji Akifitas Fraksi Teraktif

Pengujian Fraksi D dengan cara menggunakan sebanyak 20 µl mikroba uji ditambahkan 10 ml medium NA untuk bakteri. Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan kedalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Penanaman bakteri dilakukan menggunakan paper disk dengan konsentrasi 1000 ppm, 750 ppm, 500 ppm dan 250 ppm kedalam medium yang sudah dibuat. Kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam untuk bakteri dan pada suhu kamar selama 3 x 24 jam untuk jamur. Zona yang terbentuk diukur diameternya.

##### b. Pengujian Antimikroba Secara KLT-Bioautografi

Sebanyak 20 µl mikroba uji ditambahkan 10 ml medium NA untuk bakteri. Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan kedalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Kromatogram hasil pemisahan senyawa secara KLT kemudian diletakkan di atas permukaan medium yang memadat. Setelah 30 menit lempeng (kromatogram) diangkat dan dikeluarkan dari medium. Selanjutnya diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C untuk bakteri dan 3 x 24 jam pada suhu kamar untuk jamur.

## 11. Identifikasi Bercak Aktif dengan Beberapa Penampakan Bercak

Kromatogram disemprot dengan menggunakan pereaksi semprot sebagai berikut:

### a. Alkaloid

Pereaksi yang digunakan Dragendorff. Dengan pereaksi Dragendorff akan dihasilkan warna jingga dengan latar belakang kuning untuk senyawa golongan alkaloid.

### b. Steroid

Pereaksi yang digunakan Liebermann-Burchard. Kromatogram terlebih dahulu dipanaskan, kemudian diamati di lampu UV 366 nm, munculnya noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan adanya triterpen, sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.

### c. Flavonoid

Pereaksi yang digunakan  $\text{AlCl}_3$  (Aluminium Klorida) 5% diamati di lampu UV 366 nm, akan dihasilkan noda berfluoresensi hijau untuk senyawa golongan flavanoid.

### d. Fenol

Pereaksi yang digunakan  $\text{FeCl}_3$  (Besi III Klorida) 5%, jika sampel mengandung senyawa fenol maka akan dihasilkan warna biru atau hijau atau hitam.

### e. Penampak bercak $\text{H}_2\text{SO}_4$ 10%

Kromatogram disemprotkan pereaksi  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10% dipanaskan pada  $105^\circ\text{C}$  hingga nampak perubahan warna dan diamati. Kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, hitam (Sriyanti, 2014).

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Hasil Ekstraksi Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*)

Penelitian yang dilakukan menggunakan 1 kg simplisia daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) yang dimaserasi dengan menggunakan metode maserasi bertingkat hingga diperoleh ekstrak kering. Hasil ekstraksi yang diperoleh dengan pelarut n-Heksan, etil asetat dan etanol 96%. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Hasil Ekstraksi Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*)

No.	Sampel	Berat Sampel	Pelarut	Berat Ekstrak	% Rendamen
1.	Daun Cempedak	1 kg	N-Heksan	10,01 gram	1,001 %
			Etil Asetat	36,02 gram	3,602 %
			Etanol 96%	127,01 gram	12,701 %
Total			-	173,04 gram	17,304 %

#### 2. Hasil Pengujian skrining antibakteri

Pengujian skrining aktivitas antibakteri daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) yang digunakan yaitu ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol 96% terhadap bakteri uji *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio colera* dan jamur *Candida albicans*. Hasil skrining dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Hasil Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) Terhadap Beberapa Bakteri Uji.

Ekstrak	Bakteri	Konsentrasi	Diameter 1 (cm)	Diameter 2 (cm)	Diameter 3 (cm)	Rata-Rata
N-Heksan	SE	1000 ppm	0,7	0,72	0,81	0,74
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	BS	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	EC	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	PA	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	ST	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	VB	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
CA	1000 ppm	-	-	-	-	
	750 ppm	-	-	-	-	
	500 ppm	-	-	-	-	

		250 ppm	-	-	-	-
Etil Asetat	SE	1000 ppm	0,81	0,82	0,8	0,81
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SA	1000 ppm	0,8	0,85	0,83	0,82
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	ST	1000 ppm	0,83	0,8	0,81	0,81
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	1000 ppm	0,81	0,82	0,8	0,81
		750 ppm	0,78	0,75	0,8	0,77
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	BS	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	EC	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
	PA	1000 ppm	-	-	-	-
		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-
		250 ppm	-	-	-	-
VB	1000 ppm	-	-	-	-	
	750 ppm	-	-	-	-	
	500 ppm	-	-	-	-	
	250 ppm	-	-	-	-	
CA	1000 ppm	-	-	-	-	
	750 ppm	-	-	-	-	
	500 ppm	-	-	-	-	
	250 ppm	-	-	-	-	
ST	1000 ppm	0,8	0,78	0,78	0,78	
	750 ppm	-	-	-	-	

Etanol 96%		500 ppm	-	-	-	-	
		250 ppm	-	-	-	-	
	SM		1000 ppm	0,78	0,8	0,79	0,79
			750 ppm	-	-	-	-
			500 ppm	-	-	-	-
			250 ppm	-	-	-	-
			1000 ppm	-	-	-	-
	SE		750 ppm	-	-	-	-
			500 ppm	-	-	-	-
			250 ppm	-	-	-	-
			1000 ppm	-	-	-	-
	SA		750 ppm	-	-	-	-
			500 ppm	-	-	-	-
			250 ppm	-	-	-	-
			1000 ppm	-	-	-	-
	BS		750 ppm	-	-	-	-
			500 ppm	-	-	-	-
			250 ppm	-	-	-	-
			1000 ppm	-	-	-	-
	EC		750 ppm	-	-	-	-
			500 ppm	-	-	-	-
			250 ppm	-	-	-	-
			1000 ppm	-	-	-	-
	PA		750 ppm	-	-	-	-
			500 ppm	-	-	-	-
			250 ppm	-	-	-	-
			1000 ppm	-	-	-	-
	VB		750 ppm	-	-	-	-
		500 ppm	-	-	-	-	
		250 ppm	-	-	-	-	
		1000 ppm	-	-	-	-	
CA		750 ppm	-	-	-	-	
		500 ppm	-	-	-	-	
		250 ppm	-	-	-	-	
		1000 ppm	-	-	-	-	

Keterangan :

BS: *Bacillus subtilis*

SM: *Streptococcus mutans*

EC: *Escherichia coli*

ST: *Salmonella thyposa*

PA: *Pseudomonas aeruginosa*

VB: *Vibrio sp*

SA: *Staphylococcus aureus*

CA: *Candida albicans*

SE: *Staphylococcus epidermidis*

### 3. Hasil Fraksi Ekstrak Etil Asetat Melalui Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Pemisahan senyawa ekstrak etil asetat dengan menggunakan metode Kromatografi Cair Vakum (KCV) menggunakan campuran eluen n-heksan : etil asetat (3 : 1) dan diperoleh 14 fraksi dengan bobot berbeda-beda, kemudian dielusi dengan campuran eluen Heksan : Etil sehingga diperoleh 5 gabungan fraksi yang sama melalui penampakan bercak lampu UV 254 nm dan 366 nm. Dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3: Nilai Rf bercak Profil KLT Fraksi Etil Asetat Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*)

Fraksi Gabungan	Fraksi	Eluen	Bercak	Penampakan Bercak				Bobot
				UV 254 nm		UV 366 nm		
				Rf	Warna	Rf	Warna	
A	1	H:E 9 : 1	5	0,5	Hijau	0,5	Berflorosensi Hitam	1,28 g
				0,56	Kuning	0,58	Berflorosensi Hitam	
				0,64	Coklat	0,64	Berflorosensi Merah	
				0,86	Hitam	0,92	Berflorosensi Hitam	
				0,96	Hitam	0,94	Berflorosensi Biru	
B	2	H:E 6:1	4	0,46	Hitam	0,46	Berflorosensi Ungu	0,27 g
				0,54	Hitam	0,56	Berflorosensi Hitam	
				0,64	Coklat	0,64	Berflorosensi Merah	
				0,8	Hitam	0,94	Berflorosensi	

							Biru		
	3	H:E 3 : 1	4	0,52	Hitam	0,46	Berflorosensi ungu	0,16 g	
				0,58	Hitam	0,56	Berflorosensi Hitam		
				0,64	Coklat	0,64	Berflorosensi Merah		
				0,84	Hitam	0,94	Berflorosensi Biru		
C	4	H:E 1:1	5	0,26	Hitam	0,46	Berflorosensi <u>Ungu</u>	0,24 g	
				0,4	Coklat	0,4	Berflorosensi Coklat		
				0,56	Hitam	0,5	Berflorosensi Hitam		
				0,62	Coklat	0,64	Berflorosensi Merah		
				0,84	Hitam	0,94	Berflorosensi Biru		
	5	H:E 1:3	5	0,28	Hitam	0,48	Berflorosensi Coklat		0,42 g
				0,42	Coklat	0,4	Berflorosensi Coklat		
				0,6	Hitam	0,5	Berflorosensi Hitam		
0,62				Coklat	0,64	Berflorosensi Merah			
			0,84	Hitam	0,94	Berflorosensi Biru			
D	6	H:E 1 : 6	3	0,6	Coklat	0,62	Berflorosensi Merah	0,33 g	
				0,64	Coklat	0,64	Berflorosensi Coklat		
				0,84	Coklat	0,94	Berflorosensi Merah		

	7	H:E 1 : 9	3	0,6 0,64 0,84	Coklat Coklat Coklat	0,62 0,64 0,94	Berflorosensi Merah Berflorosensi Coklat Berflorosensi Merah	0,22 g
	8	H:E 1 : 12	3	0,6 0,64 0,84	Coklat Coklat Coklat	0,62 0,64 0,94	Berflorosensi Merah Berflorosensi Coklat Berflorosensi Merah	0,18 g
	9	E:M 9 : 1	2	0,65 0,84	Coklat muda Coklat Muda	0,68 0,86	Berflorosensi Merah Berflorosensi Coklat	0,37 g
E	10	E:M 6 : 1	1	0,82	Coklat muda	0,82	Berflorosensi Merah	0,55 g
	11	E:M 3 : 1	1	0,82	Coklat muda	0,82	Berflorosensi Merah	0,69 g
	12	E:M 1 : 1	1	0,82	Coklat muda	0,82	Berflorosensi Merah	0,59 g
	13	E:M 1 : 3	1	0,82	coklat muda	0,82	Berflorosensi Merah	0,33 g
	14	Metanol	1	0,82	coklat muda	0,82	Berflorosensi Biru	0,13 g

Keterangan:

Fase Gerak : n-Heksan : Etil (3:1)

H : Heksan

Fase Diam : Silika Gel F<sub>254</sub>

E : Etil Asetat

Ukuran Lempeng : 15 cm × 7 cm

M : Metanol

Penampakan Bercak : Lampu UV 254 nm

Lampu UV 366 nm

#### 4. Hasil Pengujian Skrining Aktivitas Hasil Fraksinasi

Pengujian skrining aktivitas antibakteri hasil fraksinasi dengan mengamati zona bening. Kelima hasil fraksinasi dilakukan pengujian terhadap keempat bakteri yaitu *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*. Diperoleh hasil bahwa dari kelima jenis fraksi tersebut, fraksi D yang memberikan aktifitas antibakteri yang paling baik terhadap keempat bakteri tersebut dibandingkan dengan fraksi lain. Hasil skrining dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4: Hasil Skrining Hasil Fraksinasi Etil Asetat Daun (*Artocarpus champeden L.*)

Fraksi	Bakteri	Konsentrasi	Diameter 1 (cm)	Diameter 2 (cm)	Diameter 3 (cm)	Rata-Rata
A	SM	1000 ppm	0,8	0,72	0,88	0,8
		750 ppm	0,72	0,73	0,73	0,72
		500 ppm	0,71	0,72	0,71	0,71
		250 ppm	0,66	0,67	0,7	0,67
B	SE	1000 ppm	0,72	0,74	0,71	0,72
		750 ppm	0,7	0,71	0,72	0,71
		500 ppm	0,7	0,69	0,71	0,7
		250 ppm	0,7	0,67	0,69	0,68
	SA	1000 ppm	0,77	0,72	0,7	0,73
		750 ppm	0,68	0,7	0,72	0,7
		500 ppm	0,7	0,7	0,69	0,69
		250 ppm	-	-	-	-
	ST	1000 ppm	0,73	0,71	0,7	0,71
		750 ppm	0,71	0,69	0,7	0,7
		500 ppm	0,67	0,69	0,69	0,68
		250 ppm	-	-	-	-
	SM	1000 ppm	0,74	0,69	0,8	0,74
		750 ppm	0,72	0,71	0,73	0,72
		500 ppm	0,71	0,73	0,68	0,7
		250 ppm	0,71	0,67	0,7	0,69
C	SA	1000 ppm	0,72	0,7	0,74	0,72
		750 ppm	0,7	0,69	0,72	0,70

		500 ppm	0,69	0,69	0,71	0,69	
		250 ppm	0,7	0,68	0,68	0,68	
	SE	1000 ppm	0,79	0,72	0,74	0,75	
		750 ppm	0,73	0,72	0,74	0,73	
		500 ppm	0,73	0,69	0,73	0,71	
		250 ppm	0,68	0,72	0,67	0,69	
	SM	1000 ppm	0,72	0,8	0,73	0,75	
		750 ppm	0,72	0,71	0,72	0,71	
		500 ppm	0,69	0,71	0,71	0,70	
		250 ppm	0,69	0,7	0,7	0,69	
	D	SA	1000 ppm	0,8	0,73	0,74	0,75
			750 ppm	0,75	0,73	0,71	0,73
500 ppm			0,69	0,73	0,75	0,72	
250 ppm			0,72	0,7	0,68	0,7	
ST		1000 ppm	0,73	0,74	0,76	0,74	
		750 ppm	0,71	0,74	0,73	0,72	
		500 ppm	0,71	0,70	0,73	0,71	
		250 ppm	0,70	0,70	0,71	0,70	
SM		1000 ppm	1,23	1,3	1,2	1,24	
		750 ppm	1,1	1	1,12	1,10	
		500 ppm	0,8	0,82	0,75	0,79	
		250 ppm	0,78	0,76	0,75	0,76	
SE		1000 ppm	0,84	0,72	0,74	0,76	
		750 ppm	0,79	0,71	0,77	0,75	
		500 ppm	0,70	0,75	0,78	0,74	
		250 ppm	0,70	0,72	0,72	0,71	
E	ST	1000 ppm	0,71	0,74	0,73	0,72	
		750 ppm	-	-	-	-	
		500 ppm	-	-	-	-	
		250 ppm	-	-	-	-	
	SA	1000 ppm	0,72	0,68	0,7	0,7	
		750 ppm	-	-	-	-	
		500 ppm	-	-	-	-	
		250 ppm	-	-	-	-	
	SE	1000 ppm	0,79	0,74	0,75	0,76	
		750 ppm	-	-	-	-	
		500 ppm	-	-	-	-	
		250 ppm	-	-	-	-	

Keterangan :

BS: *Bacillus subtilis*

SM: *Streptococcus mutans*

EC: *Escherichia coli*

ST: *Salmonella thyposa*

PA: *Pseudomonas aeruginosa*

VB: *Vibrio sp*

SA: *Staphylococcus aureus*

CA: *Candida albicans*

SE: *Staphylococcus epidermidis*

### 5. Hasil Uji KLT-Bioautografi dan Identifikasi Komponen Senyawa

Lempeng kromatogram fraksi D yang telah dielusi kemudian diuji dengan KLT-Bioautografi kontak pada 4 bakteri uji (*Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*). Hasil pengujian menunjukkan dimana fraksi D mampu menghambat pertumbuhan bakteri uji yang ditandai dengan adanya zona hambat bening pada area sekitar noda pada lempeng yang diinokulasi pada medium. Kemudian Fraksi D diidentifikasi komponen senyawanya menggunakan pereaksi warna semprot Lieberman Buchardat, Dragendorf, Besi (III) Klorida, Aluminium Klorida, KOH Etanolik dan penampak bercak H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%. Hasil uji KLT-Bioautografi dan Identifikasi Komponen Senyawa dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5: Hasil Uji KLT-Bioautografi Fraksi D Terhadap Bakteri Uji dan Identifikasi Komponen Senyawa

Fraksi	Rf	Bakteri Uji	Senyawa
D	0,27 0,86	<i>Salmonella thyposa</i>	Fenol
	0,27	<i>Staphylococcus aureus</i>	Flavonoid
	0,36	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Fenol
	0,27 0,54	<i>Streptococcus mutans</i>	Flavonoid

## **B. Pembahasan**

Daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) ialah merupakan salah satu jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah Sulawesi Selatan khususnya di daerah Kabupaten Masamba. Daun cempedak sering dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat sebagai bedak dingin dan penghilang flek hitam pada wajah. Ekstrak kasar dan fraksi etil asetat daun cempedak memiliki aktivitas antioksidan dan mengandung metabolit sekunder berupa flavanoid.

Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun cempedak mengandung senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang bersifat sebagai antibakteri. Hal ini mendasari penelitian mengenai pengujian daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) terhadap bakteri uji.

Pengambilan sampel daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) dilakukan pada pagi hari dikarenakan pada saat itu terjadi proses fotosintesis yang maksimum, yaitu proses pembentukan metabolit sekunder tanaman secara maksimal. Sebelum dilakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu daun cempedak yang dipetik disortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran dari simplisia. Setelah proses sortasi basah, kemudian daun dicuci dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin karena kemungkinan terdapat beberapa zat yang terkandung dalam simplisia dapat larut dalam air mengalir.

Setelah proses pencucian, kemudian daun dikeringkan dengan cara diangin-anginkan didalam ruangan yang terlindung oleh sinar matahari langsung hingga kadar air yang terkandung dalam sampel berkurang agar proses enzimatis

dapat dihentikan karena dapat merusak zat aktif. Selain itu, dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Daun yang telah kering kemudian dibuat serbuk untuk memperluas permukaan, sehingga pada proses ekstraksi, kontak antara pelarut dengan sampel lebih efektif dan senyawa dapat terekstraksi dengan optimal.

Sampel yang telah diserbukkan kemudian diekstraksi. Ekstraksi simplisia daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) dilakukan dengan metode maserasi, metode ini sesuai dengan sampel yang bertekstur lunak dan tidak memerlukan pemanasan yang dapat merusak senyawa kimia yang terdapat dalam sampel. Dalam hal ini maserasi menggunakan metode maserasi bertingkat menggunakan tiga pelarut berdasarkan tingkat kepolaran, menggunakan cairan penyari n-heksan, etil asetat dan etanol 96%. Ekstraksi yang pertama dilakukan menggunakan pelarut n-heksan dimana pelarut ini mempunyai tingkat kepolaran rendah, jadi senyawa non polar diharapkan larut dalam pelarut ini. Ekstraksi dilanjutkan dengan pelarut etil asetat pada sampel yang sama, pelarut etil asetat memiliki tingkat kepolaran yang lebih polar dari n-heksan. Ekstraksi selanjutnya dilanjutkan dengan pelarut etanol 96% pada sampel yang sama, pelarut etanol 96% memiliki tingkat kepolaran yang lebih polar dari etil asetat.

Pada proses maserasi digunakan wadah kaca untuk mencegah reaksi kimia dan disimpan ditempat yang gelap agar tidak teroksidasi oleh cahaya matahari. Selanjutnya hasil maserasi dirotavapor untuk mempekatkan sehingga diperoleh ekstrak kental, yang memudahkan dalam proses pengeringan ekstrak. Untuk ekstrak etanol 98% terlebih dahulu dibebaskan etanolkan untuk menghindari adanya aktivitas antibakteri ketika dilakukan pengujian skrining antibakteri. Ekstrak yang diperoleh kemudian disimpan dalam eksikator yang telah berisi silika gel aktif yang dapat menyerap uap air dan mencegah rusaknya ekstrak.

Dari hasil maserasi yang dilakukan diperoleh ekstrak larut n-heksan sebanyak 10,01 gram dan ekstrak etil asetat sebanyak 36,02 gram dan ekstrak etanol 96% sebanyak 127,01 gram. Hal ini menunjukkan bahwa daun cempedak lebih banyak mengandung senyawa bersifat polar daripada senyawa yang bersifat non polar dapat dilihat pada tabel 1 (Hal 39).

Pada tahap selanjutnya dilakukan uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak n-Heksan, etil asetat dan ekstrak etanol 96% terhadap bakteri uji *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Vibrio sp* dan jamur *Candida albicans*. Pengujian skrining ini dilakukan untuk mengetahui ekstrak yang aktif sebagai inhibitor pada pertumbuhan bakteri dengan cara mengamati zona hambat bening disekitar piper disk yang telah di tetesi 20 µl sampel pada konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 1000 ppm, 750 ppm, 500 ppm dan 250 ppm. Perbedaan konsentrasi dibuat untuk mengetahui tingkat efektivitas ekstrak menghambat pertumbuhan bakteri. Konsentrasi sampel dibuat dengan melarutkan 20 mg ekstrak dengan 0,2 ml DMSO (Dimetilsukfoksida) dan ditambahkan 9,8 ml aquadest steril, kemudian diencerkan sesuai nilai konsentrasi yang diinginkan. DMSO merupakan salah satu pelarut sampel yang dapat melarutkan hampir semua senyawa baik polar maupun non-polar. Selain itu, DMSO tidak memberikan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri sehingga tidak mengganggu hasil pengamatan.

Berdasarkan hasil pengujian Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun cempedak (*Artocarpus champeden L*) menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat dapat menghambat 4 bakteri uji yaitu pada bakteri *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans* dibandingkan dengan ekstrak n-heksan yang hanya dapat menghambat pada

bakteri *Staphylococcus epidermidis* dan ekstrak etanol 96% hanya dapat menghambat pada bakteri *Salmonella thyposa* dan *Streptococcus mutans*. Hasil dapat dilihat pada tabel 2 (hal 40-42).

Adapun pemilihan bakteri uji tersebut karena sifat-sifatnya yang patogenik. *Escherichia coli* merupakan bakteri anaerob fakultatif gram negatif yang bersifat patogenik penyebab radang usus dengan gejala yang muncul yaitu diare (Jawertz, Melnick, & Adelberg, 2001). *Bacillus subtilis* termasuk bakteri batang besar, gram positif, aerob dan dapat tumbuh pada makanan dan dapat menyebabkan keracunan pada makanan dan bisul. *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri aerob gram negatif, yang bersifat invasi dan tosinogenik dan menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, menimbulkan nanah hijau kebiruan, meningitis dan infeksi pada mata (Jawertz, Melnick, & Adelberg, 2001). *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri kokus gram positif yang bersifat patogenik penyebab infeksi kulit dan borok. *Staphylococcus epidermidis* merupakan bakteri gram positif yang menyebabkan infeksi pada kulit, gatal dan jerawat. *Streptococcus mutans* merupakan bakteri aerob dan anaerob gram positif yang merupakan penyebab utama kerusakan gigi atau pembusuk gigi (Irianto, 2007). *Salmonella thyposa* merupakan bakteri anaerob fakultatif dan gram negatif yang bersifat patogenik penyebab utama tifoid dan infeksi saluran kemih. *Vibrio sp* merupakan bakteri gram negatif, aerob dan menyebabkan penyakit kolera dan jamur *Candida albicans* menyebabkan panu.

Pemisahan komponen senyawa ekstrak etil asetat daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) secara kromatografi lapis tipis (KLT) menggunakan fase diam silika gel GF<sub>254</sub> dan campuran fase gerak yang sesuai lebih dahulu dilakukan untuk menentukan perbandingan eluen yang akan digunakan pada saat fraksinasi. Lempeng kromatogram yang telah dielusi dengan perbandingan eluen

n- heksan : etil asetat (3 : 1) menunjukkan adanya pemisahan setelah dideteksi bercak pada lampu UV 254 nm dan 366 nm.

Ekstrak larut etil asetat yang memiliki aktivitas antibakteri paling banyak selanjutnya difraksinasi dengan metode Kromatografi Cair Vakum (KCV). Fraksinasi dilakukan untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya dan pemilihan metode KCV ini karena cepat, mudah dan memiliki daya pemisahan yang efisien. Sebelum difraksinasi, dilakukan preparasi alat dan bahan. Menurut (al, 1995). Kolom kromatografi dikemas dalam keadaan kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan maksimum. Perbandingan eluen pelarut kemudian dituangkan ke permukaan penjerap, dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksinya. Eluen pelarut dibuat dengan perbandingan yang berbeda-beda, dimulai dari pelarut yang kepolarannya rendah hingga pelarut yang lebih polar. Dari hasil fraksinasi, diperoleh 14 fraksi yang kemudian di KLT dengan fase gerak n-heksan : etil asetat (3 : 1). Kromatogram fraksi yang memiliki warna bercak dan nilai Rf yang sama digabungkan sehingga diperoleh 5 fraksi gabungan yang akan diuji antibakteri. Hasil profil KLT fraksi etil asetat daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) dapat dilihat pada tabel 3 (hal 43-45).

Setelah diperoleh 5 jenis fraksi gabungan dari hasil Kromatografi Cair Vakum (KCV) selanjutnya dilakukan pengujian skrining aktivitas antibakteri dengan mengamati zona bening. Kelima hasil fraksinasi dilakukan pengujian terhadap keempat bakteri yaitu *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*. Diperoleh hasil bahwa dari kelima jenis fraksi tersebut, fraksi D yang memberikan aktifitas antibakteri yang paling baik terhadap keempat bakteri tersebut dengan ukuran diameter rata-rata 0,7-1,24 cm dibandingkan dengan fraksi A, B, C, E dimana fraksi A hanya memberikan aktifitas antibakteri dengan ukuran diameter rata-rata 0,67cm-0,68

cm. fraksi B hanya memberikan aktifitas antibakteri dengan ukuran diameter rata-rata 0,68 cm-0,74 cm. fraksi C hanya memberikan aktifitas antibakteri dengan ukuran diameter rata-rata 0,68 cm-0,75 cm. fraksi E hanya memberikan aktifitas antibakteri dengan ukuran diameter rata-rata 0,7 cm-0,76 cm. Hasil pengujian skrining aktivitas hasil fraksinasi dapat dilihat pada tabel 4 (hal 46-47).

Selanjutnya dilakukan tahap pengujian aktivitas antibakteri pada fraksi yang paling aktif dengan metode KLT-Biautografi. KLT-Biautografi dilakukan untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini didasarkan pada difusi agar dimana senyawa antimikrobanya akan berdifusi dari lapisan lempeng kromatogram ke permukaan medium agar yang telah memadat yang masing-masing telah diinokulasikan dengan bakteri sensitif terhadap senyawa antibakteri yang dianalisis yaitu *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*. Pada saat pengerjaan, bagian ujung lempeng kromatogram yang telah dilusi dibengkokkan hingga garis batas bawah, hal ini dilakukan untuk memudahkan pada saat menempelkan lempeng pada medium ataupun saat lempeng dikeluarkan. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi diangkat dari permukaan medium kemudian diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C. Senyawa antibakteri yang telah berdifusi dari lempeng kromatogram kedalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri dan membentuk zona bening pada medium agar.

Hasil KLT Biautografi menunjukkan bahwa fraksi etil asetat yang paling aktif adalah fraksi D menghambat 4 bakteri uji yaitu *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*. Dimana fraksi D mengandung senyawa fenol pada bakteri *Salmonella thyposa* dengan nilai  $R_f = 0,27$  dan  $0,86$ , Senyawa flavonoid pada bakteri *Staphylococcus*

*aureus* dengan nilai  $R_f = 0,27$ , Senyawa fenol pada bakteri *Staphylococcus epidermidis* dengan nilai  $R_f = 0,36$ , dan senyawa flavonoid pada bakteri *Streptococcus mutans* dengan nilai  $R_f = 0,27$  dan  $0,54$ . Hasil Uji KLT-Bioautografi dan Identifikasi Komponen Senyawa dapat dilihat pada tabel 5 (hal 48).



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak Etil Asetat memiliki antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans* dengan zona hambat paling besar pada konsentrasi 1000 ppm.
2. Fraksi D memberikan efektivitas antibakteri paling besar pada pertumbuhan bakteri *Salmonella thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*.
3. Komponen kimia Daun cempedak (*Artocarpus champeden L.*) yang berperan sebagai antibakteri yaitu senyawa flavonoid dan senyawa fenol.

### **B. Saran**

1. Untuk menambah data ilmiah dari Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) sebaiknya dilakukan penelitian mengenai elusidasi struktur senyawa yang memberikan aktivitas antibakteri dan pengembangan formulasi senyawa aktif tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KEPUSTAKAAN

- al, H. e. (1995). *Cara Kromatografi Preparatif*. Bandung: ITB.
- Ali, A. (2005). *Mikrobiologi Dasar Jilid 1*. Makassar: Jurusan Biologi UNM.
- Anonim. (2008). *Petunjuk Praktikum Mikrobiologi Dasar*. Purwokerto: Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Biologi Universitas Jendran Soedirman.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Ar-Rumaikhon, & Sulaiman, A. B. (2008). *Fiqih pengobatan Islami*. Solo: Darul Wathon Iin Nasyr.
- Ashari, S. (2006). *Hortikultura Aspek Budidaya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Aty Widyawaruyanti, d. (2011). "Mekanisme Dan Aktivitas Antimalaria Dari Senyawa Flavonoid Dari cempedak (*Artocarpus ChampedenL*).
- Direktorat Gizi Depatemen RI. (1981). *Daftar Komposisi Makanan*. Jakarta.
- Dirjen POM. (1995). *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Dirjen POM. (1997). *Farmakope Indonesia Edisi Ketiga* . Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
- Ganiswarna, S. G. (1995). *Farmakologi Dan Terapi Edisi IV. R. Setabudy dan Vincent H.S Gan Pengantar Antimikroba*. Jakarta : Gaya Baru.
- Gritter, R. J., & Schwerting, A. E. (1991). *Pengantar Kromatografi Edisi Kedua*. Bandung: Penerbit ITB.
- H, S. (2010). *Berkebun 21 Jenis Tanaman Buah*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Heyney, K. (1987). *Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid II*. Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya.
- I Made Dira Swantara, d. (2011).. (B. J. Jurusan Kimia FMIPA Universitas Udayana, Ed.) *Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Kulit Batang nangka (*Artocarpus heterophyllus*, Lam*
- Irianto, K. (2007 ). *Mikrobiologi, Menguak Dunia Mikroorganisme*. Bandung: yrama widya.
- Jawertz, E., & Melnick, d. (1996). *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta : EGC.
- Jawertz, E., Melnick, J. L., & Adelberg, E. A. (2001). *Mikrobiologi Kedokteran, Edisi XXII. Diterjemahkan Oleh Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika.

- Liana, I. (2013). *Aktivitas Antimikroba Fraksi dari Ekstrak Metanol Daun Senggani (Melastoma candidum D. Don) Terhadap Staphylococcus aureus Dan Salmonella thyphimurium Serta Kromatografi Lapis Tipis Fraksi Teraktif.*
- M., G. G., & G. L. T. (2014). *Taksonomi Outline Of The Prokaryotes Bergey's Manual Of Systemic Bacteriologi, 2nd Edition.* America: United States Of America, New York Berlin Hendelberg.
- Mulyanti, E. S. (2009). *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Ceremai (Phyllanthusacidusn (L.) Skeels) Terhadap Staphylococcus aureus Dan Escherichia coli Dan Biautografinya.*
- Mulyanti, N. M. (2008). *Uji Antibakteri Ekstrak n-Heksan Kulit Batang Cempedak (Artocarpus champeden L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa.*
- NAH, T. (2011). *Pengaruh perbandingan konsentrasi sukrosa dan sari buah cempedak (artocarpus integer (tunb.)Merr.) Terhadap kualitas permen jelly selamamasimpan.* Yogyakarta: Fakultas Teknobiologi Program Studi Biologi Universitas Atmajaya .
- Oktora, L. (2006). *Pemanfaatan Obat Tradisional Dengan Pertimbangan Manfaat Dan Khasiatnya.* Majalah Ilmu Kefarmasian.
- PCM, J. (1997). *Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 2: Buah-buahan yang dapat dimakan.* Jakarta: PROSEA-Gramedia .
- Pelczar, M. j., & Chan, E. C. (2008). *Dasar-Dasar Mikrobiologi. Jilid 2.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pratiwi, S. T. (2008). *Mikrobiologi Farmasi .* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pratiwi, S. T. (2008). *Mikrobiologi Farmasi.* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahmawati, D. (2013). *Uji Aktivitas Antioksidan Dan Identifikasi Metabolit Sekunder Batang Dan Daun Cempedak (Artocarpus champeden L).*
- Raina, M. (2011). *Ensiklopedi Tanaman Obat Kesehatan.* Yogyakarta: Absolut.Sari, D. P. (2013). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Nangka (Artocarpus Heterophyllus) terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa.
- Sartini, D. M. (2008). *. Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi.* Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Sartini, D. M., & H, K. S. (2008). *Analisis Mikrobiologi Farmasi.* Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Shihab, Q. (2009). *M. Tafsir Al-Misbah.* Jakarta Pusat: Lentera hati.
- Sriyanti, S. (2014). *Skrining Aktivitas Antimikroba Komponen Kimia Ekstrak Daun Botto-botto (Chromolaena odorata L.)*
- Swandi, U. (1991). *Resistensi Mikroba Terhadap Antibiotik.* Jakarta: PT. Kalbe Farma.

Syaodih Sukmadinata, N. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.


Verheij, E., & Coronel, R. (1997). *Buah-Buahan Yang Dapat Dimakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Whenny, Rolan, R., & Laode, R. (2015). *Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Daun Cempedak (Artocarpus Champeden L.)*.




## LAMPIRAN

### Lampiran Bagan Alir Penelitian




## 1. Skema Kerja Ekstraksi Daun Cempedak




## 2. Skema Kerja Pengujian Skrining Antibakteri

### 1. Penyiapan Stok Larutan Uji



## 2. Skrining Aktivitas Antibakteri



Keterangan :

BS = *Bacillus subtilis*

EC = *Escherichia coli*

PA = *Pseudomonas aeruginosa*

ST = *Salmonella typhi*

SA = *Staphylococcus aureus*


SE = *Staphylococcus epidermidis*

SM = *Streptococcus mutans*


VB = *Vibrio colera*

CA = *Candida albicans*


### 3. Skema Kerja Fraksinasi Sampel



#### 4. Skema Kerja Uji Aktivitas Hasil Fraksinasi



### 5. Skema Kerja KLT-Bioautografi



Keterangan :

BS = *Bacillus subtilis*

EC = *Escherichia coli*

PA = *Pseudomonas aeruginosa*

ST = *Salmonella typhi*

SA = *Staphylococcus aureus*


SE = *Staphylococcus epidermidis*

SM = *Streptococcus mutans*

VB = *Vibrio sp*

CA = *Candida albicans*

## 6. Skema Kerja Identifikasi Senyawa Kimia



**Lampiran 7 : Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran dari Ekstrak Dan Fraksi n-Heksan, Etil Asetat dan Etanol 96%**

Dik : 20 mg ( 20 x 1.000 ) = 20.000  $\mu\text{g}$

10 ml (n-heksan, Etil asetat, Etanol 96%)

$$\text{ppm} = \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} = \frac{20.000 \mu\text{g}}{10 \text{ ml}} = 2000 \text{ ppm}$$

Untuk 250 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$   
 $V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 250 \text{ ppm}$   
 $V_1 = \frac{1250 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{2000 \text{ ppm}} = 0,6 \text{ mL}$

Untuk 500 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$   
 $V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 500 \text{ ppm}$   
 $V_1 = \frac{2500 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{2000 \text{ ppm}} = 1,25 \text{ mL}$

Untuk 750 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$   
 $V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 750 \text{ ppm}$   
 $V_1 = \frac{3750 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{2000 \text{ ppm}} = 1,87 \text{ mL}$

Untuk 1000 ppm  $\longrightarrow$   $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$   
 $V_1 \times 2000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 1000 \text{ ppm}$   
 $V_1 = \frac{5000 \text{ ppm} \cdot \text{ml}}{2000 \text{ ppm}} = 2,5 \text{ mL}$

**Lampiran 8 : Gambar (1) Hasil Uji Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak N-Heksan Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm Pada Bakteri Uji**



*Bacillus subtilis*



*Escherichia coli*




*Pseudomonas aeruginosa*



*Salmonella thypi*



*Staphylococcus aureus*




*Streptococcus mutans*



*Vibrio cholera*




*Candida albicans*




*Staphylococcus epidermidis*


**Lampiran 9 : Gambar (2) Hasil Uji Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm Pada Bakteri Uji**




*Bacillus subtilis*



*Escherichia coli*




*Pseudomonas aeruginosa*




*Vibrio cholera*



*Candida albicans*




*Salmonella thyposa*



*Staphylococcus aureus*



*Staphylococcus epidermidis*




*Streptococcus mutans*

**Lampiran 10 : Gambar (3) Hasil Uji Skrining Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm Pada Bakteri Uji**



*Bacillus subtilis*




*Escherichia coli*




*Pseudomonas aeruginosa*




*Staphylococcus aureus*



*Staphylococcus epidermidis*




*Vibrio cholera*



*Candida albicans*




*Salmonella thyposa*



*Streptococcus mutans*

**Lampiran 11 : Gambar (4) Hasil Identifikasi Profil KLT Ekstrak Etil Asetat Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*)**




**Keterangan :**

- A** : Penampakan Noda Pada UV 254
- B** : Penampakan Noda Pada UV 366
- C** : Penampakan Noda Setelah Disemprot  $H_2SO_4$

**Lampiran 12 : Gambar (5) Hasil Fraksinasi Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) Dengan Eluen Heksan : Etil Asetat (3:1) menggunakan KCV**



(A)




(B)

**Keterangan :**


**A : Penampakan Pada Noda UV 254 Hasil Fraksi Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*)**

**B : Penampakan Noda Pada UV 366 Hasil Fraksi Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*)**


**Lampiran 13 : Gambar (6) Uji Skrining Aktivitas Hasil Fraksinasi  
Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*)**




Fraksi D (SA)



Fraksi D (ST)



Fraksi D (SM)



Fraksi D (SE)

**Keterangan :**


SA : *Staphylococcus aureus*

SM : *Streptococcus mutans*

ST : *Salmonella thyposa*


SE : *Staphylococcus epidermidis*

**Lampiran 14 : Gambar (7) Hasil Uji KLT-Biautografi Fraksi Aktif Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus***




**SA : *Staphylococcus aureus***

**Lampiran 15 : Gambar (8) Hasil Uji KLT-Biautografi Fraksi Aktif Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis***




**SE : *Staphylococcus epidermidis***

Lampiran 16 : Gambar (9) Hasil Uji KLT-Biautografi Fraksi Aktif Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) Terhadap Bakteri *Streptococcus mutans*



SM : *Streptococcus mutans*

**Lampiran 17 : Gambar (10) Hasil Uji KLT-Biautografi Fraksi Aktif Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) Terhadap Bakteri *Salmonella thyposa***



**ST : *Salmonella thyposa***


**Lampiran 18 : Gambar (11) Hasil Identifikasi Fraksi Aktif Daun Cempedak (*Artocarpus champeden L.*) Dengan Pereaksi Identifikasi**




**Dragendorff**



**Lieberman-Burchard**



**AlCl<sub>3</sub>**



**FeCl<sub>3</sub>**



**H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>**

## BIOGRAFI



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Nur Amalia Sahib yang biasa disapa Amel dilahirkan di kota Manokwari, Papua Barat tanggal 20 Juni 1995, adalah anak bungsu dari 4 bersaudara pasangan dari bapak H.Muh.Sahib dan ibu Hj.Nur Syamsiah. Pendidikan dasar yang ditempuh di SD Yapis 01 Manokwari (2001-2007). Kemudian pendidikan tingkat lanjut ditempuh di SMP Pesantren Modern Putri IMMIM (2007-2010). Pendidikan SMA ditempuhnya di Pesantren Modern Putri IMMIM (2010-2013). Lalu dilanjutkan menempuh program sarjana Farmasi (S.Farm) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013 sampai sekarang).

Saya bersyukur karena Allah SWT telah memberikan saya jalan seperti dengan kata yang selalu saya tanamkan yaitu “ where there is a will there is a way ” dan ada satu hal yang saya nikmati, yaitu saya bahagia menjadi diri sendiri. Saya bersyukur dengan apa yang saya punya dan dapatkan saat ini. Dan saya cenderung memilih apa yang menurut saya nyaman.

Saya mengidolakan Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki ketegaran hati dan semangat yang besar serta dapat diandalkan. Saya berharap agar dapat seperti mereka yang memiliki ketegaran hati dan semangat yang tinggi sehingga saya kelak dapat diandalkan di kehidupan bermasyarakat. Sekarang saya menjalani proses perkuliahan di kampus kita tercinta ini yang dikenal sebagai kampus PERADABAN.