

**PENGARUH SENAM AEROBIK *MIX IMPACT* TERHADAP PERUBAHAN
KADAR KOLESTEROL DARAH PADA MAHASISWA UIN ALAUDDIN
MAKASSAR DENGAN USIA PRODUKTIF 21-23 TAHUN**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

ANDI RISNI HANDAYANI

70300112014

**PRODI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Risni Handayani
NIM : 70300112014
Tempat/Tgl. Lahir : Benteng, 05 Februari 1994
Jurusan : Ilmu Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. S. Dg. Ngemba No. 47 Kec. Sombaopu Kabupaten
Gowa
Judul : Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan
Kadar Kolesterol Darah pada Mahasiswa UIN Alauddin
Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun.


Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Maret 2016

Penyusun,

Andi Risni Handayani
NIM:70300112014

KATA PENGANTAR



Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya berupa nikmat yang begitu besar bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun” Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan yang terbaik, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada umat sekarang yang konsisten pada ajaran beliau.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa menghiasi segala keluh kesah yang terucap dari keterbatasan penulis. Atas terselesainya skripsi ini, maka izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
2. Dr. dr. H.A. Armyan Nurdin, M.Sc. selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1

Keperawatan.

3. Ketua Jurusan Keperawatan Ayahanda Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes. yang sekaligus selaku pembimbing I, yang selalu memberikan motivasi dan pengajaran akan wawasan keilmuan yang luas kepada saya selaku anak didiknya dan bimbingan yang tiada henti bagi peneliti dari bapak selaku pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi.
4. Muh. Basir, S.Kep.,Ns.,M.Kes.selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dari persiapan proposal sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Drs. Wahyuddin, M.Ag selaku penguji I dan penguji II atas pengajaran ilmu yang tiada henti, pengarahan dan bimbingan selama berlangsungnya penyelesaian skripsi ini serta telah banyak memberikan masukan baik kritik yang membangun dan berbagai saran serta solusi dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajar dan mendidik penulis hingga penyelesaian studi ini.
7. Yang tersayang kepada Almarhumah Ibuku Hasnieni dan yang tercinta dua orang tuaku, Ayahandaku Dg. Mananring dan Ibundaku Andi Sukawati Patta, S.Pd.Aud sebagai sumber inspirasi terbesar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang dengan penuh cinta dan kasih sayang serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga

sekarang sampai di titik ini.

8. Terima kasih kepada sahabatku tersayang #9 (Yusna Kurnia Utami Mardan, Dwi Qadriyani, Titin Setiawaty, Rahmawati, Silvianita Amir, Rahmi Ramadhani, Sarifah Musnayni, dan Nurwahyu), para sahabat Anggi Angraeni dan Novi Chrishna Angraini serta Sri Mustika dan Irma Rukmana Kadir yang senantiasa memotivasi, membantu dan rela mengantar kesana kemari dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih juga teman-teman angkatan 2012 RONTGEN khususnya Keperawatan A yang memberikan memori indah selama menjadi mahasiswa.

Skripsi ini merupakan tugas yang harus diselesaikan penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, semoga keberadaan hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya. Karenanya itu, saran serta kritik yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis mengembalikan segalanya dan semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb

Makassar, Maret 2016

Penulis

Andi Risni Handayani
NIM:7030011201

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| DAFTAR GRAFIK | x |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Hipotesis..... | 8 |
| D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif | 8 |
| E. Kajian Pustaka..... | 9 |
| F. Tujuan Penelitian | 11 |
| G. Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kolesterol..... | 13 |
| 1. Kolesterol | 13 |
| 2. Sistem Pengangkutan Kolesterol..... | 18 |
| 3. Jalur Transpor Lipoprotein..... | 23 |
| 4. Faktor- faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol..... | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Olahraga Aerobik dan Senam Aerobik Mix Impact | 31 |
| 1. Olahraga Aerobik Untuk Mengontrol Kadar Kolesterol..... | 31 |
| 2. Senam Aerobik <i>Mix Impact</i> | 35 |
| 3. Olahraga yang dianjurkan pada masa Rasulullah SAW | 37 |

| | |
|--|----|
| 4. Hubungan Senam Mix Impact Terhadap Perubahan Kadar Kolesterol | 42 |
| C. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian | 44 |
| D. Kerangka Konsep | 45 |
| E. Kerangka Kerja | 46 |
| F. Variabel yang diteliti..... | 47 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 48 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 48 |
| C. Populasi dan Sampel | 49 |
| D. Instrumen Penelitian..... | 51 |
| E. Sumber dan Cara Pengumpulan Data | 52 |
| F. Pengolahan dan Analisa Data..... | 53 |
| G. Etika Penelitian | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Deskriptif Hasil Penelitian | 57 |
| B. Pembahasan..... | 65 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Susunan Lipoprotein dalam Darah..... | 21 |
| Tabel 2.2 Lipoprotein dan Risiko Penyakit Jantung | 23 |
| Tabel 4.1 Uji Normalitas..... | 61 |
| Tabel 4.2 Uji <i>Paired Sampel T-Test</i> | 63 |
| Tabel 4.3 Uji Kontrol Makanan | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Struktur Kolesterol | 18 |
| Gambar 2.2 Struktur Lipoprotein | 19 |
| Gambar 2.3 Energi dalam Metabolisme Aerobik | 33 |
| Gambar 2.4 Kerangka Konsep | 45 |
| Gambar 2.5 Kerangka Kerja | 46 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|----|
| Grafik 4.1 Perubahan Kadar Kolesterol Darah | 58 |
| Grafik 4.2 Rata-rata perubahan Kolesterol | 59 |
| Grafik 4.3 Grafik Kontrol Makanan Responden..... | 60 |

ABSTRAK

Nama : Andi Risni Handayani
NIM : 70300112014
Judul : Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun.

Olahraga atau aktifitas fisik yang teratur mempunyai peran dalam mencegah terjadinya penyakit jantung koroner yang umumnya dipicu karena kolesterol dalam darah yang mengakibatkan aterosklerosis terutama bagi kelompok berisiko tinggi seperti obesitas. Senam *mix impact* merupakan jenis senam aerobik gabungan antara *low impact* dan *high impact* yang mempunyai gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan dalam satu paket.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam *mix impact* terhadap perubahan kadar kolesterol darah pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan usia produktif 21-23 tahun. Penelitian yang digunakan *Pre-Eksperimental* dengan desain *One Group Pre-Post Test*. Jumlah sampel 10 orang menggunakan teknik *purposive sampling* dengan IMT antara 25,0-29,9 kg/m², dengan pemberian senam *mix impact* dengan frekuensi senam selama 3 kali seminggu.

Data hasil penelitian menggunakan uji normalitas dengan *Shapiro wilk* dengan *p value* >0,05 serta secara deskriptif dari hasil output SPSS. Analisis data untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil uji *Paired Sampel t-Test* yaitu *p value* 0,000 < ($\alpha= 0,05$), dapat disimpulkan bahwa hipotesis *H₀* ditolak berarti ada pengaruh signifikan senam *mix impact* terhadap perubahan kadar kolesterol darah mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Penurunan kadar kolesterol darah responden disebabkan oleh meningkatnya aktifitas fisik responden sehingga menyebabkan terbakarnya cadangan lemak tubuh untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh pada saat latihan senam aerobik *mix impact*. Konsumsi makanan menjadi faktor perancu seperti lemak, karbohidrat, serat, PUFA dan kolesterol, maka pengaruh senam aerobik *mix impact* terhadap perubahan kadar kolesterol ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih lanjut manfaat senam aerobik *mix impact* terhadap kadar kolesterol darah dengan lebih memperketat konsumsi makanan.

Kata kunci: Senam *mix impact*, *Kolesterol*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kadar kolesterol tinggi merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Kolesterol tinggi disebut juga sebagai pembunuh yang datang secara diam-diam (*silent killer disease*) karena penumpukan kolesterol terjadi secara tidak kasat mata. Hal ini mengakibatkan orang tidak mempunyai keluhan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi sebagai *silent killer* memang terasa tak relevan bagi kaum muda, tetapi pada kenyataannya kolesterol tinggi bisa menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Meskipun berusia dibawah 40 tahun, jika memiliki gaya hidup tidak sehat antara lain perokok, terlalu banyak makanan tinggi lemak dan tidak berolahraga, itu termasuk dalam golongan beresiko tinggi mengidap kolesterol (Shanty, 2011).

Salah satu penelitian terbesar di dunia tentang kejadian penyakit jantung koroner, penelitian INTERHEART telah menggabungkan informasi dari 52 negara dan mencakup lebih dari 30.000 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa hampir 50% dengan serangan jantung dapat dikaitkan dengan kadar kolesterol darah yang abnormal. Orang dengan kadar kolesterol yang abnormal, tiga kali lebih mudah mendapat serangan jantung dibandingkan mereka yang memiliki kadar kolesterol normal (Morrell, 2007).

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2011 bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia dan 60 % dari seluruh penyebab kematian penyakit jantung adalah penyakit jantung iskemik dan sedikitnya 17,5 juta atau setara dengan 30,0 % kematian di seluruh dunia disebabkan

oleh penyakit jantung. Diperkirakan tahun 2030 bahwa 23,6 juta orang di dunia akan meninggal karena penyakit kardiovaskular (Malik, 2013).

Badan kesehatan dunia juga memprediksi bahwa kematian akibat stroke akan meningkat seiring dengan kematian akibat penyakit jantung dan kanker kurang lebih 6 juta pada tahun 2010 menjadi 8 juta di tahun 2030 (*American Heart Association*, 2010). Diperkirakan pula 83.600.000 orang dewasa Amerika (> 1 di 3) memiliki 1 atau 2 jenis yang lebih dari CVD. Dari jumlah tersebut, 42,2 juta diperkirakan menjadi ≥ 60 tahun (*American Heart Association*, 2013).

Prevalensi jantung koroner berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,5 persen, dan berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 1,5 persen. Prevalensi gagal jantung berdasarkan pernah didiagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,13 persen, dan berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 0,3 persen. Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7,0 per mil dan yang berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. Jadi, sebanyak 57,9 persen penyakit stroke telah terdiagnosis oleh nakes. Prevalensi penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke terlihat meningkat seiring peningkatan umur responden (Riskesdas, 2013).

Abnormalitas kadar lipid dalam darah merupakan salah satu faktor resiko timbulnya penyakit kardiovaskular dan metabolik misalnya aterosklerosis. Pada penduduk ≥ 15 tahun didapatkan kolesterol total abnormal 35,9 persen, HDL rendah 22,9 persen, LDL tidak optimal dengan kategori gabungan *near optimal-borderline* tinggi 60,3 persen dan kategori tinggi-sangat tinggi 15,9 persen, trigliserida abnormal dengan kategori *borderline* tinggi 13,0 persen dan kategori tinggi-sangat tinggi 11,9 persen (Riskesdas, 2013).

Bersumber dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2010-2011, penyakit kardiovaskular berada pada peringkat 10 besar penyakit tidak menular penyebab rawat inap di rumah sakit dengan presentase 10%, dengan kejadian penyakit jantung sebesar 2.92%, stroke 2.69% dan penyakit hipertensi 4.39% (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Berdasarkan profil kesehatan kota Makassar 2012, pada tahun 2012 penyakit kardiovaskular masuk dalam 10 besar penyebab kematian di kota Makassar yaitu sebesar 1044 kasus kematian dengan jumlah penyakit jantung sebesar 432 kasus dan penyakit hipertensi 612 kasus (Profil Kesehatan Kota Makassar, 2012). Untuk profil kesehatan kota Makassar pada tahun 2013, penyakit kardiovaskular masuk dalam 10 besar penyebab kematian di kota Makassar yaitu sebesar 1010 kasus kematian dengan jumlah penyakit jantung sebesar 469 kasus, penyakit hipertensi 445 kasus dan penyakit stroke 96 kasus (Profil Kesehatan Kota Makassar, 2013).

Proporsi penderita penyakit kardiovaskular di Sulawesi Selatan masih sangat tinggi, menurut hasil survei status kesehatan pada tahun 2009 penderita penyakit kardiovaskular sebesar 35.82% pada pasien rawat jalan dan 35.11% pada pasien rawat inap (Profil Kesehatan Sulsel, 2009) dan berdasarkan hasil surveilans penyakit tidak menular berbasis rumah sakit, penyakit kardiovaskular masuk kedalam lima besar penyebab kematian di Sulsel (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2010).

Pergeseran gaya hidup terutama di perkotaan, hampir tidak memberikan pilihan untuk memiliki gaya hidup berkualitas. Pola makan yang tidak sehat dan kurang olahraga merupakan faktor resiko tingginya kadar kolesterol dalam darah. Tanpa disadari, tingginya kadar kolesterol secara perlahan, namun pasti menumpuk dalam pembuluh darah yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa penyakit seperti jantung koroner dan stroke (Shanty, 2011).

Cara terbaik mencegah penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi dan sebagainya adalah dengan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Menurunkan kadar kolesterol darah dengan mengosumsi makanan spesifik dan menghindari peningkatan berat badan bukanlah hal yang mustahil. Memahami kaitan kolesterol, kandungan lemak darah dan timbulnya *atherosclerosis* dapat membantu seseorang mengubah sikap hidup. Sebaiknya mulai dengan mengubah pola makan dan kebiasaan hidup. Hal ini merupakan jalan untuk menurunkan jumlah kolesterol dalam darah ke kadar yang relatif aman (Nilawati, 2008).

Olahraga kesehatan melatih fungsi alat-alat tubuh secara bertahap agar tetap normal pada waktu istirahat. Jadi olahraga kesehatan membuat orang menjadi lebih sehat dinamis, menjadi lebih mampu bergerak, menjadi tidak mudah lelah. Kelelahan yang begitu cepat datang menghambat kemauan dan kemampuan gerak, menghambat kegairahan hidup. Latihan senam dengan intensitas sedang dapat mencegah kegemukan, mengurangi resiko penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi serta mencegah osteoporosis (Kamajaya, 2013).

Olahraga ini memompa lebih banyak oksigen ke dalam aliran darah dan meremajakan tubuh. *Aerobik* biasanya dilakukan dari 20 hingga 30 menit, lakukan selama tiga kali seminggu. Gerakan ini dilakukan seperti tarian berirama (ritmik), menghitung penting dalam mengatur irama. *Aerobik* memiliki banyak manfaat walaupun dilakukan atau dipraktekkan dengan cara yang menyenangkan. Aerobik semacam ini adalah olahraga yang bagus untuk menurunkan berat badan dan menyehatkan otot-otot tubuh. Hal ini juga akan membantu tubuh membangun kekuatan tulang yang kebanyakan menopang berat badan dan juga menguatkan otot jantung (Alim, 2011).

Sama seperti olahraga lainnya, *aerobik* pun dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kadar gula darah dan kolesterol. Karena *aerobik* mencakup latihan pernapasan yang tepat, oksigen lebih banyak beredar di paru-paru, jantung, dan pembuluh darah yang membuat tubuh berfungsi lebih baik, menghasilkan energi dan stamina yang lebih banyak. Manfaat dari segi fisik meliputi peningkatan sistem kekebalan tubuh (Alim, 2011).

Secara fisiologis senam aerobik yang dilakukan secara teratur dan terukur bertujuan untuk memperbaiki sistem dan fungsi organ agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam penggunaan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada waktu latihan. Pada saat melakukan senam aerobik sistem oksigen merupakan sumber energi *pre-dominant*. Latihan ini sangat memacu atau merangsang kerja jantung, pembuluh darah dan paru. Jantung memompa darah lebih kuat, lebih banyak dan volume darah secara keseluruhan meningkat (Baitul, 2010).

Aktivitas olahraga ini akan membantu tubuh tetap bugar dan segar karena melatih tulang tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal, dan membantu menghilangkan radikal bebas yang berkeliaran di dalam tubuh. Tingkat kebugaran dievaluasi dengan mengawasi kecepatan denyut jantung waktu istirahat, yaitu kecepatan denyut nadi sewaktu istirahat (Alim, 2011).

Latihan fisik teratur, terutama latihan yang bersifat aerobik (*Dynamic Exercise*) berperan penting terhadap peningkatan kebugaran tubuh, dan sekaligus berperan terhadap metabolisme lemak maupun pengendalian stress. Banyak petunjuk latihan dinamik telah diberikan seperti: jalan cepat, jogging, lari, bersepeda dan berenang. Salah satu hasil yang telah dibuktikan adalah tingginya kadar HDL (*High*

Density Lipoprotein) atau kolesterol baik pada orang-orang yang terlatih (Anies, 2006).

Senam aerobik merupakan latihan fisik dimana didalam latihan tersebut menggerakkan seluruh otot terutama otot besar dengan gerakan yang terus-menerus, berirama, maju dan berkelanjutan (Ratmawati, 2013). Senam aerobik mix impact, yaitu dalam rangkaian gerakan kombinasi dan campuran dari senam aerobik low impact dan senam aerobik high impact. Pada saat melakukan gerakan senam aerobik mix impact ini kita menggunakan berbagai macam otot-otot dalam badan kita. otot-otot tersebut termasuk otot kaki nyang kita gunakan melompat dan juga mengangkat badan, dan juga otot-otot lengan yang menyebabkan jantung memompa lebih keras. Kombinasi antara low impact dan high impact akan membantu kita memperbaiki daya tahan dan kondisi jantung serta peredaran darah (Rosidah, 2013).

Kelebihan energi disimpan dalam bentuk lemak di jaringan lemak sehingga menyebabkan peningkatan berat badan. Penggunaan lemak badan pada latihan aerobik intensitas sedang akan menyebabkan penurunan persentase lemak badan. Penurunan persentase lemak terjadi akibat adanya pembongkaran lemak pada latihan aerobik seperti latihan ketahanan yang teratur dan terprogram dengan frekuensi 3-5 kali perminggu seperti rekomendasi *American College of Sports* (ACSM). Selain menurunkan persentase lemak badan, senam aerobik dapat pula menambah miofilamen otot, struktur kepadatan tulang dan jaringan ikat (Sari, 2011).

Kegemukan umumnya disebabkan oleh tidak berimbangnya asupan energi yang masuk dengan pembakaran kalori melalui aktivitas fisik. Lemak berlebih dapat memicu berbagai macam penyakit. Solusi dalam mengatasi lemak berlebih serta untuk meningkatkan kesegaran jasmani adalah dengan melakukan olahraga atau

latihan fisik. Dalam mengatasi kegemukan, diperlukan olahraga yang efektif salah satunya senam aerobik (Wisnu, 2014).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik berupa senam atau latihan aerobik merupakan salah satu alternatif olahraga yang mampu mempengaruhi perubahan kadar kolesterol dalam darah. Berdasarkan hasil penelitian Khumaidi 2014, senam zumba berpengaruh secara signifikan terhadap kadar kolesterol mahasiswa keperawatan yang melakukan senam zumba. Hasil penelitian didapatkan rata-rata nilai kadar kolesterol sebelum melakukan senam zumba adalah sebesar 188.1 mg/dl dan hasil penelitian yang didapatkan nilai rata-rata kadar kolesterol setelah melakukan senam zumba adalah sebesar 152.8 mg/dl.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun”. Adapun alasan peneliti untuk memilih Mahasiswa UIN, karena mahasiswa UIN Alauddin Makassar sudah diperkenalkan dengan salah satu senam aerobik yaitu senam zumba dan berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya, senam aerobik merupakan salah satu alternatif olahraga yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu peneliti ingin menggunakan senam aerobik *Mix Impact* yang sebelumnya berbeda dari senam zumba seperti yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Peneliti memilih mahasiswa untuk dijadikan objek penelitian karena pada era modern sekarang, gaya hidup semakin buruk termasuk pola makan yang tidak teratur dan kurang berolahraga sehingga penderita kolesterol tinggi tidak hanya menyerang usia diatas tiga puluh tahun, tetapi kadar kolesterol tinggi bisa juga diderita oleh remaja dan usia dewasa muda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun?”.

C. Hipotesis

1. H_0 (Hipotesis Nol)

Tidak ada Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun.

2. H_a (Hipotesis Alternatif)

Ada Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Kolesterol Total

Kolesterol adalah zat yang lunak dan berminyak mengacu pada lemak atau lipid. Kadar kolesterol total dalam plasma darah itu sendiri dapat diukur dengan menggunakan alat UNESCO Multi Check. Kadar kolesterol diukur pada saat puasa dengan frekuensi latihan tiga kali perminggu dalam jangka waktu 3 minggu yang dilakukan pada sore hari pada pukul 15.30 Wita pada bulan Februari – Maret 2016.

Kriteria Objektif :

- a. Normal = < 180 mg/dl
- b. Borderline = 180-199 mg/dl
- c. High = \geq 200 mg/dl

Rekomendasi Kolesterol dari *US National Cholesterol Education Program*

2. Senam Aerobik Mix Impact

Senam Aerobik Mix Impact merupakan latihan aerobik yang memerlukan oksigen untuk pembentukan energinya yang dilakukan secara terus-menerus, ritmis dengan melibatkan kelompok otot-otot besar terutama otot tungkai dengan intensitas latihan aerobik 60-80% dari *Maximal Heart Rate* (MHR) dari penggunaan maksimal oksigen selama 30 menit meliputi gerakan pemanasan, inti dan pendinginan. Intensitas latihan aerobik mix impact 60-80% dari *Maximal Heart Rate* (MHR) dengan rumus $60-80\% \times MHR_{\max} (220 - \text{usia})$, yaitu diperoleh hasil 119,4 kali/menit – 159,2 kali/menit untuk umur 21 tahun dan 118,2 kali/menit – 157,6 kali/menit untuk umur 23 tahun dengan frekuensi latihan tiga kali perminggu dalam jangka waktu 3 minggu yang dilakukan pada waktu sore hari pada pukul 15.30 Wita pada bulan Februari – Maret 2016.

E. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol. Penelitian Khumaidi 2014 menunjukkan bahwa kegiatan olahraga berupa senam yang merupakan salah satu latihan aerobik secara bermakna mempengaruhi kadar kolesterol total darah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Quasy Experimental Design* dengan menggunakan rancangan *Pretest-Posttest One Group Design*. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar yang

melakukan senam zumba yang diadakan oleh prodi keperawatn UIN Alauddin Makassar yang dilakukan setiap hari jumat. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel 8 orang. Data yang dikumpul kemudian diolah dan di analisis menggunakan uji *paired t test* untuk melihat pengaruh senam zumba terhadap perubahan kadar kolesterol. Dari uji Beda *Paired T-Test* diketahui bahwa senam zumba berpengaruh secara signifikan terhadap kadar kolesterol darah pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar karena nilai *p value* (0.003) <0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan senam zumba terhadap perubahan kadar kolesterol darah pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Penelitian Adiatman 2013 menunjukan bahwa kegiatan olahraga kebugaran otot yang merupakan salah satu latihan aerobik secara bermakna. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Quasy Experimental Design* dengan menggunakan rancangan *Pretest-Posttest One Group Design* dalam desain ini terdapat dua grup yang dipilih secara random kemudian diberi *pretest* untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara grup eksperimen dan grup kontrol. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 orang dan sampel sebanyak 10 orang untuk masing-masing kelompok baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Dari uji Beda *Paired T Test* dengan metode *circuit weight training* menghasilkan perbedaan rerata kadar kolesterol antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol adalah 11.55 mg/dl dan penelitian tersebut juga menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna kadar kolesterol total darah kelompok perlakuan dibanding dengan kelompok kontrol (p=0.02).

Berdasarkan hasil penelitian Mamat dan Sudikno (2010), menyatakan bahwa presentasi kadar kolesterol tidak normal lebih tinggi pada responden dengan aktivitas

kurang yaitu sebesar 82.7 persen dibandingkan dengan presentasi kadar kolesterol tidak normal pada responden yang aktivitas fisiknya cukup. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa responden dengan aktivitas fisik kurang memiliki odd ratio untuk mengalami kadar kolesterol tidak normal sebesar 1.64 kali dibandingkan dengan responden yang aktivitas fisiknya cukup.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kadar kolesterol sebelum melakukan senam aerobik mix impact pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun.
- b. Mengetahui kadar kolesterol darah setelah melakukan senam aerobik *mix impact* pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun.
- c. Mengetahui perbedaan kadar kolesterol darah sebelum dan sesudah melakukan senam aerobik *mix impact* pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun.

G. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Institusi

Dapat menambah referensi bagi perpustakaan dan menjadi data awal bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberi informasi bagi masyarakat bahwa senam aerobik memiliki pengaruh positif bagi kesehatan khususnya untuk mengontrol kadar kolesterol darah dan dapat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan, khususnya mengenai kolesterol.

3. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman mengenai pemecahan masalah mengenai olahraga yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kolesterol

1. Definisi Kolesterol

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali masalah makanan. Oleh karena itu bagi kaum muslimin, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri bahkan dengan perilaku. Makanan biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberi tenaga dan nutrisi. Makanan yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur - unsur zat gizi yang diperlukan tubuh baik kualitas maupun kuantitasnya, dalam ilmu gizi biasa disebut triguna makanan yaitu makanan yang mengandung zat tenaga, pembangun dan zat pengatur (Syarfaini, 2012).

Allah SWT berfirman dalam surat Q.S Al- A'raaf ayat 31 :

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahannya :

"Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang berlebih-lebihan."

Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih, yakni tidak melampaui batas merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat

berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam hal makan dan minum (Shihab, 2008).

Makanan sebagai sumber energi untuk bergerak. Makanan juga sangat bermanfaat untuk membantu proses metabolisme zat-zat gizi didalam tubuh. Zat gizi diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Adapun zat - zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiga zat tersebut mempunyai jumlah paling banyak dalam makanan. Zat - zat gizi inilah yang akan menghasilkan energi bagi tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Jika fungsi ini terganggu, aktivitas manusia juga akan terganggu. Ketiga zat gizi tersebut mengalami pembakaran untuk menghasilkan energi. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan, sebaiknya utamakan penggunaan karbohidrat sebagai sumber energi dibandingkan lemak dan protein. Hal ini disebabkan penggunaan lemak dan protein berlebihan justru akan memberatkan kerja ginjal dan dapat menimbulkan masalah kesehatan (Khasanah, 2012).

Kolesterol merupakan bahan perantara untuk pembentukan sejumlah komponen penting seperti vitamin D (untuk membentuk dan mempertahankan tulang yang sehat), hormon seks (berupa estrogen dan testosteron) dan asam empedu (untuk fungsi pencernaan). Pembentukan kolesterol didalam tubuh terutama terjadi di hati (50% total sintesis) dan sisanya di usus, kulit dan semua jaringan yang banyak mempunyai sel-sel berinti. Jenis-jenis makanan yang banyak mengandung kolesterol antara lain daging (sapi maupun unggas), ikan dan produk susu. Meskipun demikian tingginya kadar kolesterol dalam tubuh menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Pola makan sehat merupakan

faktor utama untuk menghindari hal ini. Batas normal kolesterol dalam tubuh 160-200 mg (Atikah, 2011).

Kolesterol dapat membahayakan tubuh jika jumlahnya berlebihan. Bila terdapat dalam jumlah yang terlalu banyak didalam darah, kolesterol dapat membentuk endapan pada dinding pembuluh darah. Endapan tersebut dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang dinamakan aterosklerosis (Nilawati, 2008).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan kolesterol adalah lipid atau lemak essensial yang berfungsi untuk menjaga fungsi sel agar tetap normal dan digunakan untuk membentuk membentuk hormon steroid, hormon seks, serta sintesis vitamin D.

Dari sudut agama islam, diajarkan untuk makan makanan yang bukan saja halal, namun juga baik untuk kesehatan tubuh (Halalan thayyibah), sesungguhnya ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT Kepada makhluk hidup ciptaan-Nya agar sehat rohani maupun jasmani. Hal ini disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah[2]:168.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Perintah pada ayat diatas ditujukan kepada seluruh manusia tanpa memberikan batasan-batasan jenis kelamin, suku, maupun agama. Adapun makanan halal yang dimaksud pada ayat diatas adalah makanan yang di dalam agama tidak terlarang (haram). Namun tidak semua makanan yang halal adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi, karena yang dinamakan halal terdiri dari empat macam yaitu *wajib*, *sunnah*, *mubah*, dan *makruh*. Selanjutnya, tidak semua halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Padahal yang diperintahkan al-Quran adalah makanan yang halal lagi baik (Shihab, 2012).

Persyaratan makanan yang baik (*thayyib*) menurut ilmu gizi ialah segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya untuk memenuhi kesehatan dalam arti luas bukan hanya bebas dari penyakit, melainkan sehat fisik, sehat mental dan sehat sosial sehingga mampu bekerja, berproduksi dan bersilaturahmi dengan sesama. Untuk memenuhi fungsi-fungsi ini, maka perlu batas minimal yang variasi individunya sudah diperhitungkan (Minarno, 2008).

Apabila kolesterol yang dimasukkan ke dalam tubuh lebih dari yang diperlukan maka kadar kolesterol darah akan meningkat melebihi angka normal. Misalnya banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak tinggi. Kelebihan kolesterol akan bereaksi dengan zat-zat lain dan mengendap dalam pembuluh darah arteri yang disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis (pemblokiran aliran darah akibat pembekuan lemak yang mengendap dalam pembuluh darah) sehingga mengganggu proses sirkulasi darah ke jantung. Pada akhirnya, bila kondisi ini terus berlanjut maka akan timbul terjadinya penyakit

kardiovaskular. Apabila penyumbatan terjadi di pembuluh darah yang mensuplai darah ke dinding jantung maka menyebabkan penyakit jantung koroner. Disinilah kolesterol menjadi musuh bagi manusia karena berperan negatif terhadap kesehatan (Nilawati, 2008).


Aterosklerosis adalah bentuk arteriosklerosis dan berhubungan dengan plak pada pelapisan dalam pembuluh arteri. Plak terbentuk dari lemak, sebagian besar dari kolesterol, tetapi juga dari trigliserida dan fosfolipid, termasuk zat-zat seperti platelet, fibrin, kalsium, dan jaringan ikat. Pertumbuhan plak yang terjadi secara berangsur-angsur selama waktu tertentu, melukai lapisan dinding arteri (endotelium). Pada akhirnya, jaringan endotelial yang cedera akan mengalami nekrosis atau mati sehingga timbul pertumbuhan jaringan ikat yang berlebihan di sekitar daerah yang rusak tersebut sehingga membentuk jaringan parut. Parut ini menimbulkan pertumbuhan plak yang semakin banyak. Setelah bertahun-tahun plak terakumulasi, transpor darah menjadi kian sempit, dan gumpalan darah terbentuk di sekitar plak, memblokir bahkan menghentikan transpor darah ke pembuluh arteri mana saja di seluruh tubuh, tetapi ketika hal ini terjadi pada pertumbuhan arteri koroner, proses ini disebut sebagai penyakit arteri koroner atau penyakit jantung (Durstine, 2012).

Apabila aterosklerosis terjadi pada pembuluh darah di otak, maka pembuluh darah itu akan menyempit dan mengeras, sehingga aliran darah yang membawa oksigen dan zat gizi akan terganggu dengan akibat bagian otak yang tidak menerima suplai oksigen itu akan rusak. Kasus ini disebut stroke iskemik dengan gejala kelumpuhan anggota badan (Minarno, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas telah dijelaskan bahwa semua komponen zat makanan memiliki kadar tertentu tidak lebih dan tidak kurang, begitupun dengan kadar kolesterol dalam darah.

2. Sistem pengangkutan Kolesterol


Kolesterol adalah senyawa lemak kompleks yang 80% dihasilkan dari dalam tubuh (organ hati) dan 20% sisanya dari luar tubuh (zat makanan) untuk bermacam-macam fungsi didalam tubuh, antara lain membentuk dinding sel. Kolesterol yang berada dalam zat makanan yang kita makan dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. Tetapi, sejauh pemasukan kolesterol atau asupan makanan seimbang dengan kebutuhan, tubuh tetap akan sehat (Ramadhan, 2010).



Gambar 2.1 Struktur Kolesterol

Sumber: www.chem-is-try.org

Kolesterol tidak dapat bergerak sendiri didalam tubuh karena tidak larut dalam air. Oleh karena itu, kolesterol di angkut sebagai bagian dari struktur yang bernama lipoprotein. Lipoprotein sebagai kereta yang mengangkut kolesterol ke seluruh tubuh (Morrel, 2007).



Gambar 2. 2 Struktur Lipoprotein

Sumber : Vikram Zairam, 2012

Ada empat kelompok utama lipoprotein yang telah teridentifikasi. Kelompok lipoprotein ini mempunyai makna yang penting secara fisiologis dan untuk diagnosa klinis. Adapun empat kelompok lipoprotein tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kilomikron

Kilomikron mempunyai diameter 75-1000 nm dan densitas <0.95 , diproduksi oleh intestinum (usus), sangat kaya akan triasilgliserol yang berasal dari makanan (85-95%), miskin akan kolesterol bebas dan fosfolipid dan mengandung sekitar 1-2% protein. Triasilgliserol pada kilomikron di hidrolisis oleh lipase lipoprotein menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Kilomikron bertanggungjawab dalam transport lipida dari makanan ke dalam sirkulasi.

b. VLDL (*Very Low Density Lipoprotein*)

Sebagian dari VLDL dibentuk di dinding usus dan sebagian lain di sintesis didalam hati. VLDL merupakan lipoprotein yang paling banyak mengandung trigliserida dengan bantuan lipoprotein lipase untuk digunakan sebagai energi dan sebagai cadangan lemak. Dengan melepaskan trigliserida VLDL dapat mengikat kolesterol, fosfolipid dan protein dari lipoprotein lain dalam aliran darah dan dengan demikian VLDL berubah menjadi LDL.

c. LDL (*Low Density Lipoprotein*)

LDL adalah lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol, fosfolipid dan protein sedangkan kandungannya trigliseridanya berkurang. Dalam bentuk LDL inilah kolesterol dialirkan melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Bila kadar LDL tinggi, maka kolesterol LDL itu dapat mengendap dan menempel pada lapisan pembuluh darah dan membentuk plak sehingga saluran darah menjadi sempit. Bila hal ini terjadi bertahun – tahun maka terjadi penyumbatan dan pengerasan pembuluh darah, kelainan ini disebut aterosklerosis.

d. HDL (*High Density Lipoprotein*)\

HDL disintesis dan disekresi oleh hati dan usus. Fungsi HDL adalah sebagai pengangkut kolesterol dalam darah dari jaringan tubuh ke hati, jadi kebalikan dari fungsi LDL. Bila pada dinding pembuluh darah ada plak endapan kolesterol, maka akan membersihkannya dengan cara melarutkan plaknya dan mengangkut kolesterolnya ke hati. Didalam jaringan hati, kolesterol itu akan diubah menjadi garam empedu dan

sebagian lain dieskresi ke feses. Jadi HDL berperan sebagai pelarut dan pembersih kolesterol, sehingga mencegah terjadinya aterosklerosis.

Tabel 2.1 Susunan Lipoprotein dalam Darah

| LIPOPROTEIN | ASAL | UKURAN (nm) | DENSITAS |
|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| KILOMIKRON | Usus | 75-1000 | <0.95 |
| VLDL | Hati dan Usus | 30-80 | 0.95-1.006 |
| LDL | VLDL | 20 | 1.019-1.063 |
| HDL | Hati dan Usus | 50 | 1.063-1.21 |

| LIPOPROTEIN | PROTEIN (%) | LEMAK (%) | KOLESTEROL (%) | TRIGLISERIDA (%) | FOSFOLIPID (%) |
|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| KILOMIKRON | 1 | 99 | 3 | 86 | 8.5 |
| VLDL | 8 | 92 | 23 | 56 | 20 |
| LDL | 20 | 80 | 43 | 29 | 26 |
| HDL | 50 | 50 | 41 | 16 | 43 |

Sumber: Vikram Zairam, 2012

Lipoprotein membawa kolesterol dalam bentuk yang berbeda – beda. Empat klasifikasi umum lipoprotein ini yaitu *chylomicron*, lipoprotein berkepadatan sangat rendah (VLDL), lipoprotein berkepadatan rendah (LDL), dan lipoprotein berkepadatan tinggi (HDL). Semuanya berhubungan dengan risiko penyakit jantung (lihat tabel 1.2). Adapun hubungan lipoprotein dengan risiko penyakit jantung adalah sebagai berikut:

- a. Kilomikron terbentuk saat pencernaan dan penyerapan dari usus, merupakan pembawa utama trigliserida dan dilepas dalam darah setelah makan. Periode

waktu ini sering kali disebut periode pascaprandial. Ketika berpuasa, atau tidak makan setidak – tidaknya selama 10 jam, kadar *chylomicron* darah menjadi kosong, jika kadar *chylomikron* meningkat saat puasa dihubungkan dengan risiko penyakit jantung.

- b. VLDL sebagian besar di bentuk didalam hati dan merupakan transporter utama trigliserida pasca-absorpsi keseluruhan jaringan tubuh (periode pasca absorpsi adalah periode saat seluruh lemak darah yang berasal dari pencernaan dibuang, biasanya delapan jam setelah makan). Produksi trigliserida yang berlebihan oleh hati disebut *hypertriglyceridemia*. Kadar VLDL yang meningkat saat berpuasa berhubungan dengan meningkatnya beberapa risiko penyakit jantung.
- c. LDL dibentuk oleh partikel VLDL, dengan proses yang disebut reseptor LDL. Saat partikel VLDL terpecah menjadi bagian – bagian yang lebih kecil oleh enzim darah yang disebut lipoprotein lipase, sebagian kecil trigliserida mengalir kedalam jaringan (misalnya sel – sel lemak, sel – sel otot). Satu bagian yang terbentuk dari proses ini adalah partikel LDL, yang merupakan transporter utama kolesterol ke seluruh jaringan tubuh. Kolesterol LDL (LDL-C) merupakan prediktor kuat risiko penyakit jantung.
- d. HDL terbentuk didalam hati dan usus kecil, kemudian dilepaskan kedalam darah. HDL berfungsi dalam proses aliran berbeda disebut aliran kolesterol balik, dari bagian lain lipoprotein tersebut. Dalam proses ini, HDL mengumpulkan kolesterol dari jaringan dan mengalirkan kedalam hati. Setelah itu, partikel ini dibuang dari darah dan tubuh. Karena HDL mengalirkan kolesterol kembali ke hati sehingga dapat dialirkan kembali

keseluruh tubuh, HDL disebut sebagai kolesterol baik dan tidak meningkatkan risiko penyakit jantung jantung.

Tabel 2.2 Lipoprotein Dan Risiko Penyakit Jantung

| Lipid atau lipoprotein | Hubungan dengan penyakit jantung |
|-------------------------------|--|
| Chylomicron | Berhubungan dengan peningkatan risiko |
| VLDL | Cukup berhubungan dengan peningkatan risiko |
| LDL | Sangat berhubungan dengan peningkatan risiko |
| HDL | Sangat berhubungan dengan penurunan risiko |

(Sumber: Durstine, 2012)

3. Jalur Transpor Lipoprotein

Lipid darah, lipoprotein, dan sistem kardiovaskular bertanggungjawab atas aliran dan pertukaran kolesterol, dan trigliserida diantara usus halus, hati, dan seluruh jaringan tubuh.

a. Jalur Reseptor LDL

Jalur reseptor LDL terdiri atas serangkaian tahap untuk mengirim kolesterol ke seluruh jaringan tubuh. Lemak makanan juga disebut lemak eksogen, dicerna oleh usus halus dan diserap sebagai kolesterol, trigliserida, dan asam lemak. Lemak - lemak ini bergabung dengan protein dan menjadi kilomikron, yang dilepas ke darah. Didalam darah, kilomikron mengalir keseluruh tubuh, secara terus menerus dipecah. Sebagian *chylomicron* yang dipecah, trigliserida dan *Free Fatty Acids* (FFA) dilepas sehingga dapat mengalir ke dalam sel-sel tubuh. Akhirnya, *chylomicron* darah menjadi lebih kecil dan diubah menjadi partikel VLDL. Hati adalah sumber lain VLDL, yang merupakan transporter utama lemak endogen, atau lemak yang

dihasilkan hati. Baik VLDL yang berasal dari makanan maupun lemak yang dihasilkan oleh hati, pemecahan VLDL berlanjut hingga terbentuk partikel-partikel LDL yang lebih kecil. Dalam transformasi dari VLDL menjadi LDL, trigliserida dibuang dan kolesterol ditambahkan hingga LDL yang lebih kecil (pengalir utama kolesterol darah) terbentuk. Seluruh sel tubuh memiliki reseptor pada permukaan yang mengalirkan LDL-C ke dalam sel yang digunakan untuk banyak fungsi sel, misalnya pembentukan membran dan sintesis hormon steroid. Dalam situasi normal, ketika kolesterol sel mencapai kadar tertentu, maka pengambilan dan sintesis kolesterol selanjutnya dihentikan (Durstine, 2012).

Faktor genetika dan lingkungan dapat mengganggu fungsi normal jalur reseptor LDL dan ketika hal itu terjadi, kelebihan kolesterol darah diperkirakan akan terakumulasi pada lapisan dinding arteri. Setelah akumulasi lipid ini terjadi selama beberapa waktu, mungkin bertahun-tahun, aliran darah ke jantung menjadi berkurang. Pasokan nutrien seperti oksigen juga berkurang atau bahkan berhenti. Kondisi ini umum disebut dengan penyakit jantung atau penyakit arteri koroner, dan dapat mengakibatkan terjadinya serangan jantung (Durstine, 2012).

b. Transport Kolesterol Balik

Bagian ini berhubungan dengan sejumlah reaksi kimia yang diperlukan untuk mengumpulkan kelebihan kolesterol dari jaringan perifeal dan mengalirkan kembali ke hati, untuk kemudian dibuang dari tubuh. Transpor ini dapat terjadi melewati beberapa jalur biologi yang berbeda. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa partikel HDL darah berinteraksi dengan lipoprotein lain, seperti VLDL dan LDL untuk mengumpulkan

kelebihan kolesterol dan trigliserida. Selama proses ini berlangsung, HDL berkembang hingga sangat besar atau matang dan tidak mampu mengumpulkan lipid lagi. HDL yang matang mengalir ke hati, tempat pembuangan kolesterol dan triagliserida dibuang. Partikel HDL tanpa kolesterol dan trigliserida siap untuk kembali ke dalam darah dan bersikulasi mengumpulkan kolesterol lebih banyak lagi. Seperti jalur reseptor LDL, faktor genetika dan gaya hidup berpengaruh dalam proses transport balik ini. Sebagai contoh, olahraga teratur biasanya HDL-C darah meningkat yang pada akhirnya mengurangi risiko penyakit jantung dini (Durstine, 2012).

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kadar Kolesterol

Ada beberapa factor yang mempengaruhi kadar kolesterol darah sebagai berikut :

1. Obesitas

Obesitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya kelebihan cadangan lemak (trigliserida) dalam tubuh secara abnormal. Kelebihan cadangan lemak ini akan mengakibatkan peningkatan kadar HDL darah. Obesitas merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner. Kelebihan berat badan meningkatkan resiko aterosklerosis. Orang dengan berat badan berlebih cenderung mempunyai kadar kolesterol yang tinggi dalam darah serta jumlah HDL yang rendah (Nilawati, 2008).

Secara ilmiah, obesitas terjadi akibat mengkonsumsi lemak tubuh lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh. Obesitas terjadi oleh karena ketidakseimbangan antara jumlah makanan yang masuk dan keluar. Rata-

rata wanita memiliki lemak tubuh yang lebih banyak dibandingkan pria. Perbandingan normal antara lemak tubuh dengan berat badan adalah sekitar 25-30% pada wanita dan 18-23% pada pria. Wanita dengan lemak tubuh lebih dari 30% dan pria dengan lemak tubuh lebih dari 25% dianggap mengalami obesitas (Proverawati, 2010).

2. Aktivitas Fisik

Latihan fisik teratur terutama latihan yang bersifat aerobik berperan penting terhadap peningkatan kebugaran tubuh, dan sekaligus berperan terhadap metabolisme lemak. Banyak petunjuk latihan dinamik telah diberikan seperti jalan cepat, jogging, lari, bersepeda, berenang. Salah satu hasil yang telah dibuktikan adalah tingginya kadar HDL pada orang - orang terlatih. Latihan fisik yang dilakukan 30 menit akan memberikan efek meningkatkan aliran darah, di lain pihak akan membantu memecahkan metabolisme lemak secara aerobik dan pada akhirnya akan menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Anies, 2006).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol. Berdasarkan hasil penelitian Mamat dan Sudikno (2010) menyatakan bahwa presentasi kadar kolesterol tidak normal lebih tinggi pada responden dengan aktivitas kurang yaitu sebesar 82.7 persen dibandingkan dengan presentasi kadar kolesterol tidak normal pada responden yang aktivitas fisiknya cukup. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa responden dengan aktivitas fisik kurang memiliki odd ratio untuk mengalami kadar kolesterol tidak normal sebesar 1.64 kali dibandingkan dengan responden yang aktivitas fisiknya cukup.

3. Keturunan (Genetik)

Sekitar 1 dari 500 orang di Inggris menyandang hiperkolestomia familial. Kalainan ini diturunkan dan angka kejadiannya hampir sama dengan diabetes yang bergantung insulin (tipe 1). Kemungkinan penyakit ini diturunkan adalah 50/50, artinya jika ada dari salah satu pasangan menyandang *hiperkolesteromia familial*, maka anaknya memiliki kemungkinan 50/50 menyandang penyakit ini. Pada penyandang *hiperkolesteromia familial*, mekanisme pengeluaran kolesterol LDL dari sirkulasi bekerja kurang efektif, artinya kadar kolesterol dalam darah mereka dapat mencapai dua atau tiga kali lipat di atas normal. Kadar kolesterol tinggi yang abnormal pada penyandang hiperkolesterolemia familial dapat menyebabkan penyakit vaskular dini seperti serangan jantung dan stroke (Morrel, 2007).

4. Merokok

Dampak dari rokok terhadap penurunan kadar kolesterol disebabkan oleh beberapa kandungan rokok yang dianggap beracun, sebagaimana yang disampaikan Arief (2009) bahwa dalam satu batang rokok terdapat lebih dari 4000 jenis bahan kimia, 40 persen di antaranya beracun. Bahan kimia yang berbahaya terutama nikotin, tar, hidrokarbon, karbon monoksida dan logam berat dalam asap rokok. Salah satu zat kimia yang ditemukan pada rokok adalah akrolein. Zat ini dapat menghentikan atau menurunkan aktivitas kadar kolesterol baik atau HDL untuk mengangkut timbunan lemak menuju hati sehingga terjadi penyempitan areteri atau aterosklerosis. Risiko seorang perokok untuk menderita penyakit arteri koroner secara langsung berhubungan dengan jumlah rokok yang dihisap setiap harinya.

Berdasarkan hasil penelitian Mamat dan Sudikno (2010), kebiasaan merokok menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan presentase kadar kolesterol HDL tidak normal dengan meningkatnya jumlah rokok yang dihisap responden per hari. Presentase kadar kolesterol HDL tidak normal pada perokok berat sebesar 92 persen lebih tinggi dibandingkan dengan presentase kadar kolesterol HDL tidak normal pada perokok ringan maupun pada perokok sedang. Hasil analisa menunjukkan bahwa responden yang merupakan perokok berat memiliki odd ratio untuk mengalami kadar kolesterol HDL tidak normal sebesar 4.7 kali dibandingkan responden yang tidak merokok.

5. Usia dan Jenis Kelamin

Usia merupakan salah satu risiko alami. Faktor usia jelas berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang. Hal itu terjadi karena semakin tua, kemampuan mekanisme kerja bagian - bagian organ tubuh seseorang juga akan semakin menurun. Semakin lama usia organ tubuh itu bekerja maka semakin menumpuk pula kotoran-kotoran, dalam hal ini kolesterol yang menyertai aktivitas organ tubuh tersebut. Bila pola hidup yang salah bisa menyebabkan persoalan kolesterol, proses terbentuknya aterosklerosis seolah-olah dipercepat. Keadaan ini potensial meningkat terjadinya penyakit kardiovaskular pada usia dewasa. Misalnya, pada wanita sebelum masa menopause mempunyai kadar kolesterol lebih rendah dari pada pria dengan usia yang sama (Nilawati, 2008).

Menurut Brook (2008) dalam Sari (2011) Wanita setelah mengalami pubertas akan terjadi penimbunan lemak badan akibat pengaruh hormon esterogen dan progesteron, dengan bertambahnya usia akan bertambah pula

lemak badannya. Pada wanita dewasa, jaringan lemak menunjukkan peningkatan akibat proses penuaan dan akan terus meningkat sampai usia sekitar 60 tahun. Oleh karena itu wanita setelah menopause kadar LDL wanita cenderung meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian Mamat dan Sudikno (2010) menyatakan bahwa kadar kolesterol HDL pada perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Perbedaan ini disebabkan karena wanita memiliki hormon estrogen. Menurut Yuliana (2007), kekurangan estrogen pada wanita menopause akan menurunkan kadar kolesterol HDL.

6. Pola Makan

Makanan sehari-hari dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, terutama trigliserida dan lemak jenuh sangat berpengaruh terhadap peninggian kadar kolesterol darah (Bahri, 2004). Trigliserida dan lemak jenuh berbahaya bagi tubuh karena merangsang hati untuk memproduksi banyak kolesterol yang juga berperan akan munculnya penyakit jantung. Karena kolesterol yang mengendap lama-kelamaan akan menghambat aliran darah dan oksigen sehingga mengganggu metabolisme sel otot jantung. Untuk menghindari penimbunan kolesterol dalam pembuluh darah, seseorang perlu menghindari lemak jenuh seperti lemak sapi, kambing, makanan bersantan dan gorengan karena dapat meningkatkan kadar kolesterol darah (Harsanawis, 2008).

7. Stress

Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa baik hormon stres, yaitu adrenalin maupun kortisol, dipercaya bisa mendorong produksi kolesterol dalam tubuh. Produksi kolesterol diperlukan tubuh antara lain untuk

memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun masalahnya, jika produksi kolesterol terlalu banyak karena stres bisa menyumbat pembuluh darah arteri yang pada akhirnya mengakibatkan serangan jantung atau bahkan stroke.

Sebuah teori menyebutkan, hormon stres (adrenalin dan kortisol) berperan juga dalam menyediakan energi cadangan dalam tubuh. Tetapi jika energi itu tidak digunakan, misalnya karena seseorang tak berolahraga, maka energi itu akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Kortisol berfungsi untuk mengatur tekanan darah dan sistem kekebalan tubuh. Namun hormon ini juga akan membantu membuat energi cadangan dalam bentuk gula yang bisa digunakan dalam jangka pendek. Tapi jika gula itu tidak segera dimanfaatkan, dengan kata lain, tubuh kurang aktif, gula tersebut akan dikonversi menjadi trigliserida atau asam lemak. Keduanya merupakan bahan untuk memproduksi kolesterol. Sebagai hormon stres, kadar adrenalin dan kortisol akan meningkat jika seseorang stres. Tetapi setiap orang memiliki respon yang berbeda - beda terhadap stres, begitu pula penyebab dan cara untuk mengatasinya. Penelitian yang dilakukan oleh *University of Missouri Science and Technology* membuktikan kalau seseorang yang memiliki kecenderungan stres tinggi dapat mengurangi kadar kolesterol dengan cara mengurangi konflik di tempat kerja, mengatur pekerjaan lebih baik, dan sebagainya.

Penelitian lain yang dilakukan *The National Institute of Health* menyarankan sejumlah cara untuk mengurangi stres seperti relaksasi, berolahraga, yoga dan tidur selama 8 jam sehari.

B. Tinjauan Umum Tentang Olahraga Aerobik dan Senam Aerobik *Mix Impact*

1. Olahraga Aerobik Untuk Mengontrol Kadar Kolesterol Darah

Aktivitas fisik bermanfaat bagi setiap orang karena dapat meningkatkan kebugaraan, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru dan otot serta memperlambat proses penuaan. Olahraga dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi akan menggunakan lemak sebagai bahan untuk metabolisme, dijadikan energy dalam bentuk ATP (Alim, 2011).


Olahraga menjadi kebutuhan hidup yang sifatnya periodik. Artinya olahraga merupakan alat untuk memelihara dan membina kesehatan yang tidak dapat ditinggalkan. Olahraga menjadi gerakan olah tubuh yang memberi efek pada tubuh secara keseluruhan. Pentingnya olahraga tidak hanya melatih otot - otot, sirkulasi darah, dan oksigen dalam tubuh lancar sehingga metabolisme tubuh optimal. Tubuh bisa terasa segar dan otak sebagai pusat saraf pun bekerja lebih baik. Olahraga tidak sekedar menggerakkan tubuh, menghasilkan keringat, dan merasa kelelahan, melainkan kegiatan yang berguna bagi tubuh. Ada beberapa manfaat olahraga secara umum antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kemampuan otak, mengurangi stress, meningkatkan energi tubuh, metabolisme tubuh meningkat dan menurunkan resiko penyakit serta dapat membakar lemak (Muchtadi, 2009).

Olahraga merupakan salah satu jenis aktivitas fisik yang direncanakan dan diberi struktur dengan gerakan tubuh berulang-ulang yang berpotensi menimbulkan stressor yang dapat dikondisikan dalam waktu tertentu sehingga menjadi stimulator yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas fisiologi dan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan latihan, maka mekanisme homeostatis melibatkan berbagi fungsi hormonal, saraf dan sistem-sistem lain didalam

tubuh. Konsep fisiologi olahraga meliputi daya tahan jantung, kekuatan otot, tahan otot dan lainnya (Fatmah, 2011).

Gerakan tubuh saat melakukan olahraga dapat terjadi karena otot berkontraksi. Kontraksi otot memerlukan energi dalam bentuk ATP (*Adenosin Tri Phosphate*). Olahraga aerobik dan anaerobik, keduanya memerlukan energi. Energi yang diperlukan itu didapat dari energi potensial yaitu energi yang tersimpan dalam makanan berupa energi kimia, dimana energi tersebut akan dilepaskan setelah bahan makanan mengalami proses metabolisme dalam tubuh (Kusumaningtyas, 2011).

Proses metabolisme energi secara aerobik merupakan proses metabolisme yang terjadi di dalam mitokondria dan membutuhkan kehadiran oksigen (O_2) agar prosesnya dapat berjalan dengan sempurna untuk menghasilkan ATP. Pada saat berolahraga, kedua simpanan energi tubuh yaitu simpanan karbohidrat (glukosa darah, glikogen otot dan hati) serta simpanan lemak dalam bentuk trigeliserida akan memberikan kontribusi terhadap laju produksi energi secara aerobik di dalam tubuh. Secara singkat proses metabolisme energi secara aerobik seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Energi dalam metabolisme aerobik (sumber: Anwari, 2007)

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa untuk meregenerasi ATP, 3 simpanan energi akan digunakan oleh tubuh yaitu simpanan karbohidrat (glukosa, glikogen), lemak dan juga protein. Diantara ketiganya, simpanan karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama saat proses aerobik. Metabolisme lemak adalah salah satu metabolisme aerobik. Metabolisme lemak sangat berpengaruh terhadap kadar kolesterol darah. Langkah awal dari metabolisme energi lemak adalah melalui proses pemecahan lemak yang terdapat didalam tubuh yaitu trigliserida yang merupakan bahan utama pembentuk VLDL, kolesterol dan LDL-C. Melalui proses yang dinamakan lipolisis, trigliserida akan dikonversikan menjadi asam lemak (*fatty acid*) dan gliserol. Kedua molekul yang dihasilkan melalui proses ini kemudian mengalami jalur metabolisme yang berbeda di dalam tubuh. Gliserol yang terbentuk akan masuk ke dalam siklus metabolisme untuk diubah menjadi glukosa atau juga asam piruvat. Sedangkan asam lemak yang terbentuk akan dipecah menjadi unit-unit kecil melalui proses yang dinamakan β -oksidasi untuk kemudian menghasilkan energi (ATP) di dalam mitokondria sel.

Metabolisme lemak ini sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Anwari, 2007).

Ketahanan kardiovaskular mengacu pada kemampuan jantung dan sistem sirkulasi untuk bekerja selama periode waktu tertentu dengan sedikit rasa lelah. Perbaikan ketahanan kardiovaskular dicapai melalui olahraga aerobik. Bentuk olahraga aerobik atau ketahanan, misalnya berjalan, jogging, berlari, senam, berenang, dan bersepeda. Karena olahraga aerobik atau ketahanan ini meningkatkan kerja sistem kardiovaskular dan meningkatkan kemampuan jantung untuk mengalirkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh, maka olahraga ini disebut juga olahraga ketahanan vaskular. Selain meningkatkan kekuatan dan ketahanan kardiovaskular, olahraga aerobik secara positif berpengaruh terhadap seluruh faktor risiko penyakit jantung, maka olahraga ini kerap menjadi pilihan. Dengan melakukan olahraga aerobik olahraga ini dalam jumlah tertentu, maka manfaat kesehatannya menjadi lebih baik. Olahraga ini menjadi salah satu alternatif yang diperlukan untuk mengubah profil lipid dan lipoprotein dan dampaknya pada setiap komponen kolesterol (Durstine, 2012).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga yang semakin canggih maka senam aerobik pun mengalami perkembangan yang besar. Kombinasi bentuk-bentuk latihan merupakan upaya membuat senam aerobik semakin menarik dan menyenangkan. Mulai dari mengikutsertakan unsur musik, koreografi, sampai gerakan-gerakan bela diri. Namun dari sifat dan kelasnya, secara garis besar aerobik dibagi dalam tiga macam, yakni (Yudha, 2008):

- a. *Low impact* adalah gerakan aerobik yang dilakukan dengan intensitas rendah, antara lain dengan hentakan-hentakan ringan di lantai. Pada senam aerobik, ketukan-ketukan musik biasanya lebih lembut. Pada saat jogging, kaki tidak terangkat tinggi.
- b. *High impact* adalah gerakan aerobik yang dilakukan dengan intensitas tinggi, biasanya untuk memicu system kardiovaskular. High impact dilakukan dengan ketukan-ketukan musik yang lebih keras, gerakan-gerakan dinamis dan kencang, serta lutut diangkat tinggi sehingga menahan gerakan tubuh lebih berat.
- c. *Mix impact* adalah gerakan aerobik yang mengkombinasikan jenis *low impact* dan *high impact*. Gerakan ini dimaksudkan untuk variasi latihan agar tidak jenuh dan cepat lelah karena tubuh terus menerus dipacu dengan gerakan-gerakan *high impact*.

2. **Senam Aerobic Mix Impact**

Senam aerobik adalah suatu rangkaian dari latihan-latihan aerobik seperti *jogging, running, walking, dan jumping* yang disusun sedemikian rupa dengan penghubung yang serasi dengan music yang menyatu dengan gerakan, dengan memperhatikan gerakan-gerakan lengan, pinggang, tungkai yang bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berkelompok. Seperti halnya olahraga, senam aerobik ini juga memiliki macam-macam dalam latihan, yaitu senam aerobik *low impact*, senam aerobik *mix impact*, dan senam aerobik *high impact* (Budiyono, 2015).

Senam mix impact merupakan gabungan dari senam aerobik *low impact* dan *high impact* yang berupa latihan-latihan *mix-impact* aerobik yaitu separuh waktu untuk *low impact aerobic* (benturan ringan: salah satu kaki selalu masih berada dilantai) dan separuh waktunya untuk *high impact aerobic* (benturan

keras: kedua kaki terlepas dari lantai). Hal ini dimaksudkan agar peserta latihan dapat menggunakan berbagai macam otot dalam tubuh mereka. Diantaranya otot-otot kaki yang digunakan untuk melompat dan juga mengangkat badan serta otot-otot lengan yang menyebabkan jantung memompa lebih keras. Kombinasi *low impact aerobic* dan *high impact aerobic* dapat membantu memperbaiki daya tahan dan kondisi peredaran darah dalam tubuh.

Menurut *American College of Sport Medicine* (2009), intensitas latihan aerobik harus mencapai target zone sebesar 60-90% dari frekuensi denyut jantung maksimal atau *Maximal Heart Rate* (MHR). Intensitas latihan aerobik dikatakan ringan apabila mencapai 60-69% dari MHR, intensitas latihan aerobik dikatakan sedang apabila mencapai 70-79% dari MHR, dan intensitas latihan aerobik dikatakan tinggi apabila mencapai 80-89% dari MHR. Untuk menentukan denyut nadi maksimal adalah $220 - \text{usia} \times \text{intensitas latihan}$. Peningkatan intensitas latihan dapat ditingkatkan dengan menambah beban latihan dengan gerakan melompat-loncat atau dengan mempercepat gerakan senam. *American College of Sport Medicine* (ACSM) merekomendasikan frekuensi latihan aerobik 3-5 kali perminggu dengan durasi latihan 20-30 menit setiap kali latihan.

Senam aerobik ini sangat ideal bagi mereka yang membutuhkan olahraga beresiko rendah dan penderita kegemukan. Ada berbagai jenis musik yang dapat digunakan untuk aerobik, juga kecepatan yang berbeda-beda dan variasi gaya aerobik. Ada pedoman untuk musik aerobik, biasanya sekitar 120-124 bit per menit untuk aerobik melangkah. Untuk latihan yang beresiko rendah, biasanya sekitar 136-148 bit per menit. Para pemula pun bisa menari dan berkeringat dengan irama lambat. Senam aerobik semacam ini memiliki banyak

manfaat walaupun dilakukan atau dipraktekkan dengan cara yang menyenangkan. Aerobik semacam ini adalah olahraga yang bagus untuk menurunkan berat badan dan menyehatkan otot – otot tubuh. Hal ini juga akan membantu tubuh membangun kekuatan tulang yang kebanyakan memopong berat badan dan juga menguatkan otot jantung. Sama seperti olahraga lainnya, senam aerobik ini dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kadar gula darah dan kolesterol (Alim, 2011).

3. Olahraga yang dianjurkan pada Masa Rasulullah SAW

Olahraga merupakan salah satu bentuk kebudayaan manusia yang ada dalam berbagai bentuk, bahkan dalam semua kebudayaan yang paling tua sekalipun. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan ummatnya untuk berolahraga. Tetapi kurang tepat kiranya ketika dikatakan olahraga dalam Islam hanya renang, memanah , dan berkuda saja. Rasulullah SAW mengajurkan tiga bentuk olahraga tersebut karena sesuai dengan konteks realita historis pada saat itu. Artinya ketika zaman berkembang dan olahraga juga ikut berkembang sebagai bagian dari kebudayaan manusia yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Maka olahraga apapun bentuknya boleh dilakukan asalkan dapat menyehatkan dan menguatkan badan.

Senam mix impact yang merupakan salah satu bentuk olahraga yang merupakan gabungan dari senam aerobik *low impact* dan *high impact* secara praktik telah ada pada masa rasulullah SAW. Hal ini dibuktikan dengan adanya hadits-hadits nabi yang memerintahkan berolahraga, seperti memanah, berenang, dan berkuda.

Salah satu redaksi hadis tersebut sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَامٍ الدَّمَشَقِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَمُرُّ بِي فَيَقُولُ يَا خَالِدُ اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرُكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبَلَّهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَلَيْسَ اللَّهُوَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسُهُ وَمَلَاعِبَتِهِ امْرَأَتُهُ وَرَمِيهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَ بِهَا

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Al Hasan bin Isma'il bin Mujalid berkata; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Salam Ad Dimasyqi dari Khalid bin Yazid Al Juhani berkata; 'Uqbah bin 'Amir melewatiku dan berkata, "Wahai Khalid, keluarlah bersama kami untuk melempar." Kemudian pada suatu hari aku memperlambat jalan darinya, kemudian ia berkata, "Wahai Khalid, kemarilah. Aku kabarkan kepadamu apa yang telah disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian aku datang kepadanya dan ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, dengan satu anak panah Allah memasukkan tiga orang ke dalam Surga; yaitu pembuatnya yang dalam membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang memanah dan orang yang

mengambilkan anak panah. Panah dan berkudalah, dan kalian memanah lebih aku sukai daripada kalian berkuda. Tidak ada hiburan kecuali dalam tiga hal; seorang laki-laki yang melatih kudanya, candaan seorang terhadap isterinya, dan lemparan anak panahnya. Dan barangsiapa yang tidak melempar setelah ia mengetahui ilmunya karena tidak menyenangkannya, maka sesungguhnya hal itu adalah kenikmatan yang ia kufuri” (HR. Al-Thabrani).

Dari hadits diatas dapat diklasifikasikan beberapa olahraga yang ada pada masa Rasulullah, yaitu:

a. Memanah

Berdasarkan hadis tentang memanah, mayoritas ditemukan pada bab tentang jihad berarti dahulu memanah adalah aktifitas olahraga yang tujuannya bermanfaat bagi tubuh sambil berjihad di medan perang. Malah dalam sejarah, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya dikatakan bahwa memanah itu aktifitas orang Arab yang sangat disukai Nabi saw. dan ketika ada kegiatan mengenai memanah Nabi saw. memfasilitas sahabat untuk mengembangkan bakat itu. Dalam hadisnya ditemukan pada riwayat al-Bazzar bahwa :

عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ أَوْ مِنْ خَيْرٍ لَّهُوِكُمْ

Terjemahannya:

“Tekunilah aktifitas memanah karena sesungguhnya itu adalah permainan terbaik untuk kalian.”

Secara sederhana, jika ada kata mengenai “permainan terbaik untuk kalian”, menandakan bahwa tidak ada lagi permainan yang lebih bagus dan lebih baik setelahnya. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa: ”ingatlah, bahwa kekuatan terletak pada memanah.” Kata ini berulang tiga kali. Berarti sudah jelas bahwa tujuan dari memanah adalah agar fisik kita sehat, tubuh

kita kuat, mental kita perkasa, konsentrasi kita terjaga, dan siap ke medan perang.

Namun praktek memanah, dahulu sesungguhnya dilakukan agar masyarakat islam mengaplikasikannya untuk membela islam yang selalu diserang oleh kaum jahiliyah, dengan memanah berarti menggunakan serangan jarak jauh yang kira kira jangkauan serangannya maksimal 40 meter. Berarti memanah adalah aktifitas perang yang menyerang dengan pola serangan jarak jauh seperti juga menggunakan ketapel pada masa itu. Melihat kondisi sekarang, memanah tidak lagi digunakan pada perang dengan serangan jarak jauh, tapi memanah hanya keahlian khusus bagi ninja untuk serangan jarak dekat.

b. Berkuda

Secara fisik kuda tentu lebih kuat dari penunggangnya, namun sang penunggang tetap harus menguasai kuda tersebut agar dia bisa sampai ke tujuannya. Demikian pula dalam kehidupan manusia. Sering kali harus memimpin orang-orang yang lebih pintar, lebih kuat dan lebih banyak memiliki kelebihan. Berkuda dalam hal ini adalah simbol dari hidup dan pengendalian diri, rasa percaya diri dan keberanian.

Berkuda amat baik untuk kesehatan manusia. Seluruh anggota tubuh badan dari kepala hingga ke kaki, dari fisik maupun mental akan mendapat manfaatnya. Bentuk lekuk badan belakang kuda sampai tempat di tunggangnya kuda baik untuk merawat segala masalah tulang belakang manusia. Penunggang kuda yang hebat selalu bebas dari mengalami sakit belakang atau masalah dalam 'berhubungan'. Selain itu menunggang kuda

turut mencerahkan mata sebab terdapat rangsangan terhadap saraf kranial semasa gerakan 'galloping' kuda.

c. Berenang

Berenang adalah sebuah olahraga yang dilaksanakan untuk melatih pernafasan dan melatih kekuatan kaki dan tangan. Selain untuk memperkuat otot, olahraga renang juga bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas, postur, dan keseimbangan. Hal ini karena berenang adalah latihan *low impact* yang bekerja untuk seluruh tubuh pada saat bersamaan. Dengan demikian, berenang memaksa tubuh menyesuaikan diri secara alami sehingga inti tubuh dan punggung lebih kuat. Selain itu berenang juga bermanfaat mengontrol berat badan, baik untuk persendian, pelepas stress, dan membangun jantung yang sehat.

Inti dalam olahraga renang adalah pengaturan nafas. Dimana Fungsi nafas adalah untuk memasukan atau menghirup oksigen dari Alam ke dalam tubuh kita melalui paru-paru. Oksigen yang kita hirup masuk ke paru-paru, lalu aliran darah dari jantung masuk ke paru-paru. Paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan (respirasi) dan berhubungan dengan sistem peredaran darah (sirkulasi) yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut "pernapasan eksternal" atau bernapas.

Selain itu ketiga olahraga diatas pada masa Rasulullah SAW sesuai dengan ideal moral hadis tentang anjuran Rasulullah SAW oleh karena memanah, berkuda dan berenang merupakan bentuk olahraga yang dapat membantu dalam peperangan pada masa tersebut. Ketiga olahraga tersebut

membutuhkan tubuh yang sehat, kuat dan bugar untuk dapat memenangkan perang pada saat itu.

4. Hubungan Senam Aerobik *Mix Impact* Terhadap Perubahan Kadar Kolesterol

Senam aerobik intensitas tinggi memerlukan ATP yang banyak dalam waktu singkat sehingga akan terjadi defisit oksigen ke otot yang aktif karena keterbatasan sistem kardiovaskuler dalam memasok oksigen. Akibatnya, sebagai sumber energi utama untuk kontraksi otot pada senam aerobik intensitas tinggi adalah karbohidrat. Sebaliknya, pada senam aerobik intensitas ringan, karena waktu yang cukup, sistem kardiovaskuler masih mampu memenuhi kebutuhan oksigen otot adalah lemak. Adapun sumber energi pada senam aerobik intensitas sedang adalah karbohidrat dan lemak secara seimbang. Lemak sebagai sumber energi dapat diperoleh dari pembongkaran jaringan lemak simpanan yaitu, jaringan lemak subkutan dan viseral (Sudibjo, 2005).

Intensitas olahraga mempengaruhi dalam perubahan profil lipid darah. Semakin besar intensitas olahraga yang dilakukan, kemungkinan untuk menurunkan kadar kolesterol semakin besar sehingga resiko terjadinya penyakit jantung koroner akan berkurang. Latihan intensitas sedang yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama menyebabkan asam lemak digunakan sebagai energi yang akan memperkecil peluang sintesis inti sterol sehingga kolesterol tidak terbentuk secara berlebihan dalam tubuh. Pada proses ini degradasi lemak pengaruh aktif terjadi pada latihan intensitas sedang dengan durasi lebih dari 30 menit secara kontinyu. Keadaan ini sebagian besar disebabkan oleh terjadinya pelepasan epinefrin dan norepinefrin oleh medulla adrenal selama aktivitas.

Kedua hormon ini secara langsung mengaktifkan enzim lipase yang menyebabkan terjadinya pemecahan trigliserida yang sangat cepat dan mobilisasi asam lemak keluar dari asam lemak. Pada saat melakukan aktivitas fisik yang relatif lama terjadi peningkatan asam lemak di dalam darah yang merupakan bahan baku untuk pembentukan energi di dalam otot pada waktu melakukan aktivitas fisik. Konsentrasi asam lemak bebas dalam darah seseorang yang sedang beraktivitas dapat meningkat sampai delapan kali lipat. Kemudian asam lemak ini akan ditransfer ke dalam otot sebagai sumber energi (Guyton, 2007).


Penggunaan lemak badan pada aktivitas aerobik intensitas ringan sampai sedang akan menyebabkan penurunan lemak simpanan. Pembongkaran lemak simpanan memerlukan oksigen yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan pembongkaran karbohidrat. Pada senam aerobik intensitas ringan, energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam tingkatan ringan dan karena waktu yang cukup, sistem kardiovaskuler masih mampu mencukupi kebutuhan oksigen pada otot yang bekerja sehingga oksidasi lemak merupakan sumber energi utama untuk kontraksi otot. Begitu pula pada senam aerobik dengan intensitas sedang, walaupun energi yang dibutuhkan dalam tingkatan sedang namun masih dapat ditoleransi oleh tubuh serta didukung oleh waktu yang cukup maka energi untuk kontraksi otot juga berasal dari oksidasi lemak. Lemak yang dioksidasi ini adalah lemak simpanan yaitu lemak subkutan dan viseral (Sari, 2011).

C. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian





Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh senam aerobik mix impact terhadap perubahan kadar kolesterol darah pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan usia produktif 21-23 tahun. Banyak sekali faktor yang berhubungan dengan kolesterol tinggi. Salah satu cara untuk memperbaiki kadar kolesterol dan lipoprotein adalah dengan berfokus pada pengurangan faktor yang secara negatif memengaruhi kolesterol, berkonsentrasi khususnya pada faktor-faktor yang termudah untuk diubah: faktor gaya hidup seperti kegemukan dan kurang bergerak. Beberapa cara untuk menangani obesitas antara lain dengan berolahraga, diet dan terapi psikologis. Dari hasil penelitian, latihan fisik jauh lebih baik menurunkan berat badan dibandingkan dengan dua intervensi lain. Dan olahraga teratur akan mengurangi trigliserida darah dan LDL-C sementara meningkatkan kadar HDL-C. Rekomendasi terkini untuk mengelola nilai lipid dan lipoprotein darah telah diberikan oleh NCEP (*National Cholesterol Education Program*).

Olahraga, modifikasi diet, dan penurunan berat badan direkomendasikan sebagai terapi awal perubahan gaya hidup. Faktor lingkungan lain seperti merokok dan pengelolaan stres juga memengaruhi konsentrasi lipid dan lipoprotein. Peningkatan kadar kolesterol merupakan hal yang tidak dapat dihindari seiring dengan pertambahan usia, dan sebagian orang tidak dapat dicegah mempunyai masalah kadar lipid mereka karena mereka memiliki masalah sejak lahir. Salah satu penyakit dengan kadar kolesterol LDL tinggi yang diturunkan disebut hiperkolesterolemia familial (Morrell, 2007).

D. Kerangka Konsep




Ket :

-  : Variabel Independen
-  : Variabel Dependen
-  : Variabel yang diteliti
-  : Variabel yang tidak diteliti

Gambar 2.4 Kerangka Konsep

E. Kerangka Kerja



Gambar 2.5 Kerangka Kerja

F. Variabel Yang Diteliti

Variabel Penelitian :

1. Variabel Dependen (terikat)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar kolesterol total darah pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan usia produktif 21-23 tahun. Dalam hal ini kolesterol total diperiksa dengan menggunakan alat UNESCO Multi Check.

2. Variabel Independen (bebas)


Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Senam Aerobik *Mix Impact* yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan usia produktif 21-23 tahun.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Pre-Experimental Design* dengan menggunakan rancangan *One Group Pretest-Posttest Design*, dalam desain ini sebelum uji coba dilakukan pada sebuah kelompok tanpa kelompok kontrol, dilakukan terlebih dahulu penilaian atau pengukuran pada kelompok tersebut. Selanjutnya dilakukan uji coba kelompok dengan senam *aerobic mix impact* dan setelah itu, kelompok tersebut dinilai kembali (Suyanto, 2011). Bagan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan :

Q₁ : Kelompok Intervensi senam *aerobic mix impact* sebelum dilakukan perlakuan

Q₂ : Kelompok Intervensi senam *aerobic mix impact* setelah dilakukan perlakuan

Q₃ : Kelompok Intervensi senam *aerobic mix impact* setelah dilakukan perlakuan

Q₄ : Kelompok Intervensi senam *aerobic mix impact* setelah dilakukan perlakuan

X : Perlakuan berupa senam *aerobic mix impact*

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kampus II UIN Alauddin Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan frekuensi selama 3 kali seminggu dalam jangka waktu 3 minggu dengan durasi senam dalam sehari selama 30 menit dilakukan pada bulan Februari – Maret 2016 pada sore hari pada pukul 15.30 Wita.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Bukan hanya objek atau subjek yang dipelajari saja tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek tersebut (Hidayat, 2008).

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan usia produktif 21-23 tahun sejumlah 150 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan, kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan. Ada beberapa saran praktis dalam menentukan ukuran sampel. Saran yang dikemukakan termasuk sensus untuk populasi kecil, meniru ukuran sampel dari peneliti serupa sebelumnya, menggunakan tabel yang sudah dipublikasikan, dan menggunakan rumus untuk menentukan ukuran sampel (Tiro, 2011).

Berdasarkan teori di atas, sampel pada penelitian ini adalah meniru ukuran sampel dari penelitian serupa sebelumnya, maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 10 orang. Berdasarkan penelitian Khumaidi (2014), dengan judul penelitian pengaruh senam zumba terhadap perubahan kolesterol darah pada

mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar dengan jumlah sampel sebanyak 8 orang. Adapun penelitian lainnya yaitu penelitian oleh Adiatman (2013) tentang Pengaruh Olahraga Kebugaran Otot Dalam Mengurangi Kadar Kolesterol Dalam Darah Bagi Pesenam Di Radith Gym Makassar dengan jumlah responden sebanyak 20 orang responden yang terbagi 2 menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol.

3. Teknik pengambilan sampel

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan secara non probability sampling dengan teknik purposive sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan atau masalah penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2008). Dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

Kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel yaitu:

- 1) Bersedia mengikuti senam *aerobic mix impact* secara teratur yang dilakukan dengan frekuensi senam 3 kali senam selama 3 minggu.
- 2) Mengalami kegemukan (IMT dalam kategori obes kelas 1 25,00 – 29,9 kg/m³) berdasarkan Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) 2015.
- 3) Usia Produktif 21-23 tahun
- 4) Bersedia menandatangani surat persetujuan (*informed concent*).

b. Kriteria eksklusi

Kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian, yaitu:

- 1) Memiliki gangguan (penyakit) otot dan tulang serta memiliki luka yang dapat mengganggu aktivitas .
- 2) Pernah pingsan tanpa sebab yang jelas selama mengikuti latihan
- 3) Memiliki riwayat penyakit jantung.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar observasi dan pengamatan kadar kolesterol total menggunakan alat UNESCO Multi Check.

Cara pakai alat test darah UNESCO Multi Check :

1. Masukan baterai dan nyalakan alat
2. Set jam, tanggal dan tahun pada alat.
3. Ambil chip warna hijau masukan ke dalam alat untuk cek alat.
4. Apabila pada layar muncul “ERROR” artinya alat rusak.
5. Apabila pada layar muncul “OK” artinya alat siap dipakai.
6. Setiap botol strip pada gula darah, asam urat dan kolestrol terdapat chip test.
7. Untuk cek kadar kolesterol darah, masukan chip kolesterol dan strip kolesterol terlebih dahulu.
8. Pada layar akan muncul angka/kode sesuai pada botol strip.
9. Setelah itu akan muncul gambar tetes darah dan kedip-kedip.
10. Masukkan jarum pada lancings/alat tembak berbentuk pen dan atur kedalaman jarum.
11. Gunakan kapas yang sudah di basahi alkohol atau kapas alcohol untuk membersihkan jari yang akan di ambil darahnya.

12. Tembakkan jarum pada jari dan tekan perlahan supaya darah keluar.
13. Darah disentuh pada strip dan bukan ditetes diatas strip alat test darah UNESCO Multi Check Hingga darah meresap.
14. Sentuh pada bagian garis yang ada tanda panah.
15. Darah akan langsung meresap sampai ujung strip dan bunyi beep.
16. Tunggu sebentar, hasil akan keluar beberapa detik pada layar.
17. Cabut jarumnya dari lancing juga stripnya dan buang.

Penilaian yang dilakukan adalah dengan mencatat hasil yang ditunjukkan oleh hasil masing masing orang.

E. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

1. Sumber Data

- a. Data Primer, diperoleh dengan cara:
Pengukuran kadar kolesterol total pre dan post test pada kelompok perlakuan dengan menggunakan alat UNESCO Multi Check.
- b. Data Sekunder
Data sekunder yang dimaksud disini adalah berupa jumlah peserta usia produktif senam *aerobic mix impact* Di Kampus II UIN Alauddin Makassar.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan usia produktif 21-23 tahun yang merupakan kelompok perlakuan yang akan mengikuti senam *aerobic mix impact*.
- b. Memperkenalkan diri, maksud dan tujuan penelitian.
- c. Senam Aerobik *Mix Impact* dengan frekuensi selama 3 kali seminggu dalam jangka waktu 3 minggu pada waktu sore hari pukul 15.30 Wita.

- d. Melakukan pengukuran kadar kolesterol total pada kelompok eksperimental dengan menggunakan alat UNESCO Multi Check sebelum dan sesudah senam *aerobic mix impact*.

F. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu proses editing setelah data hasil pemeriksaan terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kesinambungan data, dan keseragaman data.
- b. *Coding*, yaitu dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua data perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu, untuk setiap hasil pemeriksaan (pengkodean).
- c. *Tabulating*, yaitu kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam tabel-tabel sesuai kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.
- d. *Entry Data*, yaitu memasukkan data yang telah ditabulasi ke dalam program komputer.

2. Analisa Data

- a. Analisa Univariat

Data selanjutnya di entry ke dalam komputer dan deskriptif analisa data dengan menggunakan komputer. Pada analisis data deskriptif, data akan dideskripsikan sebagai rerata dengan simpang baku dan median. Selanjutnya dilakukan uji normalitas dari distribusi data dengan uji *saphiro wilk*. Dalam penelitian ini, analisa univariat dilakukan untuk mengetahui proporsi dari variabel penelitian yaitu variabel bebas dan terikat.

- b. Analisa Bivariat

Bila data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal, maka untuk mengetahui status perubahan kolesterol yang terjadi pada setiap perlakuan senam *mix impact* dianalisis dengan uji t berpasangan (paired t-test), karena dalam penelitian, pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test. Jika ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah perlakuan maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan (Suryabrata, 2011). Pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan $dk = n-1$, apabila $p\ value < \alpha$ maka H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh senam *mix impact* yang diberikan terhadap variabel dependent. Sedangkan apabila $p\ value > \alpha$ berarti H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh *mix impact* yang diberikan terhadap variabel dependent (Arikunto, 2010).

G. Etika Penelitian

Menurut Nursalam (2008), secara umum prinsip etika dalam penelitian/pengumpulan data dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek, dan prinsip keadilan.

1. Prinsip manfaat

a. Bebas dari penderitaan

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus.

b. Bebas dari eksploitasi

Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindarkan dari keadaan yang tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan,

tidak ada dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk apa pun.

c. Risiko (*benefits ratio*)

Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan.

2. Prinsip menghargai hak-hak subjek

- a. Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (*right to self determination*): Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak, tanpa adanya sangsi apa pun atau akan berakibat terhadap kesembuhannya, jika mereka seorang klien.
- b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*): Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek.
- c. *Informed consent*: Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada *informed consent* juga perlu dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu.

3. Prinsip keadilan

- a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*): Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan sesudah

keikutsertaan dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian.

- b. Hak dijaga kerahasiannya (*right to privacy*): Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama (*anonymity*) dan rahasia (*confidentiality*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan kepada mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan dilaksanakan di daerah Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, pada tanggal 21 Februari 2016 sampai 11 Maret 2016. Sampel pada penelitian ini berjumlah 10 orang dan berjenis kelamin perempuan. Intervensi yang dilakukan berupa senam *mix impact* untuk mengetahui perubahan kadar kolesterol setelah senam. Senam dilakukan selama 3 kali seminggu pada hari senin, selasa, rabu dan menilai kadar kolesterol pada setiap hari rabu akhir pekan. Pengukuran dilakukan berulang yaitu pada minggu ke-1, minggu ke-2 dan minggu ke-3.


1. Analisa Univariat

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti. Analisis univariat dalam penelitian ini akan menggambarkan distribusi berdasarkan data demografi dan data variabel.

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 10 responden dengan menggunakan senam *mix impact*, menunjukkan data demografi yaitu berdasarkan usia terbanyak pada usia 21-23 tahun, namun dalam hasil penelitian ini seluruh responden (100%) berada pada usia 21 tahun sedangkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin yaitu (100%) perempuan serta data responden berupa indeks massa tubuh baik sebelum dilakukan intervensi maupun setelah intervensi seluruh responden berada pada IMT obese kelas I dengan rentang 25,0 – 29,9 kg/m².

a. Grafik rata-rata perubahan Kolesterol

Grafik 4.1
Rata-Rata Perubahan Kolesterol




Sumber: data primer 2016

Berdasarkan data grafik di atas, menunjukkan bahwa perubahan kolesterol responden sebelum diberikan senam *mix impact* dan setelahnya mengalami perubahan. Adapun kadar kolesterol tertinggi pada responden sebelum dilakukan senam adalah 261 mg/dl, dimana kadar tersebut merupakan kolesterol darah total dalam klasifikasi *high* atau kadar kolesterol tinggi, namun setelah dilakukan senam selama 3 pekan menurun 148 mg/dl.

- b. Grafik rata-rata perubahan kolestrol pada pemeriksaan selama 3 minggu.

Grafik 4.2
Rata-Rata Perubahan Kolesterol pada pemeriksaan selama 3 minggu




Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan data grafik di atas, menunjukkan bahwa rata-rata perubahan kolesterol responden sebelum diberikan senam dan setelahnya mengalami perubahan yaitu antara pre test dan minggu ke-1 mengalami selisih sebesar 24,1 mg/dl, selisih antara pretest dan minggu ke-2 sebesar 64,6 mg/dl, sedangkan selisih antara pretest dan minggu ke-3 sebesar 89,7 mg/dl. Adapun perubahan terbesar terjadi antara pre test dan minggu ke-3 yaitu 89,7 mg/dl.

d. Grafik Kontrol Makanan Responden

Grafik 4.3
Grafik Kontrol Makanan Responden



Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan grafik 4.3 menunjukkan data tentang kontrol makanan responden. Beberapa zat gizi yang dikontrol seperti total energi, lemak, Karbohidrat, serat, PUFA, dan konsumsi kolesterol. Makanan yang dimakan responden dicatat selama 3 hari selama senam, dan pada akhir pekan kadar kolesterol responden diukur. Adapun rata-rata konsumsi total energi sebesar 785,4, konsumsi lemak 9,1 gram, konsumsi karbohidrat 149,46 gram, konsumsi serat 5,2 gram, konsumsi PUFA 17,1 gram, sedangkan konsumsi kolesterol 290,5 gram.

2. Analisa Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (senam *mix impact*) dengan variabel dependen (perubahan kolesterol) ditunjukkan dengan nilai $p < 0,05$. Selanjutnya untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal pada data sebelum dan setelah intervensi, maka digunakan uji normalitas secara shapiro wilk serta secara deskriptif dari hasil output SPSS.

Tabel 4.1
Uji Normalitas dengan *Shapiro wilk* dan secara deskriptif

| Pengukuran | Uji normalitas | Statistic |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| Minggu ke-1 | <i>Shapiro wilk</i> | <i>P value</i> : 0,281 |
| | Koefisien Varians | 0,687% |
| | Rasio Skewness | 1,044 |
| | Rasio Kurtosis | 1,002 |
| | <i>Shapiro wilk</i> | <i>P value</i> : 0,551 |
| Minggu ke-2 | Koefisien Varians | 0,687% |
| | Rasio Skewness | 1,989 |
| | Rasio Kurtosis | 1,149 |
| | <i>Shapiro wilk</i> | <i>P value</i> : 0,358 |
| | Koefisien Varians | 0,687% |
| Minggu ke-3 | Rasio Skewness | 1,439 |
| | Rasio Kurtosis | 1,024 |

Sumber: Descriptives Normality Test

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Saphiro wilk* dan secara deskriptif, *Saphiro wilk* mendapatkan hasil $\alpha > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal adapun dari uji deskriptif. Uji dari hasil output SPSS yaitu meliputi koefisien varians, rasio skewness, dan rasio

kurtosis. Koefisien varians menunjukkan data tersebut normal jika nilai koefisien varians <30%.

Setelah dilakukan perhitungan pada output diatas diperoleh koefisien varians sebesar 0,687% baik dari minggu ke-1, ke-2, maupun ke-3 sehingga dapat disimpulkan data tersebut normal. Rasio Skewnes dikatakan normal ketika nilai rasio skewness berada pada rentang nilai -2 sampai 2. Hasil dari output diperoleh sebesar 1,044 (mingguke-1), 1,989 (minggu ke-2) dan 1,439 (minggu ke-3) sehingga disimpulkan data tersebut normal, sedangkan rasio kurtosis dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal karena nilai rasio kurtosis berada pada interval -2 sampai 2 yaitu 1,002 (minggu ke-1), 1,149 (minggu ke-2) dan 1,024 (minggu ke-3).

Tabel 4.2
Pengaruh senam mix impact terhadap Perubahan Kolesterol Pada Setiap Waktu Pengukuran

| Perlakuan | | Skor kadar kolesterol | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------|------------|
| | | N | Rerata \pm SD | P value | Corelation |
| Pengukuran minggu I | Pretest | 10 | 238 \pm 21,4 | 0,000 | 0,881 |
| | Posttest | 10 | 214 \pm 25,8 | | |
| Pengukuran minggu II | Pretest | 10 | 238 \pm 21,4 | 0,000 | 0,833 |
| | Posttest | 10 | 173 \pm 23,3 | | |
| Pengukuran minggu III | Pretest | 10 | 238 \pm 21,4 | 0,000 | 0,527 |
| | Posttest | 10 | 148 \pm 28,8 | | |

Uji *Paired Sampel T-test* dengan menggunakan program SPSS 20 terhadap perubahan kadar kolesterol darah sebelum dan sesudah responden menjalani senam *mix impact* yaitu antara pre test dan post test minggu 1, pre test dan post test minggu 2 serta antara pre test dan post test minggu ke 3, ditunjukkan dalam tabel 4.3. Pada penelitian ini menggunakan taraf kepercayaan 95%. Analisis data untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil uji *Paired Sampel t-Test* dimana semuanya menunjukkan *p value* $0,000 < (\alpha = 0,05)$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis H_0 ditolak berarti ada pengaruh signifikan dengan

pemberian senam *mix impact* terhadap perubahan keadar kolesterol darah mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Tabel 4.3
Pengaruh kontrol makanan terhadap Perubahan Kolesterol Pada Setiap Waktu Pengukuran

| Kontrol Makanan | Corelation | kekuatan pengaruh (%) | p value | Kesimpulan |
|------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Lemak | 0,435 | 18 | 0,000 | Berpengaruh |
| Karbohidrat | 0,218 | 4 | 0,002 | Berpengaruh |
| Serat | -0,228 | 5 | 0,000 | Berpengaruh |
| PUFA | 0,432 | 18 | 0,000 | Berpengaruh |
| Cholesterol | 0,437 | 19 | 0,004 | Berpengaruh |
| Total Kalori | 0,0036 | 0,006 | 0,055 | Tidak berpengaruh |

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa lemak, karbohidrat, serat, PUFA dan kolesterol berpengaruh terhadap kadar kolesterol darah ($\alpha < 0,05$), sedangkan total kalori tidak berpengaruh karena $\alpha > 0,05$. Adapun kekuatan hubungannya yaitu lemak (18%), karbohidrat (4%), serat (5%), PUFA (18%), kolesterol (19%), sedangkan total kalori (0,055%).

B. Pembahasan

Olahraga mempengaruhi sistem, peredaran darah, pernapasan, dan RQ (*Respiratory Quotient*). Selain itu dapat meningkatkan kekuatan otak, melawan penuaan, meningkatkan perasaan bahagia, dan meningkatkan kepercayaan diri. Olahraga juga dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler, paru-paru, dan sel-sel otot yang meningkatkan kapasitas kerja baik organ (Fatmah, 2011). Adapun menurut Roza (2010), bahwa latihan fisik dapat mencegah penyakit jantung koroner yang sudah menjadi masalah kesehatan yang cukup serius untuk negara berkembang, termasuk juga di Indonesia akibat aterosklerosis yang terpicu karena peningkatan kadar kolesterol, salah satu cara untuk mengatasinya dengan senam dan jalan kaki (Roza, 2012). Latihan yang bersifat aerobik berperan penting terhadap peningkatan kebugaran tubuh, dan sekaligus berperan terhadap metabolisme lemak maupun pengendalian stress (Anies, 2006).

Gerakan tubuh saat melakukan olahraga dapat terjadi karena otot berkontraksi. Kontraksi otot memerlukan energi dalam bentuk ATP (*Adenosin Tri Phosphate*). Olahraga aerobik dan anaerobik, keduanya memerlukan energy. Energi yang diperlukan itu didapat dari energi potensial yaitu energi yang tersimpan dalam makanan berupa energi kimia, dimana energi tersebut akan dilepaskan setelah bahan makanan mengalami proses metabolisme dalam tubuh (Kusumaningtyas, 2011). Proses metabolisme energi secara aerobik merupakan proses metabolisme yang terjadi di dalam mitokondria dan membutuhkan kehadiran oksigen (O_2) agar prosesnya dapat berjalan dengan sempurna untuk menghasilkan ATP. Pada saat berolahraga, kedua simpanan energi tubuh yaitu simpanan karbohidrat (glukosa darah, glikogen otot dan hati) serta simpanan lemak dalam bentuk trigeliserida akan

memberikan kontribusi terhadap laju produksi energi secara aerobik di dalam tubuh (Coyle, 2006).

Melihat manfaat dan pengaruh yang positif dari senam *mix impact* terhadap perubahan kolesterol dan fisiologis tubuh, dalam penelitian ini telah dilakukan pembuktian selama 3 minggu dengan melakukan senam *mix impact* dan mengukur kolesterol pre test dan setiap akhir pekan selama 3 pekan dan menilai perubahan kolesterol mulai dari minggu ke-1, minggu ke-2 dan minggu ke-3 sehingga sifat pengukuran secara berulang setiap responden.

Berdasarkan hasil observasi makanan responden, beberapa zat nutrisi yang terkandung dalam makanan akan berpengaruh terhadap kadar kolesterol. Dalam penelitian ini kadar nutrisi dikontrol oleh peneliti karena ingin mengetahui seberapa kuat pengaruh kadar nutrisi tersebut terhadap kadar kolesterol untuk membedakan pengaruhnya dengan senam *mix impact*. Adapun dalam penelitian ini kadar nutrisi berpengaruh, kecuali total kalori, namun kekuatan pengaruh makanan <20%, dimana kadar nutrisi makanan pengaruhnya lebih lemah dari pada senam. Makanan sehari-hari dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, terutama trigliserida dan lemak jenuh sangat berpengaruh terhadap peninggian kadar kolesterol darah (Bahri, 2004). Trigliserida dan lemak jenuh berbahaya bagi tubuh karena merangsang hati untuk memproduksi banyak kolesterol yang juga berperan akan munculnya penyakit jantung. Karena kolesterol yang mengendap lama-kelamaan akan menghambat aliran darah dan oksigen sehingga mengganggu metabolisme sel otot jantung. Untuk menghindari penimbunan kolesterol dalam pembuluh darah, seseorang perlu menghindari lemak jenuh seperti lemak sapi, kambing, makanan bersantan dan gorengan karena dapat meningkatkan kadar kolesterol darah (Harsanawis, 2008).

Adapun jumlah responden sebanyak 10 orang yang terdiri dari 100% perempuan, dari total responden dimana semua responden berumur 21 tahun dengan kadar kolestrol yang semuanya berada pada kadar kolesterol tinggi, responden memiliki kadar kolestrol sebelum dilakukan senam adalah 261 mg/dl serta semua responden berada pada klasifikasi IMT Obese Kelas I dengan rentang IMT antara 25,00-29,9 Kg/M².

Responden pada penelitian ini sama, yaitu semua responden dikontrol makanan yang dimakan selama penelitian berlangsung, karena beberapa makanan dapat meningkatkan dan berpengaruh terhadap kadar kolesterol yang dapat membuat penelitian bias. Menurut Durstine (2012), olahraga teratur dan juga aktivitas fisik secara positif mempengaruhi profil lipid darah dan lipoprotein. Namun demikian, kolesterol darah tidak selalu berubah setelah berolahraga, kecuali dengan pengaturan diet (Durstine, 2012). Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan kontrol terhadap diet responden, berupa jenis makanan yang dikonsumsi, frekuensi serta jumlah untuk dikonversikan kedalam nilai zat gizi dengan menggunakan aplikasi nutrisurvey untuk mendapatkan kandungan gizi yang berpengaruh pada kadar kolesterol responden.

Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah yaitu seperti faktor usia, jenis kelamin, obesitas serta stress. Faktor usia dapat mempengaruhi kolestrol karena karena semakin tua seseorang, kemampuan mekanisme kerja organ tubuh seseorang akan semakin menurun. Semakin lama usia organ tubuh itu bekerja maka semakin menumpuk pula kotoran-kotoran dalam tubuh, seperti halnya kolesterol, hal ini potensial meningkat terjadinya penyakit kardiovaskular pada usia dewasa. berbeda halnya dengan faktor jenis kelamin,

misalnya, pada wanita sebelum masa menopause mempunyai kadar kolesterol lebih rendah dari pada pria dengan usia yang sama (Nilawati, 2008).

Faktor lain yang berpengaruh seperti halnya obesitas juga berpengaruh terhadap kadar kolesterol. Karena obesitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kelebihan cadangan lemak (trigliserida) dalam tubuh secara abnormal. Kelebihan cadangan lemak ini akan mengakibatkan peningkatan kadar HDL darah. Hal lainnya adalah faktor stress, hormon stres, yaitu adrenalin maupun kortisol, dipercaya bisa mendorong produksi kolesterol dalam tubuh. Produksi kolesterol diperlukan tubuh antara lain untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun, jika produksi kolesterol terlalu banyak karena stres bisa menyumbat pembuluh darah arteri yang pada akhirnya mengakibatkan serangan jantung atau bahkan stroke.

Dalam penelitian ini beberapa zat gizi yang dikontrol seperti karbohidrat, serat, lemak, PUFA dan kadar kolesterol makanan. Asupan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dapat menurunkan kolesterol ketika digunakan untuk menggantikan lemak jenuh. Karbohidrat kompleks yang ditemukan didalam berbagai makanan, Angka kebutuhan Gizi untuk karbohidrat 300 gram per hari, atau 1200 kalori (Durstine, 2012). Hasil penelitian ini menunjukkan konsumsi rata-rata karbohidrat 149,46 gram, yang terbagi dalam 3 hari dalam sepekan.

Diet kaya serat, dapat menurunkan kadar kolesterol darah dan LDL sehari adalah hingga menurunkan risiko penyakit jantung. Serat dianggap dapat menurunkan kadar kolesterol darah dengan mengikat kolesterol dan lemak lainnya pada saat mengalir melalui usus, baik kolesterol maupun serat kemudian berjala melewati sistem pencernaan, adapun kebutuhan serat per hari disarankan oleh *The American Cancer Society* yaitu sebanyak 25-35 gram, namun mayoritas hanya

mengonsumsi serta kurang dari 10 gram (Durstine, 2012) adapun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi serat 5,2 gram.

Lemak makanan mayoritas mengandung lemak jenuh yang mempunyai banyak dampak negatif bagi kesehatan terutama pada perbaikan kemampuan hati untuk membuang kolesterol dalam darah sehingga memungkinkan kadar kolesterol darah meningkat, oleh karena itu konsumsi lemak jenuh dalam sehari tidak boleh melebihi 20-30% dari total kalori atau maksimal 62 gram per hari (Durstine, 2012). Adapun rata-rata konsumsi lemak 9,1 gram.

Kolesterol terdapat dalam semua produk hewani, seperti daging sapi, unggas, maupun telur serta *National Cholesterol Education Program (NCEP)* menyarankan untuk mengonsumsi kolesterol kurang dari 300 mg dalam sehari, namun jumlah kolesterol yang terdapat dalam makanan tidak berhubungan kuat dengan kadar kolesterol darah (Durstine, 2012). PUFA (*Polyunsaturate fats acid*) atau lemak tak jenuh jamak merupakan lemak yang terkandung dalam makanan yang dapat menurunkan trigliserida darah maupun kolesterol total, jumlah total konsumsi perhari yaitu sekitar 5,5-9% untuk diet 2000 kalori per hari atau sekitar 13 gram per hari (Durstine, 2012). Adapun hasil penelitian ini yaitu konsumsi PUFA 17,1 gram, sedangkan konsumsi kolesterol 290,5 gram.

Hasil dari pemeriksaan kolesterol rata-rata perubahan kolesterol responden sebelum diberikan senam dan setelahnya mengalami perubahan yaitu antara pre test dan minggu ke-1 mengalami selisih sebesar 24,1 mg/dl, selisih antara pretest dan minggu ke-2 sebesar 64,6 mg/dl, sedangkan selisih antara pretest dan minggu ke-3 sebesar 89,7 mg/dl. Adapun perubahan terbesar terjadi antara pre test dan minggu ke-3 yaitu 89,7 mg/dl. Rata-rata perubahan kolestrol sangat signifikan karena dalam

penelitian ini, peneliti melakukan observasi ketat terhadap bahan makanan yang dikonsumsi oleh responden serta intensitas senam dilakukan secara teratur.

Selanjutnya untuk menganalisis hasil penelitian yaitu dengan uji *Paired Sampe T-Test* terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai *p value Shapirowilk* dan secara deskriptif dari data tersebut. Adapun yang digunakan untuk melihat normalitas adalah koefisien varians, rasio skewness, rasio kurtosis dan hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal.

Untuk mengetahui pengaruh senam *mix impact* terhadap perubahan kolesterol, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan senam *mix impact* terhadap perubahan kolesterol yang diukur secara berulang yaitu pada minggu ke-1, minggu ke-2 dan minggu ke-3 maka dilakukan uji *Paired Sampel T-Test*. Berdasarkan analisis data di dapatkan *p value* 0,00 ($p < \alpha$) atau $0,00 < 0,05$ yang berarti senam *mix impact* berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan kolesterol, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian senam *mix impact* berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan kolesterol dengan pemberian senam *mix impact* terhadap perubahan kadar kolesterol darah mahasiswa UIN Alauddin Makassar baik minggu ke-1, minggu ke-2 maupun minggu ke-3.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol. Hasil penelitian (Kusumaningrum, 2011) ada pengaruh pemberian aerobik intensitas ringan terhadap penurunan kolesterol ($p < 0,05$). Kemudian pada intensitas sedang nilai signifikansi $p = 0,002$ yang artinya ada pengaruh pemberian aerobik intensitas sedang terhadap penurunan kolesterol ($p < 0,05$). Penelitian Adiatman 2013 menunjukkan bahwa kegiatan olahraga kebugaran otot yang merupakan salah satu latihan aerobik secara bermakna. Dari uji

Beda *Paired T Test* dengan metode *circuit weight training* menghasilkan perbedaan rerata kadar kolesterol antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol adalah 11.55 mg/dl dan penelitian tersebut juga menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna kadar kolesterol total darah kelompok perlakuan dibanding dengan kelompok kontrol ($p=0.02$) (Adiatman 2013), demikian halnya juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sonia (2012), mengemukakan bahwa terdapat pengaruh senam aerobik terhadap penurunan kadar kolesterol total di Aerobik dan Fitness Center Bandar Lampung (Sonia, 2012).

Adapun beberapa penelitian yang tidak mendukung dalam penelitian ini yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Jonathan Hani Surentu (2014), mengemukakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kadar kolesterol HDL darah dengan kadar hs-CRP pada remaja obes (Surentu, 2014). Hal senada diungkapkan oleh Lulu'ul Badriyah (2013) mengemukakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik aktifitas fisik dan asupan lemak terhadap kadar kolesterol total pada anggota klub senam UIN Jakarta (Badriyah, 2013).

Opini peneliti secara empirik berdasarkan hasil penelitian ini yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan signifikan senam *mix impact* terhadap penurunan kadar kolesterol darah disebabkan oleh meningkatnya aktifitas fisik para responden. Responden melakukan aktivitas fisik berupa senam *mix impact* 3 kali seminggu selama 3 minggu yang mana sumber energi yang dibutuhkan berasal dari pembakaran cadangan lemak tubuhnya. Dengan meningkatnya aktifitas fisik tersebut, menyebabkan terbakarnya cadangan lemak tubuh untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh pada saat latihan senam aerobik dan berdampak juga terhadap penurunan kadar kolesterol darah bagi para responden.

Allah Berfirman dalam surah Ar-Raad ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Sumber: Al-Quran digital versi 2.1)

Islam menganjurkan dan cenderung mewajibkan seseorang untuk mampu memelihara kesehatan baik perorangan, keluarga maupun masyarakat. Untuk itu ada beberapa tuntunan yang perlu kita perhatikan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan meliputi 4 hal, yaitu penyuluhan, preventif atau pencegahan, kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif yaitu pemulihan. Olahraga merupakan salah upaya preventif untuk menjaga kesehatan salah satunya dalam proses pencegahan peningkatan kadar kolesterol dalam darah.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada penelitian ini tidak ada kelompok kontrol sehingga tidak ada pembandingan kadar kolesterol antara kelompok yang melakukan senam *mix impact* dengan yang tidak melakukan senam *mix impact* sehingga diharapkan untuk penelitian sebelumnya agar menggunakan kelompok kontrol. Program pengaturan diet pada responden juga dilakukan dengan ketat namun setelah dianalisis juga berpengaruh terhadap kadar kolesterol dalam darah sehingga perubahan kadar kolesterol dalam penelitian tidak mutlak dipengaruhi oleh senam *mix impact*, namun <20% dipengaruhi oleh faktor diet, sehingga kemungkinan faktor asupan nutrisi (diet) mempengaruhi hasil penelitian Berdasarkan hasil lembar

observasi bahwa responden yang mengalami peningkatan kadar kolesterol diketahui banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kolesterol dan lemak.

Akhirnya, penelitian yang dilakukan selama 3 minggu dengan judul “Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun” dapat diselesaikan tepat waktu. Penelitian ini memberikan gambaran kepada kita semua baik masyarakat maupun mahasiswa kesehatan bahwa pentingnya melakukan aktivitas fisik bagi kesehatan terutama senam akan berakibat positif terhadap pencegahan penyakit karena dengan aktivitas senam tersebut dapat menurunkan kadar kolesterol yang akan mencegah terserangnya penyakit jantung dan penyakit kardiovaskuler serta hal tersebut dapat menurunkan produktivitas bagi seseorang dalam masa produktivitas dan dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas.

Berkat bantuan dan kerjasama berbagai pihak, berbagai macam hambatan selama proses penelitian yang ditemui dalam penelitian ini dapat teratasi dengan baik, banyaknya aktivitas peneliti di luar kegiatan akademik seperti organisasi maupun responden terkadang menjadi suatu alasan penelitian ini lama dimulai. Disamping itu keterbatasan peneliti, yaitu biaya yang sangat cukup banyak dalam penelitian ini sehingga perlu mengumpulkan dana tersebut sebelum memulai penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rata-rata nilai kadar kolesterol *pretest* mahasiswa yang melakukan senam aerobik *mix impact* adalah sebesar 237,8 mg/dl.
2. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata kadar kolesterol *posttest* mahasiswa yang melakukan senam aerobik *mix impact* adalah sebesar 148,1 mg/dl.
3. Terdapat perbedaan nilai kadar kolesterol mahasiswa yang melakukan senam aerobik *mix impact* sebelum dan sesudah melakukan senam aerobik *mix impact*.
4. Dari uji *Paired Sampel T-Test* diketahui bahwa senam aerobik *mix impact* berpengaruh secara signifikan terhadap kadar kolesterol.
5. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan menjadi faktor perancu yang mempengaruhi kadar kolesterol seperti pada penelitian ini lemak, karbohidrat, serat, PUFA dan kolesterol berpengaruh terhadap kadar kolesterol darah ($\alpha < 0,05$), sedangkan total kalori tidak berpengaruh karena $\alpha > 0,05$.

B. Saran

1. Untuk dunia kesehatan khususnya keperawatan, senam aerobik *mix impact* yang dilakukan secara rutin bisa dijadikan salah satu alternatif paling efektif dan aman untuk menurunkan kadar kolesterol darah.
2. Untuk masyarakat umum, olahraga berupa senam aerobik *mix impact* ini perlu dilakukan secara rutin karena dapat meningkatkan kesegaran jasmani, dan menurunkan kadar kolesterol darah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, Untuk peneliti selanjutnya, perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh senam aerobik *mix impact* dengan konsumsi makanan terhadap perubahan kadar kolesterol dengan melibatkan jumlah sampel yang besar, waktu penelitian yang lebih panjang, dan metode pengendalian faktor perancu berupa asupan nutrisi yang lebih ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya; Kementrian Agama RI.
- Al-Thabrani, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mutir al- Khamy al-Syami Abu al-Qasim. *Mu'jam al-Kabir*. Al-Qahirah: Maktabah Ibn Taymiyah. 1994 M.
- Adiatman. "Pengaruh Olahraga Kebugaran Otod dalam Mengurangi Kadar Kolesterol dalam Darah bagi Pesenam Radith untuk Menurunkan Kadar Kolesterol pada Pesenam Radhit Gym Makassar". Skripsi: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Alim, Abdul dkk. "Pengaruh Aktivitas Aerobik Terhadap Perubahan Penurunan Lemak Pada Sanggar Segar". Skripsi: Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- American Heart Association. "Heart Disease and Stroke Statistic". Dallas, Texas: American Heart Association. 2010.
- _____. "Heart Disease and Stroke Statistic". Dallas, Texas: American Heart Association. 2013.
- Anies. *Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular*. Jakarta : Alex Media Komputindo. 2006.
- Anwari, Irawan. *Metabolisme Energi Tubuh dan Olahraga*. Polton Sports Science and Perfomance Lab. 2007.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Badriyah, Lulu'ul. 2013. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar Kolesterol Total pada Anggota Klub Senam Jantung Sehat UIN Jakarta*. SKRIPSI. UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25929/1/LULU%E2%80%99UL%20BADRIYAH-fkik.pdf>. diakses tanggal 13 Maret 2016.
- Bahri. "Manfaat Diet pada Penanggulangan Hiperkolesterolemi". Skripsi: Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara, 2004.
- Baitul, Sitti. "Pencegahan Dislipidimia dan Peningkatan Kebugaran Tubuh Pada Remaja Putri dan Ibu Rumah Tangga Melalui Senam Aeronik di Kota Semarang". Skripsi: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2010.
- Budiyono, Kodrad. "Amplikasi Senam Aerobic High Impact dan Low Impact Terhadap Penurunan Presentase Lemak Tubuh Pada Kepala Sekolah Dasar

- Se-Kecamatan Banjarsari Surakarta*".Skripsi: Fakultas FKIP, UNS Surakarta, 2015.
- Coyle, B. 2006. *Exercise for The Older Adult*. The University of Missouri, St. Louis.
- Deddy, Muchtadi. *Pengantar Ilmu Gizi*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia .*Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2013.
- Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Kota Makassar*. 2012.
- _____. *Profil Kesehatan Kota Makassar*. 2013.
- Durstine, Larry. *Program Olahraga: Kolesterol Tinggi*.Yogyakarta : PT Citra AjiPramana. 2012.
- Fatmah. *Gizi Kebugaran dan Olahraga*. Bandung: Lubuk Agung. 2011.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Alih Bahasa Irawati*. Jakarta: EGC. 2007.
- Harsanawis. "*Hubungan Antara Obesitas, Keteraturan Olahraga dan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Hiperkolesterolemia pada Calon Perwira Polisi di Lingkungan Mapolda Jawa Tengah*". Skripsi: Fakultas Kedokteran USU, 2008.
- Hidayat, AA. *Metode Penelitian Keperawatan dan teknik analisa data*. Jakarta: Salemba Medika.2008.
- Kamajaya, D.M, dkk. "*Pengaruh Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani 2008*
- Khasanah, Nur. *Waspada Berbagai Penyakit Degeneratif Akibat Pola Makan*. Jogjakarta: Laksana. 2012.
- Khumaidi."*Pengaruh Senam Zumba Terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah Pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar*".Skripsi: Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Kusumaningtyas, Dian Nindita. "*Pengaruh Senam Aerobik Intensitas Ringan Dan Sedan Terhadap Penurunan Persentase Lemak Badan*".Skripsi: Program Studi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Malik, Mega Amaliah, dkk. "*Gambaran Kadar Kolesterol Total Darah Pada Mahasiswa Angkatan 2011 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Dengan Indeks Massa Tubuh 18,5-22,9 Kg/M²*". Skripsi: Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013.
- Mamat dan Sudikno."*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kadar Kolesterol HDL*".Skripsi: Poltekkes Depkes Bandung, 2012.

- Medicine & Science In Sports & Exercise. "*Exercise and Physical Activity for Older Adult*". American College of Sports Medicine. 2009.
- Minarno, Eko Budi. & Hariani, Liliek. *Gizi dan Kesehatan Perspektif Al—Qur'an dan Sains*. Malang: UIN-Malang Press. 2008
- Morrel, Jonathan. *Simple Guide: Kolesterol*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Nilawati, Sri. *Care Your self, Kolesterol*. Jakarta :Penebar Plus. 2008.
- Nursalam. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Pedoman Skripsi Tesis, dan Instrumen Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2008.
- Proverawati, Atikah. *Obesitas dan Gangguan Perilaku Makan Pada Remaja*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2010.
- Ramadhan. *Mencermati Berbagai Gangguan Pada Darah dan Pembuluh Darah*. Jogjakarta: DIVA Press. 2010.
- Ratmawati, Yuliana, dkk. "*Latihan Aerobik Intensitas Sedang Dengan Diet Rendah Kolesterol Lebih Baik Dalam Memperbaiki Kognitif Dari pada Intensitas Ringan Pada Penderita Sindroma Metabolik*". *Skripsi*: Prodi Fisioterapi, Poltekkes Negeri Surakarta. Ilmu Faal, Universitas Udayana, Bali. Fakultas Fisioterapi, Universitas Desa Unggul, Jakarta, 2013.
- Roza, Devia. 2012. *Pengaruh Latihan Fisik terhadap Profil Lipid Wanita Usia Dewasa*. Jurusan Keperawatan Potekkes Padang. <http://www.journal.mercubaktijaya.ac.id/downloadfile.php?file=Jurnal%20DefinaRoza.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016.
- Rosidah, Nor. "*Pengaruh Latihan Senam Aerobik Low Impact Dan Mix Impact Terhadap Tingkat Kesegaran Jasmani Pada Siswa Putri SMK NEGERI 1 SURAKARTA*". *Skripsi*: Jurusan Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Saputra, I Made Wisnu. "*Pemberian Senam Aerobik Intensitas Ringan Lebih Menurunkan Persentase Lemak Subkutan Dibandingkan Intensitas Sedang Pada Mahasiswi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*". *Skripsi*: Program Studi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar Bali. Bagian Rehabilitasi Medik Sub Bagian Fisioterapi RSUP Sanglah, Denpasar Bali. Bagian Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar Bali, 2014.
- Sari, Yulisna M. "*Pengaruh Senam Aerobik Intensitas Ringan Dan Sedang Terhadap Penurunan Persentase Lemak Badan Di Aerobic Dan Fitness Centre "Fortuna"*". *Skripsi*: Program Studi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Shanty, Meita. *Silent Killer Diseases; Penyakit yang Diam-diam Mematikan*. Jogjakarta: Javalitera. 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesandan Kesandan Kesarasian Al-quran*. Jakarta: Lenterahati. 2008.

_____. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesandan Kesandan Kesarasian Al-quran*. Cet. IV. Jakarta: Lenterahati. 2012.

Sudibjo, Prijo, dkk. "*Pengaruh Senam Aerobik Intensitas Sedang Dan Intensitas Tinggi Terhadap Persentase Lemak Badan Dan Lean Body Weight Kajian Anthropolmetris pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta*". *Skripsi: Bagian Anatomi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yoyakarta. Bagian Anatomi, Embriologi, dan Antropologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada*, 2005.

Suyanto. *Metodologi dan Aplikasi Penelitian Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2011.

Syarfaini. *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.

Tiro, Muhammad Arif. *Teknik Pengambilan Sampel*. Makassar: Andira Publisher. 2011.

Yudha, Maza. *Beri Tenaga Hidup Anda Fitnes Fit Sepanjang Hari*. Jakarta: Niaga Swadaya. 2008.

Yuliana S. "*Hubungan Antara Kebiasaan Merokok Dengan Kejadian Hipertensi Pada laki-laki usia 40 tahun keatas di Badan Rumah Sakit Daerah Cepu*". *Skripsi: Yogyakarta: FIK .Jurusan IKM*, 2007.

Wongkar, Mega Cristy, dkk. "*Hubungan Status Gizi Dengan Kadar Kolesterol Total Pada Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Manado*". *Skripsi: Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi*. 2013.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi UIN Alauddin Gowa.

Inisial :

Umur :

Pekerjaan :

Judul Penelitian : “Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* Terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Dengan Usia Produktif 21-23 tahun.”

Saya memahami penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan ilmiah dalam rangka menyusun skripsi bagi peneliti dan tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan sehingga jawaban dan hasil observasi benar-benar dapat dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian lembar persetujuan ini saya tanda tangani dan kiranya dipergunakan sebagai mestinya.

Makassar , 2016

Responden

(.....)



PSIK UIN
ALAUDDIN
MAKASSAR

Standar Operasional Prosedur (SOP) *Senam Mix Impact*

1. Definisi

Senam Aerobik adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara terorganisir, direncanakan untuk mendapatkan oksigen sebanyak-banyaknya masuk kedalam tubuh dan bertujuan untuk daya tahan dan pembentukan tubuh. Dikatakan *mix impact* karena gerakan yang dilakukan adalah gabungan dari *high impact* dan *low impact*.

2. Tujuan

1. Mengembangkan kapasitas paru dan jantung
2. Memperkuat otot jantung.
3. Membentuk tubuh.
4. Melancarkan peredaran darah stamina.

3. Indikasi

1. Seseorang yang memiliki risiko gangguan kesehatan seperti obesitas dan ingin menurunkan berat badannya.
2. Seseorang yang ingin menjaga stamina tubuh dengan berolahraga.

4. Kontra Indikasi

1. Gangguan neuromuskular, muskuloskeletal atau radang sendi
2. Ada kelainan kardiovaskuler seperti
 - a. EKG istirahat, dengan adanya kemungkinan infark
 - b. Angina pectoris tidak stabil
 - c. Aritmia Ventrikel tidak terkontrol
 - d. Hipertensi tidak terkontrol
3. Diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol atau Diabetes tipe 1
4. Thrombophlebitis

| | |
|----------------------------|---|
| <p>5. Persiapan Pasien</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaiknya memakai pakaian olahraga yang terbuat dari katun (dapat menyerap keringat) dan tidak ketat agar pergerakan tidak terganggu (seperti kaos, training pack). 2. Sebaiknya menggunakan sepatu olahraga yang cukup nyaman (sol lunak dan elastis). |
| <p>6. Persiapan Alat</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tape</i> untuk pengiring musik. 2. Speaker. 3. Laptop untuk bahan acuan pemandu olahraga. |
| <p>7. Prosedur</p> | <p>Tahapan dalam satu sesi latihan fisik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanasan (<i>Warming-up</i>) :Pemanasan yang baik merupakan bagian penting dalam melakukan latihan fisik. Pemanasan merupakan serangkaian latihan fisik sebagai persiapan latihan fisik inti agar tubuh siap untuk melakukan latihan inti dan mencegah terjadinya cedera selama latihan. Urutan pemanasan diawali dengan gerakan-gerakan ringan, kemudian peregangan dan diakhiri dengan berjalan kaki. Pemanasan dilakukan selama 10-15 menit. <ol style="list-style-type: none"> a. Peregangan :Merupakan bagian dari pemanasan dengan cara meningkatkan luas gerak sekitar persendian serta melibatkan tulang dan otot . Peregangan dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara perlahan sampai mendekati batas luasnya gerakan sendi, kemudian ditahan selama 8 hitungan dalam 10 detik dan akhirnya direlaksasikan. 2) Sampai terasa ada regangan yang cukup tanpa ada rasa nyeri. 3) Selama 5-10 menit dengan melibatkan persendian dan otot-otot tubuh bagian atas, bagian bawah serta sisi kiri dan kanan tubuh. 4) Tanpa memantul-mantul. 5) Bernapas secara teratur dan tidak dibenarkan untuk menahan napas. 2. Latihan Inti :Terdiri dari latihan yang bersifat aerobik, latihan kekuatan otot dan latihan keseimbangan serta latihan daya ledak otot |

Latihan aerobik dilakukan berdasarkan frekuensi latihan fisik per minggu, mengukur intensitas latihan fisik dengan menghitung denyut nadi per menit saat latihan fisik, lamaserta jenis latihan fisik. Latihan kekuatan otot dilakukan berdasarkan jumlah set dan pengulangan gerakan (repetisi) serta tanpa adanya penambahan beban dari luar. Jenis latihan kekuatan otot dapat berupa latihan peregangan dan selama senam. Latihan keseimbangan dilakukan dengan melatih tubuh pada posisi tidak seimbang dengan atau tanpa menggunakan alat bantu (kursi) Latihan daya ledak otot dilakukan dengan menyerupai gerakan gerakan saat melontar jumroh pada jarak tertentu (5 – 10 meter).

a. Gerakan – Gerakan Tangan

- 1) Mengangkat tangan kedepan, ke atas, ke samping, ke belakang.
- 2) Gerakan tangan membuka dan menyilang
- 3) Mendorong dan memompa ke depan, ke atas, dan ke samping
- 4) Gerakan tangan meninju, ke depan, ke samping, ke atas, ke bawah, dan menyilang
- 5) Gerakan mengayun satu tangan atau dua tangan
- 6) Tepukan, antara lain kedua tangan menepuk, tangan menepuk paha, bahu, dan lain sebagainya

b. Gerakan – Gerakan Kaki

- 1) Berjalan di tempat.
- 2) Berbaris
- 3) Melangkah satu atau dua langkah.
- 4) Melompat satu kaki atau dua kaki ke samping, ke depan, dan ke belakang,
- 5) Mengangkat lutut, tendangan, ke belakang, ke depan, dan ke samping
- 6) Geraka cha cha cha dan gerakan menggeser kaki, menyeret kaki, dan lain sebagainya

3. Pendinginan :Dilakukan setelah melakukan latihan fisik inti, dengan gerakan sama seperti pada pemanasan termasuk peregangan adapun

| | |
|--|--|
| | <p>peregangan sendi dan otot dilakukan secara perlahan namun dengan tingkat lebih ringan dibandingkan saat pemanasan dan secara perlahan direlaksasikan.</p> |
|--|--|



PSIK UIN
ALAUDDIN
MAKASSAR

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kolestrol Total

| | |
|---------------------|---|
| 1. Definisi | Pemeriksaan yang menunjukkan jumlah antara HDL kolesterol, LDL kolesterol, dan trigliserida. Jika kadar total kolesterol melebihi 240 mg/dL, pasien harus waspada terhadap resiko penyakit jantung. |
| 2. Tujuan | Untuk mengidentifikasi gambaran umum kolestrol dalam tubuh, dan sebagai rujukan untuk pemeriksaan kolestrol secara detail melalui pemeriksaan laboratorium lengkap dan spesifik seperti kolestrol HDL atau LDL saja. |
| 3. Indikasi | <ol style="list-style-type: none">Seseorang yang memiliki risiko terjadi peningkatan kadar kolestrol seperti obesitas.Seseorang yang memiliki tanda-tanda mengalami peningkatan kadar kolestrol.Seseorang yang ingin mengetahui kadar kolestrolnya. |
| 4. Kontra Indikasi | Seseorang yang mengalami pembekuan darah lambat. |
| a. Persiapan Pasien | <ol style="list-style-type: none">Beritahu dan jelaskan pada responden tentang tindakan yang dilakukanSebelum melakukan pemeriksaan kolesterol, pasien biasanya dianjurkan untuk puasa sepanjang malam, kurang lebih 9-12 jam. Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahan pengukuran akibat adanya pengaruh dari lemak yang baru dikonsumsi.24 jam sebelum melakukan pemeriksaan kolesterol sebaiknya pasien juga tidak melakukan aktivitas berat karena kelelahan yang amat |

| | |
|----------------------|---|
| | sangat dapat berpengaruh pada hasil pemeriksaan. |
| b. Persiapan Alat | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 unit alat/mesin pemeriksaan kolestrol 2. Strip Kolesterol (biasanya berisi 10 strip/ btl). 3. Lancing device 4. Jarum lancet 5. Kapas alkohol 6. Bengkok 7. Sarung tangan 8. Pengalas |
| c. Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu dan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan. 2. Menyiapkan alat dan bahan, membawa ke dekat pasien. 3. Mengatur posisi pasien nyaman mungkin. 4. Perawat mencuci tangan dan memakai sarung tangan. 5. Ambil chip warna kuning masukan ke dalam alat untuk cek alat. 6. Apabila pada layar muncul “ERROR” artinya alat rusak. 7. Apabila pada layar muncul “OK” artinya alat siap dipakai. 8. Setiap botol strip kolestrol terdapat chip test dan masukkan pada bagian alat yang tersedia. 9. Pada layar akan muncul angka/kode sesuai pada botol strip. 10. Setelah itu akan muncul gambar tetes darah & kedip-kedip. 11. Masukan jarum pada lancing/alat tembak berbentuk pen & atur kedalaman jarum sesuai nomor. 12. Gunakan kapas alkohol untuk membersihkan ujung jari. 13. Tembakkan jarum pada ujung jari & tekan supaya darah keluar. 14. Darah disentuh pada tepi samping strip & bukan ditetes diatas tengah |

strip alat test darah.

15. Sentuh pada bagian garis yang ada tanda panah.
16. Darah akan langsung meresap sampai ujung strip & bunyi beep.
17. Tunggu sebentar, hasil akan keluar beberapa detik pada layar.
18. Cabut jarumnya dari lancing juga stripnya & buang.
19. Chip di simpan ke botol lagi.
20. Tutup rapat botol strip apabila tidak dipakai.
21. Perhatikan masa expired / kadaluarsa pada setiap strip.
22. Rapikan kembali peralatan
23. Dokumentasikan tindakan

LEMBAR OBSERVASI

“Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah
pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun”

Nama Peneliti :

| NO | NAMA INISIAL RESPONDEN | UMUR | JENIS KELAMIN | TINGGI BADAN | BERAT BADAN PRETEST | BERAT BADAN POSTEST | IMT PRETEST | IMT POSSTETS | KADAR KOLESTEROL PRETEST | KADAR KOLESTEROL POSTEST | | |
|----|---------------------------|--------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nn. S | 21 thn | Perempuan | 157 cm | 67 kg | 69 kg | 27,18 | 27,99 | 247 | 208 | 142 | 132 |
| 2 | Nn. R | 21 thn | Perempuan | 159 cm | 74 kg | 75 kg | 29,27 | 29,66 | 261 | 246 | 188 | 148 |
| 3 | Nn. A | 21 thn | Perempuan | 159 cm | 65 kg | 64 kg | 25,71 | 25,31 | 213 | 178 | 170 | 110 |
| 4 | Nn. K | 21 thn | Perempuan | 161 cm | 76 kg | 76 kg | 29,31 | 29,31 | 206 | 177 | 159 | 142 |
| 5 | Nn. D | 21 thn | Perempuan | 163 cm | 67 kg | 65 kg | 25,21 | 24,46 | 251 | 213 | 154 | 149 |
| 6 | Nn. L | 21 thn | Perempuan | 162 cm | 70 kg | 69 kg | 26,67 | 26,29 | 240 | 205 | 178 | 155 |
| 7 | Nn. F | 21 thn | Perempuan | 159 cm | 66 kg | 65 kg | 26,10 | 25,71 | 256 | 243 | 223 | 199 |
| 8 | Nn. G | 21 thn | Perempuan | 160 cm | 65 kg | 64 kg | 25,39 | 25,00 | 209 | 202 | 166 | 109 |
| 9 | Nn. J | 21 thn | Perempuan | 153 cm | 60 kg | 59 kg | 25,63 | 25,20 | 261 | 249 | 159 | 149 |
| 10 | Nn. E | 21 thn | Perempuan | 150 cm | 58kg | 58 kg | 25,78 | 25,78 | 234 | 216 | 193 | 188 |

LEMBAR OBSERVASI
HASIL KONTROL MAKANAN

“Pengaruh Senam Aerobik *Mix Impact* terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah
pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan Usia Produktif 21-23 tahun”

| NO | NAMA INISIAL RESPONDEN | Umur | Jenis kelamin | Lemak | Karbohidrat | Serat | PUFA | Cholesterol | Total Energi |
|----|---------------------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | Nn. S | 21 thn | Perempuan | 8,7 g | 155,8 g | 5,2 g | 1,9 g | 185,26 mg/dl | 852,2 kcal |
| 2 | Nn. R | 21 thn | Perempuan | 9,1 g | 156,8 g | 4,5 g | 2,1 g | 243,8 mg/ dl | 863,8 kcal |
| 3 | Nn. A | 21 thn | Perempuan | 9,4 g | 139,5 g | 5,2 g | 1,8 g | 293,3 mg/dl | 781,2 kcal |
| 4 | Nn. K | 21 thn | Perempuan | 10,8 g | 152,4 g | 5,2 g | 2,1 g | 414,7 mg/dl | 858,7 kcal |
| 5 | Nn. D | 21 thn | Perempuan | 8,7 g | 155,0 g | 5,6 g | 1,8 g | 163,5 mg/dl | 790,5 kcal |
| 6 | Nn. L | 21 thn | Perempuan | 8,5 g | 147,0 g | 5,9 g | 1,7 g | 267,0 mg/dl | 762,8 kcal |
| 7 | Nn. F | 21 thn | Perempuan | 10,9 g | 143,6 g | 4,7 g | 2,1 g | 455,1 mg/dl | 827 kcal |
| 8 | Nn. G | 21 thn | Perempuan | 7,4 g | 138,5 g | 5,7 g | 1,7 g | 205,2 mg/dl | 750,5 kcal |
| 9 | Nn. J | 21 thn | Perempuan | 10,6 g | 152,1 g | 4,5 g | 2,3 g | 345,9 mg/dl | 866,0 kcal |
| 10 | Nn. E | 21 thn | Perempuan | 9,4 g | 157,8 g | 6,3 g | 1,87 g | 272,7 mg/dl | 856,9 kcal |

Hasil Analisis Uji Normalitas SPSS

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Pengukuran Minggu I | 10 | 100,0% | 0 | 0,0% | 10 | 100,0% |
| Pengukuran Minggu II | 10 | 100,0% | 0 | 0,0% | 10 | 100,0% |
| Pengukuran Minggu III | 10 | 100,0% | 0 | 0,0% | 10 | 100,0% |

Descriptives

| | | Statistic | Std. Error |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| Pengukuran Minggu I | Mean | 213,70 | 8,179 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | | |
| | Lower Bound | 195,20 | |
| | Upper Bound | 232,20 | |
| | 5% Trimmed Mean | 213,78 | |
| | Median | 210,50 | |
| | Variance | 668,900 | |
| | Std. Deviation | 25,863 | |
| | Minimum | 177 | |
| | Maximum | 249 | |
| | Range | 72 | |
| | Interquartile Range | 48 | |
| | Skewness | 1,044 | ,687 |
| | Kurtosis | 1,002 | 1,334 |
| Pengukuran Minggu II | Mean | 173,20 | 7,395 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | | |
| | Lower Bound | 156,47 | |
| | Upper Bound | 189,93 | |
| | 5% Trimmed Mean | 172,17 | |
| | Median | 168,00 | |
| | Variance | 546,844 | |
| | Std. Deviation | 23,385 | |
| | Minimum | 142 | |
| | Maximum | 223 | |
| | Range | 81 | |
| | Interquartile Range | 32 | |
| | Skewness | 1,989 | ,687 |
| | Kurtosis | 1,149 | 1,334 |
| Pengukuran Minggu III | Mean | 148,10 | 9,134 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | | |
| | Lower Bound | 127,44 | |
| | Upper Bound | 168,76 | |
| | 5% Trimmed Mean | 147,44 | |
| Median | 148,50 | | |

| | | |
|---------------------|---------|-------|
| Variance | 834,322 | |
| Std. Deviation | 28,885 | |
| Minimum | 109 | |
| Maximum | 199 | |
| Range | 90 | |
| Interquartile Range | 37 | |
| Skewness | 1,439 | ,687 |
| Kurtosis | 1,024 | 1,334 |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|-----------------------|---------------------------------|----|-------------------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Pengukuran Minggu I | ,171 | 10 | ,200 [*] | ,910 | 10 | ,281 |
| Pengukuran Minggu II | ,154 | 10 | ,200 [*] | ,940 | 10 | ,551 |
| Pengukuran Minggu III | ,206 | 10 | ,200 [*] | ,920 | 10 | ,358 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran Hasil Uji Statistik *Paired Sample T test*

T-Test

Paired Samples Statistics

| | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--------|--------------------|--------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 | Pre test | 237,80 | 10 | 21,452 | 6,784 |
| | Post test minggu 1 | 213,70 | 10 | 25,863 | 8,179 |

Paired Samples Correlations

| | | N | Correlation | Sig. |
|--------|-------------------------------|----|-------------|------|
| Pair 1 | Pre test & Post test minggu 1 | 10 | ,881 | ,001 |

Paired Samples Statistics minggu 2

| | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--------|--------------------|--------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 | Pre test | 237,80 | 10 | 21,452 | 6,784 |
| | Post test minggu 2 | 173,20 | 10 | 23,385 | 7,395 |

Paired Samples Correlations

| | | N | Correlation | Sig. |
|--------|-------------------------------|----|-------------|------|
| Pair 1 | Pre test & Post test minggu 2 | 10 | ,833 | ,016 |

Paired Samples Statistics minggu 3

| | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--------|--------------------|--------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 | Pre test | 237,80 | 10 | 21,452 | 6,784 |
| | Post test minggu 3 | 148,10 | 10 | 28,885 | 9,134 |

Paired Samples Correlations

| | | N | Correlation | Sig. |
|--------|-------------------------------|----|-------------|------|
| Pair 1 | Pre test & Post test minggu 3 | 10 | ,752 | ,018 |

Paired Samples Test minggu 1

| | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|--------|-------|----|-----------------|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 Pre test - Post test minggu 1 | 24,100 | 12,288 | 3,886 | 15,310 | 32,890 | 6,202 | 9 | ,000 |

Paired Samples Test minggu 2

| | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|--------|-------|----|-----------------|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 Pre test - Post test minggu 2 | 64,600 | 27,802 | 8,792 | 44,712 | 84,488 | 7,348 | 9 | ,000 |

Paired Samples Test minggu 3

| | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|---------|--------|----|-----------------|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 Pre test - Post test minggu 3 | 89,700 | 25,334 | 8,011 | 71,577 | 107,823 | 11,197 | 9 | ,000 |

Hasil Uji statistik kontrol makanan terhadap kadar kolesterol T-Test

Paired Samples Statistics

| | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--|--------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan | 178,40 | 10 | 22,031 | 6,967 |
| jumlah konsumsi lemak selama latihan | 9,35 | 10 | 1,131 | ,358 |

Paired Samples Correlations

| | N | Correlation | Sig. |
|--|----|-------------|------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan & jumlah konsumsi lemak selama latihan | 10 | ,435 | ,209 |

Paired Samples Test

| | Paired Differences | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|---|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference |
| | Lower | | | |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi lemak selama latihan | 169,050 | 21,563 | 6,819 | 153,625 |

Paired Samples Test

| | Paired Differences | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--|---|--------|----|-----------------|
| | 95% Confidence Interval of the Difference | | | |
| | Upper | | | |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi lemak selama latihan | 184,475 | 24,792 | 9 | ,000 |

T-Test

Paired Samples Statistics

| | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--------|--|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 | Mean kadar koleterol selama latihan | 10 | 22,031 | 6,967 |
| | jumlah konsumsi Karbohidrat selama latihan | 10 | 7,212 | 2,281 |

Paired Samples Correlations

| | N | Correlation | Sig. |
|--------|--|-------------|------|
| Pair 1 | Mean kadar koleterol selama latihan & jumlah konsumsi Karbohidrat selama latihan | ,218 | ,545 |

Paired Samples Test

| | | Paired Differences | | | |
|--------|--|--------------------|----------------|-----------------|---|
| | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference |
| | | | | | Lower |
| Pair 1 | Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi Karbohidrat selama latihan | 28,550 | 21,634 | 6,841 | 13,074 |

Paired Samples Test

| | | Paired Differences | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--------|--|---|-------|----|-----------------|
| | | 95% Confidence Interval of the Difference | | | |
| | | Upper | | | |
| Pair 1 | Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi Karbohidrat selama latihan | 44,026 | 4,173 | 9 | ,002 |

T-Test

Paired Samples Statistics

| | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--|--------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan | 178,40 | 10 | 22,031 | 6,967 |
| jumlah konsumsi Serat selama latihan | 5,28 | 10 | ,603 | ,191 |

Paired Samples Correlations

| | N | Correlation | Sig. |
|---|----|-------------|------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan & jumlah konsumsi Serat selama latihan | 10 | -,228 | ,527 |

Paired Samples Test

| | Paired Differences | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|---|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference |
| | Lower | | | |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi Serat selama latihan | 173,120 | 22,176 | 7,013 | 157,256 |

Paired Samples Test

| | Paired Differences | t | df | Sig. (2-tailed) |
|---|---|--------|----|-----------------|
| | 95% Confidence Interval of the Difference | | | |
| | Upper | | | |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi Serat selama latihan | 188,984 | 24,686 | 9 | ,000 |

T-Test

Paired Samples Statistics

| | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--|--------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan | 178,40 | 10 | 22,031 | 6,967 |
| Pair 1 jumlah konsumsi PUFA selama latihan | 1,94 | 10 | ,202 | ,064 |

Paired Samples Correlations

| | N | Correlation | Sig. |
|--|----|-------------|------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan & jumlah konsumsi PUFA selama latihan | 10 | ,432 | ,212 |

Paired Samples Test

| | Paired Differences | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|---|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference |
| | Lower | | | |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi PUFA selama latihan | 176,463 | 21,945 | 6,940 | 160,765 |

Paired Samples Test

| | Paired Differences | T | df | Sig. (2-tailed) |
|--|---|--------|----|-----------------|
| | 95% Confidence Interval of the Difference | | | |
| | Upper | | | |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi PUFA selama latihan | 192,161 | 25,429 | 9 | ,000 |

T-Test

Paired Samples Statistics

| | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|---|--------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan | 178,40 | 10 | 22,031 | 6,967 |
| Pair 1 jumlah konsumsi Cholesterol selama latihan | 284,65 | 10 | 95,907 | 30,329 |

Paired Samples Correlations

| | N | Correlation | Sig. |
|---|----|-------------|------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan & jumlah konsumsi Cholesterol selama latihan | 10 | ,437 | ,207 |

Paired Samples Test

| | Paired Differences | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|---|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference |
| | | | | Lower |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi Cholesterol selama latihan | -106,246 | 88,531 | 27,996 | -169,577 |

Paired Samples Test

| | Paired Differences | T | df | Sig. (2-tailed) |
|---|---|--------|----|-----------------|
| | 95% Confidence Interval of the Difference | | | |
| | Upper | | | |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi Cholesterol selama latihan | -42,915 | -3,795 | 9 | ,004 |

T-Test

Paired Samples Statistics

| | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--|---------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan | 178,40 | 10 | 22,031 | 6,967 |
| Pair 1 jumlah konsumsi Kalori selama latihan | 2218,93 | 10 | 2924,805 | 924,905 |

Paired Samples Correlations

| | N | Correlation | Sig. |
|--|----|-------------|------|
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan & jumlah konsumsi Kalori selama latihan | 10 | -,066 | ,857 |









Paired Samples Test









| | Paired Differences | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|---|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference |
| | | | | Lower |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi Kalori selama latihan | -2040,530 | 2926,336 | 925,389 | -4133,905 |

Paired Samples Test

| | Paired Differences | T | df | Sig. (2-tailed) |
|--|---|--------|----|-----------------|
| | 95% Confidence Interval of the Difference | | | |
| | Upper | | | |
| Pair 1 Mean kadar koleterol selama latihan - jumlah konsumsi Kalori selama latihan | 52,845 | -2,205 | 9 | ,055 |

**GAMBAR KADAR KOLESTEROL SEBELUM DAN SESUDAH
SENAM AEROBIK MIX IMPACT**

| KODE RESPONDEN | SEBELUM | SESUDAH |
|----------------|---|---|
| SA1 |  |  |
| SA2 |  |  |
| SA3 |  |  |
| SA4 |  |  |

| | | |
|------------|--|---|
| <p>SA5</p> |  <p>A white NESCO MultiCheck F cholesterol meter with a blue test strip. The LCD screen displays 'CHOL mg/dL' and the value '257'. Below the screen, it shows '5:29' and '8:49'. The 'M' and 'S' buttons are visible at the bottom.</p> |  <p>An EasyTouch GCU cholesterol meter with a blue test strip. The LCD screen displays 'CHOL' and the value '149'. Below the screen, it shows '10:48' and '8:49'. The 'M' and 'S' buttons are visible at the bottom.</p> |
| <p>SA6</p> |  <p>A white NESCO MultiCheck F cholesterol meter with a blue test strip. The LCD screen displays 'CHOL' and the value '240'. Below the screen, it shows '5:02' and '8:49'. The 'M' and 'S' buttons are visible at the bottom.</p> |  <p>A white NESCO MultiCheck F cholesterol meter with a blue test strip. The LCD screen displays 'CHOL' and the value '155'. Below the screen, it shows '4:28' and '8:48'. The 'M' and 'S' buttons are visible at the bottom.</p> |
| <p>SA7</p> |  <p>A white NESCO MultiCheck F cholesterol meter with a blue test strip. The LCD screen displays 'CHOL' and the value '256'. Below the screen, it shows '5:02' and '8:49'. The 'M' and 'S' buttons are visible at the bottom.</p> |  <p>A white NESCO MultiCheck F cholesterol meter with a blue test strip. The LCD screen displays 'CHOL' and the value '199'. Below the screen, it shows '4:28' and '10:49'. The 'M' and 'S' buttons are visible at the bottom.</p> |
| <p>SA8</p> |  <p>A white NESCO MultiCheck F cholesterol meter with a blue test strip. The LCD screen displays 'CHOL' and the value '209'. Below the screen, it shows '4:28' and '8:43'. The 'M' and 'S' buttons are visible at the bottom.</p> |  <p>A white NESCO MultiCheck F cholesterol meter with a blue test strip. The LCD screen displays 'CHOL mg/dL' and the value '109'. Below the screen, it shows '4:28' and '10:53'. The 'M' and 'S' buttons are visible at the bottom.</p> |

SA9



SA10



DOKUMENTASI LATIHAN SENAM AEROBIC MIX IMPACT

