


METODE FUNGSI WALSH DALAM MENYELESAIKAN PERSAMAAN INTEGRAL

VOLTERRA LINEAR



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Matematika (S.Mat)
Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar*

Oleh :

ZULFATMI SAN

60600112008


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata, 30 Agustus 2016
Penyusun,

Zulfatmi San

NIM: 60600112008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Metode Fungsi Walsh dalam Menyelesaikan Persamaan Integral Volterra Linear”, yang disusun oleh Saudari **Zulfatmi San**, Nim: **60600112008** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **30 Agustus 2016 M**, bertepatan dengan **26 Dzulkaida 1437 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.).

Makassar, 30 Agustus 2016 M
26 Dzulkaida 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Risnawati Ibas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Ridwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada Rabb-ku, Allah swt.

Rabb tempat curhat yang paling tepat pemberi semangat dan pemberi harapan dibalik

keputusanku

untuk kedua orang tuaku tercinta yang selalu menjadi penyemangatku, tak henti-hentinya

selalu berdo'a untuk kesuksesanku.

Kepada seluruh keluarga, teman-teman yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi.

Almamater kebanggaanku terkhusus Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

MOTTO

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat di hantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanya sekali. Hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada meminta dan memohon.

Setiap orang tidak ada yang terlahir sempurna. Maka berjalanlah dengan percaya diri walaupun orang lain berusaha menjatuhkan kita dengan berbagai cara, siapa yang bersabar pasti beruntung “ Man Shabara Zhafira ”.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *ahirabbil'alamin*. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan serta Rahmat-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul “**Metode fungsi Walsh dalam Menyelesaikan Persamaan Integral Volterra Linear**” dapat diselesaikan. Salam dan shalawat dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama do'a dan dukungan yang tiada hentinya dari kedua orang tua tercinta yang selalu setia memberikan bantuan dan semangat selama proses penyusunan skripsi.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Bapak Irwan, S.Si., M.Si**, pembimbing I dan Pembimbing Akademik, serta **Bapak Muh Irwan, S.Si., M.Si**, pembimbing II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar beserta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Irwan S.Si., M.Si ketua jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh dosen pengajar dan staf jurusan, atas segala bantuannya kepada penulis.
3. Tim Penguji. Bapak dan Ibu terima kasih atas sarannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada sahabat dan keluarga yang setia ikut memberikan saran dan membantu dalam penulisan skripsi ini yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat serta semangat dan do'anya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 “KU12VA” yang selalu memberikan semangat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi.
6. Serta Pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik motivasi maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Agar dapat membantu penulis skripsi selanjutnya untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi dan penulis berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Makassar, Juli 2016
Penulis,
ALA UDDIN
M A K A S S A R

Zulfatmi San

NIM. 60600112008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SIMBOL	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Masalah	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hubungan Al-Quran tentang Metode Fungsi Walsh dalam Menyelesaikan Persamaan Integral Volterra Linear	11
B. Pengertian Integral	14
C. Fungsi Walsh	16
D. Persamaan Integral Volterra	22
E. Konvensi Penjumlahan Einstein	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
C. Prosedur Penelitian	31


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil.....	32
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR SIMBOL

f	= fungsi
x	= variabel
y	= variabel
$[a, b]$	= interval
$+$	= penjumlahan
$-$	= pengurangan
\leq	= besar sama dengan
\pm	= plus minus
\int	= integral
C	= konstanta
F	= anti turunan dari f
D_x	= operator linear
W_0, W_1, \dots, W_n	= fungsi walsh
r_0, r_1, \dots, r_n	= fungsi rademacher
$b_q, b_{q-1}, b_{q-2}, \dots, b_1$	= biner
$f \in L^2 [0,1]$	= perluasan fungsi walsh
c_i	= koefisien
f_j	= nilai rata-rata fungsi
$b = P_m^T c$	= perkalian matriks
P_m	= matriks operasional
$u(t)$	= fungsi yang tidak diketahui
Σ	= sigma

$K(x, t)$	= fungsi kernel
λ	= lamda
$F(u(t))$	= fungsi nonlinear
e^x	= Euler pangkat x
$n!$	= n faktorial
Sin	= sinus
Cos	= cosinus



ABSTRAK

Nama : Zulfatmi San

NIM : 60600112008

Judul : Metode Fungsi Walsh Dalam Menyelesaikan Persamaan Integral Volterra Linear

Skripsi ini membahas tentang penyelesaian persamaan integral volterra linear yang diterapkan pada tiga kasus persamaan integral volterra linear dengan cara menentukan solusi eksak dari masing- masing tiga kasus persamaan integral volterra linear. Selanjutnya mencari solusi menggunakan metode fungsi Walsh yaitu mengekspansi masing-masing suku ke dalam deret Walsh, menyederhanakan bentuk penulisan persamaan ke dalam bentuk persamaan integral, menyelesaikan persamaan integral volterra linier dengan menggunakan sifat fungsi Walsh sehingga menghasilkan persamaan linear yang ekuivalen dengan solusi eksak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian persamaan integral volterra linier menggunakan metode fungsi walsh yang diterapkan pada tiga kasus persamaan integral volterra linear.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh solusi dari penerapan tiga kasus persamaan integral volterra linear yaitu solusi eksak dan solusi metode fungsi Walsh yang dihasilkan dari masing-masing kasus I, II dan III persamaan integral volterra linear yaitu solusi eksak $\sin x$, e^x dan xe^x . Solusi dari metode fungsi Walsh $C_m = h_m - h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$, $C_m = 1 + h_m + h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$ dan, $C_m = q_m + (2 l_m P_m^T l_m + 2 Q_m P_m^T Q_m) c_m$, solusi metode fungsi Walsh ekuivalen dengan solusi eksak.

Kata Kunci: *Persamaan Integral Volterra Linear, Solusi Eksak, Metode fungsi Walsh*

ABSTRACT

Name : Zulfatmi San

NIM : 60600112008

Title : Walsh Function Method In Solving Linear Volterra Integral Equations

This thesis discusses the completion of volterra linear integral equations are applied in three cases volterra linear integral equations by determining the exact solution of each of the three cases volterra linear integral equations. Next look for a solution using Walsh function that expands each tribe into a series Walsh, simplifying forms of writing the equation in the form of integral equations, integral equations volterra finish using the linear nature of the Walsh function to produce a linear equation which is equivalent to the exact solution. Therefore, this study aims to determine how the settlement of volterra integral equations using linear walsh function method is applied to three cases volterra linear integral equations.

Based on the results obtained by the solution from the application of the three cases of integral equations volterra linear ie the exact solution and the solution function method Walsh produced from each case I, II and III of the integral equation volterra linear ie exact solution $\sin x$, e^x and xe^x . The solution of the function method Walsh $C_m = h_m - h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$, $C_m = 1 + h_m + h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$ dan, $C_m = q_m + (2 l_m P_m^T l_m + 2 Q_m P_m^T Q_m) c_m$, the solution method Walsh function equivalent to the exact solution.

Keywords: *Linear Volterra Integral Equations, Exact Solutions, Methods Walsh function*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan tidak lepas dari dasar pemikiran, pengetahuan yang perlu dikaji seperti halnya matematika yang pada dasarnya dilahirkan dari dasar pemikiran seorang ilmuwan ahli matematika aljabar yang dikenal dengan Leonardo Fibonacci sebagai ahli matematika aljabar yang ternyata hasil pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ilmuwan muslim yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi sebagai penemu angka 0 (nol) yang hingga kini dipergunakan, beliau juga berjasa dalam ilmu ukur sudut melalui fungsi sinus dan tange, persamaan linear dan kuadrat serta kalkulasi integrasi (kalkulus integral).¹

Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan khalifah, beliau pernah memperkenalkan angka-angka india dan cara perhitungan India pada dunia Islam, sehingga berkat jasa beliau sehingga perkembangan ilmu pengetahuan di dunia semakin berkembang dan perlu dikaji, Islam khususnya karena didukung oleh Al-Quran yang senantiasa memerintahkan kepada penganutnya untuk memperhatikan, mengamati dan mengkaji. Dengan pemahaman akan rahasia alam ciptaan Allah SWT. Dapat memperkokoh keimanan seseorang. Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT. Mempunyai hukum-hukum dalam sains modern disebut hukum alam yakni ketentuan Allah SWT. Di alam semesta yang berlaku terus menerus sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Fathir ayat 43 yaitu :

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

¹ <http://yafi20.co.id/2010/10/sejarah-dan-penemu-angka-nol.html>

Terjemahnya:

“Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat perubahan bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu” (Q.S Fathir ayat 43).²

Maksud dari Ayat tersebut yaitu sunnatullah (hukum alam) yang bersifat konstanta yang mengalami perubahan, sehingga dapat ditelaah secara matematis dengan demikian dapat diketahui esensinya antara lain dengan analisis matematis dan bersifat konstanta seperti halnya dari hasil integral dimana nilai C bersifat konstanta sehingga, hasil integral menggunakan metode fungsi Walsh yang merupakan solusi. Dimana dalam hal ini metode fungsi Walsh merupakan cara untuk menemukan solusi dari persamaan integral volterra linear sehingga membentuk persamaan linear.³

Adapun integrasi penggunaan integral khususnya integral volterra linear menggunakan metode fungsi walsh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada bidang teknologi di gunakan pada laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu dan penggunaan kecepatan pesawat ulang alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Pada bidang kedokteran integral digunakan pada dosimetri (ilmu cabang dari radioterapi) salah satunya sinar-X (kerjanya rontgen, analisis hasil rontgen atau tentang penyakit dalam). Kalkulus berperan pada saat penentuan lokasi lokasi koordinat penembakan laser. Metode fungsi walsh digunakan mengukur volume tumor atau pasca penembakan laser volume menurun pada operasi. Aplikasi kalkulus adalah mengukur fungsi

² Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2008), h.439

³ Muh Arsyad. *Dasar-dasar Matematika Untuk Fisikawan*, (Makassar: CV Berkah Utami, 2006), h.1

pergerakan kulit tumor setiap waktu sumber lain menganggap tumor adalah system fluida jadi hokum-hukun fluida untuk ilmu dosimetri pada pada pemanfaatan fungsi Walsh.⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu matematika secara umum wajib dalam segala hal, sehingga setiap manusia wajib menuntut ilmu. Sehingga menuntut ilmu tidak dibatasi usia, kemudian seseorang dalam menuntut ilmu telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mujadillah ayat 11 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S Al-Mujadillah ayat 11).⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. Memerintahkan kepada manusia untuk menuntut ilmu dan manusia diberikan pengetahuan untuk mengerjakan atau mengembangkan ilmu yang di dapat sehingga mampu menjadi orang yang mempunyai derajat yang sama kepada

⁴ https://academia.edu/8714866/Aplikasi_Integral_dalam_kehidupan

⁵ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.543

sesama muslim sehingga tidak hanya agama yang mereka pelajari tetapi ilmu pengetahuan yang dikembangkan.

Salah satu ilmu yang termasuk dalam kelompok analisis yang masih berkembang yaitu teori integral seperti ilmu-ilmu lainnya baik dari teori maupun pemakaiannya, persamaan integral merupakan kebalikan dari persamaan diferensial. Teori integral memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan teknologi yang semakin modern. Munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pengintegralan sebagai langkah utama dalam penyelesaian berbagai macam integral dalam berbagai bidang matematika, fisika dan teknik sebagai ilmu-ilmu yang menopang perkembangan teknologi.⁶

Persamaan integral sering muncul dalam permasalahan di bidang fisika, teknik, ekonomi, biologi, matematika terapan dan lain sebagainya. Model seperti laju pertumbuhan penduduk, laju kelahiran, transfer radiasi, proses penyaringan asap rokok, merupakan model-model yang disajikan dalam bentuk persamaan integral.

Ada beberapa macam penyelesaian integral volterra seperti metode dekomposisi adomian, metode deret taylor, metode numerik seperti metode iterasi, metode runge kutta dan metode fungsi walsh. Metode dekomposisi adomian merupakan metode yang disubstitusikan ke dalam deret tak hingga dan polinomial tak hingga. Metode deret taylor juga merupakan bentuk substitusi polinomial yang ditentukan dari tiap suku ke- n . Metode numerik merupakan suatu teknik penyelesaian yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan dan dilakukan secara berulang-ulang dengan bantuan komputer atau secara manual (*hand calculation*), tetapi semua metode tersebut menurut peneliti sebelumnya masih memiliki kelemahan diantara untuk mendapatkan nilai atau hasilnya harus melakukan perhitungan yang berulang sampai n kali dan

⁶ Indah R,A,S, *Integral Lebesgue di R^1 Skipsi*, Malang, 2009,h.15-16

cara penyelesaian terlalu rumit menurut penelitian sebelumnya, jika menggunakan metode numerik masih belum efisien karena tingkat galat toleransi belum mencapai sehingga hasil hitungnya belum akurat.⁷

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode fungsi walsh, dimana fungsi walsh merupakan fungsi gelombang persegi yang lengkap yang telah digunakan dalam berbagai bidang yang cukup luas diantaranya analisis komunikasi, sistem radar, untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk, proses penyaringan asap rokok dan dapat digunakan juga pada penerapan dalam fisika untuk menghitung suhu dalam suatu ruangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Blyth menggunakan metode fungsi Walsh untuk menyelesaikan masalah variasional serta persamaan integral fredholm dari kedua eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa metode fungsi Walsh ternyata mampu memberikan galat yang lebih kecil dan hasil perhitungannya lebih akurat dan juga perhitungan lebih sederhana dibandingkan dengan metode yang lain. Dari eksperimen numerik, Corrington menyimpulkan bahwa fungsi Walsh dapat digunakan untuk mendapatkan penyelesaian pendekatan dari persamaan integral, khususnya persamaan integral Volterra. Selanjutnya Chen dan Hsiao (1975, 265-280) serta Blyth dan Uljanov (1996, 621-628; 1996, 137-143) masing-masing menggunakan metode fungsi Walsh untuk menyelesaikan masalah variasional serta persamaan integral Fredholm. Dari kedua eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa

⁷ Citrahadi, *Perbandingan Solusi persamaan Integral Volterra Nonlinear dengan Metode Volterra-Runge_Kutta dan Metode Iterasi*, Program Studi Ganda Teknik Informatika dan Matematika Skripsi Sarjana, Universitas Bina Nusantara 2005/2006, h.1-2

metode fungsi Walsh mampu memberikan galat yang lebih kecil dibandingkan apabila digunakan metode yang telah ada, seperti metode Galerkin ataupun *middle point method*.⁸

Selain itu, penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian Purnami Widyaningsih tentang “Efisiensi penggunaan V-Cycle dalam metode fungsi walsh untuk menyelesaikan integral fredholm linier”, diteliti pada tahun 2003 yang dipresentasikan dalam seminar nasional menyimpulkan bahwa eksperimen numerik menunjukkan bahwa kombinasi metode fungsi Walsh dan v-cycle dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi metode fungsi Walsh. Aplikasi metode ini dilakukan dalam tes standar yang lebih guna diperoleh suatu penyelesaian yang baru yang lebih baik dalam penyelesaian masalah integral fredholm. Sehingga dalam penelitian ini peneliti tertarik meneliti tentang metode fungsi Walsh untuk menyelesaikan integral volterra linier .

Persamaan integral volterra memuat fungsi tidak diketahui dimana fungsi tersebut berada dalam operasi integral. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknik dan ilmu pengetahuan maka semakin banyak variasi bentuk-bentuk dari penyelesaian persamaan integral volterra. Selain itu banyak pula variasi metode penyelesaian diantaranya fungsi walsh.⁹

Metode fungsi Walsh sebagai fungsi ortogonal dengan nilai-nilai konstanta yang secara luas diterapkan sebagai alat analisis maupun masalah lain dari sistem ilmu pengetahuan. Perbandingan dasar dari fungsi lainnya yang polinomial, lebih mudah untuk perhitungan dalam

⁸ Purnami Widyaningsih, *Efisiensi Penggunaan V-cycle Dalam Metode Fungsi Walsh Untuk Menyelesaikan Persamaan Integral Fredholm Linier*, Jurnal dan Komputer, Vol.6.No 1,11-19 April 2003, ISSN:1410-8518, h.2

⁹ Zerlan okmi, *Penyelesaian Sistem Persaman Integral Volterra Dengan Dekomposisi Adomian*. JOM FMIPA Vol 1 No.2 Februari 2015. h.1.

memecahkan masalah. Fungsi ini telah digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berbeda pada persamaan integral volterra.¹⁰

Metode selalu diperlukan untuk memecahkan persamaan integral karena penyelesaian integral dapat diselesaikan beberapa metode dalam penyelesaiannya, dimana setiap metode memiliki fungsi tersendiri dalam menyelesaikan berbagai macam integral. Beberapa macam metode yang sering digunakan dalam menyelesaikan berbagai macam integral diantaranya fungsi walsh yang dapat menyelesaikan integral baik masalah-masalah teknik yang melibatkan fungsi Walsh dan masih banyak fungsi lainnya. Salah satu pengaruh terhadap perkembangan fungsi Walsh yaitu bahwa metode ini mampu menyelesaikan persamaan linier dan non linier bahkan melibatkan penggunaan transformasi Walsh yang lebih cepat dibandingkan dengan transformasi lainnya. Fungsi Walsh memudahkan dalam memecahkan suatu masalah.¹¹

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik menggunakan metode fungsi Walsh untuk menyelesaikan integral khususnya integral volterra linier. Dengan judul “ *Metode fungsi Walsh Dalam Menyelesaikan Persamaan Integral Volterra Linier* “.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

B. Rumusan Masalah

¹⁰ K. Maleknejad, *Iterated Block-Pulse Method For solving Volterra Integral Equations*, Applied Mathematics 2012,2(1), h,17-20

¹¹ W.F. Blyth, *Volterra Integral equations solved in Fredholm form Using Walsh Function*, Anziam J.45 (E) pp C269-C282,2004,h.2-3

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian persamaan integral volterra linier menggunakan metode fungsi walsh yang diterapkan pada tiga kasus persamaan integral volterra linear ?.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara penyelesaian persamaan integral volterra linier menggunakan metode fungsi walsh yang diterapkan pada tiga kasus persamaan integral volterra linear.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan keilmuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode fungsi walsh dalam menyelesaikan integral volterra linier.
 - b. Mengembangkan wawasan keilmuan tentang pendeskripsian yang berkaitan dengan metode fungsi walsh dalam menyelesaikan integral volterra linier.
2. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan informasi untuk kajian lebih lanjut mengenai metode fungsi walsh dalam menyelesaikan integral volterra linier sehingga menambah pemahaman dan penguasaan tentang berbagai metode untuk menyelesaikan integral.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, serta agar pembahasan tidak meluas maka peneliti memberikan batasan masalah bahwa skripsi ini membahas tentang metode fungsi walsh dalam menyelesaikan persamaan integral volterra linier dengan menerapkan 3 (tiga) kasus persamaan integral volterra linear.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, secara umum dapat dilihat dari sistematik penulisan dibawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini merupakan bab kajian pustaka yang berisi konsep-konsep yang menjadi landasan pembahasan masalah yang memuat pembahasan metode fungsi walsh dalam menyelesaikan integral volterra linier.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bab metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, dan prosedur penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil dan pembahasan tentang tiga kasus persamaan integral volterra linear dengan metode fungsi walsh

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Al-Quran tentang Metode Fungsi Walsh dalam Menyelesaikan Persamaan Integral Volterra Linear

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Fathir ayat 43 kaitan Al-Quran dengan metode fungsi Walsh dengan persamaan integral volterra linear yaitu:

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“ Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu”.(Q.S Fathir ayat 43).¹²

Maksud dari ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa salah satu sunnah-Nya yang bersifat konstanta dari hasil integral menggunakan metode fungsi Walsh yang merupakan hasil integral. Dimana dalam hal ini metode fungsi Walsh merupakan cara untuk menemukan solusi dari persamaan integral volterra linear.

Ayat lain yang menjelaskan tentang hubungan Al-Quran tentang masalah yang didalam operasi perhitungan baik integral maupun operasi lainnya yaitu terdapat pada Surah Asy-syarh yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

¹² Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2008), h.439

“karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Asy-syarh ayat 5-6)¹³.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT bermaksud menerangkan salah satu sunnah-Nya yang bersifat umum dan konsisten yaitu setiap kesulitan disertai dengan kemudahan seperti halnya dalam mencari hasil integral menggunakan metode fungsi Walsh apabila suatu persamaan integral volterra tidak dapat ditentukan solusi eksaknya, maka akan digunakan bantuan *hand calculation* atau metode numerik. Selama masih ada jalan lain untuk menyelesaikan persamaan integral volterra. Hal ini dibuktikan seperti halnya dengan contoh konkret pada diri pribadi nabi Muhammad SAW yang dianiaya oleh kaum musyrikin dimekah selama tiga tahun. Tetapi akhirnya tiba juga kelapangan dan jalan keluar yang selama ini mereka dambakan.

Berdasarkan uraian tersebut arti dan tafsiran tersebut dijelaskan bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan . Hal ini sejalan dengan munculnya solusi metode fungsi Walsh dalam menyelesaikan persamaan integral volterra linear. Demikian pula dengan beberapa kasus dalam persamaan integral volterra tidak semua kasus dapat diselesaikan secara manual, sehingga metode fungsi Walsh berperan penting untuk mempermudah mendapatkan solusi dari persamaan integral volterra linear.

Dalam Al-Quran yang menjelaskan peranan fungsi Walsh dalam menyelesaikan persamaan integral volterra linear yaitu :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

¹³ Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2008),h.596

Terjemahnya:

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui” (Q.S Yunus ayat 5).¹⁴

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah menjadikan matahari dan bulan bercahaya sebagai salah satu bentuk kekuasaan yang dapat ditelaah secara matematis seperti hal sebuah operasi dalam matematika baik itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sebuah persamaan integral volterra, dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan dalam arti dengan munculnya metode fungsi Walsh sebagai cara untuk menyelesaikan persamaan integral volterra sebagai solusi yang memudahkan dalam memecahkan persamaan integral volterra linear kemudian Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.


B. Pengertian Integral

Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan diferensiasi adalah satu dari dua operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam deferensial dimana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi deferensial. Bila diberikan suatu fungsi f dari variabel real x dengan interval $[a,b]$ dari sebuah garis lurus, maka integral tertentu

¹⁴ Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2008),h.208

$$\int_a^b f(x) dx \quad (1)$$

Jika diberikan suatu fungsi f dari variabel x dengan interval $[a,b]$ maka integral tentuannya dapat digambarkan sebagai berikut:



didefinisikan sebagai area yang dibatasi sumbu x , sumbu y dan garis vertikal $x = a$ dan $x = b$, dengan area yang berada diatas sumbu- x bernilai positif dan bernilai negatif. Kata integral dapat digunakan untuk merujuk pada anti turunan sebuah fungsi F yang turunannya adalah fungsi f . Notasinya ditulis sebagai ¹⁵

$$F = \int f(x) dx \quad (2)$$

Definisi 1 :

Kita mempunyai F suatu antiturunan f pada selang I jika $D_x F(x) = f(x)$ pada I yakni jika $F'(x) = f(x)$ untuk semua x dalam I .

Definisi 2 :

Jika $F(x)+C$ kontinu dan $\frac{dF}{dx} = f(x)$, maka $F(x)+C$ disebut integral tidak tentu dari $f(x)$, ditulis

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Integral>

Dalam bentuk tersebut $f(x)$ disebut fungsi integral, $F(x)+C$ disebut fungsi primitif dan C disebut konstanta integral. Dengan mengikuti Leibniz, sering menggunakan istilah integral tak tentu sebagai ganti antiturunan. Antideferensial berarti mengintegrasikan, dilambang $\int f(x)dx$. \int disebut tanda integral dan $f(x)$ disebut integral. Leibniz menggunakan kata sifat tak tentu sebagai pengingat bahwa integral tak tentu selalu mencakup suatu konstanta sebarang.¹⁶

Integral tak tentu adalah Linier, D_x suatu operator linier yang berarti dua hal.

$$a. D_x [kf(x)] = kD_x f(x)$$

$$b. D_x [f(x)+g(x)] = D_x f(x) + D_x g(x). \quad (3)$$

Sifat-sifat Integral

1. $\int f \frac{dF}{dx} dx = F(x) + C$, Sesuai dengan definisi
2. $\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$, $k =$ konstanta
3. $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

C. Fungsi Walsh

1. Pengertian Fungsi Walsh

Pada tahun 1922, Rademacher mengembangkan himpunan fungsi gelombang persegi tidak lengkap ortonormal pada $[0,1]$. Selanjutnya tahun 1923, selanjutnya disebut fungsi Walsh, metode fungsi Walsh adalah ekuivalen dengan menyelesaikan sistem persamaan linear. Chen dan Hsiao mendefinisikan fungsi walsh,

¹⁶ Purcell. *Kalkulus Edisi Kedelapan Jilid 1*.(Jakarta: Erlangga, 2003), h.213-215

Definisi 3

$$W_0 = 1$$

$$W_1(x) = r_1(x)$$

$$W_2(x) = [r_2(x)]^1 [r_1(x)]^0 \quad (4)$$

⋮

$$W_n(x) = [r_q(x)]^{b_q} [r_{q-1}(x)]^{b_{q-1}} \dots [r_1(x)]^{b_1}$$

dimana,

$$q = \lceil \log_2(n) \rceil + 1$$

$$n = b_q \cdot 2^{q-1} + b_{q-1} \cdot 2^{q-2} + \dots + b_1 \cdot 2^0$$

dan

$b_q, b_{q-1}, b_{q-2}, \dots, b_1$ adalah biner

Fungsi rademacher suatu fungsi gelombang kuadrat dengan periode sama dengan


$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, 2^{(1-k)}$ masing-masing. Sehingga fungsi walsh pada ditunjukkan pada grafik berikut


dengan menyatakan jumlah dari gelombang persegi $r_k(t)$ adalah 2^{k-1} . Himpunan tidak lengkap

untuk $r_0(t)$ dimana $t = \frac{1}{2}$

Grafik empat fungsi Walsh yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Empat grafik fungsi Walsh yaitu :





Gambar Empat Fungsi Walsh

2. Sifat Integral Fungsi Walsh dan Fungsi Kernel

Fungsi Walsh memiliki banyak sifat yang sama dengan fungsi trigonometri. Namun, lebih sederhana dalam struktur ke fungsi trigonometri dengan mengambil nilai-nilai 1 dan -1 yang dinyatakan sebagai kombinasi linear dari fungsi Haar, bukti tentang fungsi Haar membawa ke sistem Walsh.¹⁷ Sifat integral fungsi Walsh menurut Corrington, setiap integral fungsi Walsh dapat disajikan sebagai berikut :

$$\int_0^x W_n(x) = \sum_{i,j=0}^{m-1} c_i w_i \pm c_j w_j \pm h_i w_i \pm h_j w_j$$

$$= \sum_{i,j=0}^{m-1} c m_i \pm c_{m_j} \pm h_i w_i \pm h_j w_j$$

Dengan konvensi penjumlahan Einstein

$$= c m_{ij} \pm h m_{ij} \quad (5)$$

Untuk fungsi trigonometri pada fungsi sinus dan cosinus yaitu

¹⁷ W.F Blyth, *Volterra integral equations solved in fredholm from using Walsh Function*, Mathematics & Statistic, RMIT Unersity, Melbourne, Australia, Received 8 August 2003:revised 6 Jan 2004. h.2-3

$$\int_0^x W_n(x) = \sum_{i,j=0}^{m-1} q_i w_i \pm q w_j \pm l w_i \pm l w_j$$

$$= \sum_{i,j=0}^{m-1} q m_i \pm q m_j \pm l m_i \pm l m_j$$

Dengan konvensi penjumlahan Einstein

$$= q m_{ij} \pm l m_{ij} \quad (6)$$

Dimana $n = 0,1,2, \dots$ dan $i, j = 0,1,2, \dots, m - 1$ di tulis sebagai bilangan biner dengan operasi penjumlahan modulo 2.

Keterangan :

c_{ij} = Koefisien deret fungsi Walsh ke i, j

w_{ij} = fungsi Walsh ke i, j

q_{ij} = Koefisien fungsi sinus pada deret fungsi Walsh ke i, j

l_{ij} = Koefisien fungsi sinus pada deret fungsi Walsh ke i, j

Uljanov dan Blyth pada tahun 1996 mengembangkan algoritma baru yang selanjutnya di sebut fungsi Walsh untuk menyelesaikan persamaan integral volterra linear dengan mengekspansikan tiap suku dari persamaan integralnya dengan deret fungsi Walsh berhingga dan fungsi kernel yang didekati dengan fungsi Walsh rangkap berhingga yaitu $u(x) = g(x) + \int_a^x K(x, t)u(t)dt$. Dengan $g(x)$ dan kernel $K(x, t)$ diketahui dengan $u(t)$ adalah fungsi linear yang akan ditentukan.

$u(x) \approx \sum_{i=0}^{m-1} c_i W_i(x)$ $g(x) \approx \sum_{i=0}^{m-1} g W_i(x)$ dan $K(x, t) \approx \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{m-1} a_{ji} W_i(x) W_j(t)$. Menyederhanakan penulisan persamaan digunakan konvensi penjumlahan Einstein sehingga persamaan menjadi

$$u(x) \approx c_i W_i(x), g(x) \approx g_i W_i(x) \text{ dan } K(x, t) \approx a_{ji} W_i(x) W_j(t) \quad (7)$$

dengan $i, j = 0, 1, 2, \dots, m$, $m = 2^n$, $n \in \mathbb{N}$.

$$c_i W_i(x) = g_i W_i(x) + a_{ij} W_i(x) c_k$$

atau

$$c_i = g_i + a_{ij} c_k \quad (8)$$

sehingga persamaan (6) membentuk persamaan linear¹⁸

$$c_m = g_m + A_m c_m \quad (9)$$

Urutan dari fungsi Walsh, setiap fungsi $f \in L^2 [0,1]$ yang di perluas sebagai rangkaian fungsi Walsh yaitu :

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i W_i(x) \quad \text{dimana} \quad c_i = \int_0^1 f(x) W_i dx \quad (10)$$

Dari deret fourier Walsh $m = 2^n$ jumlah parsial, deret walsh dari fungsi f adalah perpotongan konstan, sama dengan rata-rata L^1 dari f , pada masing-masing sub interval $[(i-1)/m, i/m]$. Fungsi Walsh selalu terpotong untuk $m=2^n$ dalam hal ini, koefisien c_i dari fungsi Walsh yang diberikan

$$c_i = \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{m} W_{ij} f_j \quad (11)$$

Dimana f_j adalah nilai rata-rata dari fungsi $f(x)$ dalam interval j untuk $1/m$ dalam interval $(0,1)$, dan W_{ij} adalah fungsi Walsh yang berada di i, j sub interval. urutan m fungsi walsh matriks W_m memiliki unsur-unsur W_{ij} .

¹⁸ Masduki, *efisiensi dan akurasi gabungan metode fungsi Walsh dan multigirid untuk menyelesaikan persamaan integral fredholm linear*, MIPA vol. 17, No 1, januari 2007, h. 75-80

Misalkan $f(x)$ memiliki fungsi Walsh dengan koefisien C_i dan integral dari 0 sampai x memiliki fungsi Walsh dengan koefisien b_i $\int_0^x f(t)dt = \sum_{i=0}^{\infty} b_i W_i(x)$. Jika memotong untuk $m=2^n$ dan menggunakan vektor, integrasi dilakukan oleh perkalian matriks $b = P_m^T c$.

Blyth menuliskan pendekatan integral fungsi Walsh sebagai deret dengan koefisien dapat ditentukan dengan menggunakan matriks operasional P_m yang telah diberikan oleh Chen dan Hsiao¹⁹. Apabila

$$f(x) = \sum_{i=0}^{m-1} C_i W_i(x), \quad \int_0^x f(t)dt = \sum_{i=0}^{m-1} b_i W_i(x) \quad (12)$$

maka

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_{m-1} \end{bmatrix} = P_m^T \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_{m-1} \end{bmatrix}$$

dengan

$$P_m^T = \begin{pmatrix} \frac{Pm}{2} & \frac{1}{2m}Im/2 \\ -\frac{1}{2m}Im & Om/2 \end{pmatrix}, \quad P_2^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1/4 \\ -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix} \quad (13)$$

Definisi fungsi kernel

Fungsi kernel $k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi yang simetrik terhadap titik pusat O dan mempunyai sifat :

$$\int_{-\infty}^{\infty} K(x)dx = 1 \quad (14)$$

¹⁹ W.F Blyth, *Volterra integral equations solved in fredholm from using Walsh Function*, Mathematics & Statistic, RMIT Unersity, Melbourne, Australia, Received 8 August 2003:revised 6 Jan 2004. h.3

Dari definisi diatas, jika K adalah fungsi nonnegative maka K dapat juga diartikan sebagai fungsi padat peluang.

Fungsi-fungsi kernel (K) mempunyai deret pada fungsi walsh yaitu $[-1,1]$ dan memenuhi syarat-syarat berikut :²⁰

$$\begin{aligned}
 1. \int_{-1}^1 K(u) du &= 0 & 3. \int_{-1}^1 u^2 K(u) du &= \alpha \neq 0 \\
 2. \int_{-1}^1 uK(u) du &= 1 & 4. \int_{-1}^1 K^2(u) du &< \infty
 \end{aligned} \tag{15}$$

3. Macam-macam Fungsi Walsh

a. Fungsi Walsh pada $[0,1]$ yang berbentuk $\{f_1, f_2\}$ untuk $L^p([0,1])$

Suatu fungsi Walsh didefinisikan pada $[0,1]$ yang terdiri dari dua fungsi bebas linier yang berlaku $f_1, f_2 \in L^p([0,1])$. Untuk $h(x) \in L^p([0,1])$, sehingga untuk normal-2 $\|h, f_i\|_p$ untuk $i=1,2$ dapat dicari dengan menggunakan:

$$\|h, f_i\|_p = \left(\frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 |h(x)f_i(y) - h(y)f_i(x)|^p dx dy \right)^{\frac{1}{p}} \text{ untuk } i=1,2$$

Dengan memanfaatkan ketaksamaan

$$\begin{aligned}
 \|h, f_1\|_p &\leq 2^{1-\frac{2}{p}} \|h\|_p \\
 \|h, f_2\|_p &\leq 2^{1-\frac{2}{p}} \|h\|_p
 \end{aligned} \tag{16}$$

Sehingga aturan baru yang dihasilkan untuk kasus fungsi bebas linear $\{f_1, f_2\}$

$$\begin{aligned}
 \|h\|_p^* &\leq [2^{p-1}]^{\frac{1}{p}} [\|h\|_p]^{\frac{1}{p}} \\
 \|h\|_p^* &\leq 2^{1-\frac{1}{p}} \|h\|_p
 \end{aligned} \tag{17}$$

b. Fungsi Walsh pada $[0,1]$ yang berbentuk $\{g_1, g_2\}$ untuk $L^p[0,1]$

²⁰ Fitriani Agustina, *Kernel Wavelet*, Jurusan Pendidikan Matematika FPMIPA UPI-Bandung.h.1

Didefinisikan fungsi bebas linier $\{g_1, g_2\} = \alpha f_1, \beta f_2$, dengan α, β adalah bilangan bulat di \mathbb{R} dan $\{f_1, f_2\}$ adalah persamaan. Tampak jelas bahwa $g_1, g_2 \in L^p([0,1])$. Dengan cara yang sama pada persamaan, akan didapat hubungan sesuai dengan fungsi bebas linier yang dipilih.

Ketaksamaan dapat dipakai untuk menghasilkan:

$$\begin{aligned}\|h, g_1\|_p &\leq 2^{1-\frac{2}{p}}|\alpha|\|h\|_p \\ \|h, g_2\|_p &\leq (2)^{1-\frac{2}{p}}\|h\|_p|\beta|\end{aligned}\quad (18)$$

Sehingga aturan baru yang dihasilkan untuk kasus fungsi bebas linear $\{g_1, g_2\}$

$$\begin{aligned}\|h\|_p^* &= [\|h, f_1\|^p + |h, f_2|^p]^{\frac{1}{p}} \\ \|h\|_p^* &\leq 2^{1-\frac{1}{p}} [\|h\|_p^p]^{\frac{1}{p}} (|\alpha| + |\beta|).\end{aligned}\quad (19)$$

c. Fungsi Walsh pada $[0,1]$ yang berbentuk $\{g_1, g_2, \dots, g_k, \dots, g_n\}$ untuk $[0,1]$

Suatu $\{g_1, g_2, \dots, g_k, \dots, g_n\} = \{\alpha_1 f_1, \alpha_2 f_2, \dots, \alpha_k f_k, \alpha_n f_n\}$, dengan $f_1, f_2, f_3, \dots, f_k, \dots, f_n$ berada pada interval $[0,1]$ untuk pengambilan $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_k, \dots, \alpha_n$ sebagai bilangan real positif.²¹

Untuk kasus ini dihasilkan:

$$\begin{aligned}\|h, g_1\|_p &\leq (2n)^{\frac{1}{p}} 2|\alpha_1|\|h\|_p, \\ \|h, g_2\|_p &\leq (2n)^{\frac{1}{p}} 2|\alpha_2|\|h\|_p, \\ \|h, g_3\|_p &\leq (2n)^{\frac{1}{p}} 2|\alpha_3|\|h\|_p, \\ \|h, g_4\|_p &\leq (2n)^{\frac{1}{p}} 2|\alpha_4|\|h\|_p,\end{aligned}$$

²¹ Wahyuniati. *Konstruksi rumus norma alternatif untuk ruang fungsi [0,1]*. Seminar Nasional Pendidikan Sains FMIPA Unesa.2008, h.40-42.

dan seterusnya sampai n satu fungsi yaitu $\|h, g_n\|_p \leq (2n)^{\frac{1}{p}} |\alpha_n| \|h\|_p$. Sedangkan aturan baru yang dihasilkan untuk kasus fungsi bebas linier adalah:

$$\|h\|_p^* \leq \|h, g_1\|_p + \dots + \|h, g_k\|_p + \dots + \|h, g_n\|_p \quad (20)$$

Sehingga didapat aturan baru dengan fungsi bebas linear $\{g_1, g_2, \dots, g_k, \dots, g_n\}$ adalah

$$\|h\|_p^* \leq (2n)^{1-\frac{1}{p}} \|h\|_p (|\alpha_1| + \dots + |\alpha_k| + \dots + |\alpha_n|) \quad (21)$$

Hubungan antara aturan alternatif $\|h\|_p^*$ dengan aturan baku $\|h\|_p$. Hubungan ini sangat sesuai dengan bentuk fungsi bebas linier yang digunakan, jika fungsi bebas linear yang digunakan mempunyai konstanta-konstanta yang berpola seperti deret aritmetika.

D. Persamaan Integral Volterra

a. Pengertian Persamaan Integral Volterra

Persamaan integral merupakan persamaan yang memuat fungsi yang tidak diketahui yang berada didalam dan diluar operasi integral. Ada dua jenis persamaan integral salah satunya persamaan volterra linear. Persamaan integral Volterra merupakan persamaan yang memuat fungsi tidak diketahui $u(t)$ linear dan $u(t)^2$ nonlinear. Fungsi tersebut berada dalam operasi integral. Sehingga persamaan integral Volterra adalah sistem pengintegral Volterra yang diketahui mempunyai n fungsi tidak diketahui.. Persamaan integral volterra pertama kali diperkenalkan oleh Vito Volterra pada tahun 1860-1940 merupakan seorang ahli matematika dari italia. Pertama kali menuliskan sebuah makalah tentang integral dan menemukan persamaan baru yang disebut persamaan integral volterra pada tahun 1896 dan kemudian bersama-sama mengembangkan persamaan tersebut dengan seorang matematikawan dari Swedia yang bernama Ivar Fredholm. ²²

²² Hermann Brunner, *Theory and numerical solution of volterra functional integral equations*, HIT summer Simanar 5-16 july 2010,h.6.

Persamaan integral volterra berdasarkan jenisnya terdiri atas persamaan integral volterra jenis pertama dan kedua dan jenis kedua dibagi lagi atas linier dan non linier secara berurutan dengan bentuk umum sebagai berikut :²³

$$u(x) = g(x) + \lambda \int_a^x K(x, t)u(t)dt, \quad (22)$$

dan

$$u(x) = g(x) + \lambda \int_a^x K(x, t)u(t)^2 dt, \quad (23)$$

Keterangan :

$u(x)$ = Fungsi Linear atau non linear yang akan ditentukan

$g(x)$ = Fungsi yang diketahui

λ = Konversi ke dalam persamaan integral volterra (1, -1)

$K(x, t)$ = Fungsi kernel

$u(t)^2$ = Fungsi non linear yang tidak diketahui

$u(t)$ = Fungsi linear yang tidak diketahui

b. Jenis-jenis Persamaan Integral Volterra

1. Persamaan Integral Volterra Jenis pertama

Bentuk umum persamaan integral volterra jenis pertama yaitu

$$f(x) = \int_0^x K(x, t)u(t)dt. \quad (24)$$

Dengan mendiferensialkan persamaan (24) untuk mengubahnya menjadi sebuah persamaan yang setara dengan persamaan volterra jenis kedua yaitu dengan mendiferensialkan kedua

²³ Lisa Anna Nasution. *Solusi Polinomial Taylor dari Persamaan Integral Volterra*, JOM FMIPA Volume 2 No.1 februari 2015, h. 38-39.

sisi persamaan integral (24), dimana aturan Leibnitz digunakan untuk integral dari sisi kanan sehingga diperoleh

$$u(x) = \frac{f'(x)}{K(x, x)} - \frac{1}{K(x, x)} \int_0^x \frac{\partial(K(x, t))}{\partial x} u(t) dt, K(x, x) \neq 0 \quad (25)$$

Pertama harus menentukan λ . Oleh karena itu, dengan mendiferensialkan kedua sisi persamaan (25) menggunakan aturan Leibnitz dan mendapatkan persamaan integral-diferensial dari urutan pertama. Lagrange multiplier λ dapat ditentukan berdasarkan persamaan integral-diferensial yang dihasilkan.

Contoh

Selesaikan persamaan integral volterra jenis pertama

$$u(x) = -5 - 4x - x^2 + 5e^x - 2 \int_0^x (x - t + 1)^2 u(t) dt \quad (26)$$

Didiferensialkan kedua sisi persamaan (26) terhadap x sehingga membentuk persamaan integral jenis kedua

$$u'(x) = -4 - 2x + 5e^x - 2 \int_0^x (x - t + 1) u(t) dt \quad (27)$$

Untuk menentukan λ dengan membedakan lagi untuk mendapatkan persamaan integral-diferensial volterra

$$u'(x) = -2 + 5e^x - 2u(x) - 2 \int_0^x (x - t + 1) u(t) dt, u(0) = 1 \quad (28)$$

sehingga persamaan (28) adalah

$$u_{n+1}(x) = u_n(x) - \int_0^x (u'_n(t) + 2 - 5e^t + 2u(t) + 2 \int_0^t u(r)dr) dt. \quad (29)$$

dimana nilai $\lambda(t) = -1$ untuk orde pertama persamaan integral-deferensial dapat dipilih dengan menggunakan nilai awal $u(0) = 1$. Memilih $u_0(x) = 1$.

2. Persamaan Integral Volterra Jenis Kedua

Secara umum ada dua jenis persamaan integral volterra yaitu sebagai berikut :

A. Persamaan Integral Volterra Linear

Bentuk umum persamaan integral, sebagaimana yang diberikan oleh Jerri adalah sebagai berikut:

$$h(x)u(x) = g(x) + \int_a^{b(x)} K(x,t)u(t)dt \quad (30)$$

Apabila $b(x) = x$, maka persamaan (30) menjadi

$$h(x)u(x) = g(x) + \int_a^x K(x,t)u(t)dt, \quad (31)$$

dan disebut sebagai persamaan integral volterra. Apabila $h(x) = 1$, persamaan integral (31) menjadi

$$u(x) = g(x) + \int_a^x K(x,t)u(t)dt, \quad (32)$$

dan disebut sebagai persamaan integral volterra tipe dua. Apabila y linear, maka persamaan (32) dapat dituliskan sebagai berikut:²⁴

²⁴ Masduki, *Penyelesaian persamaan integral volterra linear dengan metode fungsi Walsh dan FMV-Cyle*, Jurnal Penelitian Sains & Teknologi, vol. 6, No.2,2005,h.140

$$u(x) = g(x) + \int_a^x K(x,t)u(t)dt, \quad (33)$$

dan disebut sebagai persamaan integral volterra linear tipe dua.

B. Persamaan Integral Volterra Non Linear

Bentuk standar dari persamaan integral volterra non linear dari jenis kedua yaitu :

$$u(x) = f(x) + \int_0^x K(x,t)F(u(t))dt \quad (34)$$

dimana $F(u(t))$ adalah fungsi nonlinier $u(t)$. Lagrange multiplier λ yang berfungsi sebagai konversi kedalam persamaan integral volterra (34) untuk sebuah persamaan integral. Dengan mendiferensialkan kedua sisi persamaan integral, menggunakan aturan Leibnitz untuk membedakan kedua sisi persamaan (34) sehingga

$$u'(x) = f'(x) + K(x,x)F(u(x)) + \int_0^x \frac{\partial (K(x,t))}{\partial x} F(u(t))dt \quad (35)$$

Ini akan ditunjukkan dengan contoh berikut :²⁵

Contoh

Penyelesaian persamaan integral volterra nonlinear

$$u(x) = \frac{1}{4} + \frac{x}{2} + e^x - \frac{1}{4}e^{2x} + \int_0^x (x-t)u^2(t)dt \quad (36)$$

Membedakan kedua sisi persamaan (36) terhadap x memberikan persamaan integral-diferensial

$$u'(x) = \frac{1}{2} + e^x - \frac{1}{2}e^{2x} + \int_0^x u^2(t)dt, u(0) = 1, \quad (37)$$

dimana kondisi awal $u(0) = 1$ yang diperoleh dengan mengganti nilai $x = 0$ kedalam persamaan (37). Koreksi fungsional dari persamaan (37) adalah

²⁵ Abdul Majid Wazwaz, *The variational iteration method for solving linear and nonlinear volterra integral and integro-differential equations*, International Journal of Computer Mathematics, Vol. 87, No. 5, April 2010, 1131-1141, h. 1135.

$$u_{n+1}(x) = u_n(x) - \int_0^x (u'_n(t) - \frac{1}{2} - e^t + \frac{1}{2}e^{2t} - \int_0^t u_n^2(r)dr) dt \quad (38)$$

Dimana $\lambda(t) = -1$ untuk orde pertama integral-diferensial persamaan (38). pendekatan ke nol $u_0(x)$ dapat dipilih dengan menggunakan nilai awal $u(0) = 1$. Memilih $u_0(x) = 1$, dan memilih persamaan (38) untuk mendapatkan taksiran²⁶

$$u(x) = 1.$$

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0(x) - \int_0^x (u'_0(t) - \frac{1}{2} - e^t + \frac{1}{2}e^{2t} - \int_0^t u_0^2(r)dr) dt, \\ &= 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 - \frac{1}{8}x^4 - \frac{7}{5}x^5 + \dots, \\ u_2(x) &= u_1(x) - \int_0^x (u'_1(t) - \frac{1}{2} - e^t + \frac{1}{2}e^{2t} - \int_0^t u_1^2(r)dr) dt, \\ &= 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{40}x^5 + \dots, \\ u_3(x) &= u_2(x) - \int_0^x (u'_2(t) - \frac{1}{2} - e^t + \frac{1}{2}e^{2t} - \int_0^t u_2^2(r)dr) dt, \\ &= 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \frac{1}{6!}x^6 + \dots, \end{aligned} \quad (39)$$

$$u_n(x) = (1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots + \frac{1}{n!}x^n) \quad (40)$$

Menggunakan persamaan tersebut hingga memberikan solusi yang tepat

$$u(x) = e^x. \quad (41)$$

E. Konvensi Penjumlahan Einstein

²⁶ Abdul Majid Wazwaz. *The variational iteration method for solving linear and nonlinear volterra integral and integro-differential equations*, International Journal of Computer Mathematics, Vol. 87, No. 5, April 2010, 1131-1141, h.1136-1137

Konvensi penjumlahan Einstein adalah sebuah konvensi notasi yang biasa digunakan dalam penerapan aljabar linier dalam fisika, terutama ketika berurusan dengan rumus koordinat yang bertujuan untuk menyederhanakan bentuk persamaan, konvensi ini diperkenalkan oleh Albert Einstein.²⁷

Albert Einstein (lahir 14 Maret 1879 – meninggal 18 April 1955 pada umur 76 tahun) adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20.²⁸ Menurut konvensi penjumlahan Einstein, bila sebuah indeks variabel muncul dua kali dalam satu suku, sekali dalam indeks atas (superskrip) dan sekali lagi di bawah (subskrip), berarti secara tersirat kita menjumlahkan semua nilai yang mungkin. Dalam penerapan yang tipikal, indeks ini adalah 1,2,3 (mewakili ketiga dimensi ruang Euklid fisik) atau 0,1,2,3 atau 1,2,3,4 (mewakili keempat dimensi ruang-waktu, atau ruang Minkowski), namun banyaknya indeks tersebut bisa berapa saja. Pada beberapa penerapan indeks tersebut bisa merupakan anggota himpunan tak terhingga. Indeks notasi abstrak adalah peningkatan atas notasi Einstein.

Contoh konvensi penjumlahan Einstein sangat sederhana, yang memungkinkan penggantian rumus panjang seperti berikut ini :

$$y = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n \quad (42)$$

Yang biasanya diringkas menjadi :

$$y = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad (43)$$

Dengan rumus yang bahkan lebih sederhana dengan konvensi penjumlahan Einstein


²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Notasi_Einstein

²⁸ <http://langkahmantap.blogspot.co.id/2010/03/segala-hal-tentang-albert-einstein.html>

$$y = c_i x_i \quad (44)$$

Dalam notasi Einstein, indeks seperti i dalam persamaan di atas dapat muncul baik sebagai subskrip ataupun superskrip. Letak indeks ini punya maksud khusus. Perlu diingat untuk tidak menafsirkan indeks yang muncul pada posisi superskrip sebagai pangkat, yang merupakan konvensi baku dalam aljabar. Di sini, i dalam posisi superskrip di atas simbol x menunjukkan indeks bilangan bulat yang berjalan dari 1 ke n .

Keuntungan notasi Einstein adalah indeks yang muncul dua kali atau lebih dalam satu suku menyiratkan penjumlahan pada indeks tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Search) yang bertujuan mengumpulkan beberapa literature seperti buku-buku, data dari internet, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan November tahun 2015 sampai April 2016. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan mendapatkan informasi dari penelitian ini maka penulis memilih perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang memiliki buku-buku yang berkaitan dengan persamaan integral volterra linear menggunakan metode fungsi Walsh sebagai tempat untuk melakukan penelitian.

C. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian untuk memperoleh penyelesaian integral volterra linear menggunakan metode fungsi Walsh yaitu sebagai berikut :

1. Menentukan solusi eksak dari persamaan integral volterra linear
2. Mengekspansi masing-masing suku ke dalam deret Walsh dengan menggunakan rumus:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{m-1} c_i W_i(x)$$

3. Menyederhanakan bentuk penulisan persamaan ke dalam bentuk persamaan integral, sehingga persamaan menjadi

$$f(x) \approx c_i W_i(x)$$

Sehingga persamaan integral dapat dituliskan

$$c_i W_i(x) = g_i W_i(x) + \int_0^1 a_{ij} W_i(x) W_j(t) c_k W_k(t) dt$$

$$c_i W_i(x) = g_i W_i(x) + a_{ij} W_i(x) c_k \int_0^1 W_j(t) W_k(t) dt$$

4. Menyelesaikan persamaan integral volterra linier dengan menggunakan sifat fungsi Walsh

$$c_i W_i(x) = g_i W_i(x) + a_{ij} W_i(x) c_k$$

atau

$$c_i = g_i + a_{ij} c_k$$

dengan $i, j = 0, 1, 2, \dots, m$

sehingga persamaan, membentuk persamaan linear

$$c_m = g_m + A_m c_m$$



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dalam penelitian ini persamaan integral volterra linear di selesaikan dengan mencari solusi eksak selanjutnya, metode fungsi Walsh diterapkan dalam menyelesaikan Persamaan integral volterra linear sehingga membentuk sistem persamaan linear.

Kasus I

Diberikan persamaan integral volterra linear yaitu sebagai berikut :

$$u(x) = x - \int_0^x (x-t)u(t)dt$$

Solusi eksak :

Persamaan tersebut sudah sesuai persamaan umum integral volterra linear

$$u_n(x) = f(x) - \int_a^x K(x,t)u(t)dt \quad (45)$$

Dengan $f(x) = x$ dan $K(x,t) = x - t$ dimana $k(x,t)$ adalah

$$K(x,t) = \begin{cases} x-t & 0 \leq t < x \\ 0 & x \leq t \leq 1 \end{cases} \quad (46)$$

Untuk penyelesaian Persamaan integral volterra linear, dimana $n = 0,1,2,3, \dots$ di mulai dengan

$u_0(t) = 0$, dimana $x = t$

$$\begin{aligned} u_1(t) &= x - \int_0^x (x-t)u_0(t)dt \\ &= x - \int_0^x (x-t) 0 dt \\ &= x - \int_0^x 0 dt \\ &= x \end{aligned} \quad (47)$$

$$\begin{aligned}
u_2(t) &= x - \int_0^x (x-t)u_1(t)dt \\
&= x - \int_0^x (x-t)t dt \\
&= x - \int_0^x (xt - t^2) dt \\
&= x - \left[\frac{xt^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^x \\
&= x - \left(\frac{x(x)^2}{2} - \frac{(x)^3}{3} \right) - \left(\frac{x(0)^2}{2} - \frac{(0)^3}{3} \right) \\
&= x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{3} - 0 \\
&= x - \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{3} \right] \\
&= x - \frac{x^3}{6} \\
&= x - \frac{x^3}{3!}
\end{aligned}$$

(48)

Dan untuk nilai $u_3(t)$ yaitu mensubstitusikan nilai dari $u_2(t)$ ke dalam persamaan integral volterra linear

$$\begin{aligned}
u_3(t) &= x - \int_0^x (x-t)u_2(t)dt \\
&= x - \int_0^x (x-t) \left(t - \frac{t^3}{6} \right) dt \\
&= x - \int_0^x \left(xt - \frac{xt^3}{6} \right) - \left(t^2 + \frac{xt^3}{6} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= x - \left(x \left[\frac{t^2}{2} - \frac{t^4}{24} \right]_0^x \right) - \left[\frac{t^5}{30} + \frac{t^3}{3} \right]_0^x \\
&= x - \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} \right] - \left[\frac{x^5}{24} + \frac{x^3}{2} \right] - \left[\frac{(0)^3}{2} - \frac{(0)^5}{24} \right] - \left[\frac{(0)^5}{24} + \frac{(0)^3}{2} \right] \\
&= x - \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{24} \right] + \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} \right] - 0 \\
&= x - \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} + \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} \\
&= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \\
&= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \tag{49}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_4(t) &= x - \int_0^x (x-t)u_3(t)dt \\
&= x - x - \int_0^x (x-t)u_3(t)dt \\
&= x - \int_0^x (x-t) \left(t - \frac{t^3}{6} + \frac{t^5}{120} \right) dt \\
&= x - \int_0^x xt - \frac{xt^3}{6} - \frac{xt^5}{120} - t^2 + \frac{t^4}{6} + \frac{t^6}{120} dt \\
&= x - \left[\frac{xt^2}{2} - \frac{xt^4}{24} - \frac{xt^6}{720} - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{30} + \frac{t^7}{840} \right]_0^x \\
&= x - \left[\frac{x(x)^2}{2} - \frac{x(x)^4}{24} - \frac{x(x)^6}{720} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + \frac{x^7}{840} \right] \\
&\quad - \left[\frac{x(0)^2}{2} - \frac{x(0)^4}{24} - \frac{x(0)^6}{720} - \frac{0^3}{3} + \frac{0^5}{30} + \frac{0^7}{840} \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= x - \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} - \frac{x^7}{720} - \frac{x}{3} + \frac{x^5}{30} + \frac{x^7}{840} - 0 \\
&= x - \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} - \frac{x^7}{720} \right] - \left[\frac{x}{3} + \frac{x^5}{30} + \frac{x^7}{840} \right] \\
&= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} \\
&= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}
\end{aligned} \tag{50}$$

Jadi untuk menghitung sampai ke- n adalah

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{(n+1)-1} \frac{2((n+1)-1)}{2((n+1)-1+1)} \\
&\quad - (-1)^{(n+1)} x \frac{2(n+1)+1}{(2(n+1)+1)!} \\
&= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{2n+1}{2n+1+1} - (-1)^{(n+1)} x \frac{2n+3}{(2n+3)!}
\end{aligned}$$

Berdasarkan deret maclaurin yang menyatakan bahwa $u_n(x) = \sin x$ dengan n di dekati tak hingga, dengan mengambil sebaran nilai n , misalnya untuk $n=1,2,3,\dots$ yang berhingga sehingga deret maclaurin dapat dituliskan

$$\begin{aligned}
u_n &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{2(n-1)}{2(n-1)+1} - (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
&= \sin x
\end{aligned} \tag{51}$$

Karena solusi eksak persamaan integral volterra linear merupakan bentuk dari deret maclaurin sehingga,

$$u_n(x) = \sin x$$

Persamaan integral volterra linear di selesaikan dengan metode fungsi sehingga membentuk persamaan linear

$$u(x) = x - \int_0^x (x-t)u(t)dt$$

Sehingga persamaan dapat ditulis ke dalam bentuk

$$u(x) = x - x \int_0^x u(t)dt + \int_0^x tu(t)dt \quad (52)$$

Dengan mengekspansikan masing-masing suku dari persamaan (52) ke dalam deret walsh

$$u(x) \approx \sum_{i=0}^{m-1} c_i W_i(x)$$

$$x \approx \sum_{i=0}^{m-1} h_i W_i(x)$$

$$y(t) \approx \sum_{j=0}^{m-1} c_j W_j(t)$$

$$t \approx \sum_{i=0}^{m-1} h_i W_i(t)$$

Untuk menyederhanakan penulisan persamaan digunakan konvensi penjumlahan Einstein sehingga persamaan menjadi

$$u(x) \approx c_i W_i(x)$$

$$x \approx h_i W_i(x) \quad (53)$$

$$u(t) \approx c_j W_j(t)$$

$$t \approx h_i W_i(t)$$

Substitusikan nilai dari persamaan (53) ke dalam persamaan (52) sehingga persamaan menjadi

$$c_i W_i(x) = h_i W_i(x) - h_i W_i(x) \int_0^x c_j W_j(t) dt + \int_0^x h_i W_i(t) c_j W_j(t) dt \quad (54)$$

Menerapkan sifat perkalian fungsi Walsh dan pendekatan fungsi walsh sebagai deret maka \int_0^x di ganti menjadi matrix operasional $[P_{kj}^T]$ dan $[P_{sr}^T]$, kemudian disubtitusikan kedalam (54) persamaan menjadi

$$c_i W_i(x) = h_i W_i(x) - h_i W_i(x) [P_{kj}^T] c_j W_j(t) dt + [P_{sr}^T] h_i W_i(t) c_j W_j(t) dt \quad (55)$$

Maka diperoleh sifat perkalian fungsi walsh di mana semua variable diganti sesuai dengan sifat perkalian fungsi walsh yang sesuai dengan persamaan (5) sehingga persamaan (55) membentuk sistem persamaan linear.

Dimana,

$$\begin{aligned} [P_{kj}^T] &= P_m^T \\ [P_{sr}^T] &= P_m^T \\ c_i W_i(x) &= C_m \end{aligned} \quad (55)$$

$$c_j W_j(t) = K_m$$

$$h_i W_i(x) = h_m$$

$$h_i W_i(t) = h_m$$

Mensubtitusikan persamaaan (55) ke dalam persamaan (54) sehingga persamaan membentuk persamaan linear

$$C_m = h_m - h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$$

Kasus II

Diberikan persamaan integral volterra linear yaitu sebagai berikut :

$$u(x) = 1 + x + \int_0^x (x-t) u(t) dt$$

Solusi eksak :

Persamaan tersebut dapat dibentuk ke dalam persamaan umum integral volterra linear

$$u_n(x) = f(x) - \int_a^x K(x,t)u(t)dt$$

Untuk $f(x) = x$ dan $K(x,t) = (x-t)$ dimana $k(x,t)$ adalah

$$k(x,t) = \begin{cases} (x-t) & 0 \leq t < x \\ 0 & x \leq t \leq 1 \end{cases} \quad (56)$$

dengan mensubstitusikan, sehingga persamaan menjadi

$$u_n(x) = 1 + x - \int_0^x (x-t)u(t)dt$$

Penyelesaian Persamaan integral volterra linear, dimana $n = 0,1,2,3, \dots$ dimulai dengan $u_0(t) = 0$ dimana $t = x$ sehingga,

$$\begin{aligned} u_1(t) &= 1 + x + \int_0^x (x-t)u_0(t)dt \\ &= 1 + x \end{aligned} \quad (57)$$

$$\begin{aligned} u_2(t) &= 1 + x + \int_0^x (x-t)u_1(t)dt \\ &= 1 + x + \int_0^x (x-t)(1+t)dt \\ &= 1 + x + \int_0^x (x+xt-t+t^2)dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 + x + \left[xt + \frac{xt^2}{2} - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} \right]_0^x \\
&= 1 + x + \left[x(x) + \frac{x(x)^2}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right] - \left[x(0) + \frac{x(0)^2}{2} - \frac{0^2}{2} + \frac{0^3}{3} \right] \\
&= 1 + x + \left[x^2 + \frac{x^3}{2} \right] - \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right] - 0 \\
&= 1 + x + \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \right] \\
&= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \\
&= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}
\end{aligned} \tag{58}$$

$$\begin{aligned}
u_3(t) &= 1 + x + \int_0^x (x-t)u_2(t)dt \\
&= 1 + x + \int_0^x (x-t) \left(1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} \right) dt \\
&= 1 + x + \int_0^x \left(x + xt + \frac{xt^2}{2} + \frac{xt^3}{6} - t - t^2 - \frac{t^3}{2} + \frac{t^5}{6} \right) dt \\
&= 1 + x + \left[xt + \frac{xt^2}{2} + \frac{xt^3}{6} + \frac{xt^4}{24} - \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{8} + \frac{t^5}{30} \right]_0^x \\
&= 1 + x + x(x) + \frac{x(x^2)}{2} + \frac{x(x^3)}{6} + \frac{x(x^4)}{24} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^5}{30} - x(0) + \frac{x(0^2)}{2} + \frac{x(0^3)}{6} \\
&\quad + \frac{x(0^4)}{24} - \frac{0^2}{2} - \frac{0^3}{3} - \frac{0^4}{8} + \frac{0^5}{30} \\
&= 1 + x + \left(x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^5}{24} \right) - \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^5}{30} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} \\
 &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}
 \end{aligned} \tag{59}$$

Jadi untuk menghitung sampai ke-n adalah

$$\begin{aligned}
 u_n &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{1}{n!} \\
 &= e^x
 \end{aligned} \tag{60}$$

Persamaan integral volterra linear di selesaikan dengan metode fungsi sehingga membentuk sistem persamaan linear

$$u(x) = 1 + x + \int_0^x (x-t)u(t)dt$$

Sehingga persamaan dapat ditulis ke dalam bentuk

$$\begin{aligned}
 u(x) &= x + 1 + \int_0^x x u(t)dt + \int_0^x t u(t)dt \\
 &= 1 + x + x \int_0^x u(t)dt + \int_0^x t u(t)dt
 \end{aligned} \tag{61}$$

Dengan mengekspansikan masing-masing suku dari persamaan (61) ke dalam deret walsh

$$u(x) \approx \sum_{i=0}^{m-1} c_i W_i(x)$$

$$1 + x \approx \sum_{i=0}^{m-1} h_i W_i(x)$$

$$u(t) \approx \sum_{j=0}^{m-1} c_j W_j(t)$$

$$t \approx \sum_{i=0}^{m-1} h_i W_i(t)$$

Untuk menyederhanakan penulisan persamaan digunakan konvensi penjumlahan Einstein sehingga persamaan menjadi

$$u(x) \approx c_i W_i(x)$$

$$1 + x \approx h_i W_i(x) \tag{62}$$

$$u(t) \approx c_j W_j(t)$$

$$t \approx h_i W_i(t)$$

Substitusikan nilai dari persamaan (61) ke dalam persamaan (62) sehingga persamaan menjadi

$$c_i W_i(x) = 1 + h_i W_i(x) + h_i W_i(x) \int_0^x c_j W_j(t) dt + \int_0^x h_i W_i(t) c_j W_j(t) dt \tag{63}$$

Menerapkan sifat perkalian fungsi Walsh dan pendekatan fungsi walsh sebagai deret maka \int_0^x di ganti menjadi matrix operasional $[P_{kj}^T]$ dan $[P_{sr}^T]$, kemudian disubstitusikan ke dalam (63) persamaan menjadi

$$c_i W_i(x) = 1 + h_i W_i(x) + h_i W_i(x) [P_{kj}^T] c_j W_j(t) dt + [P_{sr}^T] h_i W_i(t) c_j W_j(t) dt \tag{64}$$

Maka diperoleh sifat perkalian fungsi walsh dimana semua variable diganti sesuai dengan pada persamaan (5) sehingga persamaan (64) membentuk sistem persamaan linear.

Dimana,

$$\begin{aligned}
 [P_{kj}^T] &= P_m^T \\
 [P_{sr}^T] &= P_m^T \\
 c_i W_i(x) &= C_m
 \end{aligned} \tag{65}$$

$$c_j W_j(t) = K_m$$

$$h_i W_i(t) = h_m$$

$$h_i W_i(x) = h_m$$

Mensubstitusikan persamaan (64) ke dalam persamaan (65) sehingga persamaan membentuk persamaan linear

$$C_m = 1 + h_m + h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$$

Kasus III

Diberikan persamaan integral volterra linear yaitu sebagai berikut :

$$u(x) = \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u(t) dt$$

Solusi eksak :

Persamaan tersebut dapat dibentuk ke dalam persamaan umum integral volterra linear

$$u_n(x) = f(x) - \int_a^x K(x,t) u(t) dt$$

Untuk $f(x) = x$ dan $K(x,t) = \cos(x-t)$ dimana $k(x,t)$ adalah

$$k(x,t) = \begin{cases} \cos(x-t) & 0 \leq t < x \\ 0 & x \leq t \leq 1 \end{cases} \tag{66}$$

Di ketahui bahwa

$$\begin{aligned}
 e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \\
 \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} \\
 \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!}
 \end{aligned} \tag{67}$$

dengan mensubstitusikan nilai $\sin x$ dan $\cos x$ ke dalam persamaan

$$u(x) = \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u(t) dt$$

Sehingga diperoleh $u_0 = t$ (dimana $x=t$)

$$\begin{aligned}
 u_1 &= \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u_0 dt \\
 &= \sum_{n=0}^0 (-1)^n \frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!} + 2 \int_0^x \sum_{n=0}^0 (-1)^n \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} u_0 dt \\
 &= \sum_{n=0}^0 (-1)^0 \frac{x^{2(0)+1}}{(2(0)+1)!} + 2 \int_0^x \sum_{n=0}^0 (-1)^0 \frac{(x-t)^{2(0)}}{(2(0))!} (t) dt \\
 &= x + 2 \int_0^x 1 \cdot t dt \\
 &= x + 2 \int_0^x t dt \\
 &= x + \left[2 \cdot \frac{1}{2} t^2 \right]_0^x \\
 &= x + x^2 \quad \text{dimana } x = t \text{ sehingga diperoleh}
 \end{aligned}$$

$$u_1 = t + t^2 \tag{68}$$

$$\begin{aligned}
u_2 &= \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u_1 dt \\
&= \sum_{n=0}^1 (-1)^n \frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!} + 2 \int_0^x \sum_{n=0}^1 (-1)^n \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} u_1 dt \\
&= \sum_{n=0}^1 (-1)^1 \frac{x^{2(1)+1}}{(2(1)+1)!} + 2 \int_0^x \sum_{n=0}^1 (-1)^1 \frac{(x-t)^{2(1)}}{(2(1))!} (t+t^2) dt \\
&= \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + 2 \int_0^x \left(1 - \frac{(x-t)^2}{2}\right) (t+t^2) dt \\
&= x - \frac{x^3}{6} + 2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{24} - \frac{x^5}{60}\right) \\
&= x + x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^5}{30} \\
&= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + O[x]^4,
\end{aligned}$$

Dengan $x=t$ dan menghilangkan pangkat yang lebih besar dari 3, akan di peroleh

$$= t + t^2 + \frac{t^3}{2} \quad (69)$$

$$\begin{aligned}
u_3 &= \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u_2 dt \\
&= \sum_{n=0}^2 (-1)^n \frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!} + 2 \int_0^x \sum_{n=0}^2 (-1)^n \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} u_2 dt \\
&= \sum_{n=0}^2 (-1)^2 \frac{x^{2(2)+1}}{(2(2)+1)!} + 2 \int_0^x \sum_{n=0}^2 (-1)^2 \frac{(x-t)^{2(2)}}{(2(2))!} \left(t + t^2 + \frac{t^3}{2}\right) dt \\
&= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right) + 2 \int_0^x \left(1 - \frac{(x-t)^2}{2} + \frac{(-t+x)^4}{24}\right) \left(t + t^2 + \frac{t^3}{2}\right) dt
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + 2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{12} - \frac{x^5}{60} - \frac{x^6}{360} + \frac{x^7}{2520} + \frac{x^8}{13440} \right) \\
&= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^6}{180} + \frac{x^7}{1260} + \frac{x^8}{6720} \\
&= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + O[x]^5
\end{aligned}$$

Dengan $x=t$ dan menghilangkan pangkat yang lebih besar dari 4, akan di peroleh

$$\begin{aligned}
&= t + t^2 + \frac{t^3}{2} + \frac{t^4}{6} \tag{70} \\
u_4 &= \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u_3 dt \\
&= \sum_{n=0}^3 (-1)^n \frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!} + 2 \int_0^x \sum_{n=0}^3 (-1)^n \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} u_3 dt \\
&= \sum_{n=0}^3 (-1)^3 \frac{x^{2(3)+1}}{(2(3)+1)!} + 2 \int_0^x \sum_{n=0}^3 (-1)^3 \frac{(x-t)^{2(3)}}{(2(1))!} \left(t + t^2 + \frac{t^3}{2} + \frac{t^4}{6} \right) dt \\
&= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} \right) + 2 \int_0^x \left(1 - \frac{(x-t)^2}{2} + \frac{(-t+x)^4}{24} - \frac{(-t+x)^6}{720} \right) \\
&\quad \left(t + t^2 + \frac{t^3}{2} + \frac{t^4}{6} \right) dt \\
&= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + 2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^5}{60} \right) + O[x]^6 \\
&= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^5}{24} + O[x]^6 \\
&= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^5}{24}
\end{aligned}$$

Dengan $x=t$ dan menghilangkan pangkat yang lebih besar dari 5 sehingga

$$= t + t^2 + \frac{t^3}{2} + \frac{t^4}{6} + \frac{t^5}{24} \quad (71)$$

Cara yang sama diperoleh

$$\begin{aligned} u_5 &= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^5}{24} + \frac{x^6}{120} + O[x]^7 \\ &= t + t^2 + \frac{t^3}{2} + \frac{t^4}{6} + \frac{t^5}{24} + \frac{t^6}{120} \end{aligned} \quad (72)$$

$$\begin{aligned} u_6 &= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^5}{24} + \frac{x^6}{120} + \frac{x^7}{720} + O[x]^8 \\ &= t + t^2 + \frac{t^3}{2} + \frac{t^4}{6} + \frac{t^5}{24} + \frac{t^6}{120} + \frac{t^7}{720} \end{aligned} \quad (73)$$

Jadi untuk menghitung sampai ke-n adalah

$$\begin{aligned} u_n &= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^5}{24} + \frac{x^6}{120} + \frac{x^7}{720} + \frac{x^8}{5040} + \frac{x^9}{40320} + \frac{x^{10}}{362880} + \dots \\ &= x \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \frac{x^6}{720} + \frac{x^7}{5040} + \frac{x^8}{40320} + \frac{x^9}{362880} + \frac{x^{10}}{3628800} \right. \\ &\quad \left. + \dots \right) \\ &= x \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{10}}{10!} + \dots \right) \\ &= x e^x \end{aligned} \quad (74)$$

Persamaan integral volterra linear diselesaikan dengan metode fungsi sehingga membentuk persamaan linear

$$u(x) = \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u(t) dt \quad (75)$$

berdasarkan sifat penjumlahan dan selisih sudut trigonometri untuk $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$, sehingga persamaan menjadi

$$= \sin x + 2 \int_0^x (\cos x \cos t + \sin x \sin t) u(t) dt \quad (76)$$

$$= \sin x + 2 \int_0^x (\cos x \cos t u(t) dt + \sin x \sin t u(t) dt)$$

$$= \sin x + 2 \int_0^x (\cos x \cos t u(t) dt) + 2 \int_0^x (\sin x \sin t u(t) dt)$$

$$= \sin x + 2 \cos x \int_0^x \cos t u(t) dt + 2 \sin x \int_0^x \sin t u(t) dt$$

Sehingga persamaan dapat ditulis ke dalam bentuk

$$u(x) = \sin x + 2 \cos x \int_0^x \cos t u(t) dt + 2 \sin x \int_0^x \sin t u(t) dt \quad (77)$$

Dengan mengekspansikan masing-masing suku dari persamaan (77) ke dalam deret walsh sesuai persamaan (7) dengan cara-cara ekspansi fungsi walsh pada persamaan integral volterra linear yaitu

$$u(x) \approx \sum_{i=0}^{m-1} c_i W_i(x)$$

$$\sin x \approx \sum_{i=0}^{m-1} q_i W_i(x)$$

$$\cos x \approx \sum_{j=0}^{m-1} l_j w_j(x)$$

$$u(t) \approx \sum_{i=0}^{m-1} c_i w_i(t)$$

$$\cos t \approx \sum_{j=0}^{m-1} l_j w_j(x)$$

$$\sin t \approx \sum_{i=0}^{m-1} q_i w_i(x)$$

Untuk menyederhanakan penulisan persamaan digunakan konvensi penjumlahan Einstein sehingga persamaan menjadi

$$u(x) \approx c_i w_i(x)$$

$$\sin(x) \approx q_i w_i(x)$$

$$\cos(x) \approx l_i w_i(x)$$

$$u(t) \approx c_i w_i(t)$$

(78)

$$\cos(t) \approx l_j w_j(x)$$

$$\sin(t) \approx q_j w_j(x)$$

Substitusikan dari persamaan (78) ke dalam persamaan (77) sehingga persamaan menjadi

$$c_i w_i(x) = q_i w_i(x) + 2l_i w_i(x) \int_0^x l_j w_j(t) c_i w_i(t) dt +$$

$$2q_i w_i(x) \int_0^x q_j w_j(t) c_i w_i(t) dt \quad (79)$$

Maka diperoleh sifat perkalian fungsi walsh dimana semua variable diganti sesuai persamaan (6) sehingga persamaan (79) membentuk sistem persamaan linear. Dimana,

$$\begin{aligned} q_m &= q_i w_i(x) \\ Q_m &= q_j w_j(t) \\ c_m &= c_i w_i(t) \\ C_m &= c_i w_i(x) \\ l_m &= l_i w_i(x) \\ L_m &= l_j w_j(t) \end{aligned} \quad (80)$$

Menerapkan sifat perkalian fungsi Walsh dan pendekatan integral fungsi walsh sebagai deret maka \int_0^x di ganti menjadi matrix operasional $[P_m^T]$ dengan matrix $[P_{kj}^T]$, kemudian disubtitusikan ke dalam (80) persamaan menjadi

$$\begin{aligned} C_m &= q_m + 2 [l_{ij}] [P_{kj}^T] [l_{ij}] c_m + 2 [q_{ij}] [P_{kj}^T] [q_{ij}] c_m \\ &= q_m + (2 [l_{ij}] [P_{kj}^T] [l_{ij}] + 2 [q_{ij}] [P_{kj}^T] [q_{ij}]) c_m \\ &= q_m + (2 l_m P_m^T l_m + 2 Q_m P_m^T Q_m) c_m \end{aligned}$$

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Persamaan integral volterra linear dengan menggunakan metode fungsi walsh, dengan menyelesaikan kasus persamaan integral volterra linear menggunakan metode fungsi walsh sehingga solusi dari persamaan integral volterra linear menghasilkan sistem persamaan linear.

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan solusi eksak yang diterapkan pada kasus persamaan integral volterra linear. Tahap kedua menyelesaikan kasus persamaan integral volterra linear dengan menggunakan metode fungsi walsh dengan mengekspansi masing-masing suku kedalam deret walsh. Tahap ketiga yaitu menyederhanakan bentuk penulisan persamaan integral volterra linear. Dan tahap ke empat menyelesaikan persamaan integral volterra linear dengan menggunakan sifat perkalian fungsi walsh, sehingga persamaan membentuk sistem persamaan linear.

1. Kasus I

Pada kasus I persamaan integral volterra linear yang diberikan $u(x) = x - \int_0^x (x-t)u(t)dt$. Selanjutnya persamaan integral volterra linear yang di berikan di ubah kedalam bentuk umum persamaan integral volterra linear $u_n(x) = f(x) - \int_0^x K(x-t)u(t)dt$, untuk nilai $f(x)$ pada kasus I yaitu x dan $K(x-t) = (x-t)$ dimana nilai $K(x-t)$ untuk $(x-t)$ jika $0 \leq t \leq x$ dan 0 jika $x \leq t \leq 1$ langkah awal untuk menyelesaikan solusi eksak dengan menentukan nilai dari $u_0(t) = 0$ untuk nilai $u_1(t) = x$ selanjutnya nilai $u_2(x)$ dihitung dengan cara mensubtitusikan nilai dari $u_1(x) = x$ ke dalam bentuk persamaan integral volterra linear yang diberikan dihitung sampai nilai $u_n(x)$ karena solusi eksak yang dihasilkan dari kasus I merupakan bentuk deret maclaurin sehingga nilai $u_n(x)$ yaitu $u_n = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ Jadi $u_n(x) = \sin x$.

Selanjutnya kasus I diselesaikan dengan metode fungsi walsh sehingga menghasilkan sistem persamaan linear, dengan langkah awal mengekspansi masing-masing suku persamaan integral volterra linear ke dalam deret fungsi walsh. Kemudian menyederhanakan bentuk

penulisan persamaan digunakan konvensi penjumlahan Einstein dengan mensubstitusikan kedalam persamaan integral volterra linear dan menerapkan sifat perkalian dari fungsi walsh dan pendekatan inetegral fungsi walsh sebagai deret sehingan \int_0^x diganti menjadi matrix operasional $[P_{kj}^T]$ dan $[P_{sr}^T]$ maka diperoleh sifat perkalian fungsi walsh dimana semua diganti sesuai dengan sifat perkalian fungsi walsh sehingga menghasilkan sistem persamaan linear yaitu $C_m = h_m + h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$ yang ekuivalen dengan solusi eksak pada persamaan (51).

2. Kasus II

Pada kasus II persamaan integral volterra linear yang di berikan $u(x) = 1 + x \int_0^x (x-t)u(t)dt$. Selanjutnya persamaan integral volterra linear yang di berikan di ubah kedalam bentuk umum persamaan integral volterra linear dimana $n = 0,1,2,3 \dots$ dengan bentuk umum persamaan integral volterra yaitu $u_n(x) = f(x) \pm \int_0^x K(x-t)u(t)dt$, untuk nilai $f(x)$ pada kasus 2 yaitu $1+x$ dan $K(x,t) = (x-t)$ dimana nilai $K(x,t)$ untuk $(x-t)$ jika $0 \leq t \leq x$ dan 0 jika $x \leq t \leq 1$ langkah awal untuk menyelesaikan solusi eksak dengan menentukan nilai dari $u_0(t) = 0$ untuk nilai $u_1(t) = 1 + x$ selanjutnya nilai $u_2(x)$ dihitung dengan cara mensubstitusikan nilai dari $u_1(x) = 1 + x$ kedalam bentuk persamaan integral volterra linear yang diberikan dihitung sampai nilai $u_n(x)$ dengan solusi eksak $u_n(x)$ yaitu $u_n = 1 + x + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{1}{n!}$. Sehingga solusi eksak tersebut yaitu $= e^x$.


Selanjutnya kasus II di selesaikan dengan metode fungsi walsh sehingga menghasilkan sistem persamaan linear, dengan langkah awal mengekspansi masing-masing suku persamaan integral volterra linear kedalam deret fungsi walsh. Kemudian menyederhanakan bentuk penulisan persamaan digunakan konvensi penjumlahan Einstein dengan mensubstitusikan

kedalam persamaan integral volterra linear dan menerapkan sifat perkalian dari fungsi walsh dan pendekatan inetegral fungsi walsh sebagai deret sehingga \int_0^x diganti menjadi matrix operasional $[P_{kj}^T]$ dan $[P_{sr}^T]$ maka diperoleh sifat perkalian fungsi walsh dimana semua diganti sesuai dengan sifat perkalian fungsi walsh sehingga menghasilkan sistem persamaan linear yaitu $C_m = 1 + h_m + h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$ yang ekuivalen dengan solusi eksak pada persamaan (60).

3. Kasus III

Pada kasus III persamaan integral volterra linear yang diberikan $u(x) = \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u(t) dt$. Selanjutnya persamaan integral volterra linear yang di berikan di ubah kedalam bentuk umum persamaan integral volterra linear dimana $n = 0,1,2,3,4 \dots$ dengan bentuk umum persamaan integral volterra yaitu $u_n(x) = f(x) \pm \int_0^x K(x-t)u(t)dt$, untuk nilai $f(x)$ pada kasus III yaitu $\sin x$ dan $K(x,t) = \cos(x-t)$ dimana nilai $K(x,t)$ untuk $\cos(x-t)$ jika $0 \leq t \leq x$ dan 0 jika $x \leq t \leq 1$ langkah awal untuk menyelesaikan solusi eksak dengan menentukan nilai dari $u_0(t) = t$ untuk nilai $u_1(t) = x + x^2$ selanjutnya nilai $u_2(x)$ dihitung dengan cara mensubstitusikan nilai dari $u_1(x) = x + x^2$ kemudian hasil $u_2(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2} + 0[x]^4$ dengan menghilangkan pangkat yang lebih besar dari 3 selanjutnya untuk menghitung sampai nilai $u_n(x)$ dengan cara yang sama sehingga diperoleh solusi eksak dari kasus III persamaan integral volterra linear yang diberikan yaitu $u_n = x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^5}{24} + \frac{x^6}{120} + \frac{x^7}{720} + \frac{x^8}{5040} + \frac{x^9}{40320} + \frac{x^{10}}{362880} + \dots$ sehingga $x \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \frac{x^6}{720} + \frac{x^7}{5040} + \frac{x^8}{40320} + \frac{x^9}{362880} + \frac{x^{10}}{3628800} \dots \right)$ maka diperoleh solusi eksak dari kasus III persamaan integral volterra linear yang di berikan yaitu xe^x .

Selanjutnya kasus III di selesaikan dengan metode fungsi walsh sehingga menghasilkan sistem persamaan linear, dengan langkah awal mengekspansi masing-masing suku persamaan integral volterra linear ke dalam deret fungsi walsh. Kemudian menyederhanakan bentuk penulisan persamaan digunakan konvensi penjumlahan Einstein dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan integral volterra linear dan menerapkan sifat perkalian dari fungsi walsh dan pendekatan inetegral fungsi walsh sebagai deret sehingga \int_0^x di ganti menjadi matrix operasional $[P_m^T]$ dengan matrix $[P_{kj}^T]$ maka diperoleh sifat perkalian fungsi walsh dimana semua diganti sesuai dengan sifat perkalian fungsi walsh sehingga menghasilkan sistem persamaan linear yaitu $q_m + (2 l_m P_m^T l_m + 2 Q_m P_m^T Q_m)$ yang ekuivalen dengan solusi eksak pada persamaan (74).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan pada kasus I pada persamaan integral volterra linear diberikan yaitu

$u(x) = x + \int_0^x (x-t)u(t)dt$ dengan solusi eksak yang diperoleh pada persamaan 47. Kemudian persamaan integral volterra linear menggunakan metode fungsi walsh menghasilkan sistem persamaan linear $C_m = h_m - h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$.

Pada kasus II persamaan integral volterra linear diberikan yaitu $u(x) = 1 + x + \int_0^x (x-t)u(t)dt$, dengan solusi eksak, pada persamaan 57. Kemudian persamaan integral volterra linear menggunakan metode fungsi walsh menghasilkan sistem persamaan linear $C_m = 1 + h_m - h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$.

Dan pada Kasus III persamaan integral volterra yang diberikan persamaan integral volterra linear diberikan yaitu $u(x) = \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t)u(t)dt$ dengan solusi eksak, pada persamaan 71. Kemudian persamaan integral volterra linear menggunakan metode fungsi walsh menghasilkan sistem persamaan linear $q_m + (2 l_m P_m^T l_m + 2 Q_m P_m^T Q_m)$.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh oleh penulis memberikan rekomendasi kepada para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini yaitu dalam menyelesaikan persamaan integral volterra linear banyak metode yang bisa digunakan, salah satunya yang digunakan oleh peneliti yaitu solusi eksak dan metode fungsi walsh yang menghasilkan sistem persamaan linear, dan sebagai saran untuk penelitian selanjutnya agar persamaan integral volterra diselesaikan metode adomain atau metode numerik seperti metode picard.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Fitriani, *Kernel Wavelet*, Jurusan Pendidikan Matematika FPMIPA UPI-Bandung.2008
- Anna Lisa. *Solusi Polinomial Taylor dari Persamaan Integral Volterra*, JOM FMIPA Volume 2 No.1. 2015
- Arsyad Muh. *Dasar-dasar Matematika Untuk Fisikawan*. Makassar: CV Berkah Utami. 2006
- Blyth W.F. *Volterra Integral equations solved in Fredholm form Using Walsh Function*. Anziam . 2004
- Brunner Hermann. *Theory and numerical solution of volterra functional integral equations*. HIT summer Simanar. 2010
- Citrahadi, *Perbandingan Solusi persamaan Integral Volterra Nonlinear dengan Metode Volterra-Runge_Kutta dan Metode Iterasi*, Program Studi Ganda Teknik Informatika dan Matematika Skripsi Sarjana , Universitas Bina Nusantara. 2005
- Darmawijoyo. *Persamaan Diferensial Biasa Suatu Pengantar*. Jakarta:Erlangga. 2011
- Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2008
- Indah. *Integral Lebesgue di R^1 Skripsi*. Malang. 2009
- Majid Abdul Wazwaz. *The variational iteration method for solving linear and nonlinear volterra integral and integro-defferential equations*. International Journal of Computer Mathematics, Vol. 87, No 5. 2010
- Maleknejad K. *Iterated Block-Pulse Method For solving Volterra Integral Equations*. Applied Mathematics . 2012
- Masduki. *Penyelesaian persamaan integral volterra linear dengan metode fungsi Walsh dan FMV-Cyle*. Jurnal Penelitian Sains & Teknologi, vol. 6, No.2. 2005
- Masduki. *efisiensi dan akurasi gabungan metode fungsi Walsh dan multigirid untuk menyelesaikan persamaan integral fredholm linear*. MIPA vol. 17, No 1. 2007
- Okmi Zerlan. *Penyelesaian Sistem Persaman Integral Volterra Dengan Dekomposisi Adomian*. JOM FMIPA Vol 1 No.2. 2015
- Purcell. *Kalkulus Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. 2003
- Riogilang. *Persamaan Diferensial*. Bandung: Binacipta. 1978
- Wahyuniati. *Kontruksi rumus norma alternatif untuk ruang fungsi $[0,1]$* . seminar Nasional Pendidikan Sains FMIPA Unesa. 2008
- Widyaningsih Purnami. *Efisiensi Penggunaan V-cycle Dalam Metode Fungsi Walsh Untuk Menyelesaikan Persamaan Integral Fredholm Linier*. Jurnal dan Komputer, Vol.6.No 1. 2003

Wikaria. *Kalkulus*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007

<https://id.wikipedia.org/wiki/Integral><http://langkahmantap.blogspot.co.id/2010/03/segala-hal-tentang-albert-einstein.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Notasi_Einstein

<http://yafi20.blogspot.co.id/2010/10/sejarah-dan-penemu-angka-nol.html>

https://academia.edu/8714866/Aplikasi_Integral_dalam_kehidupan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Zulfatmi San, lahir di Bulukumba 09 Desember 1994. Merupakan anak ke dua, buah cinta dari pasangan Salomming dan Nampa, pasangan ini di karuniai tiga orang anak. Anak pertama bernama Erni San dan anak ketiga bernama Muh Yaumul San. Zulfatmi San mulai menimba ilmu yang diawali di SD Negeri 243 Mattirowalie Tahun 2000-2006, kemudian di SMP Sanur Balibo Tahun 2006-2009, selanjutnya di SMA Negeri 12 Bulukumba Tahun 2009-2012. Tahun 2012-2016, tercatat sebagai mahasiswi Matematika Sains, Fakultas Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi Negeri “UIN Alauddin Makassar”. Pada 2014 menjadi anggota rancangan al maida. Dan pada tahun 2016 tepatnya bulan September telah menyelesaikan studi ± 4 tahun dan dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

METODE FUNGSI WALSH DALAM MENYELESAIKAN PERSAMAAN INTEGRAL VOLTERRA LINEAR

WALSH FUNCTION METHOD IN SOLVING LINEAR VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS

Zulfatmi San

Jurusan Matematika

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2016

Jln. Sultan Alauddin NO. 36 Samata, Kab.Gowa

Telp (0411) 841897 Fax. (0411) 8221400

E-mail Kontak@uin-alauddin.ac.id, [Twitter@UIN_Alauddin](https://twitter.com/UIN_Alauddin)

Abstrak. Tulisan ini membahas tentang penyelesaian persamaan integral volterra linear yang diterapkan pada tiga kasus persamaan integral volterra linear dengan cara menentukan solusi eksak dari masing-masing tiga kasus persamaan integral volterra linear. Selanjutnya mencari solusi menggunakan metode fungsi Walsh yaitu mengekspansi masing-masing suku ke dalam deret Walsh, menyederhanakan bentuk penulisan persamaan ke dalam bentuk persamaan integral, menyelesaikan persamaan integral volterra linier dengan menggunakan sifat fungsi Walsh sehingga menghasilkan persamaan linear yang ekuivalen dengan solusi eksak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian persamaan integral volterra linier menggunakan metode fungsi walsh yang diterapkan pada tiga kasus persamaan integral volterra linear.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh solusi dari penerapan tiga kasus persamaan integral volterra linear yaitu solusi eksak dan solusi metode fungsi Walsh yang dihasilkan dari masing-masing kasus I, II dan III persamaan integral volterra linear yaitu solusi eksak $\sin x$, e^x dan xe^x . Solusi dari metode fungsi Walsh $C_m = h_m - h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$, $C_m = 1 + h_m + h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$ dan, $C_m = q_m + (2 l_m P_m^T l_m + 2 Q_m P_m^T Q_m) c_m$, solusi metode fungsi Walsh ekuivalen dengan solusi eksak.

Kata Kunci: *Persamaan Integral Volterra Linear, Solusi eksak, Metode fungsi Walsh*

PENDAHULUAN

Kehidupan tidak lepas dari dasar pemikiran, pengetahuan yang perlu dikaji seperti halnya matematika yang pada dasarnya dilahirkan dari dasar pemikiran seorang ilmuwan ahli matematika aljabar yang dikenal dengan Leonardo Fibonacci sebagai ahli matematika aljabar yang ternyata hasil pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ilmuwan muslim yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi sebagai penemu angka 0 (nol) yang hingga kini

dipergunakan [9]. Adapun integrasi penggunaan integral khususnya integral volterra linear menggunakan metode fungsi walsh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada bidang teknologi di gunakan pada laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu dan penggunaan kecepatan pesawat ulang alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu [8]. Ada beberapa macam penyelesaian integral volterra seperti metode dekomposisi adomian, metode deret taylor, metode numerik seperti metode iterasi, metode runge kutta dan metode fungsi walsh. Metode dekomposisi adomian merupakan metode yang disubstitusikan ke dalam deret tak hingga dan polinomial tak hingga [4].

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Blyth menggunakan metode fungsi Walsh untuk menyelesaikan masalah varisional serta persamaan integral fredholm dari kedua eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa metode fungsi Walsh ternyata mampu memberikan galat yang lebih kecil dan hasil perhitungannya lebih akurat dan juga perhitungan lebih sederhana dibandingkan dengan metode yang lain. Dari eksperimen numerik, Corrington menyimpulkan bahwa fungsi Walsh dapat digunakan untuk mendapatkan penyelesaian pendekatan dari persamaan integral. Selain itu, penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian Purnami Widyaningsih tentang “Efisiensi penggunaan V-Cycle dalam metode fungsi walsh untuk menyelesaikan integral fredholm linier”, diteliti pada tahun 2003 yang dipresentasikan dalam seminar nasional menyimpulkan bahwa eksperimen numerik menunjukkan bahwa kombinasi metode fungsi Walsh dan v-cycle dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi metode fungsi Walsh [7]. Sehingga Metode selalu diperlukan untuk memecahkan persamaan integral karena penyelesaian integral dapat diselesaikan beberapa metode dalam penyelesaiannya, dimana setiap metode memiliki fungsi tersendiri dalam menyelesaikan berbagai macam integral [5].

Fungsi Walsh, pada tahun 1922, Rademacher mengembangkan himpunan fungsi gelombang persegi tidak lengkap ortonormal pada $[0,1]$. Selanjutnya tahun 1923, selanjutnya disebut fungsi Walsh, metode fungsiWalsh adalah ekuivalen dengan menyelesaikan sistem persamaan linear. Chen dan Hsiao mendefinisikan fungsi walsh,

$$W_0 = 1$$

$$W_1(x) = r_1(x)$$

$$W_2(x) = [r_2(x)]^1 [r_1(x)]^0$$

⋮

$$W_n(x) = [r_q(x)]^{bq} [r_{q-1}(x)]^{bq-1} \dots [r_1(x)]^{b1}$$

dimana,

$$q = \lceil \log_2(n) \rceil + 1$$

$$n = b_q \cdot 2^{q-1} + b_{q-1} \cdot 2^{q-2} + \dots + b_1 \cdot 2^0$$

dan

$b_q, b_{q-1}, b_{q-2}, \dots, b_1$ adalah biner [6].

Sifat Integral Fungsi Walsh Fungsi Walsh memiliki banyak sifat yang sama dengan fungsi trigonometri. Namun, lebih sederhana dalam struktur ke fungsi trigonometri dengan mengambil nilai-nilai 1 dan -1 yang dinyatakan sebagai kombinasi linear [3]. Sifat integral fungsi Walsh menurut Corrington, setiap integral fungsi Walsh dapat disajikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \int_0^x W_n(x) &= \sum_{i,j=0}^{m-1} c_i w_i \pm c_j w_j \pm h_i w_i \pm h_j w_j \\ &= \sum_{i,j=0}^{m-1} c m_i \pm c m_j \pm h_i w_i \pm h_j w_j \end{aligned}$$

Dengan konvensi penjumlahan Einstein

$$= c m_{ij} \pm h m_{ij}$$

Untuk fungsi trigonometri pada fungsi sinus dan cosinus yaitu

$$\begin{aligned} \int_0^x W_n(x) &= \sum_{i,j=0}^{m-1} q_i w_i \pm q w_j \pm l w_i \pm l w_j \\ &= \sum_{i,j=0}^{m-1} q m_i \pm q m_j \pm l m_i \pm l m_j \end{aligned}$$

Dengan konvensi penjumlahan Einstein

$$= q m_{ij} \pm l m_{ij}$$

Dimana $n = 0, 1, 2, \dots$ dan $i, j = 0, 1, 2, \dots, m - 1$ di tulis sebagai bilangan biner dengan operasi penjumlahan modulo 2 [6].

Uljanov dan Blyth pada tahun 1996 mengembangkan algoritma baru yang selanjutnya di sebut fungsi Walsh untuk menyelesaikan persamaan integral volterra linear dengan mengekspansikan tiap suku dari persamaan integralnya dengan deret fungsi Walsh berhingga dan fungsi kernel yang didekati dengan fungsi Walsh rangkap berhingga yaitu $u(x) = g(x) + \int_a^x K(x, t)u(t)dt$. Dengan $g(x)$ dan kernel $K(x, t)$ diketahui dengan $u(t)$ adalah fungsi linear yang

aditentukan. $u(x) \approx \sum_{i=0}^{m-1} c_i W_i(x)$ $g(x) \approx \sum_{i=0}^{m-1} g_i W_i(x)$ dan $K(x,t) \approx \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{m-1} a_{ji} W_i(x) W_j(t)$ Menyederhanakan penulisan persamaan digunakan konvensi penjumlahan Einstein sehingga persamaan menjadi $u(x) \approx c_i W_i(x)$, $g(x) \approx g_i W_i(x)$ dan $K(x,t) \approx a_{ij} W_i(x) W_j(t)$ dengan $i, j = 0, 1, 2, \dots, m$, $m = 2^n$, $n \in \mathbb{N}$.

$$c_i W_i(x) = g_i W_i(x) + a_{ij} W_i(x) c_j$$

atau

$$c_i = g_i + a_{ij} c_j$$

sehingga persamaan membentuk persamaan linear

$$c_m = g_m + A_m c_m \quad [6].$$

Persamaan integral volterra berdasarkan jenisnya terdiri atas persamaan integral volterra jenis pertama dan kedua dan jenis kedua dibagi lagi atas linier dan non linier secara berurutan dengan bentuk umum sebagai berikut :

$$u(x) = g(x) + \lambda \int_a^x K(x,t) u(t) dt,$$

dan

$$u(x) = g(x) + \lambda \int_a^x K(x,t) u(t)^2 dt, \quad [1]$$

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Search) yang bertujuan mengumpulkan beberapa literature tentang persamaan integral volterra linear menggunakan metode fungsi Walsh, selanjutnya diterapkan dalam kasus-kasus persamaan integral volterra linear yang telah dipilih. Dalam penelitian ini dipilih tiga kasus persamaan integral volterra linear, kemudian kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan menentukan solusi eksak dan solusi menggunakan metode fungsi Walsh, selanjutnya hasil dari solusi eksak dibandingkan dengan hasil metode fungsi Walsh.

PROSEDUR PENELITIAN

Adapun prosedur penelitian untuk memperoleh penyelesaian integral volterra linear menggunakan metode fungsi Walsh yaitu sebagai berikut :

5. Menentukan solusi eksak dari persamaan integral volterra linear
6. Mengekspansi masing-masing suku ke dalam deret Walsh dengan menggunakan rumus:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{m-1} c_i W_i(x)$$

7. Menyederhanakan bentuk penulisan persamaan ke dalam bentuk persamaan integral, sehingga persamaan menjadi

$$f(x) \approx c_i W_i(x)$$

Sehingga persamaan integral dapat dituliskan

$$c_i W_i(x) = g_i W_i(x) + \int_0^1 a_{ij} W_i(x) W_j(t) c_k W_k(t) dt$$

$$c_i W_i(x) = g_i W_i(x) + a_{ij} W_i(x) c_k \int_0^1 W_j(t) W_k(t) dt$$

8. Menyelesaikan persamaan integral volterra linier dengan menggunakan sifat fungsi Walsh

$$c_i W_i(x) = g_i W_i(x) + a_{ij} W_i(x) c_k$$

atau

$$c_i = g_i + a_{ij} c_k$$

dengan $i, j = 0, 1, 2, \dots, m$

sehingga persamaan, membentuk persamaan linear

$$c_m = g_m + A_m c_m$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini persamaan integral volterra linear di selesaikan dengan mencari solusi eksak selanjutnya, metode fungsi Walsh diterapkan dalam menyelesaikan Persamaan integral volterra linear sehingga membentuk sistem persamaan linear.

Kasus I

Diberikan persamaan integral volterra linear yaitu sebagai berikut :

$$u(x) = x - \int_0^x (x-t)u(t)dt$$

Solusi eksak :

$$u_n(t) = x - \int_0^x (x-t)u_n(t)dt$$

$$u_n = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{2n+1}{2n+1+1} - (-1)^{(n+1)} x \frac{2n+3}{(2n+3)!}$$

$$= \sin x$$

Solusi metode fungsi walsh

$$C_m = h_m - h_m P_m^T K m + P_m^T h_m K_m$$

Pada kasus I persamaan integral volterra linear yang diberikan $u(x) = x - \int_0^x (x-t)u(t)dt$. Selanjutnya persamaan integral volterra linear yang di berikan di ubah kedalam bentuk umum persamaan integral volterra linear $u_n(x) = f(x) - \int_0^x K(x-t)u(t)dt$, untuk nilai $f(x)$ pada kasus I yaitu x dan $K(x-t) = (x-t)$ dimana nilai $K(x-t)$ untuk $(x-t)$ jika $0 \leq t \leq x$ dan 0 jika $x \leq t \leq 1$ langkah awal untuk menyelesaikan solusi eksak dengan menentukan nilai dari $u_0(t) = 0$ untuk nilai $u_1(t) = x$ selanjutnya nilai $u_2(x)$ dihitung dengan cara mensubtitusikan nilai dari $u_1(x) = x$ sampai dengan u_n . Selanjutnya diselesaikan dengan menggunakan metode fungsi walsh yang menghasilkan system persamaan linear yang ekuivalen dari solusi eksak.

Kasus II

Diberikan persamaan integral volterra linear yaitu sebagai berikut :

$$u(x) = 1 + x + \int_0^x (x-t)u(t)dt$$

Solusi eksak :

$$u_n(t) = 1 + x - \int_0^x (x-t)u(t)dt$$

$$u_n = 1 + x + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

$$= e^x$$

Solusi metode fungsi walsh

$$C_m = 1 + h_m + h_m P_m^T K m + P_m^T h_m K_m$$

Pada kasus II persamaan integral volterra linear yang di berikan $u(x) = 1 + x \int_0^x (x-t)u(t)dt$. Selanjutnya persamaan integral volterra linear yang di berikan di ubah kedalam bentuk umum

persamaan integral volterra linear dimana $n = 0,1,2,3 \dots$ dengan bentuk umum persamaan integral volterra yaitu $u_n(x) = f(x) \pm \int_0^x K(x-t)u(t)dt$, untuk nilai $f(x)$ pada kasus 2 yaitu $1+x$ dan $K(x,t) = (x-t)$ dimana nilai $K(x,t)$ untuk $(x-t)$ jika $0 \leq t \leq x$ dan 0 jika $x \leq t \leq 1$. Solusi eksak e^x . Selanjutnya kasus II di selesaikan dengan metode fungsi walsh sehingga menghasilkan sistem persamaan linear yaitu $C_m = 1 + h_m + h_m P_m^T K m + P_m^T h_m K_m$ yang ekuivalen dengan solusi eksak.

Kasus III

Diberikan persamaan integral volterra linear yaitu sebagai berikut :

$$u(x) = \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u(t) dt$$

Solusi eksak :

$$u_n = x \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{10}}{10!} + \dots \right) \\ = x e^x$$

Solusi metode fungsi walsh

$$C_m = q_m + 2 [l_{ij}] [P_{kj}^T] [l_{ij}] c_m + 2 [q_{ij}] [P_{kj}^T] [q_{ij}] c_m \\ = q_m + (2 [l_{ij}] [P_{kj}^T] [l_{ij}] + 2 [q_{ij}] [P_{kj}^T] [q_{ij}]) c_m \\ = q_m + (2 l_m P_m^T l_m + 2 Q_m P_m^T Q_m) c_m$$

Pada kasus III persamaan integral volterra linear yang diberikan $u(x) = \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-t) u(t) dt$. Selanjutnya persamaan integral volterra linear yang di berikan di ubah kedalam bentuk umum persamaan integral volterra linear dimana $n = 0,1,2,3,4 \dots$ dengan bentuk umum persamaan integral volterra yaitu $u_n(x) = f(x) \pm \int_0^x K(x-t)u(t)dt$, untuk nilai $f(x)$ pada kasus III yaitu $\sin x$ dan $K(x,t) = \cos(x-t)$ dimana nilai $K(x,t)$ untuk $\cos(x-t)$ jika $0 \leq t \leq x$ dan 0 jika $x \leq t \leq 1$, solusi eksak $x e^x$. Selanjutnya di selesaikan dengan metode fungsi walsh sehingga menghasilkan sistem persamaan linear yaitu $q_m + (2 l_m P_m^T l_m + 2 Q_m P_m^T Q_m) c_m$ yang ekuivalen dengan solusi eksak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sehingga dapat di simpulkan bahwa Solusi dari penerapan tiga kasus persamaan integral volterra linear yaitu solusi eksak dan solusi metode fungsi Walsh yang dihasilkan dari masing-masing kasus I, II dan III persamaan integral volterra linear yaitu solusi eksak $\sin x$, e^x dan xe^x . Solusi dari metode fungsi Walsh $C_m = h_m - h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$, $C_m = 1 + h_m + h_m P_m^T K_m + P_m^T h_m K_m$ dan, $C_m = q_m + (2 l_m P_m^T l_m + 2 Q_m P_m^T Q_m) c_m$, dimana solusi metode fungsi Walsh ekuivalen dengan solusi eksak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anna Lisa. *Solusi Polinomial Taylor dari Persamaan Integral Volterra*, JOM FMIPA Volume 2 No.1. 2015
- [2]. Arsyad Muh. *Dasar-dasar Matematika Untuk Fisikawan*. Makassar: CV Berkah Utami. 2006
- [3]. Blyth W.F. *Volterra Integral equations solved in Fredholm form Using Walsh Function*. Anziam . 2004
- [4]. Citrahadi, *Perbandingan Solusi persamaan Integral Volterra Nonlinear dengan Metode Volterra-Runge_Kutta dan Metode Iterasi*, Program Studi Ganda Teknik Informatika dan Matematika Skripsi Sarjana , Universitas Bina Nusantara. 2005
- [5]. Maleknejad K. *Iterated Block-Pulse Method For solving Volterra Integral Equations*. Applied Mathematics . 2012
- [6]. Masduki. *Penyelesaian persamaan integral volterra linear dengan metode fungsi Walsh dan FMV-Cyle*. Jurnal Penelitian Sains & Teknologi, vol. 6, No.2. 2005
- [7]. Widyaningsih Purnami. *Efisiensi Penggunaan V-cyle Dalam Metode Fungsi Walsh Untuk Menyelesaikan Persamaan Integral Fredholm Linier*. Jurnal dan Komputer, Vol.6.No 1. 2003
- [8]. https://academia.edu/8714866/Aplikasi_Integral_dalam_kehidupan
- [9]. [Http://yafi20.blogspot.co.id/2010/10/sejarah-dan-penemu-angka-nol.html](http://yafi20.blogspot.co.id/2010/10/sejarah-dan-penemu-angka-nol.html)