

**PERTUMBUHAN BAKTERI ASAM LAKTAT (BAL) KANDIDAT
PROBIOTIK ASAL SALURAN PENCERNAAN DOC BROILER
TERHADAP BERBAGAI KONDISI ASAM LAMBUNG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Peternakan (S.Pt)
pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

IRMA RUKMANA KADIR

NIM. 60700112045

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, November 2016

Penyusun,

IRMA RUKMANA KADIR

NIM: 60700112045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **IRMA RUKMANA KADIR**, NIM: 60700112045 mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat (BAL) Kandidat Probiotik Asal Saluran Pencernaan DOC Broiler Terhadap Berbagai Kondisi Asam Lambung”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 19 Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P
NIP. 19730828 200604 2 001

Muh. Nurhidayat, S.Pt., M.P
NIP. 19750909 200912 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.
NIP. 19590712 198603 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat (BAL) Kandidat Probiotik Asal Saluran Pencernaan DOC Broiler Terhadap Berbagai Kondisi Asam Lambung**” yang disusun oleh **IRMA RUKMANA KADIR**, NIM: 60700112045, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, 25 Agustus 2016
25 Dzulkaidha 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T. (.....)

Sekretaris : Rusny, S.Pt., M.Si. (.....)

Munaqisy I : Dr. Muh. Taufik, S.Pt., M.Si. (.....)

Munaqisy II : Hafsan, S.Si., M.Pd. (.....)

Munaqisy III : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi. (.....)

Pembimbing I : Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P. (.....)

Pembimbing II : Muh. Nurhidayat, S.Pt., M.P. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat (BAL) Kandidat Probiotik Asal Saluran Pencernaan DOC Broiler Terhadap Berbagai Kondisi Asam Lambung”** yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insya Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda **Abdul Kadir, S.Pd** dan Ibunda tercinta **Jaena, S.Pd.Sd** yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Bapak Dr.Ir.M. Basir Paly,M.Si** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. **Ibunda tercinta Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan **Bapak Muh. Nurhidayat, S.Pt., M.P** selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. **Bapak Dr. Muh. Taufik, S.Pt., M.Si, Ibu Hafsan, S.Si., M.Pd, Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Angkatan 2012: **Syafruddin, Marnila L, Nurfahmi Sukiman, Akbar, Resti Nanda Saputri, Andi Nurrika Haslinda, Astri Wahyuni, Sarialang, Asdar, Muh. Mansyur Rasyid, Saenal Salju, Sutarmin, Suparman, Asrul, Sudrianto, Salahuddin, Syamsuri, Rifaid, Akkuruddin dan Ardiansyah.** Teristimewa kepada senior-senior **Hikmawati S.Pt, Muh. Arsan Jamili S.Pt, Hardiansyah, S.Pt.** dan **Adik Diniarsih Razak, S.Pt.**
8. Sahabatku tercinta: **Sri Mustika, Rahayu Astuty, Andi Ulfa Umiyanti, Sri Maulinda, Nur Fitri Ramadhani, Muh. Salahuddin, dan Andi Resni Handayani.**
9. Saudaraku tercinta: **Irna Suhaena Kadir, S.Tp., M.P,** dan **Ijlal Arkan** yang tidak pernah berhenti mengiringi do'a, motivasi, serta canda tawa sehingga dalam kondisi apapun penulis tetap mampu percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, November 2016

Penulis

IRMA RUKMANA KADIR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
F. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu).....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Probiotik.....	5
B. Syarat Mikroba sebagai Probiotik.....	10
C. Isolasi Mikroba Sebagai Probiotik	13
D. Bakteri Saluran Pencernaan Unggas	15
E. Bakteri Asam Laktat	18
F. Kondisi Asam Lambung Unggas	24

G. Tinjauan Islam tentang Mikroorganisme, Probiotik dan Pencernaan	27
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
B. Alat dan Bahan	36
C. Prosedur Kerja	37
D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA	49
----------------------	----

LAMPIRAN	53
----------------	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Kerja Uji Ketahanan terhadap Asam Lambung (pH).....	39
Gambar 2. Hasil Pengamatan Uji terhadap Keasaman dengan pH 1-5.....	41
Gambar 3. Hasil Pengamatan Uji terhadap Keasaman dengan pH 6.....	41
Gambar 4. Hasil Pengamatan Uji terhadap Keasaman dengan pH 5-6.....	42
Gambar 5. Hasil Pengamatan Uji terhadap Keasaman dengan pH 5-6.....	42
Gambar 6. Hasil Pengamatan Uji terhadap Keasaman dengan pH 4.....	42

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Derajat Keasaman (pH) dalam Saluran Pencernaan Ayam	26
--	----



ABSTRAK

Nama : Irma Rukmana Kadir
NIM : 60700112045
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : **Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat (BAL) Kandidat Probiotik Asal Saluran Pencernaan DOC Broiler terhadap Berbagai Kondisi Asam Lambung**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan Bakteri Asam Laktat terhadap berbagai kondisi asam lambung saluran pencernaan DOC Broiler. Mikrobia kandidat probiotik diisolasi dari saluran pencernaan DOC Broiler yang baru menetas dan belum mendapatkan tambahan pakan maupun antibiotik. Metode penelitian yaitu mengamati pertumbuhan Bakteri Asam Laktat terhadap berbagai kondisi asam lambung dengan menggunakan medium MRSB-HCl dan MRSB-KOH dengan masing-masing 1 ose bakteri (ose bulat) yang diinkubasi 1x24 jam dengan derajat keasaman 1-6 (pH) dimana data yang diperoleh dari hasil pengamatan (positif atau negatif) yang ditunjukkan pada indikator uji yang telah dilakukan. Hasil penelitian didapatkan bahwa Bakteri Asam Laktat dapat tumbuh pada 4, 5 dan 6 (pH) yang terlihat dengan adanya endapan dan medium yang keruh sedangkan untuk 1-3 (pH) tidak terlihat adanya pertumbuhan dengan medium yang masih tetap jernih. Berdasarkan hal tersebut isolat bakteri asam laktat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai probiotik.

Kata kunci : *Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat, saluran pencernaan DOC Broiler, kondisi asam lambung.*

ABSTRACT

Name : Irma Rukmana Kadir

NIM : 60700112045

Department : Ilmu Peternakan

Title : The Growth of Lactic Acid Bacteria Probiotic Candidates DOC Broiler gastrointestinal Origin to Various Acidic Conditions of Gastric

The research aimed to is get the determine the growth of Lactic Acid Bacteria to various conditions gastric acid digestive tract DOC Broiler. Candidate probiotic microbes isolated from the digestive tract DOC Broiler newly hatched and do not get extra feed and antibiotics. The research method of observing the growth of Lactic Acid Bacteria to various conditions by using a gastric acid medium MRSB-HCl and MRSB-KOH with each one ose bacterium (ose round) were incubated 1x24 hours with the degree of acidity 1-6 (pH) in which the obtained from observations (positive or negative) show in the test indicators that have been made. The results showed that the Lactid Acid Bacteria can grow at 4, 5, and 6 (pH) were seen in the presence of sediments and turbid medium to 1-3 (pH) while the visible signs of growth with a medium that still remains clear. Based on this isolate Lactid Acid Bacteria has the potential to be used as a probiotics.

Keywords : Growth of Lactid Acid Bacteria, DOC Broiler digestive tract, gastric acid conditions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang pertambahan jumlah penduduknya semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan, kesadaran gizi dan kualitas hidup masyarakat maka kebutuhan daging di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Usaha dalam mendukung peningkatan produktivitas, imunitas dan pemeliharaan dapat digunakan penambahan probiotik dalam ransum.

Mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dapat meningkatkan kesehatan manusia ataupun ternak dengan cara menyeimbangkan mikroflora dalam saluran pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup disebut probiotik. BAL adalah salah satu kelompok bakteri yang berperan sebagai probiotik dimana bakteri ini hidup pada saluran pencernaan ternak. Dalam saluran pencernaan ayam, mikroba terdapat hampir di sepanjang usus. Mikroorganisme utama terdapat dalam tembolok, usus halus dan *ceca*.

Fungsi dari BAL dalam pencernaan ternak yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak dengan menyerap lebih banyak nutrisi pakan tanpa terbuang percuma melalui tinja. Selain itu BAL juga berfungsi untuk menyeimbangkan populasi mikrobia pada saluran pencernaan ternak, mengendalikan mikroorganisme patogen pada tubuh inang dan lingkungan dan menstimulasi imunitas inang, mampu menurunkan kadar kolesterol serum darah.

BAL merupakan kelompok bakteri yang juga mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat sehingga dapat menurunkan pH. Menurut Wiyana (2011), menyatakan bahwa BAL merupakan mikroorganisme fermentatif yang dapat hidup pada kisaran pH yang luas yang lebih toleran terhadap pH rendah. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba adalah faktor lingkungan yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya adalah potensial hidrogen (pH). Pertumbuhan mikroba dapat mencapai optimal bila keadaan lingkungan disesuaikan dengan sifat mikroba.

Cara untuk menambahkan jumlah bakteri probiotik pada ternak yaitu dengan mengisolasi usus ternak itu sendiri yang benar-benar cocok dan sesuai dengan sistem pencernaan ternak tersebut. Akan tetapi tidak semua jenis bakteri usus merupakan BAL. Isolat BAL digunakan sebagai probiotik karena kemampuannya menghasilkan asam laktat yang dapat menurunkan pH, mampu memproduksi hidrogen peroksida dalam kondisi aerob serta mampu memproduksi komponen penghambat yang spesifik misalnya bakteriosin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akan dilakukan penelitian tentang pertumbuhan mikroba isolat BAL kandidat probiotik asal saluran pencernaan DOC Broiler terhadap berbagai kondisi asam lambung, yang pemanfaatannya dapat meningkatkan produktifitas ayam broiler.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pertumbuhan mikroba isolat BAL kandidat probiotik asal saluran pencernaan DOC Broiler terhadap berbagai kondisi asam lambung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertumbuhan mikroba isolat BAL kandidat probiotik asal saluran pencernaan DOC Broiler terhadap berbagai kondisi asam lambung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi terhadap penelitian selanjutnya tentang pertumbuhan mikroba isolat BAL kandidat probiotik asal saluran pencernaan DOC Broiler terhadap berbagai kondisi asam lambung yang berpotensi sebagai probiotik pada pakan ternak unggas.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan BAL adalah BAL dikatakan tumbuh jika memenuhi faktor-faktor pertumbuhan yaitu suhu/temperatur, suplai nutrisi, keasaman (pH) dan ketersediaan oksigen.
- b. Kondisi asam lambung adalah kondisi dimana dalam sauran pencernaan ayam mengeluarkan getah pencernaan yaitu asam lambung yang membentuk kondisi disekitarnya menjadi asam.

c. Saluran pencernaan adalah organ yang menghubungkan antara dunia dalam tubuh ternak dengan dunia luar yang dimulai dari mulut, tenggorokan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, *ceca* dan kloaka.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi pertumbuhan bakteri asam laktat kandidat probiotik asal saluran pencernaan DOC Broiler terhadap berbagai kondisi asam lambung dengan menggunakan MRSB-HCl (asam) dan MRSB-KOH untuk mendapatkan berbagai derajat keasaman 1-6 (pH) yang ditunjukkan dengan media yang keruh dan adanya endapan pada indikator uji yang dilakukan.

F. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Anastiawan (2014), telah melakukan penelitian dengan judul “Isolasi Dan Karakterisasi Bakteri Probiotik Yang Berasal Dari Usus Itik Pedaging *Anas domesticus*”. Hasil yang diperoleh terdapat delapan isolat bakteri probiotik, 6 isolat bersifat Gram positif dan 2 isolat bersifat Gram negatif, berbentuk batang dan bulat, mampu tumbuh pada medium yang memiliki pH 2,5-3. Kedelapan isolat bersifat non motil, positif terhadap uji MR, positif dan negatif terhadap uji VP, bersifat katalase negatif, dan mampu memfermentasi karbohidrat pada medium TSIA. Dari hasil uji daya hambat didapatkan bahwa semua isolat memiliki kemampuan menghasilkan antimikroba yang bersifat bakteriosida terhadap pertumbuhan bakteri *E.coli* dan *S. aureus*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Probiotik

Istilah probiotik berasal dari bahasa Yunani, *pros* dan *bios* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai untuk hidup. Probiotik didefinisikan sebagai kultur tunggal atau campuran dari bakteri hidup yang dapat diaplikasikan kepada hewan maupun manusia, dan dapat memberikan keuntungan bagi inangnya dalam meningkatkan kinerja mikroflora alami tubuh (Irianto, 2007).

Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup non-patogenik, yang jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu akan memberikan efek menguntungkan bagi inang (*host*) (FAO/WHO, 2001). Lebih lanjut Jin *et al.* (1997) melaporkan bahwa Probiotik merupakan bakteri-bakteri yang secara tradisional telah lama digunakan dalam bentuk makanan, mengandung baik bakteri hidup, bakteri mati maupun metabolitnya yang dalam kurun waktu lama terbukti aman. Manfaat probiotik pada unggas adalah menempatkan mikroorganisme yang menguntungkan dan menekan mikroorganisme yang merugikan, meningkatkan aktifitas enzim-enzim pencernaan dan menekan aktifitas enzim-enzim bakteri yang merugikan, memperbaiki sistem pencernaan, menekan produksi gas amonia, dan merangsang sistem pertahanan tubuh.

Menurut *Food and Agriculture Organization/World Health Organization* (FAO/WHO) (2001), idealnya strain probiotik seharusnya tidak hanya mampu bertahan melewati saluran pencernaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan

cairan empedu dalam jalur makanan yang memungkinkan untuk bertahan hidup melintasi saluran pencernaan dan terkena paparan empedu. Selain itu probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti mikroba (*bakteriosin*), dan memberikan pengaruh yang menguntungkan inangnya. Syarat lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap proses psikokimia pada makanan (Prado *et al.*, 2008).

Bakteri probiotik atau bakteri baik adalah bakteri asam laktat yang hidup di dalam usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan bagi kesehatan. Sebagian besar jenis bakteri pada probiotik berasal dari *Lactobacillus* atau *Bifidobacterium*. Dua golongan bakteri ini mampu memperpanjang masa simpan produk dan secara alami melindungi usus manusia (Saxelin, 1997). Bakteri ini sering dimanfaatkan untuk industri makanan seperti yoghurt, keju, acar, bir, anggur (minuman), cuka, kimchi, cokelat dan makanan fermentasi lainnya (Khedid *et al.*, 2006).

Probiotik dapat digolongkan menjadi dua yakni golongan bakteri dan golongan cendawan. Menurut Mujiasih (2001), mikroorganisme yang sering digunakan sebagai probiotik dari kedua kelompok ini adalah *Aspergillus niger*, *A.oryzae*, *Bacillus coagulans*, *B.lentis*, *B.pumilus*, *B.brevis*, *B.alvei*, *B.circulans*, *Bifidobacterium adolescentis*, *B.animalis*, *B.bifidum*, *B.infantis*, *B.longum*,

B.thermophilus, *Bacteroides amylophilus*, *B.ruminicola*, *Lactobacillus acidophilus*, *L.brevis*, *Streptococcus oremoris*, *S.faecium*, *S.lactis*, *S.thermophilus*, *Leiconostoc mesenteroides*, *Pediococcus acidolacticii*, *Propionibacterium shemani* dan *Saccharomyces cerevisiae*.

Secara umum manfaat penambahan probiotik adalah membantu sistem pencernaan unggas, agar lebih mudah mencerna dan meningkatkan kapasitas daya cerna sehingga diperoleh zat pakan yang lebih banyak untuk pertumbuhan maupun produksi (Barrow, 1992). Menurut Jin *et.al* (1997), mekanisme kerja probiotik pada saluran pencernaan ternak unggas adalah: (1) Menetralkan racun, (2) Menekan populasi bakteri tertentu yang tidak dikehendaki sebagai anti bakteri atau berkompetisi di dalam saluran pencernaan, dan (3) Meningkatkan kekebalan tubuh. Barrow (1992) juga menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua tujuan utama dari penggunaan probiotik pada unggas, yaitu: (1) Untuk manipulasi mikroorganisme saluran pencernaan bagian anterior (*crop*, *gizzard*, dan usus halus) dengan menempatkan mikroflora dari strain *Lactobacillus sp.* (2) Untuk meningkatkan daya tahan ternak dari infeksi *Salmonella*.

Prado *et al.* (2008) lebih lanjut menyatakan bahwa, penggunaan probiotik di dalam ransum dapat meningkatkan pertumbuhan ayam. Menurut Ramia (2000), disebutkan bahwa suplementasi probiotik dalam ransum ternyata dapat meningkatkan berat karkas dan persentase daging karkas serta dapat menurunkan jumlah lemak subkutan termasuk kulit. Soeharsono (2010) menyatakan bahwa penambahan probiotik dalam ransum yang diberikan pada ternak dapat menurunkan kadar lemak dan kolesterol.

Probiotik dapat mengubah pergerakan pada populasi mikroba di dalam usus halus ayam, sehingga keberadaannya dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan usus, memperbaiki mikroflora pada sekum, serta meningkatkan penyerapan zat makanan (Mountzouris et al., 2010). Probiotik dapat memperbaiki saluran pencernaan dan meningkatkan kecernaan pakan, yaitu dengan cara menekan bakteri patogen dalam saluran pencernaan sehingga mendukung perkembangan bakteri yang menguntungkan yang membantu penyerapan zat-zat makanan (Kompiani et al., 2002).

Strain probiotik seharusnya tidak hanya mampu bertahan melewati saluran pencernaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan cairan empedu dalam jalur makanan yang memungkinkan untuk bertahan hidup melintasi saluran pencernaan dan terkena paparan empedu. Selain itu probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti mikroba (*bakteriosin*), dan memberikan pengaruh yang menguntungkan inangnya. Syarat lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap proses psikokimia pada makanan (Prado *et al.*, 2008).

Probiotik dapat memproduksi bakteriosin untuk melawan patogen yang bersifat selektif hanya terhadap beberapa strain patogen. Probiotik juga memproduksi asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida, laktoperoksidase, lipopolisakarida, dan beberapa antimikrobia lainnya. Probiotik juga

menghasilkan sejumlah nutrisi penting dalam sistem imun dan metabolisme host, seperti vitamin B (*Asam Pantotenat*), *pyridoksin*, *niacin*, *asam folat*, *kobalamin*, dan *biotin* serta *antioksidan* penting seperti vitamin K (Adams, 2000).

Tidak semua bakteri baik dapat dijadikan sebagai probiotik, salah satu bakteri yang berperan sebagai probiotik adalah BAL. Pada mulanya, bakteri asam laktat terdiri dari 4 genus yaitu *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus* dan *Streptococcus*. Namun demikian, beberapa genus baru masuk kedalam kelompok BAL menurut revisi taksonomik terakhir. Genus *Streptococcus* mencakup *Enterococcus*, *Lactococcus*, *Streptococcus* dan *Vagococcus* (Trisna, 2012).

Beberapa laporan menunjukkan bahwa penggunaan probiotik dapat meningkatkan laju pertumbuhan yang berhubungan dengan manfaat probiotik dapat meningkatkan nafsu makan dan menghasilkan vitamin serta enzim-enzim pencernaan. Memungkinkan probiotik tersebut dapat berperan sebagai stimulasi pertumbuhan, sehingga dapat meningkatkan pertambahan bobot badan sekaligus bobot karkas ayam broiler (Abrar dan Raudhati, 2006).

Penggunaan probiotik pada ternak telah dilaporkan mampu menurunkan kadar kolesterol (Depson, 2012), sebagai zat pemacu tumbuh, meningkatkan konversi pakan, control kesehatan atau pencegahan mikroba pathogen terutama ternak usia muda (Purwadaria *et al.*,2003). Efektivitas probiotik dapat bertahan jika mikroorganisme tersebut dapat aktif dalam berbagai kondisi lingkungan yang berbeda dan tetap hidup dalam berbagai bentuk. Mikroba tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: (1) dapat diproduksi secara massal; (2) tetap stabil dan *viable* dalam waktu lama dalam kondisi penyimpanan dan di

lapangan; (3) dapat bertahan hidup (akan lebih baik jika dapat tumbuh) di dalam saluran pencernaan; dan (4) memberikan dampak yang menguntungkan pada inang. Salminen *et al.* (1998) menjelaskan pentingnya viabilitas probiotik, yaitu preparasi mikroba hidup yang bermanfaat bagi kesehatan. Jumlah mikroba hidup harus cukup untuk memberikan efek positif bagi kesehatan dan mampu berkolonisasi sehingga dapat mencapai jumlah yang diperlukan selama waktu tertentu.

B. Syarat Mikroba sebagai Probiotik

Secara alami di dalam perut ayam dikeluarkan getah pencernaan seperti asam lambung (HCl) yang membentuk kondisi sekitarnya menjadi asam, garam empedu (*bile salt*) yang membawa suasana netral sampai sedikit basa, diproduksi senyawa anti bakteri, dan ada gerakan peristaltik usus di mana jika mikroba probiotik tidak mampu melekat akan terlempar oleh gerakan usus tersebut. Probiotik yang prima mampu melekat di sel epitel usus ayam. Probiotik yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas tidak mungkin melakukan mekanisme (*mode of actions*) untuk membantu menyehatkan ayam (Poultry, 2015).

Ritongga (1992) menyatakan bahwa syarat-syarat probiotik adalah mikroba tersebut tidak patogen terhadap ternak maupun manusia, mikroba tersebut harus merupakan mikroorganisme yang normal di dalam saluran pencernaan dan sanggup melakukan kolonisasi di dalam usus, harus tahan terhadap asam-asam lambung, enzim-enzim pencernaan, asam dan garam empedu, maupun respon-respon kekebalan dalam tubuh ternak, sanggup memproduksi zat-zat anti bakteri yang berspektrum luas pada bakteri-bakteri spesifik termasuk

bakteri patogen pada saluran pencernaan manusia. Umumnya yang dipenuhi syarat tersebut diatas sebagai probiotik adalah koloni mikroba *Lactobacillus* dan *Pediococci sp.*

Lebih lanjut Jin *et al.* (1997) menyatakan bahwa mikroba yang digunakan sebagai probiotik yang efektif harus memiliki beberapa sifat antara lain dapat bertahan hidup selama persiapan sampai produksi dengan skala industri, stabil dan tetap hidup dalam jangka waktu lama pada periode penyimpanan dan kondisi lapangan, dapat bertahan hidup, mampu bersaing, tidak hanya sekedar tumbuh dalam saluran pencernaan, serta mampu menimbulkan efek yang menguntungkan bagi inang.

Beberapa persyaratan yang diperlukan untuk menjadikan strain bakteri asam laktat sebagai agensia probiotik adalah bahwa strain tersebut merupakan mikroflora alami jalur pencernaan manusia, tumbuh dan tetap hidup pada makanan sebelum dikonsumsi, tetap hidup walaupun melewati jalur pencernaan, memiliki resistensi terhadap asam lambung, beberapa antibiotik, terhadap lisosim; dapat tumbuh pada intestin dan memiliki kemampuan menempel pada sel epitel intestin manusia, memberi efek yang menguntungkan pada usus, memproduksi asam dalam jumlah besar dan cepat, mampu menghasilkan komponen antimikrobia lain disamping asam (bakteriosin, hydrogen peroksida, diasetil dan reuterin) yang efektif menghambat bakteri lain yang tidak dikehendaki, khususnya bakteri pathogen (Rahayu, 1997).

Pertumbuhan mikroba dapat mencapai optimal bila keadaan lingkungan disesuaikan dengan sifat mikroba. Sebagai contoh pada pertumbuhan mikroba aerob, faktor oksigen menjadi faktor utama, sedangkan suhu lingkungan juga disesuaikan dengan sifat mikroba. Mikroba mesofilik dapat tumbuh pada suhu 28-30⁰C, sedangkan mikroba thermofilik hanya dapat tumbuh pada suhu tinggi, yaitu di atas 45⁰C. Kebutuhan sumber karbon untuk pertumbuhan mikroba tergantung pada jenis mikroba. Kelompok mikroba yang mengandung klorofil dapat menggunakan CO₂ sebagai sumber karbon (kelompok protobakteria seperti *Rhodobacter*), sedangkan kebanyakan mikroba tidak mengandung klorofil. Kelompok ini memerlukan senyawa organik sebagai sumber karbon dan senyawa yang diperlukan tergantung jenis mikrojanya. Kelompok selulolitik dapat memanfaatkan selulosa, sedangkan amilolitik memanfaatkan pati (Fardiaz, 1989).

Tidak sembarang bakteri bisa digunakan sebagai probiotik. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya punya aktivitas antimikroba dan antikarsinogenik, mampu berkoloni dalam saluran pencernaan serta mampu meningkatkan penyerapan usus. Beberapa jenis probiotik yang sering digunakan adalah *Bifidobacterium brevis*, *B. infantis*, *B. longu*, *Lactobacillus acidopholus*, *L. bulgaricus*, *L. plantarum*, *L. rhamnosus*, *L. casei*, dan *Streptococcusthermophilus*. Di pasaran probiotik ini dijual dalam bentuk susu dan foodsupplement (Tensiska, 2008).

C. Isolasi Mikroba sebagai Probiotik

Isolasi adalah memisahkan mikroba dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dan menumbuhkannya dalam suatu medium buatan. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat, sel-sel mikroba akan membentuk suatu koloni sel yang tetap pada tempatnya (Adams, 2000).

Proses isolasi diperlukan untuk melakukan pemisahan bakteri asam laktat dari sumbernya, dimana dari hasil isolasi ini akan diperoleh biakan murni dari bakteri asam laktat yang dapat dijadikan sebagai prebiotik. Pengisolasian ini harus dalam kondisi *anaerob* sehingga didapat bakteri asam laktat yang sesuai dengan harapan. Untuk mendapatkan isolat bakteri asam laktat yang dapat dijadikan sebagai probiotik dari saluran pencernaan pada ayam broiler, maka perlu dilakukan isolasi dan karakteristik bakteri asam laktat pada usus halus ayam broiler (Sari, 2013).

Biakan yang berisi lebih dari satu macam mikroorganisme (bakteri) dikenal sebagai biakan campuran, jika hanya terdiri dari dua jenis mikroorganisme, yang dengan sengaja dipelihara satu sama lain dalam asosiasi, dikenal sebagai biakan dua jenis. Persyaratan utama bagi isolasi dan kultivasi fage adalah harus adanya kondisi optimum untuk pertumbuhan organisme inangnya. Sumber bakteriofage yang paling baik dan paling utama adalah habitat inang. Sebagai contoh fage yang paling baik dan paling utama adalah habitat inang.

Sebagai contoh fage koli yang di jumpai di dalam pencernaan dapat diisolasi dari limbah atau pupuk kandang. Hal ini dilakukan dengan sentrifugasi penanaman kloroform untuk membunuh sel-sel bakterinya (Adams, 2000).

Usus besar mengandung mikroorganisme, suatu komponen yang kompleks dan mempunyai kegiatan metabolisme yang bermacam-macam. Fungsi utamanya adalah menampung energi dari karbohidrat yang tidak tercerna di bagian usus, hal ini dapat dimungkinkan oleh karena kemampuan fermentasi dan absorpsi mikroorganisme terhadap karbohidrat yang tidak terserap oleh dinding usus, sehingga mikroorganisme berperan dalam fermentasi karbohidrat (Sjofjnsn, 2003).

Mikroorganisme juga mempunyai peranan dalam sintesis vitamin B dan vitamin K, dan metabolisme asam-asam empedu, sterol dan xenobiotic. Mikroorganisme dalam usus sangat responsif terhadap diet karbohidrat yang dapat difermentasi, misalnya polisakarida *nonstarch*, *resistant starch* dan oligosakarida. Adanya bahan tersebut bakteri akan tumbuh subur dan dapat mensintesis 15 gram biomassa yang disekresikan lewat tinja yang mengandung 1 gram Nitrogen bakterial. Begitupun dengan usus pada ternak, dimana terdapat mikroorganisme yang dapat mempermudah proses penyerapan nutrisi makanan ternak. Pada usus besar koloni bakteri sangat tinggi tetapi pada usus halus/kecil jumlah mikroflora hanya sedikit sehingga efek pertahanan terhadap patogenpun sangat terbatas. Hal tersebut menjadi alasan kenapa sebagian target infeksi virus dan bakteri adalah usus halus (Tensiska, 2008).

D. Bakteri Saluran Pencernaan Unggas

Saluran pencernaan pada ayam broiler dimulai dari mulut, tenggorokan, kemudian lambung, usus halus dan usus besar yang dilalui oleh makanan yang dikonsumsi, termasuk bakteri, baik yang bermanfaat maupun yang berpotensi mengganggu kesehatan ternak (Sjofjan, 2003).

Saluran pencernaan pada unggas yang baru ditetaskan umumnya steril. Sesaat setelah menetas unggas yang masih muda secara alami mikroflora saluran pencernaannya berkembang melalui kontaminasi dari material feses yang berasal dari ayam dewasa. Faktor lain yang berpengaruh yaitu transfer mikroba dari induk pada anak, dan kontak dengan bakteri dari lingkungan. Saluran pencernaan unggas apabila dilihat dari aspek mikrobiologis dapat dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu: tembolok (*crop*); rempela; usus halus; sekum; kolon dan kloaka.

Faktor utama yang menentukan populasi mikroba adalah pH. *Escherichia coli* dan *Enterococci* merupakan organisme yang dominan yang ditemukan pada unggas yang baru menetas. Pada bagian tembolok, *Lactobacillus* menjadi dominan pada lima hari pertama, sedangkan pada usus halus memerlukan waktu dua minggu. Kolonisasi bakteri pada usus halus lebih lambat dibandingkan pada bagian lain dari saluran pencernaan dan pada hari pertama konsentrasinya dibawah 10^5 CFU/g (Coloni Forming Unit). Pada bagian sekum, pada umur unggas sekitar dua sampai empat minggu bakteri obligat aerob meningkat. Pada saat ini bakteri *Bifidobacteria*, *Bacteroides*, *Eubacteria*, *Peptostreptococci*, dan

Clostridia menjadi dominan. Selain itu pada sekum ditemukan juga kelompok bakteri selulolitik pada tingkat diatas 10^3 CFU/g (Spring 1997).

Usus pada ternak unggas ibarat sebuah tabung reaksi yang berisi beragam bakteri dan berbagai nutrisi yang disuplai melalui makanan yang dikonsumsi. Dalam saluran pencernaan ayam, mikroba terdapat hampir di sepanjang usus. Mikroorganisme utama yang terdapat dalam tembolok, usus halus dan ceca adalah golongan bakteri *Lactobacilli* yang khusus menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Sehingga pH dalam tembolok ayam yang baik antara pH 4-5 akibatnya organisme yang tidak tahan asam tidak dapat berkembang secara normal (Sjofjan, 2003).

Pada mulanya, bakteri asam laktat terdiri dari 4 genus yaitu *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus* dan *Streptococcus*. Namun demikian, beberapa genus baru masuk kedalam kelompok bakteri asam laktat menurut revisi taksonomik terakhir. Genus *Streptococcus* mencakup *Enterococcus*, *Lactococcus*, *Streptococcus* dan *Vagococcus* (Suroño, 2004).

Usus besar atau colon memiliki lebih dari 99% bakteri yang tinggal di dalamnya dan lebih dari 99% berupa bakteri anaerob mutlak diantaranya adalah *Clostridium*, *Bacterioides*, *Bifidobacterium* dan lain-lain. Hanya kurang dari 1% berupa bakteri fakultatif anaerob seperti *E.coli*, *Enterobacter* dan bakteri patogen lainnya. Populasi bakteri semakin kompleks baik jenis dan jumlahnya dengan bertambahnya umur disepanjang saluran pencernaan. Lambung hanya mengandung bakteri yang tahan terhadap asam, sebagaimana diketahui bahwa pH atau keasaman lambung sangat rendah sekitar 1,7 dan BAL bisa bertahan

dalam bilangan ribuan (10^3). Usus kecil ditempati 400-500 jenis bakteri yang jumlahnya trilyunan (10^{12} - 10^{14}) bakteri dan BAL sekitar 10^4 - 10^9 bakteri. Mikroba dalam saluran pencernaan bisa membantu pencernaan makanan bahkan beberapa jenis menghasilkan beberapa vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, namun demikian beberapa efek negatif yang secara umum adalah dihasilkan senyawa-senyawa hasil pembusukan protein, produksi toksin (Surono, 2004).

Jenis mikroba yang digunakan sebagai probiotik sangat terkait pada sifat kimia dan fisik lingkungan pencernaan. Sebagian organ pencernaan unggas (tembolok, *proventrikulus*, dan rempela) mempunyai keasaman yang tinggi, oleh karena itu mikroba yang digunakan harus tahan terhadap asam. Selain itu saluran pencernaan juga bersifat anaerob, sehingga hanya mikroba yang anaerob fakultatif atau obligat yang dapat hidup pada lingkungan tersebut. Pada umumnya mikroba yang digunakan pada unggas dapat berupa bakteri asam laktat atau dari kelompok khamir (Martin, 1995).

Beberapa mikroba telah direkomendasikan oleh beberapa peneliti sebagai sumber probiotik diantaranya *Bacillus subtilis*, *Bacillus lecheniformis*, *Bacillus toyoi*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Lactobacillus*, *Streptococcus* dan *Yeast* (Ramia, 2000). Lebih lanjut Andajani (1997), menyatakan bahwa umumnya mikroba yang terdapat dalam probiotik adalah *Lactobacillus* yang mampu menekan perkembangan *E. Coli*. Senjata ampuh *Lactobacillus sp* adalah hydrogen peroksida yang dihasilkan dari metabolismenya yang bersifat bakterisidal, disamping itu *Lactobacillus sp* juga mampu memproduksi semacam antibiotik yang disebut *Acodolin* yang dapat membunuh bakteri patogen.

E. Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang biasa digunakan sebagai probiotik. Bakteri ini bersifat nonpatogenik, nontoksikogenik, gram positif, anaerobik, tidak menghasilkan spora, bakteri penghasil asam laktat yang diproduksi dari fermentasi karbohidrat (Desai, 2008).

BAL adalah kelompok bakteri gram positif berbentuk kokus atau batang, tidak membentuk spora, suhu optimum $\pm 40^{\circ}\text{C}$, pada umumnya tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif dan oksidase positif, dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh pada kadar gula, alkohol, dan garam yang tinggi, mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida (Syahrurahman, 1994).

Bakteri ini merupakan mikroorganisme yang tersebar luas di alam baik di udara, air dan di dalam tanah. BAL adalah bakteri yang menguntungkan. Bakteri asam laktat merupakan kekayaan alam mikroba yang masih harus dieksplorasi. Secara ekologis kelompok bakteri ini sangat bervariasi dan anggota spesiesnya dapat mendominasi bermacam-macam makanan, minuman atau habitat yang lain seperti tanaman, jerami, rongga mulut dan perut hewan ternak (Mulyani, 1996).

Klasifikasi bakteri asam laktat dalam genus yang berbeda sebagian besar didasarkan pada perbedaan morfologi, cara fermentasi glukosa, pertumbuhan pada suhu yang berbeda, dan konfigurasi dari asam laktat yang dihasilkan, kemampuan untuk tumbuh pada konsentrasi garam tinggi, dan toleransi terhadap asam atau basa (Desai, 2008). Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh

pada kadar gula, alkohol, dan garam yang tinggi, mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida (Syahrurahman, 1994).

Bakteri asam laktat dapat dibedakan atas 2 kelompok berdasarkan hasil fermentasinya, yaitu:

1. Bakteri homofermentatif: glukosa difermentasi menghasilkan asam laktat sebagai satu-satunya produk. Bakteri dalam kelompok ini akan mengubah heksosa menjadi asam laktat dalam jalur Embden-Meyerhof (EM) dan tidak dapat memfermentasikan pentosa atau glukonat, asam laktat menjadi satu-satunya produk. Contoh: *Streptococcus*, *Pediococcus*, dan beberapa *Lactobacillus* (Kusuma, 2009).
2. Bakteri heterofermentatif: glukosa difermentasikan selain menghasilkan asam laktat juga memproduksi senyawa-senyawa lainnya yaitu etanol, asam asetat dan CO₂. Heksosa difermentasikan menjadi asam laktat, karbon dioksida, dan etanol (atau asam asetat sebagai akseptor elektron alternatif). Pentosa lalu diubah menjadi laktat dan asam asetat. Contoh: *Leuconostoc* dan beberapa spesie *Lactobacillus* (Kusuma, 2009).

BAL terdapat di saluran pencernaan ayam/itik dapat diisolasi dan digunakan sebagai probiotik. Introduksi isolat BAL asal saluran pencernaan unggas lebih adaptif jika diaplikasikan dalam saluran pencernaan ayam yang juga berasal dari unggas. Isolat BAL diharapkan dapat menyeimbangkan antara bakteri tidak patogen dengan yang patogen sehingga dapat meningkatkan kesehatan ayam jantan. Jenis BAL yang sering digunakan sebagai starter diantaranya kelompok

Lactobacillus, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Enterococcus*, *Lactococcus*, dan *Streptococcus* (Sutrisna, 2014).

Karakterisasi bakteri asam laktat yang dapat digolongkan ke dalam bakteri probiotik adalah diketahui sebagai materi yang tidak berbahaya, dapat hidup selama dilakukan proses dan penyimpanan, memiliki efek antagonis terhadap bakteri patogen, toleran terhadap asam lambung, getah pankreas dan cairan empedu serta mampu melindungi epitelium inangnya (Mac Farland dan Cummings, 2002).

BAL dapat menurunkan pertumbuhan bakteri patogen, seperti *E.coli* karena dalam usus halus terjadi kompetisi BAL dan *E.coli* untuk mendapatkan nutrisi, dimana BAL dapat melekat pada sel epitel usus yang kemudian membentuk koloni dan menghasilkan zat anti mikroba, sehingga bakteri patogen tidak dapat berkembang biak. BAL juga mampu menghasilkan asam lemak rantai pendek yang berperan untuk menstimulasi perbanyakan sel epitel usus, sehingga terjadi peningkatan penyerapan nutrisi dalam tubuh dan dapat mempengaruhi penambahan bobot badan ayam broiler (Irianto, 2007).

Bakteri probiotik atau bakteri baik adalah bakteri asam laktat yang hidup di dalam usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan bagi kesehatan. Pemberian BAL tidak dapat diberikan secara langsung pada ternak unggas. Hal ini dikhawatirkan viabilitas BAL semakin menurun seiring dengan semakin bervariasinya derajat keasaman (pH) yang terdapat pada saluran pencernaan (Khedid *et al.*, 2006).

Syarat BAL sebagai probiotik yang dikemukakan oleh Seveline (2005), yaitu: (1) tahan terhadap pH asam lambung (1.5-4), (2) stabil terhadap garam empedu, (3) memproduksi senyawa antimikroba, (4) mampu menempel pada sel usus manusia serta tumbuh dan berkembang baik dalam saluran pencernaan, dan (5) dapat berkoagregasi membentuk lingkungan mikroflora normal yang seimbang dalam saluran pencernaan. Kemampuan BAL untuk hidup di dalam saluran pencernaan dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Inilah alasan BAL berpotensi sebagai probiotik.

Beberapa jenis bakteri asam laktat Sumianti (2008) antara lain sebagai berikut:

1. *Streptococcus thermophilus*, *Streptococcus lactis* dan *Streptococcus cremoris*. Semuanya ini adalah bakteri gram positif, berbentuk bulat (coccus) yang terdapat sebagai rantai dan semuanya mempunyai nilai ekonomis penting dalam industri susu.

2. *Pediococcus cerevisiae*. Bakteri ini adalah gram positif berbentuk bulat, khususnya terdapat berpasangan atau berempat (tetrads). Walaupun jenis ini tercatat sebagai perusak bir dan anggur, bakteri ini berperan penting dalam fermentasi daging dan sayuran.

3. *Leuconostoc mesenteroides* dan *Leuconostoc dextranicum*. Bakteri ini adalah gram positif berbentuk bulat yang terdapat secara berpasangan atau rantai pendek. Bakteri-bakteri ini berperan dalam perusakan larutan gula dengan produksi pertumbuhan dekstran berlendir. Walaupun demikian, bakteri-bakteri ini

merupakan jenis yang penting dalam 18 permulaan fermentasi sayuran dan juga ditemukan dalam sari buah, anggur, dan bahanpangan lainnya.

4. *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus delbrueckii*. Organisme-organisme ini adalah bakteri berbentuk batang, gram positif dan sering berbentuk pasangan dan rantai dari sel-selnya. Jenis ini umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam dari pada jenis-jenis *Pediococcus* atau *Streptococcus* dan oleh karenanya menjadi lebih banyak terdapat pada sayuran. Pada hewan ternak lain seperti sapi bali dapat ditemukan bakteri asam laktat seperti *Lactobacillus lactis* dan *Lactobacillus brevis* (Suardana, 2007).

Pediococcus adalah genus bakteri yang termasuk bakteri asam laktat (BAL) dengan ciri non-motil (tidak bergerak) dan memiliki bentuk sferis. Sel bakteri ini terbagi ke dalam dua bidang sehingga membentuk pasangan, tetrad (terususun empat), atau gumpalan sel sferis yang lebih besar. Bakteri ini adalah gram positif berbentuk bulat, khususnya terdapat berpasangan. Genus *Pediococcus* termasuk golongan fakultatif anaerob dan untuk hidup memerlukan lingkungan yang kaya nutrisi serta mengandung faktor pertumbuhan dan gula yang dapat difermentasi. Bakteri ini termasuk homofermentatif (hanya menghasilkan asam laktat) dan tidak dapat menggunakan pentosa (karbohidrat beratom C₅) (Victoria, 2008).

Suhu optimum untuk pertumbuhan *Pediococcus* adalah 25-30 °C dan pH optimum ± 6 (Victoria, 2008). Spesies dan galur dari genus ini berbeda dalam toleransi atau ketahanannya terhadap oksigen, pH, suhu, resistensi antibiotik, dan

NaCl. Beberapa galur dari *Pediococcus* telah diketahui memiliki satu atau lebih plasmid dalam berbagai ukuran, yang sebagian di antaranya mengkodekan gen untuk fermentasi karbohidrat dan produksi bakteriosin (Hui, 1994).

Bakteri *Pediococcus* banyak digunakan dalam pembuatan sosis. Bahan baku sosis bermacam-macam jenisnya, ada yang menggunakan daging sapi, daging ayam dan daging ikan. Sosis adalah satu-satunya produk daging terfermentasi. Sosis yang telah diolah kemudian disimpan pada suhu 8 °C selama 40 hari atau lebih, yang selama waktu itu terjadi fermentasi asam laktat disertai dehidrasi daging yang cukup. Tentu saja hal ini meningkatkan kadar garam yang bersama dengan asam laktat mencegah pertumbuhan organisme yang merusak (Alcamo, 2001).

Saat tumbuh pada daging, *Pediococcus* dapat menghasilkan diasetil yang berperan sebagai antimikroba, namun juga dapat menghilangkan rasa makanan meskipun dalam jumlah kecil. Contohnya *Pediococcus* dapat menghambat pertumbuhan *Escherichia coli* pada sosis fermentasi selama masa inkubasi. Genus *Pediococcus* banyak terlibat dalam fermentasi bagian tanaman, di antaranya adalah *P. acidilactici*, *P. dextrinicus*, *P. inopinatus*, *P. parvulus*, dan *P. pentosaceus*. Sejak tahun 1985, telah diteliti bahwa kemampuan *Pediococcus* sp. untuk membunuh mikroorganisme pembusuk dan patogen dalam fermentasi daging dikarenakan kemampuannya menghasilkan asam organik. Selain itu, fermentasi dengan bakteri ini juga meningkatkan kestabilan makanan dalam masa penyimpanan dan menghasilkan produk yang lebih banyak mengandung protein. Walaupun jenis ini tercatat sebagai perusak bir

dan anggur, bakteri ini berperan penting dalam fermentasi daging dan sayuran (Alcamo, 2001).

BAL dalam saluran pencernaan memiliki kelemahan yaitu mudah mengalami perubahan jumlah akibat pengaruh pakan yang diberikan. Pakan ceceran berasal dari pabrik pakan yang berupa limbah atau pakan yang tidak layak jual. Pakan ceceran adalah pakan alternative yang relative lebih murah, tetapi memiliki kekurangan berupa terdapatnya bakteri patogen. Pakan ceceran terdapat cemaran *E. coli* sebesar $2,8 \times 10^6$ cfu/g (Hakim, 2014). Bakteri patogen dalam pakan akan mengganggu performa ayam. Bakteri patogen dalam pakan ceceran dapat ditekan keberadaannya dengan teknologi fermentasi dengan memanfaatkan BAL (Abudabos, 2013).

F. Kondisi Asam Lambung Unggas

Kondisi saluran pencernaan erat kaitannya dengan pH yang berbeda beda. Salah satu faktor yang menonjol dalam menentukan kadar pH dalam saluran pencernaan adalah keasaman asam lambung. Kondisi keasaman lambung berfungsi sebagai pintu gerbang pertama untuk melakukan seleksi mikroba sebelum masuk ke usus (Wiyana, 2011).

Asam laktat merupakan senyawa metabolit utama pada fermentasi oleh bakteri asam laktat yang akan menurunkan pH pada sekitar saluran usus menjadi 4-5, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan *E.coli* yang membutuhkan pH optimum 6-7. Sejumlah asam volatil yang dihasilkan selama fermentasi juga memberikan efek antimikroba dalam kondisi redoks potensial yang rendah. Asam asetat dan asam propionat yang dihasilkan melalui fermentasi

heterofermentatif, akan berinteraksi dengan sel membran dan mengakibatkan asidifikasi intraseluler dan denaturasi protein, sehingga sangat efektif sebagai antimikroba (Surono, 2004).

Bakteri yang mampu bertahan pada kondisi keasaman lambung akan dialirkan menuju ke usus bagian atas dimana pada usus, bakteri akan menghadapi tekanan yang berhubungan dengan ketersediaan O₂ yang rendah, garam empedu dan persaingan dengan mikrobiota (mikroorganisme lainnya yang terdapat di dalam usus). Garam empedu yang terdapat di dalam usus disintesis di dalam hati dengan cara mengkonjugasi steroid heterosiklik yang berasal dari kolesterol dan disalurkan ke usus melalui usus dua belas jari. Garam empedu kemudian akan diserap kembali dari ileum bagian bawah dan kembali ke hati untuk disekresikan lagi ke empedu. Lamanya bakteri di dalam usus sekitar 4-6 jam. Bakteri probiotik harus mampu bertahan dalam menghadapi rintangan-rintangan dalam saluran pencernaan agar dapat mencapai usus halus dalam keadaan tetap hidup serta dalam jumlah yang cukup memadai untuk berkembang biak dan menyeimbangkan mikrobiota dalam usus (Surono, 2004).

Surono (2004) menyatakan bahwa, berbagai rintangan yang harus dihadapi mikroba dalam saluran pencernaan dari mulut sampai anus. Pada perjalanannya melintasi berbagai sistem pencernaan khususnya yang dijumpai diantaranya enzim lisosom pada air liur, asam lambung, garam empedu dan senyawa metabolit oleh BAL terutama asam laktat. Pada usus besar hampir tidak ditemukan lagi hambatan yang cukup berarti kecuali terjadinya kompetisi terhadap nutrisi. Bakteri probiotik harus mampu bertahan menghadapi rintangan-rintangan tersebut, agar mencapai

usus dalam keadaan hidup dalam jumlah yang cukup memadai untuk berkembangbiak dalam menyeimbangkan mikrobiota usus. Untuk mengetahui pH dan waktu transit dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Derajat Keasaman (pH) dalam Saluran Pencernaan Ayam

Organ Pencernaan	pH	Lama Transit (menit)
Tembolok	5.5	50
Proventriculus dan Gizzard	2.5-3.5	90
Duodenum	5.6	5-8
Jejunum	6.5-7	20-30
Ileum	7-7.5	50-70
Rektum	8	25

Sumber: Surono (2004).

Bakteri asam laktat mampu mempertahankan pH intraseluler lebih alkali daripada pH ekstraseluler, tetapi penurunan pH intraseluler tetap berlangsung seiring dengan menurunnya pH ekstraseluler yang mendukung toleransinya terhadap asam (Siegumfeldt *et al.*, 2000). Bakteri dapat menurunkan pH intraseluler sekitar menjadi netral pada saat pH ekstraseluler turun, tetapi akan menggunakan banyak energi karena perbedaan gradien proton yang besar dan mengakibatkan terjadinya akumulasi anion asam organik dalam sitosol yang beracun bagi sel (Russel, 1992).

Pertumbuhan bakteri asam laktat pada saluran pencernaan ayam broiler dikarenakan lingkungan sesuai. Lingkungan yang sesuai untuk hidup bakteri asam laktat meliputi suhu, potensial hidrogen (pH) dan kandungan nutrisi. Suhu yang terlalu tinggi akan merusak protein penyokong hidup bakteri. Kerusakan ini akan mengakibatkan bakteri mati. Suhu yang terlalu rendah akan berakibat BAL dorman dan tidak tumbuh (Fardias, 1992). Bakteri asam laktat memiliki rentang suhu optimal 37⁰C -42⁰C (Husmaini *et al.*, 2011) dan dapat hidup pada pH 2 -6,5

(Hardiningsih et al., 2006). Ayam broiler memiliki suhu tubuh normal berkisaran 40°C-41°C (Molenaar. 2012). pH saluran pencernaan ayam broiler berkisar antara 3,47 (gizzard) sampai 6,43 (usus halus) (Mabelebele et al., 2013).

Ketika bakteri probiotik termakan, maka bakteri pertama kali akan menghadapi keasaman lambung. Bakteri asam laktat tidak hanya tumbuh dengan lambat pada pH rendah, tetapi kerusakan akibat asam dan hilangnya viabilitas juga dapat terjadi pada sel bakteri yang terpapar pada pH rendah. Tiap galur memiliki ketahanan yang berbeda terhadap asam atau pH rendah (Surono, 2004).

Bakteri yang mampu bertahan pada kondisi keasaman lambung akan dialirkan menuju ke usus bagian atas dimana pada usus, bakteri akan menghadapi tekanan yang berhubungan dengan ketersediaan O₂ yang rendah, garam empedu dan persaingan dengan mikrobiota (mikroorganisme lainnya yang terdapat di dalam usus) (Surono, 2004).

G. Tinjauan Islam tentang Mikroorganism, Probiotik dan Pencernaan

Ayam Broiler tidak dapat dipungkiri lagi telah menjadi bahan konsumsi masyarakat sehari-hari. Ayam Broiler merupakan hasil budidaya teknologi yang memiliki pertumbuhan cepat. Oleh karena itu, permintaan Ayam Broiler dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga para peternak bekerja keras dalam hal pemeliharaan serta produktifitas demi mendapatkan hasil dan kualitas yang baik. Ayam Broiler merupakan satu diantara makhluk ciptaan Allah swt., sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Mukmin/40: 79-80:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٦﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera (Kementerian Agama, RI., 2012: 477).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kesejahteraan manusia. Allah juga menciptakan segala makhluk dengan manfaatnya masing-masing termasuk pula pada hewan ternak. Ada hewan ternak yang dapat dikendarai seperti unta, sapi dan kuda serta ada pula hewan ternak yang diciptakan untuk dikonsumsi, salah satu diantaranya adalah ayam. Ayam dapat dijadikan binatang ternak dan dipelajari cara beternaknya juga dikonsumsi dagingnya. Manfaat lain dari ayam yaitu bulunya untuk bahan kerajinan dan kotorannya untuk pupuk tanaman. Hal ini menjadikan keberadaan ayam sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki manfaat yang dapat memberi pengajaran dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS an-Nahl/16:66 yang berbunyi:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَّأً خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya (Kementerian Agama, RI., 2012: 275).

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada binatang ternak dapat pelajaran. Melalui pengamatan dan pemanfaatannya manusia dapat mengetahui cara hidupnya, tingkah laku, dagingnya untuk dikonsumsi, dan kelebihan maupun kekurangannya. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang ternak, manusia dapat memperoleh karunia-Nya. Semua itu dapat manusia manfaatkan untuk berbagai tujuan, dan sebagian dari binatang ternak itu atas berkat Allah swt. manusia bisa memakan dengan mudah dan mendapatkan gizi dari ternak tersebut.

Mikroorganisme merupakan suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil dalam bentuk tunggal ataupun koloni yang umumnya tidak dapat dilihat dengan mata biasa tanpa bantuan peralatan khusus. Allah swt. sebagai pencipta dan pengatur seluruh alam semesta, Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatunya, baik yang ada di langit dan di bumi semua berada di bawah pengawasan dan kekuasaan-Nya. Bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta termasuk di dalamnya yaitu seluruh makhluk hidup di muka bumi, sebagaimana firman Allah swt. QS Yunus/10: 61, yang berbunyi:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ
شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ^ج وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah (atom) di bumi ataupun di langit tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh) (Kementerian Agama, RI., 2012: 216).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan baik itu berukuran besar maupun berukuran kecil, termasuk mikroorganisme yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat khusus, memiliki fungsinya masing-masing yang tidak luput dari pengawasan Allah swt.. Segala hal yang ada muka di muka bumi memang tidak pernah luput dari pengawasan-Nya juga mengenai halal dan haram bagi seluruh umat, sebagaimana firman Allah swt. QS al-Baqarah/2:173, yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِعَٰبِرِ اللَّهِ ۖ فَمَن

أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Kementerian Agama, RI., 2012: 27).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. mengharamkan darah, bangkai dan daging babi karena terdapat mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan tubuh jika dikonsumsi. Daging babi mengandung

cacing pita dan bangkai pada dasarnya sudah tidak higienis untuk dikonsumsi karena terkontaminasi mikroorganisme yang berbahaya.

Mikroorganisme seperti probiotik atau bakteri baik adalah bakteri asam laktat yang hidup di dalam usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan bagi kesehatan dan mempertahankan kekebalan tubuh, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al baqarah/ 2: 233, yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتِيماً بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama, RI., 2012: 38).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para ibu sepatutnya menyusukan anaknya karena di dalam Air Susu Ibu (ASI) mengandung laktosa yang tinggi. Laktosa dalam usus akan mengalami peragian hingga membentuk asam laktat. Asam laktat dalam susu bayi bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menghasilkan berbagai asam organik dan mensintesis beberapa jenis vitamin dalam usus. Vitamin dapat bermanfaat bagi kesehatan mata anak, sebagai ketahanan tubuh, dan memperkuat tulang. Selain itu para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh karena ASI yang diberikan secara langsung kemungkinan tercemarnya dari zat yang berbahaya juga lebih kecil sehingga baik bagi tumbuh kembang bayi.

ASI merupakan makanan dan minuman terbaik bagi bayi terutama untuk bayi 0-6 bulan, namun para ibu biasanya hanya memberikan ASI pada bayinya sampai berumur 1 minggu dan menggantinya dengan susu formula padahal pada umur tersebutlah bayi memerlukan ASI dimana ASI mengandung kolostrum yang berfungsi sebagai zat kekebalan terutama immunoglobulin A (IgA) untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi, seperti diare. ASI masih mengandung zat pertumbuhan istimewa yang membantu sistem imun menjadi matang, dan juga membantu otak, usus, dan organ-organ lain untuk berkembang dan matang. Untuk itu ASI masih sangat diperlukan diperlukan sampai anak berumur 2 tahun.

Adanya ASI merupakan salah satu kebajikan yang diberikan Allah swt. pada makhluknya ciptaan-Nya. Selain itu kebajikan lainnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Insan/76: 5, yang berbunyi:

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur (Kementerian Agama, RI., 2012: 579).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat kebajikan dengan ikhlas akan diberi ganjaran air kafur yaitu air surga yang mengalir di surga. Air kafur adalah yang menyebabkan hidangan menjadi lezat dan nikmat dilihat dari warna putihnya, wangi, aroma, dan dinginnya.

Rasulullah bersabda mengenai adab makan, yaitu jangan berlebihan makan sampai kenyang yang membuat malas dan merusak kesehatan. Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
نَحْنُ قَوْمٌ لَا أَكْلُ دَحَىٰ نَجُوعٍ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ

Artinya:

“Kami adalah kaum yang tidak makan sampai kami lapar dan jika kami makan maka kami tidak (sampai) kenyang.”

Hadits diatas menjelaskan bahwa umat manusia dianjurkan untuk makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang karena mempunyai dampak baik dan buruk bagi kesehatan. Bahwa makan saat kondisi perut lapar memiliki bahaya untuk kesehatan, demikian halnya jika makan hingga perut terlalu kenyang. Masing-masing pola ini memiliki bahaya tersendiri dan berdampak buruk untuk

kesehatan tubuh. Kebiasaan menahan lapar biasanya disebabkan keran pekerjaan yang menumpuk atau berbagai aktivitas lain yang membuat lupa untuk makan. Ini merupakan pola makan yang buruk karena berdampak tidak baik bagi kesehatan. Selain itu, tidak berhenti makan sebelum kenyang juga berdampak terhadap kebugaran. Pola makan ini membuat saluran pencernaan menjadi kerja lebih keras untuk mencerna banyaknya makanan yang telan. Inilah yang membuat tubuh menjadi lebih lemas dan tidak bertenaga.

Salah satu hadits menjelaskan pula tentang sederhana dalam makan dan tidak berlebihan, hadits tersebut adalah HR at-Tirmidzi, no. 2380. Ibnu Majah, no. 3349. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, yang berbunyi:

مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتِ يُقْمَنَ صَلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلْتُ
لِطَعَامِهِ وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ

Artinya:

“Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukup bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak ada pilihan, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya”.

Hadits tersebut diatas menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan umatnya untuk tidak makan secara berlebihan dan makanlah secara sederhana dimana di dalam perut manusia terbagi menjadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas. Jika makanan dalam lambung terlalu penuh, maka enzim tidak dapat mencerna makanan secara sempurna. Makanan yang tidak tercerna sempurna ini akan masuk ke usus dan menyebabkan fermentasi,

salah cerna, dan menimbulkan gas. Inilah yang menyebabkan wasir, kembung, hingga dapat berakibat muntah dan diare.

Hadits tersebut juga dapat diaplikasikan pada ternak. Ternak memiliki organ pencernaan yang hampir sama dengan manusia. Jika ternak diberikan pakan yang tidak sesuai dengan kemampuan daya cernanya maka akan mengakibatkan dampak buruk pada ternak seperti terhambatnya pertumbuhan ataupun kenaikan berat badan dan menyebabkan penyakit pada ternak itu sendiri. Pakan ternak diberikan sesuai dengan umur serta kemampuan untuk mencerna pakan itu sendiri serta memperhatikan kandungan nutrisi pada pakan itu sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 06 Juni-18 Juli 2016, yang bertempat di Laboratorium Kesehatan Hewan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoklaf, batang pengaduk, cawan petri, erlenmeyer, *hot plate*, inkubator, jarum ose, *Laminar Flow Cabiliti* (LFC), neraca analitik, pipet tetes, pH meter elektrik, rak tabung reaksi, dan tabung reaksi.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah usus segar DOC broiler, aquades, alkohol 70%, medium selektif MRSA (*Man Ragosa Sharpe Agar*), Medium MRSB (*Man Ragosa Sharpe Broth*), HCl 0.1 N, KOH, kapas, plastik sampel dan aluminium foil.

C. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sterilisasi Alat dan Medium

- a. Alat-alat gelas berupa tabung reaksi, cawan petri, gelas kimia, erlenmeyer dan pipet tetes disterilkan dengan sterilisasi panas basah yaitu dengan menggunakan autoklaf. Sterilisasi ini dilakukan selama 15 menit dalam temperatur 121⁰C.
- b. Jarum ose disterilkan dengan sterilisasi panas kering dalam nyala api bunsen sampai merah membara.

2. Pengambilan Sampel

Sampel diperoleh dari peternakan DOC Broiler. DOC Broiler lalu dipotong bagian usus kemudian usus tersebut dimasukkan ke dalam plastik sampel ditambahkan aquades dan dilakukan pengisolasian.

3. Pembuatan Medium

Pembuatan medium:

- a. Medium MRSA (*Man Ragosa Sharpe Agar*)

Sebanyak 6,8 g medium MRSA dilarutkan ke dalam 100 mL aquades. Kemudian dipanaskan sambil diaduk sampai homogen. Kemudian mulut masing-masing erlenmeyer ditutup dengan menggunakan aluminium foil lalu disterilkan dalam autoklaf dengan suhu 121 ⁰C selama 15 menit. Selanjutnya larutan dibagi ke dalam 4 buah cawan petri masing-masing sebanyak 25 mL.


b. Medium MRSB (*Man Ragosa Sharpe Broth*)

Sebanyak 13 g medium MRSB dilarutkan ke dalam 250 mL aquades. Kemudian dipanaskan sambil diaduk sampai homogen. Lalu mulut masing-masing erlenmeyer ditutup dengan menggunakan aluminium foil lalu disterilkan dalam autoklaf dengan suhu 121 °C selama 15 menit. Selanjutnya larutan dibagi ke dalam 12 buah tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 mL.

4. Uji Probiotik

a. Uji Ketahanan Terhadap Keasaman Lambung (pH)

Uji ketahanan terhadap asam dilakukan dengan menggunakan medium MRSB yang ditambahkan dengan HCl 0,1 N untuk mendapatkan pH 1-5. Sedangkan untuk mendapatkan pH 6 ditambahkan dengan KOH. Untuk mendapatkan pH yang diinginkan menggunakan pH meter elektrik. Sebanyak 1 ose (ose bulat) masing-masing isolat bakteri yang diambil dari stok kultur kemudian diinokulasikan pada medium MRSB-HCl dan MRSB-KOH yang terdapat di dalam tabung reaksi. Diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C.



Gambar 1. Skema Kerja Uji Ketahanan terhadap asam lambung (pH)

D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisa dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif antara lain dengan melihat pertumbuhan bakteri asam laktat yang meliputi uji ketahanan terhadap keasaman lambung (pH) dimana seluruh data diperoleh dari hasil pengamatan (positif atau negatif) yang ditunjukkan pada beberapa indikator uji yang telah dilakukan. Pengumpulan data pengamatan secara langsung dan dengan cara dokumentasi untuk dijadikan bukti hasil penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil uji terhadap kadar keasaman (pH), terlihat bahwa tiga dari enam media mampu tumbuh pada medium yang memiliki derajat keasaman (pH) 1-6. Medium yang memiliki derajat keasaman (pH) 1, 2 dan 3 tidak menunjukkan adanya pertumbuhan sedangkan untuk derajat keasaman (pH) 4, 5 dan 6 menunjukkan adanya pertumbuhan terlihat dari koloni bakteri yang tumbuh pada dasar tabung reaksi dan kondisi media yang keruh. Hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut.




(1)



(2)

Gambar 2. Hasil Pengamatan Uji terhadap Keasaman (pH)
(1)MRSB dengan pH 1-5
(2)MRSB dengan pH 6



(3)

(4)

Gambar 2. Hasil Pengamatan Uji terhadap Keasaman (pH)
(3) MRSB dengan pH 5-6 terdapat endapan
(4) MRSB dengan pH 5-6 kondisi keruh



(5)

Gambar 3. Hasil Pengamatan Uji terhadap Keasaman (pH)
(5) MRSB dengan pH 4 terdapat endapan

B. Pembahasan

Kondisi saluran pencernaan erat kaitannya dengan pH yang berbeda-beda. Keasaman lambung merupakan salah satu faktor yang menonjol dalam menentukan kadar pH dalam saluran pencernaan. Secara alami di dalam perut ayam dikeluarkan getah pencernaan seperti asam lambung (HCl) yang membentuk kondisi sekitarnya menjadi asam. Kondisi keasaman lambung berfungsi sebagai pintu gerbang pertama untuk melakukan seleksi mikroba sebelum masuk ke usus.

Pertumbuhan bakteri asam laktat pada saluran pencernaan ayam broiler dikarenakan lingkungan sesuai. Lingkungan yang sesuai untuk hidup bakteri asam laktat salah satunya meliputi potensial hidrogen (pH) (Fardias, 1992). Ketika bakteri probiotik termakan, maka bakteri pertama kali akan menghadapi keasaman lambung. Bakteri asam laktat tidak hanya tumbuh dengan lambat pada pH rendah, tetapi kerusakan akibat asam dan hilangnya viabilitas juga dapat terjadi pada sel bakteri yang terpapar pada pH rendah.

BAL yang diperoleh dari hasil isolasi adalah *Pediococcus* sp. *Pediococcus* adalah genus bakteri yang termasuk bakteri asam laktat (BAL) dengan ciri non-motil (tidak bergerak) dan memiliki bentuk sferis. Sel bakteri ini terbagi ke dalam dua bidang sehingga membentuk pasangan, tetrad (terususun empat), atau gumpalan sel sferis yang lebih besar. Bakteri ini adalah gram positif berbentuk bulat, khususnya terdapat berpasangan. Menurut Victoria (2008), menyatakan bahwa suhu optimum untuk pertumbuhan *Pediococcus* adalah 25-30 °C dan pH optimum \pm 6.

Uji probiotik terhadap ketahanan asam (pH) dilakukan dengan menggunakan medium MRSB yang ditambah HCl (bersifat asam) 0,1 N untuk mendapatkan pH 1-5 dan medium MRSB yang ditambah KOH (bersifat basa) untuk mendapatkan pH 6. Berdasarkan hasil pengujian isolat bakteri mampu tumbuh pada pH 5 dan 6 setelah inkubasi selama 1x24 jam serta tumbuh pada pH 4 setelah inkubasi selama 3x24 jam dengan menunjukkan adanya endapan dan medium yang keruh. Hal ini sesuai dengan pendapat Hardiningsih et al (2008) yang menyatakan bahwa Bakteri Asam Laktat dapat hidup pada kisaran pH 2-6,5. Sedangkan pH 1, 2 dan 3 tidak menunjukkan adanya pertumbuhan yang ditandai dengan medium yang jernih dan tidak adanya endapan.

Faktor yang mempengaruhi bakteri tidak tumbuh pada pH 1-3 adalah perbedaan habitat asal starter. Saluran pencernaan DOC Broiler yang diisolasi adalah bagian usus. DOC Broiler yang diisolasi tidak mendapatkan perlakuan pemberian pakan maupun antibiotik. DOC Broiler yang digunakan baru berumur satu hari. Menurut pendapat Sun (2004) yang menyatakan bahwa nilai pH pada saluran pencernaan unggas pada setiap bagian adalah tembolok (4,5), proventrikulus (4,4), gizzard (2,6), duodenum (5,7-6), jejunum (5,8), ileum (6,3), kolon (6,3), ceca (5,7), dan empedu (5,9). Menurut Osmanagaoglu dkk. (2010) melaporkan bahwa *Pediococcus*, yang merupakan salah satu bakteri asam laktat berbentuk *coccus*, tidak resisten terhadap pH 2. Tiap galur memiliki ketahanan yang berbeda terhadap asam atau pH rendah (Surono, 2004). Menurut Victoria (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan *Pediococcus* pH optimum \pm 6.

Bakteri asam laktat mempunyai toleransi pH dengan rentang yang luas. Bakteri asam laktat juga mampu mempertahankan pH sitoplasma lebih alkali dari pada pH ekstraseluler (Hutkins dan Nannen, 1993). Menurut Pratiwi (2008) pH menurunkan indikasi konsentrasi ion hidrogen. Peningkatan dan penurunan konsentrasi ion hidrogen dapat menyebabkan ionisasi gugus-gugus dalam protein, amino dan karboksilat. Hal ini dapat menyebabkan denaturasi yang dapat mengganggu pertumbuhan sel.

Mikroorganisme asidofil tumbuh pada kisaran pH optimal 1,0 – 5,5. Mikroorganisme neutrofil tumbuh pada kisaran pH optimal 5,5 – 8,0. Mikroorganisme alkalofil tumbuh pada kisaran pH optimal 8,5 – 11,5, sedangkan mikroorganisme alkalofil eksterm tumbuh pada kisaran pH optimal ≥ 10 . Maka dapat kita ketahui bahwa bakteri yang diisolasi termasuk ke dalam mikroorganisme asidofil dan neutrofil. Hal ini dapat kita lihat pada data bahwa bakteri dapat bertahan hidup pada pH 4 – 6.

Menurut Surono (2004), untuk pertumbuhannya bakteri juga memerlukan pH tertentu. Namun pada umumnya bakteri memiliki jarak pH yang sempit yaitu sekitar 6,5 – 7,5 atau pada pH netral. Beberapa bakteri ada yang dapat bertahan hidup dibawah pH 4, tetapi ada pula bakteri yang dapat hidup dan tubuh pada pH alkalis. Oleh karena bakteri termasuk makhluk hidup dimana dalam tubuhnya juga mengalami proses biokimiawi, misalnya proses metabolisme, memerlukan peranan enzim, maka masing-masing bakteri juga memiliki pH optimal untuk pertumbuhannya.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan turunnya nilai pH pada saluran pencernaan adalah fermentasi pakan. Misalnya pada daerah tembolok, pakan yang dikonsumsi oleh unggas berada beberapa saat di organ tersebut, sebagian dari pakan ini akan mengalami fermentasi oleh *Lactobacillus* tipe *Lactobacillus salivarius* dan menghasilkan asam laktat yang menyebabkan pH tembolok menjadi turun (Sarra et al, 1985). Sesuai dengan pendapat Surono (2004) yang menyatakan bahwa lama transit bakteri pada saluran pencernaan yaitu tembolok 50 menit, proventriculus dan gizzard 90 menit, duodenum 5-8 menit, jejunum 20-30 menit, ileum 50-70 menit dan rektum 25 menit.

Dengan demikian isolat bakteri asam laktat yang akan digunakan sebagai agensi probiotik harus dapat bertahan pada kondisi pH yang bervariasi saat melewati saluran pencernaan ayam. Menurut Ricke (2003) yang menyatakan bahwa telah dikenal lebih dari 60 tahun bahwa bakteri memiliki kemampuan metabolik untuk merespon kondisi lingkungan dengan pH rendah. Berdasarkan hal tersebut isolat bakteri asam laktat dapat dimanfaatkan sebagai probiotik.

pH medium biakan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, untuk pertumbuhan bakteri juga terdapat rentang pH dan pH optimal. Meskipun medium pada awalnya dikondisikan dengan pH yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, tetapi secara bertahap pertumbuhan akan dibatasi oleh produk metabolit yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut.

Asam lambung (HCL) termasuk asam kuat yang terdisosiasi dalam medium dan mampu menurunkan pH eksternal tetapi tidak dapat menembus membrane sel. Adaptasi struktur membran luar merupakan mekanisme resistensi

bakteri terhadap asam yang tergolong asam kuat. Adaptasi dapat berupa perubahan komposisi asam lemak dan fosfolipid membran.

Menurut Wiyana (2011), ketahanan terhadap asam lambung merupakan syarat penting suatu Bakteri Asam Laktat (BAL) untuk dapat menjadi probiotik. Kebanyakan mikroorganisme dapat tumbuh pada kisaran pH 6,0-8,0 dan tidak dapat bertahan hidup pada pH dibawah 2 dan diatas 10. Bakteri Asam Laktat merupakan mikroorganisme fermentatif yang dapat hidup pada kisaran pH yang luas.

Bakteri asam laktat mampu mempertahankan pH intraseluler lebih alkali daripada pH ekstraseluler, tetapi penurunan pH intraseluler tetap berlangsung seiring dengan menurunnya pH ekstraseluler yang mendukung toleransinya terhadap asam (Siegumfeldt *et al.*, 2000). Bakteri dapat menurunkan pH intraseluler sekitar menjadi netral pada saat pH ekstraseluler turun, tetapi akan menggunakan banyak energi karena perbedaan gradien proton yang besar dan mengakibatkan terjadinya akumulasi anion asam organik dalam sitosol yang beracun bagi sel (Russel, 1992).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bakteri asam laktat dapat tumbuh pada derajat keasaman (pH) 4, 5 dan 6 pada medium MRSB-HCl dan MRSB-KOH yang ditandai dengan medium menjadi keruh dan terdapat endapan. Untuk pH 1, 2 dan 3 tidak terdapat pertumbuhan ditandai dengan medium tidak mengalami perubahan (jernih).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Bakteri Asam Laktat yang diperoleh dari usus DOC broiler tersebut berpotensi sebagai probiotik yang dapat dimanfaatkan pada pakan ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. dan Raudhati, E. 2006. Produktifitas dan aktifitas mikroba saluran pencernaan ayam broiler yang diberi probiotik. Penelitian DIK-S. fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
- Abudabos, A. M., A. H. Alyemni, and M. B. A. Al Marshad. 2013. *Bacillus subtilis PB6 based- probiotic (CloSTATM) improves intestinal morphological and microbiological status of broiler chickens under clostridium perfringens challenge*. International Journal of Agriculture and Biology. 15: 978-982.
- Adams, M.R. *Food Microbiology*. University of Surrey. Guildford. New York. 2000.
- Andajani, R. 1997. *Peran Probiotik Dalam Meningkatkan Produksi Unggas*. *Poultry Indonesia* No : 26/April 1997 Hal ;19-20.
- Alcamo, I. E. 2001. *Fundamentals of Microbiology*. Jones and Bartlett. Boston.
- Barrow, P.A. 1992. Probiotics for Chickens. *In: Probiotics the Scientific Basis*. R. Fuller (Ed). Chapman & Hall, London. pp. 225-259.
- Carr FJ, Chill D, Maida, N. 2002. The lactic acid bacteria: a literature survey. *Critical Reviews in Microb* 8:281-370.
- Desai, Ankur. 2008. Strain Identification, Viability and Probiotics Properties of *Lactobacillus casei*. School of Biomedical and Health Science Victoria University. Werribee Campus Victoria Australia.
- FAO/WHO. 2001. Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. Amerian Córdoba Park Hotel, Córdoba, Argentina.
- Fardiaz, S. 1989. *Mikrobiologi Pangan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bogor.
- Fardiaz, S., 1992. *Mikrobiologi Pangan I*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hardiningsih, R., Napitupulu, R.N.R dan Yulinery, T., 2006. Isolasi dan uji resistensi beberapa isolat lactobacillus pada pH rendah. *Biodiversitas*.
- Irianto, Koes. 2007. *Mikrobiologi (Menguak Dunia Mikroorganisme) Jilid 1*. Bandung: CV. Yrama Widya.

- Jin, L. Z., Y. W. HO, M. A. Ali, N. Abdullah, and S. Jalaludin. 1997. Probiotic in poultry: modes of action. *World's poultry science journal*. Vol 53, December 1997.
- Khan, M. S. dan Wiyana, A., 2011, Karakteristik Ketahanan Bakteri Asam Laktat *Indigeneous* Kefir Sebagai Kandidat Bakteri Probiotik pada Kondisi Saluran Pencernaan *In Vitro* , Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Khedid. K dan Faïd, M. 2006. Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from the One Humped Camel Milk Produced in Morocco. *Microbiology Reseach*. Vol. 164: 81-91.
- Kompiang, I. P. 2002. Pengaruh ragi: *Saccharomyces cerevisiae* dan ragi laut sebagai pakan imbuhan probiotik terhadap kinerja unggas. *JITV* 7: 18-21.
- Saxelin, M. 1997. Lactobacillus GG-a Human Probiotic Strain with Through Clinical Documentation. *Food Rev Int*. Vol. 13: 293-313/
- M. Victoria Moreno-Arribas, Carmen Polo, María Carmen Polo (2008). *Wine chemistry and biochemistry*. Springer.
- Mabelebele, M., Alabi, O.J., Ng'ambi, J.W., Norris, D and Ginindza, M.M., 2013. Comparison of gastrointestinal tracts and pH value of digestive organs of ross 308 broiler and indigenous Venda chickens fed the same diet. *Asian journal of animal and veterinary advance* pp 1-6.
- Mac Farland, G.T. dan J.H. Cummings, 1998. <http://ighawaii.com/naturally/newsletter/biotic.html>. Probiotic and Prebiotic. Department of Molecular and Cellular Pathology, University of Dundee, Ninewells Hospital Medical School, Wyszong Health Letter. Diakses pada tanggal 14 Januari 2016.
- Martin, R. G. 1995. Using yeast culture and lactic acid bacteria in broiler breeder diets. In: *Biotechnology in the feed industry*. TP. LYONS & KA JACQUES (Eds). Proc. Alltech's Eleventh Annual Symp. pp. 371-378.
- Mujiasih. 2001. Performan ayam broiler yang diberi antibiotik zincbacitracin, probiotik *Bacillus sp.* dan berbagai level *Saccharomyces cerevisiae* dalam ransumnya (Skripsi). Fakultas peternakan-Institut Pertanian Bogor.
- Mountzouris K.C. P. Tsitrsikos, I. Palamidi, A. Arvaniti, M. Mohnl, G. Schatzmayr and K. Fegeros. 2010. Effect of probiotic inclusion levels in broiler nutrition on growth performance, nutrient digestibility, plasma immunoglobulins, and cecal microflora composition. *Poult. Sci.* 89:58-67.
- Poultry. 2015. Ayam Probiotik. <http://www.poultryindonesia.com/news/riset-artikel-referensi/ayam-probiotik/>. Diakses 14 Januari 2016.

- Prado, F. C., J. L. Parada, A. Pandey, and C. R. Soccol. 2008. Trends in non-dairy probiotic beverages. *Food Res. Int.* 41: 111-123.
- Rahayu, E.S. dan Margino. *Bakteri Asam Laktat: Isolasi dan Identifikasi* . Materi Workshop. *Seminar Makalah Tugas Akhir*. PAU Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 1997.
- Ritonga, H., 1992. Beberapa Cara Menghilangkan Mikroorganisme Patogen. *Majalah Ayam dan Telur* No. 73 Maret 1992. Hal : 24-26.
- Russel, J. B., 1992, Another Explanation for The Toxicity of Fermentation Acid at Low pH : Anion Accumulation versus Uncoupling, *J. Appl. Bacteriol* 73 : 363 – 370.
- Sari, R. 2012. Karakterisasi Bakteri Probiotik yang Berasal dari Saluran Pencernaan Ayam Pedaging. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Saxelin, M. 1997. Lactobacillus GG-a Human Probiotic Strain with Through Clinical Documentation. *Food Rev Int.* Vol. 13: 293-313
- Seveline. 2005. Pengembangan Produk Probiotik dari Isolat Klinis Bakteri Asam Laktat dengan Menggunakan Teknik Pengeringan Semprot dan Pengeringan beku. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sumianti, D., 2008, Bakteri Asam Laktat, <http://bioindustri.blogspot.com/2008/05/bakteri-asam-laktat-yang-diisolasi.html>, (Diakses tanggal 14 Januari 2016).
- Sjofjan, O. 2003. Kajian Probiotik AB (*Aspergillus* sp dan *Bacillus* sp) sebagai Imbuhan Ransum dan Implikasi Efeknya terhadap Mikroflora Usus serta Penampilan Produksi Ayam Petelur. Disertasi Program Pasca Sarjana. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Soeharsono., 2010. Probiotik Basis Ilmiah. Widya Padjadjaran. Bandung.
- Surono, I.S. 2004. Probiotik Susu Fermentasi dan Kesehatan. Tri Cipta Karya. Jakarta.
- Sutrisna, R. 2014. Isolat Bakteri Asam Laktat Sebagai Probiotik Dengan Vaksinasi AI Dan ND Dalam Pembentukan Titer Antibodi Dan Bobot Badan Ayam Jantan Tipe Medium. *Lampung (Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* Vol. 14 (2):124-133).


Syahrurachman, A.,1994, Mikrobiologi Kedokteran, Edisi Revisi, Penerbit Bina Rupa Aksara, Jakarta.

Tensiska, 2008, Probiotik dan Prebiotik sebagai Pangan Fungsional, Universitas Padjadjaran. Jatinegara.

Trisna dan Wahud N. 2012. *Identifikasi Molekuler dan Pengaruh Pemberian Probiotik Bakteri Asam Laktat (BAL) Asal Dadih dari Kabupaten Sijunjung Terhadap Kadar Kolestrol Daging pada Itik Pitalah Sumber Daya Genetic Sumatra Barat*. Artikel. Universitas Andalas. Padang.

Wiyana, A. 2011. Karakteristik Ketahanan Bakteri Asam Laktat *Indigenous* Kefir Sebagai Kandidat Bakteri Probiotik Pada Kondisi Saluran Pencernaan *In Vitro*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Yiu H. Hui, George G. Khachatourians (1994). *Food Biotechnology: Microorganisms*. Wiley-Interscience.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN PENELITIAN

1. Alat-alat yang digunakan

a. Autoklaf



b. LFC



c. Inkubator



d. Timbangan digital



e. Hot plate digital



f. Alat-Alat gelas



g. pH meter elektrik



h. Alat gelas (erlenmeyer)



2. Bahan Penelitian

a. Alkohol



b. Aquades




DOC umur 1 hari



MRSA



Hcl



MRSB



3. Kegiatan yang dilakukan

a. Proses pemotongan DOC



b. Proses pembedahan DOC



c. Penetrasi pH



d. Pengukuran pH



e. Pengambilan larutan HCl



f. Medium dengan pH 1-6



g. Sterilisasi



Inokulasi bakteri



4. Hasil Penelitian

a. Uji Keasaman dengan pH 1-6




b. Uji Keasaman pH 5 dan 6 kondisi keruh




- c. Uji Keasaman dengan pH 5 dan 6 terdapat endapan



- d. Uji Keasaman dengan pH 4 terdapat endapan



- e. Uji Keasaman dengan membandingkan media sebelum dan sesudah inkubasi



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Irma Rukmana Kadir. Lahir di Benteng Selayar pada tanggal 08 September 1994. Penulis akrab disapa “Imma” adalah anak kedua dari pasangan suami istri Abdul Kadir dan Jaena. Penulis memulai pendidikan awal di SD Inpres Benteng II 2000 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Ke SMP N 1 Benteng tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Ke SMAN 1 Benteng pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, melalui jalur Ujian Masuk Bersama (UMB) dan diterima pada Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Ilmu Peternakan. Selama berkuliah penulis aktif menjadi anggota organisasi HMJ Ilmu Peternakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R