

**VALIDASI METODE ANALISIS FLAVONOID DARI EKSTRAK ETANOL
KASUMBA TURATE (*Carthamus tinctorius L.*) SECARA
SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh
HERIATI ALWI
M A K A S S A R

NIM.70100113025

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**VALIDASI METODE ANALISIS FLAVONOID DARI EKSTRAK ETANOL
KASUMBA TURATE (*Carthamus tinctorius L.*) SECARA
SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

HERIATI ALWI
NIM.70100113025

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heriati Alwi
NIM : 70100113025
Tempat Tanggal Lahir : Mallenreng, 30 Maret 1994
Jurusan : Farmasi
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Validasi Metode Analisis Flavonoid dari Ekstrak Etanol
Kesumba Turate (Carthamus tinctorius L.) secara
Spektrofotometri Uv-Vis

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun



HERIATI ALWI
NIM. 70100113025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Validasi Metode Analisis Flavonoid dari Ekstrak Etanol Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius L.*) secara Spektrofotometri Uv-Vis” yang disusun oleh **Heriati Alwi, NIM: 70100113025**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 14 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **21 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 14 Agustus 2017 M
21 Dzulqa’idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt(.....)	(.....)
Penguji I	: Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt(.....)	(.....)
Penguji II	: Drs. H. Supardin, M.Hi.	(.....)

Dekan



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad saw, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan kali ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Alwi dan Ibunda Herlina yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberi motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau.

2. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas do'a, kasih sayang, bantuan dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

4. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

5. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

6. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

7. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

8. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

9. Ibu Haeria S.Si., M.Si selaku pembimbing pertama terima kasih atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.

10. Bapak Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua terima kasih atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.

11. Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

12. Bapak Dr. H. Supardin, M.HI selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

13. Dosen-dosen Jurusan Farmasi dan seluruh staf baik yang berada di luar maupun dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

14. Sahabatku tercinta (Lisa, Diah, Ana, Rifa, Rahma, Dian, Ayu, Ari, Aan dan Fahri) kakak terbaik Syamsul Bahrain S.Farm.,Apt yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta bantuan sejak rencana penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.

15. Teman-teman Farbion angkatan 2013 yang sangat luar biasa, terima kasih untuk semua kebersamaan selama ini.

16. Keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberi dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Juli 2017

Penyusun

HERIATI ALWI
NIM: 70100113025

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian.....	5
1. Definisi operasional.....	5
2. Ruang lingkup penelitian	6
D. Kajian pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Uraian Tanaman	9
B. Ekstraksi.....	12
C. Uraian Flavonoid.....	15
D. Validasi Metode Analisis	19
E. Spektrofotometri UV-Vis.....	31
F. Tinjauan Islam tentang Penelitian dan Pengembangan Obat	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Lokasi Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Instrumen Penelitian.....	43
E. Metode pengumpulan data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
KEPUSTAKAAN.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kasumba turate.....	11
Gambar 2. Metode Validasi menurut USP.....	20
Gambar 3. Metode Validasi menurut ICH.....	20
Gambar 4. Skema Kerja Spektrofotometri UV-Vis.....	36




DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. SKEMA PENGUJIAN.....	62
Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Kasumba Turate	62
Lampiran 2. Pembuatan Larutan Sampel	62
Lampiran 3. Pembuatan Larutan kuersetin	62
Lampiran 4. Penentuan Panjang gelombang Maksimum.....	63
Lampiran 5. Pembuatan Kurva Baku	63
Lampiran 6. Pengujian Kadar Flavonoid	64
Lampiran 7. Skema Prosedur Validasi.....	65
1.Pengujian Presisi	65
2.Pengujian Akurasi	66
3.Pengujian Linieritas, Limit deteksi dan Limit Kuantitas	68
Lampiran 8. Pembuatan Larutan	69
LAMPIRAN II. PERHITUNGAN KURVA BAKU	71
LAMPIRAN III. PERHITUNGAN PRESISI.....	72
LAMPIRAN IV. PERHITUNGAN AKURASI	74
LAMPIRAN V. PERHITUNGAN LOD & LOQ.....	76
LAMPIRAN VI. PERHITUNGAN PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Konsentrasi Analit dengan akurasi	21
Tabel 2. Perbandingan Konsentrasi Analit dengan akurasi	23
Tabel 3. Hasil Uji Presisi	50
Tabel 4. Hasil Uji Akurasi	51
Tabel 5. Hasil Uji Linieritas.....	52
Tabel 6. Hasil Uji Batas deteksi dan Batas Kuantitas.....	53



ABSTRAK

Nama : Heriati Alwi
Nim : 70100113025
Jurusan : Farmasi
Judul : Validasi Metode Analisis Flavonoid dari Ekstrak Etanol Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L.) secara Spektrofotometri UV-Vis

Telah dilakukan penelitian mengenai validasi metode analisis flavonoid dari ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) secara spektrofotometri Uv-Vis. Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penentuan kadar flavonoid dari ekstrak etanol kasumba turate memenuhi kriteria validasi metode analisis yaitu batas deteksi, batas kuantitas, linearitas, presisi, dan akurasi secara spektrofotometri uv-vis. Dengan pengukuran panjang gelombang maksimum 442 nm. Hasil penelitian menunjukkan nilai parameter validasi untuk metode spektrofotometri terhadap ekstrak etanol kasumba turate adalah % perolehan kembali sebesar 100,941%; nilai koefisien variasi yaitu 0,186% koefisien korelasi (r) 0.998, koefisien fungsi regresi (V_{x0}) yaitu 4,0625 %; batas deteksi sebesar 0,01234 ppm, dan batas kuantitas sebesar 0,04128 ppm. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, metode spektrofotometri UV untuk ekstrak etanol bunga kasumba turate telah memenuhi standar validasi dan dinyatakan valid.

ABSTRACT

Name : Heriati Alwi
Reg. Number : 70100113025
Department : Farmasi
Title of thesis : Validation Methods of Flavonoid Analysis from Ethanol Extract
Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L.) by Spectrophotometry
UV-Vis

The research which have been made the validation method of flavonoid analysis from ethanol extract kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) by spectrophotometry Uv-Vis. Validation of the method of analysis is an assessment of certain parameters. The aim of this research is how to know the method of determining the level of flavonoid from ethanol extract kasumba turate met the validation method of analytical criteria that is limit of detection, limit of quantity, linearity, precision, and accuration by spectrophotometric uv-vis. With the measurement of wave length of 442 nm. The results of this reaserch shows the value of parameter validation for spectrophotometric method on ethanol extract of kasumba turate. The result of % recovery of 100,941%; Value of coefficient of variation was 0.186% coefficient of correlation (r) 0.998, regression function coefficient (Vx0) was 4.0625%; The limit of detection 0.01234 ppm, and the limt of quantity was 0.04128 ppm. Based on the result of this research, spectrophotometric UV-Vis method for ethanol extract kasumba has met validation standard and stated valid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keajaiban dunia dalam keanekaragaman hayati bahkan dalam sumber daya hutan tropika, luas kawasannya menempati urutan ketiga sesudah Brasil dan Zaine yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia (Supriadi, 2001).

Sekitar 30.000 jenis tumbuhan berada dan hidup di Indonesia, banyak diantaranya mengandung obat. Tumbuhan obat dan obat tradisional merupakan aset nasional yang perlu terus digali, diteliti, dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya. Kecenderungan masyarakat dunia untuk “*Back to Nature*” dengan indikasi utama peningkatan kebutuhan produk-produk konsumsi untuk kesehatan dari bahan alam, merupakan peluang besar bagi pengembangan tanaman obat dan obat tradisional Indonesia (Hakim, 2002)

Tumbuhan seperti kasumba turate dan tumbuhan lainnya mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, steroid, terpenoid, saponin dan lain-lain. Senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan merupakan zat bioaktif yang berkaitan dengan kandungan kimia dalam tumbuhan, sehingga sebagian tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan obat. Tanpa adanya suatu senyawa bioaktif dalam tumbuhan secara umum tumbuhan tersebut tidak dapat digunakan sebagai obat (Adikara, 2013).

Kandungan dari *Carthamus tinctorius* L. ialah flavonoid yang terdiri dari chalcones, carthamin, carthamone, dan lignin (Cai, Luo, Sun, Corke, 2003). Analisis kimia dari ekstrak bunga kasumba turate mengungkapkan konstituen utama ialah carthamin, carthamone, neo-chartamin, nona-cosane, zat warna

kuning saflower, safflomin A, dipalmitin, adenosid, beta-sitosterol, dan polisakarida (Wijayakusuma, 2008).

Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya (Harmita, 2004). Dengan menggunakan sampel yang telah diketahui (atau setidaknya telah dihitung sebelumnya) nilai parameter suatu produk validasi dapat memberikan informasi yang berguna mengenai akurasi, presisi, linearitas, dan karakteristik lainnya dari kinerja suatu metode yang sehari-hari digunakan pada sampel yang tidak diketahui. Sebagai tambahan, Validasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber variabilitas yang tidak diinginkan. (Torbeck L.D, 2007).

Validasi ulang perlu dilakukan meskipun validasi sebelumnya menghasilkan data yang sesuai dengan kriteria penerimaan, karena metode yang dinyatakan valid pada kondisi tertentu belum tentu valid pada kondisi lain karena peralatan dan pereaksi yang digunakan, analisis yang mengerjakan dan sebagainya. Parameter validasi yang ditetapkan pada penelitian ini antara lain: *Limit of detection (LOD)*, *Limit of Quantitation (LOQ)*, linearitas, Presisi, dan akurasi

Menurut Mulja dan suharman (1995), penetapan kadar dapat dilakukan secara analisis instrumen menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Alasan menggunakan metode spektrofotometri UV karena berdasarkan penelitian Fitriadi (2014) kasumba turate dalam sediaan cair dapat ditetapkan kadarnya secara spektrofotometri ultraviolet. Selain itu menurut Hanne (2002) menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis terdapat banyak keuntungan yaitu lebih mudah, cepat dan spesifik untuk analisis zat uji.

Telah dilakukan penelitian tentang analisis kadar flavonoid total dalam ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) secara spektrofotometri UV-Vis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa flavonoid total dalam sediaan cair kasumba turate serta untuk memenuhi standarisasi produk sediaan obat herbal. Hasil penelitian menunjukkan kadar flavonoid total sebesar 0,673%. Penggunaan metode tersebut perlu divalidasi untuk membuktikan bahwa metode spektrofotometri UV-Vis ini memenuhi parameter untuk penerapan dengan analisis flavonoid kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.).

Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia diantaranya, tumbuhan dapat membersihkan udara, tumbuhan dapat membuat lingkungan sejuk, tumbuhan juga dapat dikonsumsi baik sebagai bahan makanan maupun sebagai bahan obat. Khasiat yang terdapat dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai pengobatan juga sangat beragam tergantung dari senyawa yang terkandung dalam tumbuhan tersebut. Hal ini sebagaimana disebut dalam Q.S Ali-Imram/3: 190-191, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا وَقَعُوا وَأَعْلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka (Kementerian Agama RI, 2012 : 140-141).

Tiada sia-sia segala sesuatu yang telah diciptakan Allah swt. Di dunia ini dari yang kecil hingga yang besar. Allah menciptakan makhluk hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia, bagi mereka yang

berfikir. Allah sendiri yang akan menjaga segala sesuatu yang telah ia ciptakan agar tetap hidup. Contoh tumbuhan yang baik yang sesuai dengan ayat diatas adalah tumbuhan kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan validasi metode analisis flavonoid dari ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) secara Spektrofotometri Uv-Vis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian berikut:

1. Berapa kadar flavonoid total dalam ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) dengan metode kolorimetri secara Spektrofotometri Uv-Vis?
2. Apakah metode penentuan kadar flavonoid dari ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) memenuhi kriteria validasi metode analisis (*Limit Of Detektion, Limit Of Quantitation, Linearitas, Presisi, Akurasi*) secara Spektrofotometri Uv-Vis?

C. Definisi Operasional dan ruang lingkup penelitian

1. Defisinisi Operasional

- a. Ekstrak etanol adalah bahan yang diperoleh dengan mengektaksi senyawa aktif dari simplisia kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) menggunakan pelarut etanol 70%, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan.
- b. Ekstraksi kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) merupakan hasil ekstrak yang dibuat dengan mengektraksi menggunakan pelarut etanol 70% dengan metode maserasi, lalu pelarutnya diuapkan dan didapat ekstrak kental.

- c. Flavonoid total adalah jumlah kandungan total senyawa flavonoid yang berasal dari kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) dengan metode analisis kuantitatif menggunakan Spektrofotometri Uv-Vis.
- d. Analisis kuantitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan Spektrofotometri UV-VIS untuk mengidentifikasi struktur flavonoid. Flavonoid mengandung sistem aromatis yang terkonjugasi dan dapat menunjukkan pita serapan kuat pada daerah Uv-Vis.
- e. Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya.
- f. Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang digunakan untuk menguji sejumlah cahaya yang diabsorbansi pada setiap panjang gelombang di daerah ultraviolet dan tampak.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah validasi metode analisis flavonoid dari ekstrak etanol kasumba turate dengan metode kolorimetri menggunakan standar kuersetin secara spektrofotometri UV-Vis.

D. Kajian Pustaka

Anita Tri Handayani (2011) dalam jurnal Fakultas Farmasi Universitas Surabaya tentang “Validasi Metode dan Penetapan Kadar Flavonoid Total dalam Ekstraksi Air Daun Sendok (*Plantago major L*) Hasil Ekstraksi dengan Perebusan, Ultrasonik, dan Microwave”. Penetapan kadar flavonoid total dilakukan dengan menggunakan pereaksi $AlCl_3$ secara spektrofotometri UV-Vis dan kadarnya dinyatakan sebagai % Catechin Equivalent (CE). Dari hasil validasi diperoleh LOD dan LOQ masing-masing 0,74 bpj dan 2,47 bpj. r_{hitung} dan V_{x0} ditetapkan untuk menentukan linearitas, masing-masing adalah 0,9987 ($>r_{tabel} =$

0,7540) dan $V_{xo} = 3,31\%$. Akurasi dan presisi ditunjukkan dari nilai % *recovery* dan KV. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode penetapan kadar flavonoid dalam ekstrak air daun sendok telah tervalidasi.

Fitriadi Sutir (2014) dalam jurnal Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin tentang “Analisis Kandungan Senyawa Flavonoid Total dalam Sediaan Cair Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L) secara Spektrofotometri Uv-Vis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa flavonoid total dalam sediaan cair kasumba turate serta untuk memenuhi standarisasi produk sediaan obat herbal. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu analisis kualitatif flavonoid yang dilakukan melalui uji pendahuluan flavonoid pada lempeng kromatografi lapis tipis dan analisis kuantitatif dengan spektrofotometri Uv-Vis. Hasil penelitian menunjukkan kadar flavonoid sediaan cair kasumba turate lebih besar dibandingkan pada infusa bunga kasumba turate. Kadar senyawa flavonoid diperoleh sebesar 0,699% dan kandungan flavonoid infusa bunga kasumba turate diperoleh sebesar 0,673% dihitung sebagai kuersetin.

Laras Andria Wardani (2012) dalam jurnal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia tentang “Validasi metode Analisis dan penentuan kadar vitamin c pada minuman buah kemasan dengan spektrofotometri UV-Vis”. penelitian ini dilakukan untuk analisis vitamin C pada minuman buah kemasan. Parameter metode validasi dalam penelitian ini meliputi uji presisi, uji linearitas, uji selektifitas, batas deteksi, batas kuantifikasi, uji sampel dan uji akurasi. Hasil penelitian didapat panjang gelombang yang terpilih untuk asam askorbat adalah 243 nm untuk 30 s/d 100 ppm dan 265 nm untuk 30 s/d 0 ppm. Hasil analisis data untuk linearitas didapatkan koefisien relasi (r) pada 265 nm yaitu 0,997% dan pada 243 nm yaitu 0,998%. $LOD = 0,607$ ppm dan $LOQ = 2,024$ ppm. Akurasi dari metode ini ditentukan berdasarkan hasil perolehan

kembali dengan metode spike standar sedangkan presisi dihitung berdasarkan simpangan baku relatif.

E. Tinjauan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kadar flavonoid total dalam ekstrak etanol kasumba turate dengan metode kolorimetri secara Spektrofotometri Uv-Vis.
- b. Untuk mengetahui metode penentuan kadar flavonoid dari ekstrak etanol kasumba turate memenuhi kriteria validasi metode analisis (*Limit Of Detektion*, *Limit Of Quantitation*, Linearitas, Presisi, Akurasi) secara spektrofotometri uv-vis.

2. Manfaat penelitian

- a. Sumber informasi kepada peneliti tentang validasi metode analisis dari ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*).
- b. Sebagai sumber data ilmiah atau rujukan bagi peneliti lanjutan, penelitian lainnya dan mahasiswa tentang kadar flavonoid total dalam ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) secara spektrofotometri Uv-vis.
- c. Sebagai sumber data ilmiah bagi peneliti lanjutan, penelitian lainnya dan mahasiswa tentang metode penentuan kadar flavonoid dari ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) memenuhi kriteria validasi secara spektrofotometri uv-vis.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Uraian Tanaman*

1. **Klasifikasi** (Tjitrosoepomo, 2010: 99)

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Class	: Dicotyledonae
Ordo	: Asterales
Famili	: Asteraceae
Genus	: <i>Carthamus</i>
Spesies	: <i>Carthamus tinctorius</i> L.


2. **Nama Daerah**

Kasumba Turate (Makassar), Kasumba Ugi' (Bugis), Kaise' (Enrekang), Kesumba (Melayu), Kembang Pulu (Jawa), Kesombha (Madura), Kusum' (India, Pakistan), kusumbha' (Chavan 1961), honghua'/ bunga merah (China), Kasumba (secara umum), kembang pulu (Jawa) (Wijayakusuma, 2008: 45)

3. **Morfologi**

Tegak lurus bercabang banyak, tanaman menahun, tingginya 30-180 cm. Sistem akar terbentuk dengan baik, berwarna coklat kehijauan, akar tebal dan gemuk, menusuk sampai 3 m kedalam tanah, cabang sampingnya tipis mendatar, sebagian besar terdapat diatas 30 cm. Tangkai berbentuk selinder, padat dengan intisari lunak, berkayu didekat pangkal. Daun tersusun secara spiral dengan ukuran 4-20 cm x 1-5 cm. Tepi daun berduri-bergerigi, berwarna hijau gelap mengkilap dan berbentuk herba ketika masih muda, berubah menjadi keras dan kaku setelah tua. Bagian kepala terletak di ujung berbentuk jambangan besar,

panjang sekitar 4 cm dan diameter 2,5-4 cm, hanya mengandung bunga-bunga tunggal (florest). Memiliki banyak kelopak involucral, tersusun spiral, bagian luar membujur dan menyempit diatas bagian dasar, 3-7 cm x 0,5-1,6 cm. Bagian atas seperti daun dan spinescent, tegak atau menyebar, tidak terkatup, dengan rambut panjang pada tepi bawah, berwarna hijau lebih muda daripada daun, bagian bawah terkatup, berwarna putih kehijauan, berambut panjang pada bagian luar, khususnya pada tepi, sedangkan pada bagian dalam glabrous; disekitar bagian tengah kepala, kontriksinya menjadi kurang jelas dan bagian yang seperti daun menjadi tidak nampak; kelopak yang paling dalam berbentuk lanset, 2-2,5 cm x 1-4 mm, ujung spinescent, ciliate. Dasar bunganya rata sampai berbentuk kerucut, banyak, tegak, bebulu putih dengan panjang 1-2 cm dan terdapat 20-80 bunga tunggal (Florest) berkelamin ganda, tubular, aktinomorf, panjangnya sekitar 4 cm glabrous, kebanyakan berwarna jingga kemerahan yang menjadi merah gelap saat mekar, kadang-kadang kuning; mahkotanya tersusun oleh 5 lobus, panjang tubular 18-22 mm, lobus menyebar, sedikit oblongata sampai linier, 7 mm x 1 mm; benang sari 5, epipetalous, tertanam pada bagian mulut, filamen 1-2 mm, anthers 5 mm, berkumpul, membentuk kolom; ovarium berbentuk elips, panjangnya 3,5-4,5 mm, satu sel, satu ovulet, bearing cakram pada bagian atas; penghalang tipis, panjang 28-30 mm, glabrous, mendesak mulut kolom serbuk sari, stigma panjangnya 5 mm, bifidus, kuning, dengan rambut pendek. (Vosen, 2001: 51-55)



Sumber: *Safflowerbooks* chapter 6. (Vrijendra Singh and N.Nimbkar, 2006: 171)

Gambar 1. Kasumba Turate (*Catharanthus tinctorius* L.) : 1. Tanaman utuh; 2. Cabang tanaman dengan bunga; 3. Kuncup bunga; 4. Bunga lengkap; 5. Bagian apikal dari floret yang membuka; 6. Ovarium dengan pappus; 7. Achene dengan pappus.

4. Kandungan kimia

Safflower (kasumba) mengandung 2 kelompok besar pigmen yang larut dalam air, yaitu carthamidin kuning dan dye carthamin, yang orange-merah dan larut dalam larutan alkali. Bunganya mempunyai 0,3 - 0,6% carthamin, flavonoids, glikosida, sterol dan derivat serotonin telah diidentifikasi dari bunga dan biji.

Safflower atau kasumba turate memiliki kandungan kimia seperti carthamin, arthamone, neo-carthamin, nanocosane, zat warna kuning safflower, saflomin A, dipalmitin, adenosid, beta-sitosterol, polisakarida (Wijayakusuma, 2008: 45-46).

5. Kegunaan

Bunga kasumba turate atau safflower dikenal sebagai bahan tambahan kosmetik dan belum digunakan secara luas dalam pengobatan di Cina, bunganya digunakan untuk pengobatan pada penyakit seperti penyumbatan pembuluh darah diotak, sterilitas pada laki-laki, rematik dan bronkhitis, dan sebagai teh tonik untuk memperkuat sirkulasi darah dan hati. Pengobatan dengan safflower juga

menunjukkan efek yang bermanfaat pada sakit dan pembengkakan karena trauma. Kasumba turate juga biasanya digunakan oleh masyarakat di daerah Sulawesi Selatan sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit campak (morbili) (Vosen, 2001: 52).

Kegunaan kasumba turate dapat mengatasi kanker serviks (kanker rahim), esofagus, pankreas, dan leukimia. Selain itu, khasiat melancarkan haid, sakit waktu haid, sakit perut setelah melahirkan, kejang jantung, bengkak, anemia, dan neurodermatitis (Wijayakusuma, 2008: 46).

Kasumba turate juga biasanya digunakan oleh masyarakat di daerah Sulawesi Selatan sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit campak (morbili) serta kerap kali digunakan jika terjadi alergi.

B. Ekstraksi

1. Definisi ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan kedalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama (Mukhriani, 2014: 12)

Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan (Dirjen POM, 2000)

Umumnya, zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah

pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi ke luar sel, dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi suatu keseimbangan antara konsentrasi zat aktif didalam sel dan diluar sel (Gennaro, 1990: 1047)

2. Tujuan ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. (Dirjen POM, 2000)

3. Metode ekstraksi

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan secara dingin yaitu maserasi dan perkolasi, dan secara panas yaitu refluks, soxhlet, digesti, infus, dan dekok (Dirjen POM, 2000)

Maserasi

Istilah *maceration* berasal dari bahasa latin *macerare*, yang artinya “merendam”. Merupakan proses paling tepat dimana obat (sampel) yang telah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut (Ansel, 2005: 607).

Ekstraksi merupakan suatu cara untuk memisahkan campuran beberapa zat menjadi komponen-komponen yang terpisah. Ekstraksi juga dapat diartikan sebagai proses penarikan komponen atau zat aktif menggunakan pelarut tertentu. Proses ekstraksi bertujuan mendapatkan bagian-bagian tertentu dari bahan yang mengandung komponen bioaktif (Sudirman, 2011: 15).

Secara umum ekstrak senyawa metabolit sekunder dari seluruh bagian tumbuhan seperti bunga, buah, daun, kulit batang dan akar dengan proses maserasi menggunakan pelarut organik polar.

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dalam pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan. Penekanan utama pada maserasi adalah tersedianya waktu kontak yang cukup antara pelarut dan jaringan yang akan diekstraksi (Guether, 1987).

Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi bahan alam karena dalam perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektifitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan bahan alam dalam pelarut tersebut (Lenny, 2006).

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi adalah:

a) Ukuran Bahan

Bahan yang akan diekstrak sebaiknya memiliki luas permukaan yang besar untuk mempermudah kontak antara bahan dengan pelarut sehingga ekstraksi berlangsung dengan baik (Hukmah, 2007). Kehalusan bubuk yang sesuai akan menghasilkan ekstraksi yang sempurna dalam waktu yang singkat (Guether, 1987).

b) Lama dan Suhu Ekstraksi

Lamanya waktu maserasi berbeda-beda tergantung pada sifat atau ciri campuran obat dan menstruum. Lamanya harus cukup supaya dapat memasuki semua rongga dari struktur sampel dan melarutkan semua zat yang mudah larut.

Lamanya maserasi bisa memerlukan waktu beberapa jam atau beberapa hari untuk ekstraksi yang optimum (Ansel, 2005: 612).

Ekstraksi akan berlangsung cepat dilakukan pada suhu yang tinggi, tetapi hal ini dapat mengakibatkan beberapa komponen yang terdapat dalam rempah-rempah akan mengalami kerusakan (Hijaz, 2009). Ekstraksi yang baik dilakukan pada kisaran suhu 20 °C sampai 80 °C tetapi suhu yang digunakan harus di bawah titik didih pelarut yang digunakan. Semakin lama waktu ekstraksi, kesempatan untuk bersentuhan semakin besar sehingga hasil ekstraksi semakin bertambah banyak (Hukmah, 2007).

c) Jenis dan Konsentrasi Pelarut

Menurut (Hukmah, 2007), ada dua pertimbangan dalam memilih jenis pelarut yaitu pelarut harus mempunyai daya larut yang tinggi, pelarut tidak berbahaya dan beracun. Pelarut yang paling aman adalah etanol.

C. Uraian flavonoid

Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu dan biru dan sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan.

Flavonoid merupakan pigmen tumbuhan dengan warna kuning, kuning jeruk, dan merah dapat ditemukan pada buah, sayuran, kacang, biji, batang, bunga, herba, rempah-rempah, serta produk pangan dan obat dari tumbuhan seperti minyak zaitun, teh, cokelat, anggur merah, dan obat herbal. Flavonoid juga dikenal sebagai vitamin P dan citrin, dan merupakan pigmen yang diproduksi oleh sejumlah tanaman sebagai warna pada bunga yang dihasilkan. Bagian tanaman yang bertugas untuk memproduksi flavonoid adalah bagian akar yang dibantu oleh rhizobia, bakteri tanah yang bertugas untuk menjaga dan memperbaiki kandungan nitrogen dalam tanah.

Flavonoid adalah sekelompok besar senyawa polifenol tanaman yang tersebar luas dalam berbagai bahan makanan dan dalam berbagai konsentrasi. Komponen tersebut pada umumnya terdapat dalam keadaan terikat atau terkonjugasi dengan senyawa gula. Lebih dari 4000 jenis flavonoid telah diidentifikasi dan beberapa di antaranya berperan dalam pewarnaan bunga, buah, dan daun

Flavonoid mempunyai banyak efek yang baik terhadap kesehatan tubuh manusia. Para peneliti menemukan flavonoid yang bermanfaat sebagai antioksidan; berperan sebagai molekul messenger dalam interaksi antar sel; antiinflamasi dengan memutus efek jalur metabolisme asam arakidonat, mempengaruhi produksi prostaglandin dan pelepasan histamin, mempunyai aktivitas scavenging, antitumor dengan memutus aktivitas promoter tumor, dan antivirus diperkirakan memutus sintesis asam nukleat.

Flavonoid adalah senyawa yang tersusun dari 15 atom karbon dan terdiri dari 2 cincin benzen yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat membentuk cincin ketiga. Flavonoid dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Flavonoid yang memiliki cincin ketiga berupa gugus piron. Flavonoid ini disebut flavan atau fenilbenzopiran. Turunan flavan banyak digunakan sebagai astringen (turunan tanin).
- b. Flavonoid yang memiliki cincin ketiga berupa gugus piron. Flavonoid ini disebut flavon atau fenilbenzopiron. Turunan flavon adalah jenis flavonoid yang paling banyak memiliki aktivitas farmakologi.
- c. Flavonoid yang memiliki cincin ketiga berupa gugus pirilium. Flavonoid ini disebut flavilium atau antosian. Turunan pirilium biasa digunakan sebagai pewarna alami.

Sifat- sifat dari senyawa flavonoid antara lain:

1. Sifat Fisika dan Kimia Senyawa Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa polifenol sehingga bersifat kimia senyawa fenol yaitu agak asam dan dapat larut dalam basa, dan karena merupakan senyawa polihidroksi (Gugus Hidroksil) maka juga bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, aseton, air, butanol, dimetil sulfoksida, dimetil formamida. Disamping itu dengan adanya gugus glikosida yang terikat pada gugus flavonoid sehingga cenderung menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, biru, dan sebagai zat berwarna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Perkembangan pengetahuan menunjukkan bahwa flavonoid termasuk salah satu kelompok senyawa aromatik yang termasuk polifenol.

Flavonoid juga memiliki beberapa sifat seperti hepatoprotektif, antitrombotik, antiinflamasi, dan antivirus (Stavric dan Matula, 1992). Sifat antiradikal flavonoid terutama terhadap radikal hidroksil, anionsuperoksida, radikal peroksil, dan alkoksil (Huguet, et al., 1990; Sichel, et al., 1991). Senyawa flavonoid ini memiliki afinitas yang sangat kuat terhadap ion Fe (Fe diketahui dapat mengkatalisis beberapa proses yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas). Aktivitas antiperoksidatif flavonoid ditunjukkan melalui potensinya sebagai pengkelat.

Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air dapat diekstraksi dengan etanol 70 % dan tetap ada dalam lapisan air setelah ekstrak ini dikocok dengan eter minyak bumi. Flavonoid berupa senyawa fenol, karena itu warnanya berubah bila ditambah basa atau amonia, jadi mudah dideteksi pada kromatogram atau dalam larutan (Harborne, 1987: 70).

Sifat-sifat kimia dari senyawa fenol adalah sama, akan tetapi dari segi biogenetik senyawa senyawa ini dapat dibedakan atas dua jenis utama, yaitu Senyawa fenol yang berasal dari asam shikimat atau jalur shikimat dan Senyawa fenol yang berasal dari jalur asetat-malonat.

2. Sifat Kelarutan Flavonoid

Aglikon flavonoid adalah polifenol dan karena itu mempunyai sifat kimia senyawa fenol, yaitu bersifat agak asam sehingga dapat larut dalam basa, tetapi bila dibiarkan dalam larutan basa dan di samping itu terdapat oksigen, banyak yang akan terurai. Karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil yang tak tersulih, atau suatu gula, flavonoid merupakan senyawa polar, maka umumnya flavonoid cukup larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil-sulfoksida, dimetilformamida, air, dan lain-lain (Markham, 1988: 15). Adanya gula yang terikat pada flavonoid (bentuk umum yang ditemukan) cenderung menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air dan dengan demikian campuran pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang baik untuk glikosida. Sebaliknya, aglikon yang kurang polar seperti isoflavan, flavanon, dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform (Markham, 1988: 15).

Kelarutan flavonoid antara lain:

1. Flavonoid polimetil atau polimetoksi larut dalam heksan, petroleum eter (PE), kloroform, eter, etil asetat, dan etanol. Contoh: sinersetin (nonpolar).
2. Aglikon flavonoid polihidroksi tidak larut dalam heksan, PE dan kloroform; larut dalam eter, etil asetat dan etanol; dan sedikit larut dalam air. Contoh: kuersetin (semipolar) Glikosida flavonoid tidak larut dalam heksan, PE, kloroform, eter; sedikit larut dalam etil asetat dan etanol; serta sangat larut dalam air. Contoh: rutin.

3. Kestabilan Flavonoid

Secara fisis, flavonoid bersifat stabil. Namun, secara kimiawi ada 2 jenis flavonoid yang kurang stabil, yaitu:

- a. Flavonoid O-glikosida; dimana glikon dan aglikon dihubungkan oleh ikatan eter (R-O-R). Flavonoid jenis ini mudah terhidrolisis.
- b. Flavonoid C-glikosida; dimana glikon dan aglikon dihubungkan oleh ikatan C-C. Flavonoid jenis ini sukar terhidrolisis, tapi mudah berubah menjadi isomernya. Misalnya viteksin, dimana gulanya mudah berpindah ke posisi 8. Perlu diketahui, kebanyakan gula terikat pada posisi 5 dan 8, jarang terikat pada cincin B atau C karena kedua cincin tersebut berasal dari jalur sintesis tersendiri, yaitu jalur sinamat.

D. Validasi Metode Analisis


Validasi metode menurut united states pharmacopeia (USP) dilakukan untuk menjamin bahwa metode analisis akurat, spesifik, reproduibel, dan tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis (Rohman, 2007: 463)

Suatu metode analisis harus divalidasi untuk melakukan verifikasi bahwa parameter-parameter kinerja cukup mampu untuk mengatasi problem analisis, karenanya suatu metode harus divalidasi ketika:

- a. Metode baru dikembangkan untuk mengatasi problem analisis tertentu
- b. Metode yang sudah baku direvisi untuk menyesuaikan perkembangan atau karena munculnya suatu problem yang mengarahkan bahwa metode baku tersebut harus direvisi
- c. Penjaminan mutu yang mengindikasikan bahwa metode baku telah berubah seiring dengan berjalannya waktu
- d. Metode baku digunakan dilaboratorium yang berbeda atau dikerjakan dengan alat yang berbeda


e. Untuk mendemonstrasikan kesetaraan antar 2 metode, seperti antara metode baru dan metode baku.

Menurut USP, ada 8 langkah dalam validasi metode analisis sebagaimana terlihat dalam gambar 2:



Gambar 2: Delapan Tahap metode validasi menurut USP (Sumber: Rohman A. *Kimia Farmasi Analisis*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2007. Hal 464)

Sementara itu ICH (international conference on harmonization) membagi karakteristik validasi metode sebagai berikut:



Gambar 3: Parameter validasi metode menurut ICH (Swartz and Krull, 1997)

1. Ketepatan (Akurasi)

Akurasi merupakan ketelitian metode analisis atau kedekatan antara nilai terukur dengan nilai yang diterima baik nilai konvensi, nilai sebenarnya atau nilai rujukan. Akurasi diukur sebagai banyaknya analit yang diperoleh kembali pada suatu pengukuran dengan melakukan spiking pada suatu sampel. Untuk pengujian senyawa obat, akurasi diperoleh dengan membandingkan hasil pengukuran dengan bahan rujukan standar (*Standar reference material, SRM*) (Harmita, 2004: 247)

Untuk mendokumentasikan akurasi, ICH merekomendasikan pengumpulan data dari 9 kali penetapan kadar dengan 3 konsentrasi yang berbeda (misal 3 konsentrasi dengan 3 kali replikasi). Data harus dilaporkan sebagai persentase perolehan kembali (Rohman, 2007: 465)

Tabel 1.

Keterangan Tabel: Perbandingan Konsentrasi Analit dengan Akurasi (Hube L, Inc. Germany. 2003: 341)

Analit pada matriks sampel (%)	Rasio analit	Unit	Rata-rata perolehan kembali (%)
100	1	100%	98-102
≤10	10 ⁻¹	10%	98-102
≤1	10 ⁻²	1%	97-103
≤0,1	10 ⁻³	0,1%	95-105
0,01	10 ⁻⁴	100ppm	90-107
0,001	10 ⁻⁵	10ppm	80-110
0,0001	10 ⁻⁶	1ppm	80-110
0,00001	10 ⁻⁷	100ppb	80-110
0,000001	10 ⁻⁸	10ppb	60-115
0,0000001	10 ⁻⁹	1 ppb	40-120

Sumber: Husber L. *Validation of Analytical Methods and Processes*

2. Presisi

Presisi merupakan ukuran keterulangan metode analisis dan biasanya diekspresikan sebagai simpangan baku relatif dari sejumlah sampel yang berbeda signifikan secara statistik. Sesuai dengan ICH, presisi harus dilakukan pada 3 tingkatan yang berbeda yaitu: keterulangan (*Repeatibility*), presisi antara (*Intermediate Precision*) dan ketertiruan (*Reproducibility*)

- Keterulangan yaitu ketepatan (precision) pada kondisi percobaan yang sama (berulang) baik orangnya, peralatannya, tempatnya, maupun waktunya.
- Presisi antara yaitu ketepatan (precision) pada kondisi percobaan yang berbeda, baik orangnya, peralatannya, tempatnya maupun waktunya.
- Ketertiruan merujuk pada hasil-hasil dari laboratorium yang lain.
- Dokumentasi presisi seharusnya mencakup: simpangan baku, simpangan baku relatif (RSD), atau koefisien variasi (CV), dan kisaran kepercayaan.

Pengujian presisi pada saat awal validasi metode seringkali hanya menggunakan 2 parameter yaitu: keterulangan dan presisi antara. Reprodusibilitas biasanya dilakukan ketika akan melakukan uji banding antar laboratorium (Rohman, 2007: 465)

Presisi seringkali diekspresikan dengan SD atau standar deviasi relatif (RSD) dari serangkaian data. Untuk menghitung RSD dapat dirumuskan dengan:

$RSD = \frac{100 \times SD}{\bar{x}}$; yang mana \bar{x} merupakan rata-rata data, dan SD adalah standar

deviasi serangkaian data. Presisi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Hasil analisis adalah $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ maka simpangan bakunya adalah

Simpangan baku relatif atau koefisien variansi (KV) adalah:

$$RSD (KV) = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100\%$$

Yang mana \bar{X} merupakan rata-rata data, dan SD adalah standar deviasi serangkaian data.

Tabel 2.

Keterangan Tabel: Perbandingan Konsentrasi Analit dengan Presisi

(Hube L, Inc. Germany. 2003: 341)

Analit (%)	Rasio analit	Unit	RSD (%)
100	1	100%	< 1,3
10	10^{-1}	10%	< 1,8
1	10^{-2}	1%	< 2,7
0,1	10^{-3}	0,1%	< 3,7
0,01	10^{-4}	100 ppm	< 5,3
0,001	10^{-5}	10 ppm	< 7,3
0,0001	10^{-6}	1 ppm	< 11
0,00001	10^{-7}	100 ppb	< 15
0,000001	10^{-8}	10 ppb	< 21
0,0000001	10^{-9}	1 ppb	< 30

Sumber: Husber L. *Validation of Analytical Methods and Processes*.

Data untuk menguji presisi seringkali dikumpulkan sebagai bagian kajian-kajian lain yang berkaitan dengan presisi seperti linieritas atau akurasi. Biasanya replikasi 6-15 dilakukan pada sampel tunggal untuk tiap konsentrasi. Pada pengujian dengan KCKT, nilai RSD antara 1-2% biasanya dipersyaratkan untuk senyawa-senyawa aktif dalam jumlah yang banyak; sedangkan untuk senyawa-senyawa dengan kadar sekelumit, RSD berkisar antara 5-15% (Rohman, 2007: 466)

3. Spesifisitas

Spesifisitas adalah kemampuan untuk mengukur analit yang dituju secara tepat dan spesifik dengan adanya komponen-komponen lain dalam matriks sampel

seperti ketidakmurnian, produk degradasi, dan komponen matriks. (Rohman, 2007: 467)

International Conference Harmonisation membagi spesifisitas dalam 2 kategori, yakni uji identifikasi dan uji kemurnian atau pengukuran. Untuk tujuan identifikasi, spesifitas ditunjukkan dengan kemampuan suatu metode analisis untuk membedakan antar senyawa yang mempunyai struktur molekul yang hampir sama. Untuk tujuan uji kemurnian dan tujuan pengukuran kadar, spesifitas ditunjukkan oleh daya pisah 2 senyawa yang berdekatan(sebagaimana dalam kromatografi) senyawa-senyawa tersebut biasanya adalah komponen utama atau komponen aktif dan atau suatu pengotor. Jika dalam suatu uji terdapat suatu pengotor (*Impuritis*) maka metode uji harus tidak terpengaruh dengan adanya pengotor ini.

Penentuan spesifisitas metode dapat diperoleh dengan 2 jalan. Yang pertama (dan yang paling diharapkan), adalah dengan melakukan optimasi sehingga diperoleh senyawa yang dituju terpisah secara sempurna dari senyawa-senyawa lain (Resolusi senyawa yang dituju ≥ 2). Cara kedua untuk memperoleh spesifisitas adalah dengan menggunakan detektor selektif, terutama untuk senyawa-senyawa yang terelusi secara bersama-sama. Sebagai contoh, detektor elektrokimia atau detektor fluoresent hanya akan mendeteksi senyawa tertentu, sementara senyawa yang lainnya tidak terdeteksi. Penggunaan detektor UV pada panjang gelombang yang spesifik juga merupakan cara yang efektif untuk melakukan pengukuran selektifitas. Deteksi analit secara selektif dengan detektor UV dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik derivatisasi dan dilanjutkan dengan pengukuran pada panjang gelombang tertentu yang spesifik terhadap derivat yang dihasilkan. Sebagai contoh adalah penggunaan senyawa 4-dimetil amino azobenzen-4'-sulfonil klorida (DABS-Cl) untuk menderivatisasi asam

amino yang mana derivat yang terbentuk dapat dideteksi dengan UV pada panjang gelombang 436 nm.

4. Batas Deteksi (*Limit Of Detection*, LOD)

Batas deteksi didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi, meskipun tidak selalu dapat dikuantifikasi. LOD merupakan batas uji yang secara spesifik menyatakan apakah analit di atas atau dibawah nilai tertentu. Definisi batas deteksi yang paling umum digunakan dalam kimia analisis adalah bahwa batas deteksi merupakan kadar analit yang memberikan respon sebesar respon blanko (y_b) ditambah dengan 3 simpangan baku blanko ($3S_b$) (Rohman, 2007: 467).

Limit Of Detection seringkali diekspresikan sebagai suatu konsentrasi pada rasionya 2 atau 3 dibanding 1. ICH mengenalkan suatu konvensi metode *signal to noise ratio* ini, meskipun demikian ICH juga menggunakan 2 metode pilihan lain untuk menentukan LOD yakni: Metode non instrumental visual dan dengan metode perhitungan. Metode non instrumental visual digunakan pada teknik kromatografi lapis tipis dan pada metode titrimetri. LOD juga dapat dihitung berdasarkan pada standar deviasi (SD) respon dan kemiringan (*Slope*, S) kurva baku pada level yang mendekati LOD sesuai dengan rumus, $LOD = 3,3 (SD/S)$. Standar deviasi respon dapat ditentukan berdasarkan pada standar deviasi blanko, pada standar deviasi residual dari garis regresi atau standar deviasi intersep y pada garis regresi (Harmita, 2004: 269).

5. Batas kuantifikasi (*Limit of quantification*, LOQ)

Batas kuantifikasi didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima pada kondisi operasional metode yang digunakan. Sebagaimana LOD, LOQ juga diekspresikan sebagai konsentrasi (dengan akurasi dan presisi juga dilaporkan).

Kadang-kadang rasio *signal tnoise* 10:1 digunakan untuk menentukan LOQ. Perhitungan LOQ dengan rasio *signal tnoise* 10:1 merupakan aturan umum, meskipun demikian perlu diingat bahwa LOQ merupakan suatu kompromi antara konsentrasidengan presisi dan akurasi yang dipersyaratkan. Jadi, jika konsentrasi LOQ menurun maka presisi juga menurun. Jika presisi tinggi dipersyaratkan, maka konsentrasi LOQ yang lebih tinggi harus dilaporkan. (Rohman, 2007: 468)

International Conference Harmonisation mengenalkan metode rasio *signal tnoise* ini, meskipun demikian sebagai mana dalam perhitungan LOD, ICH juga menggunakan 2 metode untuk menentukan LOQ yaitu: (1 metode non instrumental visual) dan (2 metode perhitungan). Sekali lagi, metode perhitungan didasarkan pada standar defiasi respon (SD) dan *slope* (S) kurva baku sesuai dengan rumus: $LOQ = 10 (SD/S)$ standr defiasi respon dapat ditentukan berdasarkan standr deviasi blanko pada standar defiasi residual garis rekresi linier atau dengan standar defiasi intersep-y pada garis regresi.

6. Linieritas

Linieritas merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Linieritas suatu metode merupakan ukuran seberapa baik kurva kalibrasi yang menghubungkan antara respon (Y) dengan konsentrasi (X). Linieritas dapat diukur dengan melakukan pengukuran tunggal pada konsentrasi yang berbeda-beda. Data yang diperoleh selanjutnya diproses dengan metode kuadrat terkecil, untuk selanjutnya dapat ditentukan nilai kemiringan (*Slope*), intersep, dan koefisien korelasinya. (Rohman, 2007: 469)

7. Kisaran (*Range*)

Kisaran suatu metoe didefinisikan sebagai konsentrsi terendah dan tertinggi yangmana suatu metode analisis menunjukkan akurasi, presisi, dan

linieritas yang mencukupi. Kisaran-kisaran konsentrasi yang diuji tergantung pada jenis metode dan kegunaannya. Untuk pengujian komponen utama (Mayor), maka konsentrasi baku harus diukur didekat atau sama dengan konsentrasi kandungan analit yang diharapkan. Suatu strategi yang baik adalah mengukur baku dengan kisaran 25, 50, 75, 100, 125, dan 150% dari konsentrasi analit yang diharapkan. (Rohman, 2007: 469)

8. Kekasaran (*Ruggedness*)

Kekasaran merupakan tingkat reproduibilitas hasil yang diperoleh dibawah kondisi yang bermacam-macam yang diekspresikan sebagai persen standar defiasi relatif (% RSD) kondisi-kondisi ini meliputi laboratorium, analisis, alat, reagen, dan waktu percobaan yang berbeda (Rohman, 2007: 467).

Kekasaran suatu metode mungkin tidak akan diketahui jika suatu metode dikembangkan pertama kali, akan tetapi kekasaran suatu metode akan kelihatan jika digunakan berulang kali. Suatu pengembangan metode yang bagus mensyaratkan suatu evaluasi yang sistematis terhadap faktor-faktor penting yang mempengaruhi kekasaran suatu metode (Rohman, 2007: 467).

Strategi untuk menentukan kekasaran suatu metode akan bervariasi tergantung pada kompleksitas metode dan waktu yang tersedia untuk melakukan validasi. Penentuan kekasaran metode dapat dibatasi oleh kondisi kondisi percobaan yang kritis, misalkan pengecekan pengaruh kolom kromatografi yang berbeda pabrik dan jenisnya sama atau pengaruh operasionalisasi metode pada laboratorium yang berbeda. Dalam kasus seperti ini semua faktor harus dijaga konstan seperti fase gerak dan reagen yang digunakan (Rohman, 2007: 467)

9. Ketahanan (*Robutness*)

Ketahanan merupakan kapasitas metode untuk tetap tidak terpengaruh oleh adanya variasi parameter metode yang kecil. Ketahanan dievaluasi dengan melakukan variasi parameter-parameter metode seperti: persentase pelarut organik pH kekuatan ionik, suhu dan sebagainya. Suatu praktek yang baik untuk mengevaluasi ketahanan suatu metode adalah dengan memvariasi parameter-parameter penting dalam suatu metode secara sistematis lalu mengkuatr pengaruhnya pada pemisahan. Sebagai contoh, jika suatu metode menggunakan asetonitril 36%-air sebagai fase geraknya, maka seorang analis lalu memvariasi persentase asetonitrilnya menjadi misalkan 33, 36, dan 39% lalu melihat pengaruhnya pada waktu retensi analit yang diuji (Rohman, 2007: 470)

10. Stabilitas

Untuk memperoleh hasil-hasil analisis yang reproduibel dan reliabel, maka sampel, reagen dan baku yang digunakan harus stabil pada waktu tertentu (misalkan 10 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau tergantung kebutuhan). Sebagai contoh, suatu analisis untuk pengujian suatu sampel dapat membutuhkan 10 atau lebih perlakuan kromatografi; yakni untuk menentukan kesesuaian sistem, termasuk didalamnya konsentras baku untuk membuat kurva baku dan juga untuk membuat 2 atau 3 kali replikasi terhadap sampel yang akan diuji. Dengan demikian, untuk melakukan analisis suatu sampel saja dibutuhkan waktu beberapa jam, karenany selama analisis harus dipastikan bahwa sampel, regen, dan pelarut yang digunakan stabil. Untuk analisis sampel dalam jumlah yang banyak, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi sehingga stabilitas dapat menjadi faktor yang kritis pada validasi metode (Rohman, 2007: 471)

Stabilitas semua larutan dan reagen sangatlah penting, baik yang berkaitan dengan suhu atau yang berkaitan dengan waktu. Jika larutan tidak stabil, pada

penurunan suhu hingga 2-8°C dapat meningkatkan stabilitas sampel dan standar. Pendingin dalam autosampler biasanya tersedia untuk keperluan ini. Stabilitas juga penting, terkait dengan waktu pengerjaan. Sebagai contoh, analisis secara gradien selama 100 menit tentunya membutuhkan fase gerak dengan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan analisis secara isokratik selama 5 menit.

Fase gerak haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga menghindari masalah-masalah yang terkait dengan stabilitas. Sebagai contoh, fase gerak yang mengandung THF diduga akan mengalami oksidasi. Oleh karena itu, fase gerak seperti ini harus disiapkan setiap hari dengan menggunakan THF yang baru. Beberapa fase gerak yang mengandung buffer dapat mengakibatkan masalah, misalkan fase gerak yang mengandung fosfat dan asetat akan mudah ditumbuhi bakteri, karena fosfat dan asetat merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikrobial. Natrium azida dengan konsentrasi 0,1% biasanya ditambahkan untuk menghindari pertumbuhan bakteri ini. Penambahan pelarut organik dengan konsentrasi lebih dari 1% juga merupakan cara yang efektif (Rohman, 2007: 472)

11. Kesesuaian sistem

Sebelum melakukan analisis setiap hari, seorang analis harus memastikan bahwa sistem dan prosedur yang digunakan harus mampu memberikan data yang dapat diterima. Hal ini dapat dilakukan dengan percobaan kesesuaian sistem yang didefinisikan sebagai serangkaian uji untuk menjamin bahwa metode tersebut dapat menghasilkan akurasi dan presisi yang dapat diterima. Persyaratan-persyaratan kesesuaian sistem biasanya dilakukan setelah dilakukan pengembangan metode dan validasi metode (Rohman, 2007: 472)

Farmakope Amerika (*United States Pharmacopeia*, USP) menentukan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk menetapkan kesesuaian sistem sebelum analisis. Parameter-parameter yang digunakan meliputi: bilangan

lempeng teori (N), faktor tailing, Kapasitas (K' atau A) dan nilai standar deviasi relatif (RSD) tinggi puncak dan luas puncak dari serangkaian injeksi. Pada umumnya, paling tidak ada dua kriteria yang biasanya dipersyaratkan untuk menunjukkan kesesuaian sistem suatu metode. Nilai RSD tinggi puncak atau luas puncak dari 5 kali injeksi larutan baku pada dasarnya dapat diterima sebagai salah satu kriteria baku untuk pengujian komponen yang jumlahnya banyak (komponen mayor) jika nilai $RSD \leq 1\%$ untuk 5 kali injeksi. Sementara untuk senyawa-senyawa dengan kadar sekelumit, nilai RSD dapat diterima jika antara 5-15% (Rohman, 2007: 472).

Baik *United States Pharmacopeia* maupun *Internasional Conference on Harmonization* telah memperkenalkan bahwa tidak selamanya parameter untuk mengevaluasi validasi metode diuji. USP membagi metode analisis kedalam kategori yang terpisah, yaitu:

1. Penentuan kuantitatif komponen-komponen utama atau bahan aktif
2. Penentuan pengotor (*Impurities*) atau produk-produk hasil degradasi
3. Penentuan karakteristik kinerja
4. Pengujian identifikasi

Untuk uji kategori 1, evaluasi nilai LOD dan LOQ tidak begitu penting karena komponen utama atau bahan aktif pada umumnya berada dalam jumlah yang besar. Pengujian kategori 2, dapat dibagi lagi menjadi 2 sub – kategori, yaitu analisis kuantitatif dan uji batas. Jika yang diharapkan adalah informasi kuantitatifnya maka parameter LOD tidak begitu penting, tetapi parameter yang lain dibutuhkan. Keadaan yang berlawanan berlaku untuk uji batas, karena informasi kuantitatifnya tidak dibutuhkan maka pengukuran LOD, Spesifisitas, dan kekasaran sudah mencukupi. Untuk mengetahui elemen data yang dibutuhkan

untuk uji validasi dan karakteristik validasi menurut ICH dan jenis prosedur analisisnya. (Rohman, 2007: 473)

E. Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, dan diemisikan sebagai fungsi dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang di absorpsi (Khopkar, 2008: 184).

1. Teori Spektrofotometri Ultraviolet

Spektrofotometri serapan merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Teknik yang sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi spektrofotometri ultraviolet, cahaya tampak, inframerah dan serapan atom. Jangkauan panjang gelombang untuk daerah ultraviolet adalah 190-380 nm, daerah cahaya tampak 380-780 nm, daerah infra merah dekat 780-3000 nm, dan daerah infra merah 2,5-40 μm atau 4000-250 cm^{-1} (Ditjen POM, 1995).

Radiasi ultraviolet dan sinar tampak diabsorpsi oleh molekul organik aromatik, molekul yang mengandung elektron- π terkonjugasi dan atau atom yang mengandung elektron-n, menyebabkan transisi elektron di orbital terluarnya dari tingkat energi elektron dasar ke tingkat energi elektron tereksitasi lebih tinggi. Besarnya serapan radiasi tersebut sebanding dengan banyaknya molekul analit yang mengabsorpsi sehingga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif (Satiadarma, 2004).

Gugus fungsi yang menyerap radiasi di daerah ultraviolet dekat dan daerah tampak disebut khromofor dan hampir semua khromofor mempunyai ikatan tak jenuh. Pada khromofor jenis ini transisi terjadi dari $\pi \rightarrow \pi^*$, yang menyerap pada

λ_{\max} kecil dari 200 nm (tidak terkonyugasi), misalnya pada $>C=C<$ dan $-C\equiv C-$. Khromofor ini merupakan tipe transisi dari sistem yang mengandung elektron π pada orbital molekulnya. Untuk senyawa yang mempunyai sistem konyugasi, perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi menjadi lebih kecil sehingga penyerapan terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar.

Gugus fungsi seperti $-OH$, $-NH_2$ dan $-Cl$ yang mempunyai elektron-elektron valensi bukan ikatan disebut auksokrom yang tidak menyerap radiasi pada panjang gelombang lebih besar dari 200 nm, tetapi menyerap kuat pada daerah ultraviolet jauh. Bila suatu auksokrom terikat pada suatu khromofor, maka pita serapan khromofor bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang (efek batokrom) dengan intensitas yang lebih kuat. Efek hipsokrom adalah suatu pergeseran pita serapan ke panjang gelombang lebih pendek, yang sering kali terjadi bila muatan positif dimasukkan ke dalam molekul dan bila pelarut berubah dari non polar ke pelarut polar (Dachriyanus, 2004).

Secara eksperimental, sangat mudah untuk mengukur banyaknya radiasi yang diserap oleh suatu molekul sebagai fungsi frekuensi radiasi. Suatu grafik yang menghubungkan antara banyaknya sinar yang diserap dengan frekuensi (atau panjang gelombang) sinar merupakan spectrum absorpsi. Transisi yang dibolehkan (*allowed transition*) untuk suatu molekul dengan struktur kimia yang berbeda adalah tidak sama sehingga spectra absorpsinya juga berbeda. Dengan demikian, spectra dapat digunakan sebagai bahan informasi yang bermanfaat untuk analisis kualitatif. Banyaknya sinar yang diabsorpsi pada panjang gelombang tertentu sebanding dengan banyaknya molekul yang menyerap radiasi, sehingga spectra absorpsi juga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif (Gandjar dan Rohman, 2007).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis spektrofotometri ultraviolet

a. Pemilihan Panjang gelombang maksimum

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang gelombang dimana terjadi serapan maksimum. Untuk memperoleh panjang gelombang serapan maksimum, dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada konsentrasi tertentu.

b. Pembuatan Kurva Kalibrasi

Dibuat seri larutan baku dari zat yang akan dianalisis dengan berbagai konsentrasi. Masing-masing absorbansi larutan dengan berbagai konsentrasi diukur, kemudian dibuat kurva yang merupakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi. Bila hukum Lambert-Beer terpenuhi maka kurva kalibrasi berupa garis lurus.

c. Pembacaan absorbansi sampel atau cuplikan

Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 sampai 0,6. Anjuran ini berdasarkan anggapan bahwa pada kisaran nilai absorbansi tersebut kesalahan fotometrik yang terjadi adalah paling minimal (Gandjar dan Rohman, 2007).

2. Hukum Lambert Beer

Menurut Hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel yang disinari. Menurut Hukum Beer, yang hanya berlaku untuk cahaya monokromatik dan larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi (banyak molekul zat). Kedua pernyataan ini dapat dijadikan satu dalam Hukum Lambert-Beer, sehingga diperoleh bahwa serapan berbanding lurus terhadap konsentrasi dan ketebalan sel, yang dapat ditulis dalam persamaan:

$$A = a \cdot b \cdot c \text{ g/liter atau } A = \epsilon \cdot b \cdot C \text{ mol/liter}$$

Dimana: A = serapan (tanpa dimensi)

a = absorptivitas ($\text{g}^{-1} \text{cm}^{-1}$)

b = ketebalan sel (cm)

C = konsentrasi ($\text{g} \cdot \text{l}^{-1}$)

ϵ = absorptivitas molar ($\text{M}^{-1} \text{cm}^{-1}$)

Jadi dengan Hukum Lambert-Beer konsentrasi dapat dihitung dari ketebalan sel dan serapan. Absorptivitas merupakan suatu tetapan dan spesifik untuk setiap molekul pada panjang gelombang dan pelarut tertentu.

Menurut Roth dan Blaschke (1981), absorptivitas spesifik juga sering digunakan sebagai ganti absorptivitas. Harga ini memberikan serapan larutan 1% (b/v) dengan ketebalan sel 1 cm, sehingga dapat diperoleh persamaan:

$$A = A_1^1 \cdot b \cdot C$$

Dimana: A_1^1 = absorptivitas spesifik ($\text{ml g}^{-1} \text{cm}^{-1}$)

b = ketebalan sel (cm)

C = konsentrasi senyawa terlarut ($\text{g}/100 \text{ ml}$ larutan)

3. Penggunaan Spektrofotometri Ultraviolet

Pada umumnya spektrofotometri ultraviolet dalam analisis senyawa organik digunakan untuk:

- Menentukan jenis khromofor, ikatan rangkap yang terkonjugasi dan auksokhrom dari suatu senyawa organik
- Menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang serapan maksimum suatu senyawa
- Mampu menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Dachriyanus, 2004).

Analisis kualitatif

Kegunaan spektrofotometri ultraviolet dalam analisis kualitatif sangat terbatas, karena rentang daerah radiasi yang relatif sempit hanya dapat

mengakomodasi sedikit sekali puncak absorpsi maksimum dan minimum, karena itu identifikasi senyawa yang tidak diketahui, tidak memungkinkan.

Penggunaannya terbatas pada konfirmasi identitas dengan menggunakan parameter panjang gelombang puncak absorpsi maksimum, λ_{\max} , nilai absorptivitas, a , nilai absorptivitas molar, ϵ , atau nilai ekstingsi, $A_{1\%, 1\text{cm}}$, yang spesifik untuk suatu senyawa yang dilarutkan dalam suatu pelarut dan pH tertentu (Satiadarma, 2002).

Analisis Kuantitatif


Penggunaan utama spektrofotometri ultraviolet adalah dalam analisis kuantitatif. Apabila dalam alur spektrofotometer terdapat senyawa yang mengabsorpsi radiasi, akan terjadi pengurangan kekuatan radiasi yang mencapai detektor. Parameter kekuatan energi radiasi khas yang diabsorpsi oleh molekul adalah absorban (A) yang dalam batas konsentrasi rendah nilainya sebanding dengan banyaknya molekul yang mengabsorpsi radiasi dan merupakan dasar analisis kuantitatif. Penentuan kadar senyawa organik yang mempunyai gugus khromofor dan mengabsorpsi radiasi ultraviolet-sinar tampak, penggunaannya cukup luas. Konsentrasi kerja larutan analit umumnya 10 sampai 20 $\mu\text{g/ml}$, tetapi untuk senyawa yang nilai absorptivitasnya besar dapat diukur pada konsentrasi yang lebih rendah. Senyawa yang tidak mengabsorpsi radiasi ultraviolet-sinar tampak dapat juga ditentukan dengan spektrofotometri ultraviolet-sinar tampak, apabila ada reaksi kimia yang dapat mengubahnya menjadi khromofor atau dapat disambungkan dengan suatu pereaksi khromofor (Satiadarma, 2004).

4. Peralatan Untuk Spektrofotometri

Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitans atau serapan suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Alat ini terdiri dari spektrometer yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan

fotometer sebagai alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi (Khopkar, 1990; Day and Underwood, 1981).

Unsur-unsur terpenting suatu spektrofotometer ditunjukkan secara skematik dalam gambar berikut:



Bagian optik

Bagian Listrik

Gambar 4: Skema kerja spektrofotometri UV-VIS (Mulja, 1995)

Berikut ini adalah uraian bagian-bagian spektrofotometer:

1. Sumber-sumber lampu

lampu deuterium digunakan untuk daerah UV pada panjang gelombang dari 190-350 nm, sementara lampu halogen kuarsa atau lampu tungsten digunakan untuk daerah visibel (pada panjang gelombang antara 350-900 nm).

2. Monokromator

Digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis. Alatnya dapat berupa prisma ataupun grating. Untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian.

a. Celah (Slit)

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan

penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromator dan resolusi panjang gelombang.

b. Filter Optik

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai.

c. Prisma dan kisi (grating)

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

3. Kuvet

Pada pengukuran didaerah tampak, kuvet kaca atau kuvet kaca corex dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah UV kita harus menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal kuvet adalah 10 mm, tetapi yang lebih kecil ataupun yang lebih besar dapat digunakan. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi, tetapi bentuk silinder dapat juga digunakan. Kuvet yang bertutup digunakan untuk pelarut organik. Sel yang baik adalah kuarsa atau gelas hasil leburan yang homogen.

4. Detektor

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting oleh sebab itu detektor akan menemukan kualitas dari spektrofotometer adalah mengubah signal elektronik. Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang.

5. Suatu amplifier (penguat) dan rangkaian yang berkaitan yang membuat isyarat listrik dapat untuk diamati.

6. Sistem pembacaan yang memperlihatkan besarnya isyarat listrik (Khopkar, 1990; Rohman, 2007; Day and Underwood, 1981)

F. Tinjauan Islam Tentang Penelitian dan Pengembangan Obat

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan banyaknya berbagai penyakit yang muncul di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dengan munculnya berbagai penyakit di kalangan masyarakat maka masyarakat dituntut untuk menggunakan akal pikirannya yang juga merupakan pemberian dari sang Khalik sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali-'Imran 3: 190-191 yang firmannya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (Kementrian Agama RI, 2014: 75).

As- Suyuthi dalam kitabnya menyebutkan mengenai asbabun nuzul surah Ali-Imran ayat 190 dengan mengutip hadits riwayat Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, 'Apa tanda-tanda

yang dibawa Musa kepada kalian?’Orang-orang Yahudi itu menjawab,’Tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya.’Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, lalu bertanya kepada mereka,’Apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa?’ Mereka menjawab,’Dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta dan menghidupkan orang mati.’Lalu mereka mendatangi Nabi saw. Lalu mereka berkata kepada beliau,’Berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Shafa dan Marwah menjadi emas untuk kami.’Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah.

‘Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.’(as-Suyuti, 2008: 148-149)

Ditegaskan pada ayat ini dan ayat mendatang, dan salah satu bukti kebenaran adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda* kemahakuasaan Allah bagi *ulul albib*, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni (Shihab, 2009: 370).

Dari ayat di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah swt. memberikan akal kepada manusia untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mengkaji hasil ciptaan Allah yang terdapat di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian ini, dimana tujuannya adalah untuk menguji efektivitas tanaman dalam menanggulangi suatu penyakit yang harus dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tanaman obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan (Rahim, 2007: 5).

Tumbuhan adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah swt dengan hikmah dan takdir-Nya. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Salah satunya bunga kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L) sebagai sampel yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian sehingga diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pengobatan. Dan salah satu yang dapat menjadi acuan adalah Kasumba turate (*Cartamus tinctorius* L) Senada dengan firman Allah swt. dalam QS. Thaha/20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Kementrian Agama RI, 2014: 315).

Ayat di atas menyatakan: Dia, yakni Allah swt., *Yang telah menjadikan bagi kamu, wahai Fir'aun dan seluruh manusia sebagian besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga*

kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantara hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab, 2009: 604-605)

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah swt menciptakan hamparan yang luas dengan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat terjadi dengan adanya izin Allah swt.

Penjelasan tersebut dibuktikan pula Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَإِنْ أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءِ بَرِيءٌ
بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى [رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ]

Artinya:

“Setiap penyakit ada obatnya, jika benar obat yang digunakan dapat melawan penyakit yang dimaksud, maka dengan izin Allah akan sembuh”

(HR. Imam Muslim) (Mahmud, 2007: 13-14)

Al-Nawawi dalam kitabnya *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim* menjelaskan bahwa hadits tersebut menunjukkan keutamaan berobat, itu menurut jumhur ulama, al-Qhadi mengatakan bahwa hadis ini mengandung ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, dunia, kesehatan, ilmu kedokteran, dan bolehnya berobat. Menurut

hujjah para ulama bahwa Allah selaku penentu dan adapun pengobatan juga berasal dari ketentuan Allah swt. (Al-Nawawi, 1392: 191)

Al-'Aini menjelaskan dalam kitab syarahnya bahwa Allah swt tidak memberikan penyakit kepada seseorang kecuali ia telah menentukan obatnya, yang dimaksud dengan “menurunkan” pada hadits di atas ialah Allah menurunkan penyakit dan obat melalui malaikat secara langsung kepada makhluk sebagai perwakilan. Dikatakan bahwa banyak orang yang berobat tapi mereka tidak mendapatkan kesembuhan, maka dijawab bahwa itu karena mereka tidak mengetahui hakikat dari pengobatan itu. Hadits tersebut tidak menunjukkan penyakit secara keseluruhan karena dikecualikan penyakit tua dan mati, dan pada hadits tersebut terdapat penjelasan bolehnya melakukan pengobatan dan ilmu kedokteran (Al-'Aini, 229).

Jadi, setiap penyakit yang diturunkan Allah swt. pasti ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Jika Allah swt. menghendaki maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Akan tetapi Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat berlangsung atas izin Allah swt. dan apabila penelitian berhasil maka akan mempermudah penyembuhannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dalam Laboratorium Fitokimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk melaksanakan proses pengolahan sampel bunga kasumba turate (*Charthamus tinctorius L.*). Kemudian dilanjutkan menggunakan Laboratorium Kimia Farmasi Universitas Muslim Indonesia.

B. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pendekatan dengan metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan sebuah metode yang ingin mengetahui hubungan sebab akibat pada suatu variabel.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Kasumba turate (*Charthamus tinctorius L.*) yang berada di daerah kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa Sulawesi Selatan.

2. Sampel penelitian

Kasumba turate (*Charthamus tinctorius L.*) yang merupakan bagian bunga tumbuhan.

D. Instrument penelitian

1. Alat yang digunakan

Batang pengaduk, cawan porselin, corong, gelas erlenmeyer (iwaki Pirex[®]), gelas kimia (iwaki Pirex[®]), gelas ukur, kaca arloji, inkubator (Memmert[®]), kuvet, mikropipet (Dragon Onemed[®]), labu tentukur (iwaki pirex[®]),

pipet tetes, pipet volume (iwaki pirex[®]), rotavapor (Heidolph[®]), sendok besi, spektrofotometer uv-vis (Thermo Scientific[®]), timbangan analitik (Kern[®]), toples, vial dan wadah.

2. Bahan yang digunakan

Aquadest, aluminium foil, aluminium (III) klorida 1,2%, etanol p.a, etanol 70%, kalium asetat 120 mM, kertas perkamen, kertas saring, kuersetin, serbuk simplisia bunga kasumba turate.

E. Metode pengumpulan data

1. Teknik pengolahan

a. Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari yang diperoleh dari Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Sampel yang digunakan adalah bagian bunga kasumba turate. Pengambilan sampel dengan cara memetik bunga kasumba turate mulai dari bagian bawah kelopak.

b. Pengolahan sampel

Pengolahan sampel meliputi pengeringan sampel dengan cara diangin-anginkan, tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Pengeringan dilakukan untuk menghilangkan kadar air dalam bahan untuk memperlancar proses analisis dan menambah daya awet bahan tersebut selanjutnya dilakukan proses ekstraksi.

c. Ekstraksi sampel

Sampel Bunga kasumba turate yang sebelumnya telah diserbukkan, ditimbang sebanyak 500 gram dimasukkan dalam wadah maserasi kemudian ditambahkan etanol 70% hingga semua sampel terendam keseluruhan dan ditutup rapat. Dibiarkan selama 24 jam terlindung dari cahaya, sampel sesekali diaduk. Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Selanjutnya ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari etanol 70% yang baru. Hal ini

dilakukan selama 3 kali berturut-turut. Filtrat yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan alat rotavapor setelah itu dibebaskan etanol untuk mendapatkan ekstrak kental.

2. Penyiapan Larutan

a. Pembuatan larutan stok

Ditimbang seksama lebih kurang 100 mg ekstrak etanol kasumba turate dimasukkan dalam labu tentukur 100 ml dilarutkan dengan 100 mL etanol, diencerkan dengan etanol 70% sampai tanda untuk menghasilkan larutan stok yang mengandung 1 mg/ml (1000 ppm)

3. Penentuan Kadar Flavanoid dalam Ekstrak dengan Metode $AlCl_3$

a. Pembuatan Larutan standar kuersetin

Sebanyak 50 mg kuersetin ditimbang dan dilarutkan dalam 50 ml etanol p.a sebagai larutan stok 1000 ppm. Kemudian dibuat pengenceran kuersetin dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm dan 14 ppm sebagai larutan kuersetin pembanding. Lalu dipipet 1 ml kemudian ditambahkan 1 ml aluminium (III) klorida 1,2 %, kalium asetat 120 mM. diukur absorbansinya pada panjang 400-800 nm.

b. Penentuan panjang gelombang maksimum

Larutan stok diambil sebanyak 1 ml lalu, dicukupkan volumenya menggunakan etanol 70% p.a hingga 10 ml. Diukur serapan dengan spektrofotometer ultraviolet pada panjang gelombang 400-800 nm dengan menggunakan blangko etanol absolut p.a

c. Pembuatan kurva baku kuersetin

Kurva baku dibuat dengan cara menghubungkan konsentrasi larutan standar dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 442 nm.

d. Penetapan kadar Flavanoid total dalam ekstrak

Sebanyak 0,00508 g sampel ditimbang dan dilarutkan dalam 10 ml ethanol p.a sebagai konsentrasi 500 ppm. Lalu dipipet 1 ml kemudian ditambahkan 1 ml aluminium (III) klorida 1,2 %, 1 ml kalium asetat 120 mM Setelah itu diinkubasi selama 30 menit, absorbansi dari larutan pembanding diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. Larutan sampel dibuat dalam tiga kali replikasi.

4. Uji Validasi Metode Analisis

a. Presisi

Ditimbang Ekstrak etanol kasumba turate 10 mg kemudian diencerkan pada labu tentukur 10 ml sehingga kadarnya 1000 ppm, setelah itu dibuat pengenceran 100 ppm dengan cara dipipet 1 ml dari larutan stok kemudian dimasukkan kedalam labu tentukur 10 ml lalu dicukupkan volumenya. Dipepet 1 ml dari konsentrasi 100 ppm dan dimasukkan kedalam labu tentukur 10 ml hingga kadarnya 10 ppm. Lalu dipipet 1 ml kemudian ditambahkan 1 ml aluminium (III) klorida 1,2 %, 1 ml kalium asetat 120 mM Setelah itu diinkubasi selama 30 menit Lalu diukur absorbansinya pada spektrofotometer ultraviolet dengan panjang gelombang maksimum 442 nm proses replikasi sebanyak 7 kali. Selanjutnya dihitung persentase koefisien kolerasinya untuk melihat reproduktibilitas sistem yang digunakan syarat KV > 2%.

Pengolahan data presisi

Presisi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil analisis adalah $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$ maka simpangan bakunya adalah

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n-1}}$$

2. Simpangan baku relatif atau koefisien variansi (KV) adalah:

$$RSD (KV) = \frac{SD}{\bar{X}} \times 100\%$$

b. *Limit Of Detection* dan *Limit Of Quantitation*

Limit Of Detection dan *Limit Of Quantitation* ditentukan dengan mengukur respon blanko 10 kali lalu dihitung simpangan baku respon blanko dan rumus yang digunakan yaitu:

$$LOD = 3 \times \frac{syfx}{n}$$

$$LOQ = 10 \times \frac{syfx}{n}$$

Batas deteksi dan batas kuantitas dapat dihitung secara statistik melalui garis regresi linier dari kurva kalibrasi dengan membuat larutan baku kerja dengan konsentrasi 0,5 ppm, 0,75 ppm, 1 ppm, 1,5 ppm, 1,25 ppm, 1,5 ppm dan 1,75. Lalu dipipet 1 ml kemudian ditambahkan 1 ml aluminium (III) klorida 1,2 %, 1 ml kalium asetat 120 mM. Setelah itu diinkubasi selama 30 menit, absorbansi dari larutan pembanding diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. Setelah diukur absorbansi dari larutan baku kerja dicari persamaan regresi antara kadar (konsentrasi) dengan absorbansi, kemudian dihitung harga *Limit Of Detection* dan *Limit Of Quantitation*.

c. *Linearitas (Kurva Baku)*

Linieritas dilakukan dengan membuat larutan stok dan kemudian dibuat larutan baku kerja dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm dan 14 ppm. Lalu dipipet 1 ml kemudian ditambahkan 1 ml aluminium (III) klorida 1,2 %, 1 ml kalium asetat 120 mM. Setelah itu diinkubasi selama 30 menit, absorbansi dari larutan pembanding diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. Kurva hubungan antara kadar VS serapan dibuat kemudian ditentukan persamaan regresi linier serta koefisien korelasi (x) dan koefisien korelasi dari fungsi (Vxo) untuk mengevaluasi linieritas.

$$S_{yx} = \sqrt{\frac{\sum(y-y)^2}{n-2}}$$

$$S_{xo} = \frac{syfx}{n}$$

$$V_{xo} = \frac{s_{yx}}{2} \times 10,0\%$$

Berdasarkan nilai koefisien kolerasi dapat diketahui linieritasnya baik atau tidak. Koefisien kolerasi dikatakan baik apabila $r \geq 0,998$ dan koefisien fungsi regresi (V_{XO}) $\leq 5\%$.

d. Akurasi

Dalam penelitian ini dilakukan uji ketepatan dengan menggunakan metode penambahan baku (*Standar addition method*) Uji dilakukan untuk memperoleh nilai persen perolehan kembali dalam penambahan volume larutan uji yang meningkat dalam rentang konsentrasi 80%, 100 % dan 120% dari 25 mg ekstrak etanol kasumba turate. Berdasarkan rentang konsentrasi tersebut diperoleh bobot ekstrak kasumba turate yang akan dihitung persen perolehan kembali secara berturut-turut adalah 25 mg, 25 mg, 25 mg.

Sampel ditimbang dengan bobot setara 25 mg ekstrak etanol kasumba turate kemudian diekstraksi sebanyak 3 siklus dicukupkan volumenya dengan etanol absolut p.a hingga 25 ml tiap hasil ekstraksi kemudian dipipet dengan membuat konsentrasi 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm lalu dipipet 1 ml kemudian ditambahkan 1 ml aluminium (III) klorida 1,2 %, 1 ml kalium asetat 120 mM, Setelah itu diinkubasi selama 30 menit, absorbansi dari larutan perbandingan diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum dan prosedur direplikasikan sebanyak 3 kali.

Pengolahan data akurasi

Pengujian akurasi dapat dihitung melalui % perolehan kembali (% *recovery*) dengan rumus:

$$\% \text{ recovery} = \frac{(C_p - C_A)}{C^* A} \times 100\%$$

Keterangan:

C_p = Konsentrasi Sampel

C_{Λ} =Konsentrasi Sampel Sebenarnya

C_{Λ}^* =Konsentrasi Baku yang ditambahkan

5. Analisis data

Data yang diperoleh merupakan data primer yang didapatkan dari absorbansi larutan pembanding quersetin dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linear. Kadar total dari senyawa dihitung dengan memasukkan kedalam persamaan regresi linear $y= ax+b$, yang diperoleh dari kurva kalibrasi pembanding dan hasilnya dinyatakan dalam satuan mg dalam gram. Analisis statistik menggunakan metode analisis variansi (anava) satu arah ($A=0,005$) dengan bantuan program SP.SS 15. Jika F hasil perhitungan lebih besar dari pada F tabel dengan $A=0,005$ maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kadar flavonoid maka dilanjutkan dengan uji BNT (beda nyata terkecil) untuk mengetahui metode ekstraksi yang sesuai.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengukuran sampel Ekstrak Etanol Kasumba Turate dengan menggunakan metode spektrofotometri UV diperoleh data:

1. Penentuan Panjang gelombang Maksimum Ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) secara spektrofotometri UV-Vis (Selektivitas)

Pada penelitian ini untuk menentukan panjang gelombang maksimum larutan dengan konsentrasi 10 ppm di ukur pada panjang gelombang 400-500 nm menggunakan spektrofotometri UV-Vis sehingga diperoleh panjang gelombang 442 nm. Hasil penentuan panjang gelombang maksimum dapat dilihat pada gambar berikut:



Tujuan penentuan panjang gelombang maksimum agar mengetahui daerah serapan yang dapat dihasilkan berupa nilai absorbansi dari larutan baku kuersetin yang diukur serapannya menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang gelombang 400-500.

2. Pengujian Presisi

Tabel 3. Hasil Uji Presisi

No	Bobot (mg)	Absorban	$y - y'$	$(y - y')^2$
1	10	0,459	0,0032	0,00001024
2	10	0,458	0,0022	0,00000484
3	10	0,456	0,0002	0,00000004
4	10	0,456	0,0002	0,00000004
5	10	0,454	-0,0018	0,00000324
6	10	0,454	-0,0018	0,00000324
7	10	0,454	-0,0018	0,00000324
Rata-rata		0,4558		Σ0,00002588
SD		0,00085		
RSD		0,186%		

3. Pengujian Akurasi

Tabel 4. Hasil Pengujian Akurasi

No	Bobot Sampel (g)	Konsentrasi (ppm)	Baku yang ditambahkan (%)	Absorbansi	Perolehan kembali (mg)	Perolehan kembali (%)
1	0,02510	50	80	0,419	7,45	100,948
		100		0,435		
		150		0,455		
		200		0,470		
		250		0,493		
		300		0,515		
2	0,02515	50	100	0,542	10,32	100,978
		100		0,565		
		150		0,587		
		200		0,601		
		250		0,628		
		300		0,640		
3	0,02511	50	120	0,589	11.13	100,898
		100		0,606		
		150		0,628		
		200		0,649		
		250		0,675		
		300		0,695		
Rata-Rata						100,941

4. Pengujian Linearitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Linearitas

Konsentrasi Sampel (ppm)	Serapan Sampel (A)
2	0,160
4	0,248
6	0,324
8	0,416
10	0,529
12	0,619
14	0,679
Slop (b)	0,0673
Aksis intersep (a)	0,0447
Koefisien korelasi (r)	0,9980

Maka diperoleh persamaan regresi: $y = a + bx$

$$y = 0,0447x + 0,0673$$

$$r = 0,9980$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

5. Pengujian Batas Deteksi dan Batas Kuantitas

Tabel. 6. Hasil pengujian Batas Deteksi dan Batas Kuantitas

Blanko	Absorbansi	$y - y'$	$(y - y')^2$
1	0,002	-0,0025	0,00000625
2	0,005	0,0005	0,00000025
3	0,004	-0,0005	0,00000025
4	0,005	0,0005	0,00000025
5	0,003	-0,0015	0,00000225
6	0,007	0,0025	0,00000625
7	0,007	0,0025	0,00000625
8	0,006	0,0015	0,00000225
9	0,006	0,0015	0,00000225
10	0,000	-0,0045	0,00002025
Rata-rata	0,0045		$\Sigma 0,0004250$

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	0,5	0,023
2	0,7	0,060
3	1	0,104
4	1,25	0,155
5	1,5	0,195
6	1,75	0,237
Rata-rata		0,129


$$\text{LOD} = 0,01238 \text{ ppm}$$

$$\text{LOQ} = 0,04128 \text{ ppm}$$

6. Penetapan kadar Ekstrak etanol bunga kasumba turate (*Chartamus tinctorius* L.)

Tabel 7. Hasil uji penetapan kadar sampel dengan konsentrasi 500 ppm

Replikasi	Absorbansi	Bobot Ekstrak (g)
1.	0,527	0,00508
2.	0,528	0,00513
3.	0,513	0,00529



B. Pembahasan

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya.

Penetapan kadar ekstrak etanol bunga kasumba turate dengan menggunakan metode spektrofotometri UV pada panjang gelombang 400-500 nm berdasarkan gugus antara absorbansi dan panjang gelombang.

Menurut International Conference on Harmonization (ICH), ada 10 parameter validasi, diantaranya: presisi, akurasi, batas deteksi, batas kuantitas, spesifisitas, linearitas, kisaran (range), ketahanan, kekasaran, dan kesesuaian kromofor (C=O) yang mampu menyerap sinar ultraviolet yang mengakibatkan terjadinya transisi, spektrum UV terbentuk berdasarkan kolerasi sistem. Unites States Pharmacopeia (USP) telah menyatakan bahwa tidak selamanya parameter untuk mengevaluasi validasi metode harus diuji, sehingga pengujian validasi dari metode analisis ekstrak etanol bunga kasumba turate, hanya 5 parameter yang diuji, yaitu selektifitas, akurasi, presisi, linearitas, batas deteksi, dan batas kuantitas, karena kelima parameter tersebut telah mewakili data yang dibutuhkan untuk uji validasi. Hasil uji validasi dari pengembangan metode analisis ekstrak etanol bunga kasumba turate dapat dinyatakan dalam beberapa parameter, yaitu:

1. Presisi (ketelitian)

Presisi merupakan kedekatan antara hasil pengujian individu dalam serangkaian pengukuran terhadap suatu contoh homogen yang dilakukan pengambilan contoh secara berganda menurut prosedur yang telah ditetapkan.

Hasil pengujian presisi dengan metode spektrofotometri UV menunjukkan kadar rata-rata ekstrak etanol bunga kasumba turate yang diperoleh adalah 100.188%

Hasil pengujian presisi menunjukkan nilai RSD (*Relative Standar Deviation* atau simpangan baku relative) adalah 0,186%. Nilai RSD ini memenuhi persyaratan pada analit dengan konsentrasi 100%, yaitu $< 1,3\%$. Hal ini menunjukkan bahwa metode spektrofotometri memiliki keterulangan yang masih dapat diterima dengan baik.

2. Akurasi (ketepatan)

Pada parameter validasi selanjutnya yaitu akurasi yang dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau (% *recovery*) analit yang ditambahkan. Harmita 2004, menjelaskan bahwa ketepatan pada dasarnya adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi dapat ditentukan dengan 2 cara yaitu metode simulasi (*spiked-placebo recovery*) atau dengan metode penambahan baku (*standart addition method*) seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam metode penambahan baku, dilakukan dengan membuat larutan konsentrasi 1000 ppm dengan 6 kali pengulangan kemudian dibaca absorbansinya setelah penambahan konsentrasi larutan baku 500 ppm kemudian dibuat 3 konsentrasi yang berbeda yaitu 80%, 100%, 120%. Setelah perhitungan maka nilai rata-rata % *recovery* yang diperoleh sebesar 100,941%. Nilai perolehan kembali ini memenuhi persyaratan persen perolehan kembali yaitu 98-102%. Hal ini menunjukkan

bahwa metode analisis penetapan kadar ekstrak etanol bunga kasumba turate dengan spektrofotometri mampu memberikan hasil yang akurat.

3. Linearitas

Linearitas merupakan kemampuan (dalam rentang tertentu) suatu penetapan kadar untuk memperoleh hasil uji, yang sebanding dengan konsentrasi analit dalam contoh.

Hasil analisis regresi berdasarkan metode spektrofotometri diperoleh persamaan linier $y = 0,0447x + 0,0673$ dengan koefisien korelasi (r) 0,998. Koefisien korelasi ini memberikan hasil yang linear karena memenuhi kriteria penerimaan yaitu $\geq 0,98$, koefisien fungsi regresi (V_{x0}) juga merupakan syarat dari linearitas dimana nilainya $< 5\%$ (Harmita, 2004). Hasil V_{x0} dari pengukuran yaitu 4,4714%. sehingga penggunaan metode spektrofotometri UV dapat digunakan untuk analisis dengan hasil yang baik.

4. Batas deteksi dan Baku kuantitas

Batas deteksi adalah konsentrasi analit terendah dalam contoh yang dapat dideteksi, akan tetapi tidak perlu ditentukan secara kuantitatif hingga didapatkan nilai yang persis. Sedangkan batas kuantitas adalah konsentrasi terendah dalam contoh yang dapat diukur secara kuantitatif dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima. Penentuan batas deteksi dan batas kuantitas untuk metode spektrofotometri UV berdasarkan simpangan respon dan kemiringan (*slope*) kurva kalibrasi.


Hasil pengujian batas deteksi untuk metode spektrofotometri terhadap ekstrak etanol bunga kasumba turate menunjukkan nilai limit deteksi sebesar

0,01238 ppm. Hasil pengujian batas kuantitas menunjukkan nilai limit kuantitas sebesar 0,04128.

5. Penetapan kadar Flavonoid dari ekstrak etanol bunga kasumba turate

Penetapan kadar dilakukan dengan membuat konsentrasi sampel 500 ppm untuk 3 replikasi lalu ditambahkan AlCl_3 1,2% dan Kalium Asetat 120 mM kemudian di inkubasi selama 30 menit lalu diukur absorbansinya.

Hasil perhitungan persen rendamen ekstrak etanol bungan kasumba turate yaitu 12,904%. Kadar flavonoid awal (x) dihitung dengan persamaan $y=ax+b$. Sehingga kadar flavonoid total yaitu 19,736 mg/QE/g Ekstrak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan hasil uji Selektivitas, linearitas, presisi, *Limited Of Dection dan Limited Of Quantitation*, akurasi serta penetapan kadar ekstrak etanol bunga kasumba turate dapat dilakukan secara spektrofotometri UV-Vis yang memenuhi syarat dengan nilai koefisien variasi < 2 % yaitu 0,186% koefisien kolerasi 0.998, koefisien fungsi regresi ($Vx0$) < 5 % yaitu 4,0625 %, *Limited Of Dection* sebesar 0,01238 ppm dan *Limited Of Quantitation* sebesar 0,04128 ppm, persen perolehan kembali sebesar 100,941% dan penetapan kadar rata-rata 19,736 mg/QE/g ekstrak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ekstrak etanol bunga kasumba turate telah memenuhi standar validasi.

B. Saran

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka masih perlu dilakukan beberapa penelitian lebih lanjut:

1. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan parameter validasi yang lainnya seperti spesifisitas, rentang, ketahanan, kekerasan, dan kesesuaian sistem untuk melengkapi data parameter validasi metode analisis.
2. Dilakukan uji penetapan kadar ekstrak etanol bunga kasumba turate dengan menggunakan metode lain dan membandingkan hasilnya dengan metode spektrofotometri UV-Vis.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan terjemahannya .

Abd. Muin, Ikhtisar Ilmu Tauhid, Darun Najah, Pengamalan Islam, Yogyakarta 2002

Adikara, I Putu Arya, dkk. *Studi Histopatologi Hati Tikus Putih (Rattus novergicus) yang diberi Ekstrak Etanol Daun Kedondong (Spondias dulcis) secara Oral*. Buletin Veteriner Udayana. ISSN: 2085-2495 Vol. % No. 2. 2013

Ansel. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi keempat*. Jakarta: UI Press. 2005

Anita Tri Handayani, *Validasi Metode dan Penetapan Kadar Flavonoid Total dalam Ekstrak Air Daun Sendok (Plantago mayor L.) Hasil Ekstraksi dengan Perebusan, Ultrasonik dan Microwave*. Surabaya: Skripsi Fakultas Surabaya Universitas Surabaya. 2011

Cai, Luo, Sun, Corke, *Safflowersbook chapter 6*. Review 2003

Day and Underwood. *Analisis Kimia Kuantitatif*, Edisi kelima, perbit ANDI, Yogyakarta. 2002

Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. *Farmakope Indonesia Edisi V*. Departemen kesehatan Republik Indonesia: Jakarta. 2014

Dirjen Pom. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tanama Tumbuhan Obat*. Jakarta: Depkes RI. 2000

Guether. *Minyak Atsiri Tumbuhan Tropika*. Jakarta: UI Press. 1987

Gennaro. *Remingtons Pharmaceutiucal Sciences 18 th ed*. Mack Publ. Co, Easton. 1990

Harbone. *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis*. Bandung: ITB press. 1987

Harmita. Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode dan Cara Perhitungannya. *Majalah Ilmu Kefarmasian* [serial on internet]. 2004 [Dikutip 23 Desember 2016]; vol.1 No.3 Available from: <http://departemenfarmasi-fmipa.com>

Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. Bandung: Penerbit ITB. 1987.

Hukmah. *Metode penelitian kualitatif dan Kuantitatif (5th ed.)* Jakarta: PT Raja. 2007

- Huber L. *Validation of Analytical Methods and Processes*. Marcel Dekker, inc. Germany. 2003. Available as PDF File
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2012
- Khopkar, S. M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI Press 2010.
- Laras Andria Wardani. *Validasi Metode Analisis dan Penentuan Kadar Vitamin C pada Minuman Buah Kemasan dengan Spektrofotometri UV-Visible*. Jakarta: Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Indonesia. 2012
- Lenny. *Senyawa Flavonoida, Fenilpropanida dan Alkaloida*, Karya Ilmiah Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara. 2006
- Li Dajue Hans Henning Munde. *Safflower, Carthamus tinctorius L.* Bioversity Internasional. 1996
- Markham. *Cara Mengidentifikasi Flavonoid*. Bandung: ITB Press. 1988
- Mukhriani. *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Identifikasi Senyawa Aktif*. Makassar: Jurnal Kesehatan Vol. VII No. 2/2014
- Mulja dan suharman. *Aplikasi Analisis spektrofotometri UV-Vis*. Surabaya: Moephiso Grafika, 1990. H. 1, 13-19, 26, 27
- Noviny ramayany. *Validasi Metode Analisis*. Review Journal Unsrat. ISSN: 2302-2493. 156. Januari 2017
- Rahmawati syukur 2012. *Uji Toksisitas Akut Sirup Kasumba Turate pada Tikus Wistar sebagai Prototipe Sediaan Fitofarmaka, Penentuan LD50*. Review Jurnal Fakultas Farmasi Universitas Hasuddin. Makassar 2017
- Rohman, A. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007
- Roth dan Blaschke. *Analisis Farmasi*. Yogyakarta: UGM Press. 2004
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati 2002
- Supriadi. *Tumbuhan Obat Indonesia penggunaan dan Khasiatnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2001
- Sutiadarma. *Analisis Struktur Organik secara Spektroskopi*. Yogyakarta: UGM Press. 2004
- Sutir, Fitriadi. *Analisis Kandungan Senyawa Flavonoid Total dalam Sediaan Cair Kasumba Turate (Carthamus tinctorius L.) Secara Spektrofotometri UV-Vis*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.

Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.

Torbeck L.D., editor. *Pharmaceutical And Medical Decice Validasion By Eksperimantal Design*. Informa healthcare. New york. 2007. P.4

Van der Vosen, H.A.M., Umali, B.E., 2001. "*Plant Resources of South- East Asia: Vegetables oils and fats, Volume 14*, Backhuys Publishers, Leiden, 70-72.


Wijayakusuma, Hembing. *Ramuan Herbal Penurun Kolesterol*. Jakarta: Pusaka Bunda. 2008.




LAMPIRAN I. SKEMA PENGUJIAN

Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius*


L.)




Lampiran 2. Pembuatan Larutan Sampel




Lampiran 3. Pembuatan Larutan Baku Kuersetin




Lampiran 4. Penentuan panjang gelombang maksimum



Lampiran 5. Pembuatan Kurva Baku




Lampiran 6. Pengujian kadar Flavonoid




Lampiran 7. Skema Prosedur Validasi

1. Pengujian presisi




Gambar 1. Skema kerja pengujian presisi metode spektrofotometri Uv terhadap ekstrak kasumba turate.


2. Pengujian Akurasi metode spektrofotometri UV



Gambar 2: skema kerja pengujian akurasi metode spektrofotometri uv terhadap sampel ekstrak etanol kasumba turate



3. Pengujian linearitas, LOD, LOQ metode spektrofotometri UV



Gambar 3: skema kerja pengujian linearitas, batas deteksi, dan batas kuantitas metode spektrofotometri UV terhadap ekstrak etanol kasumba turate

Lampiran 4. Pembuatan Larutan

a. Pembuatan Larutan

1. Pembuatan Larutan Induk

Larutan induk dibuat dengan cara melarutkan 25 mg pembanding dalam 25 ml etanol p.a hingga larut kemudian dicukupkan volumenya dalam labu takar 25 ml hingga tanda batas sehingga diperoleh larutan induk 1000 ppm sebanyak 25 ml.

2. Pembuatan Larutan Standar

Untuk 2 ppm

Larutan induk 10 ppm yang diencerkan menjadi 2 ppm sebanyak 10 ml.

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$10 \text{ ppm} \times V_1 = 2 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{2 \times 10}{10}$$

$$V_1 = 2 \text{ ml}$$

$$V_1 = 2000 \text{ } \mu\text{l}$$

Larutan induk 10 ppm diambil sebanyak 2000 μl dan diencerkan pada labu takar 10 ml sampai tanda batas.

3. Pembuatan Larutan Kalium Asetat 120 mM

$$M = \frac{\text{mol zat terlarut}}{\text{volume larutan}}$$

$$\text{Mol} = \frac{\text{massa zat terlarut}}{\text{Mr zat dalam g/mol}}$$

$$1 \text{ M} = \frac{x}{1 \text{ liter}}$$

$$X = 1 \text{ mol} \rightarrow 0.12 \text{ mM}$$

$$g = M \times B_m \times V$$

$$= 0,12 \times 176,8 \times 0,025$$

$$= 0,5304$$

Kalium asetat diambil sebanyak 0,5304 g dan dilarutkan pada labu takar 25 mL menggunakan aquadest sampai tanda batas.

4. Pembuatan Larutan AlCl_3 1,2 %

AlCl_3 1,2 % dibuat dengan melarutkan 2,5 gram AlCl_3 dengan aquadest hingga volume 25 ml.



LAMPIRAN II PERHITUNGAN KURVA BAKU

Perhitungan Kurva Baku

Konsentrasi Sampel (ppm)	Serapan (A)
2	0,160
4	0,248
6	0,324
8	0,416
10	0,529
12	0,619
14	0,679

Persamaan garis linier $y = ax + b$

$$= 0,0447x + 0,0673$$

$$r = 0,998$$

Gambar kurva baku



LAMPIRAN III

PERHITUNGAN PRESISI METODE SPEKTROFOTOMETRI UV

Tabel 3. Perhitungan Presisi

No	Bobot (mg)	Absorban	$y - y'$	$(y - y')^2$
1	10	0,459	0,0032	0,00001024
2	10	0,458	0,0022	0,00000484
3	10	0,456	0,0002	0,00000004
4	10	0,456	0,0002	0,00000004
5	10	0,454	-0,0018	0,00000324
6	10	0,454	-0,0018	0,00000324
7	10	0,454	-0,0018	0,00000324
Rata-rata		0,4558		
SD		0,00085		$\Sigma 0,00002588$
RSD		0,186%		

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 SD &= \frac{\sqrt{\Sigma(y - y')^2}}{n - 1} \\
 &= \frac{\sqrt{0,00002588}}{6} \\
 &= \frac{0,00508723894}{6} \\
 &= 0,00084787316
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}RSD(KV) &= \frac{SD}{x} \times 100\% \\ &= \frac{0,000847873164}{0,4558} \times 100\% \\ &= 0,186\%\end{aligned}$$

Perhitungan kadar

$$\% \text{ Kadar}_1 = \frac{0,459}{0,455} \times 100\% = 100,879 \%$$

$$\% \text{ Kadar}_2 = \frac{0,458}{0,455} \times 100\% = 100,659 \%$$

$$\% \text{ Kadar}_3 = \frac{0,456}{0,455} \times 100\% = 100,219 \%$$

$$\% \text{ Kadar}_4 = \frac{0,456}{0,455} \times 100\% = 100,219\%$$

$$\% \text{ Kadar}_5 = \frac{0,454}{0,455} \times 100\% = 99,780\%$$

$$\% \text{ Kadar}_6 = \frac{0,454}{0,455} \times 100\% = 99,780\%$$

$$\% \text{ Kadar}_7 = \frac{0,454}{0,455} \times 100\% = 99,780 \%$$

LAMPIRAN IV

PERHITUNGAN AKURASI METODE SPEKTROFOTOMETRI UV

Tabel 4. Perhitungan persen perolehan kembali (% *recovery*)

No	Bobot Sampel (g)	Konsentrasi (ppm)	Baku yang ditambahkan (%)	Absorbansi	Perolehan kembali (mg)	Perolehan kembali (%)
1	0,02510	50	80	0,419	7,45	100,948
		100		0,435		
		150		0,455		
		200		0,470		
		250		0,493		
		300		0,515		
2	0,02515	50	100	0,542	10,32	100,978
		100		0,565		
		150		0,587		
		200		0,601		
		250		0,628		
		300		0,640		
3	0,02511	50	120	0,589	11,13	100,898
		100		0,606		
		150		0,628		
		200		0,649		
		250		0,675		
		300		0,695		
Rata-Rata						100,941

$$\% \text{ recovery} = \frac{(C_p - C_A)}{C^*_A} \times 100\%$$

Keterangan:

C_p = Konsentrasi Sampel

C_A = Konsentrasi Sampel Sebenarnya

C^*_A = Konsentrasi Baku yang ditambahkan

Untuk kadar 100 %

NO	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	50	0,542
2	100	0,565
3	150	0,587
4	200	0,601
5	250	0,628
6	300	0,640
Slop (b)		0,5245
Aksis intersep (a)		0,0004
Koefisien kolerasi (r)		0,9960

Ketika $x = 0$ maka $y = 0,5245$

$$y = 0,0447x + 0,0673$$

$$0,5245 = 0,0447x + 0,0673$$

$$0,5245 - 0,0673 = 0,0447x$$

$$0,4572 = 0,0447 x$$

$$X = \frac{0,4572}{0,0447} = 10,22$$

$$Y = 0,0004 (10,22) + 0,5245$$

$$= 0,004088 + 0,5245$$

$$= 0,528588$$

Sehingga

$$0,528588 = 0,0447 x + 0,0673$$

$$0,528588 - 0,0673 = 0,0447 x$$

$$0,461288 = 0,0447 x$$

$$X = 10,32 \text{ Jadi } \frac{10,32}{10,22} \times 100\% = 100,978 \%$$

LAMPIRAN V

PERHITUNGAN BATAS DETEKSI DAN BATAS KUANTITAS METODE
SPEKROFOTOMETRI

Blanko	Absorbansi	$y - y'$	$(y - y')^2$
1	0,002	-0,0025	0,00000625
2	0,005	0,0005	0,00000025
3	0,004	-0,0005	0,00000025
4	0,005	0,0005	0,00000025
5	0,003	-0,0015	0,00000225
6	0,007	0,0025	0,00000625
7	0,007	0,0025	0,00000625
8	0,006	0,0015	0,00000225
9	0,006	0,0015	0,00000225
10	0,000	-0,0045	0,00002025
Rata-rata	0,0045		$\Sigma 0,0004250$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	0,5	0,023
2	0,7	0,060
3	1	0,104
4	1,25	0,155
5	1,5	0,195
6	1,75	0,237
Rata-rata		0,129

$$y = 0,1744x + 0,0672$$

$$r = 0,999$$

$$SD = \frac{\sqrt{\sum(y - y')^2}}{n - 1}$$

$$= \frac{\sqrt{0,0004250}}{9}$$

$$= \frac{0,0065}{9}$$

$$= 0,00072$$

Batas Deteksi

$$LOD = \frac{3 \times SD}{b}$$

Batas Kuantitas

$$LOQ = \frac{10 \times SD}{b}$$

Keterangan:

SD = simpangan baku respon analitik dari blanko

B = slope

$$LOD = \frac{3 \times 0,00072}{0,0672} = 0,01238 \text{ ppm}$$

$$LOQ = \frac{10 \times 0,00072}{0,0672} = 0,04128 \text{ ppm}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKKASSAR

LAMPIRAN VI

PERHITUNGAN PENETAPAN KADAR FLVONOID TOTAL

1. Perhitungan Persen Rendamen Ekstrak Etanol Kasumba Turate (*Chartamus tinctorius L.*)

$$\text{Persen rendamen ekstrak} = \frac{\text{Berat ekstrak}}{\text{Berat sampel}} \times 100\% = \frac{54,52 \text{ gram}}{500 \text{ gram}} \times 100\% = 12,904 \%$$

2. Perhitungan kadar flavanoid total

- a. Kandungan flavanoid awal (x)

Persamaan linear

$$\begin{aligned} y &= ax + b \\ a &= 0,0447 \\ b &= 0,0673 \\ r &= 0,9961 \\ x &= \frac{y-a}{b} \end{aligned}$$

- b. Replikasi I

$$\begin{aligned} Y &= ax + b \\ 0,527 &= 0,0447x + 0,0673 \\ 0,0447x &= 0,527 - 0,0673 \\ X &= \frac{0,527 - 0,0673}{0,0447} = 10,2841 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

- Replikasi II

$$\begin{aligned} Y &= ax + b \\ 0,528 &= 0,0447x + 0,0673 \\ 0,0447x &= 0,528 - 0,0673 \\ X &= \frac{0,528 - 0,0673}{0,0447} = 10,3131 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

- Replikasi III

$$\begin{aligned} Y &= ax + b \\ 0,513 &= 0,0447x + 0,0673 \\ 0,0447x &= 0,513 - 0,0673 \\ X &= \frac{0,513 - 0,0673}{0,0447} = 9,9776 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

- c. Flavonoid total = $\frac{\text{Volume contoh (L)} \times \text{Konsentrasi Awal (X)} \times \text{Faktor Pengenceran}}{\text{Bobot Ekstrak (g)}}$

$$\text{Replikasi I} = \frac{0,01 \times 10,2841 \times 1}{0,00508 \text{ g}} = 20,244$$

$$\text{Replikasi II} = \frac{0,01 \times 10,3131 \times 1}{0,00513 \text{ g}} = 20,103$$

$$\text{Replikasi III} = \frac{0,01 \times 9,9776 \times 1}{0,00529 \text{ g}} = 18,861$$

Jadi Rata –Rata flavonoid total adalah = $\frac{20,244 + 20,103 + 18,861}{3} = 19,736$
mgQE/g Ekstrak





YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
LABORATORIUM KIMIA FARMASI
FAKULTAS FARMASI



Jl. Urip Sumohardjo km.5 TLp/Fax (0411) 425 618 Makassar 90231

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa peneliti :

Nama : Heriati Alwi

Stambuk : 70100113025

Telah melakukan penelitian dengan judul **Validasi Metode Analisis Flavonoid Dari Ekstrak Bunga Kasumba Turate (*Chartamus tinctorius L.*) secara Spektrofotometer UV-Vis**, pada Laboratorium Kimia Farmasi Universitas Muslim Indonesia.

Makassar, 10 – Agustus – 2017

Kepala Laboratorium Kimia Farmasi UMI

(Zainal Abidin, S.Farm., M.Farm., Apt)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BIOGRAFI PENULIS



Heriati Alwi , lahir di Mallenreng, 30 Maret 1994. Putri Tunggal dari pasangan suami-istri Alwi dan Herlina. Dikenal sebagai anak yang Baik, Penyayang, Supel dan agak terbuka dengan temannya. Ia mengawali sekolahnya di SDN No.76 Baruga Riattang, Kemudian melanjutkan ke MTsN 410 Tanete lalu di SMA Neg. 2 Bulukumba dan sekarang menjadi mahasiswi di UIN Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan program studi Farmasi angkatan 2013. Alasannya memilih UIN Alauddin Makassar untuk menempuh jenjang pendidikan kuliah yaitu karena ingin menjadi seorang yang ahli di bidang Farmasi dan menjadi seorang apoteker handal dikemudian hari yang berakhlak baik tanpa melupakan ajaran- ajaran Islam. Ia tertarik mengambil jurusan Farmasi karena menurutnya Farmasi itu SENI iyyah,, Tepatnya seni meracik obat. Banyak hal dan ilmu yang bisa kita pelajari dari alam dan mengolahnya ke kimiawi serta rasa keingintahuannya yang besar terhadap tumbuh-tumbuhan untuk mengetahui khasiat dan manfaatnya. Anak yang tidak amat Pintar dan tidak amat bodoh-bodoh juga, bisa dibilang standarlah dikalangan pelajar. Hobbynya sangat banyak, tidak bisa diungkapkan satu persatu. Menurutnya hal yang meyenangkan dan bermanfaat bagi dirinya adalah hobbynya.