

**UJI AKTIVITAS HEPATOPROTEKTOR EKSTRAK BIJI BUAH BLIGU
(*Benincasa hispida* (Thunb) Cogn.) TERHADAP TIKUS (*Rattus norvegicus*)
YANG DI INDUKSI PARASETAMOL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FATHANA ARIF
NIM. 70100113016

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**UJI AKTIVITAS HEPATOPROTEKTOR EKSTRAK BIJI BUAH BLIGU
(*Benincasa hispida* (Thunb) Cogn.) TERHADAP TIKUS (*Rattus norvegicus*)
YANG DI INDUKSI PARASETAMOL**



FATHANA ARIF
NIM. 70100113016

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fathana Arif
NIM : 70100113016
Tempat Tanggal Lahir : Tibona, 25 September 1996
Jurusan : Farmasi
Alamat : Jl. Sultan Alauddin II, Mamoa V Lr.3.
Judul : Uji aktivitas hepatoprotektor ekstrak biji buah bligu
(*benincasa hispida* (thunb) cogn.) terhadap tikus (*rattus
norvegicus*) yang di induksi parasetamol

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata-gowa, Juli 2017
Penyusun,

Fathana Arif
NIM. 70100113016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Uji Aktivitas Hepatoprotektor Ekstrak Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) Cogn) Terhadap Tikus (*Rattus norvegicus*) Yang Diinduksi Parasetamol" yang disusun oleh Fathana Arif, NIM: 70100113016, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Agustus 2017 M yang bertepatan dengan 28 Dzulqaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 21 Agustus 2017 M
28 Dzulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)
Sekretaris : Mukhlisani, S.Si., M.Sc., Apt (.....)
Pembimbing I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt (.....)
Pembimbing II : Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt (.....)
Penguji I : Mukhlisani, S.Si., M.Sc., Apt (.....)
Penguji II : Dr. Dudung Abdullah, M.Ag. (.....)

Dekan



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assal mu ‘alaikum warahmatull hi wabarak tuh

Segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan Semesta Alam Maha Pencipta dan Maha Segala Sesuatu. Sebagai hambaNya patutlah kita bersyukur karena telah diberikan banyak kelimpahan dan kenikmatan kepada kita sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa pula tetap terhaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. karena berkatnyalah kita dapat merasakan indahnya Islam dimana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Arifuddin G** dan Ibunda **Darma** yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat keluarga saudaraku tercinta Dwi Pratiwi, Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat

terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Khaerani, S. Farm., M.Farm.Klin., Apt selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Dr. Dudung Abdullah. M.Ag. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberi dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun

Fathana Arif


NIM : 70100113016

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian	6
D. Kajian pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

A. Uraian Tanaman.....	11
B. Uraian Hewan Coba.....	13
C. Uraian Ekstraksi.....	15
D. Uraian Organ Hepar.....	22
E. Enzim Transaminase.....	30
F. Uraian Obat.....	32
G. Tinjauan Islam.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	45
1..Jenis Penelitian.....	45
2..Lokasi Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan.....	45
E. Instrumen Penelitian.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
KEPUSTAKAAN.....	61

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
RIWAYAT HIDUP.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Buah Bligu (<i>Benincasa hispida</i> (Thunb) Cogn.).....	69
Gambar 2	Proses Maserasi	69
Gambar 3	Ekstrak Biji Bligu (<i>Benincasa hispida</i> (Thunb) Cogn.)	70
Gambar 4	Tikus Putih Jantan	70
Gambar 5	Sampel penginduksi.....	71
Gambar 6	Proses pengambilan darah tikus	71
Gambar 7	Darah Tikus	72
Gambar 8	Proses sentrifuge.....	72
Gambar 9	Serum tikus.....	73
Gambar 10	Pemberian secara oral.....	73
Gambar 11	Reagen SGPT	74
Gambar 12	Pengukuran kadar SGPT	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Kerja.....	65
Lampiran 2	Perhitungan Dosis	67
Lampiran 3	Gambar Pengamatan	69
Lampiran 4	Analisis Data	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Biologik tikus	14
Tabel 2	Desain Pembagian Kelompok Percobaan	48
Tabel 3	Data Hasil Pengamatan Kadar SGPT.....	52
Tabel 4	Konversi dosis hewan coba berdasarkan BSA.....	67



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Kenaikan Kadar SGPT	53
----------	---------------------------	----



ABSTRAK

Judul Skripsi : Uji Aktivitas Hepatoprotektor Ekstrak Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (thunb) cogn.) Terhadap Tikus (*Rattus norvegicus*) Yang Di Induksi Parasetamol

Nama Penyusun : Fathana Arif

NIM : 70100113016

Telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas hepatoprotektor ekstrak biji buah bligu (*benincasa hispida* (Thunb) Cogn.) terhadap tikus (*Rattus norvegicus*) yang di induksi parasetamol yang menggunakan parameter kadar enzim SGPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktifitas ekstrak Metanol biji buah bligu (*benincasa hispida* (Thunb) Cogn.) dalam mengobati kerusakan hati dengan konsentrasi tertentu. Biji buah bligu diekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol, kemudian diujikan pada 15 ekor tikus yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok perlakuan yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, kelompok ekstrak 100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB, 400 mg/kgBB yang diinduksi menggunakan parasetamol 2,5 g/kgBB dan diberi terapi selama 7 hari. Pengukuran kadar SGPT dilakukan pada hari pertama sebelum diterapi. setelah diterapi dilanjutkan dengan penginduksian parasetamol yang diberikan bersamaan dengan terapi lanjutan. Hasil penelitian membuktikan bahwa ekstrak metanol biji buah bligu (*benincasa hispida* (Thunb) Cogn.) mempunyai aktivitas hepatoprotektor dimana dosis ekstrak 400mg/kg BB tikus tidak berbeda nyata dengan kenaikan kadar SGPT darah pada pemberian suspensi Curliv®.

Kata kunci : Ekstrak Biji Buah Bligu (*benincasa hispida* (Thunb) Cogn.), Hepatoprotektor, SGPT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Title : Study of Hepaprotective of Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) Cogn.) Seed Extract toward Rats (*Rattus norvegicus*) in Paracetamol-induced

Writer : Fathana Arif

Reg. No : 70100113016

A study was conducted about the activity of Hepaprotective of Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) Cogn.) Seed Extract toward Rats (*Rattus norvegicus*) in Paracetamol-induced which used Serum Glutamate pyruvate transminase (SGPT) parameter. The objectives of this study was to know the activity of methanol extract of *Benincasa hispida* (Thunb) Cogn. in curing hepatotoxicity with certain concentration. Bligu seed was extracted using methanol, then it was tested to 15 rats divided randomly into 5 treatment groups, namely negative control group, positive control group, 100mg/kgBW extracted group, 200mg/kgBW, 400mg/kgBW induced by using 2,5g/kbBW paracetamol and the therapy was given for seven days. Measurement of serum glutamate pyruvate transminase (SGPT) was on the first day before therapy. After therapy, it was continued by giving paracetamol-induced and advanced treatment at the same time. The result of the study proved that methanol extract of bligu seeds (*Benincasa hispida* (Thunb) Cogn.) have hepaprotective effect where the extract at dose of 400mg/kgBW of rat was not significantly compared to curliv suspension in decrease in SGPT levels in the blood.

Keyword: *Bligu seed extract (benincasa hispida* (Thunb) Cogn.), *Hepaprotective, SGP*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit hati menduduki urutan kedelapan penyebab kematian di Indonesia. Menurut Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevalensi hepatitis tahun 2013 (1,2%) dua kali lebih tinggi dibanding tahun 2007. Dikonversrasi ke dalam jumlah absolut penduduk Indonesia tahun 2013 sekitar 248.422.956 jiwa, maka bisa dikatakan bahwa 2.981.075 jiwa penduduk Indonesia terinfeksi.

Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Fungsi hati sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh (Homeostasis). Hati merupakan tempat menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan protein protein tertentu maupun perobakannya yang mengatur pembentukan sel darah merah dan memproduksi garam atau cairan empedu, yang digunakan untuk mengemulsikan lemak dan vitamin yang larut lemak, menetralkan racun racun yang ada dan ikut dalam pembentukan maupun perombakan sel darah merah. Begitu pentingnya hati sehingga kita tak dapat hidup tanpa hati.

Penyakit hati dapat terjadi dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hati antara lain virus, bakteri, toksisitas dari obat-obatan atau bahan kimia (Pasiyan dalam Tuminah, 2009).

Salah satu obat-obatan yang dapat merusak sel dan fungsi hati adalah parasetamol (Pasiyan dalam Tuminah, 2009). Parasetamol bersifat tidak toksik jika

digunakan dalam dosis terapi, tetapi dalam dosis yang berlebihan dan jangka panjang akan menimbulkan nekrosis hati (Zimmerman, 1999). Metabolisme parasetamol di hati menghasilkan metabolit reaktif N-asetil-p-benzokuinonimina (NAPQI) yang menimbulkan kerusakan sel hati. Kelainan yang terjadi pada hati dapat dilihat dari meningkatnya kadar SGPT (serum glutamate piruvat transaminase) dan SGOT (serum glutamate oksaloasetat transaminase). Nekrosis hati terjadi karena interaksi radikal bebas hasil metabolisme obat dan metabolisme tubuh dengan biomolekul penyusun membran sel hati. Interaksi radikal bebas ini menyebabkan perubahan dan merusak membrane sel. Kerusakan sel hati menyebabkan meningkatnya lipid peroksida darah karena lipid peroksida tubuh tidak dapat lagi didetoksifikasi dalam hati.

Penggunaan parasetamol sebagai analgetik dan antipiretik telah dikenal oleh masyarakat umum dan banyak dijual bebas di pasaran. Hal ini menyebabkan masyarakat dapat mengonsumsinya tanpa harus menggunakan resep dokter, selain itu pengetahuan masyarakat mengenai bahaya toksisitas obat masih kurang, terutama bila digunakan dalam dosis berlebihan (Price, 2005; Bera et al., 2012)..

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kesalahan yang biasa terjadi dalam mengkonsumsi parasetamol adalah penggunaan dengan dosis toksik. Karena di masyarakat obat ini digunakan secara luas untuk menghilangkan gejala rasa sakit yang timbul. Hal ini dikarenakan parasetamol merupakan obat bebas yang digunakan secara luas oleh masyarakat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penggunaan yang dapat menyebabkan toksisitas parasetamol cukup besar.

Kerusakan hati dapat dilindungi atau diobati oleh zat yang disebut sebagai hepatoprotektor (Price, 2005; Bera et al., 2012).

Hepatoprotektor didefinisikan sebagai obat yang melindungi hati dari efek yang merugikan dari endogen atau bahkan faktor eksogen dengan mengurangi efek peradangan dan mengurangi perkembangan penyakit. Tanaman obat telah dikenal secara luas dan digunakan sebagai agen hepatoprotektor. Penggunaan obat herbal cukup umum, sebanyak 80% dari populasi dunia dan banyak digunakan oleh negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan obat-obatan herbal secara ekonomi lebih murah karena diperoleh dari sumber daya alam. Banyak literatur menyatakan bahwa obat herbal digunakan dalam penyakit tanpa obat modern untuk mengobati atau sebagai paliatif terapi. Selain itu, orang-orang dalam masyarakat percaya pada keamanan, khasiat, dan efek samping yang minimal setelah pengobatan jangka panjang, berdasarkan tradisi. Hingga saat ini belum ada obat yang secara spesifik mengatasi hepatitis (Gestanovia dan Hendra, 2004), karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan obat alam yang dapat digunakan sebagai hepatoprotektor.

Tanaman *Benincasa hispida* (Thunb) Cogn adalah anggota dari keluarga bernama *Cucurbitaceae*, yang merupakan tanaman berasal dari selatan-timur Asia. *Benincasa hispida* (Thunb) Cogn dikenal dalam berbagai nama yaitu bligu, kundur, melon musim dingin, labu putih, labu abu, lemak labu, labu putih, lilin labu, dan labu melon. Beberapa penelitian sebelumnya telah difokuskan pada komponen biologis aktif yakni aktivitas antioksidan pada jaringan yang berbeda seperti hati dan

otak telah terbukti. Dengan ekstrak yang kaya akan senyawa bioaktif inilah sangat penting untuk pemanfaatan biji *Benincasa hispida* (Thunb) Cogn. Penelitian tentang kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam biji *Benincasa hispida* (Thunb) Cogn telah banyak dilakukan. Sheemole (2016) Dari Analisis fitokimia menggunakan ekstrak metanol ditemukan adanya senyawa karbohidrat, lemak asam, asam organik, asam amino, karotenoid, Flavanoid, Asam fenoli, alkaloid dan terpenoid. Antioksidan yang tinggi yang dimiliki oleh *Benincasa hispida* (Thunb) Cogn dikaitkan dengan kandungan Flavonoid yang terdapat pada biji *Benincasa hispida* (Thunb) Cogn.

Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan mengenai potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Asy-syu'ara / 26;7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أُبْتِنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya:

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.”
(Kementerian Agama RI.2013)

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan didalam Al-Qur'an mengandung suatu zat/ obat yang dapat digunakan

untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt. di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.

Penelitian efek hepatoprotektor dilakukan untuk mengetahui kemampuan ekstrak Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) untuk mencegah atau melindungi hati dari kerusakan. Adapun parameter yang diamati adalah aktivitas enzim *Serum Glutamate Piruvat Transaminase* (SGPT). Pada penelitian ini sebagai indikator kerusakan hati digunakan kadar enzim SGPT. Enzim SGPT merupakan indikator yang sensitif dalam mengenali adanya penyakit pada hati yang bersifat akut. Hal ini disebabkan hepatosit yang rusak atau mati akan melepaskan enzim SGPT ke dalam aliran darah (Chopra, 2001). Enzim SGPT merupakan enzim yang lebih dipercaya dibandingkan SGOT dalam menentukan kerusakan sel hati. Hal ini disebabkan SGPT banyak ditemukan terutama di hati sedangkan SGOT dapat ditemukan selain di hati, seperti di otot jantung, otot rangka, ginjal, pankreas, otak, sel darah merah, dan sel darah putih. Dengan demikian, jika hanya terjadi peningkatan SGOT maka dapat saja yang mengalami kerusakan adalah sel-sel organ lainnya yang mengandung SGOT (Sari et al, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian ini, dimana kita ketahui bahwa antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghilangkan, membersihkan dan menahan efek dari radikal bebas, sehingga hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ekstrak Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) sebagai hepatoprotektor yang dapat dikembangkan sebagai alternatif untuk mencegah atau melindungi hati dari kerusakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Ekstrak Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) sebagai hepatoprotektor pada Tikus (*Rattus norvegicus*) yang diinduksi Parasetamol?
2. Berapa konsentrasi Ekstrak Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) yang memiliki aktivitas hepatoprotektor terhadap Tikus (*Rattus norvegicus*) yang diinduksi Parasetamol?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) adalah anggota dari keluarga bernama *Cucurbitaceae*, yang merupakan tanaman berasal dari selatan-timur Asia. *Benincasa hispida* (Thunb) Cogn Dikenal dalam berbagai nama yaitu bligu, kundur, melon musim dingin, labu putih, labu abu, lemak labu, labu putih, lilin labu, dan labu melon.
- b. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan menarik zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut.
- c. Induksi adalah influensi, imbasan atau yang menyebabkan. Dalam penelitian ini induksi Parasetamol merupakan tindakan atau proses merangsang atau menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGPT.
- d. Hati adalah organ tubuh yang berfungsi dalam menetralkan zat toksik yang masuk dalam tubuh, serta menjadi sasaran peningkatan konsentrasi radikal bebas. Hati

berperan dalam banyak proses tubuh, diantaranya memproduksi berbagai protein penting, memproses dan menyimpan nutrisi, menghancurkan toksin dan racun.

- e. Parasetamol (asetaminofen) merupakan obat analgetik non narkotik dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di Sistem Syaraf Pusat (SSP). Parasetamol tergolong analgesik non-narkotik yang hanya mempunyai sedikit efek anti-inflamasi, tetapi banyak digunakan sebagai analgesik ringan dan dapat diabsorpsi dengan baik secara peroral.
- f. SGPT (*Serum Glutamic Pyruvic Transaminase*) adalah Enzim yang mengkatalis pemindahan satu gugus amino antara lain dan asam alfa ketoglutarat. Enzim SGPT merupakan indikator yang sensitif mengenali adanya penyakit pada hati yang bersifat akut
- g. Hepaprotektor didefinisikan sebagai obat yang melindungi hati dari efek yang merugikan dari endogen atau bahkan faktor eksogen dengan mengurangi efek peradangan dan mengurangi perkembangan penyakit.
- h. Kontrol Positif adalah perlakuan atau variabel independent yang mendukung hipotesis
- i. Kontrol Negatif adalah tanpa dilakukannya perlakuan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah laboratorium murni yang meliputi penggunaan bahan alam yang diujikan pada hewan coba.

D. Kajian Pustaka

Silaban, GPC Sarai. Institut Pertanian Bogor. 2012. Dengan judul “Uji aktivitas hepatoprotektor ekstrak air pegagan (*Centella asiatica*) terhadap tikus putih jantan yang diinduksi parasetamol”. Dalam penelitian ini diperoleh hasil formula ekstrak air pegagan pada F16 memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga kelangsungan hepatosit normal dan memulihkan hepatosit yang mengalami kerusakan yang ditandai dengan penurunan nilai enzim SGPT, SGOT setelah diinduksi parasetamol. Penulis kemudian menjadikan penelitian ini sebagai salah satu dasar penggunaan parasetamol sebagai penginduksi untuk meningkatkan kadar enzim SGPT, SGOT sehingga terjadi kerusakan hati.

Wan Saidatul Syida Wan Kamaruddin et al (2012) dengan judul penelitian “Evaluasi *In-Vitro* Antioksidan dan Aktivitas antimikroba dari Berbagai Bagian *Benincasa hispida* (Thunb) cogn.”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak labu lilin merupakan salah satu sumber antioksidan alami. Di antara bagian-bagian ini, ekstrak biji dari buah ini menunjukkan sifat antioksidan yang sangat kuat dalam semua *in vitro* antioksidan. Tes yang dilakukan (DPPH, FRAP, dan -Karoten tes bleaching).

Maheswar.S et al (2008) dengan judul penelitian “ Hepatoprotective Activity of “*Orthosiphon stamineus*” on Liver Damage Caused by Parasetamol in Rats”. Dalam penelitian penggunaan parasetamol sebagai penginduksi untuk melihat kadar kerusakan hati digunakan parasetamol sebesar 2,5 g. Hal ini menjad landasan peneliti untuk menggunakan parasetamol sebesar 2.5 g sebagai penginduksi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak Metanol Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) sebagai Hepatoprotektor pada Tikus (*Rattus norvegicus*) yang diinduksi Parasetamol dengan parameter Enzim SGPT.
- b. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak Metanol Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) yang optimal memiliki aktivitas hepatoprotektor terhadap Tikus (*Rattus norvegicus*) yang diinduksi Parasetamol dengan parameter Enzim SGPT.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah tentang manfaat dari Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) sebagai Hepatoterapi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu tanaman yang mengandung ekstrak Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) dapat dijadikan alternatif pengobatan pada pasien yang mengalami gangguan hati.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah tentang manfaat Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) sebagai hepatoprotektor.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi Tanaman

Kingdom	: Plantae (tumbuhan)
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Subkelas	: Dilleniidae
Ordo	: Cucurbitales
Familia	: Cucurbitaceae
Genus	: Benincasa
Spesies	: <i>Benincasa hispida</i> (Thunb) Cogn

2. Nama Daerah Tanaman

Kundo (Aceh); Gundur (Gayo); Kudul (Simalur); Undru (Nias); Kundue (Minangkabau); Sardak (Lampung); Butong (Dayak); Baligo, Leyor (Sunda); Baligo (Jawa); Bhaligu, Kondur (Madura); Kunrulu (Bugis); Laha (Irian).

3. Morfologi

Tanaman bligu merupakan salah satu jenis tanaman yang berasal dari jenis keluarga tanaman labu-labuan (*Cucurbitaceae*). Tanaman bligu ini hidupnya menjalar atau merambat pada tanah atau tanaman lain. Tanaman bligu batangnya ini lunak berbulu dan berwarna hijau. Tanaman bligu berdaun tunggal, berbentuk bulat dengan

tepian rata, ujung daun tumpul sedangkan pada bagian pangkal membulat dengan ukuran panjang 10-17 cm dan lebar 9-15 cm. Daun tanaman bligu berwarna hijau. Bunga tanaman bligu ini tunggal berkelamin dua, bunganya tumbuh pada ketiak daun. Mahkota bunga tanaman bligu ini berbulu halus dan berwarna kuning. Buah tanaman bligo ini termasuk buah buni, berbentuk bulat lonjong memanjang, berdaging dengan ukuran 15-20 cm, berwarna hijau keputihan. Biji tanaman bligu berbentuk bulat telur berwarna putih kekuningan dan berbentuk pipih. Akar tanaman bligu ini akarnya tunggang berwarna putih kecoklatan. Tanaman bligo ini berkembang biak menggunakan biji. Habitat tanaman bligu ini berada di ketinggian 1 – 1500 meter di atas permukaan laut. Tanaman bligu menyukai tanah yang bertekstur kering dengan sinar matahari yang cukup tinggi.

4. Manfaat Tanaman

Sifat khas Manis, mendinginkan, dan membersihkan paru. Berkhasiat sebagai hemostatik, diuretik, dan ekspektoran. Biji bligo digunakan untuk mengobati batu ginjal, demam, kencing manis, melembutkan kulit, radang paru, radang usus, sembelit, tonik, dan wasir. Buahnya berkhasiat mengatasi disentri, panas dalam, peradangan organ bagian dalam, dan sebagai tonik.

5. Kandungan Kimia

Metabolit yang terdapat pada buah bligu yaitu flavonoid, asam fenolik, terpenoid, alkaloid, kumarin, sterol. Tanaman ini memiliki senyawa tinggi akan flavonoid dari biji dan daging buahnya. Kandungan flavonoid paling banyak ditemukan di seluruh kerajaan tanaman. Flavonoid memiliki peran penting dan

beragam sebagai metabolit sekunder. Flavonoid mempunyai berbagai aktivitas biologis meliputi: anti-inflamasi, anti-oksidan, anti-bakteri, anti-virus, anti-alergi. Selain itu flavonoid juga memiliki peran langsung sebagai fungsi antibiotik yang memiliki target spektrum yang luas dan senyawa tersebut memiliki kemampuan melawan bakteri Gram positif dan Gram negatif.

B. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Tikus (Ruedas, 2008).

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Kelas	: Mammalia
Ordo	: Rodentia
Subordo	: Sciurognathi
Famili	: Muridae
Subfamili	: Murinae
Genus	: <i>Rattus</i>
Spesies	: <i>Rattus norvegicus</i>

2. Karakteristik Tikus

Tikus yang digunakan secara luas untuk penelitian di laboratorium adalah tikus putih yang berasal dari Asia Tengah. Terdapat beberapa galur yang memiliki kekhususan tertentu antara lain galur sprague-dawley yang berwarna albino putih berkepala kecil dan ekornya lebih panjang daripada badannya dan galur wistar yang ditandai dengan kepala besar dan ekor lebih pendek.

Tikus terutama yang muda memiliki jaringan lemak berwarna coklat di bagian leher sampai scapula yang jumlahnya berkurang setelah 14 dewasa. Tikus dapat dikandang bersama dalam satu kelompok besar yang terdiri dari jantan dan betina dari berbagai tingkat tanpa terjadinya perkawinan. Tikus dapat hidup lebih dari tiga tahun dan produktif untuk berkembangbiak selama lebih dari sembilan bulan atau sampai usia satu tahun.

Tabel 1. Data biologik tikus (Harmita & Radji, 2006)

- Konsumsi pakan per hari	5 g/100 g bb
- Konsumsi air minum per hari	8-11 ml/100 g bb
- Diet protein	12%
- Ekskresi urine per hari	5,5 ml/100 g bb
- lama hidup	2,5- 3 tahun
- Bobot badan dewasa	
Jantan	300-400 g
Betina	250-300 g
- Bobot lahir	5-6 g
-Dewasa kelamin (jantan=betina)	50+10 hari
- Siklus estrus (menstruasi)	5 hari (polyestrus)
- Umur sapih	21 hari, 40-50 g
- Mulai makan pakan kering	12 hari
- Rasio kawin	1 jantan – 3 atau 4 betina
- Jumlah kromosom	42
- Suhu rektal	37,5°C
- Laju respirasi	85 x/mn
- Denyut jantung	300 – 500 x/mn

- Pengambilan darah maksimum	5,5 ml/Kg
- Jumlah sel darah merah (Erytrocyt)	7,2-9,6 X 10 ⁶ /μl
- Kadar hemoglobin (Hb)	15,6 g/dl
- Pack Cell Volume (PCV)	46%
- Jumlah sel darah putih (Leucocyte)	14 10 ³ /μl

C. Uraian Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian atau penarikan komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, biota laut dengan pelarut organik tertentu (Dirjen POM, 1986).

Dari hasil ekstraksi diperoleh ekstrak. Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Dirjen POM, 1979).

2. Mekanisme Kerja Ekstraksi

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan berdifusi keluar sel dan proses ini

berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antar konsentrasi zat aktif di dalam sel dan di luar sel (Dirjen POM 1986).

Pada proses ekstraksi dapat dibedakan menjadi 2 fase yaitu :

- a. Fase pembilasan. Pada saat cairan ekstraksi kontak dengan material simplisia maka sel-sel yang rusak atau tidak utuh lagi akibat proses penghalusan langsung bersentuhan dengan bahan pelarut. Dengan demikian komponen sel yang terdapat di dalamnya lebih mudah diambil atau dibilas. Oleh karena itu, dalam fase pertama ekstraksi ini, sebagian bahan aktif telah berpindah ke dalam bahan pelarut.
- b. Fase ekstraksi. Yang lebih kompleks adalah proses selanjutnya oleh karena bahan pelarut untuk melarutkan komponen dalam sel harus mampu mendesak masuk lebih dahulu kedalamnya. Membran sel yang mengering, mengkerut di dalam simplisia mula-mula harus diubah kondisinya sehingga memungkinkan bahan pelarut masuk ke dalam sel. Hal itu terjadi melalui pembengkakan, dimana membran mengalami pembesaran volume akibat masuknya sejumlah molekul bahan pelarut. Dengan mengalirnya bahan pelarut ke dalam ruang sel, protoplasma akan membengkak dan bahan kandungan sel akan terlarut sesuai dengan tingkat kelarutannya. Bahan kandungan sel akan terus masuk ke dalam cairan di sebelah luar sampai difusi melintasi membran mencapai keseimbangan yakni pada saat konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel sama (Voight.R, 1995).

3. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, biota laut, dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara didalam dan diluar sel mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Harbone, 1987).

Tujuan ekstraksi secara umum terdapat empat situasi :

- a. Secara kimia telah diketahui identitasnya untuk diekstraksi dari organisme. Dalam kasus ini, prosedur yang telah dipublikasikan dapat diikuti dan dibuat modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuaikannya dengan kebutuhan pemakai.
- b. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu, misalnya: alkaloid, flavanoid, atau saponin meskipun struktur kimia walaupun dari senyawa ini, metode umum yang digunakan untuk senyawa kimia yang diminati dapat diperoleh dari pustaka.
- c. Organisme (tanaman atau hewan) digunakan dalam pengobatan tradisional dan biasanya dibuat dengan bebrbagai cara misalnya *TradisionalChinese Medicine*

(TCM) sering kali membutuhkan herba yang dididihkan dalam air dan dekok dalam air untuk diberikan sebagai obat. Proses ini harus ditiru sedekat mungkin jika ekstrak akan melalui kajian ilmiah biologi atau kimia lebih lanjut, khususnya jika tujuannya untuk memvalidasi penggunaan tradisional.

d. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara apapun. Situasi ini (umumnya dalam program skrining) dapat timbul jika tujuannya adalah menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau berdasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa dengan aktivitas biologi tertentu (Alam. G. Rhim. A, 2008 : 11-12).

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara kering. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin yaitu dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Sudjadi, 1988: 60).

Pada dasarnya metode ekstraksi ada beberapa macam di antaranya yaitu maserasi (perendaman), perkolasi, digesti, infusi, dan dekoksifikasi. Ekstraksi dilakukan dengan pelarut organik dengan kepolaran yang semakin meningkat secara berurutan. Pelarut yang digunakan harus memenuhi syarat tertentu yaitu tidak toksik, tidak meninggalkan residu, harga murah, tidak korosif, aman, dan tidak mudah meledak (Wientarsih & Prasetyo, 2006).

4. Maserasi

Maserasi adalah cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif

di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari. Pada penyarian dengan cara maserasi, perlu dilakukan pengadukan. Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel (Dirjen POM, 1986). Hasil maserasi (maserat) diupkan pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50°C hingga konsistensi yang dikehendaki (Dirjen POM, 1979).

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol atau pelarut lain. Bila cairan penyari yang digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat ditambahkan bahan pengawet, yang diberikan pada awal penyarian (Fachruddin, 2001: 20).

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna (Fachruddin, 2001: 21).

Pada penyarian dengan cara maserasi, perlu dilakukan pengadukan. Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan

larutan di luar sel. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu. Waktu tersebut diperlukan untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan penyari seperti malam dan lain-lain.

Maserasi dapat dilakukan modifikasi misalnya:

1) Digesti

Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40° - 50° C. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap panas.

Dengan pemanasan akan memperoleh keuntungan antara lain:

- a. Kekentalan pelarut akan berkurang, yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas.
- b. Daya melarutkan cairan penyari akan meningkat, sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan.
- c. Koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan, hingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Umumnya kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan.
- d. Jika cairan penyari mudah menguap pada suhu yang digunakan, maka, perlu dilengkapi dengan pendingin balik, sehingga cairan penyari yang menguap akan kembali ke dalam bejana (Fachruddin, 2001: 21).

2) Maserasi dengan mesin pengaduk

Penggunaan mesin pengaduk yang berputar terus menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam (Fachruddin, 2001: 21).

3) Remaserasi

Cairan penyari dibagi 2. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah diempas tuangkan dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua (Fachruddin, 2001: 21).

4) Maserasi Melingkar

Maserasi dapat diperbaiki dengan menguasai agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Keuntungan cara ini:

- a. Aliran cairan penyari mengurangi lapisan batas.
- b. Cairan penyari akan didistribusikan secara seragam, sehingga akan memperkecil kepekatan setempat.
- c. Waktu yang diperlukan lebih pendek.

5) Maserasi Melingkar Bertingkat

Pada maserasi melingkar penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat (M.M.B.) (Fachruddin, 2001: 21).

5. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (*exhaustive extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetapan/penampungan ekstrak) yang jumlahnya 1-5 bahan (Dirjen POM, 1995:12-15).

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang organik pada sampel sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersama-sama pelarut. Tetapi efektifitas dari proses ini hanya akan lebih besar senyawa organik yang sangat mudah larut dalam pelarut yang digunakan (Darwis,2000).

6. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

7. Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

8. Infusa

Infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur pengas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98° C).

9. Dekok

Dekok adalah infusa pada waktu yang lebih lama (>30° C) dan temperatur sampai titik didih air (Ditjen POM,2000: 10).

D. Uraian Organ Hepar

1. Anatomi Hepar

Hati mempunyai bentuk seperti piramida dengan alasnya disebelah kanan dan puncaknya di ujung kiri. Facies diaphragmatica terletak tepat di bawah kubah diaphragm dan merupakan suatu kesatuan lengkungan dari facies anterior, superior,

lateral dan posterior. Permukaan yang menghadap ke inferior berhubungan dengan alat-alat viscera abdomen, disebut facies viceralis. Facies visceralis berbatasan dengan facies diaphragma di depan pada batas yang tajam, disebut margo anterior. Namun tumpul di belakang dan disebut facies posterior (Widjaja, 2009).

Hati terbagi dengan adanya perlekatan ligamentum falciforme hepatis menjadi lobus kanan yang besar dan lobus kiri yang lebih kecil. Pada permukaan visceralis, dengan adanya lekuk (*fossa*) sagittalis kanan dan kiriserta porta hepatis, terpisah dari lobus kanan dua lobus kecil, yaitu lobus quadratus di depan dan lobus caudatus di belakang (Widjaja, 2009).

Hati mempunyai dua jenis persediaan darah, yaitu yang datang melalui arteri hepatica dan yang melalui vena porta. Arteri hepatica merupakan pembuluh darah yang keluar dari aorta dan memberikan seperlima darahnya kepada hati, darah ini mempunyai kejenuhan oksigen 95-100%. Vena porta terbentuk dari vena lienalis dan vena mesentrika superior, menghantarkan empat perlima darahnya ke hati, darah ini mempunyai kejenuhan oksigen hanya 70% sebab beberapa O₂ telah diambil limpa dan usus. Darah dari vena porta membawa zat makanan yang telah diabsorpsi mukosa usus halus ke hati (Pearce, 2009).

Hepar merupakan kelenjar tubuh yang paling besar, beratnya antara 1000-1500 gram, kurang lebih 25% berat badan orang dewasa dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks dan ruwet. Hepar terdiri dari dua lobus utama, kanan dan kiri. Lobus kanan dibagi menjadi segmen anterior dan

posterior, lobus kiri dibagi menjadi segmen medial dan lateral oleh ligament falsiformis yang dapat dilihat dari luar. Setiap lobus merupakan bentuk heksagonal yang terdiri atas lembaran sel hepar berbentuk kubus yang tersusun radial mengelilingi vena sentralis. Diantara sel hepar terdapat kapiler yang dinamakan sinusoid, yang merupakan cabang vena porta dan arteria hepatica. Sinusoid tidak seperti kapiler lain, dibatasi oleh sel fagositik atau sel Kupffer. Sel Kupffer merupakan sistem retikuloendotelial dan mempunyai fungsi utama menelan bakteri dan benda asing lain dalam tubuh. Hanya sumsum tulang yang mempunyai masa sel retikuloendotelial yang lebih banyak daripada hepar. Jadi hepar merupakan salah satu organ utama sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan bakteri dan agen toksik (Dharmawati, 2012).

Hepar mendapat darah dari dua macam peredaran darah yaitu vena porta dan arteria hepatica. Vena porta menerima aliran darah dari saluran cerna, limpa dan pankreas. Darah vena porta ini berbeda dengan darah vena lain karena:

- a. Tekanan sedikit lebih tinggi, untuk mengatasi tekanan pada sinusoid hepar
- b. Oksigen lebih tinggi, karena aliran darah splanknikus ini relative lebih banyak
- c. Mengandung lebih banyak zat makanan
- d. Mengandung banyak sisa-sisa bakteri dari saluran pencernaan.

Volume total darah yang melalui hati 1.200-1.500 mL tiap menit dan dialirkan melalui vena hepatica kanan dan kiri yang mengosongkannya ke vena kava inferior (Dharmawati, 2012).

Darah dari lambung dan usus dialirkan terlebih dahulu ke hati melalui vena porta sebelum diedarkan ke sistem sirkulasi. Dengan demikian hati menjadi organ pertama yang berhadapan dengan berbagai materi yang diingesti tubuh seperti sari-sari makanan, vitamin, logam, obat-obatan, dan toksikan yang berasal dari lingkungan. Serangkaian proses fisiologis yang terjadi di sel-sel hati mengekstraksi materi-materi tersebut dari darah untuk selanjutnya dikatabolisme, disimpan, atau diekskresikan melalui getah empedu (Corwin, 2010).

2. Fungsi Hepar

Hepar adalah organ viseral (dalam rongga abdomen) terbesar yang terletak di bawah kerangka iga. Pada kondisi hidup, hati berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah dan kaya nutrient dari vena portal dan vena hepatica.

Fungsi hepar adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Metabolik

Metabolisme asimilasi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan produksi energi. Seluruh monosakarida akan diubah menjadi glukosa. Pengaturan glukosa dalam darah terjadi di hati. Pembentukan asam lemak dan lipid serta pembentukan fosfolipid terjadi di hepar. Metabolisme protein serta pembentukan albumin dan globulin juga terjadi di hepar.

b. Fungsi Ekskretori

Produksi empedu oleh sel hepar (bilirubin, kolesterol, dan garam empedu), kedalam empedu juga diekskresikan zat yang berasal dari luar tubuh seperti logam-logam berat, bermacam zat warna, dan lain-lain.

c. Fungsi Pertahanan Tubuh

Detoksikasi racun siap untuk dikeluarkan, melakukan fagositosis terhadap benda asing langsung membentuk antibodi. Bila hepar rusak, maka berbagai racun akan meracuni tubuh. Beberapa macam cara mendetoksikasikan racun misalnya: pembentukan urea dari amoniak atau zat beracun dioksidasi (dikeluarkan) direduksi (dipindahkan) dihidrolisis (pemecahan) dengan zat-zat yang lain untuk mengurangi toksik dari racun tersebut.

d. Pengaturan dalam Peredaran Darah

Berperan membentuk darah dan heparin di hati dan mengalirkan darah ke jantung. Dalam hepar, sel darah merah akan rusak karena terdapat sel-sel Retikulo Endotelium Sistem (RES). Perusakan ini juga terjadi dalam limpa dan sum-sum tulang.

e. Hepar membentuk Asam Empedu

Terutama dari kolesterol membentuk pigmen-pigmen empedu terutama dari hasil perusakan hemoglobin (Syarifuddin, 2009).

f. Penyimpanan Vitamin

Hepar mempunyai kecenderungan tertentu untuk menyimpan vitamin dan telah lama diketahui sebagai sumber vitamin yang baik untuk pengobatan pasien. Vitamin yang terbanyak disimpan dalam hati adalah vitamin A, tetapi sejumlah besar vitamin D dan B1-2 dalam keadaan normal juga disimpan. Kecuali besi dalam hemoglobin darah, sebagian besar besi tubuh biasanya disimpan di hati dalam bentuk ferritin. Sel hati berisi sejumlah besar protein yang disebut apoferritin yang dapat

bergabung dengan besi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, maka besi akan berikatan dengan apoferritin membentuk ferritin dan disimpan dalam bentuk ini sampai diperhatikan. Hati membentuk berbagai bahan yang sangat diperlukan untuk proses pembekuan darah. Bahan–bahan tersebut adalah fibrinogen protrombin dan beberapa faktor pembekuan lainnya.

g. Fungsi Sintesis

Sintesis adalah penyusunan atau pembuatan suatu senyawa dari zat atau molekul yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Fungsi sintesis hati antara lain pembuatan protein dan lipoprotein plasma (Smeltzer, 2011).

3. Kerusakan Pada Hepar

Kerusakan hati dapat berupa perlemakan hati, nekrosis, kolestatis dan sirosis hati (Cotran & Robbins, 2011).

a. Perlemakan Hepar(Steatosis)

Perlemakan hepar adalah penumpukan lemak lebih dari 5% pada organ hepar. Penyebab perlemakan hepar terdiri dari dua faktor utama. Pertama berhubungan dengan peningkatan kadar asam lemak bebas dalam plasma yang terjadi akibat mobilisasi lemak dari jaringan adiposa atau dari hidrolisis triasilgliserol lipoprotein oleh lipase sensitif hormon di jaringan ekstrahepatik. Pembentukan VLDL (*Very Low Density Lipoprotein*) tidak dapat mengimbangi meningkatnya influx dan esterifikasi asam lemak bebas sehingga terjadi penumpukan triasilgliserol yang menyebabkan perlemakan hepar. Kedua, karena adanya penghambat metabolik dalam

produksi lipoprotein plasma sehingga terjadi penimbunan triagilgliserol (Cotran & Robbins, 2011).

b. Nekrosis Hepar

Nekrosis merupakan kematian sel hati yang ditandai dengan rusaknya struktur lobulus hepar. Manifestasi dari toksikan yang berbahaya dapat menimbulkan nekrosis. Perubahan biokimia yang terjadi bersifat kompleks dan berbagai hepatotoksikan bekerja melalui berbagai mekanisme. Mekanisme terjadinya nekrosis diantaranya hepatotoksikan secara kovalen mengikat protein dan lipid tidak jenuh dan menyebabkan peroksidasi lipid.

c. Kolestasis

Kolestasis merupakan kerusakan hati yang bersifat akut disebabkan karena aktivitas ekskresi empedu pada membran kanalikuli biliaris. Penyakit kolestasis lebih jarang ditemukan dibandingkan dengan perlemakan hepar dan nekrosis.

d. Sirosis Hepar

Sirosis ditandai oleh adanya septa kolagen yang tersebar di sebagian hati. Kumpulan hepatosit muncul sebagai nodul yang dipisahkan oleh lapisan seberat ini. Beberapa karsinogen kimia dan pemberian CCl₄ jangka panjang dapat menyebabkan sirosis pada hewan. Pada manusia penyebab sirosis yang paling penting adalah konsumsi kronis minuman beralkohol. Mekanisme penyakit hati akibat konsumsi alkohol masih belum pasti, diperkirakan mekanismenya yaitu sel hati mengalami fibrosis dan destruksi protein yang berkepanjangan akibat metabolisme alkohol yang menghasilkan acetaldehyde. Fibrosis yang terjadi merangsang pembentukan kolagen.

Regenerasi sel tetap terjadi tetapi tidak dapat mengimbangi kerusakan sel. Penimbunan kolagen terus berlanjut, ukuran hati mengecil, berbenjol-benjol dan mengeras sehingga terjadi sirosis hati (Baradero & Siswandi, 2010).

Berdasarkan zona kerusakannya, kerusakan lobulus hati akibat jejas toksik dapat dibedakan menjadi tiga zona kerusakan yaitu :

Zona I: Terletak mulai dari daerah periportal. Zona ini memiliki perfusi oksigen yang tinggi karena dekat dengan pembuluh darah. Karena alasan tersebut pembentukan CCl_3O_2 banyak terjadi di sini, tetapi karena zona ini memiliki kadar enzim glutathion yang tinggi, kerusakan hepatosit akibat CCl_3O_2 sedikit terjadi.

Zona II: Daerah diantara zona 1 dan 2

Zona III: Zona ini terletak di sekitar vena sentralis. Daerah ini memiliki kadar alkohol dehidrogenase dan enzim sitokrom P450 yang tinggi, sehingga kerusakan hepatosit banyak terjadi di sini (Goldfrank, 2002).

4. Evaluasi Kerusakan Hepar

- a. Patologi makroskopik warna dan penampilan sering dapat menunjukkan sifat toksisitas, seperti perlemakan hepar atau sirosis. Biasanya berat organ merupakan petunjuk yang sangat peka dari efek pada hepar. Dalam kasus tertentu peningkatan berat hepar merupakan kriteria paling peka untuk toksisitas.
- b. Pemeriksaan mikroskopik cahaya dapat mendeteksi berbagai jenis kelainan histologi seperti perlemakan, nekrosis, sirosis, nodul hiperplastik dan neoplasia. Mikroskopi elektron dapat mendeteksi perubahan dalam berbagai struktur subset.

Pengamatan perubahan subset, serta penemuan biokimia, sering berguna untuk menggambarkan cara kerja toksikan.

- c. Uji biokimia beberapa enzim serum sebagai indikator kerusakan hepar, bila terjadi kerusakan hepar, enzim ini dilepaskan ke dalam darah dari sitosol dan organel sebasei, seperti mitokondria, lisosom dan nukleus. Enzim tertentu meningkat dengan nyata pada keadaan kolestatik, tetapi hanya meningkat sedikit pada nekrosis hati. Pemeriksaan berbagai enzim serum terutama enzim transaminase yang terdiri dari enzim SGPT dan SGOT, terbukti paling praktis sebagai indikator untuk mengukur banyaknya kerusakan hati. Enzim serum lain yang digunakan untuk menilai penyakit hati adalah bilirubin serum, urobilinogen, alkali fosfat dan -nukleotidase.
- d. Sifat toksisitas umumnya hepatotoksikan mengganggu struktur membran retikulum endoplasma, menurunkan kandungan sitokrom P-450, menurunkan aktivitas metabolisme obat, dan meningkatkan jumlah rantai samping asli jenuh (Sacher & Mc Person, 2002).

E. Enzim Transaminase

Transaminase adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari suatu asam amino kepada asam amino yang lain. Dalam reaksi transaminase ini gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari tiga senyawa keto, yaitu asam piruvat, oksaloasetat dan α -ketoglutarat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Enzim transaminase di dalam serum tidak

mempunyai fungsi, karena di dalam serum tidak terdapat koenzim serta substrat yang tepat. Enzim transaminase yang terdapat dalam serum merupakan indikator terjadinya kerusakan jaringan pada penyakit tertentu (Sacher & Mc Person. 2002).

Hepar sendiri mampu mensekresikan enzim-enzim transaminase disaat sel-selnya mengalami gangguan. Kadar transaminase yang tinggi biasanya menunjukkan kelainan dan nekrosis hati. Enzim-enzim tersebut masuk dalam peredaran darah. Transaminase merupakan indikator yang peka pada kerusakan sel-sel hati (Husadha, 1996). Enzim-enzim tersebut adalah:

1. *Serum Glutamat Oksaloasetat Transminase (SGOT)/ Aspartat Amino Transminase (AST)*

AST adalah enzim mitokondria yang juga ditemukan dalam hati, jantung, ginjal, dan otak (Widmann, 1995). Bila jaringan tersebut mengalami kerusakan yang akut, kadarnya dalam serum meningkat. Diduga hal ini disebabkan karena bebasnya enzim intraseluler dari sel-sel yang rusak ke dalam sirkulasi. Kadar yang sangat meningkat terdapat pada nekrosis hepatoseluler atau infark miokard (Hadi, 1995).

AST melakukan reaksi antara asam aspartat dan asam-ketoglutamat (Widmann, 1995). AST berada dalam sel parenkim hati. AST meningkat pada kerusakan hati akut, tetapi juga terdapat dalam sel darah merah dan otot skelet. AST berfungsi untuk mengubah aspartat dan asam-ketoglutamat menjadi oksaloasetat dan glutamat. Terdapat 2 isoenzim, yaitu AST 1 merupakan isoenzim sitosol yang terutama berada dalam sel darah merah dan jantung. Kemudian AST 2 merupakan isoenzim mitokondria yang predominan dalam sel hati. Kadar normal dalam darah

10-40 μ /liter. Meningkat tajam ketika terjadi perubahan infark miokardium (Sacher dan McPerson, 2002).

2. *Serum Glutamat Piruvat Transminase (SGPT) / Alanin Amino Transferase (ALT)*

Enzim ini mengkatalisis pemindahan 1 gugus amino antara lain alanin dan asam alfa ketoglutarat. Terdapat banyak di hepatosit dan konsentrasinya relatif rendah di jaringan lain. Kadar normal dalam darah 5-35 U/liter dan ALT lebih sensitif dibandingkan AST (Sacher dan McPerson, 2002).

Kadar SGPT dan SGOT serum meningkat pada hampir semua penyakit hati. Kadar yang tertinggi ditemukan dalam hubungannya dengan keadaan yang menyebabkan nekrosis hati yang luas, seperti hepatitis virus yang berat, cedera hati akibat toksin, atau kolaps sirkulasi yang berkepanjangan. Peningkatan yang lebih rendah ditemukan pada hepatitis akut ringan demikian pula pada penyakit hati kronik difus maupun lokal (Podolsky dan Isselbacher, 2000). Kadar mendadak turun pada penyakit akut, menandakan bahwa sumber enzim yang masih tersisa habis. Kalau kerusakan oleh radang hati hanya kecil, kadar SGPT lebih dini dan lebih cepat meningkat dari kadar SGOT (Widmann, 1995).

F. Uraian Obat

Parasetamol (asetaminofen) merupakan obat analgetik non narkotik dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di Sistem Syaraf Pusat (SSP). Parasetamol digunakan secara luas di berbagai negara baik dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgetik-antipiretik maupun kombinasi dengan obat lain dalam

sediaan obat flu, melalui resep dokter atau yang dijual bebas. (Lusiana Darsono, 2002).

Parasetamol sebagai antipiretik akan bekerja saat terjadi demam dengan merusak kemampuan pyrogen dalam meningkatkan temperatur sebagai pusat ermoregulasi tubuh di otak (hipotalamus anterior), sehingga temperatur tubuh akan turun melalui, pengeluaran keringat dan vasodilatasi kutaneus. (Hsu, 2008).

Parasetamol dapat merusak hati bila dikonsumsi manusia pada dosis tunggal 10 sampai 15 gram (Utami dan Masjhoer, 2006). Dosis parasetamol diatas 10 gram pada manusia menyebabkan nekrosis hati yang parah hingga menyebabkan kematian. Kejadian hepatotoksik parasetamol tergantung dari dosis yang diberikan (Mutschler, 1999).

Beberapa efek menguntungkan mengenai pemberian parasetamol di atas tentunya perlu disertai dengan pemberian dosis yang tepat atau dosis yang menyembuhkan. Menurut Imani dkk. (2014) parasetamol cukup aman dikonsumsi oleh manusia pada dosis antara 2-3 g/hari. *Food and Drug Administration* (FDA) (2011) menjelaskan bahwa pemberian parasetamol tidak boleh melebihi dari 4 g/hari pada manusia. Dosis terapeutik parasetamol untuk tikus Wistar adalah 63 mg/kg BB, yang diperoleh dari hasil konversi dosis terapeutik pada manusia, namun penelitian tersebut hanya membahas tentang efek analgesik dari respon yang diamati dan tidak spesifik pada perubahan histopatologis hati tikus Wistar (Pandey dkk., 2013). Pemberian parasetamol dalam dosis berlebih memungkinkan terjadinya hepatotoksik (Neal, 2006; Hardman dan Limbird, 2007). Gejala dini dari kerusakan hati meliputi

mual, muntah, diare, dan nyeri abdomen selain itu kerusakan ginjal tanpa kerusakan hati juga pernah dilaporkan meskipun dalam dosis biasa pada manusia (Katzung, 2007). Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (2006) lethal dosis parasetamol LD50 2.400 mg/kg BB peroral yang menimbulkan hepatotoksik berupa nekrosis lobulus sentral hati dan kerusakan pada ren berupa nekrosis tubulus ginjal akut (Hardman dan Limbird, 2007; Katzung, 2007). Menurut Rini dkk. (2013) dosis tunggal parasetamol 1.350 mg/kg BB akan memberikan efek hepatotoksik. Dosis parasetamol 1.350 mg/kg BB juga memberikan efek berupa degenerasi parenkim, degenerasi hidropik, dan nekrosis sel hati pada tikus Wistar (Utami dan Masjhoer, 2006).

Parasetamol, mempunyai daya kerja analgetik dan antipiretik sama dengan asetosal, meskipun secara kimia tidak berkaitan. Tidak seperti Asetosal, Parasetamol tidak mempunyai daya kerja antiradang, dan tidak menimbulkan iritasi dan pendarahan lambung. Sebagai obat antipiretika, dapat digunakan baik Asetosal, Salsilamid maupun Parasetamol.

Diantara ketiga obat tersebut, Parasetamol mempunyai efek samping yang paling ringan dan aman untuk anak-anak. Untuk anak-anak di bawah umur dua tahun sebaiknya digunakan Parasetamol, kecuali ada pertimbangan khusus lainnya dari dokter. Dari penelitian pada anak-anak dapat diketahui bahwa kombinasi Asetosal dengan Parasetamol bekerja lebih efektif terhadap demam daripada jika diberikan sendiri-sendiri. (Sartono 1996)

Parasetamol telah lama diketahui mempunyai mekanisme yang sama dengan aspirin oleh karena persamaan struktur kedua zat tersebut. Parasetamol bekerja menghambat enzim cyclooxygenase (COX) sehingga dapat mengurangi produksi prostaglandin, yang terlibat di dalam proses demam dan sakit. Bagaimanapun, ada perbedaan penting antara efek aspirin dan parasetamol. Aspirin mengandung prostaglandin yang berperan di dalam proses peradangan, tetapi parasetamol tidak dapat berfungsi sebagai antiinflamasi. Selain itu, aspirin bekerja menghambat enzim COX yang tidak dapat diubah, secara langsung menghalangi lokasi aktif enzim dan mempunyai efek merugikan pada lapisan perut. Parasetamol secara tidak langsung menghalangi enzim COX sehingga menjadi tidak efektif terhadap peroksida. Hal ini menyebabkan parasetamol menjadi efektif bekerja pada susunan saraf pusat dan sel endotel, tetapi bukan pada platelet dan sel imun yang mempunyai tingkat peroksida tinggi (Katzung, 2010).

1. Farmakokinetik

Parasetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu $\frac{1}{2}$ jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam (Freddy, 2007). Parasetamol sedikit terikat dengan protein plasma dan sebagian dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati dan diubah menjadi asetaminofen sulfat dan glukuronida, yang secara farmakologi tidak aktif (Katzung, 1997).

2. Farmakodinamik

Parasetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga juga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Efek analgetiknya serupa salisilat yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol merupakan penghambat biosintesa PG yang lemah. Efek iritasi, erosi, dan perdarahan lambung tidak terlihat dengan obat ini, demikian juga gangguan pernapasan dan keseimbangan asam basa (Freddy, 2007).

3. Efek Samping

Reaksi alergi terhadap parasetamol jarang terjadi, manifestasinya berupa eritem atau urtikaria dan gejala yang lebih berat berupa demam dan lesi pada mukosa (Freddy, 2007). Pada dosis terapi, kadang-kadang timbul peningkatan ringan enzim hati dalam darah tanpa disertai ikterus; keadaan ini reversibel bila obat dihentikan (Katzung, 1997). Pada penggunaan kronis dari 3-4 g sehari dapat terjadi kerusakan hati, pada dosis di atas 6 g mengakibatkan nekrose hati yang tidak reversibel (Tjay, 2002).

Parasetamol merupakan salah satu obat yang paling sering menyebabkan kematian akibat keracunan (self poisoning). Toksisitas parasetamol terjadi pada penggunaan dosis tunggal 10 sampai 15 gram (150 sampai 250 mg/kg BB); dosis 20 sampai 25 gram atau lebih kemungkinan menyebabkan kematian (Goodman dan Gilman, 2008; Wilmana dan Gunawan, 2007). Sedangkan dosis toksik untuk mencit atau LD50 mencit adalah 6,76 mg/20 gr BB mencit (Wishart dan Knox, 2006). Akibat dosis toksik yang paling serius adalah nekrosis hati, walaupun nekrosis tubuli

renalis dan koma hipoglikemik juga dapat terjadi. Sekitar 10% pasien yang mengalami keracunan yang tidak mendapatkan penanganan khusus mengalami kerusakan hati yang parah; sebanyak 10-20% di antaranya akhirnya meninggal karena kegagalan fungsi hati. Gagal ginjal akut juga terjadi pada beberapa pasien (Goodman dan Gilman, 2008).

4. Dosis

Oral: dewasa tiap 3-4 jam 325-650 mg, maksimum 4 g sehari. Untuk anak: 10-20 mg/kgBB/dosis per oral/1x pemberian, maksimal 5x pemberian/ hari atau 80 mg/kgBB/hari (Chan dan Gennrich, 2004).

5. Interaksi

Parasetamol memperkuat daya kerja antikoagulansia, antidiabetika oral, dan metotreksat. Efek obat encok probenesid dan sulfinpirazon berkurang bila disertai dengan penggunaan parasetamol, begitu pula dengan diuretika furosemid dan spironolakton. Kerja analgetiknya diperkuat oleh antara lain kodein dan d-propoksifen. Penggunaan alkohol disertai parasetamol akan meningkatkan resiko perdarahan lambung usus. Karena efek antitrombotiknya yang mengakibatkan perdarahan meningkat, penggunaan parasetamol perlu dihentikan satu minggu sebelum pencabutan gigi (Tjay, 2002).

6. Mekanisme Hepatotoksik Parasetamol

Pemberian parasetamol secara oral dengan penyerapan yang cepat dan hampir sempurna di saluran pencernaan. Penyerapan dihubungkan dengan tingkat

pengosongan lambung, dan konsentrasi dalam plasma mencapai puncak dalam 30 sampai 60 menit (Katzung, 2002). Waktu paruh dalam plasma 1 sampai 3 jam setelah dosis terapeutik dengan 25% parasetamol terikat protein plasma dan sebagian dimetabolisme enzim mikrosom hati (Wilmana dan Gunawan, 2007). Hati merupakan tempat metabolisme utama parasetamol. Di dalam hati, 60% dikonjugasikan dengan asam glukuronat, 35% asam sulfat, dan 3% sistein; yang akhirnya menghasilkan konjugat yang larut dalam air serta diekskresi bersama urin. Jalur konjugasi pertama (terutama glukuronidasi dan sulfasi) tidak dapat digunakan lagi ketika asupan parasetamol jauh melebihi dosis terapi dan sebagian kecil akan beralih ke jalur sitokrom P450 (Goodman dan Gilman, 2008).

Metabolisme melalui sitokrom P450 membuat parasetamol mengalami N-hidroksilasi membentuk senyawa antara, N-acetyl-para-benzoquinoneimine (NAPQI), yang sangat elektrofilik dan reaktif. Pada keadaan normal, senyawa antara ini dieliminasi melalui konjugasi dengan glutathione (GSH) yang berikatan dengan gugus sulfhidril dan kemudian dimetabolisme lebih lanjut menjadi suatu asam merkapturat yang selanjutnya diekskresi ke dalam urin. Ketika terjadi overdosis, kadar GSH dalam sel hati menjadi sangat berkurang yang berakibat kerentanan sel-sel hati terhadap cedera oleh oksidan dan juga memungkinkan NAPQI berikatan secara kovalen pada makromolekul sel, yang menyebabkan disfungsi berbagai sistem enzim (Goodman dan Gilman, 2008). Ikatan kovalen dengan makromolekul sel

terutama pada gugus tiol protein sel dan kerusakan oksidatif juga merupakan patogenesis utama terjadinya nefropati analgesik (Cotran *et al.*, 2007; Neal, 2006).

Rangkaian metabolisme minor parasetamol ini dapat menyebabkan efek merugikan. Pengurangan GSH secara tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya stres oksidatif akibat penurunan proteksi antioksidan endogen (antioksidan enzimatis), yang juga dapat menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid (Maser *et al.*, 2002). Peroksidasi lipid merupakan suatu proses autokatalisis yang mengakibatkan kematian sel. Produk akhir peroksidasi lipid di dalam tubuh adalah malondialdehid (MDA) yang dapat menyebabkan kematian sel akibat proses oksidasi berlebihan dalam membran sel (Mayes, 2008; Winarsi, 2007). Selain itu, reaksi pembentukan NAPQI akibat detoksifikasi oleh sitokrom P450 memacu terbentuknya radikal bebas superoksida (O_2^-) yang dinetralkan oleh superoksida dismutase (SOD) menjadi H_2O_2 , suatu Reactive Oxygen Species (ROS) (Ojo *et al.*, 2006). Namun, melalui reaksi Haber-Weiss dan Fenton, adanya logam transisi seperti Cu dan Fe akan membentuk radikal hidroksil yang sangat berbahaya yang akan menghancurkan struktur sel (Winarsi, 2007).

7. Dosis Toksik

Parasetamol dosis 140 mg/kg pada anak-anak dan 6 gram pada orang dewasa berpotensi hepatotoksik. Dosis 4g pada anak-anak dan 15g pada dewasa dapat menyebabkan hepatotoksitas berat sehingga terjadi nekrosis sentrolobuler hati. Dosis lebih dari 20g bersifat fatal. Pada alkoholisme, penderita yang mengkonsumsi obat-

obat yang menginduksi enzim hati, kerusakan hati lebih berat, hepatotoksik meningkat karena produksi metabolit meningkat.

G. Tinjauan Islam

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan.

Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ 26: 7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Kementerian Agama RI.2013)

Kata *ila* pada firman-Nya di awal ayat ini: awalam yara ila al-aradh, apakah mereka tidak melihat ke bumi, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2010: 11).

Kata *zauj* berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah yang terhampar di

bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangan dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu ayat di atas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak melihat, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Shihab, 2010: 11-12).

Kata *karim*, antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2010: 12).

Dari ayat tersebut dapat dipahami adanya perintah kepada manusia untuk memperhatikan bumi, yang mana dapat diartikan sebagai perintah untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari tumbuhan yang ada tersebut. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit. Ayat ini membuktikan keniscayaan keesaan Allah swt., karena aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaannya konsisten (Shihab, 2002).

Kaum musyrikin enggan percaya dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan apakah mereka tidak melihat ke bumi, yakni mengarahkan pandangan sepanjang, seluas, dan seantero bumi, berapa banyak kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat (Shihab 2002).

Untuk dapat mengetahui tentang pengobatan terhadap penyakit maka dibutuhkan penelitian-penelitian terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah swt baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan dan lainnya. Firman Allah swt dalam QS Al-Yunus/10 : 101

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman". (Kementerian Agama RI.2013)

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan dengan mata, kepala dan hati masing-masing tentang makhluk atau sistem kerja yang ada di langit dan di bumi. Sungguh banyak yang dapat kamu perhatikan satu diantaranya saja. Bila kamu menggunakan akalmu yang dianugerahkan Allah swt, sudah cukup untuk mengantarkan kamu semua beriman dan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Dia Maha Esa dan dia membimbing manusia antara lain melalui para nabi guna mengantar mereka ke jalan bahagia (Shihab 2002).

Allah swt. memberi pengarahan kepada hamba-hamba-Nya untuk berfikir tentang nikmat-nikmat-Nya dan dalam apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-ayat yang agung untuk orang-orang yang mempunyai akal. Apa yang Allah turunkan darinya berupa hujan, maka ia menghidupkan bumi setelah matinya, mengeluarkan darinya pohon-pohon dan buah-buahan, tanaman-tanaman, bung-bunga dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Apa yang Allah ciptakan padanya dari binatang-binatang yang beragam bentuk, warna dan manfaatnya (Abdullah, 2004).

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh Allah swt atas hamba-hambaNya. Sesungguhnya dibalik musibah adalah hikmah yang bermanfaat bagi manusia, dan Allah swt menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dari kesalahan mereka apabila mereka ikhlas dengan rasa sakit yang dialaminya.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ 26: 80.

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.” (Kementerian Agama RI.2013)

Ayat tersebut disandarkan penyakit kepada dirinya (Nabi Ibrahim as.), sekalipun hal itu merupakan qadar, qadha dan ciptaan Allah. Akan tetapi, ia sandarkan hal itu kepada dirinya sebagai sikap beradab. Makna hal itu berarti, jika aku menderita sakit, maka tidak ada seorang pun yang kuasa menyembuhkanku selain-

Nya sesuai takdirNya yang dikarenakan oleh sebab yang menyampaikannya (Abdullah, 2004).

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk terus berusaha dan yang menentukan hasilnya adalah Allah swt. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang kita dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu dengan menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Biasanya setelah berobat ada yang langsung sembuh dan ada pula yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Ini berarti masalah kesembuhan suatu penyakit tergantung pada ridha dan izin Allah swt.

Rasulullah saw bersabda, dalam hadis Abu Hurairah r.a :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari).

Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap yang diciptakan oleh-Nya diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena setiap penyakit pasti ada obatnya yang menjadi penawarnya agar penyakit itu dapat sembuh.

Dalam penelitian ini, maka ditemukanlah buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) Cogn) yang memiliki efek hepatoprotektor yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana pengobatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara eksperimental.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Praktikum Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Eksperimen.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi : Tanaman Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) dari desa Tibona Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba, Sulawesi Selatan.

2. Sampel : Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) dari desa Tibona Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba, Sulawesi Selatan.

D. Metode pengumpulan data Dan Teknik Pengolahan

1. Metode Pengumpulan Data

a. Pengambilan dan Penyiapan Sampel

Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) yang digunakan diperoleh dari desa Tibona Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumpa, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memetik. Buah yang diambil adalah buah yang tua dan sehat. Buah yang sudah dipetik kemudian dibelah untuk memisahkan biji dari buahnya. Biji yang telah dipisahkan dari buahnya kemudian dibersihkan dengan cara mencuci menggunakan air mengalir, kemudian dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung. Setelah itu, sampel yang telah dikeringkan kemudian diserbukkan dan disimpan dalam toples. sampel siap untuk diekstraksi.

b. Ekstraksi Sampel

Sebanyak 1 kg sampel Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) diekstraksi dengan metode Maserasi. Sampel dimasukkan kedalam wadah maserasi, kemudian dibasahi dengan pelarut metanol hingga semua simplisia terbasahi, diaduk kemudian ditambahkan kembali metanol hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring. Dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari metanol yang baru. Hal ini dilakukan selama 3x24 jam. Selanjutnya, ekstrak cair yang diperoleh kemudian diuapkan pelarutnya menggunakan *rotary evaporator* sehingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak yang diperoleh ditimbang dengan menggunakan neraca analitik.

c. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Coba

Hewan coba yang digunakan adalah Tikus jantan (*Rattus norvegicus*) yang sehat dan aktivitas normal, bobot badan antara 180-200 g. Tikus jantan diadaptasikan dalam kandang selama 7 hari, Adaptasi dilakukan untuk menghindari resiko timbulnya stress yang dapat mempengaruhi kandungan serum darah. Selama masa adaptasi, Tikus jantan hanya diberi pakan standar dan belum diberi perlakuan apa-apa. Pada akhir masa adaptasi dilakukan analisis serum pada kelima kelompok perlakuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan normal aktivitas enzim SGPT.

d. Pembuatan Koloidal NaCMC 1%

Sebanyak 100 ml aquadest, dimasukkan Na-CMC sebanyak 1 gram sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan pengaduk elektrik dengan suhu 70°C hingga terbentuk larutan koloid.

e. Pembuatan Suspensi Parasetamol

Suspensi parasetamol dibuat dengan menimbang 14,97 g lalu ditambahkan NaCMC 1% sebanyak 50 ml dan diaduk hingga homogen.

f. Pembuatan Suspensi Curliv®

Suspensi Curliv® dibuat dengan menimbang 83,45 mg lalu ditambahkan NaCMC 1% sebanyak 10 ml dan diaduk hingga homogen.

g. Pembuatan Suspensi Ekstrak Metanol Biji Buah Bligu

Suspensi yang dibuat adalah suspensi ekstrak metanol Biji Buah Bligu dengan dosis 100 mg, 200 mg dan 400 mg. Cara pembuatan larutan ekstrak metanol biji buah

bligu adalah sebanyak 100 mg ekstrak Biji Buah Bligu ditimbang lalu disuspensikan dengan NaCMC 1% sebanyak 20 ml kemudian diaduk hingga homogen. Dilakukan hal yang sama untuk pembuatan suspensi ekstrak etanol Biji Buah Bligu dengan menimbang ekstrak metanol Biji Buah Bligu masing-masing 200 mg, dan 400 mg.

h. Rancangan penelitian

Rancangan penelitian ini adalah *The pre and Post Test Control Group Design*.

Metode hepatoprotektor dilakukan selama 11 hari.

Tabel 2. Desain Pembagian kelompok percobaan

KLP	Perlakuan (hari ke-)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KN								+	+	+	-
KP	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥+	¥+	¥+	-
KU 1								+	+	+	-
KU 2								+	+	+	-
KU3	μ	μ	μ	μ	μ	μ	μ	μ+	μ+	μ+	-

Keterangan :

KN : Kontrol Negatif

KP : Kontrol Positif

KU 1 : Kelompok Uji 1

KU 2 : Kelompok Uji 2

KU 3 : Kelompok Uji 3

- : tanpa diberi perlakuan apapun

¥ : NaCMC

¥ : Curliv®


: Ekstrak Biji Buah bligu dosis rendah

: Ekstrak Biji Buah bligu dosis sedang

μ : Ekstrak Biji Buah bligu dosis tinggi

: Parasetamol

 : Pengambilan sampel darah untuk uji SGPT

 : Terminasi, Pengambilan sampel darah untuk uji SGPT

1. KN : sebagai kontrol negatif yang diinduksi NaCMC 1% selama 7 hari berturut-turut kemudian dilanjutkan pemberian Parasetamol selama 3 hari berturut. Darah dianalisa pada hari 1, 8 dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT
2. KP : Sebagai kontrol positif merupakan kontrol positif yang pemberian obat Curliv® yang disuspensikan dalam NaCMC 1% selama 7 hari berturut-turut kemudian dilanjutkan pemberian induksi Parasetamol selama 3 hari berturut. Darah dianalisa pada hari 1, 8 dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT.
3. KU 1 : merupakan perlakuan dengan pemberian ekstrak Biji Buah 100 mg/kg BB mencit yang disuspensikan dalam NaCMC 1% sebanyak 2 ml selama 7 hari berturut-turut kemudian dilanjutkan pemberian induksi Parasetamol selama 3 hari berturut. Darah dianalisa pada hari 1, 8 dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT.
4. KU 2 : merupakan perlakuan dengan pemberian ekstrak Biji Buah 200 mg/kg BB mencit yang disuspensikan dalam NaCMC 1% sebanyak 2 ml selama 7 hari berturut-turut kemudian dilanjutkan pemberian induksi

Parasetamol selama 3 hari berturut. Darah dianalisa pada hari 1, 8 dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT.

5. KU 3 : merupakan perlakuan dengan pemberian ekstrak Biji Buah 400mg/kg BB mencit yang disuspensikan dalam NaCMC 1% sebanyak 2 ml selama 7 hari berturut-turut kemudian dilanjutkan pemberian induksi Parasetamol selama 3 hari berturut. Darah dianalisa pada hari , 8 dan 11 untuk mengamati aktivitas SGPT.

Bahan yang akan diujikan diantaranya: ekstrak Biji Buah Bligu, Parasetamol, NaCMC dan Curliv®. Cara pemberian dilakukan secara peroral (p.o) menggunakan sonde oral yang dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut. Pada hari ke 8 dilakukan pengukuran kadar SGPT dengan menggunakan *human analyzer* setelah sebelumnya dipuasakan selama 16-18 jam . Semua kelompok selanjutnya diinduksikan dengan parasetamol dengan dosis 2,5 g/kg BB tikus selama 3 hari berturut-turut, kemudian dilakukan pengukuran kadar SGPT pada hari ke 11 dengan menggunakan *human analyzer* setelah sebelumnya dipuasakan selama 16-18 jam.

2. Teknik pengolahan Data

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan *software SPSS* dengan uji *One Way ANOVA*.

E. Instrumen Penelitian

1. Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan adalah batang pengaduk, corong, gelas piala, gelas ukur, human analyzer (microlab 300), kandang, sonde oral, mikropipet (Memmert), tip mikropipet, neraca analitik (Sartorius), sendok tanduk, seperangkat alat refluks, seperangkat alat rotavapor, sentrifuge (Termo scientific), toples, tabung eppendorf dan timbangan O'hauss.

2. Bahan Penelitian

Adapun bahan yang digunakan antara lain aquadest, aluminuim foil, NaCMC, Curliv®, Biji Buah Bligu, metanol, kapas, kertas saring, kertas timbang, pakan mencit, Parasetamol, pereaksi SGPT dan Tikus (*Rattus norvegicus*).


BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Ekstrak Metanol Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) sebagai hepatoprotektor yang diujikan pada hewan coba, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Data Hasil Pengamatan Kadar SGPT

Perlakuan	Replikasi	Pengukuran			% Kenaikan
		SGPT U/L Kadar Normal : 18,5 - 45			
		Awal	Terapi	Terapi+Induksi	
NaCMC 1%	1	25.2	24.8	102.5	313%
	2	30.4	29.3	107.3	266%
	3	33.1	30.4	109.2	259%
Curliv®	1	31.8	30.2	43.8	45%
	2	27.2	26.4	40.2	52%
	3	33.4	30.9	35.8	16%
Dosis Ekstrak 100 mg	1	28.4	26.5	87.3	229%
	2	32.6	30.7	90.8	196%
	3	26.8	26	80.2	208%
Dosis Ekstrak 200 mg	1	27.3	24.4	53.2	118%
	2	30.4	29.3	60.7	107%
	3	28.3	26.5	48.2	82%
Dosis Ekstrak 400 mg	1	32.4	30.1	40.8	36%
	2	30.7	29.8	41	38%
	3	26.3	25.4	37.1	46%



Grafik 1. Grafik Kenaikan Kadar SGPT

B. Pembahasan

Hati merupakan organ aksesoris pada sistem digesti sekaligus kelenjar terbesar dalam tubuh (Akers dan Denbow, 2008). Pada hewan tikus, hati terletak di bagian kanan pada region epigastrikus, tepat di belakang dari diafragma. Hati terdiri atas lobus-lobus dan setiap lobus terbagi menjadi lobulus-lobulus (Rogers dan Dintzis, 2012). Setiap lobulus merupakan badan heksagonal dengan ukuran 0,7 x 2 mm yang terdiri atas sel-sel parenkim hati (hepatosit), vena sentralis, sinusoid, cabang-cabang vena porta, cabang-cabang arteri hepatica, sel Kupffer, duktus empedu, buluh darah limfatik, dan saraf (Dancygier, 2010).

Fungsi hati bersangkutan dengan metabolisme tubuh, khususnya mengenai pengaruhnya atas makanan dan darah. Hati merupakan pabrik kimia terbesar dalam tubuh dalam hal bahwa ia menjadi “pengantara metabolisme”. Artinya ia mengubah

zat makanan yang diabsorpsi dari usus dan yang disimpan disuatu tempat di dalam tubuh, guna dibuat sesuai untuk pemakaiannya di dalam jaringan. Hati juga mengubah zat buangan dan bahan racun untuk dibuat mudah untuk ekskresi kedalam empedu dan urin (Evelyn, 2009).

Evaluasi kerusakan hati, dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan melakukan uji biokimia serum sebagai indikator kerusakan hati. Pemeriksaan berbagai enzim serum terutama enzim transaminase yang terdiri dari enzim SGPT dan SGOT, terbukti paling praktis sebagai indikator untuk mengukur banyaknya kerusakan hati. Uji enzim sering menjadi satu-satunya petunjuk adanya cedera sel pada penyakit dini hati atau lokal. Dua enzim Transaminase yang paling sering diukur pada penyakit hati yaitu *Serum Glutamate Oxaloacetic Transaminase* (SGOT) dan *Serum Glutamic Pyruvic Transaminase* (SGPT).

Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)/ Alanin Aminotransferase (ALT) adalah Enzim yang mengkatalis pemindahan satu gugus amino antara lain alanin dan asam alfa ketoglutarat. Terdapat banyak di hepatosit dan konsentrasinya relatif rendah di jaringan lain. Kadar normal dalam darah 5-35 U/L dan ALT lebih sensitif dibandingkan AST (Sacher dan McPerson, 2011).

Pada penelitian ini, digunakan sampel Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn). Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) ini dibuat dalam bentuk simplisia sebelum diolah menjadi ekstrak. Bahan ini diperoleh dari Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Biji Buah Bligu segar disortasi basah dengan tujuan untuk memisahkan bahan dari bahan yang

tidak dibutuhkan, setelah itu dilakukan pencucian dengan menggunakan air mengalir untuk membersihkan kotoran yang melekat pada Biji. Lalu dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung, karena jika terpapar sinar matahari langsung dapat merusak senyawa kimia. Tujuan dari pengeringan yaitu untuk mengurangi kadar air dalam bahan sehingga tidak dapat ditumbuhi mikroba. Setelah simplisia kering kemudian dilakukan lagi sortasi kering. Tujuan dari sortasi kering ini adalah agar simplisia tidak tercampur dengan bahan yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi kemurnian ekstrak. Setelah itu dilakukan penghalusan untuk memperluas permukaan simplisia sehingga cairan penyari dapat menarik komponen kimia dengan cepat.

Sampel yang telah kering selanjutnya diekstraksi dengan metode maserasi. Metode maserasi digunakan karena metode ini merupakan metode dengan cara dingin yang digunakan untuk mengekstraksi simplisia termasuk kandungan yang tidak tahan pemanasan. Maserasi dilakukan dengan cara merendam simplisia sebanyak 1 kg dalam cairan penyari metanol.

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi didalam dan diluar sel. Filtrat yang dihasilkan dirotavapor pada suhu 600 C agar ekstrak menjadi pekat dan kental. Kemudian ekstrak ditimbang dan diperoleh bobot ekstrak sebesar 14,8703 gram. Selanjutnya ekstrak kental di simpan dalam

eksikator yang berisi silika gel yang telah aktif yang dapat menyerap uap air dan mencegah rusaknya ekstrak.

Selanjutnya dilakukan pengujian pada hewan coba untuk melihat efek hepatoprotektor dari ekstrak Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) Pada penelitian ini digunakan tikus putih jantan (*Rattus norvegicus*) sebagai hewan coba. Adapun alasan digunakan tikus sebagai hewan coba dikarenakan tikus tidak bersifat fotofobik, aktivitasnya tidak terganggu oleh manusia, lebih tenang, lebih besar, relatif resisten terhadap infeksi. Penggunaan tikus jantan dikarenakan tikus jantan mempunyai kecepatan metabolisme yang lebih cepat dan kondisi biologi yang relatif stabil dibanding tikus betina. Tikus yang akan digunakan terlebih dahulu diadaptasi selama 1 minggu yang bertujuan untuk mengkondisikan hewan dengan suasana laboratorium.

Dalam penelitian ini untuk menginduksi kerusakan hati digunakan parasetamol dosis toksik (2,5 g/kgBB). Parasetamol dimetabolisme melalui sitokrom P450 membuat parasetamol mengalami N-hidroksilasi membentuk senyawa antara, N-acetyl-para-benzoquinoneimine (NAPQI), yang sangat elektrofilik dan reaktif. Pada keadaan normal, senyawa antara ini dieliminasi melalui konjugasi dengan glutathione (GSH) yang berikatan dengan gugus sulfhidril dan kemudian dimetabolisme lebih lanjut menjadi suatu asam merkapturat yang selanjutnya diekskresi ke dalam urin. Apabila mengkonsumsi parasetamol pada dosis tinggi, glutathione akan mengalami deplesi sekitar 90% sehingga konsentrasi metabolit toksik ini menjadi jenuh. NAPQI yang berada dalam keadaan bebas akan berikatan dengan

makromolekul protein pada membran hepatosit sehingga menyebabkan kerusakan membran sel hati. Sel-sel hepatosit akan pecah sehingga enzim golongan aminotransferase seperti ALT atau SGPT dan AST atau SGOT yang terdapat dalam sel hepatosit akan keluar dan masuk aliran darah di sekitar vena sentralis sehingga terjadi kenaikan aktivitas enzim SGPT dan SGOT melebihi normal (Cooper, 2010).

Pada penelitian ini sebagai indikator kerusakan hati digunakan kadar enzim SGPT. Enzim SGPT merupakan indikator yang sensitif dalam mengenali adanya penyakit pada hati yang bersifat akut. Hal ini disebabkan hepatosit yang rusak atau mati akan melepaskan enzim SGPT ke dalam aliran darah (Chopra, 2001). Enzim SGPT merupakan enzim yang lebih dipercaya dibandingkan SGOT dalam menentukan kerusakan sel hati. Hal ini disebabkan SGPT banyak ditemukan terutama di hati sedangkan SGOT dapat ditemukan selain di hati, seperti di otot jantung, otot rangka, ginjal, pankreas, otak, sel darah merah, dan sel darah putih. Dengan demikian, jika hanya terjadi peningkatan SGOT maka dapat saja yang mengalami kerusakan adalah sel-sel organ lainnya yang mengandung SGOT (Sari et al, 2008).

Dalam penelitian ini digunakan 15 ekor tikus putih jantan (*Rattus norvegicus*) dengan berat 180-200 gram yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok perlakuan. kelompok I terapi dengan NaCMC 1 % kemudian diinduksi dengan Parasetamol, kelompok II terapi dengan Curliv® yang disuspensikan kedalam NaCMC 1 % kemudian dilanjutkan dengan induksi Parasetamol, kelompok III terapi dengan ekstrak 100 mg/kkBB yang disuspensikan kedalam NaCMC 1 % kemudian dilanjutkan dengan induksi Parasetamol, kelompok IV terapi dengan ekstrak 200 mg/kkBB yang

disuspensikan kedalam NaCMC 1 % kemudian dilanjutkan dengan induksi Parasetamol, kelompok V terapi dengan ekstrak 400 mg/kkBB yang disuspensikan kedalam NaCMC 1 % kemudian dilanjutkan dengan induksi Parasetamol.

Sebelum diberi perlakuan, hewan coba dipuasakan selama 12 jam kemudian dilakukan pengambilan darah melalui vena lateralis untuk mengukur kadar SGPT awal. Selanjutnya pada hari ke 8 setelah pemberian terapi ekstrak metanol Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) selama 7 hari berturut-turut kemudian diukur kembali kadar SGPT. Kemudian pada hari ke 11 setelah terapi ekstrak metanol Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) dan diinduksikan dengan parasetamol, diukur kembali kadar SGPT akhir pada masing-masing kelompok.

Reagen yang digunakan adalah jenis reagen semitemik dimana reagen tersebut harus dicampur terlebih dahulu antara reagen pertama dan reagen kedua dengan perbandingan 5:1 kemudian reagen dapat digunakan untuk menganalisis. Prinsip pengukuran aktivitas SGPT adalah mengukur laju berkurangnya jumlah NADH menjadi NAD⁺ pada reaksi yang terjadi antara enzim dan substrat yang dapat diukur pada panjang gelombang 340 nm.

Data dikatakan signifikan apabila nilai $p < 0,05$, Dan hasil analisis statistik dengan uji *One Way ANOVA* menyatakan bahwa data kadar SGPT tiap perlakuan diperoleh nilai $p = 0,000$. sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) memiliki aktivitas sebagai hepatoprotektor dalam pemulihan organ hati yang rusak dan tidak berfungsi normal, dan pemberian ekstrak metanol Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn)

dosis 400mg/kgBB menunjukkan aktivitas hepatoprotektor yang tidak berbeda nyata dengan suspensi Curliv®.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa,

1. Ekstrak metanol Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) memiliki aktivitas hepatoprotektor yang ditandai dengan kenaikan kadar enzim SGPT yang tidak terlalu meningkat dari kadar awal enzim SGPT.
2. Ekstrak metanol Biji Buah Bligu (*Benincasa hispida* (Thunb) cogn) dosis 400 mg/kgBB tikus menunjukkan aktivitas terbaik dalam mempertahankan nilai kadar enzim SGPT.

B. Saran

1. Perlunya perlengkapan yang lebih lengkap di Laboratorium agar peneliti tidak harus ke Universitas lain untuk melakukan penelitian ini.
2. Perlunya sebuah laboratorium khusus untuk kandang hewan coba, agar dalam pemeliharaan hewan coba tidak mengganggu kenyamanan dan kebersihan dari laboratorium pengujian.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an.

Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh. *Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsiir*. Terj. M. Abdul Ghofur E.M., Abdurrohim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsiir*. Bogor: Pustaka Imam Syafii. 2004.

Abdullah, Noriham ., Zainal, Samicho., Nurain, Aziman and Khairusy Syakirah. *Evaluation of In-Vitro Antioxidant and Antimicrobial Activities of the Various Parts of Benincasa hispida*. International Journal of PharmTech Research. Volume.4, Nomor.4. Oct-Dec 2012.

Alberta G. and Canada G. 2006. DrugBank: *Acetaminophen* (APRD00252). <http://redpoll.pharmacy.ualberta.ca/drugbank/cgi-bin/getCard.cgi?CARD=APRD00252.txt>. (21 Maret 2017).

Bimakr, mandana. *Extraction of valuable compounds from winter melon (benincasa hispida (thunb.) Cogn.) Seeds using ultrasonic assisted solvent, supercritical carbon dioxide and pressure-swing methods*. Tesis. Universiti Putra Malaysia. Desember 2012. **M A K A S S A R**

Bimakr, Mandana et all. *Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Seed Oil from Winter Melon (Benincasa hispida) and Its Antioxidant Activity and Fatty Acid Composition*. Journal Molecules. 2013.

Corwin, E.Z. *Buku saku patofisiologi*. Terj. Dari *Handbook of pathophysiology* oleh Brahm, U. Penerbit Buku Kedokteran EGC. edisi revisi ke 3 Jakarta. 2010


- Cotran & Robbins, *Buku Saku Dasar Patologis Penyakit* Ed. 7. EGC. Jakarta. 2011
- Darmawati, SL. *Efek hepatoprotektif daun kelor (Moringa oleifera Lam.) terhadap kerusakan hepar akibat obat isoniazid pada tikus wistar*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2012.
- Depkes RI. *Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Hati*. Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik. 2007.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Ed. III*; Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1979.
- . *Sediaan Galenik Ed II*; Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1986.
- Freddy I.W. “*Analgesik, antipiretik, Anti Inflamasi Non Steroid dan Obat Piri*”. *Farmakologi dan Terapi, Edisi 5*. Jakarta : Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pp. 2007
- Goodman, A., dan Gilman, H. *Dasar Farmakologi Terapi Edisi kesepuluh Volume I*.EGC. Jakarta. 2008
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia-Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan (Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro, Penerjemah.)*. Bandung: Penerbit ITB, 1987.
- Oktavia, sri dan Cylia Willa Pebriandin. *Uji Aktivitas Hepatoprotektor Ekstrak Daun Sukun (Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg) terhadap Kerusakan Hati yang Diinduksi CCl4* . Prosiding Seminar Nasional & Workshop “Perkembangan Terkini Sains Farmasi & Klinik 5”. November 2015.

- Podolsky D.K., and Isselbacher K.J. Tes *Diagnostik Pada Penyakit Hati. Dalam: Ahmad H., dan Asdie eds. Prinsip-prinsip ilmu penyakit dalam, edisi 3. jilid 4.* Jakarta: EGC. 2000.
- Rayees, B., Dorcus, M. and Chitra, S. *Nutritional composition and oil fatty acids of Indian winter melon Benincasa hispida (Thunb.) seeds.* International Food Research Journal. Volume 20, 2013.
- Sabrang R. *Pengaruh Minyak Jintan Hitam (Nigella Sativa) Terhadap Kerusakan Histologis Hepar Mencit (Mus Musculus) Yang Diinduksi Parasetamol.* Skripsi. FK UNS, p: 18. 2008.
- Sacher dan McPerson, *Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium. Edisi 11.* Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, 2002.
- Sayuti, Kesuma dan Yenrina, rina. *Antioksidanalami Dan Sintetik.* Padang: Andalas University Press. 2015
- Sheemole M.S, V.T. Antony, Kala K. *Phytochemical Analysis of Benincasa hispida(Thunb.)Cogn. Fruit Using LC-MS Technique.* International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research Volume 36(1), Nomor. 43. January – February 2016.
- Shihab, Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 10.* Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Smeltzer S, *Buku ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner Suddarth. Volume 2* Edisi 8. Jakarta : EGC, 2011.


- Sulistianto, Dian Endri dan Marti Harini. *Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Mahkota Dewa [Phaleria macrocarpa (Scheff) Boerl] terhadap Struktur Histologis Hepar Tikus Putih (Rattus norvegicus L.) setelah Perlakuan dengan Karbon Tetraklorida (CCl4) secara Oral*. Jurnal BioSMART Volume 6, Nomor 2. 2004.
- Syaifuddin. *Fisiologi Tubuh Manusia Untuk Mahasiswa Keperawatan Edisi 2*. Salemba Medika. Jakarta. 2009
- Tjay, T.H. & Raharja, K. *Obat-Obat Penting : Khasiat, Penggunaan, dan Efek Efek Sampingnya Edisi 5*. Gramedia. Jakarta. 2002
- Voight, Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Wahyuningsih, Sri. *Uji aktivitas hepatoprotektor ekstrak air Akar kuning (Fibraurea tinctoria lour) pada tikus putih Betina galur wistar*. Jurnal Aristoteles vol. 4 No. 1. 2006.
- Widmann FK. *Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium Edisi 9*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 1995
- Winulang Sabdo Nugroho, *pengaruh pemberian sari wortel (daucus carota l.) Terhadap kerusakan histologis sel hepar Mencit akibat pemberian parasetamol*. Skripsi. FK Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.

Lampiran.1 Skema Kerja

A. Ekstraksi Sampel



B. Pengujian Hepatoprotektor



Lampiran.2 Perhitungan Dosis

A. Perhitungan Dosis Parasetamol

$$\begin{aligned}
 \text{Dosis toksik untuk tikus} &= 2,5 \text{ g/kgBB tikus} \\
 \text{Berat Rata-rata} &= 598,98 \text{ mg} \\
 \text{Untuk 200 g BB tikus} &= 2,5 \text{ g} \times \frac{2 \text{ m}}{1 \text{ m}} \\
 &= 0,5 \text{ g} \\
 \text{Pembuatan larutan stok} &= \frac{5}{2} \times 0,5 \text{ g} \\
 &= 12,5 \text{ g/50 ml} \\
 \text{Berat tablet yang ditimbang} &= \frac{1,5 \text{ g}}{5 \text{ m}} \times \text{berat rata-rata 20 tablet} \\
 &= \frac{1,5 \text{ g}}{5 \text{ m}} \times 598,98 \text{ mg} \\
 &= 14,97 \text{ g}
 \end{aligned}$$

Jadi berat Parasetamol yang ditimbang yaitu 14,97 g kemudian dilarutkan dalam 50 ml NaCMC 1%.

B. Perhitungan Dosis Curliv®

Diketahui dosis etiket dari obat Curliv® adalah 607 mg. Menurut Shannon et al, 2007 perhitungan konversi dosis ekuivalen pada manusia (Human Equivalent Doses HED) adalah sebagai berikut:

$$\text{HED (mg/KgBB)} = \text{Dosis hewan coba (mg/KgBB)} \times \frac{\text{Faktor Km hewan coba}}{\text{Faktor Km manusia}}$$

Tabel 4. Konversi dosis hewan coba berdasarkan BSA (FDA Draft Guidelines, 2005)

spesies	Berat (Kg)	BSA (m ²)	Faktor Km
Manusia	60	1,6	37
Anjing	10	0,5	20
Kelinci	1,8	0,15	12
Babi	0,4	0,05	8
Tikus	0,15	0,025	6

$$\begin{aligned} \text{HED (mg/kgBB)} &= \frac{6}{6} = 10,116 \text{ mg/kgBB} \\ \text{Dosis tikus} &= 10,116 \times \frac{3}{6} = 62,382 \text{ mg/kgBB tikus} \\ \text{Untuk tikus 200 g} &= 62,382 \times \frac{2}{1} \frac{\text{g}}{\text{g}} \\ &= 12,4764 \text{ mg/200 gBB tikus} \\ \text{Pembuatan larutan stok} &= \frac{1}{2} \times 12,4764 \text{ mg} \\ &= 62,382 \text{ mg} \\ \text{Berat yang ditimbang} &= \frac{6,3}{6} \times 812,0 \text{ mg} \\ &= 83,45 \text{ mg} \end{aligned}$$

Jadi berat Curliv® yang ditimbang yaitu 83,45 mg kemudian dilarutkan dalam 10 ml NaCMC 1%.

C. Perhitungan Dosis Ekstrak Biji Buah Bligu

1. Dosis 100 mg/kgBB Tikus

$$\begin{aligned} &= 100 \text{ mg} \times \frac{2}{1} \frac{\text{g}}{\text{g}} \\ &= 100 \text{ mg} \times 0,2 \\ &= 20 \text{ mg} \\ \text{Pembuatan Larutan stok} &= \frac{2}{2} \times 20 \text{ mg} = 200 \text{ mg} \end{aligned}$$
2. Dosis 200 mg/kgBB Tikus

$$\begin{aligned} &= 200 \text{ mg} \times \frac{2}{1} \frac{\text{g}}{\text{g}} \\ &= 200 \text{ mg} \times 0,2 \\ &= 40 \text{ mg} \\ \text{Pembuatan Larutan stok} &= \frac{2}{2} \times 40 \text{ mg} = 400 \text{ mg} \end{aligned}$$
3. Dosis 400 mg/kgBB Tikus

$$\begin{aligned} &= 400 \text{ mg} \times \frac{2}{1} \frac{\text{g}}{\text{g}} \\ &= 400 \text{ mg} \times 0,2 \\ &= 80 \text{ mg} \\ \text{Pembuatan Larutan stok} &= \frac{2}{2} \times 80 \text{ mg} = 800 \text{ mg} \end{aligned}$$

Lampiran 3. Gambar Pengamatan



Gambar 1. Buah Bligu



Gambar 2. Maserasi sampel Biji Buah Bligu



Gambar 3. Ekstrak Biji Buah Bligu



Gambar 4. Tikus putih jantan



Gambar 5. Bahan Pengujian




Gambar 6. Proses pengambilan darah Tikus



Gambar 7. Darah Tikus



Gambar 8. Proses Sentifius



Gambar 9. Serum Tikus



Gambar 10. Pemberian secara oral



Gambar 11. Pereaksi SGPT



Gambar 12. Proses pengukuran kadar SGPT

Lampiran 4. Analisis Data

Descriptives

Hasil

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
NaCMC 1% Curliv	3	1063.3333	34.53018	19.93601	977.5556	1149.1111	1025.00	1092.00
Eksrak 100 mg	3	399.3333	40.06661	23.13247	299.8024	498.8643	358.00	438.00
Eksrak 200 mg	3	861.0000	54.00926	31.18226	726.8336	995.1664	802.00	908.00
Eksrak 400 mg	3	540.3333	62.91529	36.32416	384.0431	696.6236	482.00	607.00
Total	15	396.3333	21.96209	12.67982	341.7765	450.8902	371.00	410.00
		652.0667	278.25540	71.84523	497.9740	806.1594	358.00	1092.00

Test of Homogeneity of Variances

Hasil

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.791	4	10	.557

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A N O V A S S A R

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1063654.267	4	265913.567	130.923	0.000
Within Groups	20310.667	10	2031.067		
Total	1083964.933	14			

Hasil

	Sampel	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Tukey HSD ^a	Eksrak 400 mg	3	396.3333			
	Curliv	3	399.3333			
	Eksrak 200 mg	3		540.3333		
	Eksrak 100 mg	3			861.0000	
	NaCMC 1%	3				1063.3333
	Sig.			1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



RIWAYAT HIDUP



Fathana Arif lahir di Tibona Kab.Bulukumba, 25 september 1996, merupakan putra dari pasangan Bapak Arifuddin G dan Ibu Daram. Anak sulung dari 2 bersaudara ini menyelesaikan jenjang pendidikan formalnya di SD.Neg. 306 Marana Kab. Bulukumba (2007), SMP Neg. 2 Bulukumpa Kab. Bulukumba (2010), SMA Neg.2 Bulukumba (2013) dan melanjutkan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh masa kuliah aktif di beberapa Organisasi Yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi, Tim Bantuan Farmasi Alauddin dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan. Dan memiliki motto “Ikhlas adalah kunci dalam mensyukuri segala cobaan hidup”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R