

UJI MIKROBIOLOGI KANDUNGAN MAKANAN JENTIK NYAMUK
Aedes aegypti



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Biologi
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

ANDI NURUL AZIZAH
NIM. 60300112108

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nurul Azizah M
NIM : 60300112108
Tempat/Tgl. Lahir : UjungPandang/12 September 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Biologi
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : BTN Hartaco Indah Blok 3N No.3
Judul : Uji Mikrobiologi Kandungan Makanan Jentik Nyamuk
Aedes aegypti

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2016

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ANDI NURUL AZIZAH M
NIM : 60300112108

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji Mikrobiologi Kandungan Makanan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti*”, yang disusun oleh Andi Nurul Azizah M, NIM: 60300112108, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 yang bertepatan dengan 26 Dzulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Agustus 2016 M
26 Dzulqaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad M.Ag. (.....)

Sekretaris : Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd. (.....)

Munaqisy I : Dr. M. Khalifah Mustami, M.Pd. (.....)

Munaqisy II : Isna Rasdiana Aziz, M.Sc. (.....)

Munaqisy III : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. (.....)

Pembimbing II : Dr. Syahribulan, S.Si., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad M.Ag.
NIP. 196912051993031001

KATA PENGANTAR



Menjadi sarjana tepat waktu atau menjadi sarjana di waktu yang tepat. Itu adalah pendapat yang sering saya dengar saat-saat ini di kalangan teman-teman seangkatan. Jika saya disuruh memilih, maka saya akan memilih keduanya, menjadi sarjana tepat waktu di waktu yang tepat. Bukan hanya sarjana yang dikejar, namun juga ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam masyarakat. Insya Allah.

Tiada kata yang dapat diucapkan penulis selain puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmat, dan kasih sayang, sehingga penulis dengan segala keterbatasannya bisa menyelesaikan karya tulis (skripsi) ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam yang membawakan petunjuk bagi ummat manusia, menjadi rahmat seluruh alam.

Penelitian ini berjudul “Uji Mikrobiologi Kandungan Makanan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti*” dapat terselesaikan, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sains (S.Si)**.

Penulis menyadari bahwa dalam karya tulis yang dibuat ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penulisan maupun isinya. Namun dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, secara moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda **Andi Imtihan SH**, ibunda di alam surga **Almh. Hasni**, dan adindaku **Andi Muhammad Irdan Yazid, Andi Zhafirah Inayah, Andi Muhammad Ibnu**, yang telah menjadi motivator terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi, yang selalu mengirimkan do'a dan harapan terbaik bagi penulis. Penulis juga memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada **Nenek Hj.Sittiming, Tante Harlina Achmad, serta teman-temanku** yang selalu menjadi penasihat terbaik dan pendengar terbaik.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta seluruh dosen dan karyawan yang telah memberikan bantuan fasilitas serta bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes** selaku Ketua Jurusan Biologi, **Baiq Farhatul S.Si., M.Si** selaku sekretaris Jurusan Biologi, beserta seluruh dosen Biologi terima kasih ilmu dan pengetahuan yang di berikan, dan staf jurusan Kak Ririn untuk segala dukungan dan bantuannya.
4. **Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Si** selaku pembimbing I dan **Dr. Syahribulan, S.Si., M.Si** selaku pembimbing II yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis dari sejak awal bimbingan hingga pada hasil penelitian ini.
5. **Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd, Isna Rasdiana Aziz, S.Si., M.Sc, Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi** selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan tulisan ini.
6. **Isna Rasdiana Aziz, S.Si., M.Sc,** selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis selama aktif menjalani proses perkuliahan.
7. Pihak Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan izin penelitian.
8. Masyarakat di desa Bengo Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa telah memberikan izin untuk mengambil jentik nyamuk *Aedes aegypti* pada tempat penampungan air (tempayan).
9. Teman-teman KKNP-6 di desa Bajeng Kabupaten Gowa.

10. Seluruh teman-teman Jurusan Biologi UIN Alauddin Makassar umumnya yang senantiasa saling mendorong dan memberi motivasi, dan juga kakanda senior yang telah banyak memberikan masukan bagi penyempurnaan penulisan.


11. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Terima Kasih telah banyak membantu.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik, dan selalu memperoleh rahmat-Nya. Aamiin. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.-

Makassar, 29 Agustus 2016

Penulis.-



DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-6
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan	6
F. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7-34
A. Tinjauan Tentang Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	7
B. Tinjauan Tentang Larva (Jentik) Nyamuk	24
C. Tinjauan Tentang Bakteri	26
D. Ayat dan Hadis	27-33
E. Kerangka Pikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35-47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Variabel Penelitian	35
D. Definisi Operasional Variabel	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Prosedur Kerja	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48-62
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
KEPUSTAKAAN	64-68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Karakteristik Morfologi Koloni Secara Mikroskopik	48-49
Tabel 4.2 Hasil Koloni secara Mikroskopik dengan Pewarnaan Gram	50
Tabel 4.3 Uji Biokimia	51



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Telur <i>Aedes aegypti</i>	17
Gambar 2.2 Larva (Jentik) Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	19
Gambar 2.3 Pupa <i>Aedes aegypti</i>	21
Gambar 2.4 Nyamuk Dewasa <i>Aedes aegypti</i>	23



ABSTRAK

Nama : Andi Nurul Azizah

NIM : 60300112108

Judul : Uji Mikrobiologi Kandungan Makanan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti*

Nyamuk (*Diptera: Culicidae*) merupakan vektor berbagai jenis penyakit baik pada hewan maupun manusia. Untuk dapat berperan sebagai vektor, nyamuk harus ada dan hidup pada saat agen penyakit (virus, bakteri dan parasit) ada di dalam tubuh inang. Nyamuk *Aedes aegypti* merupakan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan merupakan vektor penyakit yang berkaitan dengan populasi dan aktivitas menghisap darah. Makanan jentik nyamuk *Ae. aegypti* yaitu dapat berupa mikroorganisme, algae dan kotoran organik, karena partikel-partikel organik yang berada di dalam air adalah salah satu makanannya untuk dapat bertahan hidup dan berkembangbiak di dalam tempat-tempat yang tergenang air kotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan makanan nyamuk *Aedes aegypti*. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan teknologi, sampel yang digunakan adalah sampel jentik nyamuk *Aedes aegypti*. Dengan perlakuan uji biokimia yang meliputi uji *Indole*, uji *Methyle red*, uji *Voges Paskuer*, dan uji *Sugar Citrat Agar* (SCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa genus yang ditemukan pada sampel jentik nyamuk *Aedes aegypti* yaitu genus bakteri yang diperoleh *Escherichia*, dan *Aeromonas*.

Kata Kunci: Jentik, *Aedes aegypti*, *Escherichia*, *Aeromonas*.

ABSTRACT

Name : Andi Nurul Azizah

NIM : 60300112108

Judul : Microbiology Food Ingredients Test Of Larvae *Aedes aegypti*

Mosquito (Diptera : Culicidae) is a vector of various diseases in both animals and humans. To be able to act as a vector, the mosquito must be present and alive at the time of disease agents (viruses, bacteria, and parasites) in the host's body. *Aedes aegypti* is a dangerous, disease for human health and a vector disease related to population and blood sucking activity. Larvae food of organic particles in the water is one food to survive and multiply in places dirty stagnant water. This study aims to determine the content of *Aedes aegypti*. Food this research was conducted in the Laboratory of Microbiology Department of Biology, Faculty of Science and Technology, the sample used is a sample of *Aedes aegypti* mosquito larvae, using treatment biochemical test that includes *Indole* test, *Methyle red* test, *Voges Paskuer* test, and *Sugar Citrate Agar* (SCA) test. The results showed that the genus found in samples of *Aedes aegypti* larvae is acquired from bacterial genus *Escherichia* and *Aeromonas*.

Keywords: Larvae, *Aedes aegypti*, *Escherichia*, *Aeromonas*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Nyamuk (*Diptera: Culicidae*) merupakan vektor berbagai jenis penyakit baik pada hewan maupun manusia. Beberapa penyakit yang menjangkiti hewan dan manusia dalam penularannya memerlukan peran nyamuk sebagai vektor dari agen penyakitnya, seperti filariasis dan malaria. Untuk dapat berperan sebagai vektor, nyamuk harus ada dan hidup pada saat agen penyakit (virus, bakteri dan parasit) ada di dalam tubuh inang. Nyamuk memiliki kemampuan terbang yang terbatas maka tempat perindukan nyamuk harus dekat atau berada dalam wilayah yang terjangkau oleh nyamuk dengan inang yang mengandung agen penyakit (Service, 2001).

Sebagian spesies nyamuk dari genus *Anopheles* dan *Culex* yang bersifat *zoofilik* berperan dalam penularan penyakit pada binatang dan manusia, tetapi ada juga spesies nyamuk antropofilik yang hanya menularkan penyakit pada manusia. Satu diantaranya adalah *Aedes aegypti* yang menularkan penyakit Demam Berdarah Dengue (Samsi, 2001).

Nyamuk *Aedes aegypti* merupakan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan merupakan vektor penyakit yang berkaitan dengan populasi dan aktivitas menghisap darah. Aktivitas menghisap darah diperlukan oleh nyamuk betina untuk proses pematangan telur demi kelanjutan keturunannya

(Hadi, 2006). Perilaku menghisap darah nyamuk *Aedes betina* terjadi setiap dua sampai tiga hari sekali pada pagi hari sampai sore hari yakni pada pukul 08.00-12.00 dan pukul 15.00-17.00 WITA. Nyamuk betina untuk mendapatkan darah yang cukup, sering menggigit lebih dari satu orang (*multiple biter*). Penularan penyakit terjadi karena setiap kali nyamuk menghisap darah, sebelumnya akan mengeluarkan air liur melalui saluran probosisnya, agar darah yang dihisap tidak membeku. Bersama air liur inilah virus dengue dipindahkan dari nyamuk ke orang lain (Munif, 2012).

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit endemis di Indonesia yang menyebabkan banyak kematian penduduk. Penyakit DBD disebabkan oleh virus *dengue* dan ditularkan oleh nyamuk *Ae. aegypti*. Penularan penyakit DBD akan terus meningkat apabila tidak adanya upaya pemberantasan serta akibat tingginya kontak dengan nyamuk vektor DBD (Kusuma dkk, 2013).

Faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya kasus DBD adalah Angka Bebas Jentik (ABJ) nyamuk. Upaya meningkatkan ABJ tersebut dilakukan dengan meningkatkan berbagai kegiatan dalam tindakan pembersihan sarang nyamuk oleh masyarakat meliputi tindakan larvasidasi serta menguras, menutup dan mengubur kontainer air yang bisa menjadi sarang nyamuk (Dinas Kesehatan, 2011).

Pengendalian terhadap vektor penyakit dapat dilakukan dengan cara alami dan buatan. Pengendalian alami meliputi pengendalian yang berhubungan dengan faktor geografis, perubahan musim dan iklim, angin, predator, dan hama, sedangkan dengan cara buatan terdiri atas pengendalian mekanik, kimiawi, fisik,

hayati dan genetika. Pengendalian yang sering dilakukan adalah secara fogging, yaitu pengasapan yang dilakukan terhadap imago (Kusumawati. 2007).

Ae. aegypti umumnya memiliki habitat di lingkungan perumahan, di mana terdapat banyak genangan air bersih dalam bak mandi ataupun tempayan. *Ae. albopictus* yang cenderung berada di daerah hutan berpohon rimbun. penyebaran populasi *Ae. aegypti* dipengaruhi oleh faktor musim, peningkatan biasanya terjadi pada saat musim hujan, karena larva membutuhkan air yang cukup untuk perkembangannya (Runtuwene dkk, 2013).

Nyamuk *Ae. aegypti* ditemukan hidup di pemukiman padat penduduk di perkotaan dan di pedesaan (Braks, 2003) pada berbagai tempat penampungan air, misalnya : bak mandi, drum, tempayan, kaleng bekas, vas bunga, lubang bambu, pelepah daun, dan tempurung kelapa yang berisi air untuk tempat bertelur (Salim, 2005). Nyamuk *Ae. albopictus* ditemukan hidup di berbagai tempat, misalnya : di perkotaan, daerah pertanian, atau di hutan dan utamanya berkembang biak di lubang-lubang pohon (Jauhari, 2007). Larvanya ditemukan hidup di pelepah daun dan potongan bambu yang berisi air (Wongkoon, 2007), juga berkembangbiak dalam sumur baik di dalam maupun di luar rumah penduduk (Syahribulan, 2012).

Makanan jentik nyamuk *Ae. aegypti* yaitu dapat berupa mikroorganisme, algae dan kotoran organik, karena partikel-partikel organik yang berada di dalam air adalah salah satu makanannya untuk dapat bertahan hidup dan berkembangbiak di dalam tempat-tempat yang tergenang air kotor.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian adalah adakah bakteri yang terkandung di dalam makanan nyamuk *Ae. aegypti*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui genus bakteri yang terkandung pada kandungan makanan jentik nyamuk *Aedes aegypti* melalui pengujian biokimia yaitu uji *Indol*, uji *Methyl red*, uji *Voges-Paskuer*, dan uji *Citrat*.

Sampel jentik nyamuk *Ae. aegypti* diambil pada tempat penampungan air (tempayan) di Desa Bengo Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa melalui pengujian pada Laboratorium Mikrobiologi

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampe dengan Agustus 2016. Uji mikrobiologi bakteri dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.23.

Nyamuk (Diptera: Culicidae) merupakan vektor beberapa penyakit baik pada hewan maupun manusia. Banyak penyakit pada hewan dan manusia dalam penularannya mutlak memerlukan peran nyamuk sebagai vektor dari agen penyakitnya, seperti filariasis dan malaria. Untuk dapat berperan sebagai vektor, nyamuk harus ada dan hidup pada saat agen penyakit (virus, bakteri dan parasit) ada di dalam tubuh inang. Nyamuk memiliki kemampuan terbang yang terbatas maka tempat perindukan nyamuk harus dekat atau berada dalam wilayah yang terjangkau oleh nyamuk dengan inang yang mengandung agen penyakit.

Uji mikrobiologi merupakan salah satu jenis uji yang dapat menyimpan daya tahan suatu makanan, juga dapat digunakan sebagai indikator sanitasi makanan atau indikator keamanan makanan. Pengujian mikrobiologi diantaranya meliputi uji kuantitatif untuk menentukan mutu dan daya tahan suatu makanan, uji kualitatif bakteri patogen untuk menentukan tingkat keamanannya, dan uji bakteri indikator untuk mengetahui tingkat sanitasi makanan tersebut.

Makanan jentik nyamuk *Ae. aegypti* yaitu mikroorganisme, algae dan kotoran organik, karena partikel-partikel organik yang berada di dalam air adalah salah satu makanannya.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikeshoji (1975), Benzon serta Apperson (1988), menunjukkan bahwa nyamuk *Ae. aegypti* umumnya ditemukan meletakkan telur dalam kontainer yang terdapat bakteri *Acinetobacter calcoaceticus*, *Enterobacter cloacae*, *Pseudomonas gladialli* dan *Pseudomonas alcaligenes*. Kehadiran bakteri tersebut menurut Trexler (2003) berpengaruh terhadap persentase pelatakan telur nyamuk *Ae. aegypti*. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa baik tahapan larva maupun dewasa nyamuk *Ae. aegypti* mengandung bakteri di dalam ususnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Molavi (2003), menunjukkan bahwa ditemukan jenis bakteri di dalam usus tengah jentik yang dapat mempengaruhi kerentanan nyamuk tersebut terhadap virus dengue. Bakteri

yang ada di usus tengah nyamuk dapat merangsang aktivitas kekebalan yang dapat melindungi dari infeksi virus dengue.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mourya (2001), mengemukakan bahwa keberadaan bakteri *Escherichia coli* dan *Aeromonas* pada usus tengah nyamuk berpengaruh terhadap kerentanan nyamuk *Aedes aegypti* dewasa terhadap virus dengue.
4. Penelitian selanjutnya dilakukan Misnarliah (2010), mengemukakan bahwa pada sampel jentik dari tempat penampungan air (tempayan) ditemukan bakteri *Aeromonas* dan *Escherichia*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kandungan makanan nyamuk *Aedes aegypti*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang nyamuk *Ae. aegypti* merupakan vektor penyakit Demam Dengue (DD) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang termasuk salah satu masalah kesehatan masyarakat.
2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang ada tidaknya bakteri yang terdapat di kandungan makanan nyamuk *Ae. aegypti*.
3. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori tentang Nyamuk *Aedes aegypti*

Nyamuk (Diptera: Culicidae) merupakan vektor beberapa penyakit baik pada hewan maupun manusia. Banyak penyakit pada hewan dan manusia dalam penularannya mutlak memerlukan peran nyamuk sebagai vektor dari agen penyakitnya, seperti filariasis dan malaria. Untuk dapat berperan sebagai vektor, nyamuk harus ada dan hidup pada saat agen penyakit (virus, bakteri dan parasit) ada di dalam tubuh inang. Nyamuk memiliki kemampuan terbang yang terbatas maka tempat perindukan nyamuk harus dekat atau berada dalam wilayah yang terjangkau oleh nyamuk dengan inang yang mengandung agen penyakit (Mardihusodo, 2009).

Nyamuk *Aedes* dikenali dengan adanya ciri-ciri belang hitam putih pada badan dan kaki, dua jenisnya yang sangat dikenali yaitu *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* (Depkes, 2002). Nyamuk *Ae. aegypti* ditemukan hidup di pemukiman padat penduduk di perkotaan dan di pedesaan (Braks, 2003) pada berbagai tempat penampungan air, misalnya : bak mandi, drum, tempayan, kaleng bekas, vas bunga, lubang bambu, pelepah daun, dan tempurung kelapa yang berisi air untuk tempat bertelur (Salim, 2005). Nyamuk *Ae. albopictus* ditemukan hidup di berbagai tempat, misalnya : di perkotaan, daerah pertanian, atau di hutan dan utamanya berkembang biak di lubang-lubang pohon (Jauhari, 2007). Larvanya

ditemukan hidup di pelepah daun dan potongan bambu yang berisi air (Wongkoon, 2007), juga berkembangbiak dalam sumur baik di dalam maupun di luar rumah penduduk (Syahribulan, 2012).

Nyamuk *Ae. aegypti* bertelur bukan pada air kotor atau air yang langsung bersentuhan dengan tanah, melainkan di dalam air tenang dan jernih. Air tenang dan jernih ini sering terdapat dalam vas bunga, drum, ember, ban bekas, kaleng bekas, dan barang-barang lainnya yang bisa menampung air hujan. Itulah sebabnya DBD biasa mewabah saat musim hujan. Perkembangan larva *Ae. aegypti* dipengaruhi oleh suhu dan makanan. Perkembangan larva juga dipengaruhi oleh pH yang merupakan faktor dalam menentukan sebaran populasi larva. Larva *Ae. aegypti* dapat hidup dalam wadah yang mengandung air dengan pH 5.8-8.6 dan tahan terhadap air yang mengandung kadar garam dengan konsentrasi konsentrasi 0-0,7‰ (Hoedojo, 1993). Karakteristik lingkungan Kimia yang mempengaruhi keberadaan larva *Ae. aegypti* yaitu pH dan salinitas air. Sedangkan untuk faktor lingkungan biologi yang mempengaruhi keberadaan larva *Ae. aegypti* ialah tanaman hias serta predator seperti ikan pemakan larva nyamuk (Agustina, 2006).

Faktor abiotik seperti curah hujan, dan temperatur dapat mempengaruhi kegagalan telur, pupa dan pupa nyamuk menjadi imago. Demikian juga faktor biotik seperti predator, parasit, kompetitor dan makanan yang berinteraksi dalam kontainer sebagai habitat akuatiknya pradewasa juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya menjadi imago. Keberhasilan itu juga ditentukan oleh kandungan air kontainer seperti bahan organik, komunitas mikroba, dan serangga air yang

ada dalam kontainer itu juga berpengaruh terhadap siklus hidup *Ae. aegypti*. Selain itu bentuk, ukuran dan letak kontainer (ada atau tidaknya penangas atau terbuka dan terkena sinar matahari langsung) juga mempengaruhi kualitas hidup nyamuk (Nguyen, 2013).

Nyamuk *Ae. aegypti* betina menyimpan virus dengue pada telurnya, selanjutnya akan menularkan virus tersebut ke manusia melalui gigitan. Setelah mengigit seseorang, nyamuk ini akan berulang kali menggigit orang lain sehingga dengan mudah darah seseorang yang mengandung virus dengue dapat cepat berpindah ke orang lain, yang paling dekat tentulah orang yang tinggal dalam satu rumah (Hastuti, 2008).

Tempat perindukan utama *Ae. aegypti* adalah tempat-tempat air bersih yang berdekatan letaknya dengan rumah tangga (penduduk), biasanya tidak lebih dari radius 500 m dari rumah (Gandatusada, 2000). Pemberantasan nyamuk *Aedes* Sp dapat dilakukan dengan menyemprotkan insektisida, namun selama jentik masih dibiarkan hidup, maka akan timbul lagi nyamuk yang baru (Didik, 2009).

Menurut Depkes (2004), manusia dan hewan merupakan inang bagi kehidupan nyamuk, kegiatan manusia juga secara tidak langsung menyebabkan terciptanya habitat perkembangbiakan nyamuk seperti : air hujan yang tertampung pada drum, ban bekas, lubang pohon, bambu. dan lain-lain. Habitat perkembangbiakan pradewasa ditemukan juga pada tempat penampungan air seperti ; bak mandi, tempayan, ember, kaleng bekas, dan vas bunga yang berisi air (Hasyimi, 2004).

Nyamuk *Aedes* tertarik pada suhu yang hangat serta keadaan yang lembab (Sutaryo, 2005). Sistem pernafasan nyamuk *Ae. aegypti* yaitu dengan menggunakan pipa-pipa udara yang disebut trakea, dengan lubang-lubang pada dinding tubuh nyamuk yang disebut spirakel yang terbuka lebar tanpa ada mekanisme pengaturannya, maka pada kelembaban rendah akan menyebabkan penguapan air dalam tubuh nyamuk yang akan menyebabkan keringnya cairan tubuh nyamuk (Soekamto, 2007).

Nyamuk dapat hidup dengan baik pada suhu 24°C – 39°C dan akan mati bila berada pada suhu 6°C dalam 24 jam. Nyamuk dapat hidup pada suhu 7°C – 9°C. Rata-rata lama hidup nyamuk betina *Ae. aegypti* selama 10 hari (Ashry, 2009). Untuk meletakkan telurnya, nyamuk betina tertarik pada kontainer air yang berwarna gelap, terbuka, dan terutama yang terletak di tempat-tempat terlindung dari sinar matahari (Depkes, 2007). Menurut penelitian Hasyimi 2009 menyatakan salah satu penyebab penampungan air menjadi tempat perindukan adalah tidak tertutupnya penampungan air tersebut.

Eksistensi nyamuk *Ae. aegypti* dan *Ae. albopictus* di alam dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan biologik, nyamuk ini tersebar diantara garis isotherm 20°C antara 45°LU dan 35°LS pada ketinggian kurang dari 1000 m dari permukaan air laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Asia Tenggara *Ae. aegypti* ditemukan hidup pada ketinggian 1000 – 1.500 m dari atas permukaan laut (dpl) (WHO, 2006).

Aktivitas menghisap darah nyamuk dapat berubah oleh pengaruh angin, suhu dan kelembaban udara (Departemen Kesehatan RI, 2002). Perubahan kondisi

lingkungan dapat menyebabkan aktivitas menghisap darah dari nyamuk *Ae. aegypti* dan *Ae. albopictus* berubah. Nyamuk *Ae. aegypti* dan *Ae. albopictus* selain melakukan aktivitas menghisap darah pada pagi hingga sore hari, saat ini juga diketahui melakukan aktivitas tersebut pada malam hari.

Dalam siklus hidupnya, nyamuk *Aedes* spp mengalami empat stadium yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Faktor lingkungan biotik dan abiotik berpengaruh terhadap kehidupan nyamuk *Aedes*, faktor abiotik seperti curah hujan, temperatur dan evaporasi. Dan faktor biotik seperti predator, kompetitor dan makanan di tempat perindukan (Sayono, 2011).

Keberadaan nyamuk menghisap darah pada suatu daerah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu dan kelembaban. Nyamuk merupakan hewan berdarah dingin dan karenanya proses-proses metabolisme dan siklus kehidupannya tergantung pada suhu lingkungan. Suhu rata-rata optimum untuk perkembangannya adalah 25-30⁰C dengan kelembaban diatas 70% (Novelani, 2007).

Ae. aegypti jantan yang lebih cepat menjadi nyamuk dewasa tidak akan terbang terlalu jauh dari tempat perindukan untuk menunggu nyamuk betina yang muncul untuk kemudian berkopulasi. *Ae. aegypti* bersifat antropofilik dan hanya nyamuk betina saja yang menggigit. Nyamuk menggigit baik di dalam maupun di luar rumah, biasanya pada pagi hari pukul 08.00 – 11.00 WIB dan pada sore hari pukul 15.00 – 17.00 WIB. Sifat sensitif dan mudah terganggu menyebabkan *Aedes aegypti* dapat menggigit beberapa orang secara bergantian dalam waktu singkat (multiple halter) dimana hal ini sangat membantu dalam memindahkan

virus dengue ke beberapa orang sekaligus, sehingga dilaporkan adanya beberapa penderita DBD dalam satu rumah. Meskipun tidak menggigit, nyamuk jantan juga tertarik pada manusia apabila melakukan kopulasi (Ashry, 2009).

Larva *Aedes* dapat tumbuh hingga dewasa pada media perindukan dari campuran kotoran ayam, kaporit dan air sabun dengan konsentrasi setara polutan air di alam. Diduga, ada perubahan fisiologis dan perilaku bertelur dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Penelitian dari Sayono tahun 2011 membuktikan bahwa larva *Aedes* spp mampu bertahan hidup dan bertumbuh pada berbagai jenis air di alam sebagai tempat perindukan.

Faktor temperatur, kelembaban, pH air, curah hujan dan tempat penampungan air dapat menjadi salah satu atau beberapa faktor kunci yang menentukan kepadatan stadium larva nyamuk *Aedes* spp (Mibhfakhudin, 2011).

Aktivitas dan metabolisme nyamuk *Aedes* spp dipengaruhi secara langsung oleh faktor lingkungan yaitu: temperatur, kelembaban udara, tempat perindukan, dan curah hujan. Nyamuk *Aedes* membutuhkan rata-rata curah hujan lebih dari 500 mm per tahun dengan suhu ruang 32– 34°C dan suhu air 25-30°C, pH air sekitar 7 dan kelembaban udara sekitar 70%. Keberhasilan perkembangan nyamuk *Aedes* spp ditentukan oleh tempat perindukan yang dibatasi oleh temperatur tiap tahunnya dan perubahan musim (Hariyono, 2011).

1. Morfologi Nyamuk *Aedes aegypti*

Nyamuk ini dikenal juga sebagai Tiger mosquito atau Black White Mosquito karena tubuhnya memiliki ciri yang khas, yaitu dengan adanya garis-garis dan bercak-bercak putih keperakan di atas dasar warna hitam.

Ciri khas utamanya adalah dua garis lengkung yang berwarna putih keperakan di kedua sisi lateral dan dua buah garis lengkung sejajar di garis median dari punggungnya yang berwarna dasar hitam (*lyre shaped marking*) (Andika, 2010).

Secara umum nyamuk *Ae. aegypti* sebagaimana serangga lainnya mempunyai tanda pengenal sebagai berikut :

- a. Terdiri dari tiga bagian, yaitu : kepala, dada, dan perut
- b. Pada kepala terdapat sepasang antena yang berbulu dan moncong yang panjang (*proboscis*) untuk menusuk kulit hewan/manusia dan menghisap darahnya.
- c. Pada dada ada 3 pasang kaki yang beruas serta sepasang sayap depan dan sayap belakang yang mengecil yang berfungsi sebagai penyeimbang (*halter*).

Ae. aegypti dewasa berukuran kecil dengan warna dasar hitam. Pada bagian dada, perut, dan kaki terdapat bercak-bercak putih yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada bagian kepala terdapat pula proboscis yang pada nyamuk betina berfungsi untuk menghisap darah, sementara pada nyamuk jantan berfungsi untuk menghisap bunga. Terdapat pula palpus maksilaris yang terdiri dari 4 ruas yang berujung hitam dengan sisik berwarna putih keperakan. Pada palpus maksilaris *Ae. aegypti* tidak tampak tanda-tanda pembesaran, ukuran palpus maksilaris ini lebih pendek dibandingkan dengan proboscis. Sepanjang antena terdapat diantara sepasang dua bola

mata, yang pada nyamuk jantan berbulu lebat (Plumose) dan pada nyamuk betina berbulu jarang (pilose).

Dada nyamuk *Ae. aegypti* agak membongkok dan terdapat *scutelum* yang berbentuk tiga lobus. Bagian dada ini kaku, ditutupi oleh *scutum* pada punggung (dorsal), berwarna gelap keabu-abuan yang ditandai dengan bentukan menyerupai huruf Y yang ditengahnya terdapat sepasang garis membujur berwarna putih keperakan. Pada bagian dada ini terdapat dua macam sayap, sepasang sayap kuat pada bagian mesotorak dan sepasang sayap pengimbang (*halter*) pada metatorak. Pada sayap terdapat saluran trachea longitudinal yang terdiri dari chitin yang disebut venasi. Venasi pada *Ae. aegypti* terdiri dari *vena costa*, *vena subcosta*, dan *vena longitudinal*.

Terdapat tiga pasang kaki yang masing-masing terdiri dari coxae, trochanter, femur, tibia dan lima tarsus yang berakhir sebagai cakar. Pada pembatas antara *prothorax* dan *mesothorax*, dan antara *mesothorax* dengan *metathorax* terdapat stigma yang merupakan alat pernafasan.

Bagian perut nyamuk *Ae. aegypti* berbentuk panjang ramping, tetapi pada nyamuk gravid (kenyang) perut mengembang. Perut terdiri dari sepuluh ruas dengan ruas terakhir menjadi alat kelamin. Pada nyamuk betina alat kelamin disebut cerci sedang pada nyamuk jantan alat kelamin disebut *hypopigidium*. Bagian dorsal perut *Ae. aegypti* berwarna hitam bergaris-garis putih, sedang pada bagian ventral serta lateral berwarna hitam dengan bintik-bintik putih keperakan (Ashry, 2009).

2. Taksonomi Nyamuk *Aedes aegypti*

Adapun klasifikasi dari nyamuk *Aedes aegypti* menurut Soegijanto, 2006 adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
 Phylum : Arthropoda
 Classis : Insekta
 Ordo : Diptera
 Sub Ordo : Nematocera
 Familia : Culicidae
 Sub Familia : Culicinae
 Genus : *Aedes*
 Species : *Aedes aegypti*

3. Siklus Hidup Nyamuk *Aedes aegypti*

Siklus hidup nyamuk *Ae. aegypti* memiliki siklus hidup secara sempurna. Siklus hidup nyamuk ini terdiri dari empat fase, mulai dari telur, larva, pupa dan kemudian menjadi nyamuk dewasa.

a. Telur

Pada waktu dikeluarkan, telur aedes berwarna putih, dan berubah menjadi hitam dalam waktu 30 menit. Telur diletakkan satu demi satu dipermukaan air, atau sedikit dibawah permukaan air dalam jarak lebih kurang 2,5 cm dari tempat perindukan. Telur dapat bertahan sampai berbulan-bulan dalam suhu 2⁰C – 4⁰C, namun akan menetas dalam waktu 1 – 2 hari pada kelembaban rendah. Dari penelitian Brown (1962) telur

yang diletakkan di dalam air akan menetas dalam waktu 1 – 3 hari pada suhu 30°C, tetapi membutuhkan waktu 7 hari pada suhu 16°C. Pada kondisi normal, telur *Ae. aegypti* yang direndam di dalam air akan menetas sebanyak 80% pada hari pertama dan 95% pada hari kedua. Telur *Ae. aegypti* berukuran kecil (50µ), sepintas lalu tampak bulat panjang dan berbentuk lonjong (*oval*) mempunyai torpedo. Di bawah mikroskop, pada dinding luar (*exochorion*) telur nyamuk ini, tampak adanya garis-garis membentuk gambaran seperti sarang lebah. Berdasarkan jenis kelaminnya, nyamuk jantan akan menetas lebih cepat dibanding nyamuk betina, serta lebih cepat menjadi dewasa.

Telur nyamuk bisa saja telah diletakkan di dinding tendon bagian dalam, sebelum tandon tergenang air, karena telur *Ae. aegypti* tahan terhadap kekeringan. Bila kemudian tandon tersebut terisi air yang jernih seperti air hujan, maka telur akan segera menetas. Hal tersebut mengakibatkan prevalensi penyakit demam berdarah cenderung meningkat ketika musim hujan (Biran, 2003).

Telur *Ae. aegypti* berbentuk panjang, bulat telur, halus, dan ukuran panjangnya sekitar satu millimeter (Foster & Walker, 2002). Nyamuk *Ae. aegypti* betina biasanya meletakkan telurnya satu persatu pada dinding tempat perindukan yang gelap, basah dan lembab, misalnya bak mandi, tempayan, ban bekas, tonggak bambu (Christopher, 2009).

Setiap kali bertelur, nyamuk betina dapat mengeluarkan sekitar 100 butir telur dengan ukuran sekitar 0,7 mm per butir. Telur tersebut

berbentuk ovoid yang meruncing dan selalu diletakkan satu per satu, Induk nyamuk biasanya meletakkan telurnya di dinding tempat penampungan air, seperti gentong, lubang batu dan lubang pohon di atas garis air.

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tetas telur adalah suhu, pH air perindukkan, cahaya, serta kelembaban disamping fertilitas telur itu sendiri (Ashry, 2009).



Gambar Telur *Aedes aegypti* (Sivnathan, 2006)

Telur *Ae. aegypti* dapat bertahan pada kondisi kering pada waktu dan intensitas yang bervariasi hingga beberapa bulan. Jika tergenang dalam air, beberapa telur mungkin menetas dalam beberapa menit, sedangkan yang lain mungkin membutuhkan waktu lama terbenam dalam air.

b. Larva

Setelah menetas, telur akan berkembang menjadi larva (jentik-jentik). Pada stadium ini, kelangsungan hidup larva dipengaruhi suhu, pH air perindukan, ketersediaan makanan, cahaya, kepadatan larva, lingkungan hidup, serta adanya predator. Larva nyamuk *Ae. aegypti*


dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami empat kali pergantian kulit (*ecdysis*) yang dipengaruhi oleh hormon ecdison (Andika, 2010).

Larva mengambil makanan di dasar kontainer sehingga disebut pemakan makan di dasar (*bottom feeder*). Dalam posisi istirahat membentuk sudut 45° dengan garis permukaan air dengan bagian kepala berada di bawah. Larva mengambil oksigen dari udara dengan menempatkan *siphon*-nya tepat pada permukaan air (Andika, 2010).

Pada stadium larva dikenal empat tingkat jentik yang masing-masing tingkatan dinamakan instar.

1. Larva instar I berukuran paling kecil yaitu 1-2 mm atau satu sampai dua hari setelah telur menetas, duri-duri (*spinae*) pada dada belum jelas dan corong pernapasan (*siphon*) belum menghitam.
2. Larva instar II berukuran 2,5 – 3,5 mm berumur dua sampai tiga hari setelah telur menetas, duri-duri dada belum jelas, corong pernapasan sudah mulai menghitam.
3. Larva instar III berukuran 4 – 5 mm berumur tiga sampai empat hari setelah telur menetas, duri-duri dada sudah mulai jelas dan corong pernapasan berwarna coklat kehitaman.
4. Larva instar IV berukuran paling besar yaitu 5 – 6 mm berumur empat sampai enam hari setelah telur menetas dengan warna kepala gelap.

Larva stadium III atau larva stadium IV lebih mudah diamati dari stadium lain, alat-alat tubuhnya sudah terbentuk lengkap dan bersifat relatif stabil terhadap pengaruh luar (Andika, 2010).



Gambar Larva (Jentik) Nyamuk *Aedes aegypti* (Suparta, 2008)

Adapun ciri-ciri larva *Ae. aegypti* adalah :

1. Corong udara terdapat pada
2. Pada segmen-segmen abdomen tidak dijumpai adanya rambut-rambut berbentuk kipas (*Palmate hairs*).
3. Pada corong udara terdapat *pecten*
4. Sepasang rambut jumpai pada corong udara (siphon).
5. Pada setiap sisi abdomen segmen kedelapan ada *comb scale* sebanyak 8 – 21 atau berjejer 1 – 3.
6. Bentuk individu dari *comb scale* seperti duri.

7. Pada sisi thorax terdapat duri yang panjang dengan bentuk kurva dan adanya sepasang rambut di kepala.
8. Corong udara (*siphon*) dilengkapi *pecten*.

Larva *Ae. aegypti* biasa bergerak-gerak lincah dan aktif, dengan memperlihatkan gerakan-gerakan naik ke permukaan air dan turun ke dasar wadah secara berulang. Larva mengambil makanan di dasar wadah, oleh karena itu larva *Ae. aegypti* disebut pemakan makanan di dasar (*bottom feeder*). Pada saat larva mengambil oksigen dari udara, larva menempatkan corong udara (*siphon*) pada permukaan air seolah-olah badan larva berada pada posisi membentuk sudut dengan permukaan air (Aradilla, 2009).

Suhu optimal untuk perkembangan larva ini adalah $25^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$. Larva berubah menjadi pupa memerlukan waktu 4 – 9 hari dan melewati 4 fase atau biasa disebut instar. Perubahan instar tersebut disebabkan larva mengalami pengelupasan kulit atau biasa disebut ecdisi/moulting (Aradilla, 2009).

c. Pupa

Larva instar IV akan berubah menjadi pupa yang berbentuk bulat gemuk menyerupai tanda koma. Untuk menjadi nyamuk dewasa diperlukan waktu 2 – 3 hari. Suhu untuk perkembangan pupa yang optimal adalah sekitar $27^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$ (Ashry, 2009).

Pada pupa terdapat kantong udara yang terletak diantara bakal sayap nyamuk dewasa dan terdapat sepasang sayap pengayuh yang saling

menutupi sehingga memungkinkan pupa untuk menyelam cepat dan mengadakan serangkaian jungkiran sebagai reaksi terhadap rangsang. Stadium pupa tidak memerlukan makanan. Bentuk nyamuk dewasa timbul setelah sobeknya selongsong pupa oleh gelembung udara karena gerakan aktif pupa (Ashry, 2009).



Gambar Pupa *Aedes aegypti* (Sivnathan, 2006)

d. Nyamuk Dewasa


Setelah keluar dari selongsong pupa, nyamuk akan diam beberapa saat di selongsong pupa untuk mengeringkan sayapnya. Nyamuk betina dewasa menghisap darah sebagai makanannya, sedangkan nyamuk jantan hanya makan cairan buah-buahan dan bunga. Setelah berkopulasi, nyamuk betina menghisap darah dan tiga hari kemudian akan bertelur sebanyak kurang lebih 100 butir. Nyamuk akan menghisap darah lagi.

Nyamuk *Ae. aegypti* dewasa memiliki ukuran sedang dengan tubuh berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan garis-garis putih keperakan. Di bagian punggung tubuhnya tampak dua garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan yang menjadi ciri dari spesies ini. Pada umumnya, sisik-sisik pada tubuh

nyamuk mudah rontok atau terlepas sehingga menyulitkan identifikasi pada nyamuk-nyamuk tua. Ukuran dan warna nyamuk jenis ini kerap berbeda antar populasi, tergantung dari kondisi lingkungan dan nutrisi yang diperoleh nyamuk selama perkembangan. Nyamuk jantan dan betina tidak memiliki perbedaan dalam hal ukuran nyamuk jantan yang umumnya lebih kecil dari betina dan terdapatnya rambut-rambut tebal pada antena nyamuk jantan. Kedua ciri ini dapat diamati dengan mata telanjang. *Ae. aegypti* bentuk domestik lebih pucat dan hitam kecoklatan.

Pada stadium dewasa baik nyamuk jantan maupun betina memanfaatkan gula sebagai sumber energi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan hanya nyamuk betina yang bersifat haematophagous (menghisap darah) (Arca dkk, 2005). Oleh karena itu penularan DBD dilakukan oleh nyamuk betina saja (Clements, 1992). Protein pada darah juga merupakan sumber protein utama untuk pembentukan telur, sekalipun demikian kondisi nutrisi nyamuk betina yang baru keluar dari pupa sangat berpengaruh terhadap kapasitas reproduksinya. Konsumsi darah pada inang vertebrata merupakan hal penting bagi *Ae. aegypti* betina dewasa untuk menyelesaikan siklus gonotropiknya. Keberadaan darah di dalam midgut nyamuk diketahui dapat menginisiasi endokrin untuk oviposisi dan pematangan telur. Sifat sensitif dan mudah terganggu menyebabkan *Ae. aegypti* dapat menggigit beberapa orang secara bergantian dalam waktu singkat (multiple halter)

dimana hal tersebut menyebabkan *Ae. aegypti* dapat memindahkan virus dengue ke beberapa inang sekaligus (Aradilla, 2009).



Gambar Nyamuk Dewasa *Aedes aegypti* (Suparta, 2008)

4. Tempat Berkembang Biak (*Breeding Place*)

Ae. aegypti hidup di daerah pemukiman dan berkembang biak pada genangan air bersih buatan manusia (*man made breeding place*). Adapun tempat perindukannya dibedakan menjadi tempat perindukan sementara, tempat perindukan permanen, dan alamiah. Tempat perindukan sementara antara lain yaitu kaleng bekas, ban bekas, talang air, vas bunga, dan barang-barang yang dapat menampung air bersih. Tempat perindukan permanen antara lain tempat yang merupakan penampungan air untuk keperluan rumah tangga seperti bak mandi, gentong air, bak penampung air hujan, dan reservoir air. Sedangkan tempat perindukan alamiah berupa genangan air yang terdapat pada lubang-lubang pohon (Chahaya, 2003).

5. Perilaku Mencari Makan

Ae. aegypti bersifat diurnal yaitu aktif pada pagi dan siang hari. Nyamuk yang menghisap darah hanyalah nyamuk betina. Hal tersebut dikarenakan nyamuk betina membutuhkan protein untuk pembentukan telur setelah kawin. Nyamuk *Ae. aegypti* betina memiliki kebiasaan menghisap darah pada pagi dan sore hari yaitu antara pukul 08.00 hingga 12.00 dan 15.00 hingga 17.00. Jenis darah yang disukai oleh nyamuk ini adalah darah manusia (Soegijanto, 2006).

Setelah menghisap darah, nyamuk betina akan mencari tempat beristirahat yang aman untuk mengubah darah menjadi telur. Nyamuk betina biasanya beristirahat di tempat-tempat dengan vegetasi yang padat, lubang-lubang pohon, kandang hewan, atau bebatuan selama 2 hingga 4 hari hingga gelur berkembang secara utuh. Setelah itu nyamuk betina akan terbang dari tempat peristirahatannya pada sore atau malam hari untuk mencari tempat untuk meletakkan telur. Kemudian nyamuk betina akan menghisap darah lagi untuk mengulang siklus (Achmadi, 2011).

B. Teori Tentang Larva (Jentik) Nyamuk

Menurut Sudarmo (1989), larvasida merupakan golongan dari pestisida yang dapat membunuh serangga belum dewasa atau sebagai pembunuh larva. Larvasida berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu “*Lar*” berarti serangga belum dewasa dan “*Sida*” berarti pembunuh. Jadi larvasida dapat

diartikan sebagai pembunuh serangga yang belum dewasa atau pembunuh ulat (larva).

Pemberantasan nyamuk menggunakan larvasida merupakan metode terbaik untuk mencegah penyebaran nyamuk. Parameter aktivitas larvasida suatu senyawa kimia dilihat dari kematian larva (Wibowo dkk, 1997). Senyawa bersifat larvasida juga bisa digunakan sebagai sediaan insektisida untuk membasmi serangga yang belum dewasa dan serangga dewasa.

Keberadaan jentik *Ae. aegypti* di suatu daerah merupakan indikator terdapatnya populasi nyamuk *Ae. aegypti* di daerah tersebut. Upaya pengendalian vektor DBD paling efektif dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN-DBD) (Widiarti dkk, 2011). Data tentang populasi vektor DBD di setiap wilayah, seperti *Container Index* (CI), *House Index* (HI), *Breteau Index* (BI), *Pupae Index* (PI) dan *Ovitrap Index* (OI) yang menjadi parameter entomologis sangat diperlukan.

Perkembangan nyamuk *Ae. aegypti* didukung oleh karakteristik lingkungan yaitu lingkungan fisik, kimia dan biologi. Nyamuk *Aedes aegypti* bertelur bukan pada air kotor atau air yang langsung bersentuhan dengan tanah, melainkan di dalam air tenang dan jernih. Air tenang dan jernih ini sering terdapat dalam vas bunga, drum, ember, ban bekas, kaleng bekas, dan barang-barang lainnya yang bisa menampung air hujan. Itulah sebabnya DBD biasa mewabah saat musim hujan. Perkembangan larva *Ae. aegypti* dipengaruhi oleh suhu dan makanan. Perkembangan larva juga di pengaruhi oleh pH yang merupakan faktor dalam menentukan sebaran populasi larva. Larva *Ae. aegypti* dapat hidup dalam

wadah yang mengandung air dengan pH 5.8-8.6 dan tahan terhadap air yang mengandung kadar garam dengan konsentrasi konsentrasi 0-0,7‰ (Hoedojo, 1993). Karakteristik lingkungan Kimia yang mempengaruhi keberadaan larva *Aedes aegypti* yaitu pH dan salinitas air. Sedangkan untuk faktor lingkungan biologi yang mempengaruhi keberadaan larva *Ae. aegypti* ialah tanaman hias serta predator seperti ikan pemakan larva nyamuk (Agustina, 2006).

C. Teori Tentang Bakteri

Bakteri merupakan uniseluler, pada umumnya tidak berklorofil, ada beberapa yang fotosintetik dan produksi aseksualnya secara pembelahan dan bakteri mempunyai ukuran sel kecil dimana setiap selnya hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. *Bakteri* pada umumnya mempunyai ukuran sel 0,5-1,0 μm kali 2,0-5,0 μm , dan terdiri dari tiga bentuk dasar yaitu bentuk bulat atau kokus, bentuk batang atau *Bacillus*, bentuk spiral (Dwidjoseputro, 1989).

Fase pertumbuhan *bakteri*, yaitu sebagai berikut:

1. Fase adaptasi yaitu fase untuk menyesuaikan dengan substrat dan kondisi lingkungan disekitarnya
2. Fase pertumbuhan awal yaitu fase dimana sel mulai membelah dengan kecepatan yang masih rendah
3. Fase logaritmik yaitu fase dimana mikroorganisme membelah dengan cepat dan konstan

4. Fase pertumbuhan lambat yaitu fase dimana zat nutrisi di dalam medium sudah sangat berkurang dan adanya hasil-hasil metabolisme yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan bakteri
5. Fase pertumbuhan tetap (statis) yaitu fase dimana jumlah populasi sel yang tetap karena jumlah sel yang hidup tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati
6. Fase menuju kematin dan fase kematian yaitu fase dimana sebagian populasi baktei mulai mengalami kematian karena beberapa sebab yaitu zat gizi di dalam medium habis dan energi cadangan di dalam sel habis (Fardiaz, 1993).

D. Ayat dan Hadis

1. Ayat

Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:173 berbicara tentang mikroorganisme dan mikrobiologi sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah (2000) dari ayat tersebut menerangkan bahwa:

Yang dimaksud *bangkai* adalah binatang yang berhembus nyawanya tidak melalui cara yang sah seperti yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, namun tidak sempat disembelih, dan yang disembelih untuk berhala. Dikecualikan dari pengertian bangkai adalah binatang air (ikan dan sebagainya) dan belalang.

Binatang yang mati karena faktor ketuaan atau mati karena terjangkit penyakit pada dasarnya mati karena zat beracun, sehingga bila dikonsumsi manusia, sangat mungkin mengakibatkan keracunan. Demikian juga binatang karena tercekik dan dipukul, darahnya mengendap di dalam tubuhnya. Ini mengidap zat beracun yang membahayakan manusia.

Darah, yakni darah yang mengalir, bukan yang substansi asalnya membeku seperti limpah dan hati. *Daging babi*, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemak, dan kulitnya.

Binatang yang (ketika disembelih) *disebut* (nama) *selain Allah*. Itu berarti ia baru haram di makan bila disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah. Adapun bila disebut nama-Nya, maka binatang halal yang disembelih demikian, masih dapat ditoleransi untuk dimakan.

Kasih sayang Allah melimpah kepada makhluk, karena itu Dia selalu menghendaki kemudahan buat manusia. Dia tidak menetapkan sesuatu yang menyulitkan mereka, dan karena itu pula larangan di atas dikecualikan oleh lanjutan ayat: *Siapa yang berada dalam keadaan terpaksa* (memakannya)

sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka dosa baginya.

Keadaan terpaksa adalah keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian, sedang *tidak menginginkannya* adalah tidak memakannya padahal ada makanan halal yang dapat dia makan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan selernya. Sedang yang dimaksud *tidak melampaui batas* adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian ditetapkan Allah, karena *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Penutup ayat ini dipahami juga oleh sementara ulama sebagai isyarat bahwa keadaan darurat tidak dialami seseorang kecuali akibat dosa yang dilakukannya, yang dipahami dari kata *Maha Pengampun*. Keputusan yang mengantar seseorang merasa jiwanya terancam tidak akan menyentuh hati seorang mukmin, sehingga dia akan bertahan dan bertahan datangnya jalan keluar dan pertolongan Allah. Bukankah Allah telah menganugerahkan kemampuan kepada manusia untuk tidak menyentuh makanan, melalui ketahanan yang dimilikinya, juga lemak, daging, dan tulang yang membungkus badannya?

Penjelasan tentang makanan-makanan yang diharamkan tersebut, dikemukakan dalam konteks mencela masyarakat Jahiliah, baik di Mekah maupun di Madinah, yang memakannya. Mereka misalnya membolehkan memakan binatang yang mati tanpa disembelih dengan alasan bahwa yang

disembelih/dicabut nyawanya oleh manusia, maka mengapa haram yang dicabut sendiri nyawanya oleh Allah?

Penjelasan tentang keburukan ini dilanjutkan dengan uraian ulang tentang mereka yang menyembunyikan kebenaran, baik menyangkut kebenaran Nabi Muhammad saw., urusan kiblat, haji dan umrah, maupun menyembunyikan atau akan menyembunyikan tuntutan Allah menyangkut makanan. Orang-orang Yahudi misalnya, menghalalkan hasil suap, orang-orang Nasrani membenarkan sedikit minuman keras, kendati dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan banyak.

Dalam QS al-Baqarah/2:26 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا
 أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ
 بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Mishbah (2000) dari ayat tersebut menerangkan bahwa:

Allah swt. membuat perumpamaan dari seekor nyamuk atau lebih rendah daripada itu artinya seekor nyamuk hanya salah satu dari hewan yang berukuran kecil, namun jangan kira hewan kecil itu tidak akan berdampak besar, contohnya pada nyamuk, berbagai macam nyamuk dapat menularkan berbagai macam penyakit yang berbahaya. Misalnya nyamuk *Aedes aegypti* merupakan nyamuk sebagai vector penyakit Demam berdarah dengue (DBD) yang menularkan virus dengue ketika mengigit mangsanya, bagi orang-orang yang beriman akan percaya bahwa hal sekecil itupun pasti dari Tuhan, dan orang-orang yang kafir akan mempertanyakan hal tersebut.

Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

Adapun orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, maka mereka mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah kebenaran sempurna yang bersumber dari Allah, Tuhan pemelihara mereka yang melimpahkan aneka bimbingan untuk memelihara mereka, sedangkan orang-orang kafir akan terus bertanya ‘Apakah maksud Allah menjadikan nyamuk sebagai satu perumpamaan?’ pertanyaan mereka dijawab: dengan perumpamaan itu banyak orang yang menutup mata dan telinganya dan banyak pula diberikan

petunjuk. Karena tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasiq.

2. Hadis

Hadis Annadhofatu al-Iman berbicara tentang “Kebersihan Sebagian dari Iman” : النظافة من الإيمان. Sebagaimana diriwayatkan oleh HR. Muslim

sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ
 الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ أَوْ
 تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ
 وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ (رواه مسلم)

Artinya:

Diriwayatkan dari Malik Al Asy'ari dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda : Kebersihan adalah sebagian dari iman dan bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi, dan shalat adalah cahaya dan shadaqah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al Quran adalah pedoman bagimu.” (HR. Muslim)”

Sebagaimana yang diriwayatkan HR. Tirmizi sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ
الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ
فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتِكُمْ (رواه الترمذي)


Artinya:

“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari ayahnya, dari Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmizi).”

Maksud dari kedua hadis tersebut yaitu sebagaimana yang diriwayatkan Annadhofatu al-Iman dan HR. Tirmizi kebersihan adalah sebagian dari iman. Nyamuk juga membutuhkan tempat yang bersih untuk mendapat makanan yang bersih. Berkembang biak ditempat yang bersih seperti tempat penampungan air yang bersih.

ALA UDDIN
MAKASSAR

E. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu mengetahui jenis mikroorganisme yang terdapat pada makanan jentik nyamuk *Ae. aegypti*. Penelitian ini berlokasi di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksploratif yaitu mengetahui mikroorganisme (*bakteri*) yang diduga atau berada pada makanan jentik nyamuk *Ae. aegypti* tersebut.

C. Variabel Penelitian

Jenis variabel pada penelitian ini variabel tunggal yaitu mengetahui bakteri yang terkandung dalam kandungan makanan jentik nyamuk *Aedes aegypti*.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Nyamuk *Ae. aegypti* merupakan anggota famili *Culicidae* yang memiliki ciri dua garis lengkung berwarna putih keperakan di kedua sisi lateral

toraks disebut *lyre* dan dua garis hitam sejajar di garis median toraks, pada kaki terdapat sisik berbentuk gelang-gelang berwarna putih.

2. Uji mikrobiologi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya mikroba yang terdapat pada/bersama makanan nyamuk *Ae. aegypti* yang terdiri dari uji penguat dan uji penduga.
3. Partikel adalah zat-zat yang dikonsumsi oleh jentik *Ae. aegypti*, dapat berupa mikroorganisme, algae dan zat organik.

E. Instrument Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop dinokuler, botol sampel, cawan petri, gelas beaker, tabung reaksi, labu erlenmeyer, pipet tetes, rak tabung, ose bulat, ose lurus, sendok, autoklaf, inkubator, *Laminary Air Flow* (LAF), vortex mixer, Hot Plate, stirrer, mikropipet, tip, oven, lemari pendingin, penjepit, botol semprot, *object glass*, neraca analitik, bunsen, batang pengaduk, mortar, pestle, tapisan dan pinset.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jentik *Aedes aegypti* yang diambil dari tempayan, alkohol 70%, aquabidest, aquades, kapas, aluminium foil, plastik buah, spiritus, pH meter, silk, tisu, pepton, glukosa, K_2HPO_4 , larutan kristal violet, larutan lugol, larutan safranin, larutan etanol, larutan Malachite Green, medium NA (*Nutrient Agar*), medium *Simmons*

Citrate Agar (SCA), medium *Motility Indole Ornatum* (MIO), reagen *Kovac's*, reagen *Methyl Red*, reagen α -naphthol 5%, dan KOH 40%.

F. Cara Kerja

1. Sterilisasi Alat

Semua alat-alat yang digunakan terlebih dahulu dibersihkan. Alat yang terbuat dari gelas seperti cawan petri, tabung reaksi, gelas beker, labu erlenmeyer, mortar, pipet tetes, pestle dan botol sampel direndam dan dicuci sampai bersih dengan sabun atau deterjen, kemudian dikeringkan. Alat-alat gelas yang tahan pada pemanasan tinggi disterilkan dengan oven pada suhu 181°C selama 2 jam. Alat yang terbuat dari non gelas seperti ose bulat, ose lurus, sendok, gegep di sterilkan dengan menyemprotkan alkohol 70% sebelum dipergunakan dan jarum inokulum/ose disterilkan dengan dipijarkan langsung di atas api bunsen hingga berwarna merah. Tujuan dari sterilisasi adalah untuk membebaskan suatu bahan atau benda dari semua bentuk kehidupan. Untuk sterilisasi tip, medium *Nutrient agar* (NA), medium SCA, medium MIO, medium MR-VP, tabung reaksi yang berisi aquabidest dilakukan dengan autoklaf pada tekanan 2 atm suhu 121°C selama ± 30 menit.

2. Pembuatan Media (NA)

Menimbang media *Nutrient Agar* (NA) sebanyak 70 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beaker yang berisi aquadest sebanyak 500 ml. Medium *Nutrient Agar* (NA) di sterilkan pada autoklaf terlebih dahulu sebelum digunakan.

3. Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jentik nyamuk yang dipipet dengan menggunakan pipet tetes dalam tempat penampungan air (tempayan) yang berada di depan rumah penduduk Desa Bengo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dan dimasukkan ke dalam botol sampel.

4. Ekstraksi jentik

Mengambil jentik nyamuk pada botol sampel dengan pipet dimasukkan dalam tapisan untuk menapis air yang tersisa dari jentik dan direndam dalam gelas beaker yang berisi alkohol 70% selama 5 menit. Setelah jentik nyamuk tersebut mati, digerus di dalam mortar dan pestle sampai halus. Kemudian dimasukkan ke tabung reaksi pertama yang berisi aquabidest. Pengerjaan mengekstraksi jentik dikerjakan di dalam *Laminary Air Flow* (LAF) yang telah di UV selama 2 jam.

5. Pengenceran

Tabung pengenceran pertama yang berisi sampel dan aquabidest terlebih dahulu di homogenkan dengan menggunakan vortex mixer. Setelah homogen, dipindahkan dengan dipipet sebanyak 1 mL menggunakan mikropipet dan tip yang dimasukkan ke tabung reaksi kedua dan dihomogenkan. Perlakuan yang sama dilakukan pada tabung pengenceran ketiga sampai tabung pengenceran ke delapan. Pengenceran dilakukan di dalam *Laminary Air Flow* (LAF) yang telah di UV selama 2 jam. Tujuan dari

pengenceran bertingkat tersebut adalah untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan.

6. Isolasi Bakteri

a. Isolasi Bakteri secara Umum

1. Isolasi Bakteri

Tiga pengenceran terakhir dari hasil pengenceran yang dilakukan sebelumnya yaitu pengenceran 10^{-6} , 10^{-7} , 10^{-8} di pipet 1 mL ke cawan petri steril, kemudian ditambahkan 15-20 mL medium *Nutrient Agar* (NA) dituang lalu dihomogenkan dengan cara menggoyangkan cawan petri, setelah medium memadat diinkubasikan pada suhu 37°C selama 1 X 24 jam dengan posisi terbalik di inkubator. Posisi terbalik di inkubator bertujuan agar uap air tidak jatuh pada media isolat dan tertampung ditutupnya saja. Tujuan *Nutrient Agar* (NA) dituang adalah untuk membutuhkan ruang yang lebih luas untuk penyebarannya. Penambahan satu cawan petri yang berisi medium *Nutrient Agar* (NA) sebagai kontrol. Tiga tabung pengenceran terakhir diambil bertujuan untuk mendapatkan koloni tunggal.

2. Pemurnian

Koloni bakteri yang tumbuh setelah diinkubasikan di cawan petri pada permukaan medium *Nutrient Agar* (NA) di amati koloni, ukuran, permukaan, margin, elevasi, serta bentuk pertumbuhan bakteri morfologi koloninya. Morfologi koloni yang berbeda dari ke tiga cawan petri 10^{-6} , 10^{-7} , 10^{-8} tersebut didapatkan 8 isolat yang berbeda.

Morfologi koloni yang berbeda di pisahkan secara aseptis menggunakan ose kemudian di goreskan ke cawan petri yang berisi medium *Nutrient Agar* (NA) padat. Sebelum jarum inokulum/ose digunakan di pijarkan terlebih dahulu di atas api menyala dengan bunsen. Dilakukan beberapa kali penanaman pada medium yang sama sampai mendapatkan isolat murni atau koloni tunggal dengan cara penggoresan secara sinambung menggunakan jarum inokulum/ose dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 X 24 jam. Teknik penanaman dengan cara penggoresan bertujuan untuk mengisolasi bakteri dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam medium baru.

Setelah diinkubasikan, isolat bakteri murni atau koloni tunggal secara aseptis diinokulasikan ke dalam medium *Nutrient Agar* (NA) miring pada tabung reaksi dan diinkubasi selama 1 X 24 jam pada suhu 37°C, kemudian disimpan dalam lemari pendingin sebagai isolat bakteri uji. Pemurnian dilakukan bertujuan untuk mendapatkan isolat bakteri murni atau koloni tunggal yang ditumbuhkan di dalam tabung reaksi.

7. Identifikasi Bakteri

a. Pengamatan Morfologi

1. Secara Makroskopis

Pengamatan secara makroskopik dilakukan dengan mengamati pertumbuhan bakteri pada *Nutrient Agar* (NA) cawan dengan melihat koloni, ukuran, permukaan, margin, elevasi, serta bentuk pertumbuhan bakteri pada medium *Nutrient Agar* (NA) miring.

2. Secara Mikroskopis

a. Pewarnaan Gram

Gelas objek dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol 70% kemudian dipanaskan di atas nyala api. Diambil secara aseptik 1 ose biakan bakteri pada tabung reaksi, diratakan pada gelas objek dan difiksasi di atas nyala api (bunsen). Kemudian ditetaskan 2-3 tetes dengan larutan kristal violet (Gram A) reagen ini akan mewarnai seluruh permukaan sel bakteri gram positif dan gram negatif dapat bersifat asam maupun basa, dibiarkan selama 1 menit tujuannya kristal violet dapat menyerap pada biakan bakteri kemudian dibilas dengan aquadest. Selanjutnya ditetaskan 2-3 tetes dengan larutan lugol (Gram B) reagen ini akan mewarnai seluruh permukaan sel bakteri gram negatif bersifat basa, reagen ini menyebabkan adanya ikatan CV dengan *iodine* yang akan mengakibatkan zat warna oleh bakteri. Pada gram positif dapat terbentuk CV iodinribonukleat pada dinding sel, dan dibiarkan selama 1 menit, lalu dibilas dengan aquadest.

Selanjutnya ditetaskan satu tetes saja dengan etanol (Gram C) selama 30 detik reagen ini akan mewarnai seluruh permukaan sel gram negatif dapat bersifat asam, karena menyebabkan pori-pori pada gram negatif yang memiliki banyak lapisan lemak (lipid larut dalam etanol) sehingga kompleks CV *iodine* akan lepas dari permukaan sel gram negatif, sedangkan pada gram positif CV *iodine*

tetap menempel di dinding sel, sel gram negatif menjadi bening, dan dibilas dengan aquadest.

Setelah itu diteteskan 2-3 tetes dengan larutan safranin (Gram D) akan mewarnai sel gram negatif menjadi warna merah, sedangkan gram positif tidak terpengaruh. Counterstain hanya berfungsi sebagai pengontras saja didiamkan selama 45 detik, kemudian dibilas dengan aquadest dan dibiarkan hingga mengering. Selanjutnya ditetesi dengan minyak imersi (jika dibutuhkan) untuk diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100x. Pengamatan dilakukan dengan melihat morfologi sel dan warna. Bakteri Gram-positif akan berwarna biru keunguan sedangkan bakteri Gram-negatif akan berwarna pink kemerahan.

b. Uji Biokimia

1. Uji Indole

Medium *Motility Indole Ornatum* (MIO) ditimbang terlebih dahulu sebanyak 1,365 gram pada neraca analitik dengan menggunakan aluminium foil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beaker yang berisi aquadest sebanyak 45 mL, di Hot Plate sampai mendidih. Kemudian dipindahkan ke-8 tabung reaksi sebanyak 5 mL dengan penambahan satu tabung reaksi sebagai kontrol dan disterilkan terlebih dahulu di autoklaf. Isolat bakteri dari kultur murni diambil 1 ose kemudian diinokulasikan pada medium MIO secara tusukan pada tabung reaksi lalu diinkubasi di inkubator pada suhu 37°C selama 2 X

24 jam. Selanjutnya ditambahkan 3 tetes reagen kovac's, dan didiamkan selama 20-60 menit. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya cincin warna merah tua pada permukaan medium reagen (indole). Pembentukan H₂S ditandai dengan terbentuknya warna kehitaman pada medium. Motilitas ditandai dengan terjadinya penyebaran pada bekas tusukan.

2. Uji *Methyl Red-Voges Proskauer* (MR-VP)

Medium glukosa, peptone, dan K₂HPO₄ ditimbang terlebih dahulu masing-masing sebanyak 0,5 gram pada neraca analitik dengan menggunakan aluminium foil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beaker yang berisi aquadest sebanyak 90 mL, di Hot Plate sampai mendidih. Untuk uji MR 45 mL dan untuk uji VP 45 mL medium MR-VP, masing-masing dipindahkan ke-8 tabung reaksi uji MR dan dipindahkan ke-8 tabung reaksi untuk uji VP sebanyak 5 mL dengan penambahan satu tabung reaksi sebagai kontrol. Selanjutnya disterilkan terlebih dahulu di autoklaf.

Isolat bakteri dari kultur murni diambil 1 ose kemudian diinokulasikan pada medium MR-PV pada tabung reaksi secara tusukan pada tabung reaksi lalu diinkubasi di inkubator pada suhu 37°C selama 3 X 24 jam. Selanjutnya pada media untuk uji VP ditambahkan larutan alfa-naphthol 5 % sebanyak 0,6 mL dan larutan KOH 40 % sebanyak 0,5 mL dengan menggunakan pipet tetes. Hasil positif bila terbentuknya warna merah. Sedangkan pada media untuk uji MR ditambahkan 3 tetes

larutan methyl red. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah dan negatif terbentuk warna kuning.

3. Uji Citrat

Medium *Simmons Citrate Agar* (SCA) ditimbang terlebih dahulu sebanyak 1,96 gram pada neraca analitik dengan menggunakan aluminium foil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beaker yang berisi aquadest sebanyak 81 mL, di Hot Plate sampai mendidih. Kemudian dipindahkan ke-8 tabung reaksi sebanyak 5 mL dengan penambahan satu tabung reaksi sebagai kontrol dan disterilkan terlebih dahulu di autoklaf. Isolat bakteri dari kultur murni diambil 1 ose kemudian diinokulasikan pada medium *Simmons Citrate Agar* (SCA) tersebut dengan cara goresan sinambung pada tabung reaksi lalu diinkubasi di inkubator pada suhu 37°C selama 2 X 24 jam.

Fungsi dari masing-masing alat:


1. Mikroskop berfungsi untuk mengamati obyek yang berukuran sangat kecil (mikroskopis) sehingga akan tampak lebih besar dari ukuran aslinya.
2. Botol sampel berfungsi untuk menyimpan sampel yang di ambil dari Desa Bengo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.
3. Cawan petri berfungsi untuk pembuatan kultur media yang akan digunakan.

4. Gelas beaker berfungsi untuk mengukur volume larutan yang akan digunakan.
5. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia dan melakukan reaksi kimia dalam skala kecil.
6. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk menyimpan medium, menyimpan larutan yang akan digunakan, dan tempat untuk menyimpan medium yang akan disterilkan.
7. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan dengan volume yang diketahui.
8. Triangular berfungsi untuk meratakan mikroba pada permukaan medium dengan cara diputar pada permukaan medium.
9. Rak tabung berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi.
10. Ose bulat berfungsi untuk menggores media dalam pertumbuhan bakteri pada media miring.
11. Ose lurus berfungsi untuk menusuk media dalam pertumbuhan bakteri pada media tegak.
12. Sendok berfungsi untuk mengambil larutan yang akan digunakan.
13. Autoklaf berfungsi untuk untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan 2 atm suhu 121°C selama ± 30 menit.
14. Inkubator berfungsi untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol.
15. *Laminary Air Flow* (LAF) berfungsi untuk alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis karena BSC mempunyai pola pengaturan dan

penyaring aliran udara sehingga menjadi steril dan aplikasikan UV beberapa jam sebelum digunakan.

16. Vortex mixer berfungsi untuk mengaduk senyawa kimia yang ada dalam tabung reaksi atau wadah.
17. Hot plate berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Pelat (plate) yang terdapat dalam alat ini dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi. Pengadukan dengan bantuan batang magnet Hot plate dan magnetic stirrer seri SBS-100 dari SBS misalnya mampu menghomogenkan sampai 10 L, dengan kecepatan sangat lambat sampai 1600 rpm dan dapat dipanaskan sampai 425°C.
18. Mikropipet berfungsi untuk ntuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 μl .
19. Tip berfungsi Sebagai tempat untuk cairan dalam ukuran 1 μl sampai 20 μl .
20. Oven berfungsi untuk mensterilkan alat yang dipergunakan pada suhu 181°C selama 2 jam.
21. Lemari pendingin berfungsi untuk menyimpan mikroba, isolat atau koloni yang akan dipergunakan.
22. Object glass berfungsi untuk menempatkan objek yang akan dilihat/dianalisa dengan menggunakan mikroskop.
23. Neraca analitik berfungsi untuk Menimbang bahan yang akan digunakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi.
24. Bunsen berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril.

25. Batang pengaduk berfungsi untuk untuk menyebarkan cairan di permukaan mediaagar supaya bakteri yang tersuspensidalam cairan tersebut tersebar merata.
26. Mortar berfungsi untuk menghaluskan/memecah bahan menjadi partikel yang lebih kecil.
27. Pestle berfungsi untuk memperlancar proses eksperimen di laboratorium.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Isolasi Bakteri Secara Umum

a. Morfologi Koloni Isolat Bakteri secara Makroskopik

Hasil pengamatan inokulasi terhadap sampel jentik nyamuk *Ae. Aegypti* yang di ambil dari dalam tempat penampungan air (tempayan) pada medium *Nutrient Agar* (NA) cawan disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Morfologi Koloni Isolat Bakteri Secara Makroskopik

Pengenceran	Kode Isolat	Pengamatan Morfologi				
		Ukuran	Bentuk	Permukaan	Margin	Elevasi
10 ⁻⁶	J1	Large (besar)	Irreguler (tidak beraturan)	halus mengkilap	Undulate (bergelombang)	Umbonate
	J2	Large (besar)	Irreguler (tidak beraturan)	halus mengkilap	Undulate (bergelombang)	Umbonate
	J3	Large (besar)	Irreguler (tidak beraturan)	halus mengkilap	Lobate (berbentuk seperti telinga)	Convex (cembung)
	J4	Large	Rhizoid	halus	Curled	Umbonate

		(besar)	(pertumbuhan dengan cabang-cabang tidak teratur)	mengkilap	(berbentuk seperti cabang yang beraturan)	
10 ⁻⁷	J1	Large (besar)	Circular (bulat/bundar)	halus mengkilap	Entire (rata)	Convex (cembung)
	J2	Small (kecil)	Circular (bulat/bundar)	halus mengkilap	Entire (rata)	Convex (cembung)
	J3	large (besar)	Irregular (tidak beraturan)	halus mengkilap	Undulate (bergelombang)	Convex (cembung)
10 ⁻⁸	J1	large (besar)	Irregular (tidak beraturan)	halus mengkilap	Entire (rata)	Convex (cembung)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa karakteristik koloni isolat bakteri bervariasi pengamatan morfologinya dari segi ukuran, permukaan, margin dan elevasinya. Ukuran yang diperoleh yaitu kecil (Small), dan besar (Large). Bentuk yang diperoleh yaitu *Circular* (bulat/bundar), *Irregular* (tidak beraturan), dan *Rhizoid* (pertumbuhan dengan cabang-cabang tidak teratur). Keseluruhan permukaan isolat bakteri yang diperoleh yaitu halus mengkilap. Tepi (Margin) yang diperoleh yaitu *Undulate* (bergelombang), *Curled* (berbentuk seperti cabang yang beraturan), *Lobate* (berbentuk seperti telinga), dan *Entire* (rata). Elevasi yang diperoleh yaitu *Umbonate*, dan *Convex*.

b. Morfologi Koloni Isolat Bakteri secara Mikroskopik

Pewarnaan Gram

Hasil pengamatan koloni pada medium *Nutrient Agar* (NA) cawan miring yang diberi pewarnaan gram disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Koloni Isolat Bakteri Secara Mikroskopik dengan Pewarnaan Gram

Pengenceran	kode isolat	Pewarnaan Gram	Bentuk
10 ⁻⁶	J1	Positif	Basil
	J2	Positif	Basil
	J3	Positif	Basil
	J4	Positif	coccus
10 ⁻⁷	J1	Positif	Basil
	J2	Positif	Basil
	J3	Positif	Basil
10 ⁻⁸	J1	Positif	Coccus

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari ke 8 isolat bakteri diperoleh bentuk sel yaitu basil (batang), dan coccus (bulat). Isolat bakteri diperoleh gram positif (berwarna ungu).

2. Uji Biokimia

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, 1 ose koloni bakteri di tanam pada medium MIO dengan secara tusukan, 1 ose koloni bakteri di tanam pada medium SCA dengan cara digores sinambung, 1 ose koloni bakteri di tanam pada medium MR-VP dengan secara tusukan disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji Biokimia pada Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* dengan menggunakan medim MIO, MR-VP, dan medium SCA

Pengenceran	Kode Isolat	Uji Biokimia							Keterangan (Genus Bakteri)
		MIO				MR	VP	SCA	
		G	H	I	M				
10 ⁻⁶	J1	-	-	-	-	+	+	+	<i>Aeromonas</i>
	J2	-	-	-	-	+	-	-	<i>Escherichia</i>
	J3	-	-	-	-	+	-	-	<i>Escherichia</i>
	J4	-	-	-	-	+	+	+	<i>Escherichia</i>
10 ⁻⁷	J1	-	-	-	-	+	+	+	<i>Aeromonas</i>
	J2	-	-	-	-	+	-	+	<i>Aeromonas</i>
	J3	-	-	-	-	+	+	+	<i>Aeromonas</i>
10 ⁻⁸	J1	-	-	-	-	+	+	-	<i>Escherichia</i>

Keterangan:

G: Gas, H: H₂S, I: Indol, M: Motil, MIO: Motility Indole Ornatum, MR: Methyl Red, VP: Voges Proskauer, SCA: Simmons Citrate Agar

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada uji biokimia yang dilakukan terhadap uji Indole, uji MR-VP, dan uji Citrat menghasilkan genus bakteri yaitu *Escherichia*, dan *Aeromonas*.

B. Pembahasan

1. Isolasi Bakteri Secara Umum

a. Morfologi Koloni Isolat Bakteri secara Makroskopik

Berdasarkan hasil penelitian, hasil dari inokulasi sampel jentik nyamuk *Ae. aegypti* yang diambil dari dalam tempat penampungan air (tempayan) pada medium *Nutrient Agar* (NA) keseluruhan diperoleh 8 isolat. Ke 8 isolat tersebut menunjukkan karakteristik koloni yang bervariasi pada media *Nutrient Agar* (NA) cawan.

Morfologi isolat bakteri secara makroskopik diamati koloninya yang berbeda dari ke delapan pertumbuhan pengamatan pada plate agar cawan petri tersebut menggunakan colony counter dengan melihat ukuran, bentuk, permukaan, margin, dan elevasi. Ukuran isolat bakteri meliputi titik (*pinpoint*), kecil (*Small*), sedang (*Moderate*), dan besar (*Large*). Bentuk isolat bakteri meliputi *Circular*, *Irregular*, *Spindle*, *Filamentous*, dan *Rhizoid*. Permukaan isolat bakteri meliputi halus mengkilap, kasar, berkerut, dan kering seperti bubuk. Margin isolat bakteri meliputi entire, lobate, undulate, serrate, dan filamentous. Elevasi isolat bakteri meliputi *Flat*, *Raised*, *Convex*, dan *Umbonate*.

Pada tabel 4.1, hasil karakteristik ukuran koloni isolat bakteri sampel jentik nyamuk *Ae. Aegypti* diperoleh 2 ukuran yang berbeda yaitu small (2%), dan large (14%). Hasil karakteristik bentuk koloni isolat bakteri sampel jentik nyamuk *Ae. Aegypti* diperoleh 3 bentuk yang berbeda yaitu irregular (15%), rhizoid (3%), dan circular (6%). Hasil karakteristik margin

koloni isolat bakteri sampel jentik nyamuk *Ae. Aegypti* diperoleh 4 margin yang berbeda yaitu undulate (12%), entire (12%), lobate (4%), dan curled (4%). Hasil karakteristik elevasi koloni isolat bakteri sampel jentik nyamuk *Ae. Aegypti* diperoleh 2 elevasi yang berbeda yaitu umbonate (6%), dan convex (10%).

b. Morfologi Koloni Isolat Bakteri secara Mikroskopik

Pewarnaan gram

Pewarnaan gram sangat berguna dan paling banyak digunakan dalam laboratorium mikrobiologi, karena merupakan tahapan penting dalam langkah awal identifikasi. Pewarnaan ini didasarkan pada tebal atau tipisnya lapisan peptidoglikan di dinding sel dan banyak sedikitnya lapisan lemak pada membran sel bakteri. Jenis bakteri berdasarkan pewarnaan gram dibagi menjadi dua yaitu gram positif yang ditandai dengan adanya warna ungu pada dinding sel bakteri tersebut, dan gram negatif yang ditandai dengan adanya warna merah pada dinding sel bakteri tersebut. Selain perbedaan dalam sifat pewarnaannya, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif berbeda dalam sensitivitasnya terhadap kerusakan mekanis/fisis, terhadap enzim, desinfektan dan antibiotik. Dinding sel yang tebal dan membran sel selapis pada bakteri gram positif. Sedangkan dinding sel tipis yang berada di antara dua lapis membran sel pada bakteri gram negatif (Fardiaz, 1989).

Bakteri gram positif dinding selnya terdiri atas 60-100 persen peptidoglikan dan bakteri gram positif memiliki polimer lurus asam N-asetil muramat dan N-asetil glukosamin. Struktur dinding selnya tebal, sekitar 15-

80 nm, berlapis tunggal. Dinding selnya mengandung lipid yang lebih normal (1-4%), peptidoglikan ada yang sebagai lapisan tunggal. Mengandung asam tekoat. Bersifat lebih rentan terhadap penisilin. Pertumbuhan dihambat secara nyata oleh zat-zat warna seperti ungu kristal. Komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rumit. Lebih resisten terhadap gangguan fisik. Resistensi terhadap alkali (1% KOH) larut. Toksin yang dibentuk Eksotoksin Endotoksin (Purnomo, 2003).

Bakteri gram negatif mengandung 10-20 % peptidoglikan, di luar lapisan peptidoglikan ada struktur membran yang tersusun dari protein fosfolipid dan lipopolisakarida. Struktur dinding selnya tipis, sekitar 10 – 15 mm, berlapis tiga atau multilayer. Dinding selnya mengandung lemak lebih banyak (11-22%), peptidoglikan terdapat di dalam lapisan kaku, sebelah dalam dengan jumlah sedikit \pm 10% dari berat kering, tidak mengandung asam tekoat. Kurang rentan terhadap senyawa penisilin. Pertumbuhannya tidak begitu dihambat oleh zat warna dasar misalnya kristal violet. Komposisi nutrisi yang dibutuhkan relatif sederhana. Tidak resisten terhadap gangguan fisik. Resistensi terhadap alkali (1% KOH) lebih pekat. Toksin yang dibentuk Endotoksin. (Purnomo, 2003).

Bakteri gram negatif bersifat lebih konstan terhadap reaksi pewarnaan, tetapi bakteri gram positif sering berubah sifat pewarnaannya sehingga menunjukkan reaksi gram variabel, sebagai contoh, kultur bakteri gram positif sudah tua dapat kehilangan kemampuannya untuk menyerap pewarna violet kristal sehingga dapat menyerap pewarnaan safranin, dan

berwarna merah seperti bakteri gram negatif. Perubahan tersebut juga dapat disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan atau modifikasi teknik pewarnaan (Fardiaz, 1989).

Hasil pewarnaan gram menunjukkan bahwa isolat bakteri memiliki dua jenis bentuk sel, yaitu bentuk batang (basil) dan bulat (coccus). Bentuk batang (basil) dibagi menjadi 4 bentuk yaitu coccobacilli, bacilli rounded end dan blunt end, streptobacilli, dan helical (spirillum). Bentuk bulat (coccus) dibagi menjadi 6 bentuk yaitu coccus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, tetrads, dan sarcina.

Berdasarkan pada tabel 4.2 setelah diberikan 4 pewarnaan gram menunjukkan 8 isolat bakteri gram positif. Keseluruhan isolat bakteri tersebut diperoleh gram positif (berwarna ungu) disebabkan karena bakteri mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop, mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan. Sedangkan pada bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Memiliki sistem membran ganda di mana membran plasmanya diselubungi oleh membran luar permeabel.

2. Uji Biokimia

Uji biokimia bakteri merupakan suatu cara atau perlakuan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeterminasi suatu biakan murni bakteri hasil isolasi melalui sifat-sifat fisiologinya. Setiap bakteri memiliki sifat biokimia yang berbeda sehingga tahapan uji biokimia ini sangat membantu proses identifikasi. Setelah sampel diinokulasikan pada media differensial atau selektif, kemudian koloni kuman diinokulasikan pada media uji biokimia. Ada 12 jenis uji yang sering digunakan dalam uji biokimia walaupun sebenarnya masih banyak lagi media yang dapat digunakan (Adam, 2001).

Proses biokimia erat kaitannya dengan metabolisme sel, yakni selama reaksi kimiawi yang dilakukan oleh sel yang menghasilkan energi maupun yang menggunakan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan selular, seperti pergerakan. Suatu bakteri tidak dapat dideterminasi hanya berdasarkan sifat-sifat morfologinya saja, sehingga perlu diteliti sifat-sifat biokimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya.

Ciri fisiologi ataupun biokimia merupakan kriteria yang amat penting di dalam identifikasi spesimen bakteri yang tidak dikenal karena secara morfologis biakan ataupun sel bakteri yang berbeda dapat tampak serupa, tanpa hasil pengamatan fisiologis yang memadai mengenai kandungan organik yang diperiksa maka penentuan spesiesnya tidak mungkin dilakukan. Karakterisasi dan klasifikasi sebagian mikroorganisme

seperti bakteri berdasarkan pada reaksi enzimatik maupun biokimia. Mikroorganisme dapat tumbuh pada beberapa tipe media yang memproduksi tipe metabolit yang dapat dideteksi dengan reaksi antara mikroorganisme dengan reagen test yang dapat menghasilkan perubahan warna reagen (Cowan, 2004).

a. Uji Indol

Uji Indol adalah suatu persenyawaan nitrogen yang kompleks yang dihasilkan bakteri sebagai hasil dari penguraian protein. Tryptophan merupakan asam amino esensial yang dapat mengalami oksidasi dengan cara kegiatan enzimatik beberapa bakteri. Konversi triptofan menjadi produk metabolik di mediasi oleh enzim Tryptophanase. Media ini biasanya digunakan dalam indentifikasi yang cepat. Perbenihan indol digunakan untuk melihat kemampuan bakteri mendegradasi asam amino triptofan secara enzimatik. Hasil uji indol yang diperoleh negatif karena tidak terbentuk lapisan (cincin) berwarna merah muda pada permukaan biakan, artinya bakteri ini tidak membentuk indol dari tryptopan sebagai sumber karbon, yang dapat diketahui dengan menambahkan larutan kovaks. Asam amino triptofan merupakan komponen asam amino yang lazim terdapat pada protein, sehingga asam amino ini dengan mudah dapat digunakan oleh mikroorganisme akibat penguraian protein. Motilitas adanya penyebaran yang berwarna putih seperti akar disekitar inokulasi, yang berarti bahwa *bakteri* mempunyai flagella. Motilitas

pergerakan pada bakteri ditandai dengan pertumbuhan di area tusukan. (Cowan, 2004).

Pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa dari ke delapan isolat bakteri pada medium MIO indol dan motilitasnya diperoleh negatif karena tidak terbentuk lapisan (cincin) berwarna merah muda pada permukaan biakan. Gas diperoleh negatif karena tidak terbentuknya gas pada sekitar tusukan permukaan biakan. Sedangkan H₂S diperoleh negatif karena ketika berwarna hitam pada ujung tabung mengandung H₂S.

b. Uji MR (*Methyl Red*)

Uji MR digunakan untuk mendeteksi bakteri yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi glukosa menghasilkan produk asam berkonsentrasi tinggi yang stabil sehingga menyebabkan pH media turun hingga dibawah 4,4 yang ditandai dengan hasil positif, terjadi perubahan warna menjadi merah setelah ditambahkan Methyl Red. Artinya, bakteri ini menghasilkan asam campuran (metilen glikon) dari proses fermentasi glukosa yang terkandung dalam medium MR, dan apabila tidak terjadi perubahan warna berarti uji MR negatif. (Lehninger, 1995).

Pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa dari ke delapan isolat bakteri medium MR diperoleh positif karena terjadinya perubahan warna menjadi merah setelah ditambahkan Methyl Red yang menghasilkan asam campuran (metilen glikon) dari proses fermentasi glukosa.

c. Uji VP (*Voges-Proskuer*)

Uji VP (*Voges-Proskuer*) digunakan untuk mengetahui pembentukan asetil metil karbinol (asetoin) dari hasil fermentasi glukosa. Hasil negatif (-) apabila tidak terjadi perubahan warna media menjadi merah setelah ditambahkan alfa-naphthol 5 % dan larutan KOH 40 %. Positif (+) apabila terjadi perubahan warna media menjadi merah setelah ditambahkan alfa-naphthol 5 % dan larutan KOH 40 %, artinya hasil akhir fermentasi bakteri adalah asetil metil karbinol (asetoin) (Colome, 2001).

Pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa pada uji VP (*Voges-proskuer*) menunjukkan 5 isolat bakteri diperoleh positif yaitu pengenceran 10^{-6} dengan kode isolat J1 dan J4, pengenceran 10^{-7} dengan kode isolat J1 dan J3, dan pengenceran 10^{-8} dengan kode isolat J1 yang berarti mengalami perubahan warna menjadi warna merah pada permukaan tabung. Bakteri ini mempunyai kemampuan untuk pembentukan asetil metil karbinol (asetoin) dari hasil fermentasi glukosa. Sedangkan 3 isolat bakteri yang lainnya tidak terjadi perubahan warna yang menunjukkan uji VP negatif.

d. Uji Sitrat

Uji Sitrat untuk mengetahui bakteri menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Pada uji ini medium yang digunakan adalah SCA (*Sugar Citrate Agar*) sebagai karbon. Apabila bakteri menggunakan sitrat sebagai sumber karbon maka media berubah menjadi basa dan berubah warna menjadi biru. Hasil negatif (-) apabila tidak terjadinya perubahan warna media dari hijau menjadi biru. Artinya bakteri ini tidak

mempunyai enzim sitrat permease yaitu enzim spesifik yang membawa sitrat ke dalam sel. Sehingga bakteri tidak menggunakan citrat sebagai salah satunya sumber karbon. Positif (+) apabila terjadinya perubahan warna media dari hijau menjadi biru, artinya bakteri menggunakan citrat sebagai salah satu/satu-satunya sumber karbon (Colome, 2001).

Pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa pada uji sitrat menunjukkan 5 isolat bakteri diperoleh positif yaitu pengenceran 10^{-6} dengan kode isolat J1 dan J4, pengenceran 10^{-7} dengan kode isolat J1, J2 dan J3 yang berarti terjadinya perubahan warna menjadi warna biru. Sedangkan 3 isolat bakteri yang lainnya tidak terjadi perubahan warna yang menunjukkan uji sitrat negatif.

Hasil uji biokimia menunjukkan bahwa *Escherichia* dan *Aeromonas* ditemukan pada sampel jentik *Ae. aegypti* pada tempat penampungan air tempayan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu (Fabio dkk, 2001) bahwa *Escherichia* merupakan bakteri yang menjadi dominan di usus tengah nyamuk. Hal ini disebabkan karena bakteri ini kemungkinan memiliki beberapa keunggulan kompetitif di lingkungan usus. Penelitian tentang mikroba pada usus tengah nyamuk (Mourya dkk, 2001) juga memperlihatkan bahwa mikroba yang melimpah ditemukan pada usus tengah *Ae. aegypti* yaitu genus *Aeromonas*. Bakteri ini bersama dengan bakteri *Escherichia* menjadi penghuni usus tengah *Ae. aegypti* sebagai flora normal. Mikroba flora

normal yang menghuni usus tengah nyamuk dapat merangsang aktivitas kekebalan nyamuk dewasa yang dapat melindungi dari infeksi virus.

Mourya dkk, 2001, keberadaan bakteri *Escherichia* dan *Aeromonas* pada usus tengah jentik *Ae. aegypti* memiliki pengaruh pada efek kerentanan nyamuk dewasa *Ae. aegypti* terhadap virus dengue (DEN). Penghalang usus tengah merupakan salah satu faktor utama yang mengatur kepekaan nyamuk. Setiap patogen nyamuk yang masuk melalui makanan (darah) akan melalui usus tengah sehingga akan berinteraksi dengan sel epitel dan bakteri yang ada di dalam usus tengah.

e. Genus Bakteri

Genus bakteri yang ditemukan pada kandungan makanan jentik nyamuk *Aedes aegypti* adalah *Escherichia*, dan *Aeromonas*.

Genus *Escherichia* Motil atau non-motil, gram negatif, batang pendek, glukosa dan laktosa difermentasi dengan produksi asam dan gas, Acetylmethylcarbinol tidak diproduksi. Tes merah metil positif, Karbon dioksida dan hidrogen diproduksi dalam volume kurang lebih sama dari glukosa. Umumnya tidak mampu memanfaatkan asam sitrat sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Ditemukan dalam kotoran, sesekali patogen pada manusia. Spesies jenis adalah *Escherichia coli* (Migula) Castellani dan Chalmers. asam sitrat dan garam-garam dari asam sitrat tidak dimanfaatkan sebagai sumber tunggal karbon. Hidrogen sulfida tidak diproduksi (Bergeys, 1919).

Genus *Aeromonas* menurut Markovic et al. (2007), genus *Aeromonas* memiliki ciri katalase positif, fermentasi glukosa, VP negatif, tidak menghasilkan H₂S, indol negatif dan β hemolisis. Pendek (jarang lebih dari 3 mikron), sel-sel berbentuk batang. motil dengan cara flagella polar. Gram negatif, Heterotrofik, karbohidrat difermentasi dengan produksi H₂, CO₂ dan 2,3-butilena glikol. Biasanya monotrichous, non-motil. Gram negatif Metil negatif merah, lambat atau tidak ada fermentasi laktosa. Mayoritas spesies sejauh yang dijelaskan berasal dari air atau pathogen ke laut dan hewan air segar seperti ikan dan amfibi (Bergeys, 1919).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapatnya bakteri yang terkandung di dalam makanan nyamuk *Ae. Aegypti* yaitu *Aeromonas* dan *Escherichia*.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sumber informasi bagi masyarakat bahwa nyamuk *Ae. aegypti* merupakan vektor penyakit Demam Dengue (DD) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.



KEPUSTAKAAN

- Achmadi, Umar Fahmi. *Dasar-Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*. Jakarta. Rajawali Press. 2011.
- Adam, MR. 2001. *Microbiology of Fermented Food*. Elsevier Applied Science Publisher, Ltd. New York.
- Agustina. 2006. *Studi Preferensi Tempat Bertelur dan Berkembang Nyamuk dan Jentik Nyamuk Aedes aegypti pada Air Terpolusi* (Tesis) Pascasarjana IPB. Bogor: IPB.
- Aradilla, A. S. 2009. "Uji Efektivitas Larvasida Ekstrak Etanol Daun Mimba (*Azadirachta indica*) Terhadap Larva *Aedes aegypti*." Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Arca, B., Lombardo, F., Valenzuela, J. G., Fransischetti, I. M. B., Marinotti, O., Coluzzi, M., & Ribeiro, J. M. C. 2005. An Updated Catalogue of Salivary Gland Transcripts in the Adult Female Mosquito, *Anopheles gambiae*. *The Journal of Experimental Biology*. Vol. 208: 3971-3986.
- Ashry Sikka. Skripsi *Uji Efektivitas Larvasida Ekstrak Ethanol Daun Mimba (Azadirachta indica) Terhadap Larva Aedes aegypti*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.
- Astuti D. (2008). *Upaya pemantauan nyamuk aedes aegypti dengan pemasangan ovitrap di desa Gonilan Kartasura Sukoharjo*, Warta, Vol 2 Maret 2008 : 90-98.
- Bergeys, 1919. *Bergey's Manual Of Determinative Bacteriology*, Seventh Edition.
- Biran S. 2003. *Demam Dengue/Demam Berdarah Dengue di RSUP Sanglah Denpasar*. Seminar Nasional Demam Berdarah Dengue. Denpasar.
- Braks, M.A., Honorio, N.A, de Olivieira, L., Juliano, S.A., Lounibos, L.P. *Convergent Habitat Segregation of Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in Southeastern Brazil and Florida*. *J. Med. Entomol.* 2003 Nov; 40 (6): 785-94.
- Chahaya, I., 2003. *Pemberantasan Vektor Demam Berdarah di Indonesia*. USU Digital Library.

- Chistopher, A. P. 2009. *Optimalisasi Kegiatan Pemberantasan Jentik Berkala di Wilayah Kerja Pelabuhan Kampung Dalam-Pekanbaru*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau Press.
- Clements, A. N. 1992. *The Biology of Mosquitoes*. Vol I: Development, Nutrition and Reproduction. New York: Chapman Hall.
- Colome, JS. Et al. 2001. *Laboratory Exercises in Microbiology*. West Publishing Company. New York.
- Cowan, ST. 2004. *Manual for the Identification of Medical Fungi*. Cambridge University Press. London.
- Departemen Kesehatan RI. (2002). *Pedoman Survei Entomologi Demam Berdarah Dengue*, cetakan kedua. Ditjen P2M & PL, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. (2004) *Perilaku Hidup Nyamuk Aedes aegypti Sangat Penting Diketahui Dalam Melakukan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk Termasuk Pemantauan Jentik Berkala*.
- Depkes RI. 2007. Modul Pelatihan Bagi Pengelola Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah di Indonesia. Dirjen P2PL Depkes RI. Jakarta.
- Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Profil Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2011. Pontianak: Dinas Kesehatan Kota Pontianak; 2011. Hal. 30-5.
- Dwidjoseputro, D. 1989. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Cetakan Ke-2*. Djambatan. Malang.
- Erma Kusuma Pratiwi. 2013. Skripsi *Uji Toksisitas Bacillus thuringiensis Asal Kota Nganjuk Terhadap Larva Aedes aegypti*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Fatna Andika Wati. 2010. Skripsi *Pengaruh Air Perasan Kulit Jeruk Manis Terhadap Tingkat Kematian Larva Aedes Aegypti Instar III IN VITRO*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Fardiaz, S. 1993. *Analisis Mikrobiologi Pangan*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Foster W. A., & Walker, E. D. 2002. Mosquitoes (Culicidae). In Mullen, G., Durden, L. (Eds.) *Medical and Veterinary Entomology* (p 203-262). Academic press, Sand Diego, CA. 597 pp.
- Gandahusada, S. FKUI, 2000' *Parasitologi Kedokteran*, Cetakan Ketiga Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Penerbit FKUL

- Hadi, U.K. dan F.X. Koesharto. (2006). *Nyamuk. Unit Kajian Pengendalian Hama Permukiman*. FKH IPB. Bogor. hal. 23-51.
- Hariyono P. *Uji bakteriologis air sumur di Kecamatan Semampir Surabaya [Skripsi]*. Surabaya: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Airlangga; 2011.
- Hasyimi, H. dan Mardjan. (2004) *Pengamatan Tempat Perindukan Aedes aegypti Pada Tempat Penampungan Air Rumah Tangga Pada Masyarakat Pengguna Air Olahan*, J. Ekol.Kesehatan. April 2004; Vol 3 No 1: 37-42.
- Hasyimi M, Harmany M, Pangestu. 2009. *Tempat-Tempat Terkini Yang Disenangi Untuk Perkembangbiakan Vektor Demam Berdarah Aedes sp. Media Litbang Kesehatan*, 19(2):71- 76.
- Hoedojo. 1993. *Vektor Demam Berdasar Dengue dan Upaya Penanggulangannya*. *Maj Parasitol Ind* 6(1) : 31-45.
- Kusumawati Y, Suswardhany DL, Yuniarto S, Darnoto S. 2007. *Upaya pemberantasan nyamuk Aedes aegypti dengan pengasapan (fogging) dalam rangka mencegah peningkatan kasus demam berdarah*. *Jurnal Warta* 10:1-9.
- Lay,B.W. 1994. *Analisis Mikroba di Laboratorium*. PT.Raja Grafiindo Persada. Jakarta.
- Lehninger. 1995. *Microbiology: a Laboratory Manual*. Adison-Wesley. Publishing company: California.
- M. Quraish Shihab, 2000. *Tafsir Al-Mishbah, pesan kesan dan keserasian Al-Quran surah Al-Baqarah*. Volume 1, Jakarta.
- Mourya,D.T, V. Pidiyar, M. Patole, M.D. Gokale & Shouche. Y. 2002. *Pengaruh Bakteri Midgut Flora Aedes aegypti pada Kerentanan Nyamuk untuk Virus Dengue*. Pusat Sains Nasional Universitas Pune Ganeshkind Maharastra. India.
- Munif Said Hassan. 2012. *Skripsi Waktu Aktivitas Menghisap Darah Nyamuk Aedes aegypti Dan Aedes albopictus Di Desa Pa'lanassang Kelurahan Barombong Makassar Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Misnarliah, 2010. *Analisis Bakteri pada Jentik Ae. aegypti Linnaeus (Diptera: Culicidae) dari Berbagai Tempat Penampungan Air (TPA) Skripsi*. FMIPA UNHAS, Makassar.

- Nguyen, L A P. 2011. *Abundance and prevalence of Aedes aegypti immatures and relationships with household water storage in rural areas in Southern Vietnam. Int. health*, 3: 115-125
- Novelani, B. (2007). *Studi Habitat dan Perilaku Menggigit Nyamuk Aedes serta Kaitannya dengan Kasus Demam Berdarah di Kelurahan Utan Kayu Utara Jakarta Timur*. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Purnomo, A.T. dan Djoko A.P. 2003. *Uji Aktivitas "Crude" Enzim Proteolitik Bacillus subtilis FNCC 0059 Hasil Fermentasi Curah*. Farmasi Airlangga. Surabaya.
- Runtuwene J. 2013. *Skripsi Survei Jentik Nyamuk Aedes spp Di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Salim, M., Febriyanto. *Survey Jentik Aedes aegypti di Desa Saung Naga Kab. Oku Tahun 2005*.
- Samsi TK. 2001. *Demam Berdarah Dengue: Pengamatan Klinik dan Penetalaksanaan di Rumah Sakit Sumber Waras*. Ebers Papyrus, 7 (3), 163-173.
- Sayono, Qoniatum S, Mibhfakhudin. *Pertumbuhan larva Aedes aegypti pada air tercemar*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang. 2011; 7(1).
- Service MW. 2001. *Medical Entomology*. London Chapman & Hall.
- Soegijanto, S. 2006. *Kumuplan Makalah Penyakit Tropis dan Infeksi di Indonesia*. Airlangga: Surabaya.
- Soekamto. (2007). *Studi karakteristik wilayah dengan Kejadian DBD di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap*. [Tesis]. Univ. Dip. Semarang.
- Sudarmo, S., 1989. *Pestisida Tanaman. Edisi kedua*. Penerbit Kanisius Yogyakarta. 124 halaman.
- Sugeng Juwono Mardihusodo. 2009. *Skripsi Pemilihan Tempat Bertelur Nyamuk Aedes aegypti pada Air Limbah Rumah Tangga di Laboratorium*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Supartha, I.W. (2008) *Pengendalian Terpadu Vektor Virus Demam Berdarah Dengue, Aedes aegypti (L) dan Aedes albopictus (Skuse) Diptera :*

Culicidae. Senior Entomologist. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Denpasar.

Sutaryo. (2005). *Dengue*. Medika FK UGM. Yogyakarta.

Syahribulan, (2011) *Distribusi Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus sebagai Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) berdasarkan Faktor Elevasi, Jarak dari Pantai dan Kepadatan Penduduk*. Disertasi. PPs Unhas, Makassar.

Wibowo, A. E., W. Sumaryono, Milnaldi. 1997. *Uji Aktivitas Larvasida dan Identifikasi Senyawa Ekstrak Rimpang Temu Lawak Terhadap Larva Nyamuk Aedes aegypti*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Dalam Bidang Farmasi. Halaman 641-650.

Widiarti, Heriyanto B, Boewono DT. *Peta resistensi vektor demam berdarah dengue Aedes aegypti terhadap insektisida kelompok (organofosfat, karbamat, dan pyrethroid) di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Buletin Penelitian Kesehatan. 2011; 39 (4): 176-89.

Wongkoon, M. Jaroensutasinee, K. Jaroensutasinee, W. Preechaporn, and S. Chumkiew. (2007). *Larval Occurrence and Climatic Factors Affecting DHF Incidence in Samui Islands, Thailand*. *World Acad. of Sci., Eng. and Tech.* 33.

World Health Organization dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Pencegahan dan penanggulangan penyakit demam dengue dan demam berdarah*. Jakarta: World Health Organization dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2003.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN



a. Sterilisasi Alat Gelas



b. Sterilisasi Alat NonGelas

Pengambilan Sampel Jentik di Desa Bengo Kec. Bontonompo Selatan Kab.

Gowa




Tempat Penampungan Air (Tempayan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Isolat Bakteri Pengenceran pada *Nutrient Agar* (NA)



a. Pengenceran 10⁻⁶



c. Pengenceran 10⁻⁷




b. Pengenceran 10⁻⁸




d. Kontrol

Pengerjaan di Dalam *Laminary Air Flow*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Uji Biokimia



a. Uji Citrat

c. Uji Indole




b. Uji MR



d. Uji VP


Medium *Nutrient Agar* Miring dengan Penanaman Isolat Bakteri




Penggoresan secara Sinambung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Pewarnaan Gram




a. Pengenceran 10⁻⁶ Isolat J1




c. Pengenceran 10⁻⁶ Isolat J2




b. Pengenceran 10⁻⁶ Isolat J3




d. Pengenceran 10⁻⁶ Isolat J4



a. Pengenceran 10^{-7} Isolat J1



c. Pengenceran 10^{-7} Isolat J2



b. Pengenceran 10^{-7} Isolat J3



d. Pengenceran 10^{-8} Isolat J1

Pengukuran pH medium MR-VP



pH medium MR-VP adalah 7,5 bersifat basa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Koloni Tunggal



a. Isolat murni 10⁻⁶ (1) tampak depan

c. Isolat murni 10⁻⁶ (1) tampak belakang



b. Isolat murni 10⁻⁶ (2) tampak depan

d. Isolat murni 10⁻⁶ (2) tampak belakang



e. Isolat murni 10^{-6} (3) tampak depan




g. Isolat murni 10^{-6} (3) tampak belakang



f. Isolat murni 10^{-6} (4) tampak depan



h. Isolat murni 10^{-6} (4) tampak belakang



i. Isolat murni 10^{-7} (1) tampak depan



k. Isolat murni 10^{-7} (1) tampak belakang



j. Isolat murni 10^{-7} (2) tampak depan



l. Isolat murni 10^{-7} (2) tampak belakang



m. Isolat murni 10^{-7} (3) tampak depan



o. Isolat murni 10^{-7} (3) tampak belakang



n. Isolat murni 10^{-8} (1) tampak depan




p. Isolat murni 10^{-8} (1) tampak belakang

Isolat Bakteri



a. Pengenceran 10^{-6} Jentik 1,2

c. Pengenceran 10^{-6} Jentik 3,4



b. Pengenceran 10^{-7} Jentik 1,2,3

d. Pengenceran 10^{-7} Jentik 1



a. Air pada Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* ditapis



b. Ukuran Jentik Dewasa 5-6 mm

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Makassar, pada tanggal 12 September 1994 anak dari Bapak yang bernama Andi Imtihan, SH dan ibu bernama Hasni (Almarhumah). Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan *Sekolah Dasar di SD Inpres Hartaco Indah Kota Makassar* pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di *MTsN Model Makassar dan tamat pada tahun 2009*. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di *SMA Negeri 8 Makassar* dan lulus pada tahun 2012. Setelah tamat SMA, penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan di *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Biologi*. Pada tanggal 2 Februari sampai tanggal 2 Maret 2015 penulis menyelesaikan *Praktek Kerja Lapangan (PKL)* di salah satu Rumah Sakit Bhayangkara Makassar bagian Laboratorium Forensik. Selanjutnya, penulis melaksanakan *Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN Profesi)* di desa Bajeng Kabupaten Gowa selama kurang 2 bulan pada tanggal 6 Agustus sampai tanggal 6 Oktober 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R