


**AKTIVITAS ANTIMIKROBA DAN ANTIOKSIDAN BAKTERI
SEDIMEN LAUT PERAIRAN PUNTONDO
KABUPATEN TAKALAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjan Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

ST. RAVIDA SYAMSU

NIM. 60300113075

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St. Ravida Syamsu
Nim : 60300113075
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar/20 Maret 1995
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Cendrawasih IV
Judul : Aktivitas Antimikroba dan Antioksidan Bakteri Sedimen Laut Perairan Puntondo Kab. Takalar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, 23 Agustus 2017

Penyusun,






St. Ravida Syamsu
Nim: 60300113075

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Aktivitas Antimikroba dan Antioksidan Bakteri Sedimen Laut Perairan Puntodo Kab. Takalar", yang disusun oleh St. Ravida Syamsu', NIM: 60300113075, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu/23 Agustus 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Samata-Gowa, Agustus 2017

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof Dr. H. Arifuddin, M.Ag	()
Sekretaris	: Hasyimddin S.Si. M.Si	()
Munaqisy I	: Hafsan S.Si., M.Pd	()
Munaqisy II	: Isna Rasdianah Azis S.Si., M.Sc	()
Munaqisy III	: Dr. Dudung Abdullah M.Ag	()
Pembimbing I	: Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes	()
Pembimbing II	: Eka Sukmawaty S.Si., M.Si	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad M.Ag
NIP : 19691205 199303 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari St. Ravida Syamsu, NIM: 60300113075, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul “Aktivitas Antimikroba dan Antioksidan Bakteri Sedimen Laut Perairan Puntodo Kab. Takalar”, memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *minagasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa,

Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mashuri Masri, S.Si M.Kes
NIP: 198012162009121003


Eka Sukmawaty S.Si, M.Si
NIP: 198607160320152006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kalimat yang pantas terucap, selain kalimat Alhamdulillah Rabbil 'alamin yang mana atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “Aktivitas Antimikroba dan Antioksidan Bakteri Dari Sedimen Laut Perairan Puntondo Kabupaten Takalar” ini dapat terselesaikan, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan beberapa ilmu ini, pengetahuan yang dijadikan lampu penerang dalam mengarungi kehidupan ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara khusus iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis ayahanda Syamsu dan Ibunda Nurmia yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayang, ketulusan serta keikhlasan, yang tak henti-hentinya, melantunkan doa terbaik di setiap akhir sujud beliau bagi penulis serta rela mengorbankan segalanya demi tercapainya harapan dari sang anak tercinta yang tidak akan pernah mampu untuk dibalas. Semoga berkah dan rahmat Allah SWT. selalu melindungi mereka.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin M. Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Beserta pembantu Dekan I. pembantu Dekan II dan pembantu Dekan III serta seluruh staf administrasi yang telah memberikan fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri M.Kes, selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, sekaligus sebagai pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
4. Ibu Eka Sukmawaty S.Si, M.Kes selaku pembimbing II, dalam proses penulisan skripsi ini yang telah banyak menuangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .
5. Ibu Hafsan, S.SI., M.Pd., Ibu Isna Rasdianah Azis S. Si., M.Sc dan Bapak Dr. Dudung Abdullah, selaku penguji/pembahas I, II dan III yang senantiasa ,memberikan saran-saran dan penyempurnaan skripsi penulis.
6. Ibu Ulfa Triani A Latif, S.Si., M.Pd ., selaku Penasehat Akademik (PA) Jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) yang telah memberikan arahan serta nasihatnya.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa mendidik dan membagi ilmu kepada penulis.

8. Ibu Eka Sukmawaty S.Si., M.Si, selaku Kepala Laboratorium Jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Staf akademik, Staf jurusan Biologi (Kak Hasanah Aprilnanda/Ririn) dan laboran jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan kemudahan dalam pengurusan akademik.
10. Untuk Kepala Perpustakaan dan jajaran Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
11. Untuk saudara penulis (Kak Sulfiani S.Kom dan Kak Muh. Ridwan Syamsu) yang selama ini membantu dan memotivasi penulis.
12. Kakak-kakak (Asrianty Basri S.Si, Selfia Hadriany S.Si dan Rezky Awalya Zhaputri S.Si) yang senantiasa banyak membantu selama penelitian serta selalu memberikan dukungan dan motivasi.
13. Seperjuangan peneletian penulis, Nurfiaty Sukiman, Rezky Awalya, Maghfirah Mardatillah, Muh. Maslan, Siti Latifa Wulandari dan Inna Sintya, yang telah banyak memberikan masukan dan semangat antar satu sama lain, serta bantuan selama penelitian penulis berlangsung.
14. Teman-teman mahasiswa Jurusan Biologi dari 2005-2012 sebagai kakanda, untuk angkatan 2014-2016 sebagai generasi muda dan terkhusus untuk keluarga besar **BRACHIALIS** (2013) yang telah banyak memberikan saran dan menciptakan cerita indah selama kurang lebih 4 tahun.
15. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar (BBLK) (Maghfirah M, Resky Awalia, Fitri Syam, Nur


Afdalia A, Nurhidayah, Mawar, Altriana Eka P, Hardianty, Chaerunnisa dan Anggi Anggraeni) yang selalu bekerjasama dan saling membagi pengalaman.

16. Teman-teman KKN-Reguler Angkatan 53 di Kab. Gowa, se-Kec. Tinggi Moncong, terkhusus lingkungan Palangga posko 3.

Samata-Gowa, 23 Agustus 2017

Penulis

St. Ravida Syamsu



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Ayat Yang Relevan	11
B. Tinjauan Umum	14
1. Tinjauan Sedimen Alga.....	14
2. Tinjauan Bakteri Laut	16
3. Tinjauan Antimikroba.....	10
4. Tinjauan Antioksidan.....	25
C. Kerangka Fikir	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Variabel Penelitian	38
D. Defenisi Operasional Variabel	38
E. Alat dan Bahan	39
F. Prosedur Kerja.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan.....	43
B. Pembahasan.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

KEPUSTAKAAN	56
-------------------	----

LAMPIRAN	64
----------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Aktivitas antimikroba dengan masa inkubasi 3x24 jam	44
Tabel 4.2 Persen hambatan antioksidan isolat sedimen	45
Table 4.3 Klasifikasi hambatan.....	47



ABSTRAK

Nama : St. Ravida Syamsu

NIM : 60300113075

Judul Skripsi : “Aktivitas Antimikroba dan Antioksidan Bakteri dari Sedimen Laut Perairan Puntondo Kabupaten Takalar”.

Telah dilakukan penelitian tentang aktivitas antimikroba dan antioksidan dari bakteri sedimen laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dan antifungi serta aktivitas antioksidan dari bakteri sedimen laut. Pengujian antimikroba digunakan dengan cara difusi agar dan untuk uji antioksidan, menggunakan metode DPPH (*2,2-difenil-1-pikrihidrazil*). Hasil pengujian antimikroba menunjukkan bahwa hampir semua isolat sedimen alga mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *MRSA* dan *Candida albicans*. Selanjutnya, isolat yang memiliki daya hambat tertinggi akan diuji aktivitas antioksidannya. Masing-masing isolat yang diuji antioksidannya menunjukkan aktivitas antioksidan dengan masing-masing persen hambatan yaitu BS4 (96,226%), BS5 (94,829%), BS10 (94,829%) dan BS11 (98,323%).

Kata Kunci : Antimikroba, Antioksidan, Sedimen alga dan bakteri sedimen.

ABTRACK

Name : St. RavidaSyamsu

NIM : 60300113075

Title : “Antimicrobial and antioxidant activity of bacteria from Sediments of the sea waters of Puntondo Regency Takalar ”

The research on antimicrobial and antioxidant activity of marine sediment bacteria has done. This research aim to know the activity of antibacterial, antifungy and antioxidant from sea sediment bacteria. The test of antimicrobial activity used agar diffusion method and for antioxidant using the DPPH method (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil). Antimicrobial test result showed that almost all the isolates was able to inhibit the growth of *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *MRSA* and *Candida albicans*. Isolates with highest inhibitory zone used for antioxidant activity assay. Each of the isolate tested showed antioxidant activity percent barriers are BS4(96.226%), BS5 (94.829%), BS10 (94.829%) and BS11 (98.323%).

Keyword: Antimicrobial, Antioxidant and Sediment of Algae, bacteria sediment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menurunkan al-Quran sebagai pedoman untuk manusia dalam melakukan segala perbuatan didunia, termasuk dalam proses penelitian dikalangan mahasiswa. Allah SWT juga telah menurunkan nikmat dan karunia-Nya, baik yang ada diatas darat maupun yang berada dalam lautan. Maka kita sebagai seorang muslim, hendaknya bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surah an-Nahl ayat 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur (Kementrian agama, 2012).

Menurut Quraish Shihab (2002), menguraikan apa yang terdapat didalam air lagi tertutup oleh-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa Dia yakni Allah SWT yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-

ikan dan sebangsanya yang berdiam disana, sehingga kamu dapat memakan darinya yang segar, yakni binatang-binatang laut itu. Dan kamu dapat mengupayakan dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, seperti perhiasan dari permata dan mutiara.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah memberi khabar tentang pengendalian-Nya terhadap lautan yang menggebu-gebu dengan ombak, dan Allah memberi anugrah kepada hamba-Nya dengan menundukkan lautan itu untuk mereka, dan membuatnya mudah untuk mengarunginya, menjadikan didalamnya ikan besar dan ikan kecil dan menjadikan dagingnya halal, baik dari yang hidup atau dari yang mati. Allah memberi anugerah kepada mereka dengan apa yang Allah ciptakan didalam lautan itu, berupa mutiara dan permata yang sangat berharga. Dan Allah memudahkan bagi mereka untuk mengeluarkan mutiara dan permata itu dari tempatnya, sehingga menjadi perhiasan yang mereka pakai. Dan Allah memberi anugrah kepada mereka dengan menundukkan lautan untuk membawa perahu-perahu mengarunginya dan dikatakan pula, bahwa angin yang menggerakannya.

Dalam tafsir ilmi (Lajnah, Kemenag, 2012), menjelaskan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada manusia kemudahan mobilitas di laut dengan berbagai alat transformasi laut dan potensi pengkapan ikan dan hasil laut lainnya seperti mutiara. Dalam rangkaian ayat ini, sebelum dan sesudahnya, disebutkan secara integral nikmat Allah di bumi, di langit dan di laut (samudera). Hal itu dimaksudkan sebagai penyandaran terhadap manusia akan ke-Esaan ke-Kuasaan Allah sebagai Pencipta.

Terdapat dua hasil laut yang disebut dalam ayat tersebut yaitu daging segar dan perhiasan. Menurut az Zamakhsyari, yang dimaksud dengan daging segar adalah ikan, sementara penyertaan kata “segar” menunjukkan bahwa dalam waktu relatif singkat daging ikan akan cepat rusak. Adapun yang dimaksud dengan kata perhiasan (*hilyah*) pada ayat di atas adalah mutiara (*lu'lu'*) dan marjan. Penyebutan daging (ikan) segar merupakan representasi hasil laut yang pada umumnya dikonsumsi oleh manusia. Betapa banyak biota laut berlimpah-limpah disediakan oleh Allah di lautan mulai dari ikan segar dalam berbagai bentuk dan rasanya, hingga rumput yang halal dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan manusia.

Laut yang luasnya melebihi daratan merupakan salah satu area manusia mencari penghidupan yang menakjubkan, wilayah yang terkadang tampak tak bertepi dengan kedalaman yang mencapai ribuan meter menyimpan sejumlah besar air yang tak terhitung volumenya, bergerak dan bergelombang setiap saat, sungguh menurut logika manusia, bukanlah diciptakan oleh tangan manusia. Keanekaan hayati dan bahan mineral yang tersimpan di bawah permukaan laut tak terbayangkan jumlah asal-muasal. Makhluk hidup seperti ikan terus bereproduksi dalam jumlah yang sangat banyak untuk menyediakan mata rantai, memangsa, hal itu seharusnya tidak dilihat sebagai bentuk sadisme antarmerka, melainkan sebagai sebuah mekanisme yang dibuat oleh Sang Pencipta agar keseimbangan hidup di alam tetap terjadi secara alamiah. Sekiranya tidak ada mekanisme seperti itu, maka hampir dapat dipastikan seluruh lautan akan dipenuhi oleh ikan karena reproduksinya yang bersifat massal. Demikian pula proses alamiah bagaimana peran laut dalam menyediakan air laut

dimana penguapan yang dengan mudah dibawa oleh angin dan menjadi hujan di berbagai wilayah yang mungkin sangat jauh dari lautan. Manusia yang berakal sehat akan meyakini dirinya bahwa eksistensi laut dan aneka kehidupan di dalamnya pasti diciptakan oleh yang Maha Kuasa. Di dalam al-Qur'an dengan tegas disebutkan bahwa pencipta langit dan bumi, termasuk laut di dalamnya adalah Allah.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut diketahui bahwa semua makhluk hidup yang ada didarat dan dilautan telah Allah ciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ada begitu banyak makhluk hidup yang telah dimanfaatkan manusia, seperti binatang laut dan juga tumbuhan laut. Namun makhluk hidup yang ada dilaut, tidak terbatas hanya hewan dan tumbuhan saja, tetapi terdapat juga makhluk hidup yang lain yaitu bakteri dan fungi.

Sebagai negara yang dikelilingi oleh lautan, Indonesia memiliki panjang pantai sekitar 81.000 km dengan luas perairan mencapai 6.846.000 km². Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan serta memanfaatkan sumberdaya kekayaan laut seperti halnya memanfaatkan potensi mikroba laut (Dimara, 2011).

Bakteri laut sangat menarik dalam hal sistem biokimia dan fisiologinya karena kemampuan adaptasinya pada kondisi laut yang berubah-ubah. Bakteri laut hidup pada kondisi yang kompetitif dengan kondisi lingkungan yang unik, meliputi pH, suhu, tekanan, ketersediaan oksigen, cahaya, nutrisi, salinitas dan kandungan klorin serta bromina yang tinggi. Kondisi ini mengharuskan bakteri laut menghasilkan metabolit sekunder sebagai respon stressnya (Wenzel dan Muller 2005).

Bakteri laut dapat ditemukan pada badan air, bersimbiosis dengan tumbuhan laut sebagai epibiota atau endobiota dan pula ditemukan pada sedimen laut. Karakter sedimen laut berperan penting pada populasi mikroba yang berada didalamnya dan metabolit sekunder yang dihasilkan (Mucci, dkk, 2000).

Hedges dan Oades (1997) menyatakan bahwa kandungan Na^+ , Ca^+ , dan Mg^{2+} pada sedimen laut sangat tinggi dan pHnya berkisar antara 7-8. Sedimen laut pada kedalaman 0,56 – 0,59 m memiliki kandungan karbon organik sebesar 4,69% bobot kering, fosfor 38 ppm dan arsenik 29 mmol/gram.

Selain mengandung bahan organik, laut juga memiliki bakteri yang terdiri dari bakteri autotropik dan heterotropik. Bakteri heterotropik yang berada pada laut, hidup sebagai individu pada air laut dan menempel pada permukaan partikel dan sedimen. Bakteri ini mengkonsumsi bahan organik terlarut karena tidak mempunyai alat selain membran yang dapat memasukkan nutrisi terlarut yang melaluinya. Beberapa bakteri mampu menghasilkan enzim yang dapat mendegradasi molekul berukuran besar sehingga dapat melalui dinding sel (Emerson dan Hedges, 2008). Bakteri penghasil agen mikrobial juga ditemukan di sedimen laut, secara umum adalah *Bacillus* dan *Actinomiset* dari kelompok gram positif dan untuk kelompok gram negatif yaitu *Pseudomonas* dan *Alteromonas* (Pandey dkk, 2002 ; Osborne dkk 2002).

Blunt dkk (2004) dan Berdy (2005) menjelaskan bahwa bakteri laut menunjukkan aktivitas biologi yang unik dibandingkan bakteri terestrial. Berdasarkan hal tersebut dan uraian tentang mikroba yang mendiami sedimen, maka akan dilakukan penelitian tentang aktivitas senyawa bioaktif mikroba sedimen laut.

Penelitian ini akan menggunakan mikroba sedimen laut yang berasal dari sedimen *Caleurpa racemosa* di perairan Puntondo, Kabupaten Takalar. Substrat *Caleurpa racemosa* dipilih karena pada penelitian Nurzakiah (2016) telah melaporkan bahwa *Caleurpa racemosa* dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*. Selanjutnya telah diketahui bahwa salah satu mekanisme bakteri endofit masuk ke jaringan tanaman melalui akar sehingga sangat menarik untuk meneliti mikroba yang berasal dari sedimen *Calerupa racemosa* untuk mengetahui aktivitas antimikroba dan antioksidannya.

Saat ini salah satu penyebab penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Upaya untuk menangani mikroba yang bersifat patogen yaitu dengan menggunakan mikrobalain yang memiliki sifat antagonis yang dapat menghambat metabolisme mikroba lainnya. Agen antimikroba umumnya bersifat *selektif toxicity* sehingga sering digunakan dalam terapi penyembuhan penyakit yang disebabkan mikroba patogen (Putri, 2013).

Antimikroba adalah suatu zat yang dapat mencegah terjadinya pertumbuhan dan reproduksi mikroba yang bersifat patogen. Antibiotik maupun antimikroba sama-sama menyerang mikroba patogen. Antimikroba biasanya dijelaskan sebagai suatu zat untuk membersihkan permukaan dan membunuh mikroba yang berpotensi membahayakan (Volk dan Wheeler, 1993).

Menurut Lutfi (2004), antimikroba merupakan bahan yang dapat membunuh atau menghambat aktivitas mikroorganisme dengan berbagai cara. Senyawa antimikroba terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan mekanisme daya kerjanya

atau tujuan penggunaannya. Bahan antimikroba dapat berupa secara fisik atau kimia dan berdasarkan penggunaannya dapat berupa desinfektan, antiseptik, sterilizer, sanitizer dan sebagainya.

Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat oksidasi molekul yang dapat menghasilkan radikal bebas. Antioksidan telah secara luas digunakan untuk melindungi makanan dari degradasi oksidatif. Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dua macam, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetis (buatan). Antioksidan sintetis yang paling sering digunakan adalah *Propil Galat* (PG), *Butylated Hydroxyanisole* (BHA), *Butylated Hydroxitoluene* (BHT) dan *Buthylhydroquinone* (TBHQ). Antioksidan sintetis ini dikhawatirkan dapat memberi efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia karena bersifat karsinogenik. Berbagai studi mengenai BHA dan BHT menunjukkan bahwa dapat menimbulkan tumor dalam penggunaan jangka panjang (Andarwulan, 1996).

Keanekaragaman makroalga yang berada di Pulau Puntondo Kecamatan Mangara'bombang Kabupaten Takalar tergolong masih banyak jenis makroalga. Hal ini terjadi karena masyarakat disana menjaga kelestarian dan kebersihan pulau tersebut. Sehingga para wisatawan yang berkunjung disana dimanjakan dengan keindahan pulau Puntondo. Selain itu jenis-jenis makroalga, terumbu karang dan lain sebagainya masih dijaga dan dilestarikan. Sudah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian disana. Namun, belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai bakteri yang terdapat pada sedimen alga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aktivitas antimikroba dari bakteri sedimen laut di perairan Puntondo, Kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana aktivitas antioksidan dari bakteri sedimen laut dari perairan Puntondo, Kabupaten Takalar ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Mikroorganisme yang digunakan berasal dari sedimen alga *Caleurpa racemosa*.
2. Uji aktivitas antimikroba dengan menggunakan metode difusi agar.
3. Uji aktivitas antioksidan bakteri sedimen alga *Caleurpa racemosa* dengan menggunakan metode DPPH (2,2-diphenil 1-picrylhidrazil).

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, namun telah banyak referensi mengenai eksplorasi sedimen laut sebagai antimikroba dan antioksidan yang akan dilakukan di perairan Puntondo, Kabupaten Takalar dan referensi mengenai penghasil antioksidan. Penelitian yang berkaitan dilakukan oleh :

1. Zereini (2014) dengan penelitian yang berjudul *Bioactive Crude From Four Bacterial Isolates of Marine Sediments from Red Sea, Gulf of Aqaba, Jordan*. Melaporkan bahwa ekstrak kasar dari *Brevibacterium* sp memiliki aktivitas antibakteri yang lemah tapi aktivitas antioksidan menengah. *Moraxella* sp

memperlihatkan aktivitas antibakteri yang lemah dan *Corynebacterium* sp mempunyai potensi menghasilkan aktivitas antioksidan.

2. Suvega dan Arunkumar (2014) dengan penelitian berjudul *Antimicrobial Activity of Bacteria Associated with Seaweeds Against Plant Pathogens on Par with Bacteria Found Seawater and Sediments of South India Coasts* menemukan bahwa didapatkan sebanyak 673 isolat yang termasuk kedalam 27 genus bakteri, memperlihatkan aktivitas antibakteri terhadap *Xanthomonas axonopodispv citri*, *Oryzae* pv dan *Ustilaginoideavirens*.
3. Nurzakiyah (2016) mendapatkan 12 isolat bakteri endofit yang diisolasi dari *Caleurpa racemosa* asal perairan Puntondo, Kabupaten Takalar. Semua isolat memperlihatkan aktivitas penghambat terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui aktivitas antimikroba dari bakteri sedimen laut dari perairan Puntondo, Kabupaten Takalar.
2. Mengetahui aktivitas antioksidan dari bakteri sedimen laut perairan Puntondo, Kabupaten Takalar.

F. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan biologi dan khususnya untuk mata kuliah Mikrobiologi.

2. Untuk menambah referensi bagi masyarakat umum serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Allah SWT menurunkan al-Quran sebagai pedoman untuk manusia dalam melakukan segala perbuatan di dunia, termasuk dalam proses penelitian. Allah SWT juga telah menurunkan nikmat dan karunia-Nya, baik diatas darat maupun didalam lautan. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya bersyukur sebagaimana dalam surah ali-Imran ayat 191 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “ Ya Tuhan Kami. Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka (Kementrian agama, 2012).

Dalam tafsir ilmiah, ayat 191 surah ali-Imran menjelaskan ciri-ciri orang yang berakal, yaitu mereka yang selalu ingat Allah, serta berusaha mengikuti petunjuk-petunjuknya-Nya, baik ketika berdiri, berjalan dan melaksanakan segala aktivitas, maupun ketika duduk, bahkan ketika beristirahat tidur-tiduran dan sedang tidak melaksanakan kegiatan apa-apa. Juga selalu memikirkan rahasia penciptaan alam, yaitu langit, bumi dan segala isinya, sehingga mengetahui sifat-sifat dan manfaat

langit yang luas, kandungan dan kekayaan bumi, baik didarat maupun dilautan, serta bagaimana menafoatkannya dan tidak membuat kerusakan di alam ini.

Kajian mendalam semua ini akan bermuara pada simpulan bahwa semua ciptaan Allah tidak sia-sia, semua bermanfaat bagi manusia, ada guna dan faedahnya. Akhirnya timbul dari jiwa terdalam pengakuan tulus akan ke-Mahasucian Sang Pencipta: “Alhamdulillah, kami dapat memahami semua ini”.

Maksud dari surah al-Imran ayat 191 diatas ialah bahwa mereka yang tak putus-putus berdzikir dalam segala keadaan, baik dalam keadaan berdzikir dengan hati maupun dengan lisan mereka. Mereka yang memahami apa yang terdapat pada keduanya yakni langit dan bumi dari kandungan hikmah yang menunjukkan keagungan Al Khalik (Allah), kekuasaan-Nya keluasan ilmu-Nya, hikmah-Nya, pilihan-Nya serta rahmat-Nya (Abdullah, 2011).

Allah tidak menciptakan semua yang ada dalam alam raya dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa yang mereka kerjakan dan juga memberikan balasan orang-orang yang baik dengan balasan yang lebih baik yaitu surga. Dengan mengerjakan amal saleh, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada manusia dan dapat mengantarkan kami kesurga serta menyelamatkan diri kita dari azab-Nya yang sangat pedih (Abdullah, 2011).

Tafsir diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menganugerahkan kepada manusia akal pikiran untuk memikirkan dan mencari tau tentang semesta raya. Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu termasuk penciptaan

mikroba yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Seperti dalam surah al-Baqarah ayat 26, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾

Terjemah:

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik (Kementrian Agama, 2012).

Dalam tafsir ilmi (Lajnah, Kemenag, 2012), menjelaskan, Allah menegaskan betapa Dia tidak segan membuat perumpamaan dengan nyamuk. Itu karena meski hewan ini bertubuh kecil, nyatanya tidak ada satupun manusia yang dapat menciptakannya. Hanya Allah yang yang mampu menciptakannya dan menyertai ciptaan itu dengan manfaat-manfaat yang ditujukan bagi kehidupan manusia. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah.

Maksud dari ayat tersebut yaitu, hanya Allah yang dapat menciptakan segala sesuatu bahkan makhluk sekecil apapun. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah swt. Selain nyamuk yang merupakan makhluk yang berukuran kecil, terdapat juga mikroba. Mikroba yang memiliki banyak manfaat, baik dalam kesehatan, ekonomi dan pangan.

B. Tinjauan Umum

1. Tinjauan sedimen alga

Luas wilayah Indonesia sebagian besar yaitu dua per tiga merupakan wilayah perairan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, flora maupun fauna, baik di wilayah darat ataupun perairan. Khusus untuk biodiversitas laut, terdapat sekitar 782 spesies alga, 12 spesies lamun, 38 spesies mangrove, 850 spesies spons, 210 spesies karang lunak, serta ratusan ribu spesies berbagai biota lainnya, baik makro maupun mikro, yang merupakan kekayaan alam lautan Indonesia. Selain spesies-spesies tersebut, kelompok organisme yang masih kurang dieksplorasi dan didayagunakan adalah berbagai jenis mikroba laut. Semua itu merupakan potensi yang luar biasa sebagai sumber pangan, obat-obatan, bahan diagnostika ataupun aneka produk industri yang bernilai ekonomi tinggi (Noviendri, 2007).

Salah satu biota yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yaitu alga. Alga adalah tumbuhan nonvascular yang memiliki bentuk thallus yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Alga mengandung nukleus yang dibatasi oleh membran. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas, yang dapat berbentuk pita atau seperti cakram-cakram diskrit (satuan-satuan tersendiri) sebagaimana yang terdapat pada tumbuhan hijau (Suparmi, 2009).

Alga juga telah terbukti mengandung beberapa senyawa yang dapat dimanfaatkan, salah satunya yaitu dalam bidang kesehatan. Salah satu sumber penghasil senyawa dari alga yaitu adanya mikroba yang berasosiasi dengan alga dan

menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang disebut dengan mikroba endofit. Mikroba endofit adalah mikroba yang hidup dalam bentuk koloni didalam jaringan tanaman tanpa membahayakan jaringan inangnya. Mikroba endofit masuk kedalam jaringan tumbuhan melalui akar yang melekat pada substrat (Kuncoro, 2011).

Jenis substrat yang paling banyak ditumbuhi oleh alga yaitu jenis substrat lumpur-berpasir. Substrat berperan untuk menentukan stabilitas kehidupan dan juga sebagai media tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan laut dan juga salah satu sumber unsur hara. Selain itu, substrat juga mengandung zat-zat organik yang berfungsi sebagai nutrisi bagi mikroorganisme yang terdapat didalamnya (Singh dan Reddy, 2014). Perbedaan komposisi jenis substrat dapat menyebabkan perbedaan komposisi jenis tumbuhan yang tumbuh dipermukaannya. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa perbedaan komposisi dan jenis sedimen tersebut, sehingga menyebabkan perbedaan nutrisi bagi tumbuhan laut dan proses dekomposisi (Hasanuddin, 2013).

Sedimen laut merupakan partikel batuan, mineral ataupun bahan organik yang terbentuk akibat proses pengendapan melalui perantara angin, air dan juga es (Idham, 2010). Secara umum, sedimen laut memiliki peranan penting, yaitu sebagai sumber bahan organik bagi berbagai kehidupan vegetasi laut. Selain itu, sedimen laut juga berpotensi untuk menghasilkan senyawa kimia baru yang memiliki berbagai aktivitas biologis, bahkan sedimen laut memiliki peran penting dalam siklus karbon serta kebutuhan nutrisi bagi kehidupan biota laut. Sedimen laut mengandung berbagai macam unsur bahan organik yang tinggi dan kompleks dengan kandungan mencapai 0,5-20% berat kering. Sedimen laut yang berada pada daerah tropis diwilayah

Indonesia, umumnya memiliki potensi dan kandungan organik yang lebih tinggi (Riyanto, 2011).

Besarnya kandungan nutrisi dalam sedimen bukan berarti akan selalu dalam konsentrasi yang sama pada karakteristik sedimen dasar dan kedalaman perairan. Bila terjadi perbedaan maka hal ini dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan kondisi dan sebaran pada setiap jenis tumbuhan laut yang tumbuh dalam perairan (Hasanuddin, 2013).

2. Tinjauan bakteri laut

Laut merupakan salah satu sumber kekayaan biologi dan kimia. Salah satu sumber kekayaan biologi dan kimia yang dapat dimanfaatkan yaitu bakteri laut. Meskipun bakteri laut menyusun sebagian kecil makhluk hidup, tetapi satu sel bakteri laut dapat mengandung beberapa senyawa kimia yang berpotensi dalam bidang kesehatan, industri bahkan pangan (Noviani, 2008).

Pada umumnya, ukuran tubuh bakteri sangat kecil dan dapat dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Bakteri adalah sel prokaryot yang bersifat khas, uniseluler dan tidak mengandung struktur yang membatasi membran di dalam sitoplasma. Bentuk sel bakteri bermacam-macam, ada yang berbentuk bulat, batang dan juga spiral. Berdasarkan komposisi selnya, bakteri dibedakan atas Gram positif dan Gram negatif. Bakteri Gram positif adalah bakteri yang memberi respon dengan warna biru keunguan jika dilakukan uji pewarnaan Gram, sedangkan bakteri Gram negatif memberikan respon dengan warna merah ketika dilakukan uji pewarnaan Gram (Tortora dan Derrickson, 2006).

Bakteri terdapat secara luas dilingkungan alam yang berhubungan dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air dan tanah. Pertumbuhan bakteri dipengaruhi faktor lingkungan seperti suhu, oksigen, karbondioksida, pH, nutrien dan cahaya (Suendra, 1991).

Bakteri laut yang memiliki senyawa kimia yang bersifat potensial, umumnya berasal dari metabolit sekunder mikroba. Metabolit adalah suatu reaksi kimia yang berlangsung didalam organisme yang dalam mekanismenya mencakup enzim, atau dengan kata lain metabolit adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan melalui proses metabolisme. Metabolit diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer adalah suatu metabolit atau molekul yang pada produk akhirnya memiliki fungsi yang sangat esensial bagi kelangsungan hidup organisme tersebut, serta terbentuk secara intraseluler dan dalam jumlah yang terbatas. Contohnya, protein, lemak, karbohidrat dan DNA. Pada sebagian besar mikroorganisme, jika memproduksi metabolit yang berlebihan, maka dapat menghambat pertumbuhannya dan bahkan dapat mematikan mikroorganisme tersebut. Metabolit primer diproduksi pada waktu yang sama dengan pembentukan sel baru dan proses metabolisme tersebut untuk membentuk metabolit primer disebut metabolisme primer (Noviani, 2008).

Untuk metabolit sekunder, diproduksi oleh mikroorganisme setelah fase pertumbuhan aktif telah berhenti. Zat tersebut biasanya tidak diperlukan dalam proses metabolisme atau pemeliharaan sel-sel yang penting. Meskipun tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan, namun metabolit sekunder dapat berfungsi sebagai nutrisi

darurat untuk bertahan hidup. Metabolit sekunder dibuat dan disimpan secara ekstraseluler dan tidak diproduksi pada saat pertumbuhan sel secara cepat (fase logaritmik) dan pada fase ini, mikroorganisme lebih tahan terhadap keadaan ekstrim (Beksono, 2014).

Karakteristik bakteri laut yaitu, pada pertumbuhannya memerlukan air laut atau kadar garam, sehingga bakteri laut digolongkan kedalam kelompok bakteri halofilik. Berdasarkan toleransi kadar garamnya, bakteri laut terbagi dua yaitu bakteri halofilik moderat, yaitu bakteri yang dalam pertumbuhannya memerlukan 1% hingga 20% NaCl, sedangkan untuk bakteri halofilik ekstrim yaitu bakteri yang memerlukan konsentrasi NaCl lebih dari 15% hingga 31% dan hidup pada kadar garam yang cukup tinggi (Ogenski dan Umbret 1959 dalam Lisdayanti, 2013).

Pada umumnya, bakteri laut memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dengan suatu lapisan pada permukaan padat serta penyebarannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gerakan air laut, jarak dari pantai, tingkat kedalaman, cahaya matahari, iklim dan organisme lainnya. Untuk faktor biotik, yang mempengaruhi penyebaran bakteri laut yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan laut (Shidarta 2000 dalam Lisdayanti, 2013).

Menurut Pelczar dan Chan (1988), ada beberapa faktor abiotik yang mempengaruhi penyebaran bakteri laut, yaitu:

a. Suhu

Semua proses makhluk hidup termasuk bakteri, bergantung pada reaksi kimiawi dimana adanya laju yang dipengaruhi oleh suhu. Keragaman suhu dapat mengubah proses metabolisme tertentu pada sel bakteri.

b. Tekanan hidrostatik

Pada tekanan hidrostatik mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Umumnya, pada tekanan 1 – 400 atm tidak mempengaruhi ataupun hanya sedikit yang terpengaruh saat dalam proses metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Tekanan hidrostatik yang lebih tinggi dapat menghambat bahkan menghentikan pertumbuhan mikroba, karena mempengaruhi proses sintesis RNA, DNA dan protein. Selain itu, juga mengganggu fungsi transport membran sel maupun mengurangi aktivitas berbagai macam enzim.

c. Salinitas

Konsentrasi seluruh bahan padat dalam air laut disebut dengan salinitas, dengan satuan ppt (*Part Per Thousand*). Tingkat salinitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan serta pertumbuhan mikroorganisme diperairan. Sebaran salinitas dilaut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan dan aliran sungai.

d. pH

Sebagian besar bakteri memiliki tingkat pH minimum dan maksimum antara 4 hingga 9 dalam pertumbuhannya. Umumnya, pH optimum pertumbuhan bakteri

terletak antara 6,5 dan 7,5 tetapi beberapa spesies dapat tumbuh dalam keadaan asam ataupun basa.

e. Nitrat dan fosfat

Nitrat (NO_3) adalah bentuk utama dari nitrogen diperairan alami serta sangat mudah larut dan bersifat stabil. Senyawa ini merupakan salah satu senyawa yang berfungsi dalam merangsang pertumbuhan biomassa laut, sehingga secara langsung dapat mengontrol perkembangan produksi primer. Fosfat merupakan salah satu unsur esensial bagi metabolisme dan pembentukan protein. Sumber utama fosfat terlarut dalam perairan adalah hasil pelapukan, mineral yang mengandung fosfor serta bahan organik seperti hancuran tumbuh-tumbuhan.

3. Tinjauan antimikroba

Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan yang digunakan masyarakat, baik itu secara tradisional maupun secara modern. Masyarakat telah mengenal dan menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai obat tradisional sejak dahulu kala untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Sekarang ini, dengan semakin mahalnya obat modern dipasaran merupakan salah satu alasan untuk menggali kembali penggunaan obat tradisional seperti pada penggunaan antimikroba (Noor, dkk, 2006).

Saat ini salah satu penyebab penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Upaya untuk menangani bakteri yang bersifat pathogen yaitu dengan menggunakan bakteri lain yang memiliki sifat antagonis yang dapat menghambat metabolisme bakteri lainnya. Agen antibakteri

umunnya bersifat *selektif toxicity* sehingga sering digunakan dalam terapi penyembuhan penyakit yang disebabkan bakteri pathogen (Putri, 2013).

Antibakteri adalah suatu zat yang mencegah terjadinya pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Antibiotik maupun antibakteri sama-sama menyerang bakteri patogen. Antibakteri biasanya dijelaskan sebagai suatu zat untuk membersihkan permukaan dan membunuh bakteri yang berpotensi membahayakan. Kepekaan antibakteri adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan bakteri (Volk dan Wheeler, 1993)

Kepekaan bakteri terhadap senyawa yang berfungsi sebagai antibiotik bervariasi. Bakteri gram positif biasanya lebih peka dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Meskipun beberapa antibiotik dapat bereaksi atau mempengaruhi bakteri negatif, sehingga tidak menutup kemungkinan bakteri gram negatif dapat lebih peka pada beberapa zat antibiotik tertentu. Zat antibiotik yang dapat bereaksi dengan bakteri gram positif dan gram negatif disebut dengan antibiotik *Broad Spectrum* atau antibiotik luas (Brock *et al* 1994 dalam Lisdayanti, 2013).

Mekanisme antibakteri untuk menghambat pertumbuhan bakteri terdapat dua cara yaitu bakteristatik dan bakterisida. Hambatan ini terjadi sebagai akibat gangguan yang esensial bagi pertumbuhan. Uji antibakteri dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas suatu bakteri terhadap antibakteri. Terdapat tiga metode yang umum digunakan dalam uji antibakteri, yaitu sebagai metode dilusi kaldu, metode dilusi agar, metode difusi cakram. Metode yang paling umum

digunakan yaitu metode difusi cakram (Brock dan Madigan 1994 dalam Lisdayanti, 2013).

Prinsip dari metode difusi cakram adalah senyawa antibakteri yang dijenuhkan didalam kertas saring (cakram kertas). Cakram kertas yang mengandung senyawa antibakteri tertentu ditanam pada media pembenihan agar yang padat dan telah dicampurkan dengan bakteri uji, kemudian diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu, selanjutnya diamati adanya area (zona) bening disekitar cakram kertas yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri.

Antifungi adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh fungi pathogen. Antifungi ini terbagi menjadi dua, yaitu fungisidal dan fungistatik. Fungisidal yaitu suatu senyawa yang dapat menghambat bahkan membunuh fungi pathogen, sedangkan fungistatik yaitu suatu zat atau senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan fungi pathogen tanpa mematikannya (Marsh 1977 dalam Putri, 2013).

Untuk mekanisme antifungi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian (Istya, 2009) yaitu :

- a. Gangguan pada membran sel
- b. Penghambat biosintesis ergosterol dalam sel jamur
- c. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein jamur
- d. Penghambatan mitosis jamur

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh suatu bahan antifungi, seperti mampu mematikan mikroorganisme, mudah larut dan bersifat stabil, tidak bersifat

racun bagi manusia, hewan dan tumbuhan, efektif pada suhu kamar dan suhu tubuh, tidak menimbulkan karat dan warna (Hasan, 2015).

Uji senyawa antifungi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu senyawa uji dapat menghambat pertumbuhan jamur dengan mengukur respon pertumbuhan populasi jamur terhadap agen antifungi (Pratiwi, 2008).

Pengujian antifungi terbagi atas dua metode, yaitu metode difusi dan metode dilusi. Untuk metode difusi, merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam pengujian antifungi. Pada metode difusi cakram, menempatkan kertas cakram yang sudah mengandung bahan antimikroba tertentu pada medium lempeng padat yang telah dicampurkan dengan jamur yang akan diuji. Kemudian diinkubasi pada suhu 37° selama 18 – 24 jam, selanjutnya mengamati adanya area (zona) bening disekitar cakram. Daerah yang nampak disekitar kertas cakram akan menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikroba. Jamur yang sensitif terhadap bahan antimikroba ditandai dengan adanya daerah hambatan disekitar cakram, sedangkan jamur yang resisten terlihat tetap tumbuh pada tepi atas cakram (Afifah, 2015).

Menurut Kusmiyati (2007), metode difusi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. *Disk diffusion*, yaitu agen antimikroba yang dijenuhkan pada disk (kertas saring) kemudian disk tersebut diletakkan pada permukaan media agar yang telah diinokulasikan dengan mikroba uji. Pengukuran zona hambat diamati pada daerah sekitar disk.

2. Metode sumuran, yaitu agen antimikroba diteteskan pada sumuran dengan diameter tertentu yang dibuat pada media agar yang telah diinokulasi dengan mikroba uji. Untuk pengukuran zona hambat, dapat diamati pada skala sumuran.
3. *Pour plate*, hampir mirip dengan disk diffusion, yang membedakan hanyalah pada media agar yang telah dicampurkan dengan suspensi mikroba uji.

Untuk pengujian dilakukan dengan mengukur zona hambatan yang berwarna bening pada media. Bila diameter daerah hambatan 5 mm, maka aktivitas penghambatannya dikategorikan lemah, jika 5-10 mm dikategorikan sedang, jika 10-20 mm dikategorikan kuat dan 20 mm atau lebih dikategorikan sangat kuat (Stout 2000).

Pada metode dilusi, prinsip yang digunakan yaitu menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan sejumlah sel tertentu mikroba yang diuji. Metode dilusi merupakan larutan uji diencerkan hingga diperoleh beberapa konsentrasi, kemudian masing-masing larutan ditambahkan suspensi jamur kedalam media. Prosedur dilusi digunakan untuk mencari konsentrasi hambat minimum (KHM), yaitu konsentrasi rendah yang dapat menghambat pertumbuhan jamur. Untuk konsentrasi bunuh minimum (KBM), merupakan konsentarsi rendah yang dapat membunuh jamur. Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau membunuhnya, masing-masing dikenal sebagai kadar hambat minimal (KHM) atau *minimum inhibitory concentration* (MIC) dan kadar bunuh minimal (KBM) (Syarif, dkk, 2001). Nilai MIC dapat ditentukan dengan metode penipisan (*dilution method*), yaitu dengan melakukan suatu seri pengenceran senyawa akan

diuji didalam tabung reaksi, kemudian memasukkan fungi uji. Kemudian menentukan batas terendah yang dapat menghambat tumbuhnya jamur tersebut yang disebut MIC. Jamur yang berada didalam tabung yang tidak menunjukkan pertumbuhan dapat disubkultur dalam media tanpa senyawa uji untuk menentukan apakah hambatan ini reversible atau permanen. Dengan cara ini dapat ditentukan pula nilai MBC (Sujudi 1983 dalam Hasan, 2015).

5. Tinjauan antioksidan

Antioksidan didefinisikan sebagai zat yang dapat melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas atau *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang terbentuk sebagai hasil dari metabolisme oksidatif, yaitu hasil dari reaksi-reaksi kimia dan proses metabolik yang terjadi dalam tubuh. Dalam arti lain, antioksidan merupakan senyawa yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas dalam lipid. Antioksidan memiliki peranan penting dalam mencegah oksidasi radikal bebas yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti karsinogenik dan penuaan (Mardiyah, dkk, 2014).

Menurut Nareswati (2007) dan Eskin (2011) menyebutkan bahwa antioksidan dinyatakan sebagai senyawa yang secara nyata dapat memperlambat oksidasi, walaupun dengan konsentrasi yang rendah. Husnah (2009) menyatakan bahwa antioksidan dalam bahan pangan digunakan untuk mempertahankan mutu produk pangan. Berbagai kerusakan seperti ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan aroma serta kerusakan fisik lainnya.

Antioksidan merupakan substansi penting yang mampu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan meredamnya. Konsumsi antioksidan dalam jumlah memadai mampu menurunkan resiko terkena penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, kanker, aterosklerosis, osteoporosis dan lain-lain. Konsumsi makanan yang mengandung antioksidan, dapat meningkatkan imunologi dan menghambat timbulnya penyakit degeneratif akibat penuaan. Kecukupan antioksidan secara optimal dibutuhkan oleh semua golongan umur (Winarsi, 2007).

Sumber antioksidan bisa kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi, baik secara alami maupun sintesis. Secara umum, berdasarkan sumbernya antioksidan dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu, antioksidan endogen dan antioksidan eksogen (Percival, 1998).

Dalam keadaan normal, secara fisiologis sel memproduksi radikal bebas sebagai konsekuensi logis akibat reaksi biokimia dalam metabolisme sel aerob. Tubuh secara alami memiliki sistem pertahanan terhadap radikal bebas yaitu antioksidan endogen intrasel yang terdiri dari enzim-enzim yang disintesis oleh tubuh seperti *Superoksida dismutase* (SOD), katalase dan glutathion peroksidase. Antioksidan yang terdapat dalam tubuh harus dalam jumlah yang berlebihan, maka enzim-enzim yang berfungsi sebagai antioksidan endogen dapat menurunkan aktivitasnya (Afifah, 2015).

Untuk antioksidan eksogen, dibedakan menjadi antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami dapat diperoleh dari ekstraksi bahan alami, sedangkan antioksidan sintetik diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia (Muawwanah,

dkk, 1997). Saat ini, antioksidan sintetis yang sering digunakan pada bahan pangan yaitu *butylated hydroxytoluene* (BHT), *butylated hydroxyanisole* (BHA), *propyl gallate* (PG) dan *nordiethyl pyroquateric acid* (NDGA) (Pramesiti, 2013). Penggunaan pada antioksidan sintesis pada setiap bahan pangan harus terkontrol secara baik, karena apabila pemakaiannya terlalu berlebihan maka fungsi antioksidan tersebut akan berubah menjadi racun didalam tubuh kita (Maulida, 2007).

Kekhawatiran akan adanya efek samping dari antioksidan sintetis menyebabkan antioksidan alami menjadi alternatif. Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan yang disebabkan senyawa oksigen reaktif, menghambat terjadinya penyakit degeneratif serta mampu menghambat peroksidasi lipid pada makanan. Antioksidan alami perlu dikembangkan untuk memperoleh antioksidan yang lebih aman dikonsumsi pada penderita dengan gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, hamil dan menyusui. Kemudian, obat tradisional misalnya bakteri endofit yang berasal dari tanaman memiliki kelebihan yang tidak dimiliki obat-obatan sintesis kimia, yaitu efek samping yang relatif kecil dan lebih ekonomis (Sunarni, 2005).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa antioksidan alami memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan antioksidan sintetis, itu terbukti karena antioksidan alami mulai meningkat dalam penggunaannya dan menggantikan antioksidan sintetis. Antioksidan alami secara toksikologi lebih aman untuk dikonsumsi dan lebih mudah diserap oleh tubuh daripada antioksidan sintetis (Paiva, 1999).

Antioksidan merupakan substansi nutrisi maupun non nutrisi yang terkandung dalam bahan pangan, mampu mencegah atau memperlambat terjadinya kerusakan oksidatif yang terjadi didalam tubuh. Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron dalam tubuh (elektron donor) atau reduktan. Antioksidan dapat menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil tetapi mampu menginvasi reaksi oksidasi dengan mencegah terbentuknya radikal (Winarsi, 2007).

Secara umum, tahapan reaksi pembentukan reaksi radikal bebas melalui 3 tahapan reaksi, yaitu inisiasi, propagasi dan terminasi. Pada tahap inisiasi merupakan awal pembentukan radikal bebas, tahap propagasi merupakan proses pemanjangan rantai, dan untuk tahap terminasi merupakan proses bereaksinya senyawa radikal dengan radikal lain atau dengan kata lain yaitu penangkapan radikal sehingga potensi propagasinya rendah. Reaktivitas radikal bebas tersebut dapat dihambat dengan beberapa cara (Winarsi, 2007) yaitu:

- a. Mencegah atau menghambat pembentukan radikal bebas yang baru
- b. Menginaktivasi atau menangkap radikal bebas dan propagasi (pemutusan rantai)
- c. Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas.

Tubuh manusia memiliki sistem antioksidan untuk menangkal reaktivitas radikal bebas yang secara kontinyu dibentuk oleh tubuh. Kerusakan-kerusakan yang dibentuk oleh radikal bebas pada dasarnya diakibatkan oleh jumlah senyawa oksigen reaktif yang melebihi jumlah antioksidan dalam tubuh. Radikal bebas merupakan

atom atau molekul yang sangat labil dan akan mengambil elektron dari zat atau senyawa lain yang ada disekitarnya. Pengambilan elektron tersebut akan mengakibatkan zat atau senyawa lain tersebut akan kekurangan elektron, sehingga senyawa tersebut akan menjadi radikal. Radikal bebas sebetulnya sangat diperlukan bagi kelangsungan beberapa proses fisiologis dalam tubuh, terutama untuk transportasi elektron. Namun, radikal bebas yang berlebihan dapat membahayakan tubuh, karena dapat merusak makro molekul dalam sel seperti protein dan DNA (Julyasih, dkk, 2009).

Kerusakan jaringan oleh radikal bebas merupakan pemicu terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Radikal bebas memiliki kemampuan yang sangat berbahaya, yakni menyerang sel-sel tubuh yang sehat dan menyebabkan kerusakan dalam struktur fungsi. Meskipun begitu, radikal bebas dapat dikontrol secara alami oleh berbagai senyawa yang menguntungkan seperti adanya antioksidan. Antioksidan mampu untuk menstabilkan atau menonaktifkan radikal bebas sebelum mereka menyerang sel. Antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh memiliki keterbatasan sehingga perlu suplai antioksidan dari luar tubuh. Salah satu sumber antioksidan dari luar tubuh yang bersifat alami yaitu alga. Adapun sumber radikal bebas dalam tubuh adalah mitokondria, NADPH oksidase dan *5-lipoksigenase* (Nawaly, 2013).

Menurut Pratt dan Hudson (1990), senyawa-senyawa yang umumnya terkandung dalam antioksidan alami adalah fenol, polifenol dan yang paling umum yaitu flavonoid (*flavonol, isoflavon, flavon, katekin, flavonon*) turunan asam sinamat, tokoferol dan asam organik polifungsi. Asam askorbat merupakan antioksidan alami

yang terdapat dalam berbagai jenis buah-buahan dan sayuran. Antioksidan ini larut dalam air dan menjadi pertahanan pertama ROS dalam plasma. Senyawa ini secara aktif menangkap O_2 , OH, peroksid radikal, single oksigen dan berperan dalam regenerasi vitamin E. Pada vitamin C dapat melindungi biomembran dari kerusakan peroksidase dan merupakan substrat bagi askorbat peroksidase yang merupakan enzim penting dalam menghilangkan H_2O_2 dalam kloroplas. Senyawa kimia yang tergolong antioksidan dapat ditemukan secara alami diantaranya *asam ellagic*, *prontosinidin*, *polifenol*, *karotenoid*, *astaxhantin*, *tokoferol* dan *glutation* (Recsanti, 2009).

1. *Asam ellagic*

Asam ellagic merupakan senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan yang banyak ditemukan pada buah rashberry merah, stroberi, bluberry, delima dan kenari. *Asam ellagic* juga mengandung senyawa yang bersifat anitmutagenik.

2. *Prontosianidin*

Antioksidan ini termasuk keluarga flavonoid dan merupakan senyawa yang memberikan warna merah dan biru pada buah. *Prontosianidin* telah terbukti bermanfaat dan memperkuat kapiler, memperbaiki penglihatan dalam gelap, mendukung integritas dinding pembuluh darah dan mencegah pembekuan darah. *Prontosianidin* dapat ditemukan pada kismis, biji anggur, kulit buah anggur, teh hijau, teh hitam, kulit kayu manis dan kakao.

3. *Polifenol*

Mikronutrien ini mewakili kelompok besar antioksidan yang termasuk flavonoid dan antosianidin. Menurut sebuah penelitian di *America Journal of Clinical Nutrition*, senyawa ini telah mencegah kondisi degenerative, termasuk kanker, penyakit kardiovaskuler dan neuro degenerative. *Polifenol* dapat ditemukan pada apel, bawang, brokoli, stroberry, kakao, teh dan sayuran hijau.

4. *Karotenoid*

Karotenoid adalah larutan dalam lemak yang dikenal dengan sebutan *-karoten* (yang dikonversi menjadi vitamin A dalam tubuh), karotenoid dapat ditemukan pada spirulina, wortel, jeruk, lemon, lobak dan tomat.

5. *Astaxhantin*

Menurut para ahli, *astaxhantin* 1000 kali lebih kuat sebagai antioksidan dibanding dengan vitamin E. *Astaxhantin* dapat ditemukan pada udang, ikan salmon dan kerang. Tetapi kandungan *astaxhantin* terbanyak ada pada jenis makroalga yaitu *Haematococcus pluvialis* (Rohmatussalihah, 2009).

6. *Tokoferol*

Tokoferol atau vitamin E dipercaya sebagai sumber antioksidan yang melindungi lipid dari peroksidase asam lemak tak jenuh dalam membran sel dan membantu oksidasi vitamin A serta mempertahankan kesuburan. Vitamin E dapat ditemukan pada kacang-kacangan, minyak sayur, minyak gandum dan minyak hijau.

7. *Glutation*

Glutation adalah molekul yang sangat kecil dan merupakan antioksidan yang paling penting karena berada dalam sel, molekul ini mampu menetralkan radikal bebas, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu hati mengeluarkan racun dari dalam tubuh. *Glutation* berfungsi sebagai regulator dan regenerasi dari kekebalan sel dan agen detoksifikasi. Rendahnya tingkat *glutation* dalam tubuh dapat menyebabkan disfungsi hati, disfungsi kekebalan tubuh, penyakit jantung, penuaan dini bahkan kematian. *Glutation* dapat ditemukan pada susu kambing, alpukat, asparagus, peterseli dan brokoli.

Untuk mekanisme kerja antioksidan, memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai antioksidan primer dan antioksidan sekunder. Untuk antioksidan primer diproduksi secara alami dan kontinu oleh tubuh. Antioksidan primer merupakan jenis antioksidan enzimatik yaitu mampu memberikan atom hidrogen kepada radikal bebas sehingga dapat menjadi stabil kembali. Mekanisme kerja antioksidan primer yaitu dengan mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru atau mengubah radikal bebas dengan cara memutus reaksi berantai. Contohnya, antioksidan primer adalah enzim superoksida dismutase, katalase dan *glutation* peroksidase (Afifah, 2015).

Penambahan antioksidan primer dengan konsentrasi rendah pada lipida dapat menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan minyak. Radikal-radikal antioksidan yang terbentuk pada reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat beraksi dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru (Trilaksani, 2003).

Untuk fungsi kedua, yang sering disebut antioksidan sekunder atau antioksidan eksogema atau antioksidan nonenzimatis. Antioksidan sekunder merupakan antioksidan yang tidak diproduksi secara alami oleh tubuh dan didapatkan dari asupan makanan dan minuman. Pada mekanisme kerja antioksidan sekunder yaitu dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkap radikal bebas (*free radical scavenger*). Sehingga radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler (Afifah, 2015).

Penambahan konsentrasi antioksidan yang tinggi dapat merubah aktivitas apabila sebagai antioksidan berubah menjadi aktivitas peroksidan. Senyawa antioksidan tersebut dapat beraktivitas bila masih dalam konsentrasi tertentu. Apabila melebihi batas konsentrasi tersebut maka aktivitasnya dapat berubah menjadi peroksidan sehingga dapat menimbulkan efek negatif seperti munculnya penyakit kanker dan gangguan liver. Penghambat oksidasi lipid oleh antioksidan melalui lebih dari satu mekanisme tergantung pada kondisi reaksi dan sistem makanan. Ada empat kemungkinan mekanisme penghambatan tersebut yaitu pemberian hidrogen, pemberian elektron, penambahan lipida pada cincin aromatik antioksidan dan pembentukan kompleks antara lipida dan cincin aromatik antioksidan. Ketika atom hidrogen dalam keadaan labil pada suatu antioksidan tertentu diganti dengan deuterium (isotop hidrogen yang massa atomiknya hampir dua kali hidrogen biasa, karena kehadiran neutron dan proton dalam inti) maka antioksidan tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penghambatan dengan pemberian hidrogen lebih baik dibanding pemberian elektron. Pada pemberian

hidrogen atau elektron merupakan mekanisme utama, sementara pembentukan kompleks antara antioksidan dengan lipid adalah reaksi sekunder (Husnah, 2009).

Radikal bebas merupakan suatu molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan yang menempati molekul orbitalnya sendiri. Suatu atom atau molekul akan tetap stabil bila elektronnya berpasangan. Untuk mencapai kondisi stabil tersebut, radikal bebas dapat menyerang bagian tubuh seperti sel, sehingga dapat menyebabkan kerusakan sel tersebut dan mempengaruhi kinerja sel dan jaringan, sehingga pada proses metabolisme tubuh juga terganggu. Radikal bebas dapat berasal dari tubuh makhluk hidup itu sendiri sebagai akibat aktivitas tubuh seperti aktivitas antioksidan, oksidasi enzimatis, organel subseluler, aktivitas ion logam transisi dan berbagai sistem enzim lainnya (Percival 1996 dalam Beksono, 2014).

Pembentukan radikal bebas pada sel terus menerus dan terjadi sebagai konsekuensi antara reaksi enzimatis dan non enzimatis. Reaksi enzimatis yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang mencakup reaksi respiratori, fagositosis, sintesis prostaglandin dan sintesis sitokrom. Radikal bebas juga dapat terbentuk melalui reaksi non enzimatis oksigen dengan komponen organik. Beberapa sumber radikal bebas internal yaitu fagosit, jalur arakidonat, peroksisom, inflamasi dan iskemik. Untuk sumber radikal bebas eksternal yaitu merokok, polusi udara, ozon, lapisan UV, radiasi dan juga dalam penggunaan obat, anestesi serta pestisida. Terbentuknya senyawa radikal, baik radikal internal maupun radikal eksternal terjadi melalui sederetan reaksi. Mula-mula terjadi pembentukan awal radikal bebas

(inisiasi), kemudian terbentuk radikal baru (propagasi) dan selanjutnya pemusnahan atau perubahan senyawa radikal menjadi non radikal (terminasi). Radikal bebas tidak hanya memiliki dampak yang negatif bagi tubuh, jika jumlah radikal bebas dalam tubuh termasuk kategori wajar maka radikal bebas dapat berfungsi sebagai fosforilasi oksidatif, apoptosis sel dan membunuh mikroorganisme (Supari, 1996).

Packer (1995) menyatakan bahwa aktivitas antioksidan suatu senyawa dapat diukur dari kemampuannya menangkap radikal bebas. Pengukuran aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya DPPH (*2,2-difeni 1 pikrilhidrazil*), FRAP (*Ferric reducing antioxidant power*) dan CUPRAC (*Cupric ion reducing antioxidant capacity*). Radikal bebas yang biasa digunakan sebagai model dalam pengukuran daya penangkapan radikal bebas adalah DPPH. DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang stabil sehingga apabila digunakan sebagai pereaksi dalam uji penangkapan radikal bebas cukup dilarutkan. Jika disimpan dalam keadaan kering dan kondisi penyimpanannya yang baik, akan stabil selama bertahun-tahun.

Metode DPPH merupakan metode yang dapat mengukur aktivitas total antioksidan, baik dalam pelarut polar maupun non polar. Metode DPPH adalah metode yang paling sering digunakan untuk skrining aktivitas antioksidan dan berbagai jenis tanaman. Beberapa metode lain terbatas dalam mengukur komponen yang larut dalam pelarut yang digunakan dalam analisa. Metode DPPH mengukur semua komponen antioksidan, baik yang larut dalam lemak ataupun dalam air. Metode perendaman radikal bebas oleh DPPH didasarkan pada reduksi dari radikal bebas DPPH yang berwarna oleh penghambatan radikal bebas. Prosedur ini

melibatkan pengukuran penurunan serapan DPPH pada panjang gelombang maksimalnya yang sebanding terhadap konsentrasi penghambat radikal bebas yang ditambahkan kelarutan reagen DPPH. Aktivitas tersebut dinyatakan sebagai konsentrasi efektif (*effective concentration*) (Prakash, 2001).



C. Kerangka Fikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru yang belum diketahui, belum dipahami dan belum dikenali.

C. Variabel Penelitian

Jenis variabel pada penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu potensi mikroba dari substrat alga dalam bidang kesehatan.

D. Defenisi Operasional Variabel

1. Antimikroba yaitu senyawa yang diperoleh dari isolat sedimen alga *Caleurpa racemosa* yang dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroba patogen.

2. Antioksidan adalah zat atau senyawa yang diperoleh dari sedimen alga *Caleurpa racemosa* yang dapat melawan pengaruh bahaya radikal bebas yang terbentuk sebagai hasil dari metabolisme oksidatif, yaitu hasil dari reaksi-reaksi kimia dan proses metabolik yang terjadi didalam tubuh.

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Autoklaf, botol vial, bunsen, cawan petri, corong, gelas kimia, erlenmeyer, evaporator, *hot plate and stirrer*, *incubator shaker*, jangka sorong, lemari es, labu ukur, *lamina air flow* (LAF), oven, ose, mikropipet dan tip, neraca analitik, sentrifuge, tabung reaksi, vortex mixer.

2. Bahan

Isolat bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Methicilin Resistant Staphylococcus aureus* dan *Candida albicans*, alkohol 70%, asam askorbat (vitamin c), aquades steril, media *nutrient agar* (NA), media *nutrient broth* (NB), media *potato dextrose agar* (PDA), aluminium foil, *cloramfenikol*, plastik silk, *tissue*, larutan DPPH (*2, 2 difenil 1-pikrilhidrazil*), kertas saring, *paper dis*, methanol pa dan swap steril.

F. Prosedur Kerja

1. Sterilisasi alat

Semua alat-alat gelas dan tip yang akan digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu disterilkan dalam oven dengan suhu 180⁰ selama 2 jam.

2. Peremejaan isolat

Isolat yang digunakan yaitu *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Methicilin Resistant Staphylococcus aureus* dan *Candida albicans*. Untuk setiap isolat bakteri, diremajakan dengan cara menginokulsikan pada media agar miring. Diinkubasi selama 1x24 jam dengan suhu 37⁰C, setelah itu dimasukkan kedalam lemari pendingin sebagai biakan stok. Untuk isolat *Candida albicans*, diremajakan pada media PDA yang telah dicampurkan kloramfenikol dan kemudian diinkubasi dengan suhu kamar.

3. Uji antibakteri

a. Pembuatan kultur kerja

Masing-masing bakteri sedimen diinokulasikan kedalam media NB. Kemudian diinkubasi dengan inkubator bergoyang selama 1 x 24 jam dengan kecepatan 200 rpm pada suhu 37⁰C.

b. Pengujian antimikroba dengan metode difusi agar

Kemampuan penghambatan bakteri yang berasal dari isolat sedimen alga terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *MRSA* dilakukan dengan metode difusi agar. Sebanyak 100 µl kultur dari masing-masing bakteri uji diinokulasikan pada media NA dengan menggunakan swap steril. Kertas cakram

dengan diameter 6 mm yang berisi 30 μ l kultur bakteri sedimen diletakkan pada masing-masing media agar yang telah disebar dengan bakteri uji (*Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan MRSA). Aktivitas penghambatan diamati selama 3 x 24 jam yang ditandai dengan terbentuknya zona bening disekitar kertas cakram.

Untuk kemampuan penghambatan fungi yang berasal dari sedimen alga terhadap *Candida albicans* dilakukan dengan metode difusi agar. Sebanyak 100 μ l kultur dari fungi uji diinokulasikan dengan menggunakan swap steril pada media PDA yang telah dicampurkan dengan kloramfenikol. Kertas cakram dengan diameter 6 mm yang berisi 30 μ l kultur fungi sedimen yang diletakkan pada media agar yang telah disebar dengan isolat fungi uji. Aktivitas penghambatan diamati selama 3 x 24 jam yang ditandai dengan terbentuknya zona bening disekitar kertas cakram

4. Uji antioksidan

a. Penyiapan kultur kerja

Setiap isolat ditumbuhkan dalam 100 ml media NB, kemudian diinkubasi pada suhu 37⁰C selama 3 hari. Kultur bakteri disentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 15 menit, kemudian supernatan difiltrasi menggunakan kertas saring dan diautoklaf. Selanjutnya metanol ditambahkan dalam saringan (2:1) dan stirrer selama 24 jam untuk menghasilkan ekstraksi. Ekstrak methanol kemudian difiltrasi dan dimasukkan dalam evaporator dengan suhu dibawah 45⁰C.

b. Pembuatan larutan DPPH

Menimbang DPPH sebanyak 6,57 mg dan melarutkan dengan methanol dalam labu ukur 50 ml. Larutan diletakkan pada suhu kamar, terlindung dari cahaya untuk segera digunakan.

c. Pengukuran daya antioksidan ekstrak methanol

Untuk ekstrak methanol, memipet larutan stok masing-masing 1ml kemudian menambahkan larutan DPPH sebanyak 1 ml dan mencukupkan volumenya dengan methanol sampai 5 ml. Campuran tersebut dihomogenkan dengan menggunakan vortex mixer dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37⁰C. Masing-masing larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nm.

Nilai konsentrasi penghambatan ditentukan dengan analisis statistik menggunakan regresi linear dari data persen penghambatan dengan konsentrasi sampel. Besarnya persentasi penghambatan radikal bebas dihitung dengan rumus:

$$\text{Persen penghambatan} : \frac{A - A_1}{A} \times 100\%$$

Keterangan:

A₀ : Absorbansi kontrol (DPPH)

A₁ : Absorbansi ekstrak sampel

Selanjutnya membuat pembanding (kontrol) dengan menggunakan asam askorbat (vitamin c), diperlakukan sama seperti sampel tetapi sampel diganti dengan menggunakan asam askorbat (vitamin c).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Antimikroba Isolat Bakteri Sedimen Alga

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri dari 14 isolat bakteri sedimen alga yang diuji aktivitas antimikrobanya, hampir semua isolat memiliki zona bening. Data dari hasil uji aktivitas antimikroba dari isolat bakteri sedimen alga dari Perairan Puntondo Kab. Takalar dengan masa inkubasi 3x24 jam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Data aktivitas antimikroba dengan masa inkubasi 3x24 jam

No	Kode Isolat	Diameter Penghambatan (mm)			
		<i>E. coli</i>	<i>S. aureus</i>	MRSA	<i>Candida albicans</i>
1	BS1	1,1	1,1	-	0,5
2	BS2	0,2	1,1	0,7	0,8
3	BS3	2,4	1,2	2,1	0,7
4	BS4	2,4	1,2	1,6	1,1
5	BS5	2,1	3,6	1,4	1,1
6	BS6	1,4	2,1	1,3	1,7
7	BS7	1,1	1,5	1,1	0,2
8	BS8	1,1	1,9	2,9	2,4
9	BS9	1,4	0,4	1,3	1,2
10	BS10	-	1,3	3,4	1,1
11	BS11	0,7	2,3	2,1	3,8

12	BS12	1,9	1,7	2,7	1,4
13	BS13	0,1	2,3	2,9	2,1
14	BS14	-	2,3	2,1	0,5

2. Uji Antioksidan dengan Menggunakan Metode DPPH

Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan empat isolat bakteri sedimen yang memiliki daya hambat tertinggi dan masing-masing isolat mewakili penghambatan pada mikroba uji. Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan cara mencampurkan ekstrak methanol, reagen DPPH dan methanol p.a kemudian menghomogenkan dengan menggunakan vortex mixer lalu menginkubasi selama 30 menit pada suhu 37°C. Kemudian, mengukur serapannya menggunakan spektrofotometer dan menghitung masing-masing persen hambatan pada setiap isolat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Persen hambatan antioksidan isolat sedimen

No	Kode Isolat	Persentase hambatan(%)
1.	BS4	96,226
2.	BS5	94,619
3.	BS10	94,829
4.	BS11	98,323
5.	Vit C (pemanding)	99,650

B. Pembahasan

1. Uji Aktivitas Antimikroba Isolat Bakteri Sedimen Alga

Uji aktivitas antimikroba merupakan metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu bahan dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Pada

penelitian ini digunakan isolat bakteri sedimen dari alga *Caleurpa racemosa*, karena alga tersebut telah terbukti khasiatnya terutama dalam bidang kesehatan serta bakteri yang berasosiasi dengannya diketahui memiliki aktivitas antimikroba.

Penelitian oleh Nurzakiah (2016) menemukan bahwa bakteri endofit yang berasal dari *Caleurpa racemosa* mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Sedangkan bakteri endofit tersebut kemungkinan berasal dari sedimen yang masuk melalui akarnya, sehingga ditemukannya bakteri yang memiliki kemampuan penghambatan terhadap mikroba pada sedimen *Caleurpa racemosa* memperkuat hasil penelitian tersebut.

Tamat dkk (2007), menyatakan bahwa terdapat beberapa senyawa yang dihasilkan oleh bakteri laut yang bersimbion dengan alga hijau yaitu nonil fenol, metal palmitat, etil palmitat dan asam stearat. Menurut Abubakar dkk (2011), bakteri laut yang berasosiasi dengan spons mampu menghambat pertumbuhan *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio Harvey* *Pseudomonas aeruginosa* dan EPEC K-11 serta khamir *Candida albicans* dan *C. toropicalis*. Kemampuan tersebut merupakan aktivitas antagonis yang diduga dilakukan dengan menghasilkan kandungan senyawa yang bersifat antimikrobia. Dari hasil penelitian Kim et al (2006), Montalvo et al (2005) dan Zhang et al (2006) menyebutkan bahwa actinomyetes yang bersimbiosis dengan spons *Pseudoceratina clavalata*, *Xestospongia* spp., *Hymeniacidon perlevis* dan *Craniella australiensis* juga menunjukkan adanya aktivitas antimikrobia. Bahkan Sunaryanto dkk (2010)

memperoleh 9 isolat *Actinomycetes* laut yang memiliki toksisitas terhadap sel kanker paru-paru A549 yang di isolasi dari sedimen laut.

Bukti lain yang menunjukkan aktivitas bakteri laut sebagai antimikroba, juga telah dinyatakan oleh Radjasa *et al* (2007), dimana aktivitas antibakteri dari *Pseudoalteromonas luteoviolacea* TAB 4.2 yang berasosiasi dengan karang keras *Acropora* sp aktif menghambat pertumbuhan bakteri karang yang patogen. Bakteri *Pseudoalteromonas flacopilchra* BSP5.1 yang merupakan simbiosis sponge *Haliclona* sp yang diperoleh dari perairan Bandengan, Jepara mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri patogen *Alteromonas hydrophila* dan *Vibrio parahaemolyticus*.

Menurut Pringgenis (2010), bakteri laut juga mampu menghasilkan senyawa antimikrob seperti Nitrogen oksida (N₂O) (CAS) Nitrous oxide; Asam asetat, asam etilat; asam propanat, asam 2- metil Isobutarat ; asam propanoat, asam isobutirat; asam butanat, asam 2-metil 2-metibutanoid, dan 1,2-Propadiene (CAS) Allene.

Seperti yang dikemukakan oleh Patel *et al* (2017) bahwa lingkungan laut yang ekstrim merupakan alasan untuk menghasilkan metabolit sekunder dari sekelompok mikroba sehingga lebih istimewa dibandingkan dengan lingkungan darat. Saat ini banyak penelitian mengenai senyawa-senyawa dari ekosistem laut yang dapat digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit yang disebabkan mikroba patogen bahkan beberapa diantaranya berhasil dipasarkan. Berdasarkan hasil penemuan, dapat disimpulkan bahwa ekosistem laut merupakan salah satu sumber yang kaya untuk menghasilkan *actinomycetes* yang mampu menghasilkan senyawa bioaktif dan dapat dijadikan sebagai obat untuk bakteri patogen. Identifikasi potensi *actinomycetes* yang

menghasilkan senyawa bioaktif ke tingkat genus dan penelitian lebih lanjut. Isolat A2 menunjukkan potensi yang baik sebagai aktivitas antibakteri terhadap *E. coli*.

Setelah masa inkubasi 3x24 jam dilakukan pengukuran zona hambat pada bakteri uji *E. coli* dan menunjukkan penghambatan tertinggi pada kode isolat BS₄, terdapat tiga isolat yang tidak memiliki aktivitas antimikroba yaitu BS₁₀, BS₁₁ dan BS₁₄. Pada bakteri uji *Staphylococcus aureus*, menunjukkan semua isolat memiliki zona hambat dan penghambatan tertinggi pada kode isolat BS₅. Untuk bakteri uji MRSA, menunjukkan penghambatan tertinggi pada kode isolat BS₁₀ dan terdapat satu isolat yang tidak memiliki aktivitas antibakteri yaitu isolat BS₁. Untuk *Candida albicans*, isolat yang menunjukkan zona hambat tertinggi yaitu pada BS₁₁ dan isolat yang tidak menunjukkan aktivitas antimikroba yaitu BS₁.

Pada pengujian antimikroba, diameter zona hambat masing-masing antimikroba pada mikroba uji adalah *E. coli* (2,4 mm), *Staphylococcus aureus* (3,6 mm), MRSA (3,4 mm) dan *Candida albicans* (3,8 mm), sehingga dapat dikategorikan dalam kategori lemah. Karena menurut Stout (2000), jika daya hambat antimikroba ≤ 5 mm, maka kategori daya hambat antibakteri adalah lemah. Sedangkan, isolat bakteri sedimen dikategorikan sangat kuat dalam menghambat pertumbuhan suatu mikroba uji apabila melebihi standar kategori hambat yaitu ≥ 20 mm.

4.3 Klasifikasi hambatan

Daya hambat	Kategori daya hambat
5 mm	Lemah
5-10 mm	Sedang
10-20 mm	Kuat
≥ 20 mm	Sangat kuat

Hasil uji aktivitas antimikroba menunjukkan aktivitas yang berbeda dari tiap isolat, hal ini ditunjukkan dengan diameter zona hambatan yang diberikan bervariasi terhadap beberapa mikroba uji. Perbedaan diameter zona hambatan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kandungan zat antimikroba sehingga menyebabkan perbedaan kemampuan dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Selain itu, menurut Iriano (2008), hal tersebut dapat disebabkan oleh banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap besar zona hambatan yang dihasilkan pada metode difusi agar, antara lain kecepatan difusi, sifat media agar yang digunakan, jumlah organisme yang diinokulasi, kecepatan tumbuh bakteri, konsentrasi bahan kimia, serta kondisi pada saat inkubasi.

Perbedaan daya aktivitas antimikroba pada *E. coli* yang tergolong bakteri Gram negatif dan *S. aureus* yang tergolong bakteri Gram positif terjadi karena adanya perbedaan struktur dinding sel pada masing-masing bakteri uji. Dimana bakteri Gram negatif memiliki lapisan dinding sel yang dilapisi oleh membran luar yang terdapat protein, fosfolipid dan lipopolisakarida dan ruang periplasmik. Sedangkan untuk Gram positif, memiliki lapisan dinding sel yang terdiri dari lapisan peptidoglikan yang tebal, asam teikoat dan sedikit lipid (Ibrahim, 2007).

Menurut Jawetz (1998), ketahanan Gram negatif dan Gram positif terhadap senyawa antimikroba berbeda-beda. Perbedaan kesensitifan mikroba gram positif dan gram negatif berkaitan dengan struktur dalam dinding selnya, seperti jumlah peptidoglikan, sifat ikatan silang dan aktivitas enzim autolitik. Komponen tersebut

merupakan faktor yang menentukan penetrasi, pengikatan dan aktivitas senyawa antimikroba.

E. coli merupakan salah satu golongan Gram negatif, dimana dinding selnya memiliki tiga lapisan (Pelczar dan Chan, 1988). Menurut Brock et al (1994), bakteri gram negatif mempunyai kemampuan mudah dalam menyerap larutan, sehingga memudahkan zat terlarut memasuki dinding sel bakteri tersebut. Akan tetapi, peptidoglikan dalam dinding sel bakteri Gram negatif tidak mudah hancur. Semakin dekat bakteri dengan zat terlarut dari kertas cakram yang terdifusi ke dalam agar, dan semakin pekat zat terlarut, maka makin mudah bakteri terbunuh oleh zat tersebut (Lingga dan Mia, 2005).

Untuk *Staphylococcus aureus* merupakan Gram positif yang hanya memiliki satu lapis membran peptidoglikan. Membran tersebut mudah larut oleh pelarut, misalnya etanol. Karena bakteri gram positif lebih sensitif dibanding Gram negatif, sehingga bakteri Gram positif lebih mudah dihambat pertumbuhannya (Lingga dan Mia, 2005).

Zona hambatan juga diperlihatkan oleh isolat bakteri sedimen terhadap MRSA walaupun bakteri tersebut termasuk mikroba yang resisten terhadap beberapa antibiotik. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa antibakteri yang terdapat pada isolat tersebut dan senyawa tersebut mampu mengontrol fungsi membran sel bakteri uji. Darsana dkk (2012) dan Yustina (2009) menjelaskan bahwa salah satu senyawa antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan MRSA adalah saponin. Saponin bekerja sebagai antibakteri dengan mengganggu stabilitas membran sel bakteri

sehingga menyebabkan sel bakteri lisis. Efektivitas antibakteri dapat bereaksi pada beberapa target sasaran pada membran bakteri, sehingga menyebabkan kerusakan atau autolisis dan juga terhambatnya pertumbuhan atau bahkan kematian sel (Ahn et al 2004).

Pada uji antifungi, dengan menggunakan mikroba uji *Candida albicans*, terdapat zona bening disekitar kertas cakram. Hal tersebut terjadi karena adanya senyawa yang terdapat pada isolat bakteri sedimen. Salah satu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan *Candida albicans* yaitu senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa poli-fenol. Senyawa fenol bersifat merusak membran sel sehingga terjadi perubahan permeabilitas sel yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau bahkan matinya sel tersebut (Kumalasari dan Nanik, 2011).

Aktivitas antimikroba yang dibentuk oleh isolat sedimen alga terhadap *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, MRSA dan *Candida albicans* bersifat bakteristatik. Isolat sedimen alga tersebut tidak dapat membunuh pertumbuhan *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, MRSA dan *Candida albicans* tetapi hanya dapat menghambat pertumbuhan mikroba sehingga dikatakan bakteristatik. Ditandai dengan semakin berkurangnya besar zona hambat yang terbentuk. Data dapat dilihat pada lampiran.

Menurut Mycek (2001), bahwa suatu antimikroba bersifat bakteristatik jika senyawa antimikroba tersebut hanya mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen jika pemberian senyawa terus dilakukan dan jika dihentikan atau habis, maka pertumbuhan dan perbanyakan dari bakteri patogen akan kembali meningkat yang ditandai dengan berkurangnya diameter zona hambatan. Sebaliknya, bersifat

bakterisida jika diameter zona hambatan meningkat, hal ini disebabkan karena senyawa ini mampu membunuh dan menghentikan aktivitas fisiologis dari bakteri meskipun pemberian senyawa tersebut dihentikan.

Mekanisme kerja antimikroba isolat sedimen alga diduga dengan cara mengganggu komponen peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Efektivitas antimikroba dapat bereaksi pada beberapa target sasaran pada membran mikroba, sehingga menyebabkan kerusakan atau autolisis dan juga terhambatnya pertumbuhan atau bahkan kematian sel (Ahn *et al*, 2004).

2. Uji Antioksidan dengan Menggunakan Metode DPPH

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh. Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbital luarnya. Adanya elektron yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut reaktif mencari pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada disekitarnya.

Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas antioksidan adalah metode serapan radikal *2,2-difenil-1-pikrihidrazil* (DPPH) karena metode ini adalah metode yang lebih efisien digunakan dengan sampel dalam jumlah yang sedikit dengan waktu yang singkat. Metode DPPH pertama kali diperkenalkan oleh Marsden blois di Universitas Stanford. DPPH merupakan radikal sintetik yang larut dalam pelarut polar seperti metanol, berwarna ungu gelap dan mengandung nitrogen tidak stabil

dengan absorbansi pada panjang gelombang 517 nm, karena pada gelombang tersebut merupakan panjang gelombang maksimum pada DPPH. Pada DPPH, memiliki panjang gelombang maksimal yang bervariasi berkisar 515 nm, 516 nm, 518 nm dan 520 nm. Namun untuk pengujian dengan menggunakan DPPH, panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang maksimal (Dini, 2010).

DPPH mampu menerima sebuah elektron atau radikal hidrogen untuk menjadi molekul diamagnetik yang stabil. DPPH pada uji ditangkap oleh antioksidan yang melepaskan hidrogen sehingga membentuk DPPH-H tereduksi. Warna berubah dari ungu gelap menjadi memudar dan diikuti penurunan serapan pada panjang gelombang 517 nm di daerah UV-VIS adanya penurunan serapan tersebut maka aktivitas penangkap radikal bebas dapat diketahui. Radikal bebas DPPH dapat menangkap atom hidrogen dari komponen aktif ekstrak yang dicampur kemudian bereaksi menjadi bentuk tereduksinya.

Pada umumnya semua sel jaringan tubuh dapat menangkal serangan radikal bebas, karena dalam sel terdapat sejenis enzim khusus yang mampu melawannya dinamakan glutathione, tetapi manusia secara alami mengalami degradasi atau kemunduran seiring berkurangnya usia, akibatnya pemusnahan radikal bebas tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka kerusakan jaringan terjadi secara perlahan-lahan. Contohnya kulit menjadi keriput karena kehilangan elastisitas jaringan kolagen serta otot, terjadinya bintik pigmen kecoklatan/flek, pikun, parkinson dan kanker.

Pada uji antioksidan ini, menggunakan empat isolat yang memiliki nilai hambatan tertinggi, yaitu BS₄, BS₅, BS₁₀ dan BS₁₁. Untuk kontrol positif, menggunakan vitamin c.

Berdasarkan hasil pengujian antioksidan, semua ekstrak sedimen alga mengandung antioksidan yang ditandai dengan adanya perubahan warna dengan persen hambatan masing-masing yaitu 96,226%, 94,619%, 94,829% dan 98,323% yang termasuk dalam kategori kuat. Sedangkan vitamin C yang memiliki persen hambatan sebesar 99,65. Deachathai et al (2006) melaporkan bahwa ekstrak dikatakan aktif antioksidan apabila memiliki persen inhibisi diatas 65% dan sebaliknya, jika persen inhibisi dibawah 65%, maka dikatakan tidak aktif antioksidan..

Menurut Hanani dkk (2005), perubahan warna dari warna ungu berubah menjadi warna kuning terjadi karena senyawa antioksidan bereaksi dengan radikal DPPH melalui mekanisme donasi atom hidrogen. Hal yang sama juga diterangkan oleh Hanapi dkk (2013) bahwa banyaknya atom hidrogen yang didonorkan oleh molekul antioksidan dapat diketahui secara kualitatif dengan terjadinya perubahan warna radikal DPPH dari ungu menjadi kuning.

Hanya saja terdapat endapan saat diinkubasi, hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya protein yang mengendap. Menurut Chem (2007), pada umumnya, protein dapat diendapkan dengan pelarut organik seperti methanol, etanol dan asetonitril. Juga dapat meningkatkan terdeteksinya protein-protein lain yang ukurannya relatif kecil. Peristiwa pengendapan protein tersebut disebut *salting out*.

Efek *salting out* disebabkan garam dengan konsenrasi tinggi dapat menghidrasi air dari permukaan molekul protein sehingga protein terendapkan (Sari, 2012).

Senyawa aktif dalam ekstrak yang memiliki kemampuan penangkap radikal umumnya merupakan pendonor atom hidrogen (H), sehingga atom H tersebut ditangkap oleh radikal DPPH (hidrazil) untuk berubah menjadi bentuk netralnya (hidrazin). Radikal bebas DPPH bersifat peka terhadap cahaya, oksigen dan pH, tetapi bersifat stabil dalam bentuk radikal sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengukuran antioksidan. Semakin tinggi persen penangkapan radikal bebas sampel menunjukkan semakin tingginya aktivitas antioksidan (Salamah dkk, 2015).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Isolat bakteri sedimen alga dari perairan Puntondo Kab. Takalar mampu menghambat pertumbuhan *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, MRSA dan *Candida albicans*.
2. Ekstrak isolat sedimen alga dari perairan Puntondo Kab. Takalar mampu menghasilkan senyawa antioksidan.

B. Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa antimikrob yang dihasilkan, terutama pada isolat yang mampu menghambat pertumbuhan MRSA. Selain itu, perlu untuk melihat perbandingan konsentrasi (%) pada isolat antioksidan.

KEPUSTAKAAN

- Abubakar, Hermawaty. Dkk. Skrining Bakteri yang Berasosiasi dengan Spons Jaspis sp. Sebagai Penghasil Senyawa Antimikroba. FMIPA IPB 16 no. 1 (Maret2011).
- Al Zereini, Wead. Bioactive Crude Extracts From Four Bacterial Isolates of Marine Sediments from Red Sea, Gulf of Aqaba, Jondan. Jordan Journal of Biological Science 7 No. 2, 2014.
- Aly, Hanan F. Et al . Marine Algal Sterol Hydrocarbon With Anti-Inflammatory, Anticancer And Antioxidant Properties. NRC, Dokki (July, 2016).
- Andriani. Aktivitas Antibakterial Fungi Endofit *Caleurpa racemosa* Terhadap Bakteri *E. coli* dan *Staphylococcus aureus*. Prosiding Seminar Nasional Mikrobiologi Kesehatan dan Lingkungan, Makassar, 29 Januari 2015.
- Beksono, Hanindyo Riezky. “Uji Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Biji Kopi Robusta (*Coffea canophea*) Dengan Metode DPPH”. Skripsi. Jakarta. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Chem, Indo. J. the Infulence Of Organic Solvent Protein Precipitation On SDS Page Protein Profile In serum. UGM Press 7 no. 3 (2007).
- Darsana, I Gede Oka., I Nengah Kerta Besung dan Hapsari Mahatmi. Potensi Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Tenore) Steenis) dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli secara In Vitro. Fak. Kedokteran Univ Udayana 1 no. 3 (2012).
- Davis, W. W and T. R Stout. Disc Plate Methode of Microbiological Antibiotic Assay. Microbiol, 1971.
- Deachathai, et al. *Phenolic Compound From The Flowers Of Garcinia dulcis*. Elsevier 67 numb. 5 (March 2006).
- Dimara, Lisiard., Tien Nova. “Uji Aktivitas Antibakteri dan Antioksidan Ekstrak Pigmen Klorofil Rumput Laut *Caleurpa racemosa* J. Agardh”. FMIPA Univ. Cendrawasih 3 no. 2 (Oktober, 2011).

- Dini. *Isolasi Fungi Endofit Penghasil Senyawa Antioksidan Dari Tanaman Kleinhovia hospital Linn*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2010.
- Emerson and Hedges J. I. Chemical Oceanography and The Marine Carbon Cycle. *Journal of The American Chemical Society* 131 numb. 16 (2008).
- Eskin, N A. *Antioxidant and Shelf Life Of Foods*. New York: CRC Press, 2004.
- Fenellah M War Nongkhlaw., S R Joshi. *L-Asparaginase and Antioxdant Activity Of Endophytic Bacteria Associated With Ethnomedicinal Plants*. India: Departement of Biotechnology and Bioinformatics, North-Eastern Hill University Shillong, 2015.
- G Singh., I, P, S Kapoor., S. K Pandey., U. K Singh. *Phytotherapy Research*. Journal Citation Repost 16 numb. 7 (November, 2002).
- Hanani, Endang,. Dkk. “Identifikasi senyawa Antioksidan dalam Spons Callypongia sp dari Kepulauan Seribu”. *FMIPA-UI Depok* 2 no. 3 (Desember 2005).
- Hanapi, Ahmad,. Dkk. “Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Metanol Alga Merah *Euchema spinosum* dari Perairan Wongsorejo Banyuwangi”. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* 2 no. 2 (Maret 2013).
- Hasan, M Nur. “Pengaruh ekstrak Rimpang Jeringau (*Acorus calamus* L) Dalam Beberapa Pelarut Organik Terhadap Aktivitas Antioksidan dan Antifungi Secara In Vitro”. *Skripsi*. Malang, Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Hasanuddin, Rabuanah. “Hubungan Antara Kerapatan dan Morfometrik Lamun *Enhalus acoroides* Dengan Subtrat dan Nutrien di Pulau Sarappo Lompo Kab. Pangkep”. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Hanapi, Ahmad. Dkk. Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Metanol Alga Merah *Euchema spinosum* Dari Perairan Wongsorejo Banyuwangi. *Alchemy* 2 no. 2 (Maret 2013).
- Hedges J.I., JM Oades. *Comparative Organic Geochemistries Of Soil And Marine Sediments*. Elsevier Schince 25 numb. 7/8 (1997).

- Husnah, M. "Golongan Senyawa Antioksidan Ekstrak Kasar Buah Pepino (*Solanum muricatum*) Berdasarkan Variasi Pelarut". *Skripsi*. Malang. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang, 2009.
- Ibrahim M. *Mikrobiologi: Prinsip dan Aplikasi*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Idham, Fitriani. "Potensi Sedimen Laut Perairan Teluk Jakarta Sebagai Substrat Sedimen *Microbial Fuel Cell*". *Skripsi*. Bogor. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB, 2010.
- Isnindar, Wahyuno S., Setyowati E. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Antioksidan Daun Kesemek (*Diospyros kaki* Thumb) Dengan Metode DPPH. Yogyakarta: Majalah Obat Tradisional, 2011.
- Istya, Rizki Ariningsih. "Isolasi *Streptomyces* dari Rizofer Familia Poaceae Yang Berpotensi Menghasilkan Antijamur Terhadap *Candida albicans*". *Skripsi*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Izzati, M. Skreening Potensi Antibakteri pada Beberapa Spesies Rumput Laut Terhadap Bakteri Patogen pada Udang Windu. *Bioma* 9 no. 2 (2007).
- Jawetz, Melnick & Adelberg's. *Mikrobiologi Kedokteran*, Edisi 22. Surabaya: Diterjemahkan oleh Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Penerbit Salemba Medika, 2005.
- Julyasih K S., Wirawan IG., Harijani W. S., Wiludjeng W. "Aktivitas Antioksidan Beberapa Jenis Rumput Laut Komersial di Bali". Seminar Nasional Fakultas Pertanian dan LPPM UPM Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2 Desember 2009.
- Karlina, Chrystie Y. Dkk. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Herba Krokot (*Portulaca oleracea* L) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Esherichia coli*. *Lentera Biologi* 2 no. 1 (Januari 2013).
- Kuncoro, Hadi., Noor Erma S. "Jamur Endofit, Biodiversitas, Potesi dan Prospek Penggunaannya Sebagai Sumber Bahan Obat Baru". *Departemen Kimia Farmasi* 1 no. 3 (2011).
- Kumalasari, Eka dan Nanik Sulistyani. Aktivitas Antifungi Ekstrak Etanol Batang Binahong (*Anredera cordifolia* (Tenore) Steen) Terhadap *Candida albicans* Serta Skrining Fitokimia. *Jurnal Ilmiah Kefarmasian* 1 no. 2 (2011).

- Lingga, Martha E dan Mia Miranti Rustama. Uji Aktivitas ANTibakteri Dari Ekstrak Air dan Etanol Bawang Putih (*Allium sativum* L) Terhadap Bakteri Gram Negatif dan Gram Positif yang Diisolasi Dari Udang Dogol (*Metapenaeus monoceros*), Udang Lobster (*Panulirus* sp) dan Udang Reon (*Mysis* dan *Acetes*). *Jurnal Biotika* (2005).
- Lisdayanti, Eka. “Potensi Antibakteri dari Bakteri Asosiasi Lamun (*Seagrass*) dari Pulau Bonebatang Perairan Kota Makassar”. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS, 2013.
- Lutfi. *Kimia Lingkungan*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Maulida R. Akitivitas Antioksidan dan Rumput Laut *Caleurpa lentillifer*. *Skripsi*. Universitas Institut Pertanian Bogor, 2007.
- Mardiyah, U., Fasya AG., Fauziah B., Amalia S. “Ekstraksi, Uji Aktivitas Antioksidan dan Identifikasi Golongan Senyawa Aktif Alga Merah *Euchema spinosum* dari Perairan Banyuwangi”. *Teknosains* 3 no. 1 (Maret, 2014).
- Mulyani, Yeni. Dkk. Peranan Senyawa Metabolit Sekunder Tumbuhan Mangrove Terhadap Infeksi Bakteri *Aeromonas hydrophila* Pada Ikan Mas (*Cyprinus carpio* L). *Jurnal Akuatika* 4 no. 1 (Maret 2013).
- Muawwanah, dkk. “Ekstraksi Antioksidan Dari Alga Laut Sargassum sp dan Efektivitasnya Dalam Menghambat Kerusakan Awal Emulsi Minyak Ikan”. *Bulletin Teknologi Perikanan* 3 no. 1 (1997).
- Mycel, M. J. Farmakologi: Ulasan Bergambar Edisi 2. Widya Medika. Jakarta. *Antimicrobial and Cytotoxic Activity of Five Algae sp*. Hasanuddin University, 2011.
- Nasution, S Siska. “Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Sedimen dan Siput *Strombus canarium* di Perairan Pantai Pulau Bintan”, *Universitas Riau* 5 no. 2 (2011).
- Nawaly, Hermanus., Susanto AB., A Jacob L., Utoisega. “Senyawa Bioaktif Dari Rumput Laut Sebagai Antioksidan”. Seminar Nasional Pendidikan Biologi FKIP Universitas Diponegoro, Semarang, 10 Juni 2013.
- Nareswaty, N. Proses Ekstraksi, “Pengujian Aktivitas Penangkapan Radikal Bebas dan Penghambatan Pembentukan Hidrogen Perksida Ekstrak Ubi Jalar Kuning Varietas Daya Dengan Berbagai Rasio Pelarut Heksana”. *Skripsi*. Malang. Universitas Brawijaya, 2007.

- Noor Susan M., Maswari Poeloengan., Titin Yulianti. "Analisis Senyawa Kimia Sekunder dan Uji Daya Antibakteri Ekstrak Daun Tanggung (*Mimusops elengi* L) Terhadap *Salmonella typhi* dan *Shigella boydii*". Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Jakarta, 30 Agustus 2006.
- Noviani, Risa. Urgensi dan Mekanisme Biosintesis Metabolit Sekunder Mikroba Laut. *Dikti* 5 no. 2 (2008).
- Noviendri, Dedi. Teknologi DNA Rekombinan dan Aplikasinya Dalam Eksplorasi Mikroba Laut. *Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan* 2 no. 2 (Desember, 2007).
- Nurjanah. Dkk. Aktivitas Antioksidan dan Komponen Bioaktif Kerang Pisau (*Solen spp*). *IPB* 16 no. 3 (September, 2011).
- Paiva A. R. -*Carotene and Carotenoids As Antioxidant. Jurnal Of The American College Of Nutrition* 18 no. 5 (1999).
- Patel, H. K. Et al. Isolation Of Actinomycetes From Marine Ecosystem And Study Of Their Bioactive Component Production Potential. *IJPBS, India* (July, 2017).
- Pelczar, M. J dan Chan, E. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Jilid 2*. Penerjemah; UI dari *Elements of Microbiology*, Jakarta, 1988.
- Prakash A., Fred R., Eugena M. Medallion Laboratories: Analytical Progress, Antioxidant Activity <http://www.medallionlabs.com/Downloads/>.
- Pratiwi T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Pramesti, Rini. "Aktivitas Antioksidan Ekstrak Rumput Laut *Caleurpa serullata* Dengan Metode DPPH (1, 1 difenil 2 pikrilhidrazil)". *Buletin Oseanografi Marina* 2 no. 7 (April 2013).
- Putri, Azmi Utami."Uji Potensi Antifungi Ekstrak Berbagai Jenis Lamun Terhadap Fungi *Candida albicans*". *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS Makassar, 2013.
- Radjasa, O.K., A. Sadono, Junaidi and E. Zocchi. Richness of Secondary Metabolite-Producing Marine Bacteria Associated with Sponge *Haliclona* sp. *Int J Pharmacol* 3 no. 3 (2007).

- Riyanto, Bambang., Nisa Rahmania., Fitria Idham. "Energi Listrik Dari Sedimen Laut Teluk Jakarta Melalui Teknologi *Microbial Fuel Cell*. Departemen Teknologi Hasil Perairan XIV no. 1 (2011).
- Recsanti, Desi. "Pengaruh Pemberian Jus Stroberry Terhadap Kerusakan Histologis Hepatosit Mencit Akibat Pemberian Asetaminofen". *Skripsi*. Surakarta. Fakultas Kedokteran. Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Salamah, Nina. Dkk. Aktivitas Penangkap Radikal Bebas Ekstrak Etanol Ganggang Hijau *Spirogya* sp dan *Ulva lactuca* dengan Metode DPPH. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia* 13 no. 2 (September 2015).
- Sari, DK. Lipase Isolat Lokal Pada Sintesis Biodiesel. Makalah Pendidikan Kimia, 2012.
- Serpara Saul A., Dkk. Pengaruh Penggunaan Es Ekstrak rumput Laut *Caleurpa racemosa*, dalam Konsentrasi Berbeda Terhadap Mutu Ikan Layang (*Decapterus* sp). Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan, Univ. Sam Ratulangi 1 no. 4 (Oktober 2013).
- Shihab, Quraish M. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Singh, Ravindra Pal., Reddy C. R. K. Seaweed Microbial Interaction. Ed. Gerrard Muyzer, Published online, 2014.
- Sunarni. "Aktivitas Antioksidan Penangkap Radikal Bebas Beberapa Kecambah dari Biji Tanaman Familia Papilionaceae". *Jurnal Farmasi Indonesia*. Vol 2, 2005.
- Suendra. *Buku Pedoman MataAjaran Mikrobiologi Lingkungan*. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depkes RI. Jakarta, 2001.
- Sukandar, Dede., dkk. "Karakterisasi Senyawa Aktif Antibakteri Ekstrak Air Bunga Kecombrang (*Etilingera elatior*) Sebagai Bahan Pangan Fungsional". *BPPT Jakarta* 2 no. 1 (November, 2010).
- Sunaryanto R., Bambang Marwoto dan Yoshihide Matsuo. Isolasi Actinomycetes laut Penghasil Metabolit Sekunder Yang Aktif Terhadap Sel Kanker A549. *Jurna Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan* 5 no. 2 (Desember 2010).
- Supari F. Radikal Bebas dan Parasitologi Beberapa Penyakit. Seminar Senyawa Radikal dan Sistem Pangan. Jakarta, 1996.

- Suparmi, Sahri Ahmad. "Kajian Pemanfaatan Sumber Daya Rumput Laut Dari Aspek Industri dan Kesehatan". Universitas Diponegoro XLIV no. 118 (Juni-Agustus, 2009).
- Suvega and Arunkumar. Antimicrobial Activity of Bacteria Associated with Seaweds against Plants Pathogens on Par with Bacteria Found in Seawater and Sediment. *British Microbiologi Research* 8 numb. 8 (2014).
- Syarif A, dkk. *Famakologi dan Terapi Edisi 4*. Jakarta: Gaya Baru, 2001.
- Tamat, Swasono R., Thamrin Wikanta dan Lina S Maulina. Aktivitas Antioksidan dan Toksisitas Senyawa Bioaktif dari Ekstrak Rumput Laut Hijau *Ulva reticulate* Frosskal. *Fakultas Farmasi Univ Pancasila* 5 no. 1 (April 2007).
- Tabarez, M R. Discovery Of The New Antimicrobial Compound 7-malonyl macrolactin a. Dissertation Van Der Gemeinssamen Naturwissenschaftlichen Fakultat. University Carolo, Wihelmia, 2005.
- Trilaksani, W. Antioksidan: Jeni, Sumber, Mekanisme Kerja dan Peran Terhadap Kesehatan. <http://fa.lib.itc.ac.id/go.php?id=jbptitbfa-gdl-s2-1992-marlina-63-ITB>.
- Tortora G and B Derrickson. *Principle Of Anatomy And Physiologi* 11th Edition. USA: Willey, 2006
- Volk W, A., Wheeler M, F. *Mikrobiologi Dasar*. Ed: Markham. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1993.

LAMPIRAN

A. Persen Hambatan Antioksidan (%)

$$\begin{aligned} 1. \text{ BS}_4 &= \frac{A - A_1}{A} \times 100\% \\ &= \frac{2,8 - 0,1}{2,8} \times 100\% \\ &= 96,226\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ BS}_5 &= \frac{A - A_1}{A} \times 100\% \\ &= \frac{2,8 - 0,1}{2,8} \times 100\% \\ &= 94,829\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ BS}_{10} &= \frac{2,8 - 0,1}{2,8} \times 100\% \\ &= \frac{2,8 - 0,1}{2,8} \times 100\% \\ &= 94,829\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ BS}_{11} &= \frac{A - A_1}{A} \times 100\% \\ &= \frac{2,8 - 0,0}{2,8} \times 100\% \\ &= 98,323\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \text{ Vit C} &= \frac{2,8 - 0,0}{2,8} \times 100\% \\ &= 99,650\% \end{aligned}$$

Keterangan :

Ao : Absorbansi kontrol (DPPH)

A1 : Absorbansi ekstrak sampel





B. Tabel zona hambat (Data perhari)

No	Kode Isolat	Diameter Penghambatan (mm)											
		<i>E. coli</i>			<i>S. aureus</i>			<i>MRSA</i>			<i>C. albicans</i>		
		1x24	2x24	3x24	1x24	2x24	3x24	1x24	2x24	3x24	1x24	2x24	3x24
1.	BS1	8,7	6	7,1	6,6	7,5	7,1	6,7	6	6	6	6,1	6,5
2.	BS2	9,9	8,7	6,2	7,5	7,1	7,1	7,3	7,8	6,7	6,6	6,5	6,8
3.	BS3	9,3	6	8,4	7,3	7,9	7,2	6	8,6	8,1	6,6	6,5	6,7
4.	BS4	9,2	9,8	8,4	7,3	7,1	7,2	6	7,9	7,6	7,1	7,2	7,1
5.	BS5	9,9	9,9	8,1	8,9	7,9	9,6	6	7,1	7,4	6	7,1	7,1
6.	BS6	9,3	7,2	7,4	7,6	7,9	8,1	9,5	8,2	7,3	6,8	7,4	7,7
7.	BS7	7,9	8,9	7,1	8,1	7,9	7,5	6,5	7,1	7,1	6	7,1	6,2
8.	BS8	9,2	7,2	7,1	7,2	6,5	7,9	6,9	8,4	8,9	7,3	7,5	8,4
9.	BS9	8,8	7,3	7,4	6,6	7,1	6,4	7,3	8,2	7,3	6	7,5	7,2
10.	BS10	9,1	6,8	6	7,5	7,2	7,3	8,1	6	9,4	6,7	7,1	7,1
11.	BS11	8,2	6,7	6,7	7,4	7,2	8,3	8,2	7,1	8,1	6	8,4	9,8
12.	BS12	7,9	7,3	7,9	7,4	7,2	7,7	7,9	8,1	8,7	6,7	7,9	7,4
13.	BS13	7,1	6,4	6,1	7,3	7,7	8,3	7,1	8,4	8,9	6	8,1	8,1
14.	BS14	7,8	6,4	6	6,4	7,9	8,3	7,8	7,7	8,1	6	7,4	6,5

C. Zona hambat uji Antimikroba

1. Bakteri uji *E. coli*


a. Masa inkubasi 1 x 24 jam



b. Masa inkubasi 2 x 24 jam






c. Masa inkubasi 3 x 24 jam




2. Bakteri uji Staphylococcus aureus



a. Masa inkubasi 1 x 24 jam



b. Masa inkubasi 2 x 24 jam






c. Masa inkubasi 3 x 24 jam





3. Bakteri Uji MRSA



a. Masa inkubasi 1 x 24 jam



b. Masa inkubasi 2 x 24 jam





c. Masa inkubasi 3 x 24 jam



3. Fungi Uji *Candida albicans*



a. Masa inkubasi 1 x 24 jam



b. Masa inkubasi 2 x 24 jam



c. Masa inkubasi 3 x 24 jam



D. Hasil Uji Antioksidan



E. Hasil Spektrofotometer

