


**AKTIVITAS ANTIBAKTERI SARI TEMULAWAK
TERHADAP PERTUMBUHAN *Escherchia coli* YANG
DIISOLASI
DARI FESES BROILER**



Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Peternakan (S.Pt)
pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

ASTRI WAHYUNI
NIM. 60700112065

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astri Wahyuni
Nim : 60700112065
Tempat/Tgl.Lahir : Bulukumba, 07 Juli 1994
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jalan Japing, Perumahan Bumi Zarinda Blog Aghatis No.
4, kec. Patalassang Kab. Gowa.
Judul : :Aktivitas Antibakteri Sari Temulawak Terhadap
Pertumbuhan Bakteri Escherchia coli yang Diisolasi dari
Feses Broiler.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Desember, 2016

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ASTRI WAHYUNI
NIM: 60700112065


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi saudara **Astri Wahyuni** NIM: 60700112065, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Aktivitas Antibakteri Sari Temulawak Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherchia coli yang Diisolasi dari Feses Broiler*", memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui sebagai skripsi lengkap.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Makassar, 09 Desember, 2016

Pembimbing I



Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
Nip. 19750909 200912 1 001

Pembimbing II




Astati, S.Pt., M.Si.
NIP. 19760821200912002

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ALAUDDIN

Dr. Ir. Muh. Basir Palv, M.Si.
NIP: 19590712 198603 1 002

MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Aktivitas Antibakteri Sari Temulawak terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherchia Coli* yang Diisolasi dari Feses Broiler", yang disusun oleh Astri Wabyuni, NIM: 60700112065 mahasiswi Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2016 bertepatan dengan 9 Rabi'ul Awwal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan.

Makassar, 09 Desember 2016
9 Rabi'ul Awwal 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Ir. A. Suarda, M.Si. (.....)

Sekretaris : Ruspy, S.Pt., M.Si. (.....)

Munaqisy I : Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P. (.....)

Munaqisy II : Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si. (.....)

Munaqisy III : Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Hi. (.....)

Pembimbing I: Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P. (.....)

Pembimbing II: Astaty, S.Pt., M.Si. (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Aktivitas Antibakteri Sari Temulawak Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherchia coli yang Diisolasi dari Feses Broiler”***. Salam dan Shalawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. sebagai Uswatun Hasanah, yang telah berjuang menyempurnakan akhlak manusia diatas bumi.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Meskipun beberapa kesulitan telah dialami penulis dalam menyusun skripsi ini, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan segenap jajarannya.

3. Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly. M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Peternakan dan penguji II yang telah banyak memberikan kritikan dan saran-saran kepada penulis.
4. Bapak Muh. Nur Hidayat., S.Pt.,M.P selaku dosen pembimbing I, yang selama ini meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Astaty, S.Pt., M.Si., selaku dosen pembimbing II, yang selama ini meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P. selaku dosen penguji I, yang telah banyak memberikan kritikan dan saran-saran kepada penulis.
7. Bapak Dr. Muh.Thahir Maloko, M.Hi. selaku penguji III yang telah banyak memberikan kritikan dan saran-saran kepada penulis.
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas ilmu pengetahuan dan bantuannya yang telah diberikan selama ini.
9. Ayahanda Abd Samad dan Ibunda Halwiah selaku orang tua yang berjuang mendidik dengan sabar dan memberikan yang terbaik bagi hidup penulis.
10. Bapak Drs Abdul Haris, M.Si., yang selalu mendukung apapun yang butuhkan penulis dan menjadi penasihat selama study.
11. Bapak Taufik yang telah membantu dan membimbing pada saat penelitian dikala penulis melakukan penelitian di Sekolah Teknik Penyuluh Pertanian.

12. Adik-adik ku tersayang Ihdar Wahyudi, Sri Wulandari dan Miftahul khaer yang selalu membuat penulis tersenyum disaat masa-masa putus asa.
13. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Jurusan Ilmu Peternakan khususnya kelas B angkatan 2012 terima kasih atas motivasi dan keceriaan selama penulis kuliah.
15. Teman-teman KKN reguler angkatan 51 Desa Kanreapia Kec. Tombolo Pao terima kasih atas motivasi dan keceriaan selama penulis kuliah.
16. Kakak-kakak senior angkatan 2006-2011 dan adik-adik junior saya angkatan 2013-1016 di Jurusan Ilmu Peternakan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin Ya Robbal Aalamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Hipotesis Penelitian.....	4
F. Penelitian Terdahulu.....	4
G. Defenisi Operasional.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
A. Tinjauan Islam Tentang Manfaat Tanaman Herbal.....	7
B. Tanaman Temulawak Sebagai Tanaman Herbal.....	13

a. Kandungan Dan Senyawa Kimia Temulawak.....	14
1. Efek Analgetik dan Anti Inflamasi.....	16
2. Efek Hipolipidemik.....	16
3. Efek Antioksidan.....	17
4. Efek Antidiabetik.....	17
5. Efek Antihepatotoksik.....	17
6. Efek Antitumor.....	18
7. Efek Diuretik.....	18
8. Efek Menekan Saraf Pusat.....	18
9. Efek Hipotermik.....	18
10. Efek Anti bakteri.....	19
11. Efek Lain-lain.....	19
b. Temulawak Sebagai Penghasil Minyak Atsiri dan Kurkumin	21
1. Minyak atsiri	21
2. Kurkumin.....	23
c. Anti bakteri.....	25
1. Kerusakan pada dinding sel	25
2. Perubahan permeabilitas sel.....	25
3. Perubahan molekul protein dan asam nukleat.....	26
4. Perubahan kerja enzim.....	26
5. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein.....	26
6. Uji aktivisasi bakteri.....	27
a. Dilusi.....	27

b. Difusi.....	27
c. Cara Kirby Bauer.....	27
d. Cara sumuran	28
e. Cara pour plate.....	28
7. Uji Bioutografi.....	28
8. Ayam broiler.....	29
9. <i>Escherchia coli</i>	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
C. Alat dan Bahan.....	39
D. Prosedur Penelitian.....	39
1. Sterilisasi alat dan media.....	39
2. Pengambilan sampel feses	40
3. Sari temulawak.....	40
4. Isolasi dan Identifikasi Bakteri <i>E. coli</i> dari Feses Broiler..	41
5. Pembuatan Media Tanamdan Tahap uji Kepekaan Bakteri <i>Escherchia coli</i>	41
E. Metode Penelitian.....	42
F. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil.....	44
B. Pembahasan.....	45

BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Desain Kartu Kontrol	38
2. Rata-rata diameter zona hambat sari temulawak terhadap Pertumbuhan bakteri <i>Escherchia coli</i> yang diisolasi dari feses broiler.....	44



DAFTAR GAMBAR

Nomer	Halaman
1 : Diagram Batang Nilai Rata-Rata Zona Hambat.....	46



ABSTRAK

Nama Penyusun : ASTRI WAHYUNI
NIM : 60700112065
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : **Aktivitas Antibakteri Sari Temulawak Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherchia coli* yang Diisolasi dari Feses Broiler**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian antibakteri sari temulawak terhadap pertumbuhan bakteri *Escherchia coli* yang diisolasi dari feses broiler, penelitian dilakukan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Sekolah Teknik penyuluh pertanian Gowa, selama tiga minggu. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 3 kali ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini yaitu penambahan sari temulwak dalam sumuran dalam media *Nutrient agar* yang diinokulasi dengan bakteri *Escherchia coli* dengan level yang berbeda yaitu P1(1mL), P2(2mL), P3(3mL), P4(4mL) dan P5(5mL). Kemudian dianalisis dengan analisis varian ANOVA. Perubah yang diukur adalah zona bening yang terdapat disekitar sumuran yang menandakan adanya penghambatan bakteri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sari temulawak yang mengandung berbagai level yaitu berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap zona hambat bakteri *Escherchia coli*.

Kata Kunci: Temulawak, Antibakteri, Zona Hambat, Escherchia coli, Feses Broiler

ABSTRACT

Name : ASTRI WAHYUNI

NIM : 60700112065

Subject : Animal Science

Title : Activity Antibacterial Extract Curcuma Against The Growth Of Bacteria Escherichia Coli Isolated From The Feces Of Broiler.

This study was conducted to determine the effect of antibacterial extract of curcuma on the growth of bacteria *Escherichia coli* isolated from the feces of broilers, the research conducted at the Animal Health Laboratory, School of Agricultural Engineering Livestock Gowa, for three weeks. The study was conducted by using a completely randomized design with three replications of five treatments were monitored for three days. The treatment in this study is the addition of antibacterial extract curcuma in wells in *Nutrient Agar* media inoculated with the bacterium *Escherichia coli* with different levels. 1mL to (P1), 2 mL (P2), 3ml (P3), 4ml (P4) and 5 mL (P5). The method used is an experimental method using a completely randomized design (RAL) with 5 treatments 3 repetitions. The parameters measured were contained clear zone around the wells that indicate the presence of bacterial inhibition. Then analyzed by analysis of variance ANOVA completely randomized design, and there are real differences in treatment. From the results of this study showed that at the level of 5 mL (P5) significant ($P > 0.05$) on the inhibition of the growth of the bacteria *Escherichia coli*.

Keywords: Curcuma, Zone of Inhibition, Bacteria Escherichia Coli

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini peternakan unggas khususnya peternakan ayam pedaging merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian nasional khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan terhadap daging ayam seiring dengan meningkatnya penghasilan dan kesadaran penduduk akan pentingnya protein hewani. Akan tetapi terkadang peternak mengabaikan masalah kondisi lingkungan dan kesehatan ternak yang dapat menurunkan kualitas dan performa ternak.

Broiler juga rentan terhadap mikroorganisme, salah satunya yaitu bakteri *Escherichia coli*. Reservoir *Escherichia coli* adalah saluran pencernaan hewan, termasuk unggas. Pada ayam terdapat sekitar 10^9 colony forming units (cfu) bakteri per gram feses dan 10^6 cfu merupakan bakteri *Escherichia coli*. Bakteri *Escherichia coli* juga sering diisolasi dari saluran pernapasan bagian atas dan juga didapatkan dari kulit unggas dan bulu. Salah satu bakteri penyebab diare adalah bakteri *Escherichia coli*. *Escherichia coli* merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek, tumbuh baik pada *Mac Conkey Agar* (MCA) dengan koloni berbentuk bulat dan cembung, bersifat memfermentasikan laktosa. *Escherichia coli* memiliki panjang sekitar 2 μm , diameter 0,7 μm , lebar 0,4-0,7

µm, dan bersifat anaerob fakultatif. *Escherichia coli* membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata (Dewanti dan Wahyudi, 2011).

Escherichia coli, atau biasa disingkat *E.coli* pada umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodor Escherich ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Kebanyakan *Escherichia coli* tidak berbahaya, tetapi *Escherichia coli* tipe O157:H7, dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan bernama verotoksin. Toksin ini bekerja dengan cara menghilangkan satu basa adenin dari unit 28S rRNA, sehingga menghentikan sintesis protein. Sumber bakteri ini contohnya adalah daging yang belum masak, seperti daging hamburger yang belum matang. *Escherichia coli* yang tidak berbahaya dapat menguntungkan manusia dengan memproduksi vitamin K2, atau dengan mencegah bakteri lain di dalam usus. *Escherichia coli* banyak digunakan dalam teknologi rekayasa genetika. Biasa digunakan sebagai vektor untuk menyisipkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk dikembangkan. *Escherichia coli* dipilih karena pertumbuhannya sangat cepat dan mudah dalam penanganannya. Negara-negara di Eropa sekarang sangat mewapadai penyebaran bakteri *Escherichia coli* ini, mereka bahkan melarang mengimpor sayuran dari luar (Jawetz, 1995).

Di Indonesia, penggunaan tanaman berkhasiat yang diramu menjadi jamu atau ramuan tradisional untuk pencegahan penyakit dan pengobatan secara tradisional sudah lama diterapkan pada manusia. Pemanfaatan jamu pada ternak di Indonesia masih sangat terbatas. Beberapa tanaman berkhasiat yang sudah diteliti

penggunaannya untuk ternak diantaranya adalah: lidah buaya atau *Aloe vera*, mengkudu atau *Bancudus latifolia Rumph*, kunyit atau *turmeric*, bawang putih dan oregano, jinten atau *black cumin* (jintan hitam) (Aydin *et al.*, 2008).

Berbagai macam tanaman berkhasiat yang banyak digunakan pada manusia yang potensial dijadikan sebagai antibakteri salah satunya adalah tanaman temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh liar di manapun. Temulawak mengandung protein, pati, zat warna kuning kurkuminoid (yang terdiri dari dua komponen yaitu kurkumin dan kurkuminoid), serta minyak *atsiri*. Pati merupakan komponen terbesar dalam temulawak, sekitar 29–34%. Pati ini adalah jenis yang mudah dicerna sehingga baik untuk pencernaan. Kandungan zat pada temulawak yaitu minyak atsiri yang bermuatan felandren dan turmerol, terdapat juga kurkumin dan pati dengan dosis 0,5 g sampai 1 g sangat baik untuk antipasmotika dan obat kolagoga (Kartasapoetra, 2001).

Penggunaan bahan ini sebagai penghambat pertumbuhan bakteri *Escherchia coli* diharapkan dapat menggantikan fungsi antibakteri dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak unggas serta efisiensi penggunaan antibiotik komersial. Pengurangan penggunaan antibiotika ini akan memberikan sumbangan peningkatan kualitas produk peternakan dan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menguji aktivitas antibakteri sari temulawak terhadap pertumbuhan *Escherchia coli* yang diisolasi dari feses broiler.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana aktivitas antibakteri sari temulawak terhadap pertumbuhan *Escherchia coli* yang diisolasi dari feses broiler ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas antibakteri sari temulawak terhadap pertumbuhan *Escherchia coli* yang diisolasi dari feses broiler.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai media informasi tentang bagaimana aktivitas antibakteri sari temulawak terhadap pertumbuhan *Escherchia coli* yang diisolasi dari feses broiler.

E. Hipotesis Penelitian

1. Ada aktivitas antibakteri sari temulawak terhadap pertumbuhan bakteri *Escherchia coli* pada level tertentu.
2. Tidak ada aktivitas antibakteri sari temulawak terhadap pertumbuhan bakteri *Escherchia coli* pada level tertentu.

F. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Rahmawati (2014), telah melakukan penelitian dengan judul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Herbal Terhadap Bakteri *Escherichia Coli*”. Persiapan bahan dimulai dengan menyiapkan ekstrak herbal (kunyit, kunyit putih, temulawak dan temuireng). Prosedur selanjutnya ialah sterilisasi alat dan media MHA (*Muller Hinton Agar*). Alat dan media yang digunakan uji antibakteri disterilisasi menggunakan autoklaf dengan suhu 121 °C dalam waktu 30 menit. Selanjutnya uji

diameter zona hambat bakteri *Escherichia coli* dilakukan menggunakan metode difusi sumur agar. Langkah berikutnya adalah mengikuti prosedur kerja uji diameter zona hambat dan dilanjutkan dengan uji KHM dengan metode penelitian adalah metode laboratorium dengan menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 ulangan, yaitu A0:Akuades, A1:Antibiotik (tetrachlor), A2:Ekstrak kunyit, A3:Ekstrak kunyit putih A4:Ekstrak temulawak dan A5:Ekstrak temuireng sehingga didapatkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak herbal kunyit memiliki diameter zona hambat tertinggi dibandingkan dengan ekstrak kunyit putih, temulawak dan temuireng. Hal ini menandakan bahwa aktivitas antibakteri kunyit paling tinggi dibandingkan ekstrak herbal lain meskipun nilainya masih rendah dibandingkan antibiotik. hasil penelitian ekstrak herbal yang efektif dalam menghambat bakteri *Escherichia coli* ialah kunyit yaitu sebesar $5,64 \pm 0,25$ mm.

Khaeruni (2013), telah melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Ekstrak Etanol Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) Terhadap Pertumbuhan *Escherichia coli* Secara *In vitro*". Salah satu bakteri penyebab tersebut adalah *Escherichia coli*. Penggunaan antibiotik yang tidak terkendali memicu peningkatan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Tanaman tradisional diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Temulawak dipercaya dapat digunakan sebagai antibakteri, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya aktivitas antibakteri ekstrak temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) terhadap *Escherichia coli*. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan pengujian secara *in vitro* dan dengan metode difusi agar, kemudian daya

hambat diukur dengan menggunakan penggaris. Dalam penelitian ini digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang menggunakan 6 kelompok perlakuan, satu kelompok kontrol positif (Kloramfenikol 30 µg) dan satu kelompok kontrol negatif *Carboxyl Methyl Cellulose* (CMC) 1%. Masing-masing kelompok dilakukan empat kali pengulangan sesuai dengan rumus perhitungan pengulangan. Data dianalisis menggunakan *Analysis of Variance* (ANOVA). Hasil uji daya hambat ekstrak etanol temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb.) pada konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% terhadap zona hambat *Escherichia coli* diperoleh diameter rata-rata 9,5 mm, 10,25 mm, 11,125 mm dan 11,750 mm. Kelompok perlakuan (kontrol negatif) dan (kontrol positif) menghasilkan zona hambat dengan diameter 0 mm dan 23,625 mm. Semakin besar konsentrasi yang diberikan maka semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk.

G. Defenisi operasional

1. Temulawak adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-temuan yang berasal dari Indonesia, khususnya pulau Jawa.
2. Feses adalah produk buangan saluran pencernaan hewan yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka yang mengandung banyak mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kesehatan ternak.
3. *Escherichia coli* adalah salah satu jenis bakteri yang tergolong dalam genus *Escherichia* dan familia *Enterobacteriaceae*. Bakteri tersebut umumnya bersifat gram negatif, berbentuk batang pendek gemuk, tidak tahan asam, tidak berspora, bersifat aerob atau fakultatif anaerob.

4. Zona hambat adalah daerah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada media agar oelh antibiotik.
5. Antibakteri adalah zat atau senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi bakteri, khususnya bakteri yang merugikan manusia. Definisi ini kemudian berkembang menjadi senyawa yang dalam konsentrasi tertentu mampu menghambat bahkan membunuh proses kehidupan suatu mikroorganisme.
6. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Islam tentang Manfaat Tanaman Herbal

Secara prinsip, herbalogi atau ilmu penggunaan tanaman obat ialah menggunakan bahan yang bersifat alami dan tidak menggunakan bahan-bahan sintesis. Herba terbaik tentunya ialah herbal yang dianjurkan oleh **Rasulullah saw.** seperti *madu, habbatusaudah, minyak zaitun*, dan termasuk tanaman-tanaman obat lain yang tumbuh disekitarnya. Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» رواه البخاري

Artinya :

"tidaklah suatu penyakit diturunkan melainkan Allah juga menyertakan obat-obatnya"(HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Abdilla,: juz 7 hal.122).

Al-Qur`an menyebutkan sejumlah tanaman yang oleh ilmu pengetahuan modern ditegaskan memiliki khasiat untuk mencegah beberapa jenis penyakit. Tumbuhan yang memberikan manfaat pada tubuh manusia dalam berbagai cara, juga enak rasanya. Di dalam ayat-ayat al-Qur`an, Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan keberagaman dan keindahan disertai seruan agar merenungkan ciptaan-ciptaannya yang amat menakjubkan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Thaha/20:53 sebagai berikut :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
أَنْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, “dan menurunkan dari langit air hujan”. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Kementerian Agama RI, 2012).

Ayat tersebut menjelaskan betapa besarnya karunia/nikmat yang Allah berikan pada manusia diantaranya menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia yg dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana jalan yang mudah ditempuh manusia, menurunkan dari langit air yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang macam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Salah satu tumbuhan yang memiliki manfaat bagi manusia dan binatang-binatang peliharaannya adalah temulawak yang bisa dimanfaatkan sebagai obat, makanan maupun minuman. Hal ini juga dijelaskan dalam QS An Nahl/16:11 Allah swt. berfirman sebagai berikut :

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

"Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan"(Kementerian Agama RI, 2012).

Dia yakni Allah swt. menumbuhkan bagi kamu dengannya,yakni dengan air hujan itu, tanaman-tanaman, dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah dan matang, mudah dipetik, dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadi makanan yang halal atau minuman yang haram, dan dari segala macam atau sebagian buah-buaha, selain yang disebut itu. Sesungguhnya yang demikian, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu, adalah maha esa lagi maha kuasa. Tanda itu berguna bagi kaum yang memikirkan. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempet, tetapi rasanya berbeda-beda.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kesejahteraan manusia. Allah juga menciptakan segala makhluk dengan manfaatnya masing-masing termasuk pula dengan tumbuhan. Ada tumbuhan yang bisa dijadikan makanan dan dijadikan sebagai obat seperti contohnya tanaman temulawak. Hal ini menjadikan keberadaan tanaman sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki manfaat yang dapat memberi pengajaran dan ilmu pengetahuan.

Hikma dibalik ciptaan Allah swt. juga terdapat dalam QS al baqarah/2:164 yaitu sebagai berikut :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٩٠﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Kementerian Agama RI, 2012).

Ayat ini menerangkan tentang, bukti kekuasaan Allah swt. dan memang banyak sekali bukti atas kekuasaan Allah swt. yang salah satunya adalah silih bergantinya siang dan malam. di dalam penciptaan langit dan bumi serta segala keajaiban yang ada pada keduanya dan berbagai perbedaan siang dan malam dari segi datang dan perginya maupun dari segi lebih dan kurang waktunya, semua itu merupakan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah swt bagi manusia, yakni orang-orang yang punya akal. Dalam QS Ali Imran/3:190-191 Allah swt. berfirman sebagai berikut :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka." (Kementerian Agama RI, 2012).

Dan salah satu bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berfikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan , yakni kejadian benda-benda angkasa seperti, matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang ada di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran bumi dan porosnya, yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang, perbedaannya, baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya terhadap tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul albab yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni.

Dalam ayat 190 menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaan-Nya juga dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaan-Nya.

Pada ayat 191 mendefinisikan orang-orang yang mendalam pemahamannya dan berpikir tajam (Ulul Albab), yaitu orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah. Ia selalu mengingat Allah (berdzikir) di setiap waktu dan keadaan, baik di waktu ia berdiri, duduk atau berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa

ulul albab yaitu orang-orang baik lelaki maupun perempuan yang terus menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi.

QS adh- Dzariyat/51:20-21 Allah swt. berfirman sebagai berikut :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.” dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?” (Kementerian Agama RI, 2012)

Demikianlah banyak sekali tanda-tanda keesaan, kebesaran, dan kekuasaan Allah yang terbentang dilangit dan bukan hanya dilangit, dibumi pun terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yakin yang mantap keyakinannya, dan disamping itu ada juga banyak tanda-tanda serupa yang terdapat pada diri kamu sendiri wahai manusia maka apakah kamu lalai sehingga tidak melihat yakni tidak memerhatikan tanda-tanda itu dengan mata kepala dan hati kamu (Abdulrahman, 2011).

Bukti keesaan Allah yang terdapat dibumi antara lain system kerja bumi dan keseimbangannya yang terdapat didalamnya. Disamping keindahan dan kelanggengannya, kesemua terjadi secara berulang-ulang yang menampik dugaan kebetulan dan kesemuanya pula terjadi dengan demikian teratur dan konsisten. Seandainya ada dua Tuhan keharmonisan dan kesinambungan ini tidak akan pernah terjadi (Abdulrahman, 2011).

Bukti pada manusia dapat dilihat antara lain pada kejadian manusia yang sangat unik dan organ-organ tubuhnya yang demikian serasi tapi kompleks, demikian pula pada tingkah lakunya yang demikian rumit. Ayat tersebut menerangkan bahwa di dalam bumi itu terdapat berbagai tanda yang menunjukkan keagungan Penciptanya dan kekuasaan-Nya yang sangat jelas berupa berbagai macam tumbuhan, binatang, hamparan bumi, gunung, tanah lapang, sungai, lautan dan berbagai macam bahasa dan warna kulit umat manusia, serta sesuatu yang telah ditakdirkan untuk mereka berupa keinginan dan kekuatan, dan apa yang terjadi di antara mereka berupa perbedaan tingkat dalam hal pemikiran, pemahaman, dinamika kehidupan, kebahagiaan, kesengsaraan, dan hikmah yang terdapat di dalam anatomi tubuh mereka, yaitu dalam menempatkan setiap anggota tubuh dari keseluruhan tubuh mereka pada tempat yang benar-benar mereka perlukan (Abdulrahman, 2011).

B. Temulawak sebagai Tanaman Herbal

Curcuma berasal dari kata Arab, kurkum yang berarti kuning. *Xanthoriza* berasal dari kata Yunani, *Xanthos* yang berarti kuning dan rhiza yang berarti umbi akar. Jadi *Curcuma xanthoriza* Roxb berarti akar kuning. Dalam bahasa Indonesia *Curcuma xanthoriza* Roxb disebut temulawak yang berarti akar kuning. Dalam bahasa Belanda disebut *geelwortel* dalam bahasa Jerman disebut *javanischer gelbwurzel* (Rahmat, 1995).

Temulawak sebagaimana nama padanannya, *Curcuma javanica*, dipercaya sebagai tumbuhan asli Indonesia, yang kemudian menyebar ke beberapa negara seperti Malaysia, Cina bagian selatan, Thailand, Birma, India, dan Filipina. Tumbuhan yang diduga kuat berasal dari Pulau Jawa ini menyebar ke beberapa

wilayah Indonesia seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan dan Sulawesi (Rahmat, 1995).

Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Di daerah Jawa Barat temulawak disebut sebagai koneng gede sedangkan di Madura disebut sebagai temu lobak. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman ini selain di Asia Tenggara dapat ditemui pula di Cina, IndoCina, Barbados, India, Jepang, Korea, di Amerika Serikat dan Beberapa negara di Eropa.

Curcuma xanthorrhiza roxb termasuk dalam:

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

Ordo : Zingiberales

Keluarga : Zingiberaceae

Genus : *Curcuma*

Spesies : *Curcuma xanthorrhiza* Roxb

Curcuma xanthorrhiza Roxb merupakan tanaman terna berbatang semu dengan tinggi hingga lebih dari 1m tetapi kurang dari 2m, berwarna hijau atau coklat gelap. Akar rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berwarna hijau gelap. Tiap batang mempunyai daun 2–9 helai dengan bentuk bundar memanjang sampai bangun lanset, warna daun hijau atau coklat keunguan terang sampai gelap, panjang daun 31–84cm dan lebar 10–18cm, panjang tangkai

daun termasuk helaian 43–80cm. Perbungaan lateral, tangkai ramping dan sisik berbentuk garis, panjang tangkai 9–23cm dan lebar 4–6cm, berdaun pelindung banyak yang panjangnya melebihi atau sebanding dengan mahkota bunga. Kelopak bunga berwarna putih berbulu, panjang 8–13mm, mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang keseluruhan 4.5cm, helaian bunga berbentuk bundar memanjang berwarna putih dengan ujung yang berwarna merah dadu atau merah, panjang 1.25–2cm dan lebar 1cm (Rahmat, 1995).

Tanaman ini ditanam secara konvensional dalam skala kecil tanpa memanfaatkan teknik budidaya yang standard, karena itu sulit menentukan dimana sentra penanaman temulawak di Indonesia. Hampir di setiap daerah pedesaan terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak terutama di lahan yang teduh (Rahmat, 1995).

a. Kandungan dan Senyawa Kimia Temulawak

Rimpang temulawak mengandung zat kuning kurkumin, minyak atsiri, pati, protein, dan lemak. Diantara komponen tersebut yang paling banyak kegunaannya adalah pati, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Ketiganya baik digunakan di industri maupun rumah tangga. Pati merupakan komponen terbesar dari rimpang temulawak. Pati temulawak berwarna putih kekuningan karena mengandung kurkuminoid. Kadar protein pati temulawak lebih tinggi dibanding dengan tanaman lainnya. Kandungan dari pati temulawak adalah abu, protein, lemak, serat kasar, karbohidrat, kurkumin, kalium, natrium, kalsium, magnesium, zat besi, mangan, dan kadmuim (Sidik, 1997).

Berdasarkan komposisi tersebut pati temulawak dapat digunakan untuk bahan makanan. Pati temulawak mudah dicerna sehingga cocok digunakan sebagai makanan bayi atau makanan orang baru sembuh dari sakit dan sebagai bahan campuran makanan atau sumber karbohidrat. Pati temulawak dapat juga digunakan sebagai pencampur pati lain, misalnya sebagai campuran sereal untuk mengurangi sifat basi pada roti atau sebagai pengental pada sirup (Sidik, 1997).

Berdasarkan analisis rimpang temulawak secara kuantitatif diperoleh kadar air 13,98% kadar minyak atsiri 3,81% kadar pati 41,45% kadar serat 12,62% kadar abu 4,62% kadar abu tak larut asam 0,56% sari air 10,96% sari alkohol 9,48% dan kadar kurkumin 2,29%. Sedangkan berdasarkan Analisis secara kualitatif dengan pengujian skrining fitokimia diperoleh bahwa didalam rimpang temulawak terdapat alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid dan glikosida. Dari hasil pengujian skrining fitokimia terlihat dalam rimpang temulawak kandungan alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid dan glikosida lebih dominan dibanding tannin, saponin dan steroid. Alkaloid sering kali beracun bagi manusia dan banyak digunakan dalam bidang pengobatan (Sidik, 1997).

Rimpang tanaman ini mengandung zat warna kuning 1-2% terdiri dari *Curcumin* dan *Monodesmetoksi curcumin*. Kandungan minyak atsirinya sekitar 5% dengan komponen utama *1-sikloisopren mycren*, *b-curcumen*, *zanthorrhizo*, *germacron*, *falandren*, *sabinen*, *sineol*, *bornel*, *zingiberin*, *turmeron*, *atlanton*, dan *artumeron*. Minyak esensial dari temulawak atau lebih dikenal dengan minyak atsiri dapat diperoleh setelah penyulingan dan fraksinasi dengan suhu tinggi (Sidik, 1997).

Berdasarkan beberapa penelitian jumlah komposisi dari minyak tersebut menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Adapun perbedaan mungkin dapat disebabkan oleh factor lingkungan seperti kondisi pertumbuhan, penanganan, dan pengolahan pasca panen dari rimpang temulawak tersebut (Lutony, 2000).

Secara umum temulawak dapat dimanfaatkan sebagai obat, sumber karbohidrat, bahan penyedap, masakan dan minuman, serta pewarna alami untuk makanan dan kosmetika. Semua bagian dari temulawak dapat dimanfaatkan. Hanya, bagian yang paling berharga dan dapat dimanfaatkan untuk beberapa macam keperluan adalah rimpangnya. Efek yang dapat dihasilkan antara lain:

1. Efek Analgetik dan Anti-inflamasi

Kurkumin yang terkandung dalam temulawak mempunyai aktivitas antiradang yang setara dengan 100 mg fenilbutazon yang dapat mengurangi nyeri dan radang sendi. Dicapai melalui penghambatan migrasi sel-sel leukosit ke daerah radang atau melalui penghambatan pembentukan serta transportasi mediator radang yaitu prostaglandin. Dari hasil uji klinik menunjukkan adanya perbaikan pada penderita radang sendi.

2. Efek Hipolipidemik

Suatu hasil penelitian pada seekor tikus menunjukkan bahwa minyak atsiri berefek melarutkan kolestrol dalam tikus. Hasil uji praklinik dan klinik menunjukkan bahwa ekstrak temulawak dan fraksi kurkuminoidnya dapat menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida dan meningkatkan kadar HDL (*High Dencity Lypoprotein*) kolesterol. Komponen yang diduga berperan dalam menurunkan lemak darah adalah kurkuminoid

3. Efek Anti-oksidan

Ekstrak temulawak yang mengandung senyawa kurkuminoid yaitu kurkumin dan desmetoksikurkumin diduga mampu menghambat peroksidasi lipid tak jenuh ganda yang ada pada LDL (*Low Dencity Lypoprotein*) atau biasa disebut juga sebagai lemak jahat. Penghambatan pembentukan MDA (*Malodialdehid*) dalam LDL (*Low Dencity Lypoprotein*) teroksidasi (penghambatan oksidasi (*Low Dencity Lypoprotein*) oleh ekstrak temulawak sejalan dengan kadar total fenol ekstrak temulawak yang dikandungnya.

4. Efek Anti-diabetik

Temulawak mempunyai potensi sebagai bahan baku obat antidiabetes. Temulawak dapat digunakan untuk menyembuhkan gejala diabetes pada tikus, merubah jumlah dan komposisi *fecal bile acids*, *growth retardation*, *hyperphagia*, *polydipsia*, mengurangi tingginya glukose dan trigliserida dalam serum, dan mengurangi terbentuknya linoleat dari arakhidonat dalam fosfolipid hati.

5. Efek Anti-hepatotoksik

Pemberian seduhan rimpang temulawak sebesar 400, 800 mg/kg bobot mencit selama 6 hari serta 200, 400 dan 800 mg/kg bobot mencit pada mencit selama 14 hari. Selain itu juga mampu menurunkan aktivitas enzim *Glutamic Pyruvic Transaminase* (GPT)-serum dosis hepatotoksik parasetamol maupun mempersempit luas daerah nekrosis parasetamol secara nyata. Daya antihepatotoksik tergantung pada besarnya dosis maupun jangka waktu pemberiannya.

6. Efek Anti-tumor

Empat senyawa *sesquiterpenoid* bisabolan dari rimpang temulawak, yaitu kurkumen, arturmeron, atlanton dan *xanthorrhizol*. Sebagian besar dari zat tersebut merupakan senyawa antitumor melawan *sarcoma 180 ascites* pada tikus. Pemberian temulawak dapat mengaktifkan sel T dan sel B yang berfungsi sebagai media dalam sistem kekebalan pada tikus percobaan.

7. Efek Diuretik

Rebusan temulawak pada dosis ekuivalen 1x dan 10x dosis lazim orang, pada tikus putih mempunyai efek diuretik kurang lebih setengah dari potensi HCT (Hidroklorotiazid) 1,6 mg/kg.

8. Efek Menekan Saraf Pusat

Ekstrak rimpang temulawak mempunyai efek memperpanjang masa tidur yang diakibatkan oleh pento barbital. Selanjutnya diketahui bahwa (R)-(-)-*xanthorrhizol* adalah zat aktif yang menyebabkan efek tersebut dengan cara menghambat aktifitas sitokrom P 450. Selain *xanthorrhizol*, germakron yang terkandung dalam ekstrak temulawak juga mempunyai efek memperpanjang masa tidur. Pemberian germakron 200 mg/kg secara oral pada tikus percobaan dinyatakan dapat menekan hiperaktifitas yang disebabkan oleh metamfetamin (3 mg /kg). Lebih lanjut dinyatakan bahwa pemberian germakron 750 mg/kg bobot hawan uji secara oral pada tikus percobaan tidak menunjukkan adanya toksisitas letal.

9. Efek Hipotermik

Pemberian infus temulawak menunjukkan penurunan suhu pada tubuh mencit percobaan (Pudjiastuti, 1988). Ekstrak metanol rimpang temulawak mempunyai efek penurunan suhu pada rektal tikus percobaan. Selanjutnya bahwa germakron diidentifikasi sebagai zat aktif dalam rimpang temulawak yang menyebabkan efek hipotermik.

10. Efek Anti-bakteri

Ekstrak temulawak mempunyai aktivitas anti bakteri seperti juga pada tanaman famili Zengiberaceae lainnya seperti temu ireng, temu mangga dan temu putih. Ekstrak rimpang temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) dari maserasi rimpang kering dengan etanol 95% dapat memberikan anti bakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis*, dengan KHTM (konsentrasi hambat tumbuh minimum) masing-masing 0,38% b/v dan 0,03% b/v.11, 16, 17

11. Efek Lain-lain

Efek dari rimpang temulawak bisa memperbaiki keadaan penderita rematik artritis. Ekstrak rimpang temulawak bisa meningkatkan cairan empedu. Dalam dosis tindi temulawak dapat menurunkan kadar enzim glutamat oksaloasetat transaminase dalam serum (SGOT) dan enzim glutamat piruvat transaminase dalam serum (SGPT). Hasil wawancara dengan 100 orang responden petani wanita menunjukkan bahwa penggunaan temulawak dapat memperbaiki kerja sistem hormonal yang mengontrol metabolisme khususnya karbohidrat dan asam susu, memperbaiki fisiologi organ tubuh, dan meningkatkan kesuburan.

Temulawak juga bisa digunakan sebagai ramuan untuk demam, pegal linu, memulihkan kesehatan setelah melahirkan, sembelit, perut kembung dan meningkatkan nafsu makan.

Ekstrak herbal merupakan nutrisi yang diberikan kepada ternak yang berasal dari bahan – bahan alami dan berfungsi meningkatkan penampilan produksi dan kesehatan ternak. Temulawak merupakan tumbuhan tahunan yang tumbuh tegak dengan tinggi hingga lebih dari 1 m tetapi kurang dari 2 m, berwarna hijau atau coklat gelap. Akar rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berwarna hijau gelap. Tiap batang mempunyai daun 2-9 helai dengan bentuk daun bundar memanjang sampai bangun lanset, warna daun hijau atau coklat keunguan terang sampai gelap, panjang daun 31-84 cm dan lebar 10-18 cm, panjang tangkai daun termasuk helaian 43-80 cm. Daun termasuk tipe daun sempurna, artinya tersusun dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Perbungaan lateral, tangkai ramping dan sisik berbentuk garis, panjang tangkai 9-23 cm dan lebar 4-6 cm, berdaun pelindung banyak yang panjangnya melebihi atau sebanding dengan mahkota bunga. Kelopak bunga berwarna putih berbulu, panjang 8-13 mm, mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang keseluruhan 4.5 cm, helaian bunga berbentuk bundar memanjang berwarna putih dengan ujung berwarna merah dadu atau merah, panjang 1.25-2 cm dan lebar 1 cm (Sidik dkk, 1997).

Selanjutnya Sidik dkk, (1997), menyatakan bahwa rimpang induk temulawak bentuknya bulat seperti telur, sedangkan rimpang cabang terdapat pada bagian samping yang bentuknya memanjang. Tiap tanaman memiliki rimpang

cabang antara 3-4 buah. Warna kulit rimpang sewaktu masih muda maupun tua adalah kuning kotor. Warna daging rimpang adalah kuning, dengan cita rasanya pahit, berbau tajam, serta keharumannya sedang. Rimpang terbentuk dalam tanah pada kedalaman kurang lebih 16 cm. Tiap rumpun tanaman temulawak umumnya memiliki enam buah rimpang tua dan lima buah rimpang muda. Sistem perakaran tanaman temu lawak termasuk akar serabut. Akar-akarnya melekat dan keluar dari rimpang induk. Panjang akar sekitar 25 cm dan letaknya tidak beraturan.

Tanaman temulawak merupakan salah satu tanaman dengan daya adaptasi yang tinggi terhadap beberapa cuaca di daerah tropis. Tanaman ini tumbuh baik pada lahan teduh dan terlindung dari sinar matahari. Namun, temulawak juga dapat tumbuh di tanah tegalan dengan intensitas matahari yang cukup terik. Suhu udara yang baik untuk budidaya tanaman ini antara 19-30 °C (Sidik, 1997).

2. Temulawak sebagai Penghasil Minyak Atsiri dan Kurkumin

a. Minyak Atsiri

Dalam tumbuhan, kebanyakan senyawa-senyawa yang beraroma dihasilkan melalui jalur metabolisme sekunder. Terpen merupakan persenyawaan hidrokarbon tidak jenuh yang molekulnya tersusun dari unit isoprene (C₅H₈). Unit Isopren berkondensasi dengan persambungan kepala ke ekor isopentenil pirofosfat dan dimetil pirofosfat menghasilkan terpen dalam tumbuhan (Koensoemardiyah,2010).

Minyak atsiri adalah minyak yang mudah menguap yang terdiri atas campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi dan titik didih yang

berbeda. Sebagian besar minyak atsiri diperoleh dengan cara penyulingan atau *hidrodestilasi* (Koensoemardiyah,2010).

Dewasa ini, minyak atsiri banyak digunakan dalam berbagai industri, seperti industri parfum, kosmetik, *essence*, farmasi dan *flavoring agent*. Biasanya, minyak atsiri yang berasal dari rempah digunakan sebagai *flavoring agent* makanan. Bahkan dewasa ini sedang dikembangkan penyembuhan penyakit dengan *aromatherapy*, yaitu dengan menggunakan minyak atsiri yang berasal dari tanaman. Minyak temulawak merupakan minyak atsiri yang dihasilkan rimpang temulawak. Kadar minyak atsiri temulawak berkisar antara 4.6-11%, memiliki bau yang tajam dan bau khas aromatik. Banyaknya kandungan minyak atsiri temulawak tergantung pada umur rimpangnya (Agusta, 2000).

Pada minyak atsiri yang bagian utamanya terpenoid, biasanya terpenoid itu terdapat pada fraksi minyak atsiri yang tersuling uap. Zat inilah penyebab wangi, harum atau bau yang khas pada banyak tumbuhan. Secara ekonomi senyawa tersebut penting sebagai dasar wewangian alam dan juga untuk rempah–rempah serta sebagai senyawa citarasa dalam industri makanan. Monoterpen dan seskuioterpen merupakan komponen utama dari banyak minyak atsiri yang digunakan sebagai cita rasa dan pewangi. Monoterpen dan seskuioterpen dapat dipilah-pilah berdasarkan kepada kerangka karbon dasarnya. Yang umum adalah asiklik (misalnya graniol dan fanesol), monosiklik (misalnya limonene dan bisabolena), bisiklik (misalnya α dan β -pinena). Dalam setiap golongan monoterpen dan seskuioterpen bisa terdapat senyawa hidrokarbon tak jenuh atau keton. Minyak atsiri dapat diperoleh melalui ekstraksi tumbuh–tumbuhan yakni

dari daun, bunga, akar, dan kulit kayu. Biasanya tumbuhan penghasil minyak atsiri tumbuh liar atau dibudidayakan dan biasanya tumbuhan itu berarti wangi (Agusta, 2000).

Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir, beraroma wangi sesuai dengan aroma tumbuhan penghasilnya. Umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Minyak atsiri itu berupa cairan jernih, tidak berwarna, tetapi selama penyimpanan akan mengental dan berwarna kekuningan atau kecoklatan. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh oksidasi dan resinifikasi (berubah menjadi dammar atau resin). Untuk mencegah atau memperlambat proses oksidasi dan resinifikasi tersebut, minyak atsiri harus dilindungi dari pengaruh sinar matahari yang dapat merangsang terjadinya oksidasi dan oksigen udara yang akan mengoksidasi minyak atsiri (Agusta, 2000).

b. Kurkumin

Kurkumin merupakan salah satu senyawa yang diisolasi dari tanaman *Curcuma sp* dan pemberi warna kuning pada tanaman kunyit *Curcuma longa L*. Kurkumin banyak digunakan sebagai rempah-rempah dan pemberi warna pada makanan dan juga pemberi warna pada tekstil. Secara tradisional kurkumin juga digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit seperti anoreksia, batuk, diabetes, hepatitis, rematik dan sinusitis (Majeed dkk, 1995).

Kurkumin terdapat pada berbagai genus *Curcuma* dalam jumlah yang relatif kecil yaitu pada tanaman kunyit sekitar 3-4% yang terdiri dari kurkumin I 94%, kurkumin II 6% dan kurkumin III 0,3. Kurkumin merupakan senyawa

metabolit sekunder, dan secara kimia termasuk golongan fenolik. Kurkumin [1,7-bis(4-hidroksi-3'-metoksifenil)-1',6'-heptadien-3',5'-dion] diisolasi oleh Vogel dan Pellettier pada tahun 1818 tapi ditemukan dalam bentuk kristal oleh Daube pada tahun 1870. Sintesis kurkumin pertama kali dilakukan oleh Milobedzka dkk pada tahun 1910. Kurkumin memiliki rumus molekul $C_{21}H_{20}O_6$ dengan berat molekul 368,37. Kurkumin tidak larut dalam air namun larut dalam kloroform, diklorometan, metanol, etanol, etil asetat, dimetilsulfoksida dan aseton (Pandey *et al*, 2010).

Kurkumin di alam terdapat bersama-sama dengan dua senyawa lain yaitu demetoksi kurkumin dan bis-demetoksi kurkumin, yang dikenal dengan nama kurkuminoid. Berdasarkan hasil penelitian senyawa kurkumin yang diisolasi tersebut memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antibakteri, antiprotozoa, antivirus, antikoagulan, antioksidan, antitumor dan antikarsinogenik. Sedangkan untuk senyawa demetoksi kurkumin dan bis-demetoksi kurkumin memiliki aktivitas antioksidan. Chattopadhyay *et al* (2004) menyatakan bahwa hasil isolasi tanaman *Curcuma longa* diperoleh berbagai senyawa kurkumin lainnya seperti sodium kurkuminat yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan antibakteri, dan metil kurkumin yang memiliki aktivitas antiprotozoa

Selain kurkumin di alam ditemukan pula berbagai senyawa analog kurkumin dengan berbagai aktivitas biologis seperti dibenzolylmetan dengan aktivitas antiinflamasi dan anti tumor, capsaicin yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan menghambat radikal superoksida. *Yakuchinon* A yang dapat menghambat produksi induksi LPS (Lipopolisakarida) nitrit oksida, induksi TPA

(12-*O*-tetradekanoilporbol-13-asetat) superoksida dan lipid peroksidasi. *Cassumuin* A dan B lebih baik dibandingkan kurkumin sebagai antitoksisitas (Anand dkk, 2008).

Biosintesis kurkumin menurut Roughly dan Whiting terbentuk melalui 2 jalur, jalur pertama yaitu asam sinamat dengan 5 malonyl Co-A, dan jalur kedua antara dua sinamat dan malonyl Co-A.

Kurkumin terdapat pada berbagai genus *Curcuma* dalam jumlah yang relatif kecil juga variasi struktur yang terbatas. Hal ini merupakan kendala bagi penggunaan kurkumin dalam bidang pengobatan mengingat aktivitas biologis kurkumin yang sangat beragam. Selain jumlah yang cukup juga dibutuhkan variasi struktur yang beragam. Kondisi ini sulit diperoleh melalui isolasi bahan alam. Selain kurang menguntungkan dari segi biaya juga membutuhkan banyak bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Sintesis dapat digunakan untuk menanggulangi masalah tersebut (Robinson dkk, 2005).

Struktur kurkumin terbagi atas tiga bagian yaitu A, B dan C. Bagian A dan C merupakan gugus aromatis dan B adalah ikatan dien-dion. hubungan struktur dan aktivitas kurkumin terkait dengan gugus-gugus fungsional senyawa tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Gugus hidroksi pada cincin aromatik menunjukkan aktivitas antioksidan pada senyawa kurkumin.
- b. Gugus keton dan ikatan rangkap ber[eran dalam aktivitas biologis sebagai antiinflamasi, antikanker dan antimutagenik.

- c. Dua cincin aromatis simetris ataupun tidak simetris menentukan potensi ikatan antara senyawa obat dengan reseptor (Pandey dkk, 2010).

C. Antibakteri

Menurut Jawetz *et al.* (2005) antibakteri adalah zat atau senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi bakteri, khususnya bakteri yang merugikan manusia. Definisi ini kemudian berkembang menjadi senyawa yang dalam konsentrasi tertentu mampu menghambat bahkan membunuh proses kehidupan suatu mikroorganisme. Mekanisme penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa antibakteri dapat berupa kerusakan dinding sel, perubahan permeabilitas membran sitoplasma, perubahan molekul protein dan asam nukleat, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein. Senyawa antibakteri dapat bekerja sebagai bakteristatik, bakterisidal, dan bakteriolitik.

Antibakteri mempunyai beberapa target yang spesifik meliputi:

1. Kerusakan pada dinding sel

Struktur dinding sel dapat dirusak dengan cara menghambat pembentukannya atau setelah selesai terbentuk. Antibiotik yang bekerja dengan mekanisme ini diantaranya adalah penisilin. Penisilin dapat menghambat pembentukan dinding sel bakteri, hal tersebut dapat terjadi karena adanya ikatan antara reseptor *Protein Binding Penicillin* (PBP) dengan cincin β -laktam pada penisilin yang berakibat dapat menimbulkan penghambatan reaksi transpeptidasi atau dihentikannya sintesis peptidoglikan sehingga dinding sel dapat mengalami lisis atau rusak (Jawetz *et al.*, 2005).

2. Perubahan permeabilitas sel

Fungsi dari membran sitoplasma yaitu mempertahankan bagian-bagian tertentu dalam sel serta mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan lain, kemudian memelihara integritas komponen-komponen seluler. Turunan fenol dapat mengubah permeabilitas membran sel bakteri, sehingga menimbulkan kebocoran konstituen sel yang esensial dan mengakibatkan bakteri mengalami kematian (Jawetz *et al.*, 2005).

3. Perubahan molekul protein dan asam nukleat.

Hidup suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul protein dan asam nukleat dalam keadaan alamiahnya. Suatu antibakteri dapat mengubah keadaan ini dengan mendenaturasikan protein dan asam-asam nukleat sehingga merusak sel tanpa dapat diperbaiki lagi (Jawetz *et al.*, 2005).

4. Penghambatan kerja enzim

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptik, seperti turunan aldehid dan etilen oksida. Aldehid dan etilen oksida bekerja dengan mengalkilasi secara langsung gugus nukleofil seperti gugus-gugus amino, karboksil, hidroksil, fenol, dan tiol dari protein sel bakteri (Jawetz *et al.*, 2005).

Sulfonamid merupakan zat kemoterapi sintetis yang bekerja dengan cara bersaing dengan *para-Amino Benzoic Acid* (PABA), sehingga dapat menghalangi sintesis asam folat yang merupakan asam esensial yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin. Dengan demikian karena tidak adanya enzim, maka aktivitas seluler yang normal akan terganggu (Jawetz *et al.*, 2005).

5. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein

DNA (*Deoxyribonucleic Acid*), RNA (*Ribonucleic Acid*), dan protein memegang peranan amat penting di dalam proses kehidupan normal sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan sel atau pada fungsi sel zat-zat tersebut mengakibatkan kerusakan total pada sel (Jawetz *et al.*, 2005).

6. Uji Aktivitas Antibakteri

Tujuan pengukuran aktivitas antibakteri adalah untuk menentukan potensi suatu zat yang diduga atau telah memiliki aktivitas sebagai antibakteri dalam larutan terhadap suatu bakteri. Pengaruh potensi antibakteri dari suatu zat dapat dilakukan dengan cara:

a. Dilusi

Ada dua macam dilusi yaitu dilusi padat dan dilusi cair. Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi dapat ditambah suspensi kuman dalam media sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampur dengan media agar lalu ditanami kuman. Metode dilusi digunakan untuk menghitung konsentrasi minimal suatu agen antibakteri yang dibutuhkan untuk menghambat suatu mikroorganisme. Agen antibakteri yang akan diuji diencerkan dalam berbagai konsentrasi, kemudian agen antibakteri diukur konsentrasi terendah yang menghambat atau membunuh mikroorganisme (Jawetz *et al.*, 2005).

b. Difusi

Prinsip metode yaitu uji potensi yang berdasarkan pengamatan luas daerah hambatan pertumbuhan bakteri karena adanya efek antibakteri senyawa kimia pada ekstrak atau bahan uji dari titik awal pemberian ke daerah difusi (Jawetz *et al.*, 2005).

c. Cara Kirby Bauer

Metode Kirby Bauer adalah metode yang digunakan untuk mengetahui sensitivitas suatu mikroba terhadap antibakteri tertentu. Agen antibakteri dijenuhkan pada *disk* (kertas saring), kemudian *disk* tersebut diletakkan pada permukaan media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri, kemudian diukur zona hambatan yang terbentuk di sekitar *disk*.

d. Cara Sumuran

Agen antibakteri ditetaskan pada sumuran dengan diameter yang dibuat pada media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri, kemudian diukur zona hambatan yang terbentuk di sekitar sumuran.

e. Cara *Pour Plate*

Cara ini mirip dengan Kirby Bauer, hanya saja media agar yang digunakan dicampur homogen dengan suspensi bakteri uji.

7. Uji Bioautografi

Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak pada kromatogram hasil KLT (kromatografi lapis tipis) dan menentukan ekstrak, fraksi ataupun isolasi senyawa murni yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antifungi dan antiviral. Bioautografi dapat juga digunakan untuk mendeteksi antibiotik yang belum diketahui karena metode kimia atau fisika

hanya terbatas untuk senyawa murni. Adapun deteksi kimia dengan warna spesifik digunakan sebagai pembanding hasil bioautografi sehingga kedua metode tersebut saling melengkapi (Dewanti dan Wahyudi, 2011).

Dalam prakteknya, kromatogram diletakkan pada permukaan media agar di dalam petri yang telah diinokulasi dengan mikroorganisme. Setelah zat dalam kromatogram berdifusi ke agar, lempeng diangkat dan agar diinkubasi. Setelah masa inkubasi berakhir, dapat diamati bercak yang menyebabkan hambatan pertumbuhan mikrobial uji, kemudian dicocokkan dengan hasil deteksi kromatogramnya dengan metode deteksi KLT (kromatografi lapis tipis) yang sesuai. Dengan demikian dapat diperkirakan senyawa yang bertanggung jawab terhadap daya antimikroba (Dewanti dan Wahyudi, 2011).

D. Ayam Broiler

Tidak semua orang memahami asal-muasal atau seluk-beluk perkembangan ayam broiler, meskipun hampir setiap harinya orang mendengar atau bahkan bisa jadi mengkonsumsi daging dan telur ayam broiler. Bagi mereka ketidakpahaman tersebut memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi bagi peternak atau calon peternak pengetahuan tentang asal-muasal atau seluk-beluk perkembangan ayam broiler dari waktu ke waktu penting dimiliki. Hal itu penting karena pemahaman yang baik tentang karakteristik atau sifat-sifat ayam broiler dapat membantu dalam melancarkan usahanya dalam beternak ayam broiler, baik untuk tipe ayam pedaging maupun petelur. Terlebih lagi, pemahaman mengenai jenis-jenis ayam broiler yang unggul perlu diketahui oleh setiap peternak agar dalam usaha ternaknya dapat mendatangkan keuntungan (Wahid, 2009).

Berkaitan dengan hal itu saat ini dikenal adanya istilah ayam broiler komersial karena usaha peternakan hewan unggas ini tidak terlepas dari orientasi atau tujuan mendatangkan keuntungan. Dengan pernyataan lain, usaha peternakan ayam broiler tidak hanya diperuntukkan bagi konsumsi sendiri melainkan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan sehingga diperoleh suatu keuntungan finansial (keuangan) (Wahid, 2009).

Usaha peternakan ayam broiler komersial dewasa ini tumbuh subur di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Usaha peternakan ayam broiler komersial dilakukan menggunakan *strains* atau bibit ayam broiler unggulan. *Strains* ayam broiler unggulan diperoleh dari usaha penyiangan ayam unggulan. Semula *strains* ayam broiler unggulan diperoleh dengan melakukan penetasan alami atau menitipkan pada induk ayam. Pada perkembangan waktu-waktu selanjutnya yakni pada tahun 1844, di Amerika didirikan pabrik penetasan (*incubation*) telur ayam untuk pertama kali. Saat ini telah dikenal berbagai jenis *strains* ayam broiler unggul yang dikembangkan di berbagai negara. Contohnya, di Italia dikenal terdapat *strains* ayam Leghorn paling diunggulkan dan banyak dikembangkan sebagai hewan unggas yang dternakkan secara komersial (Wahid, 2009).

Di Amerika Serikat terdapat beberapa jenis atau *strains* ayam unggulan seperti *Rhode Island Red*, *Cobb*, *Arbor Acres*, dan *Avian* yang sekarang ini diunggulkan dan banyak dternakkan secara komersial. Di Australia saat ini terdapat *strains* Australorp sebagai primadona hewan unggas untuk dternakkan secara komersial. Di Prancis mempunyai *strains* ayam unggulan yang dinamakan

Isa Veddete dan *Shaper*. Di Belanda dikenal strains ayam *Hybro* dan *Hubbart* sebagai strains ayam yang diunggulkan untuk ditenakkan secara komersial, dan masih banyak lagi yang lain (Wahid, 2009).

Perkembangan dan penyebaran ayam broiler komersial ke seluruh dunia amat disokong oleh diberlakukannya sistem pasar bebas di era globalisasi. Para ahli genetika secara terus-menerus dilakukan penelitian, persilangan, dan seleksi yang ketat sehingga pada akhirnya dihasilkan varietas ayam broiler unggulan yang khusus menghasilka salah satu produk komersial yaitu daging atau telur. Trend beternak ayam broiler komersial waktu-waktu selanjutnya dilakukan lebih khusus, misalnya beternak ayam broiler komersial penghasil daging atau telur saja, tidak kedua-duanya. Dengan begitu hasilnya dapat maksimal (Wahid, 2009).

Dewasa ini telah dihasilkan tidak kurang dari tiga ratus bibit ayam broiler murni dan varietas ayam terseleksi dari potensi genetiknya. Jenis atau varietas ayam broiler unggulan tersebut telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa potensi genetik pada ayam broiler unggulan yang telah ditingkatkan tersebut meliputi ukuran tubuh ayam broiler unggulan lebih besar, ayam memiliki proporsi daging karkas yang tinggi, ayam memiliki kerangka tulang yang lebih kuat, pertumbuhan badan ayam terhitung lebih cepat, ayam mempunyai warna kulit putih atau kuning yang bersih, lebih tahan terhadap penyakit, dan yang lebih penting sebagai ayam broiler komersial memiliki konversi pakan yang baik sehingga lebih mendatangkan keuntungan besar bagi setiap peternak (Wahid, 2009).

Perkembangan ayam broiler di Indonesia dapat dimulai abad ke-19. Pada saat itu benua Eropa dan benua Amerika sangat familiar dengan ayam Sumatra. Kondisi tersebut mendorong para pakar perunggasan kedua benua tersebut untuk melakukan penelitian terhadap ayam Sumatra. Pada abad ke-20 para pakar kedua benua itu menugaskan salah seorang pakar perunggasan yang terkenal pada waktu itu bernama J.F. Mohede mengadakan penelitian tentang ayam Sumatra. Beberapa jenis ayam (Wahid, 2009).

Sumatra memang terkenal di masa lalu karena berbagai kelebihanannya. Selain meneliti ayam Sumatra, pakar dari negara asing itu juga meneliti ayam Kedu. Bahkan tidak hanya J.F. Mohede yang mengadakan penelitian terhadap ayam Kedu, tetapi juga disertai ahli yang lain yakni J. Menkens. Penelitian kedua orang pakar perunggasan tersebut dilakukan pada tahun 1937. Saat itu ayam Kedu terkenal mempunyai kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan ayam yang lain, di antaranya tahan terhadap berbagai jenis penyakit, tingkat pertumbuhan tinggi, produksi telur tinggi, cita rasa daging yang enak, dan pemeliharaan yang mudah. Tidak heran jika ayam Kedu merupakan salah satu nenek moyang dari ayam ras yang terbentuk di Amerika dan Inggris seperti ayam *Sussex*, ayam *Cornish*, ayam *Orpington*, ayam *Australorp*, dan ayam *Dorking* (Wahid, 2009).

Perkembangan populasi ayam komersial di Indonesia tercatat dimulai pada pertengahan dasawarsa 1970-an. Perkembangan itu mencapai puncaknya pada awal 1980-an. Faktor-faktor yang menentukan perkembangan populasi ayam broiler komersial di berbagai daerah di Indonesia antara lain sejalan dengan

pertumbuhan populasi penduduk, pergeseran gaya hidup, tingkat pendapatan, perkembangan situasi ekonomi dan politik, serta kondisi keamanan suatu wilayah atau daerah di Indonesia. Daerah perkembangan ayam broiler saat itu belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Daerah pusat penyebaran ayam broiler di wilayah Indonesia. Daerah pusat penyebaran ayam broiler di wilayah Indonesia bagian Bbarat meliputi wilayah Pulau Jawa dan sebagian Sumatra (Wahid, 2009).

Hampir semua perusahaan pembibitan ayam broiler komersial dan pangsa pasar terbesarnya di dominasi di kedua wilayah itu. Berkaitan dengan pangsa pasar terbesar berada di pulau Jawa lebih disebabkan penduduk di Pulau Jawa merupakan terbanyak jumlahnya di Indonesia. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa produksi ayam briler terbesar berada di Pulau Jawa. Perkembangan pesat ayam broiler komersial di Indonesia terjadi di Pulau Jawa disebabkan konsumen ayam broiler paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Hal itu amat sesuai dengan karakteristik atau sifat dari ayam broiler itu sendiri yakni produksi ayam broiler sesungguhnya tidak menghendaki terlalu jauh dari konsumen (Wahid, 2009).

Ayam broiler merupakan produk peternakan yang pada umumnya mempunyai sifat mudah rusak. Ayam broiler hasil panen yang terlalu lama dalam perjalanan menuju ke tempat konsumen atau pengolahan bisa mati dijalan akibat kepanasan, kehausan, kelaparan, atau stress. Demikian pula bibit ayam atau Day Old Chick (D.O.C) yang dikirim menuju *farm* yang terlalu jauh juga riskan kematian. Sedangkan biaya transportasi menjadi pertimbangan penting dalam usaha peternakan ayam broiler komersial. Jarak antara konsumen dengan produsen yang terlalu jauh akan memperbesar biaya transportasi sehingga

mengurangi bahkan meniadakan keuntungan dalam usaha. Perkembangan populasi ayam broiler di wilayah lain, yaitu di Indonesia bagian tengah meliputi daerah di propinsi-propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur meliputi daerah-daerah di Pulau Sulawesi (Wahid, 2009).

Mengingat pentingnya ayam sebagai sumber protein hewani bagi manusia dan dapat diusahakan (dibesarkan) dalam waktu relatif singkat, maka hewan unggas ini menjadi tumpuan pilihan dan banyak ditenakkan secara komersial di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Cepatnya masa panen yang dicapai dari usaha pembesaran ayam broiler menjadikannya hewan unggas tersebut sebagai primadona para peternak ayam. Ayam ras broiler atau pedaging sempat menjadi idola karena pada umur 39–40 hari bisa mencapai bobot 1,8kg. Padahal bobot yang sama baru bisa dicapai ayam kampung biasa pada umur lebih dari 3 bulan. Bahkan kini ayam broiler modern bisa mencapai bobot yang sama pada umur 31–32 hari. Dengan kata lain, ayam broiler yang dipelihara saat ini lebih cepat besar dibandingkan ayam broiler zaman dulu atau ayam broiler klasik (Wahid, 2009).

Sejalan dengan hal itu mendorong peternak ayam broiler meningkatkan terus kapasitas usahanya sehingga akan dapat memenuhi permintaan pasar akan daging ayam broiler yang berkualitas baik. Sampai saat ini belum semua permintaan pasar akan daging ayam broiler dapat dipenuhi. Terbuka peluang yang cukup besar untuk mengusahakan atau beternak ayam broiler komersial. Usaha

peternakan ayam pedaging atau sering disebut dengan ayam broiler komersial merupakan usaha yang sangat menguntungkan (Wahid, 2009).

Usaha ternak ayam broiler komersial menjanjikan perputaran modal yang relatif cukup singkat dan cepat (35–40 hari). Dapat dibayangkan dalam waktu kurang dari satu setengah bulan ayam broiler modern telah dapat dipanen. Artinya dalam kurun waktu kurang dari satu setengah bulan peternak ayam broiler komersial telah dapat mengantongi keuntungan dari usaha peternakannya. Pemanenan ternak ayam komersial pada umur 30–35 hari sering disebut produksi ‘ayam kecil’. Ayam jenis ini biasanya dipelihara di area panas atau dekat dengan kota besar. Langkah ini ditempuh atau dipilih peternak untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan daging ayam broiler dengan waktu relatif singkat. Selain produksi ‘ayam kecil’, di pasaran beredar pula ‘ayam besar’ dengan kisaran berat antara 2–2,5kg. Ayam broiler yang demikian ini dipanen pada umur pemeliharaan dalam kandang sekitar 40 hari (Wahid, 2009).

Tingkat kecepatan produksi pada ayam broiler sangat ditentukan oleh faktor genetik yang terdapat pada diri ayam broiler tersebut. Faktor genetik tersebut dikondisikan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakar unggas secara terus-menerus dan berkesinambungan. Para ahli terus-menerus melakukan perbaikan genetik untuk menghasilkan bibit ayam broiler komersial yang semakin unggul. Setiap tahun, bisa dikatakan pencapaian pertumbuhan broiler secara genetik maju 1 hari. Sebagai gambarannya, dalam 50 tahun terakhir laju pertumbuhan broiler maju 50 hari untuk mencapai bobot badan yang sama. Sampai-sampai para ahli genetika membuat guyonan bahwa apabila sekarang

ayam umur 35 hari bisa mencapai bobot 1,7kg, maka dalam 35 tahun ke depan , ayam yang hari ini baru menetas – besok beratnya sudah mencapai 1,7kg. Tentu hal tersebut belum tentu benar, namun berkat jerih payah atau kerja keras mereka itulah pada saat ini diperoleh varietas ayam broiler unggul. Semua dapat terjadi tidak dapat dilepaskan dari peran kemajuan di bidang ilmu dan teknologi akhir-akhir ini. Sejatinya kemajuan di bidang peternakan ayam karena adanya dukungan perkembangan teknologi dunia (Wahid, 2009).

Dilihat dengan menggunakan kaca mata ekonomi beternak ayam terutama ayam broiler skala komersial nyata-nyata memberikan banyak keuntungan secara finansial dan bisa menjadi tambahan mencari nafkah. Selain itu, beternak ayam mengandung kearifan lokal di antaranya untuk memenuhi kebutuhan khalayak luas akan protein hewani, dapat menyerap tenaga lokal, mulai dari pembangunan kandang , pemeliharaan/pembesaran ternak, sampai tahap pemanenan hasil dan penanganan pasca panen, membangun kerjasama sinergis dengan petani yang menghasilkan sekam (padi) dan tanaman keras seperti kayu, bambu, dan lain-lain untuk pembuatan kandang ayam, kotoran ayam dapat digunakan sebagai pupuk kandang tanaman budidaya oleh petani, dan lain-lain (Wahid, 2009).

Secara kualitatif dapat dinyatakan bahwa hingga saat ini kebutuhan akan daging ayam broiler sebagai sumber bahan makanan yang kaya zat protein terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kenaikan taraf ekonomi masyarakat. Dengan demikian usaha di bidang ternak ayam broiler penghasil daging memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan dan akan menghasilkan keuntungan finansial bagi peternaknya (Wahid, 2009).

Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik, dan dapat dipotong pada usia yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 1992).

Ayam pedaging (broiler) adalah jenis unggas yang telah mengalami seleksi gen bertahun-tahun. Broiler yang dipelihara saat ini memiliki berbagai macam strain. Semua jenis strain yang telah dikembangkan memiliki daya produktivitas relatif sama. Artinya seandainya terdapat perbedaan, perbedaannya tidak menyolok atau sangat kecil sekali. Adapun jenis strain ayam pedaging (broiler) yang banyak beredar di pasaran adalah: *Super 77, Tegel 70, ISA, Kim cross, Lohman 202, Hyline, Vdett Yabro, Goto, Arbor arcres, Tatum, Indian river, Hybro, Cornish, Brahma, Langshans, Hypeco-Broiler, Ross, Marshall"m", Euribrid, A.A 70, H&N, Bromo* (Cahyono, 1995).

Ayam broiler merupakan ternak ayam yang pertumbuhan badannya sangat cepat dengan perolehan timbangan berat badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, yaitu pada umur 4-5 minggu berat badannya dapat mencapai 1, 2-1,9 kg. Lebih lanjut dinyatakan ayam broiler mempunyai sifat pertumbuhan bulu dan tubuh dengan cepat, umumnya berdada lebar, mempunyai timbunan daging yang baik, dagingnya lunak serta umumnya mempunyai warna kulit terang (Murtidjo, 1992).

Broiler secara umum memiliki ciri-ciri pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan irit, siap dipotong pada usia relatif muda, serta

menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Ayam broiler memiliki ciri khas yaitu pertumbuhan badannya cepat dan efisiensi tinggi untuk membentuk daging. Pada broiler dikenal dua fase pemeliharaan, yaitu:

1. Fase pemeliharaan awal (starter), yaitu anak broiler yang berumur 1 hari (DOC) sampai 3 atau 4 minggu.
2. Fase pemeliharaan akhir (finisher), yaitu pada masa ini broiler siap untuk dijual atau dipotong dengan umur lebih dari 4 minggu .

Diantara berbagai golongan ayam ras, ayam broiler adalah yang paling cepat diproduksi dan dagingnya dapat menduduki kelas yang paling tinggi mutunya, dengan penampilan yang seragam baik mutu maupun kurannya. Karena umurnya masih sangat muda maka tidak ada perbedaan mutu antara daging ayam broiler jantan dengan betina (Rasyaf, 2004)

Ayam merupakan sumber protein hewani yang baik, karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dan dalam perbandingan jumlah yang baik. Selain itu serat-serat dagingnya pendek dan lunak. Daging ayam menghasilkan jumlah kalori yang rendah apabila dibandingkan dengan nilai kalori dari daging sapi. Oleh karena itu daging ayam dapat dipakai sebagai bahan makanan yang baik untuk mengawasi penambahan berat badan, penyembuhan dari orang sakit dan untuk orang-orang tua yang tidak aktif bekerja lagi. Hidangan daging ayam digunakan sebagai sumber protein dalam diet, yang dimaksud untuk mengurangi jumlah kalori yang diterima dalam tubuh (Muchtadi dan Sugiyono, 1992).

E. Escherichia coli

Escherchia coli merupakan bakteri anaerob fakultatif yang merupakan anggota golongan *coliform*, *Escherchia coli* adalah penghuni umum dalam pencernaan manusia dan hewan, dianggap tidak patogen apabila didalam saluran pencernaan dan patogen apabila berada diluar saluran pencernaan (Jawetz *et al.*, 1982).

Adapun taksonomi dari *Escherichia coli* sebagai berikut:

Superdomain : Phylogenetica 11

Filum : Proterobacteria

Kelas : Gamma Proteobacteria

Ordo :Enterobacteriales

Family : Enterobacteriaceae

Genus : Escherichia

Species : *Escherichia coli*

Ada tiga macam struktur antigen yang penting dalam klasifikasi *Escherchia coli* yaitu, antigen O (*Somatik*), antigen K (*Kapsel*) dan antigen H (*Flagella*). Determinan antigen (tempat aktif suatu antigen) O terletak pada bagian liposakarida, bersifat tahan panas dan dalam pengelompokannya diberi nomor 1,2,3 dan seterusnya. Antigen K merupakan polisakarida atau protein, bersifat tidak tahan panas dan berinterferensi dengan aglutinasi O, sedangkan antigen H mengandung protein, terdapat pada flagella yang bersifat termolabil. Pada saat ini telah diketahui ada 173 grup serotype antigen O, 74 jenis antigen K dan 53 jenis antigen H. *Escherchia coli* dapat menghasilkan berbagai jenis toksin seperti endotoksin, enterotoksin dan neurotoksin (Barness dan Gross, 1997).

Sebagian besar strain *E.coli* tidak berbahaya, namun terdapat beberapa yang bersifat patogen. Strain *E.coli* merupakan flora normal saluran pencernaan, yang menguntungkan host dengan memproduksi vitamin K, atau mencegah pertumbuhan bakteri lain. Sedangkan bakteri *E.coli* patogen meliputi Enterotoxigenic *Escherichia coli* (ETEC), Enteropathogenic *Escherichia coli* (EPEC), Enterohemorrhagic *Escherichia coli* (EHEC), Verotoxigenic *Escherichia coli* (VTEC), Urophatogenic *Escherichia coli* (UPEC). Avian patogen *Escherichia coli* (APEC) menyebabkan *aerosacculitis*, *poliserositis*, *septicemia* dan penyakit terutama ekstraintestinal lainnya pada ayam, kalkun dan spesies unggas lainnya (Dho-Moulin dan Fairbrother, 1999).

Janben *et al.* (2001) mengelompokkan *Escherichia coli* patogenik sesuai dengan gejala klinis yang ditimbulkan antara lain: *Escherichia coli* penyebab diare, *Escherichia coli* penyebab septicemia dan *Avian Pathogenic Escherichia coli* (APEC). Galur APEC merupakan galur yang berhubungan dengan lesi-lesi karakteristik penyakit koliseptikemia pada ayam.

Bakteri *Escherichia coli* merupakan salah satu jenis bakteri yang tergolong dalam genus *Escherichia* dan familia *Enterobacteriaceae*. Bakteri tersebut umumnya bersifat gram negatif, berbentuk batang pendek gemuk, tidak tahan asam, tidak berspora, bersifat aerob atau fakultatif anaerob. Bakteri ini memiliki daya tahan berbulan-bulan dalam tanah dan di dalam air, peka terhadap *Streptomisin*, *Tetrasiklin*, *Kloramfenikol*, dan menghasilkan toksin berupa endotoksin dan eksotoksin. Sebagian besar *Escherichia coli* bersifat motil dengan alat pergerakan berupa flagel. Bakteri ini tumbuh dengan baik pada suhu 10-40 °C

dan pH optimum lingkungan antara 6,5 – 7,5. *Escherchia coli* merupakan mikroflora normal di intestinum, namun sebagian galur *Escherchia coli* dapat menyebabkan diare, karena hasil metabolismenya bersifat beracun dan *Escherchia coli* dapat langsung menyerang lapisan epitelium dinding usus (Gibson, 1999).

Bakteri *Escherichia coli* adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang dalam sel tunggal atau berpasangan dan merupakan anggota famili *Enterobacteriaceae* dan flora normal intestinal yang mempunyai kontribusi pada fungsi normal intestine dan nutrisi tetapi bakteri ini akan menjadi pathogen bila mencapai jaringan di luar jaringan intestinal. Bakteri *Escherchia coli* ini tergantung pada daerah infeksi dan tidak dapat dibedakan dari gejala yang disebabkan oleh bakteri lainnya (Jawetz dkk, 1995).

Escherichia coli diisolasi pertama kali pada tahun 1885 oleh Buchner dan secara lengkap diuraikan oleh Theobald Escherich pada tahun 1882. Meskipun kebanyakan diantaranya nonpatogen, beberapa diantaranya menyebabkan infeksi ekstra intestinal (Aiello dkk, 1998). *Escherichia coli* merupakan penghuni normal saluran pencernaan unggas. Adanya *Escherichia coli* dalam air minum merupakan indikasi adanya pencemaran oleh feses. Dalam saluran pencernaan ayam normal terdapat 10-15% bakteri *Escherichia coli* patogen dari keseluruhan *Escherichia coli*. Dalam individu yang sama, *Escherichia coli* dalam usus tidak selalu sama dengan yang diisolasi dari jaringan lain (Tabbu, 2000).

Bakteri *Escherichia coli* dapat ditemukan dalam litter, kotoran ayam, debu atau kotoran dalam kandang. Debu dalam kandang ayam dapat mengandung

10^5 sampai 10^6 *Escherichia coli* per gram, bakteri ini dapat bertahan lama dalam kandang, terutama dalam keadaan kering. *Escherichia coli* adalah bakteri Gram negatif, tidak tahan asam, tidak membentuk spora dan umumnya berukuran 2-3 x 0,6 μm . *Escherichia coli* dan sebagian besar bakteri enterik lainnya membentuk koloni bulat dan cembung. Beberapa strain *Escherichia coli* menyebabkan hemolisis dalam agar darah. *Escherichia coli* dalam menghemolisis dapat menjadi salah satu metode penentuan patogenitas *Escherichia coli* (Raji dkk, 2003).

Pada media *Eosin Methylene Blue* (EMB) koloni *Escherichia coli* tumbuh khas yaitu terlihat berwarna hijau metalik. *Escherichia coli* memproduksi asam dan gas dalam glukosa, maltosa, manitol, gliserol, *xylose*, *rhamnose*, sorbitol dan arabinosa, tetapi tidak dalam dekstrin dan inositol. Beberapa strain memfermentasikan laktosa dengan lambat atau tidak sama sekali, fermentasi adonitol, sukrosa, salisin, rafinosa dan dulsitol bervariasi. *Escherichia coli* positif pada tes *methyl red* dan negatif pada tes *Voges-proskauer*. Pada *Kligler's iron medium*, *Escherichia coli* tidak memproduksi H_2S (Barnes dan Gross, 1997).

Pengelompokkan *Escherichia coli* patogenik sesuai dengan gejala klinis yang ditimbulkan antara lain: *Escherichia coli* penyebab diare, *Escherichia coli* penyebab septicemia dan *Avian Pathogenic Escherichia coli* (APEC). Beberapa faktor virulensi yang terdapat pada *Escherichia coli* galur APEC diantaranya: *FimC* (*fimbriae* tipe 1), *iucD*, *protein tsh*, *hlyE* dan *stx2f* (Gibson, 1999).

Kebanyakan *Escherichia coli* hidup di lingkungan kandang unggas melalui kontaminasi feses. Permulaan kejadian patogen dari *Escherichia coli* mungkin terjadi di *hatchery* dari infeksi atau telur yang terkontaminasi, tetapi infeksi sistemik biasanya membutuhkan lingkungan predisposisi atau sebab-sebab infeksi (Aiello dan Mays, 1998). Akoso (1998), menambahkan infeksi kolibasilosis terjadi melalui kontak langsung dengan lingkungan tempat tinggal ayam yang basah dan kotor, dan bukan dari ayam ke ayam. Mc Mullin (2004), menyebutkan bahwa infeksi kolibasilosis biasanya terjadi baik melalui peroral atau inhalasi, lewat membran sel/yolk/tali pusat, air, muntahan, dengan masa inkubasi 3-5 hari.

Mycoplasmosis, infectious bronchitis, newcastle disease, hemoragi enteritis, dan *turkey bordetellosis* seringkali menyertai kolibasilosis. Kualitas udara yang buruk dan stres yang berasal dari lingkungan juga kemungkinan untuk predisposisi infeksi *Escherichia coli*. Faktor pendukung timbulnya kolibasilosis meliputi sanitasi yang kurang optimal, sumber air minum yang tercemar bakteri, sistem perkandangan dan peralatan kandang yang kurang memadai dan adanya berbagai penyakit yang bersifat immunosupresi (Aiello dan Mays, 1998).

Kemampuan *Escherichia coli* dalam menimbulkan tingkat keparahan yang tinggi tergantung dari faktor-faktor virulensi yang dimiliki *Escherichia coli* patogenik. Faktor virulensi inilah yang membedakan antara *Escherichia coli* patogenik dengan non patogenik. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui macam-macam faktor virulensi yang dimiliki oleh *Escherichia coli* patogenik. Beberapa faktor virulensi yang dimiliki *Escherichia coli* galur

APEC telah teridentifikasi dan diduga berhubungan dengan banyak kasus kolibasilosis antara lain: sistem aerobaktin dalam *uptake Fe*, polisakarida K1, protein Tsh dan produk "cytopathic effect" (Dewanti dan Wahyudi, 2011).

Ayam broiler juga rentan terhadap mikroorganisme, salah satunya yaitu bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*). Reservoir *E. coli* adalah saluran pencernaan hewan, termasuk unggas. Pada ayam terdapat sekitar 10⁹ colony forming units (cfu) bakteri per gram feses dan 10⁶ cfu merupakan bakteri *E. coli*. Bakteri *E. coli* juga sering diisolasi dari saluran pernapasan bagian atas dan juga didapatkan dari kulit unggas dan bulu. Salah satu bakteri penyebab diare adalah bakteri *E. coli*. *E. coli* merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek, tumbuh baik pada *MacConkey agar* (MCA) dengan koloni berbentuk bulat dan cembung, bersifat memfermentasikan laktosa. *Escherichia coli* memiliki panjang sekitar 2 µm, diameter 0,7 µm, lebar 0,4-0,7 µm, dan bersifat anaerob fakultatif. *Escherichia coli* membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata (Dewanti dan Wahyudi, 2011).

Infeksi *Escherichia coli* menyebabkan kematian embrio pada telur tetas, infeksi kuning telur, koliseptisemia, peradangan kantung udara, radang usus, infeksi saluran reproduksi, radang persendian dan bahkan menyebabkan kematian. Mortalitas dari penyakit ini adalah 10–15 %. Penularan kolibasilosis biasanya terjadi secara oral melalui pakan, air minum atau debu yang tercemar oleh *Escherichia coli*. Bakteri *Escherichia coli* juga mampu menyebar melalui peredaran darah sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ sehingga

mengganggu pertumbuhan dari ayam tersebut hal ini akan menyebabkan kerugian yang cukup besar untuk peternak broiler (Tabbu, 2000).

Berbagai usaha untuk mengatasi kolibasilosis telah banyak dilakukan khususnya dengan menggunakan antibiotik seperti gentamisin, kolistin, kloramfenikol, streptomisin, doksisisiklin, dan lain-lain. Pemberian antibiotika yang tidak tepat guna untuk mengatasi infeksi *Escherichia coli* dapat menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut. *Escherichia coli* adalah kuman oportunistik dan merupakan penghuni normal saluran pencernaan unggas. Sifatnya unik karena dapat menyebabkan infeksi primer pada usus, misalnya diare pada anak dan traveller's diarrhea, seperti juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain di luar usus (Barnes dan Gross, 1997).

Escherichia coli juga dapat mencapai aliran darah dan menyebabkan sepsis. *Escherichia coli* dapat melekat di sel manusia, menginvasi jaringan, berkoloni, dan melepaskan toksin. Masa inkubasi *Escherichia coli* berlangsung 1-3 hari. Infeksi terjadi jika lebih dari 10⁶ mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. *Escherichia coli* berbentuk batang pendek dengan diameter 0,5 µm dan panjang 1-3 µm. *Escherichia coli* dapat tumbuh pada suasana aerob maupun anaerob sehingga ia memperoleh energinya dari proses fermentasi maupun respirasi tergantung pada suasana lingkungan dimana bakteri tersebut berada, dengan suhu optimum 37 °C. *Escherichia coli* dibedakan antara galur satu dengan yang lain dengan cara serologi dari antigen somatik (O), flagellar (H), dan kapsular (K) (Akoso, 1998).

Antigen O merupakan polisakarida spesifik spesies, sebagai komponen pembuat kompleks polisakarida dari dinding sel serta berperan dalam produksi endotoksin. Antigen H merupakan antigen protein flagellar, penting dalam serotyping dan merupakan aspek penting dari patogenisitas. Antigen K merupakan komponen polisakarida yang ada pada enterobakter, berperan dalam patogenisitas bakteri dalam hal mekanisme pembentukan koloni bakteri. Antigen ini menghambat fagositosis dan efek dari serum antibodi. Karena adanya kapsul, antibodi tidak dapat menghancurkan *Escherichia coli* tersebut (Akoso, 1998).

Pada ayam broiler, infeksi dari bakteri *Escherichia coli* sangat berdampak buruk. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian selama periode pemeliharaan hingga perolehan bobot badan saat ayam panen tidak mencapai standart. Bakteri *Escherichia coli* ini lebih banyak ditemukan di usus, dan akan dikeluarkan dari tubuh dengan jumlah besar lewat kotoran ternak (feses). Bakteri ini dapat bertahan sampai beberapa minggu di dalam feses yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi *Escherichia coli* tidak tahan pada kondisi asam, kering dan akan mati dengan desinfektan (Akoso, 1998).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai 14 November 2016, yang bertempat di Laboratorium Kesehatan Hewan Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP), Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, tabung reaksi, erlenmeyer, inkubato, pemanas listrik, neraca analitik, pipet volume, mikropipet 1 ml, autoklaf, *waterbath*, gelas kimia, bunsen, aluminium foil, rak tabung, tissue, kapas, tabung reaksi, ose, parut, saringan, dan laminar air flow.

2. Bahan

Bahan uji yang digunakan adalah temulawak yang diparut untuk mendapatkan sari temulawak sebagai antibakteri. Bakteri yang diujikan adalah bakteri *Escherchia coli* yang diisolasi dari feses broiler. Bahan kimia yang digunakan diantaranya *Eosin Metilen Blue Agar* (EMBA), *Trypticase Soy Brith* (TSB), *oil mersy*, alkohol, dan *Aquadest*.

C. Rancangan Penelitian

Tabel 1. Desain kartu kontrol

Perlakuan (KP)	Ulangan (KU)		
	1	2	3
P1	P1.1	P1.2	P1.3
P2	P2.1	P2.2	P2.3
P3	P3.1	P3.2	P3.3
P4	P4.1	P4.2	P4.3
P5	P5.1	P5.2	P5.3

Sumber : desain kartu kontrol lima perlakuan dengan tiga pengulangan.

Keterangan :

KP : kelompok perlakuan

KU : kelompok ulangan

P1-P5 : untuk kelompok perlakuan

P1.1-P5.3 : untuk kelompok ulangan

D. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sterilisasi Alat dan Media

- a. Alat-alat gelas berupa tabung reaksi, cawan petri, gelas kimia, erlenmeyer, pipet tetes dan bahan yang digunakan disterilkan dengan sterilisasi panas


basah yaitu dengan menggunakan autoklaf. Sterilisasi ini dilakukan selama 15 menit dalam temperatur 121⁰C.

- b. Jarum ose disterilkan dengan sterilisasi panas kering dalam nyala api bunsen sampai merah membara.

2. *Pengambilan Sampel*


Sampel diperoleh dari isolasi dari feses broiler yang diperoleh dari peternakan UIN Alauddin Makassar.

3. *Sari Temulawak*



Gambar 1. Skema Pengambilan Sari Temulawak.

Keterangan : Dari 100 g temulawak didapatkan hasil ekstrak sebanyak 40 g atau 40%.



Gambar 2. Skema pengenceran sari temulawak menggunakan aquades.

4. Isolasi dan Identifikasi Bakteri *E. coli* dari Feses Broiler

- Mengencerkan sebanyak 14,85 gram feses broiler kedalam 14,85 mL aquades. Mengambil 1 mL feses broiler yang diencerkan pada tabung 1 dicampur hingga rata, kemudian dipindahkan sebanyak 1 ml kedalam tabung 2 dan diencerkan secara berseri sampai tabung ke-6 yaitu sampai 10^4 bakteri/ml.
- Mengambil 10 mL feses yang sudah diencerkan pada tabung 4 sampai 6 lalu dimasukkan ke dalam cawan petri.
- Menambahkan *Eosin Metilent Blue* ke dalam cawan petri sebagai media tumbuh bakteri *Escherchia coli* kemudian diamkan sampai *Eosin Metilent Blue* memadat.
- Inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37° C dalam inkubator untuk melihat pertumbuhan bakteri *Escherchia coli*.

5. *Pembuatan Media Tanam dan Tahap uji Kepekaan Bakteri E. coli*

- a. Menimbang nutrient agar menggunakan neraca analitik sebanyak 2,5 gram.
- b. Menambahkan 100 mL aquades ke dalam *erlenmeyer* yang berisi nutrient agar.
- c. Melarutkan natrium agar dengan cara pemanasan.
- d. Memasukkan ring kedalam cawan petri sebagai media sumuran.
- e. Natrium agar yang telah larut kemudian ditambahkan bakteri sebanyak 10 μ L ke dalam Erlenmeyer lalu homogenkan. Kultur bakteri yang digunakan diremajakan dalam media *Trypticase Soy Brith* (TSB) dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.
- f. Menuang natrium agar yang berisi bakteri kedalam cawan petri yang sudah berisi ring sebanyak 25 mL.
- g. Diamkan sampai memadat kemudian cabut ring menggunakan pinset.
- h. Memasukkan 500 μ L ekstrak sari temulawak yang sudah di encerkan kedalam sumuran.
- i. Menginkubasi selama 3 x 24 jam menggunakan incubator dengan suhu 37 °C dan amati perubahan yang terjadi.
- j. Mengukur zona bening yang terjadi pada sekitar sumuran menggunakan jangka sorong.
- k. Mengulanginya sampai ulangan ke-3

E. Parameter yang Diukur

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah semakin lebar zona bening suatu bahan pada media dengan jumlah penggunaan antibakteri yang semakin kecil. Mengukur Zona bening dari antibakteri sari temulawak yaitu

menggunakan jangka sorong dengan perlakuan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

P1 = 1 mL sari temulawak + 10 mL air / Aquades

P2 = 2 mL sari temulawak + 10 mL air / Aquades

P3 = 3 mL sari temulawak + 10 mL air / Aquades

P4 = 4 mL sari temulawak + 10 mL air / Aquades

P5 = 5 mL sari temulawak + 10 mL air / Aquades

Perbandingan ini diambil dari ukuran yang sederhana jika nanti diaplikasikan di lahan peternakan dimana dalam 10 liter air ditambahkan 1 liter sari temulawak murni.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL) dengan model tersarang dengan 5 perlakuan yaitu masing-masing perlakuan diberi lubang sumuran dalam cawan petri. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan uji lanjut Duncan's apabila terdapat perbedaan nyata, dengan rumus matematika sebagai berikut (Hanafiah, 2004) :

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

Keterangan :

Y_{ij} = Hasil pengamatan

μ = Rata-rata pengamatan

τ_i = Pengaruh perlakuan i

ε_{ij} = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

dimana :

$i = 1, 2, \text{ dan } 3$

$j = 1, 2, \text{ dan } 3$

Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan dari data yang dianalisis maka diuji lanjut dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5% (Gomez dan Gomez, 1995).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian selama tiga minggu yang mencakup rata-rata zona hambat pertumbuhan bakteri *Escherchia coli* yang diisolasi dari feses broiler dengan penambahan sari temulawak disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-Rata Diameter Zona Hambat Sari Temulawak terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherchia coli* yang Diisolasi dari Feses Broiler

Pengamatan (hari)	Zona hambat (mm)				
	P1	P2	P3	P4	P5
Hari 1	0±0	0±0	0±0	0±0	0±0
Hari 2	1,76 ^a ±0,30	1,83 ^b ±0,27	1,89 ^b ±0,06	2,15 ^b ±0,10	2,41 ^c ±0,42
Hari 3	1,87 ^a ±0,17	2,33 ^b ±0,12	2,3 ^b ±0,34	2,26 ^b ±0,13	2,78 ^c ±0,38
Total	3,63	4,16	4,19	4,41	5,19
Rata-rata	1,21 ^a ±0,16	1,39 ^b ±0,31	1,40 ^b ±0,17	1,47 ^b ±0,14	1,73 ^c ±0,55

Keterangan : Superskrip yang Berbeda pada Baris yang sama Menunjukkan adanya Perbedaan yang Nyata ($P < 0.05$).

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa rata-rata zona hambat bakteri sari temulawak terhadap pertumbuhan bakteri *Escherchia coli* berpengaruh nyata ($P < 0,05$). Rata-rata yaitu P1(1,21), P2(1,39), P3(1,40), P4(1,47) dan P5(1,73). Adanya perbedaan nilai akhir yang signifikan menunjukkan ada perbedaan nyata ($P < 0.05$) antara perlakuan di hari pertama sampai perlakuan dihari ke tiga

kemudian dilakukan uji lanjut yaitu uji Duncan's guna mengetahui perlakuan yang memiliki perbedaan nyata dari beberapa perlakuan yang dilakukan.


Hasil uji Duncan's menunjukkan pada perlakuan P1, P2, P3, P4 dan P5 tidak ada perbedaan sama sekali karena tidak ada nilai ukur pada hari pertama. Pada hari ke dua perlakuan P1 berbeda nyata dengan P2 dan P5 sedangkan P2 tidak berbeda nyata dengan P3 dan P4. Hari ke tiga menunjukkan perlakuan P1 berbeda nyata dengan P2 dan P5 sedangkan P2 tidak berbeda nyata dengan P3 dan P4.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama tiga minggu di Laboratorium Kesehatan Hewan Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian menunjukkan bahwa ekstrak herbal dalam berbagai level menunjukkan ada perbedaan nyata ($P < 0,05$) terhadap diameter zona hambat bakteri *Escherichia coli* selama tiga hari. Hasil penelitian zona hambat sari temulawak terhadap bakteri *Escherichia coli* menunjukkan bahwa besarnya konsentrasi pada level dan lamanya perlakuan mempengaruhi diameter hambatan pada media.

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan's diketahui bahwa diameter zona hambat ekstrak herbal tertinggi ditunjukkan pada perlakuan P5 (2,78 mm) dan terendah P1 (0 mm). Menurut Kusmayati dan Agustini (2007) uji diameter zona hambat dilakukan dengan metode difusi sumuran yaitu membuat lubang pada media *Nutrient Agar* yang sudah padat dan diinokulasi dengan bakteri *Escherichia coli*. Kemudian lubang diinjeksikan dengan ekstrak herbal dengan berbagai level yang

diuji. Setelah dilakukan inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan di sekeliling lubang.



Gambar 3. Diagram Batang Nilai Rata-Rata Zona Hambat

Gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan pada hari pertama rata-rata zona hambat bakteri adalah 0 mm karena pada hari pertama tidak ada zona bening yang dapat diukur. Hari ke dua rata-rata zona hambat bakteri yaitu P1(1,76), P3(1,89), P4(2,15) dan P5(2,41). Hari ke tiga rata-rata zona hambat bakteri yaitu P1(1,87), P2(2,33), P3(2,3), P4(2,26) dan P5(2,78). Dari keterangan tersebut di atas dapat dilihat bahwa aktivitas anti mikroba yang paling tinggi terdapat dihari ketiga pada P5 yaitu (2,78) dan aktivitas anti mikroba yang paling rendah terdapat dihari pertama pada P1-P5, yaitu (0).

Pada Tabel. 2 rata-rata zona hambat bakteri pada perlakuan P1(1,21), P2(1,39), P3(1,40), P4(1,47) dan P5(1,73), sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan level penambahan sari temulawak yang diberikan memberikan efek yang tidak sama terhadap zona hambat bakteri di setiap levelnya. Diameter zona

hambat terlihat dari zona bening di sekitar lubang. Jika semakin luas zona bening maka semakin besar suatu bahan dalam menghambat pertumbuhan bakteri.

Menurut Davis and Stout (1971), diameter zona bening antara 0–5 mm mempunyai daya hambat hal ini dikarenakan temulawak memiliki senyawa aktif kurkumin yang mempunyai aktivitas antibakteri berspektrum luas yaitu antibakteri yang aktif terhadap berbagai jenis bakteri Gram positif dan gram negatif, antivirus, dan penginduksi apoptosis sel (antitumor). Hal ini menunjukkan bahwa temulawak memiliki potensi yang tinggi sebagai pengganti antibiotik.

Respon daya hambat pertumbuhan mikroba yang dihasilkan dipengaruhi oleh kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam rimpang *Curcuma* seperti minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, tanin, kurkuminoid dan terpenoid. Senyawa flavonoid mampu merusak dinding sel sehingga menyebabkan kematian sel. Flavonoid juga dapat menghambat pembentukan protein sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Selain flavonoid kandungan senyawa lain seperti senyawa tanin juga dapat merusak membran sel. Senyawa tanin dapat merusak pembentukan konidia jamur. Kandungan senyawa lain seperti alkaloid dalam rimpang *Curcuma* mampu mendenaturasi protein.

Cikrici *et al.*, (2008) menambahkan bahwa aktivitas antibakteri kurkumin dapat menghambat pertumbuhan *Escherichia coli* penyebab penyakit diare akut. Proses penghambatan kurkumin terhadap aktivitas bakteri *Escherichia coli* dengan cara menghambat aktivitas enzim siklooksigenase-2 (cox-2) yang mengubah asam arakhidonat menjadi prostaglandin yang menyebabkan timbulnya rasa sakit. Kurkumin merupakan senyawa fenolik yang juga dapat menghambat pertumbuhan

bakteri dengan cara mendenaturasi dan merusak membran sel sehingga proses metabolisme sel akan terganggu.

Menurut Bisping dan Amtsberg (1988) perbedaan ketebalan dinding sel bakteri non patogen dan patogen berpengaruh terhadap reaksi yang disebabkan oleh senyawa fenolik. Dinding sel bakteri non patogen akan mengalami dehidrasi sehingga pori-pori akan mengecil. Hal ini menyebabkan daya rembes dinding sel dan fungsi membran menurun, sedangkan pada bakteri patogen lipid akan terekstrasi dari dinding sel sehingga pori-pori mengembang. Hal ini menyebabkan daya rembes sel dan fungsi membran meningkat oleh penyerapan yang tidak terkontrol sehingga merusak komponen dinding selnya.

Menurut Soeparno (1998) gangguan pembentukan dinding sel disebabkan oleh akumulasi komponen lipofilat pada dinding atau membran sel sehingga menyebabkan perubahan komposisi dinding sel. Akumulasi tersebut terjadi karena senyawa antimikroba dipengaruhi oleh bentuk tak terdisosiasi. Pada konsentrasi rendah molekul-molekul fenol yang terdapat pada minyak *thyme* kebanyakan berbentuk tak terdisosiasi, lebih hidrofobik, dapat mengikat daerah hidrofobik membran protein dan dapat melarut baik pada fase lipid dari membran bakteri. Reaksi dengan membran sel terjadi karena komponen bioaktif dapat mengganggu dan mempengaruhi integrasi membran sitoplasma yang mengakibatkan kebocoran intraseluler sehingga menyebabkan lisis sel, denaturasi protein dan menghambat ikatan ATP ase pada membran sel. Selain itu, cara yang digunakan adalah dengan menginaktivasi enzim. Mekanisme tersebut menunjukkan kerja enzim akan mengganggu dalam mempertahankan kelangsungan aktivitas mikroba sehingga

mengakibatkan enzim akan memerlukan energi dalam jumlah besar untuk mempertahankan kelangsungan aktivitasnya. Akibatnya energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan menjadi berkurang dan aktivitas mikroba menjadi terhambat. Pertumbuhan bakteri akan terhenti jika kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus.

Khunaifi (2010) menyatakan bahwa didalam sel terdapat enzim dan protein yang membantu kelangsungan proses-proses metabolisme. Beberapa zat kimia telah diketahui dapat mengganggu reaksi biokimia seperti logam-logam berat, golongan tembaga, perak dan air raksa. Senyawa logam berat lainnya umumnya efektif sebagai bahan antimikroba pada konsentrasi yang relatif rendah. Logam-logam tersebut akan mengikat gugus enzim sulfhidril yang berakibat terhadap perubahan protein yang terbentuk. Penghambatan ini dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme sel.

Berdasarkan analisis rmtu rimpang temulawak secara kuantitatif diperoleh kadar air 13,98% kadar minyak atsiri 3,81% kadar pati 41,45% kadar serat 12,62% kadar abu 4,62% kadar abu tak larut asam 0,56% sari air 10,96% sari alkohol 9,48% dan kadar kurkumin 2,29%. Sedangkan berdasarkan Analisis secara kualitatif dengan pengujian skrining fitokimia diperoleh bahwa didalam rimpang temulawak terdapat alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid dan glikosida. Dari hasil pengujian skrining fitokimia terlihat dalam rimpang temulawak kandungan alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid dan glikosida lebih dominan dibanding tannin, saponin dan steroid. Alkaloid sering kali beracun bagi manusia dan banyak digunakan dalam bidang pengobatan.

Rimpang tanaman ini mengandung zat warna kuning 1-2% terdiri dari *Curcumin* dan *Monodesmetoksi curcumin*. Kandungan minyak atsirinya sekitar 5% dengan komponen utama *1-sikloisopren mycren*, *b-curcumen*, *zanthorrhizo*, *germacron*, *falandren*, *sabinen*, *sineol*, *bornel*, *zingiberin*, *turmeron*, *atlanton*, dan *artumeron*. Minyak esensial dari temulawak atau lebih dikenal dengan minyak atsiri dapat diperoleh setelah penyulingan dan fraksinasi dengan suhu tinggi.

Berdasarkan komposisi tersebut pati temulawak dapat digunakan untuk bahan makanan. Pati temulawak mudah dicerna sehingga cocok digunakan sebagai makanan bayi atau makanan orang baru sembuh dari sakit dan sebagai bahan campuran makanan atau sumber karbohidrat. Pati temulawak dapat juga digunakan sebagai pencampur pati lain, misalnya sebagai campuran sereal untuk mengurangi sifat basi pada roti atau sebagai pengental pada sirup.

Temulawak adalah salah satu ekstrak herbal yang merupakan nutrisi yang diberikan kepada ternak yang berasal dari bahan – bahan alami dan berfungsi meningkatkan penampilan produksi dan kesehatan ternak. Temulawak merupakan tumbuhan tahunan yang tumbuh tegak dengan tinggi hingga lebih dari 1 m tetapi kurang dari 2 m, berwarna hijau atau coklat gelap. Akar rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berwarna hijau gelap. Tiap batang mempunyai daun 2-9 helai dengan bentuk daun bundar memanjang sampai bangun lanset, warna daun hijau atau coklat keunguan terang sampai gelap, panjang daun 31-84 cm dan lebar 10-18 cm, panjang tangkai daun termasuk helaian 43-80 cm. Daun termasuk tipe daun sempurna, artinya tersusun dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Perbungaan lateral, tangkai ramping dan sisik berbentuk garis,

panjang tangkai 9-23 cm dan lebar 4-6 cm, berdaun pelindung banyak yang panjangnya melebihi atau sebanding dengan mahkota bunga. Kelopak bunga berwarna putih berbulu, panjang 8-13 mm, mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang keseluruhan 4.5 cm, helaian bunga berbentuk bundar memanjang berwarna putih dengan ujung berwarna merah dadu atau merah, panjang 1.25-2 cm dan lebar 1 cm (Sidik dkk, 1997).

Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS Thaha/20:53 yang menjelaskan betapa besarnya karunia/nikmat yang Allah berikan pada manusia diantaranya menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia yg dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana jalan yang mudah ditempuh manusia, menurunkan dari langit air yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang macam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Salah satu tumbuhan yang memiliki manfaat bagi manusia dan binatang-binatang peliharaannya adalah temulawak yang bisa dimanfaatkan sebagai obat, makanan maupun minuman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji anti mikroba sari temulawak terhadap pertumbuhan bakteri *Escherchia coli* yang diisolasi dari feses broiler dapat disimpulkan bahwa Analisis ragam menunjukkan bahwa antibakteri sari temulawak pada berbagai level yaitu berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap zona hambat bakteri *Escherchia coli*. Aktivitas anti mikroba yang paling tinggi terdapat dihari ketiga pada P5 yaitu (1,73 mm) dan aktivitas anti mikroba yang paling rendah terdapat dihari pertama pada P1-P5 yaitu (0 mm). Diamater zona hambat terlihat dari zona bening di sekitar lubang. Jika semakin luas zona bening maka semakin besar konsentrasi suatu bahan dalam menghambat pertumbuhan bakteri.

B. Saran

Dengan melihat kesimpulan di atas maka penggunaan sari temulawak memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Escherchia coli* yang termasuk sebagai bakteri Gram negative yang bersifat patogen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman Al-Ansari. 2011. *Tasir Al-Quran Al Adzim*. Tafzir Ibnu Kafsir, Tahqiq:Dr. Abdullah Bin uhammad Bin Abdulrahman Bin Ishaq Ali Syaikh.
- Agusta, A. 2000 . *Minyak Atsiri Tumbuhan Tropika Indonesia*. Bandung:Penerbit ITB
- Ahmad Elfawati. 2008. *Performans Ayam Broiler yang Diberi Sari Buah Mengkudu (Morind Citrifolia)*. Jakarta:Jurnal Peternakan Vol 5 No.1. Halaman 10 – 13.
- Aiello S.E, dan Mays A. 1998. *The Merck Veterinary Manual*, New Jersey : White House Station.
- Akoso, B. T. 1998. *Kesehatan Unggas*. Yogyakarta:Kanisius.
- Anand., dan Sanjay. 2008. *Essentials of Corporate Governance*. United States of America: Wiley Publisher.
- Aydin, R., M. Karaman, T. Cicek dan H. Yardibi. 2008. Black Cumin (Nigella Sative L.) Supplementation Into the Diet of the Laying Hen Positively Influences Egg Yield Parameters, Shell Quality, And Decreases Egg Cholesterol. *Poult. Sci*.
- Barnes. HJ., Dan Gross WB. 1997.*Colibacillosis in Disease Of Poultry.Tenth Edition*,Lawa State University Press, Ames.USA.
- Bisping W, Amtsberg G.A. 1988. *Color Atlas for The Diagnosis of Nacterial Pathogen in Animals*. Berlin. Paul Parey Scientific Publisher. Germany.
- Budiono Wahid. 2009. *Sejarah Keberadaan Ayam Broiler*. Blogternakayam.blogspot.com
- Cahyono, B. 1995. *Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Ras Pedaging (Broiler)*. Yogyakarta:Pustaka Nusatama.
- Chattopadhyay, Ansuman, Santosh Podder, Soumik Agarwal, Shelley Bhattacharya. 2004. Turmeric and Curcumin: Biological Actions and Medical Applications. *Current Science*.

- Cikrici S, Mozioglu E, and Yilmaz H. 2008. Biological Acktivity Of Curcuminoids from *Curcuma longa*. *JNat Prod*.
- Commandeur, J.N. and N.P. Vermeulen, 1996. *Cytotoxicity and cytoprotective activities of natural compounds*. The case of curcumin. *Xenobiotica*.
- David, W.W and Stout, T.R. 1971. *Disc Plate Methods of Microbiological Antibiotic Assay*. Microbiology.
- Dewanti, S. M.T. Wahyudi. 2011. Antibacteri Activity of Bay Leaf Infuse (*Folia Syzygium Polyanthum* Wight) to *Escherichia coli* in-vitro. *J. Med. Planta*.
- Dho-Moulin, M., dan Fairbrother, J.M. 1999. Avian Pathogenic *Escherichia coli* (APEC). *Vet. Res*.
- Gibson GR, 1999. Prebiotic, probiotic and symbiotic : approaches for modulation the microbial ecologi of the gut. *Am J clin Nutr*.
- Gomez, K.A. dan Gomez A.A. 1995. *Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian*. Edisi Kedua. Jakarta:UI
- Halliwel B, R. Aeschbach, J. Lolinger, Auroma OI. 1995. Toxicology. *J Food Chem*
- Hanafiah, Ali, Kemas. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Janben, T., Schawez, C., Preickschat, P., Voss, M., Philip, H. C., dan Weiler L. H. 2001. Virulence- Associated Genes in Avian Pathogenic *Escherichia coli* (APEC) Isolated from Internal Organ Poultry having Died from Colibacillosis, *Int.J.Med Microbiology*,
- Jawetz1, Melnick, dan Adelberg. 2005. *Medical Microbiology*. Salemba Medika. Jakarta.
- Jawetz1, Melnick, dan Adelberg. 2008. *Medical Microbiology*. Salemba Medika. Jakarta.
- Kartasapoetra, G. 2001. *Budidaya Tanamana Obat*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kementerian Agama, RI., 2012, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur:CV Darus Sunnah.

- Koensoemardiyah. 2010. *Aromaterapi untuk Kesehatan, Kebugaran dan Kecantikan*. Yogyakarta: Lily Publisher.
- Khunaifi, M. 2010. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus dan Pseudomonas Aeruginosa*. Skripsi Sarjana pada Jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : Tidak diterbitkan.
- Kusmayanti, Agustini, N.W.R. 2007. Uji Aktivitas Senyawa Antibakteri dari Mikroalga (Parphyridium Cruentum). *J.Biod*.
- Lutony, T.L. 2000 . *Produksi dan Perdagangan Minyak Asiri*. Jakarta:Penebar Swadaya.
- Majeed , M., V. Badmaev, U. Shirakumar, and R. Rajerdran. 1995. *Curcuminoids antioxidant phytonutrients 3-80*. New Jersey:nutriScience publisher inc., Pis Cataway,
- Mcmullin, P. 2004. *A Pocket Guide to Poultry Health and Disease*. 5M Enterprises Limited. Shef field.
- Meiyanto, E. 1999. *Kurkumin Sebagai Obat Kanker: Menelusuri Mekanisme Aksi*. Majalah Farmasi Indonesia .
- Muchtadi, T. R., dan Sugiyono. 1992. *Petunjuk Laboratorium Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*. Bogor:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan tinggi Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. IPB.
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Sahih Al-Bukhari*, (dari Tauqi Annajah), Cetakan pertama tahun 1422 H. Juz 7 hal. 122
- Murtidjo, B.A., 1992. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Yogyakarta:Kanisius.
- Pandey, R.R., Dubey, R.C. & Saini, S., 2010, Phytochemical and Antimicrobial Studies on essential Oils of Some Aromatic Plants, *African Journal of Biotechnology*.
- Pokorny, J., Yanishlieva N. dan Gordon,M. (2001). Antioxidant in food. cRc. Washington DC:Press. Boca Raton Boston New York.

- Punnomowati, S Dan Yoganingrum, A., 1997 . *Tinjauan Literatur Temulawak . Jakarta:Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah .Lembaga Pengetahuan Indonesia.*
- Quraish M. Shihab. 2009. *Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.* Lentera Hati. Ciputat. Cetakan I, Muharram 1430. Hal 604-606.
- Quraish M. Shihab. 2009. *Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.* Lentera Hati. Ciputat. Cetakan I, Muharram 1430. Hal 543-544.
- Quraish M. Shihab. 2009. *Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.* Lentera Hati. Ciputat. Cetakan I, Muharram 1430. Hal 371.
- Quraish M. Shihab. 2009. *Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.* Lentera Hati. Ciputat. Cetakan I, Muharram 1430. Hal 78-79.
- Rahmat Rukmana, Ir. 195. *Temulawak Tanaman Rempah dan Obat.* Yogyakarta. Kanisius.
- Raji, M. A, Dkk. 2003. *In Vitro And In Vivo Pathogenicity Studied Of Escherchia coli Isolated From Poultry.* Nigeria.
- Rasyaf, M. 2004. *Beternak Ayam Pedaging.* Jakarta:Penebar Swadaya.
- Robinson, T. P., Ehlers, T., Hubbard IV, R. B., Bai, Xianhe, Arbiser, J.L., daCurcumin, Bioorg. *Med . Chem. Lett.*
- Sidik, M.W. Mulyono, dan Muhtadi A. 1992. *Temulawak, Cucurma xan-thorrhiza (Roxb).* Jakarta::Yayasan Pengembangan Obat Bahan Alam Phytomedica.
- Sidik, M.W. Mulyono, dan Muhtadi A. 1997. *Temulawak, Cucurma xan-thorrhiza (Roxb).* Jakarta:Yayasan Pengem-bangan Obat Alam.
- Soeparno. 1998. *Ilmu dan Teknologi Daging.* Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Tabbu, C.R. 2000. *Penyakit Ayam dan Penanggulangannya.* Yogyakarta:Kanisius.

L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN DATA

hari 1	P1	P2	P3	P4	P5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

hari 2	P1	P2	P3	P4	P5
1	1.43	1.52	1.84	2.04	2.12
2	1.8	1.93	1.88	2.19	2.2
3	2.04	2.05	1.96	2.23	2.9
	5.27	5.5	5.68	6.46	7.22
	1.76	1.83	1.89	2.15	2.41

hari 3	P1	P2	P3	P4	P5
1	1.71	2.18	1.96	2.14	2.35
2	1.84	2.39	2.65	2.23	2.92
3	2.05	2.41	2.29	2.41	3.08
	5.6	6.98	6.9	6.78	8.35
	1.87	2.33	2.30	2.26	2.78

Rata-rata

	p1	p2	p3	p4	p5
hari 1	0	0	0	0	0
hari 2	1.76	1.83	1.89	2.15	2.41
hari 3	1.87	2.33	2.3	2.26	2.78
	3.63	4.16	4.19	4.41	5.19
	1.21	1.3866667	1.3966667	1.47	1.73

21.58

Descriptives

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
						hari			
_1	1	3	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
	2	3	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
	3	3	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
	4	3	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
	5	3	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
	Total	15	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
hari									
_2	1	3	1.7567	.30730	.17742	.9933	2.5200	1.43	2.04
	2	3	1.8333	.27791	.16045	1.1430	2.5237	1.52	2.05
	3	3	1.8933	.06110	.03528	1.7416	2.0451	1.84	1.96
	4	3	2.1533	.10017	.05783	1.9045	2.4022	2.04	2.23
	5	3	2.4067	.42911	.24775	1.3407	3.4726	2.12	2.90
	Total	15	2.0087	.33804	.08728	1.8215	2.1959	1.43	2.90
hari									
_3	1	3	1.8667	.17156	.09905	1.4405	2.2928	1.71	2.05
	2	3	2.3267	.12741	.07356	2.0102	2.6432	2.18	2.41
	3	3	2.3000	.34511	.19925	1.4427	3.1573	1.96	2.65
	4	3	2.2600	.13748	.07937	1.9185	2.6015	2.14	2.41
	5	3	2.7833	.38371	.22154	1.8301	3.7365	2.35	3.08
	Total	15	2.3073	.37149	.09592	2.1016	2.5131	1.71	3.08

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
hari_1	.	4	.	.
hari_2	3.395	4	10	.053
hari_3	1.584	4	10	.253

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
hari_1	Between Groups	.000	4	.000	.	.
	Within Groups	.000	10	.000		
	Total	.000	14			
hari_2	Between Groups	.861	4	.215	2.911	.078
	Within Groups	.739	10	.074		
	Total	1.600	14			
hari_3	Between Groups	1.270	4	.318	4.799	.020
	Within Groups	.662	10	.066		
	Total	1.932	14			

Robust Tests of Equality of Means^b

		Statistic ^a	df1	df2	Sig.
hari_1	Welch
hari_2	Welch	3.460	4	4.543	.113
hari_3	Welch	3.840	4	4.858	.089

a. Asymptotically F distributed.

Robust Tests of Equality of Means^b

		Statistic ^a	df1	df2	Sig.
hari_1	Welch
hari_2	Welch	3.460	4	4.543	.113
hari_3	Welch	3.840	4	4.858	.089

b. Robust tests of equality of means cannot be performed for hari_1 because at least one group has 0 variance.



hari_3

Duncan

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
1	3	1.8667	
4	3	2.2600	
3	3	2.3000	2.3000
2	3	2.3267	2.3267
5	3		2.7833
Sig.		.068	.052

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

hari_2

Duncan

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
1	3	1.7567	
2	3	1.8333	
3	3	1.8933	1.8933
4	3	2.1533	2.1533
5	3		2.4067
Sig.		.127	.051

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

LAMPIRAN FOTO-FOTO ALAT DAN KEGIATAN PENELITIAN

1. Alat-alat yang digunakan

a. Autoklaf



b. LFC



c. Inkubator



d. Kulkas



e. Timbangan digital



f. Hot plate digital



g. Mikroskop



h. Mikropipet



i.



j. ring



2. Bahan yang digunakan

a. Nutrient agar (NA)



b. Alkohol



c. Kristal violet



d. lugol



e. Safranin



f. Oil mersi



g. Aquadest



h. Eosin Metilen Blue Agar





c. isolasi dan identifikasi bakteri Escherchia coli dari feses broiler\

Penggoresan bakteri pada media EMBA





d. media tanam dan tahap uji kepekaan bakteri *Escherchia coli*






e. pengenceran antibakteri sari temulawak







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Astri Wahyuni. Lahir di Bulukumba pada tanggal 07 Juli 1994. Penulis akrab disapa “Astri”, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Abdul Samad dan Halwiah. Penulis memulai pendidikan awal pada tahun 1999 di TK. Raudlatul Athfal Bonto Sunggu Kab. Bulukumba sampai tahun 2000 kemudian melanjutkan ke SD No. 35 Bonto Sunggu Kab. Bulukumba tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 6 Bukit Tinggi dan tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 7 Bulukumba tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi.