

**HUBUNGAN KONSELING TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN IBU  
PADA TERAPI DIARE BALITA DI PUSKESMAS PAMPANG  
KOTA MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi (S.Farm)  
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
Andi Try Resti Fauziah Sahib  
NIM. 70100113073  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Try Resti Fauziah Sahib  
NIM : 70100113073  
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 28 Maret 1995  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : Jl. Poros Malino, Perumahan Bumi Batara Mawang Blok  
AA7 No.2  
Judul : Hubungan Konseling Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu  
Pada Terapi Diare Balita di Puskesmas Pampang Kota  
Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 21 Agustus 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

**Andi Try Resti Fauziah Sahib**

NIM. 70100113073

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Konseling Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu pada Terapi Diare Balita Di Puskesmas Pampang Kota Makassar**” yang disusun oleh **Andi Try Resti Fauziah Sahib, NIM: 70100113073**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 21 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **28 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 21 Agustus 2017 M  
28 Dzulqa’idah 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Khaerani, S. Farm., M.Farm.Klin., Apt.	(.....)
Penguji I	: Alifia Putri Febriyanti, S.Farm.,M.Farm.Klin.Apt.	(.....)
Penguji II	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	(.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc  
NIP. 198312100

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Hubungan Konseling Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Pada Terapi Diare Balita Di Puskesmas Pampang Kota Makassar ” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda H. Muhammad Sahib S.Pd., S.H., M.H dan ibunda Hj. Andi Rahmah, S.Pd.I., M.M serta kedua saudara terkasih Andi Tri Rezki Amaliah sahib, SKM dan Andi Tri Anugerah Sahib dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudaraku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M. Kes., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M. Kes., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
4. Ibu Haeria, S. Si., M. Si., selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
5. Ibu Surya Ningsi, S. Si., M. Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis
6. Ibu Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin, Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis. Terimakasih atas segala semangat dan do'anya kepada penulis.
7. Ibu Alifia Putri Febriyanti., S. Farm. M. Farm. Klin. Apt., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
8. Bapak Dr. Dudung Abdullah, M.Ag, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,

10. Kepada kakanda Reski Wahyu, S.Farm., Apt. yang telah banyak membantu dalam proses penelitian dan memberikan arahan serta bimbingannya
11. Seluruh Pegawai Puskesmas Pampang Kota Makasar terima kasih atas arahan dan bantuannya selama proses penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
12. Kepada kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin Makassar serta pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat PSL Putri, Uswa, Rina, Nita, Ayu, Andira, Nunung, Amirah, kk Icchank, Nurdia, Imma yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya untuk penulis, terimakasih atas kasih sayang kalian.
14. Kepada saudariku pondok faris squad Saly, Tria Nur Rahmah, St.Mukarramah, Fiyula El Syarah, kk Canna, kk Tari, Icha, Nini, Tatun dan semuanya yang selalu mendukung selama proses penelitian dan skripsi. Terimakasih atas bantuannya, semangat dan do'a kalian semoga dibalas oleh Allah swt.
15. Kepada adikku Ayudiarahma faadilah alatas Sadikin yang senantiasa mendukung, memberikan semangat dan do'a kepada penulis. Terimakasih atas segala ketulusannya selama ini semoga segala langkah senantiasa diberkahi oleh Allah swt.
16. Kepada akhwatiFillahku Nikmawati, Wahyu Lyana Ningsih, Zakiah Anugerah Hamzah, Nur Azizah, Kiki Rezki Syukron jazaakumullaahu khairon atas semangat dan do'anya serta bantuannya selama proses skripsi ini Serta
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (Far13ion) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, do'a, dan rasa nyaman, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, *Uhibbukifillah*.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Gowa, 21 Agustus 2017

Penulis,

**Andi Try Resti Fauziah Sahib**

NIM. 70100113073



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Hipotesis.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	10
A. Tinjauan Tentang Penyakit.....	10
B. Tinjauan tentang tingkat pengetahuan.....	28
C. Tinjauan tentang pelayanan kefarmasian dan konseling.....	30
D. Tinjauan dalam Islam.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Pendekatan Penelitian .....	39
D. Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel .....	40
E. Metode Pengumpulan Data .....	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Teknik pengujian Instrumen.....	42

H. Analisis data penelitian .....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Hasil Penelitian .....	47
B. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
KEPUSTAKAAN .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Distribusi nilai uji validitas kuesioner.....	47
2. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel bukti fisik .....	48
3. Karakteristik responden .....	49
4. Distribusi frekuensi responden berdasarkan penanganan diare .....	51
5. Distribusi penggunaan obat diare pada balita .....	51
6. Distribusi persentasi pengetahuan ibu.....	52
7. Distribusi frekuensi hasil pengisian kuesioner .....	53
8. Hasil analisis uji wilcoxon .....	55
9. Hasil data statistik uji wilcoxon .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diare Tanpa Dehidrasi .....	25
2. Diare Dehidrasi Ringan/Sedang .....	26
3. Diare Dehidrasi Berat.....	27
4. Gambar Resep Untuk Anak Diare.....	83
5. Penandatanganan informed concent.....	86
6. Pengisian Kuesioner <i>Pre test</i> .....	86
7. Pemberian Konseling oleh Apoteker .....	86
8. Pengisian Kuesioner <i>Post test</i> .....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja penelitian .....	65
2. Panduan konseling .....	66
3. Kuesioner penelitian .....	68
4. Informed Consent.....	71
5. Surat Izin Penelitian .....	72
6. Nilai-Nilai r Product Moment (r tabel) .....	76
7. Hasil Uji Analisis SPSS .....	77
8. Resep untuk anak diare di Puskesmas Pampang .....	83
9. Hasil Pengisian kuesioner .....	84
10. Dokumentasi Penelitian .....	86

## ABSTRAK

Nama : Andi Try Resti Fauziah Sahib

NIM : 70100113073

Judul : Hubungan Konseling Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Pada Terapi Diare Balita Di Puskesmas Pampang Kota Makassar

---

Peranan farmasis dalam mengoptimalkan terapi diare pada pasien sangat dibutuhkan dimana farmasis diharapkan dapat memberikan konseling tentang terapi yang benar pada diare anak. Konseling merupakan komponen dari pelayanan kefarmasian yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan hasil terapi, dengan memaksimalkan penggunaan obat yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan konseling terhadap tingkat pengetahuan ibu di Puskesmas Pampang kota Makassar dalam terapi diare pada balita. Penelitian ini merupakan penelitian *non eksperimental* dengan rancangan penelitian analitik observasional dengan menggunakan analisis kuantitatif. Pendekatan waktu yang digunakan yaitu rancangan penelitian observasional studi *one group pre-post test*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang bermakna antara hasil *pre-test* dengan *post-test* dimana data *significancy* dari kedua kelompok data adalah 0,000 ( $p < 0,05$ ) yang menyatakan bahwa adanya hubungan konseling terhadap tingkat pengetahuan ibu pada terapi diare balita di Puskesmas Pampang kota Makassar.

**Kata kunci: Diare balita, Konseling, Tingkat Pengetahuan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

Name : Andi Try Resti Fauziah Sahib

NIM : 70100113073

Title : Correlate of Counseling to Maternal Knowledge Level on Diarrhea Therapy of Toddlers at Pampang Health Center of Makassar city

---

The role of pharmacists in optimize the diarrhea therapy for the patient is urgently required. For this reason the pharmacist are expected to provide the counseling about the correct therapy for the child diarrhea. Counseling is a component of pharmaceutical care that necessary to increase the result of therapist by maximizing the use of the drugs accurately. This research aims to knowing there is correlate of counseling to maternal knowledge at Pampang Health Center of Makassar city in the treatment of toddlers diarrhea. This is a non-experimental research model to analytical observational research with quantitative analysis. Approach by using observational research with *one group pre-post test* study. The data were collected using questionnaires and then analyzed using SPSS. The results showed that there was a significant difference in the level of knowledge between the pre-test and post-test results where the significance data from both groups were 0.000 ( $p < 0.05$ ) which states that there is a counseling relationship to mother's knowledge level on therapy of toodlers diarrhea at Pampang Health Center of Makassar city.

**Keywords: Toodlers Diarrhea, Counseling, Level of Knowledge**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 2010 merupakan keadaan seimbang dari kesehatan jasmani, mental/rohani dan sosial dan tidak hanya semata terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah sebuah investasi, aset, dan harta yang paling berharga bagi setiap individu. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Diare menjadi penyebab kedua kematian balita di dunia. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa insiden diare pada kelompok usia balita di Indonesia adalah 10,2 %. Lima provinsi dengan insiden diare tertinggi adalah Aceh, Papua, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Banten (RISKESDAS, 2013: 9).

Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni fasilitas kesehatan di negara berkembang yang masih kurang, kurangnya air bersih, infrastruktur kesehatan yang masih kurang memadai, BAB tidak pada tempatnya, tidak adanya sarana jamban yang baik, lingkungan yang kurang bersih dan para orang tua yang tidak mengetahui cara mengatasi dehidrasi. Survei morbiditas yang

dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan insidens naik. Pada tahun 2000 IR penyakit Diare 301/ 1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374 /1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423 /1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga masih sering terjadi, dengan CFR yang masih tinggi. Pada tahun 2008 terjadi KLB di 69 Kecamatan dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 239 orang (CFR 2,94%). Tahun 2009 terjadi KLB di 24 Kecamatan dengan jumlah kasus 5.756 orang, dengan kematian 100 orang (CFR 1,74%), sedangkan tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah penderita 4204 dengan kematian 73 orang (CFR 1,74 %.) (Kementerian Kesehatan RI, 2015: 147).

Salah satu langkah dalam pencapaian target MDGs (Goal ke-4) adalah menurunkan kematian anak menjadi 2/3 bagian dari tahun 1990 sampai pada 2015. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Studi Mortalitas dan Riset Kesehatan Dasar dari tahun ke tahun diketahui bahwa diare masih menjadi penyebab utama kematian balita di Indonesia. Penyebab utama kematian akibat diare adalah tata laksana yang tidak tepat baik di rumah maupun di sarana kesehatan. Untuk menurunkan kematian karena diare perlu tata laksana yang cepat dan tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2015: 147).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan kota makassar menunjukkan bahwa angka kejadian diare tertinggi pada tahun 2015 dikota makassar adalah kecamatan Panakkukang yaitu sebanyak 4360 jiwa. Data Dinas Kesehatan kota makassar juga menunjukkan bahwa puskesmas yang memiliki persentase tertinggi pada tahun 2015

terkait kasus diare adalah Puskesmas Pampang yaitu sebanyak 1950 jiwa. Situasi kasus diare berdasarkan penggolongan umur kota Makassar pada tahun 2015 bahwa pada umur  $\geq 5$  tahun sebanyak 14746 jiwa, selanjutnya pada umur 1 – 4 tahun sebanyak 10096 jiwa dan pada umur 0-<1 tahun sebanyak 1415 jiwa.

Puskesmas pampang sebelumnya berturut – turut yakni pada tahun 2013 hingga 2014 menempati urutan ke lima terkait kasus diare namun akhirnya meningkat drastis pada tahun 2015 dan menempati urutan pertama diantara seluruh puskesmas di kota Makassar.

Salah satu peran farmasis dalam mengurangi resiko penyakit diare adalah Pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah penyedia pelayanan yang langsung bertanggung jawab terkait dengan obat, dengan maksud pencapaian hasil yang pasti dan meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP 51, 2009).

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelaksanaan yang fungsinya terorganisir, terstruktur meliputi pelayanan langsung sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dai sistem pelayanan kesehatan yang ada dilaksanakan secara utuh dan lebih fokus atau berorientasi kepada pasien dalam hal penyembuhan pasien juga dalam penyediaan obat yang aman dan efektif serta harga obat yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat yang berstatus pasien (Rikomah, 2016: 30).

Konseling adalah diskusi, nasehat, edukasi tentang penyakit dan pengobatan sehingga pasien memperoleh keuntungan yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan perawatannya. Konseling merupakan komponen dari pelayanan

kefarmasian yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan hasil terapi, dengan memaksimalkan penggunaan obat yang tepat (Rikomah, 2016: 44).

Berkaitan dengan hal tersebut maka peranan farmasis dalam mengoptimalkan terapi diare pada pasien sangat dibutuhkan. Dimana farmasis diharapkan dapat memberikan konseling tentang terapi yang benar pada diare anak.

Pengetahuan pasien yang baik setelah diberikan konseling merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh farmasis. Diketahui bahwa setiap individu memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda sehingga ini menjadi salah satu tugas utama seorang farmasis untuk memberikan konseling dengan sebaik-baiknya agar pasien dapat lebih memahami dan tidak adanya lagi kesalahan dalam penanganan terapinya.

Pengetahuan ibu sangat berpengaruh dalam penatalaksanaan diare di rumah. Karena bila pengetahuannya baik maka ibu akan mengetahui tentang cara merawat anak sakit diare di rumah, terutama tentang upaya rehidrasi oral dan juga ibu akan mengetahui tentang tanda-tanda untuk membawa anak berobat atau merujuk ke sarana kesehatan. Tindakan pengobatan yang dilakukan di rumah adalah titik tolak keberhasilan pengelolaan penderita tanpa dehidrasi, juga tindakan untuk mendorong ibu memberikan pengobatan secepat mungkin ketika diare baru mulai. Bila ibu mengetahui prinsip pengelolaan efektif diare, misalnya bila ibu memberikan pengobatan cairan secara oral pada anak di rumah segera setelah anak menderita diare, ini dapat mencegah terjadinya dehidrasi atau mengurangi beratnya dehidrasi (Ariani, Ayu Putri. 2016: 122).

Penelitian sebelumnya oleh Ardian Budi Kusuma tahun 2009 tentang efektivitas konseling kepada ibu terhadap perilaku hidup bersih sehat dan kejadian diare akut anak balita di puskesmas serayu larangan Kabupaten purbalingga menunjukkan bahwa konseling dapat efektif menurunkan kejadian diare akut pada balita di Wilayah Puskesmas Serayu Larangan Kab. Purbalingga ( $t = -6,00$  dengan  $p = 0,000$ ).

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dilakukan penelitian tentang hubungan konseling terhadap tingkat pengetahuan ibu pada terapi diare balita di puskesmas pampang kota makassar dengan harapan kiranya melalui konseling dapat menurunkan kejadian dan komplikasi yang dapat diakibatkan oleh diare pada anak.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan pemberian konseling terhadap tingkat pengetahuan ibu di puskesmas Pampang kota Makassar dalam penanganan diare pada balita ?

### **C. Definisi Operasional Penelitian**

#### 1. Diare

Diare adalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering (biasanya tiga kali atau lebih) dalam satu hari (Departemen Kesehatan RI, 2011: 2).

## 2. Balita

Bayi lima tahun atau sering disingkat sebagai Balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan kategori 0 – 5 tahun (Depkes RI. 2009: 1).

## 3. Pengetahuan

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian. Pengetahuan ibu yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh ibu tentang terapi diare anak yang baik dan benar.

## 4. Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Rikomah, 2016: 29)

## 5. Konseling

Konseling obat adalah salah satu metode edukasi pengobatan secara tatap muka atau wawancara, merupakan salah satu bentuk pelayanan kefarmasian dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien dalam penggunaan obat (Depkes RI. 2007: 1).

### **D. Kajian Pustaka**

1. Telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Motto, Stephany Y dkk (2013), yang meneliti tentang Tingkat pengetahuan ibu tentang diare pada anak di puskesmas bahu manado dengan jenis penelitian deskriptif cross sectional.

Dimana sampelnya adalah Ibu-Ibu yang membawa anaknya ke Poli Anak Puskesmas Bahu Manado. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan Ibu tentang diare pada anak sebagian mendapat nilai baik.

2. Khikmah, Furi Ainun (2012). Meneliti tentang Hubungan pengetahuan ibu tentang diare dengan kejadian diare pada balita usia 2-5 tahun di wilayah kerja puskesmas kecamatan karanganyar kabupaten karanganyar dengan jenis penelitian adalah observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional dimana sampelnya adalah balita usia 2-5 tahun yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dan mengalami diare dalam tiga bulan terakhir. Hasil menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, pengetahuan baik 53 orang (53%), pengetahuan cukup 41 orang (41%), dan pengetahuan kurang 6 orang (6%). Dari hasil penelitian, ibu dengan pengetahuan baik (53 orang) sebanyak 18 anak diare dan 35 anak tidak diare. Ibu dengan pengetahuan cukup (41 orang), didapatkan 29 anak diare dan 12 anak tidak diare. Ibu dengan pengetahuan kurang (6 orang) didapatkan 5 anak diare dan 1 anak tidak diare. Hasil analisis didapatkan nilai  $p = 0,001$ .
3. Setiabudi, Felicia Marsella (2015), meneliti tentang Pengaruh Edukasi Terhadap pengetahuan ibu-ibu di kecamatan patrang dalam penanganan diare pada balita dengan jenis penelitiannya adalah analitis kategorik berpasangan. Dimana sampel yang digunakan adalah ibu-ibu yang mempunyai balita usia 1-5 tahun di kec.Patrang Kab. Jember. Hasil yang diperoleh adalah Tindakan

awal yang dilakukan ibu-ibu di kecamatan Patrang apabila keluarganya mengalami diare adalah 70% dilakukan pengobatan sendiri, 14% membawa ketenaga kesehatan, 8% menggunakan ramuan tradisional dan 8% tidak diobati. Perbandingan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan edukasi mengenai penanganan diare adalah jumlah responden yang memiliki nilai diatas 10 mengalami peningkatan yaitu dari 74 responden sebelum diberikan edukasi menjadi 98 responden setelah diberikan edukasi. Jumlah responden yang memiliki nilai dibawah 10 mengalami penurunan, yaitu dari 26 responden sebelum dilakukan edukasi menjadi 2 responden setelah diberikan edukasi. Ada perbedaan yang signifikan pada tingkat pengetahuan responden sebelum dan sesudah diberikan edukasi.

4. Kusuma, Ardian Budi (2009), meneliti tentang keefektifan konseling kepada ibu-ibu terhadap perilaku Hidup bersih sehat dan kejadian diare akut anak Balita di puskesmas serayu larangan Kabupaten purbalingga dengan jenis penelitian *Randomized Control Trial*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan ( $t = -2,30$  dengan  $p=0,023$ ), sikap ( $t = -4,82$  dengan  $p=0,000$ ) dan tindakan ( $t = -3,44$  dengan  $p=0,001$ ) pada kelompok konseling dan kontrol. Hal ini menunjukkan konseling efektif dalam memperbaiki PHBS dibidang kesehatan dan lingkungan ibu tentang kejadian penyakit diare akut pada anak balita di Wilayah Puskesmas Serayu Larangan Kab. Purbalingga. Pada penelitian ini,

konseling efektif menurunkan kejadian diare akut pada balita di Wilayah Puskesmas Serayu Larangan Kab. Purbalingga ( $t = -6,00$  dengan  $p = 0,000$ ).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan konseling terhadap tingkat pengetahuan ibu di puskesmas pampang kota Makassar dalam terapi diare pada balita.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien dalam hal ini adalah pemberian konseling agar efek terapi yang diharapkan dapat tercapai.
2. Menjadi dasar tentang pentingnya konseling dalam meningkatkan pengetahuan pasien dalam pelaksanaan terapi, salah satunya dalam hal penanganan terapi diare pada balita.

#### **G. Hipotesis**

Pemberian konseling memiliki hubungan terhadap tingkat pengetahuan ibu pada terapi diare balita di puskesmas pampang kota makassar

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Tinjauan tentang penyakit*

##### 1. Definisi dan klasifikasi diare

Diare atau penyakit diare (*Diarrheal Disease*) berasal dari bahasa Yunani yaitu *Diarroi* yang artinya mengalir terus, adalah keadaan abnormal dari pengeluaran tinja yang frekuen (Ariani, Ayu Putri. 2016: 12).

Diare merupakan peningkatan frekuensi dan penurunan konsistensi feses jika dibandingkan dengan keadaan normal usus individu. Hal ini sering menjadi gejala dari suatu penyakit sistemik. diare akut umumnya memiliki durasi lebih pendek yakni tidak lebih dari 14 hari, diare persisten yakni lebih dari 14 hari, dan diare kronis memiliki durasi yang lebih lama dari 30 hari. Sebagian besar kasus diare akut disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau protozoa, dan umumnya diri terbatas (DiPiro, Joseph T dkk, 2015: 200).

Diare berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari (umumnya kurang dari 7 hari). Gejala dan tanda sudah berlangsung <2 minggu sebelum datang berobat. Akibat diare akut adalah dehidrasi, sedangkan dehidrasi merupakan penyebab utama kematian bagi penderita diare.
- b. Diare kronik, yaitu diare yang gejala dan tanda sudah berlangsung > 2 minggu sebelum datang berobat atau sifatnya berulang

- c. Disentri, yaitu diare yang disertai darah dalam tinjanya. Akibat dari disentri adalah anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, kemungkinan terjadi komplikasi pada mukosa

(Marsella, Felicia Setiabudi, 2015: 6).

Derajat dehidrasi dibagi dalam 3 klasifikasi :

a) Diare tanpa dehidrasi

Tanda diare tanpa dehidrasi, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

1. Keadaan Umum : baik
2. Mata : Normal
3. Rasa haus : Normal- minum biasa
4. Turgor kulit : kembali cepat

b) Diare dehidrasi Ringan/Sedang

Tanda Diare dengan dehidrasi Ringan/Sedang, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

1. Keadaan Umum : Gelisah, rewel
2. Mata : Cekung
3. Rasa haus : Haus, ingin minum banyak
4. Turgor kulit : Kembali lambat

c) Diare dehidrasi berat

Tanda Diare dehidrasi berat, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

1. Keadaan Umum : Lesu, lunglai, atau tidak sadar
2. Mata : Cekung

3. Rasa haus : Tidak bisa minum atau malas minum
4. Turgor kulit : Kembali sangat lambat (lebih dari 2 detik)

(Kementerian Kesehatan RI, 2011: 19).

## 2. Etiologi

Sebagian besar kasus diare akut disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau protozoa, dan umumnya diri terbatas (DiPiro, Joseph T dkk, 2015: 200).

Beberapa penyebab diare antara lain :

### a. Faktor Infeksi

#### 1. Infeksi enteral

##### a) Infeksi bakteri

##### 1) *Vibrio, Eschericia Coli*

*Eschericia Coli* merupakan penyebab diare infeksi pada bayi.

Berdasarkan antigen O maka *Eschericia Coli* dibagi menjadi beberapa golongan (*sero group*) dan berdasarkan antigen H dibagi menjadi serotip (*serotype*). Penggolongan *E. Coli* antara lain :

*Enteropathogenic Eschericia Coli* (EPEC), *Enterotoxigenic Eschericia Coli* (ETEC), *Enterinvasive Eschericia Coli* (EIEC) dan *Enterohemorrhagic Eschericia Coli* (EHEC).

##### 2) *Salmonella Typii*

##### 3) *Shigella*

##### 4) *Campylobacter Jejuni*

b) Infeksi virus

Virus terbanyak penyebab diare adalah *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Enterovirus*, *Astrovirus*, *Minireotavirus*, *Calicivirus*, dan sebagainya.

Garis besar patogenesisnya sebagai berikut:

- 1) Virus masuk kedalam *traktus digestivus* bersama makanan dan atau minuman.
- 2) Virus berkembangbiak di dalam usus.
- 3) Virus masuk ke dalam epitel usus halus dan menyebabkan kerusakan bagian apikal vili usus halus.
- 4) Vili usus kemudian memendek sehingga kemampuannya untuk menyerap dan mencerna makanan akan berkurang. Pada saat ini biasanya diare mulai timbul.
- 5) Sel-sel *retikulum* akan melebar
- 6) Infiltrasi sel-sel limfoid dari lamina propria, untuk mengatasi infeksi sampai terjadi penyembuhan.

c) Infeksi parasit

Patogenesis terjadinya diare oleh karena bakteri pada garis besarnya ialah sebagai berikut :

- 1) Masuknya bakteri kedalam *traktus digestivus*.
- 2) Berkembangbiaknya bakteri di dalam *traktus digestivus*.
- 3) Dikeluarkannya toksin oleh bakteri.

- 4) Toksin merancang epitel usus yang menyebabkan peningkatan aktivitas enzim *adenil siklase* (bila toksin bersifat tidak tahan panas, yang disebut LT = '*label toksin*') atau enzim *guanil siklase* (bila toksin bersifat tahan panas, yang disebut ST = '*stable toxin*')
- 5) Sebagai peningkatan aktivitas enzim – enzim, ini akan terjadi peningkatan cAMP atau cGMP, yang mempunyai kemampuan merangsang sekresi klorida, natrium dan air dari dalam sel ke lumen usus ke dalam sel. Hal ini akan menyebabkan peninggian tekanan osmotik di dalam lumen usus (*hiperosmoler*).
- 6) Terjadi hiperperistaltik usus untuk mengeluarkan cairan yang berlebihan dalam lumen usus, sehingga cairan dapat berlebihan dalam lumen usus, sehingga cairan dapat dialirkan dari lumen usus halus ke lumen usus besar (kolon). Dalam keadaan normal, kolon orang dewasa dapat menyerap sebanyak 4.400 ml cairan sehari, karena itu produksi atau sekresi cairan sebanyak 4.500 sehari belum menyebabkan diare. Bila kemampuan penyerapan kolon berkurang atau sekresi cairan melebihi kapasitas penyerapan kolon, maka akan terjadi diare. Pada kolera sekresi cairan dari usus halus ke usus besar dapat mencapai 10 liter atau lebih sehari. Oleh karena itu, diare pada kolera biasanya sangat hebat, suatu keadaan yang disebut '*profused diarrhoea*'. Contoh parasit yaitu : cacing, protozoa dan jamur.

## 2. Infeksi parenteral

Infeksi parenteral yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan, seperti Otitis Media Akut (OMA), *Tonsolofaringitis*, *BronkoPneumonia*, *Ensefalitis* dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak berumur di bawah 2 tahun.

### b. Faktor malabsorpsi

Beberapa faktor malabsorpsi antara lain: malabsorpsi karbohidrat (intoleransi laktosa), malabsorpsi lemak, malabsorpsi protein dan malabsorpsi asam empedu.

### c. Faktor makanan dan minuman yang dikonsumsi

Makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan. Kontak antara sumber dan host dapat terjadi melalui air, terutama air minum yang tidak dimasak dapat juga terjadi sewaktu mandi dan berkumur. Kontak kuman pada kotoran dapat berlangsung ditularkan pada orang lain apabila melekat pada tangan dan kemudian dimasukkan ke mulut dipakai untuk memegang makanan. Kontaminasi alat makan dan dapur. Bakteri yang terdapat pada saluran pencernaan adalah bakteri *Entamoeba Colli*, *Salmonella*, *Shigella*,. Virusnya yaitu *Enterovirus*, *rotavirus*, serta parasit yaitu cacing dan jamur.

### d. Faktor terhadap laktosa (susu kaleng)

Tidak memberikan ASI secara penuh selama 6 bulan pertama kehidupan. Pada bayi yang tidak diberi ASI resiko untuk menderita diare lebih besar daripada bayi yang diberi ASI penuh dan kemungkinan menderita dehidrasi berat juga lebih besar. Menggunakan botol susu akan memudahkan pencemaran

oleh kuman sehingga menyebabkan diare. Dalam ASI mengandung antibosi yang dapat melindungi anak terhadap berbagai penyebab diare seperti Shigelle dan *V. Cholerae*.

(Ariani, Ayu Putri. 2016: 47)

Penyebab diare pada pasien unit perawatan intensif antara lain :

Obat :

- a. Antimikroba (menular)
- b. larutan Sorbitol yang mengandung Guaifenesin, teofilin, dan asam valproate
- c. Agen Prokinetic : Metoclopramide dan eritromisin
- d. Histamin 2 reseptor antagonis, pompa proton inhibitor, magnesiumcontaining produk enteral, dan misoprostol
- e. Digoxin, procainamide, dan quinidine

Formula nutrisi enteral (terutama formula hyperosmotic) Infectious :

- a. Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, dan Candida spp.
- b. Uncommon- Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Yersinia spp., Dan enteropathogenic Escherchia coli

Lainnya :

- a. Impaksi tinja, usus iskemik, insufisiensi pankreas, dan fistula usus
- b. neoplasma gastrointestinal: vasoaktif polipeptida usus tumor mensekresi

(Papadopoulos, John, 2015: 92)

### 3. Patofisiologi

Diare adalah ketidakseimbangan pada absorpsi dan sekresi air dan elektrolit. Jika absorpsi air pada intestinal kecil dan kolon menurun atau sekresi meningkat di atas normal, terjadi diare. Normalnya, absorpsi air dan elektrolit melebihi sekresi.

Empat mekanisme patofisiologi umum yang mengganggu keseimbangan air dan elektrolit, menyebabkan diare. Empat mekanisme ini merupakan dasar diagnosis dan terapi. Mekanismenya adalah (1) perubahan pada transport aktif ion baik karena penurunan absorpsi natrium atau peningkatan sekresi klorida; (2) perubahan pada motilitas intestinal; (3) peningkatan pada osmolaritas luminal; dan (4) peningkatan pada tekanan hidrostatik jaringan.

Mekanisme ini telah dihubungkan dengan empat grup besar diare: sekretorik, osmotik, eksudatif, dan perubahan transit intestinal.

Diare sekretori terjadi ketika substansi dengan struktur serupa (seperti vasoaktif intestinal peptide, VIP, atau toksin bakteri) meningkatkan sekresi atau menurunkan absorpsi sejumlah besar air dan elektrolit. Substansi yang sulit diserap ini menahan cairan intestinal, menyebabkan diare osmotik. Inflamasi pada intestinal bisa menyebabkan diare eksudatif karena pelepasan mucus, protein atau darah ke intestinal. Motilitas intestinal bisa dirubah dengan mengurangi waktu kontak pada intestinal kecil, pengosongan kolon terlalu cepat, dan oleh pertumbuhan bakteri yang berlebihan (DiPiro, Joseph T dkk, 2015: 200).

Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik (makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam

rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus, isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare). Selain itu menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian terjadi diare. Gangguan motiliasi usus yang mengakibatkan hiperperistaltik dan hipoperistaltik. Akibat dari diare adalah kehilangan air dan elektrolit (dehidrasi) yang mengakibatkan gangguan asam basa (asidosis metabolik dan *hypokalemia*), gangguan gizi (*intake* kurang, *output* berlebih), hipoglikemia dan gangguan sirkulasi. Gangguan gizi sebagai akibat kelaparan (masukan makanan kurang, pengeluaran bertambah) dan gangguan sirkulasi darah (Ariani, Ayu Putri. 2016: 46).

#### **4. Manifestasi klinis dan gejala**

Pada diare akut, keluhan pasien berupa onset yang mendadak dengan konsistensi berair, lunak, mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, demam, menggigil, malaise, dan nyeri abdominal. Diare berlangsung selama 12-60 jam. Nyeri dengan interval pada periumbilikal atau quadrant kanan bawah dengan kram dan suara intestinal bisa terdengar merupakan ciri penyakit intestinal kecil. Ketika nyeri terjadi pada diare intestinal besar, nyerinya bertahan dengan tenesmus (kesulitan buang air dan terasa nyeri). Pada diare kronik, serangan sebelumnya, hilangnya berat, anoreksia, dan kelemahan yang kronik merupakan temuan penting (DiPiro, Joseph T dkk, 2015: 201).

Mula mula bayi dan anak menjadi cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Tinja cair

dan mungkin disertai lendir atau darah. Warna tinja makin lama berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya lecet karena seringnya defekasi dan tinja makin lama asam sebagai akibat makin banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi usus selama diare (Ariani, Ayu Putri. 2016: 62)

Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare dan dapat disebabkan oleh lambung yang turut meradang atau akibat gangguan keseimbangan asam-basa dan elektrolit. Bila anak banyak kehilangan cairan dan elektrolit, maka gejala dehidrasi makin tampak. Berat badan menurun, turgor kulit berkurang, mata dan ubun-ubun membesar menjadi cekung, selaput lendir bibir dan mulut serta tampak kering. Berdasarkan banyaknya cairan yang hilang dapat dibagi menjadi dehidrasi ringan, sedang dan berat. Sedangkan berdasarkan tonisitas plasma dapat dibagi menjadi dehidrasi hipotonik, isotonik dan hipertonik (Ariani, Ayu Putri. 2016: 63).

## **5. Pemeriksaan fisik dan laboratorium**

### **a. Diare Akut**

#### **1. Pemeriksaan Fisik**

- a) Tentukan status hidrasi : pasien anak-anak juga bisa datang dalam keadaan kurang cairan, disertai takikardia dan hipotensi postural, sehingga membutuhkan cairan salin intravena.
- b) Pada umumnya demam merupakan tanda penyakit infeksi, namun bisa juga didapatkan pada kolitis yang berat.

## 2. Pemeriksaan laboratorium

- a) Tes darah : hitung darah lengkap; anemia atau trombositosis mengarahkan dugaan adanya penyakit kronis. Albumin yang rendah bisa menjadi patoka untuk tingkat keparahan penyakit namun tidak spesifik.
- b) Kultur tinja : bisa mengidentifikasi organisme penyebab Bakteri *C. difficile* ditemukan pada 5 % orang sehat; oleh karenanya diagnosis ditegakkan berdasarkan adanya gejala disertai ditemukannya toksin, bukan berdasarkan ditemukannya organisme saja.
- c) Foto polos abdomen : bisa menunjukkan gambaran kolitis akut.

### **b. Diare Kronis**

#### 1. Pemeriksaan Fisik

- a) Keadaan Umum : menentukan apakah pasien nampak sakit ringan atau berat. Dapatkan keterangan sejelas mungkin mengenai penurunan berat badan (pakaian atau kulit menjadi longgar, pindah lubang ikat pinggang, dan lain-lain).
- b) Tanda-tanda malabsorpsi : perubahan kuku misalnya koilonikia, leukonikia. Pada lidah dan mulut didapatkan glositis, keilitis, dan ulkus, ada memar.
- c) Pemeriksaan abdomen : termasuk pemeriksaan rektal dan sigmoidoskopi dengan teliti.

#### 2. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan harus dipilih berdasarkan prioritas diagnosis klinis yang paling mungkin.

- a) Tes darah : secara umum dilakukan hitung darah lengkap, LED, biokimiawi darah, tes, khusus dilakukan untuk mengukur albumin serum, vitamin B<sub>12</sub> dan folat. Fungsi tiroid. Antibodi endomisial untuk penyakit seliaka.
- b) Mikroskopik dan kultur tinja (3x) : hasil kultur negatif belum menyingkirkan giardisis.
- c) Lemak dalam tinja : cara paling sederhana adalah pewarnaan sampel tinja dengan sudan black kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Pada kasus yang lebih sulit, kadar lemak tinja harus diukur, walaupun untuk pengukuran ini dibutuhkan diet yang terstandarisasi.
- d) Foto polos abdomen : pada foto polos abdomen bisa terlihat klasifikasi pankreas, walaupun, jika diduga terjadi insufisiensi pankreas, sebaiknya diperiksa dengan *endoscopic retrograde cholangiopancreatography* (ERCP) dan/atau CT pankreas.
- e) Endoskopi, aspirasi duodenum, dan biopsi : untuk menyingkirkan penyakit seliaka dan giardisis.
- f) Kolonoskopi dan biopsi : endoskopi saluran pencernaan bagian bawah lebih menguntungkan daripada pencitraan radiologi dengan kontras karena, bahkan jika mukosa terlihat normal, pada biopsi bisa ditemukan kolitis mikroskopik (misalnya kolitis limfositik, kolitis kolagenosa).
- g) *Hydrogen breath test* : untuk hipolaktasia (laktosa) atau pertumbuhan berlebihan bakteri pada usus (laktulosa)

- h) Pencitraan usus halus : bisa menunjukkan divertikulum jejuni, penyakit Crohn atau bahkan struktur usus halus.
- i) Berat tinja 24 jam (diulang saat puasa): walaupun sering ditulis di urutan terakhir daftar pemeriksaan penunjang, pemeriksaan ini tetap merupakan cara paling tepat untuk membedakan diare osmotik dari diare sekretorik.
- j) Hormon usus puasa : jika ada dugaan tumor yang mensekresi hormon, harus dilakukan pengukuran kadar hormon puasa.

(Davey, Patrick. 2005: 33)

Pemeriksaan fisik antara lain :

Cari :

1. Darah dalam tinja.
2. Tanda – tanda gizi buruk.
3. Perut kembung.
4. Tanda invaginasi (massa intra-abdominal, tinja hanya lendir dan darah)
5. Tanda-tanda dehidrasi ringan atau dehidrasi berat:
  - a. Rewel atau gelisah.
  - b. Letargis atau kesadaran berkurang.
  - c. Mata cekung
  - d. Cubitan kulit perut kembalinya lambat atau sangat lambat.
  - e. Haus atau minum dengan lahap, atau malas minum atau tidak bisa minum.

Tidak perlu dilakukan kultur tinja rutin pada anak dengan diare.

(Ariani, Ayu Putri. 2016: 66)

## 6. Terapi Farmakologi dan Non Farmakologi

Adapun terapi Farmakologi untuk diare antara lain :

- a. Obat yang digunakan untuk mengobati diare dikelompokkan menjadi beberapa kategori: antimotilitas, adsorben, senyawa antisekretori, antibiotik, enzim, dan usus mikroflora. Biasanya, obat ini tidak menyembuhkan tapi meringankan.
- b. Opiat dan turunannya opioid menghambat transit konten intraluminal atau meningkatkan kapasitas intestinal, memperlama kontak dan penyerapan. Keterbatasan opiat adanya Potensi kecanduan (harus diperhatikan untuk penggunaan jangka panjang) dan memburuknya diare di dipilih diare infeksi tertentu.
- c. Loperamide sering dianjurkan untuk penanganan diare akut dan kronis. Diare yang berlangsung lebih dari 48 jam memulai loperamide dengan perhatian medis.
- d. Adsorbents (seperti kaolin-pektin) digunakan untuk mengurangi gejala-gejala. Adsorben yang spesifik dalam aksi; agen ini menyerap nutrisi, racun, obat, dan cairan pencernaan. Pemberian bersama obat lain bisa menurunkan bioavailabilitas.
- e. Bismuth subsalisilat sering digunakan untuk pengobatan atau pencegahan diare (pelancong diare) dan memiliki antisekresi, anti-inflamasi, dan efek antibakteri. subsalisilat berisi beberapa komponen yang mungkin beracun jika diberikan dalam kelebihan untuk mencegah atau mengobati diare.

- f. Sediaan *Lactobacillus* digunakan untuk menggantikan mikroflora kolon. ini ditujukan untuk mengembalikan fungsi usus dan menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen. Namun, diet produk susu yang mengandung 200 hingga 400 g laktosa atau dekstrin adalah sama efektif dalam rekolonisasi flora normal.
- g. Obat antikolinergik, seperti atropin, menghambat tonus vagal dan memperpanjang waktu transit intestinal. Manfaatnya dalam mengendalikan diare masih dipertanyakan dan dibatasi oleh efek samping.
- h. Octreotide, sebuah octapeptide analog sintetik dari somatostatin endogen, diresepkan untuk pengobatan gejala tumor karsinoid dan peptida lainnya mensekresi tumor. Rentang dosis untuk menangani diare terkait dengan tumor karsinoid adalah 100-600 µg/hari dalam 2 - 4 dosis terbagi subkutan untuk 2 minggu. Octreotide dikaitkan dengan efek samping seperti cholelithiasis, mual, diare, dan sakit perut.

(DiPiro, Joseph T dkk, 2015: 202)

Tatalaksana diare berdasarkan derajat dehidrasi :

<b>Diare tanpa dehidrasi</b>	
<b>Bila terdapat dua tanda atau lebih</b>	
Keadaan Umum baik, sadar	A
Mata tidak cekung	
minum biasa, tidak haus	
Cubitan kulit perut / turgor kembali segera	

**RENCANA TERAPI A  
UNTUK TERAPI DIARE TANPA DEHIDRASI**

**MENERANGKAN 5 LANGKAH TERAPI DIARE DI RUMAH**

- 1. BERI CAIRAN LEBIH BANYAK DARI BIASANYA**
  - Teruskan ASI lebih sering dan lebih lama
  - Anak yang mendapat ASI eksklusif, beri oralit atau air matang sebagai tambahan
  - Anak yang tidak mendapat ASI eksklusif, beri susu yang biasa diminum dan oralit atau cairan rumah tangga sebagai tambahan (kuah sayur, air tajin, air matang, dsb)
  - Beri Oralit sampai diare berhenti. Bila muntah, tunggu 10 menit dan dilanjutkan sedikit demi sedikit.
    - Umur < 1 tahun diberi 50-100 ml setiap kali berak
    - Umur > 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali berak.
  - Anak harus diberi 6 bungkus oralit (200 ml) di rumah bila:
    - Telah diobati dengan Rencana Terapi B atau C.
    - Tidak dapat kembali kepada petugas kesehatan jika diare memburuk.
  - Ajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit.
- 2. BERI OBAT ZINC**

Beri Zinc 10 hari berturut-turut walaupun diare sudah berhenti. Dapat diberikan dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI.

  - Umur < 6 bulan diberi 10 mg (1/2 tablet) per hari
  - Umur > 6 bulan diberi 20 mg (1 tablet) per hari.
- 3. BERI ANAK MAKANAN UNTUK MENCEGAH KURANG GIZI**
  - Beri makan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat
  - Tambahkan 1-2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makan
  - Beri makanan kaya Kalium seperti sari buah segar, pisang, air kelapa hijau.
  - Beri makan lebih sering dari biasanya dengan porsi lebih kecil (setiap 3-4 jam)
  - Setelah diare berhenti, beri makanan yang sama dan makanan tambahan selama 2 minggu
- 4. ANTIBIOTIK HANYA DIBERIKAN SESUAI INDIKASI. MISAL: DISENTERI, KOLERA dll**
- 5. NASIHATI IBU/ PENGASUH**

Untuk membawa anak kembali ke petugas kesehatan bila :

  - Berak cair lebih sering
  - Muntah berulang
  - Sangat haus
  - Makan dan minum sangat sedikit
  - Timbul demam
  - Berak berdarah
  - Tidak membaik dalam 3 hari

Gambar 1. Diare tanpa Dehidrasi (Departemen Kesehatan RI, 2011: 6)

**Diare dehidrasi Ringan/ Sedang**

**Bila terdapat dua tanda atau lebih**

B

Gelisah, rewel

Mata cekung

Ingin minum terus, ada rasa haus

Cubitan kulit perut / turgor kembali lambat

**RENCANA TERAPI B**  
**UNTUK TERAPI DIARE DEHIDRASI RINGAN/SEDANG**  
**JUMLAH ORALIT YANG DIBERIKAN DALAM 3 JAM PERTAMA DI SARANA KESEHATAN**

**ORALIT yang diberikan =**  
**75 ml x BERAT BADAN anak**

- Bila BB tidak diketahui berikan oralit sesuai tabel di bawah ini:

Umur/Sampai	4 bulan	4 -12 bulan	12-24 bulan	2-5 tahun
Berat Badan	< 6 kg	6-10 kg	10-12 kg	12-19 kg
Jumlah cairan	200-400	400-700	700-900	900-1400

- Bila anak menginginkan lebih banyak oralit, berikanlah.
- Bujuk ibu untuk meneruskan ASI.
- Untuk bayi < 6 bulan yang tidak mendapat ASI berikan juga 100-200 ml air masak selama masa ini.
- Untuk anak > 6 bulan, tunda pemberian makan selama 3 jam kecuali ASI dan oralit
- Beri obat Zinc selama 10 hari berturut-turut

**AMATI ANAK DENGAN SEKSAMA DAN BANTU IBU MEMBERIKAN ORALIT:**

- Tunjukkan jumlah cairan yang harus diberikan.
- Berikan sedikit demi sedikit tapi sering dari gelas.
- Periksa dari waktu ke waktu bila ada masalah.
- Bila kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air masak atau ASI. Beri oralit sesuai Rencana Terapi A bila pembengkakan telah hilang.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**


**SETELAH 3-4 JAM, NILAI KEMBALI ANAK MENGGUNAKAN BAGAN PENILAIAN, KEMUDIAN PILIH RENCANA TERAPI A, B ATAU C UNTUK MELANJUTKAN TERAPI**

- Bila tidak ada dehidrasi, ganti ke Rencana Terapi A. Bila dehidrasi telah hilang, anak biasanya kencing kemudian mengantuk dan tidur.
- Bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan/ sedang, ulangi Rencana Terapi B
- Anak mulai diberi makanan, susu dan sari buah.
- Bila tanda menunjukkan dehidrasi berat, ganti dengan Rencana Terapi C

**BILA IBU HARUS PULANG SEBELUM SELESAI RENCANA TERAPI B**

- Tunjukkan jumlah oralit yang harus dihabiskan dalam Terapi 3 jam di rumah.
- Berikan oralit 6 bungkus untuk persediaan di rumah
- Jelaskan 5 langkah Rencana Terapi A untuk mengobati anak di rumah

Gambar 2. Diare dehidrasi Ringan/ Sedang (Departemen Kesehatan RI, 2011: 8)



Gambar 3. Diare Dehidrasi Berat (Departemen Kesehatan RI, 2011: 10)

## **B. Tinjauan tentang tingkat pengetahuan**

Ilmu pengetahuan menurut pengertian dinamis ialah suatu metode dalam menganalisis berbagai fenomena, yang dilakukan secara sistematis, obyektif, dan logis untuk pengumpulan pengetahuan yang andal. Keandalan ilmu pengetahuan mengandung arti dapat diuji kembali oleh siapapun dengan hasil yang relatif tetap. Untuk mendapatkan pengetahuan yang andal ini upaya yang dilakukan menempuh prosedur yang teliti dan hati-hati yang dilakukan melalui penelitian ilmiah. Tercakup dalam ilmu pengetahuan itu adalah sejumlah teori ilmiah. Teori-teori ilmiah adalah teori-teori dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya berfungsi mendeskripsikan, memprediksi dan mengendalikan (Heri D.J. Maulana, 2009: 230).

Cara yang tepat untuk mengukur pengetahuan dan sikap adalah dengan wawancara, baik terstruktur maupun wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), khusus untuk penelitian kualitatif. Sementara, untuk memperoleh data tindakan atau perilaku adalah melalui observasi, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan *recall* melalui wawancara, dengan mengingat kembali perilaku yang telah dilakukan responden beberapa waktu lalu (Heri D.J. Maulana, 2009: 230).

Pemberian informasi atau edukasi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, dan dengan pengetahuannya, akan menimbulkan sikap dan akhirnya menyebabkan individu atau kelompok sasaran akan berperilaku yang

didasarkan pada kesadaran dan kemauan individu yang bersangkutan (Heri D.J. Maulana, 2009: 235).

Pengetahuan merupakan hasil dari “Tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan (Notoatmodjo, 2012: 7).

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek penelitian atau responden (Notoatmodjo, 2010: 17).

Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain:

1. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah ia memahami hal baru dan menyelesaikan aneka persoalan yang berkaitan dengannya.

2. Informasi

Seseorang memiliki keluasan informasi, akan semakin memberikan pengetahuan yang lebih jelas.

3. Budaya

Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang karena apa yang sampai kepada dirinya, biasanya terlebih dahulu disaring berdasarkan kebudayaan yang mengikatnya.

#### 4. Pengalaman

Pengalaman disini berkaitan dengan umur dan pendidikan individu maksudnya pendidikan yang tinggi pengalaman akan luas sedang umur semakin banyak (semakin tua).

#### 5. Sosial Ekonomi

Tingkatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup disesuaikan dengan penghasilan yang ada sehingga menuntut pengetahuan yang dimiliki harus dipergunakan semaksimal mungkin. Begitupun dalam mencari bantuan ke sarana kesehatan yang ada mereka disesuaikan dengan pendapatan yang ada.

(Notoatmodjo, 2010: 17).

Semakin banyak informasi yang diterima semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang diare. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan seseorang, biasanya seseorang dengan pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Namun perlu ditekankan bahwa seseorang yang berpendidikan rendah tidak mutlak berpengetahuan rendah pula (Ariani, Ayu Putri. 2016: 122)

### ***C. Tinjauan tentang pelayanan kefarmasian dan konseling***

#### **1. Pelayanan Kefarmasian**

Menurut PP 51 Tahun 2009 Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan

farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Rikomah, 2016: 29).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu tanggung jawab farmasis dalam mengoptimalkan terapi dengan cara mengidentifikasi masalah terkait obat (*Drug Related problem*). Dalam hal ini ketidakpatuhan (*non compliance*) dan ketidaksepahaman (*non corcondance*) pasien dalam menjalankan terapi merupakan salah satu penyebab kegagalan terapi. Hal tersebut sering disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien tentang obat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan obat untuk terapinya (Depkes RI. 2007: 1).

Pelayanan farmasi merupakan suatu pelaksanaan yang fungsinya terorganisir, terstruktur meliputi pelayanan langsung sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang ada dilaksanakan secara utuh dan lebih fokus atau berorientasi kepada pasien dalam hal penyembuhan pasien juga dalam penyediaan obat yang aman dan efektif serta harga obat yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat yang berstatus pasien (Rikomah, 2016: 30).

Dalam pelaksanaan kegiatan farmasi klinis, banyak hambatan yang menjadi kendala dan menghambat tercapainya kegiatan farmasi klinis, masalah yang terkait dalam pelayanan farmasi klinis yaitu:

- b. Dokumentasi pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi.

Setiap kegiatan dalam farmasi klinis harus terdokumentasi, apa yang ditulis itu yang dikerjakan, apa yang dikerjakan itu yang ditulis, sehingga mencegah

adanya kajian kesalahan pemakaian obat dan berguna untuk pemantauan dan mengevaluasi sediaan farmasi.

c. Wawancara riwayat obat secara rutin dan terdokumentasi

Pentingnya suatu wawancara riwayat obat secara rutin harus terdokumentasikan dengan baik, jelas dengan meminimalkan pasien mendapatkan banyak obat dan salah penggunaan obat.

d. Dokumentasi survei kepuasan pasien dalam pelayanan obat

Untuk mengetahui seseorang pasien mengerti dan paham tentang obat yang telah diterima, dapat dilakukan dengan cara melakukan survey kepuasan pasien dalam pelayanan obat.

e. Dispensing khusus

Kegiatan farmasi klinik salah satunya yaitu melakukan dispensing khusus, dispensing khusus disesuaikan dengan kebutuhan pasien.

f. Kunjungan secara rutin

Dalam proses penanganan penyakit pasien banyak tim kesehatan yang terlibat didalamnya, baik farmasis, dokter, perawat yang menangani langsung pasien. Kunjungan rutin ke rumah perawat pasien dengan tujuan salah satunya untuk memantau penggunaan obat pasien.

g. Pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat secara rutin

Dengan adanya kegiatan kunjungan farmasis langsung ke ruang rawat pasien dapat diketahui kebutuhan pasien dalam minum obat, sehingga nantinya dapat dilakukan monitoring yang berkaitan dengan penggunaan obat seperti efek yang

berkaitan dengan penggunaan obat seperti efek samping obat yang mungkin terjadi selama pengobatan pasien

h. Kajian penggunaan obat secara rutin dan terdokumentasi

Obat yang telah diberikan kepada pasien perlu dilakukan pengkajian tentang efektifitas dan keamanan obat tersebut dan harus terdokumentasikan, kajian penggunaan obat dapat dilakukan bersama tim baik farmasi-farmasis, farmasis dengan dokter.

i. Konseling pasien rawat inap maupun jalan secara rutin, terjadwal dan terdokumentasi, ruang khusus untuk konseling dan informasi obat, serta dokumentasi dan laporan evaluasi konseling dan informasi obat dakan konseling dan informai obat.

(Rikomah, 2016: 30)

Pelayanan informasi obat merupakan suatu kegiatan untuk memberikan pelayanan informasi obat yang akurat dan objektif dalam hubungannya dengan perawatan pasien, pelayanan informasi obat sangat penting dalam upaya menunjang budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional. Pelayanan informasi obat sangat diperlukan, terlebih lagi banyak pasien yang belum mendapatkan informasi obat yang digunakan, karena penggunaan obat yang tidak benar bisa membahayakan.

Tujuan pelayanan Informasi Obat yaitu :

1. Menunjang ketersediaan informasi dalam rangka penggunaan obat yang rasional, dan berorientasi kepada pasien. Ketersediaan informasi mengenai obat yang cukup kepada pasien dapat meningkatkan penggunaan obat yang resional, tepa

indikasi, tepat dosis, tepat pasien, taepat rute pemberian obat, tepat cara penggunaan.

2. Menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga dan pihak lain. Peranan farmasi klinik salah satunya yaitu pemberian informasi mengenai obat ini dapat diberikan kepada pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan yang lain atau sesama tenaga farmasi, karena pengetahuan tentang obat yang didapatkan oleh seorang farmasis bisa saja berbeda dengan farmasis yang lain.
3. Menyediakan informasi untuk kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan obat. Pemberian onformasi mengenai obat selain kepada pasien maupun tenaga kesehatan yang lain, informasi mengenai obat dibutuhkan juga dalam hal kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat misalnya kebijakan obat-obat yang dimasukkan dalam formularium RS.

(Rikomah, 2016: 38)

Pelayanan informasi obat dilakukan secara merata dan menyeluruh di lingkungan dimana ada pasien, sasaran informasi obat tersebut yaitu:

1. Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan juga perlu diberikan informasi mengenai obat oleh farmasis, tenaga kesehatan tersebut yaitu dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, asisten apoteker, dan lain-lain.

2. Pihak lain yaitu manajemen, tim/kepanitiaan klinik

Pemberian informasi mengenai obat juga diberikan kepada pihak manajemen RS, atau apotek ataupun klini dalam hal pengadaan obat, penyimpanan serta

distribusi obat, pemberian informasi ini juga diberikan kepada tim kepanitiaan klinik untuk membantu dalam pembuatan kebijakan pengobatan kepada pasien.

### 3. Pasien atau keluarga pasien

Pasien atau keluarga pasien sangat dianjurkan untuk diberikan informasi mengenai obat, karena pasien berasal dari lapisan ekonomi dan latar belakang pendidikan yang berbeda, saat melakukan pemberian informasi mengenai obat juga bahasa untuk komunikasi harus disesuaikan dengan keadaan pasien (Rikomah, 2016: 39).

## 2. **Konseling**

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, farmasik tidak sekedar meracik obat untuk pasien, namun interkasi dengan pasien dan profesi kesehatan lain, sehingga dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dengan tujuan untuk memberikan pelayanan informasi obat dan konseling.

Konseling adalah diskusi, nasehat, edukasi tentang penyakit dan pengobatan sehingga pasien memperoleh keuntungan yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan perawatannya. Konseling bukan sekedar pemberian informasi, konseling secara psikologi membantu memecahkan masalah kesehatan pasien, ikut mengusahakan kualitas hidup pasien. Konseling memberikan empati, dukungan, membesarkan hati, arahan dan saran kepada pasien (Rikomah, 2016: 44).

Manfaat konseling bagi farmasis yaitu *legal protection*, memelihara status profesional sebagai bagian tim kesehatan, meningkatkan kepuasan pekerjaan,

mengurangi stress pekerjaan, tambahan pelayanan untuk mengikat pasien dan membantu dalam berkompetisi, meningkatkan pendapatan melalui pembayaran saat pelayanan konseling dan mengurangi kehilangan pasien (Rikomah, 2016: 45).

Tujuan konseling yaitu menciptakan hubungan dengan pasien dan membentuk trust, memperlihatkan perhatian dan asuhan pada pasien, membenatu pasien mengatur dan adaptasi penyakitnya, mencegah atau meminimalkan maslaah yang berhubungan dengan efek samping, efek yang tidak dikehendaki dan kepatuhan baik sekarang atau yang akan datang, meningkatkan kapasitas pasien untuk menyelesaikan masalah kesehatan (Rikomah, 2016: 45).

#### **D. Tinjauan dalam Islam**

Dijelaskan dalam Surah Al Ashr Ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٣﴾ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“ Demi masa (1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian (2) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran (3) (QS. Al Ashr: 1 - 3)

Suatu ayat yang menegaskan bahwa semua manusia diliputi oleh kerugian yang besar dan beraneka ragam. Ayat di atas mengecualikan mereka yang melakukan empat kegiatan pokok yaitu : *kecuali orang-orang yang beriman dan beramal amalan-amalan yang saleh, yakni bermanfaat, serta saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran dan ketabahan.* Sementara ulama membagi ajaran agama kepada dua sisi, yakni *pengetahuan dan pengamalan.* Amal saleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan terhenti atau menjadi tiada-akibat

pekerjaan tersebut-suatu mudharat (kerusakan) atau dengan dikerjakannya diperoleh manfaat dan kesesuaian. Amal saleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan (Shihab, M. Quraish. 2002: 587).

Dari ayat diatas, kita diperintahkan untuk saling berwasiat atau saling menasehati antar sesama dalam kebaikan. Seperti halnya dalam membagi ilmu pengetahuan yang kita ketahui kepada masyarakat agar dapat memberikan manfaat.

Selain itu dijelaskan pula dalam surah Az Zumar ayat 9:

أَمَّنْ هُوَ قَدِيتُ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Apakah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang yang dapat menarik pelajaran adalah Ulul Albab.” (QS. Az Zumar: 9).

Ayat diatas menegaskan perbedaan sikap dan ganjaran yang akan mereka terima dengan sikap dan ganjaran bagi orang-orang beriman. Allah berfirman : *Apakah orang yang beribadah secara tekun dan tulus diwaktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri secara mantap demikian juga yang rukuk dan duduk atau berbaring, sedang ia terus-menerus takut kepada siksa akhirat dan dalam saat yang sama senantiasa mengharapkan rahmat Tuhannya sama dengan mereka yang baru berdoa saat mendapat musibah dan melupakan – Nya ketika memperoleh nikmat serta menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu? Tentu saja tidak sama! Katakanlah: “Adakah*

*sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dan mengesakan – Nya dengan orang-orang yang idak mengetahui hak Allah dan mengkufuri-Nya” “Sesungguhnya orang yang dapat menarik banyak pelajaran adalah Ulul Albab, yakni orang-orang yang cerh pikirannya. (Shihab, M. Quraish. 2002: 453).*

Ayat tersebut menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui suatu ilmu. Hal ini terkait dengan penelitian ini yang membandingkan pengetahuan responden sebelum dan setelah diberikan konseling karena tentunya akan terdapat perbedaan antara responden yang belum sama sekali mendapatkan konseling dan responden yang telah memberikan konseling.

Dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ  
بِلْجَامٍ مِّنْ نَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [رواه أبو داود]

Terjemahnya:

*“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu dirahasiakannya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka (HR. Abu Daud).*

Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa seorang konselor harus menyampaikan suatu informasi yang benar kepada kliennya agar klien dapat terbebas dari permasalahan yang dihadapinya. Dimana dalam penyampaian ini konselor menyampaikan kebenaran yang ada tentang apa-apa saja yang diketahui tentang pencegahan dan pengentasan permasalahan kliennya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *non eksperimental* dengan rancangan penelitian analitik observasional dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu penelitian dengan menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. (Siswanto, dkk. 2015: 10).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian.**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Puskesmas Pampang, yaitu di jalan pampang II No. 28 A, Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Bulan Mei 2017

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional studi *one group pre-post test*. Rancangan penelitian dilakukan dengan pengukuran pengetahuan terhadap kelompok responden yang diberikan perlakuan atau intervensi berupa konseling dan diukur kembali setelahnya. Penelitian observasional adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Siswanto, dkk. 2015: 15).

## **D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang membawa anaknya yang menderita diare untuk berobat ke Puskesmas Pampang kota Makassar.

### **2. Sampel**

Sampel penelitian adalah semua ibu yang membawa anaknya yang menderita diare untuk berobat ke Puskesmas Pampang kota Makassar yang memenuhi kriteria inklusi.

#### **a. Kriteria Inklusi**

- 1) Memiliki anak  $\leq 5$  tahun
- 2) Anak di diagnosa diare
- 3) Menandatangani *informed consent*

#### **b. Kriteria Eksklusi**

Ibu bukan penduduk tetap di wilayah Pampang

#### **c. Kriteria Drop Out**

Ibu pasien tidak dapat dihubungi atau di follow up

### **3. Besar Sampel**

Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sampel dengan besar populasi  $< 1000$ , maka ditentukan dengan rumus menurut Taro Yamane dan Slovin (2015) :

$$n = \frac{1}{1-f} \times \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$$n = \frac{1}{1-0,05} \times \frac{30}{1+30(0,05^2)} = 30$$

Keterangan :

- $n$  : Jumlah sampel  
 $N$  : Jumlah populasi  
 $d$  : Tingkat signifikansi ( $d = 0,05$ )  
 $f$  : Kemungkinan drop out (5%)

#### 4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Non probability sampling* dengan menggunakan metode *Consecutive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Siswanto, dkk. 2015: 227).

#### E. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang telah diisi lengkap oleh responden yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data secara *consecutive sampling*.

##### 1. Variabel Penelitian

- a. Variabel bebas : Konseling
- b. Variabel terikat : Tingkat pengetahuan ibu terhadap terapi diare pada balita.

##### 2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Angket (Kuesioner). Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan

kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti (Kusumah. 2011: 78). Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, dimana dalam kuesioner ini jawaban sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih (Siswanto, dkk. 2015: 271).

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang variabel atau objek yang sedang diteliti. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa angket seperti yang terdapat pada lampiran.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala guttman. Skala guttman menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten, yaitu ya-tidak, positif-negatif, tinggi-rendah, yakin-tidak yakin, setuju-tidak setuju. Penggunaan skala guttman disebut juga *scalogram* atau analisis skala (*scale analysis*) sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sikap yang diteliti (Nazir, 2005: 340).

Penilaian	Skor
Benar	1
Salah	0

#### **G. Teknik Pengujian Instrumen**

Instrumen angket (kuesioner) harus diukur validitas dan reliabilitas datanya sebelum digunakan kepada sampel target sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliabel.

## 1. Uji Validitas

Menurut Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (2011:124) validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Apabila peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitiannya, maka kuesioner yang disusun harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Uji validitas umumnya dilakukan dengan mengukur korelasi antar variabel atau item dengan skor total variabel. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan/ Pernyataan diuji validitasnya.

Dalam program SPSS digunakan *Pearson Product Moment Correlation-Bivariate* dan membandingkan hasil uji *Pearson Correlation* dengan  $r_{tabel}$ . Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Prayitno, 2012:101)

Berdasarkan nilai korelasi:

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item dinyatakan valid
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item dinyatakan tidak valid

Berdasarkan signifikansi:

- a. Jika nilai signifikansi  $> \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan tidak valid
- b. Jika nilai signifikansi  $< \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan valid

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji validitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/ pernyataan.
- b. Menghitung skor total jawaban responden.

- c. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *correlation bivariate*
- d. Membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$
- e. Menyortir item yang valid dan tidak valid

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah keterpercayaan. Instrumen dikatakan dapat dipercaya atau reliabel apabila memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten (Siswanto dkk, 2015: 310).

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai lebih dari satu kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten (Singarimbun dan Effendi, 2011:142-144). Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*.

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan uji coba instrumen satu kali saja dengan melihat nilai *alpha cronbach*. *Cronbach Alpha* merupakan sebuah ukuran keandalan yang memiliki nilai berkisar dari nol sampai satu (Hair *et al.*, 2010: 92).

Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012:53) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan

diatas 0,8 adalah baik. Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai  $r_{tabel}$  menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikan 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini). Kriteria rebilitasnya yaitu (Wibowo, 2012; 52):

- a. Jika  $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$  maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliable
- b. Jika  $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$  maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*
- c. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan  $r_{tabel}$

#### **H. Analisis Data Penelitian**

##### 1. Skala Pengukuran

Sumber yang diambil berasal dari jawaban kuesioner yang dikoding dalam bentuk angka, oleh karena itu pada penelitian ini digunakan skala numerik.

##### 2. Analisis data

Data dianalisis akan menggunakan bantuan *software SPSS* versi 22.0 dan tahap kepercayaan yang dipilih adalah 95%

a. Analisis univariat

Analisis univariat menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran distribusi karakteristik responden, tingkat pengetahuan tentang penanganan diare dan jawaban responden untuk pertanyaan pada kuesioner.

b. Analisis bivariat

Uji T-test dengan alternatif uji *Wilcoxon signed rank test*

Sebelum dilakukan uji bivariat, dilakukan uji normalitas terlebih dahulu menggunakan *Shapiro-Wilk*. Jika data terdistribusi normal, maka uji bivariat yang digunakan adalah uji T-test. Jika data terdistribusi tidak normal, maka digunakan uji alternatif yaitu menggunakan uji *Wilcoxon signed rank test*. Syarat uji *Wilcoxon signed rank test* adalah penelitian menggunakan 2 kelompok berpasangan dan skala pengukuran yang digunakan adalah skala kategorik (ordinal). Uji bivariat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang bermakna pada tingkat pengetahuan ibu-ibu dalam penanganan diare balita, *pre-test* dan *post-test* setelah diberikan konseling. Interpretasi data uji *Wilcoxon* adalah dengan memperhatikan nilai p. Jika nilai  $p < 0,05$  maka terdapat perbedaan antara sebelum dengan sesudah pemberian intervensi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil Penelitian*

##### 1. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah semua ibu yang membawa anaknya yang menderita diare untuk berobat ke Puskesmas Pampang kota Makassar pada bulan Mei 2017 yakni sebanyak 30 ibu yang menjadi responden dan memenuhi kriteria inklusi sampel.

##### 2. Pengujian Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui validitas (ketepatan) dan reliabilitas (ketetapan) instrumen penelitian, sebelum digunakan untuk penjarangan data yang sebenarnya. Instrumen yang digunakan selanjutnya dalam penelitian adalah yang telah memenuhi kriteria valid dan reliabel, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan.

##### a. Hasil Uji Validitas Angket

Tabel 1. Distribusi nilai uji validitas kuesioner

Item Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
P 1	0,479	0.361	Valid
P 2	0,574	0.361	Valid
P 3	0,456	0.361	Valid
P 4	0,481	0.361	Valid
P 5	0,712	0.361	Valid
P 6	0,481	0.361	Valid
P 7	0,712	0.361	Valid
P 8	0,571	0.361	Valid
P 9	0,481	0.361	Valid
P 10	0,531	0.361	Valid

P 11	0,481	0.361	Valid
P 12	0,694	0.361	Valid
P 13	0,663	0.361	Valid
P 14	0,452	0.361	Valid
P 15	0,557	0.361	Valid
P 16	0,494	0.361	Valid
P 17	0,452	0.361	Valid
P 18	0,611	0.361	Valid
P 19	0,387	0.361	Valid
P 20	0,475	0.361	Valid

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini  $r_{tabel}$  dengan  $N=30$  dan  $\alpha=0,05$  adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan bahwa semua pernyataan yang terdapat dalam kuesioner adalah valid.

#### b. Hasil Uji Reliabilitas Angket

Tabel 2. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel bukti fisik

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.796	20

Dari tabel perhitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas kuesioner adalah 0.796. Untuk melihat apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, digunakan  $r_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka instrumen yang digunakan reliabel. Nilai  $r_{tabel}$  dari  $N = 30$  pada  $\alpha = 5\%$  adalah 0.361. Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS diketahui nilai koefisien alpha sebesar 0.796 dan nilai  $r_{tabel}$  adalah 0.361. Dengan demikian nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $0.796 > 0.361$  maka instrumen kuesioner yang digunakan dinyatakan reliabel.




### 3. Karakteristik Responden


Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	N (total=100)	%
<b>Usia Responden (tahun)</b>		
16 – 20	1	3,3
21 – 25	5	16,7
26 – 30	6	20
31 – 35	13	43,3
> 35	5	16,7
<b>Usia Anak (tahun)</b>		
0 – 1	6	20
1 – 2	8	26,7
2 – 3	11	36,7
3 – 4	2	6,7
4 – 5	3	10
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
Tidak tamat SD	-	-
SD	8	26,7
SMP	9	30
SMA/SMK	8	26,7
Perguruan Tinggi	5	16,7
<b>Pekerjaan</b>		
Tidak/Belum Bekerja	28	93,3
Karyawan	2	6,7
Guru	-	-
Pegawai Negeri	-	-

Dari tabel tersebut di atas didapatkan bahwa kelompok usia responden terbanyak adalah usia 31-35 tahun (43,3 %) dan kelompok yang paling sedikit adalah usia 15 – 20 tahun sebanyak 3,3 %. Usia anak terbanyak adalah 2 -3 tahun (36,7%) dan kelompok usia anak paling sedikit adalah 3 – 4 tahun sebanyak 6,7%. Tingkat pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah SMP (30%). Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan pengetahuan seseorang. Pada

karakteristik pekerjaan responden terbanyak tidak/belum bekerja yaitu dengan persentase 93,3 %.





Tabel 4. Distribusi frekuensi responden berdasarkan penanganan diare

Jenis Penanganan	N	%
Diobati sendiri	1	3,3
Tidak diobati	-	-
Sarana Kesehatan	27	90
Menggunakan ramuan tradisional	2	6,7
Jumlah	30	100

Dari 30 responden yang masuk dalam kriteria inklusi penelitian, dapat kita lihat gambaran mengenai penanganan diare pada keluarga responden didapatkan 27 responden (90%) menangani diare pada keluarganya dengan membawa ke sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik). Terdapat 2 responden (6,7%) menggunakan ramuan tradisional dalam menangani diare dan 1 responden (3,3%) melakukan pengobatan sendiri lebih dulu.

Tabel 5. Distribusi penggunaan obat diare pada balita

Nama Obat	N	%
Tidak mengobati	18	60
probiotik	1	3,3
oralit	9	30
zinc	2	6,7
Jumlah	30	100


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jika balita mengalami diare, obat yang paling banyak digunakan oleh ibu-ibu di wilayah puskesmas Pampang kota Makassar adalah oralit yaitu sebanyak 9 responden dengan persentase sebesar 30%. Terdapat 1 responden (3,3%) yang menggunakan probiotik dalam menangani diare, sebanyak 2 responden (6,7%) menggunakan zinc dalam mengobati diare dan sebanyak 18 responden (60%) memilih untuk tidak mengobati tetapi memilih untuk membawa balitanya langsung ke sarana kesehatan.

Tabel 6. Distribusi Persentasi Pengetahuan Ibu

Responden	Nilai <i>Pre test</i>	Nilai <i>Post test</i>	Perubahan Skor Pengetahuan (%)
1	18	20	6,6
2	15	20	16,6
3	17	20	10
4	16	19	10
5	16	20	13,3
6	11	20	30
7	14	19	16,6
8	17	20	10
9	16	20	13,3
10	19	20	3,3
11	7	20	43,3
12	16	19	10
13	19	20	3,3
14	9	20	36,6
15	16	20	13,3
16	17	20	10
17	14	19	16,6
18	18	20	6,6
19	19	20	3,3
20	16	20	13,3
21	16	20	13,3
22	8	20	40
23	16	20	13,3
24	19	20	3,3
25	12	20	26,6
26	16	20	13,3
27	8	20	40
28	16	20	13,3
29	18	20	6,6

30	17	20	10
----	----	----	----

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua responden memiliki nilai *post test* yang lebih besar dari nilai *pre test* dimana perubahan skor pengetahuan tertinggi adalah 43,3 %. Secara spesifik akan dijabarkan pada grafik perbandingan perolehan nilai *pre test* dan *post test* responden berikut ini.




Tabel 7. Distribusi Frekuensi Hasil Pengisian Kuesioner

Pernyataan	Pre test				Post test			
	Jumlah Benar	%	Jumlah Salah	%	Jumlah Benar	%	Jumlah Salah	%
1	9	30	21	70	29	96,7	1	3,3
2	24	80	6	20	30	100	0	0
3	8	26,7	22	73,3	29	96,7	1	3,3
4	27	90	3	10	30	100	0	0
5	27	90	3	10	30	100	0	0
6	27	90	3	10	29	96,7	1	3,3
7	27	90	3	10	30	100	0	0
8	28	93,3	2	6,7	30	100	0	0
9	27	90	3	10	30	100	0	0
10	28	93,3	2	6,7	30	100	0	0
11	27	90	3	10	30	100	0	0

12	27	90	3	10	30	100	0	0
13	26	86,7	4	13,3	30	100	0	0
14	28	93,3	2	6,7	30	100	0	0
15	4	13,3	26	86,7	30	100	0	0
16	15	50	15	50	30	100	0	0
17	29	96,7	1	3,3	30	100	0	0
18	28	93,3	2	6,7	29	96,7	1	3,3
19	17	56,7	13	43,3	30	100	0	0
20	24	80	6	20	30	100	0	0

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pernyataan pada kuesioner *pre test* yang memiliki jumlah benar paling banyak adalah pernyataan nomor 17 yakni sebanyak 29 (96,7%) dan jumlah salah yang paling banyak adalah pernyataan nomor 15 yakni sebanyak 26 (86,7%). Sedangkan pada kuesioner *pos test* sebanyak 26 responden memiliki jumlah benar 30 (100%) dan sebanyak 4 responden memiliki jumlah benar 29 (96,7%).



Tabel 8. Hasil analisis uji Wilcoxon

		N
Tingkat pengetahuan Post-test dan Pre-test	Negatif	0 <sup>a</sup>
	Positif	30 <sup>b</sup>
	Ties	0 <sup>c</sup>
	Total	30

- a. Skor pengetahuan Post Test < Skor pengetahuan Pre test
- b. Skor pengetahuan Post Test > Skor pengetahuan Pre test
- c. Skor pengetahuan Post Test = Skor pengetahuan Pre test

Dari data tabel tersebut menunjukkan perbandingan tingkat pengetahuan *pre-test* dan *post-test*. Terdapat 30 orang dengan hasil pengetahuan setelah *post test* lebih besar dari pada *post-test* dan tidak ada responden yang tidak memiliki tingkat pengetahuan yang lebih kecil dan sama setelah dilakukan *post-test*.

Tabel 9. Hasil data statistik uji Wilcoxon

Tingkat Pengetahuan	N	<i>p</i>
Pre – test	30	0,000
Post – test	30	0,000

Berdasarkan tabel diatas hasil data statistik uji Wilcoxon menunjukkan nilai *significancy* dari kedua kelompok data adalah 0,000 ( $p < 0,05$ ) sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang bermakna antara hasil *pre-test* dengan *post-test*.

## **B. Pembahasan**

Diare adalah buang air besar (BAB) encer atau bahkan dapat berupa air saja (mencret) biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari. Diare terdiri dari diare akut, diare persisten dan diare kronik. Diare akut adalah BAB dengan frekuensi yang meningkat dan konsistensi tinja yang lembek atau cair dan bersifat mendadak datangnya dan berlangsung dalam waktu < 2 minggu. Diare persisten adalah diare akut dengan atau tanpa disertai darah dan berlanjut sampai 14 hari atau lebih. Diare kronik adalah diare yang berlangsung > 4 minggu (Ariani, Ayu Putri, 2016: 12). Adapun jenis diare yang di alami oleh balita di Puskesmas Pampang kota Makassar tidak diketahui karena pihak puskesmas tidak mengkategorikan secara spesifik jenis diare yang di alami oleh pasien.

Konseling pasien dapat didefinisikan sebagai penyedia informasi, saran atau nasehat tentang obat baik dalam bentuk oral atau tertulis kepada pasien atau yang mewakili mengenai efek samping, penyimpanan, diet dan perubahan gaya hidup. Konseling tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga terhadap pengobatan. Kepatuhan tidak hanya di pengaruhi dari faktor pasien saja, melainkan juga dipengaruhi oleh tenaga kesehatan yang tersedia, pemberian pengobatan yang kompleks, sistem akses dan pelayanan kesehatan (Rikomah, 2016: 45).

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek penelitian atau responden (Notoatmodjo, 2010: 17).

Adapun perbandingan hasil dari penelitian sebelumnya (Setiabudi, Felicia Marsella. 2015) tentang pengaruh edukasi terhadap pengetahuan ibu-ibu di kecamatan Patrang dalam penanganan diare pada balita dimana penelitian ini menggunakan media leaflet untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu pada penanganan diare pada balita sedangkan pada penelitian ini mengukur tingkat pengetahuan ibu melalui konseling kefarmasian oleh apoteker.

Dalam penelitian ini digunakan angket atau kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu setelah diberikan konseling. Kuesioner yang digunakan terdiri dari *pre-test* dan *post-test*. Konseling diberikan setelah pemberian *pre-test* dan peneliti akan kembali memberikan *post-test* setelah 10 hari kedepan untuk mengukur atau mengevaluasi pengetahuan pasien. Dalam hal ini evaluasi dilakukan setelah 10 hari dengan alasan yaitu merujuk kepada penggunaan terapi standar yakni penggunaan zinc untuk diare.

Hasil distribusi karakteristik responden menunjukkan bahwa kelompok usia responden terbanyak adalah usia 31-35 tahun (43,3 %) dan kelompok yang paling sedikit adalah usia 15 – 20 tahun sebanyak 3,3 %. Karakteristik responden berdasarkan usia anak menunjukkan kelompok usia anak tertinggi yang mengalami diare adalah usia 2 – 3 tahun (36,7%) dan kelompok usia anak paling sedikit mengalami diare adalah usia 3 – 4 tahun sebanyak 6,7%. Tingkat pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah SMP (30%), SD (26,7%), SMA/SMK (26,%), Perguruan tinggi (16,7%) dan kelompok yang paling sedikit adalah tidak tamat SD yaitu 0%. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan

pengetahuan seseorang. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa (Ariani, Ayu Putri, 2016: 121). Pada karakteristik pekerjaan responden terbanyak tidak/belum bekerja yaitu dengan persentase 93,3 %, jenis pekerjaan umumnya berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pendapatan atau sosial ekonomi. Sosial ekonomi mempunyai pengaruh langsung terhadap faktor-faktor penyebab diare. Kebanyakan anak yang mudah menderita diare berasal dari keluarga besar dengan daya beli yang rendah, kondisi rumah yang kurang baik, tidak mempunyai penyediaan air bersih yang memenuhi syarat dan tidak adanya kamar mandi atau jamban sehat. Status sosial ekonomi yang rendah akan mempengaruhi status gizi anggota keluarga. Hal ini nampak dari ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga khususnya pada anak balita sehingga mereka cenderung memiliki status gizi kurang bahkan status gizi buruk yang memudahkan balita tersebut terkena diare. Mereka yang berstatus ekonomi rendah biasanya tinggal di daerah yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga memudahkan seseorang untuk terkena diare.

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi responden dalam menangani diare menunjukkan bahwa banyaknya responden yang memilih membawa keluarganya ke sarana kesehatan yakni sebanyak 90% yang dalam hal ini adalah puskesmas. Oleh karena itu perlu adanya pelayanan yang lebih baik oleh tenaga kesehatan salah satunya adalah dengan melakukan konseling terhadap pasien atau keluarga pasien

agar mereka dapat mengetahui cara tepat dalam penanganan obatnya serta hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung dalam proses penyembuhannya.

Hasil distribusi penggunaan obat diare menunjukkan bahwa sebanyak 60% ibu memilih untuk tidak mengobati balita namun memilih untuk langsung membawa anaknya ke sarana kesehatan. Adapun obat yang paling banyak digunakan oleh ibu-ibu untuk penanganan awal di rumah adalah oralit yaitu sebanyak 30%. Oralit merupakan pengganti cairan tubuh yang digunakan sebagai alternatif pertama untuk menangani diare. Selanjutnya obat yang biasa digunakan oleh ibu adalah probiotik. Probiotik digunakan untuk mengembalikan keseimbangan flora normal usus dan menghambat pertumbuhan organisme patogen pada saluran cerna, serta mengurangi keadaan intoleransi laktosa. Bakteri probiotik dapat dipakai sebagai cara untuk pencegahan dan pengobatan diare baik yang disebabkan rotavirus maupun mikroorganisme lain, maupun diare yang disebabkan oleh karena pemakaian antibiotika yang tidak rasional (Subijanto, dkk. 2010: 21). Pengobatan selanjutnya yang digunakan ibu adalah dengan pemberian zinc. Tablet zinc berguna untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi volume tinja dan menurunkan kekambuhan diare pada tiga bulan berikutnya. Zinc merupakan salah satu zat gizi mikro yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Zinc yang ada dalam tubuh akan menurun dalam jumlah besar ketika anak mengalami diare. Pemberian zinc mampu menggantikan kandungan zinc alami tubuh yang hilang tersebut dan mempercepat kandungan zinc alami tubuh yang hilang tersebut dan mempercepat penyembuhan diare. Kemampuan zinc untuk mencegah diare terkait

dengan kemampuannya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Zinc merupakan mineral penting bagi tubuh. Penggunaan suplemen zinc pada balita yang mengalami diare masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 6,7 % dari 30 responden. Padahal penggunaan suplemen zinc perlu ditingkatkan guna mengurangi angka kejadian diare pada balita. Masyarakat kemungkinan masih kurang memahami akan kegunaan dari suplemen zinc yang digunakan sebagai pelengkap untuk pengobatan diare pada balita. Dalam hal ini menjadi tugas tenaga kesehatan yaitu apoteker sebagai pelayanan kefarmasian untuk menjelaskan kegunaan dan cara penggunaan zinc yang tepat kepada pasien yakni dengan melakukan konseling. Dimana pemberian pada balita yang menderita diare tetap dilakukan selama 10 hari meskipun diare sudah sembuh. Hal ini ditujukan untuk mengganti zinc yang hilang dari tubuh dan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya diare kembali selama tiga bulan berikutnya (Perangin-angin, 2014: 13).

Dalam penelitian ini dilakukan konseling tentang penggunaan obat diare yang baik dan benar. Konseling dilaksanakan oleh apoteker dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pasien tentang penggunaan obat yang baik dan benar, meningkatkan kepatuhan pasien dan untuk mengoptimalkan efek terapi. Dalam hal ini terapi standar puskesmas untuk obat diare adalah oralit dan zinc.

Hasil *pre-test* pada kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan yang paling banyak tidak diketahui oleh sang ibu adalah pernyataan ke 15. Dimana rata-rata ibu menjawab benar bahwa anak dibawah 5 tahun yang mengalami diare boleh diberi obat antibiotik padahal jawaban yang sebenarnya adalah salah yakni anak dibawah 5

tahun yang mengalami diare tidak boleh langsung diberikan antibiotik namun sebaiknya digunakan oralit dahulu sebagai lini pertama untuk dehidrasi dan pemberian zinc. Menurut ibu jawaban benar di berikan berdasarkan pengalaman yang dialami biasanya pada saat mendapatkan obat untuk anaknya yang menderita diare. Dalam hal ini menjadi peran farmasis dalam memperhatikan kembali peresepan obat yang diberikan kepada pasien utamanya anak balita terlebih dalam pemberian antibiotik. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2011 antibiotik hanya diberikan sesuai indikasi seperti disentri, kolera dll. Sehingga dalam hal ini pemberian antibiotik pada anak sebaiknya tidak diberikan. Hasil *post test* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan pada ibu, dimana semua ibu menunjukkan nilai *post test* yang lebih besar dibandingkan nilai *pre test*.

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang bermakna antara hasil *pre-test* sebelum diberikan konseling dengan *post-test* setelah diberikan konseling. Hal ini menyatakan bahwa konseling dapat memberikan efek positif pada tingkat pengetahuan pasien sehingga konseling dapat menjadi salah satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yakni farmasis agar membantu dalam mencapai efek terapi yang diharapkan terutama dalam pelayanan kesehatan mulai dari posyandu, puskesmas sampai rumah sakit dimana ada pemberian obat yang harus disertai dengan pemberian konseling untuk meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan terapi pasien.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan konseling terhadap tingkat pengetahuan ibu pada terapi diare balita di Puskesmas Pampang kota Makassar hal tersebut dibuktikan melalui data statistik uji *Wilcoxon signed rank test* dengan nilai *significancy* dari kedua kelompok data *pre-test* dan *post-test* yaitu *p-value* < 0,05.

#### **B. Saran**

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pampang kota Makassar, maka pihak Puskesmas Pampang perlu:

1. Menambahkan profesi Apoteker yang khusus bertanggung jawab dalam pemberian obat dan konseling kepada pasien.
2. Adanya ruangan khusus untuk pemberian konseling kepada pasien agar konseling dapat berjalan dengan baik dan privasi pasien dapat terjaga.

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KEPUSTAKAAN

Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud, Juz 3, h. 360, hadits 3660

Al-Qur'an

Ariani, Ayu Putri. *Diare: Pencegahan dan Pengobatannya*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2016

Depkes RI. *Lintas Diare*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI Direktorat jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2011

Depkes RI. *Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian Di Sarana Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. 2007

Depkes RI. *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2009

DiPiro, Joseph T dkk. *Pharmacotherapy Handbook Ninth Edition*. New York: Medical. 2015

Febri, Ayu Bulan dkk. *Smart Parents: Pandai mengatur menu dan tanggapan saat anak sakit*. Jakarta: Gagas Media. 2010

Hair, J.F, et. al. *Multivariate Data Analysis with Reading 4rd Edition*. New Jersey: Prentice Hall Internationa. 2010.

Heri D.J. Maulana, *Promosi Kesehatan*. Jakarta: EGC. 2009

Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia. 2005.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an. 2014


Kementerian Kesehatan RI. *Infodatin: Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014

Kementerian Kesehatan RI. *Panduan Sosialisasi Tatalaksana Diare Balita*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011

Kementerian Kesehatan RI. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013

Kementrian Kesehatan RI. *Situasi Diare di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015

- Khikmah, Furi Ainun. *Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Diare Dengan Kejadian Diare Pada Balita Usia 2-5 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012
- Kusuma, Ardian Budi. *Kefektifan Konseling Kepada Ibu Terhadap Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Kejadian Diare Akut Anak Balita di Puskesmas Serayu Larangan Kabupaten Purbalingga*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2009
- Kusumah, W. & Dedi D. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Indeks. 2011.
- Lapau, B. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- Motto, Stephany Y dkk. *Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Diare Pada Anak di Puskesmas Bahu Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2013
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005
- Notoatmodjo, s. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010
- Papadopoulos, John. *Pocket Guide to Critical Care Pharmacotherapy Second Edition*. New York: Springer. 2015
- Prayitno. *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan UNP. 2012.
- Priyanto, Agus & Lestari, Sri. *Endoskopi Gastrointestinal*. Jakarta: Salemba Medika. 2008
- Rikomah, Setya Enti. *Farmasi Klinik*. Yogyakarta: Deepublish. 2016
- Sekaran & Wibowo. *Manajemen Kerja Edisi Ke-3*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Setiabudi, Felicia Marsella. *Pengaruh edukasi terhadap pengetahuan ibu-ibu dikecamatan patrang dalam penanganan diare pada balita*. Fakultas Farmasi Universitas Jember. 2015
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al – Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Singarimbun, M. & Soffian E. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. 2011.
- Siswanto, dkk. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. Yogyakarta: Bursa Ilmu. 2015.

**Lampiran 1. Skema Kerja Penelitian**

## Lampiran 2. Panduan Konseling

Topik : Terapi diare pada balita

Metode : Konseling

Penyuluh : Apoteker

Sasaran : Ibu anak

Tempat : Puskesmas Pampang kota Makassar

### A. Tujuan

Setelah mendapatkan penyuluhan, diharapkan ibu mengerti tentang terapi diare pada anak yang baik dan benar.

### B. Pokok-pokok Materi Penyuluhan

1. Definisi diare
2. Penyebab, gejala dan cara penularan penyakit diare
3. Terapi Farmakologi dan Non Farmakologi diare

### C. Kegiatan Konseling

Tahap Kegiatan	Kegiatan Konselor	Kegiatan Ibu
Pembukaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi salam</li> <li>2. Menyapa Ibu</li> <li>3. Memperkenalkan diri</li> <li>4. Pre test</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjawab salam</li> <li>2. Membahas</li> <li>3. Membalas</li> <li>4. Mengisi Pre test</li> </ol>
Isi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan definisi diare</li> <li>2. Menerangkan penyebab, gejala dan cara penularan penyakit diare</li> <li>3. Menjelaskan terapi farmakologi dan terapi non farmakologi diare</li> <li>4. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya dan mengemukakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendengarkan</li> <li>2. Mendengarkan</li> <li>3. Mendengarkan</li> <li>4. Bertanya dan mengemukakan</li> </ol>

	<p>masalah</p> <p>5. Menjawab pertanyaan dan memberi jalan keluar permasalahan</p>	<p>masalah</p> <p>5. Mendengarkan</p>
Penutup	<p>1. Post test</p> <p>2. Menyimpulkan</p> <p>3. Menutup penyuluhan</p>	<p>1. Mengisi post test</p> <p>2. Mendengarkan dan menjawab salam</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

**Lampiran 3. Kuesioner Penelitian**

**KUESIONER *PRE-TEST/POST-TEST***  
**HUBUNGAN KONSELING TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN IBU**  
**PADA TERAPI DIARE BALITA DI PUSKESMAS PAMPANG**  
**KOTA MAKASSAR**

NO.

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
4. No.Telp/HP :
5. Pendidikan terakhir : a. Tidak tamat SD  
 b. SD atau sederajat  
 c. SMP  
 d. SMA/SMK  
 e. Perguruan Tinggi D3/S1/S2  
 (Jurusan.....)
6. Pekerjaan : a. Tidak/belum bekerja  
 b. Karyawan  
 c. Guru  
 d. Pegawai negeri (.....)  
 e. Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

## II. PENDAHULUAN

1. Jika ada keluarga yang mengalami diare, tindakan apa yang biasanya anda lakukan?

- a. Diobati sendiri      c. Ke Tenaga Kesehatan (dokter, puskesmas, RS)  
b. Tidak diobati      d. Menggunakan ramuan tradisional

2. Apakah anak anda pernah mengalami diare, obat apa yang biasa anda berikan pada anak?

Jawab: .....

## III. PENGETAHUAN TENTANG PENANGANAN DIARE

NO	PERNYATAAN	BENAR	SALAH
1.	Diare merupakan penyakit yang tidak berbahaya karena diare hanya menyerang umur tertentu saja.		
2.	Penyakit diare biasanya ditandai dengan keluarnya tinja lunak atau cair tiga kali atau lebih dalam satu hari.		
3.	Diare tidak bersifat fatal karena tidak menyebabkan kematian.		
4.	Diare mudah menyerang anak karena ditularkan lewat media yang dekat dengan manusia (peralatan rumah tangga, alat makan, pakaian, dan lain-lain).		
5.	Diare dapat menyerang anak di rumah karena kondisi lingkungan disekitar rumah yang tidak sehat atau kurang bersih, dan pembuangan tinja yang tidak sehat.		
6.	Diare dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan gizi anak.		
7.	Diare dapat menyebabkan lemas, kekurangan cairan (dehidrasi), berat badan berkurang, dan berkurangnya nafsu makan bila tidak segera ditangani.		
8.	Penanganan awal diare pada anak adalah mencegah terjadinya kekurangan cairan (dehidrasi) yaitu harus diberikan air minum yang lebih banyak.		

9.	Tanda-tanda anak mengalami dehidrasi adalah gelisah/rewel, mulut kering, mata cekung, tampak kehausan.		
10.	Anak yang mengalami diare lebih dari 2 hari, muntah berulang, demam, tinja berdarah atau berlendir, perlu penanganan khusus (dibawa ke dokter atau rumah sakit).		
11.	Anak yang mengalami dehidrasi berat perlu penanganan khusus (dibawa ke dokter atau rumah sakit).		
12.	Anak yang menderita diare perlu diberikan makanan yang dapat merangsang usus untuk bekerja lebih keras, seperti makanan yang bertekstur keras dan mengandung asam.		
13.	Anak yang mengalami diare dan mengkonsumsi susu formula, harus menghentikan terlebih dahulu pemberian susu formula pada anak.		
14.	Ibu tetap memberikan ASI kepada anak yang mengalami diare agar dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang.		
15.	Anak dibawah 5 tahun yang mengalami diare boleh diberi obat antibiotik		
16.	Anak dibawah 5 tahun yang mengalami diare boleh diberi obat bebas yang dibeli di apotik tanpa resep dokter (seperti kaolin, pektat, imodium, dan lain-lain).		
17.	Oralit merupakan alternative pertama penanganan diare anak di rumah.		
18.	Bahan untuk membuat oralit adalah gula, garam, dan air putih matang.		
19.	Larutan oralit harus diberikan pada anak diare semau anak minum dan bila larutan oralit tersebut tidak habis boleh disimpan untuk keesokan harinya.		
20.	Anak yang mengalami diare diberi suplemen zinc untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah terjadinya resiko diare dalam 3 bulan ke depan.		

#### Lampiran 4. Informed Consent

### SURAT PERSETUJUAN (INFORMED CONCENT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konseling terhadap tingkat pengetahuan ibu pada terapi diare balita di Puskesmas Pampang kota Makassar.

Setiap ibu yang menjadi responden akan diajukan beberapa pernyataan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari *pre test* dan *post test* serta akan diberikan konseling kefarmasian tentang terapi diare. Peneliti sangat mengharapkan partisipasi dari ibu – ibu. Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi kita semua.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Alamat/No HP :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian sebagai responden. Saya menyadari bahwa keikutsertaan diri saya pada penelitian ini adalah sukarela. Saya setuju akan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Makassar, Mei 2017

Peneliti

Yang Membuat Pernyataan

(Andi Try Resti Fauziah Sahib)

( )

## Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

### a. Surat izin penelitian pengambilan data di Puskesmas Pampang Kota Makassar

		<b>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR</b> <b>DINAS KESEHATAN</b> Jl. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 881549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221 <small>email: <a href="mailto:dukesskotamakassar@yahoo.co.id">dukesskotamakassar@yahoo.co.id</a> home page: <a href="http://dukesskotamakassar.net">dukesskotamakassar.net</a></small>		
Nomor	: 440/ 5718 /PSDK/XII/2016	Kepada Yth		
Lampiran	: -	Ka. Puskesmas Pampang		
Perihal	: Izin Pengambilan Data	di-		
		Makassar		
			UIN Sehubungan dengan surat dari FAKULTAS FARMASI UIN MAKASSAR No. 6861/Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2016 Tanggal, 07 Desember 2016 perihal tersebut diatas maka dengan ini di sampaikan kepada saudara bahwa :	
			N A M A : ANDI TRI RESTI FAUZIAH SAHIB NIM/PROGRAM : 70100113037 / FARMASI J U D U L : <i>PEJABAT KONSELOR TERHADAP</i> "EVALUASI <i>DATA</i> TINGKAT PENGETAHUAN IBU TERHADAP TERAPI DIARE ANAK DI PUSKESMAS PAMPANG KOTA MAKASSAR"	
			Akan melaksanakan pengambilan data di wilayah kerja saudara, oleh karena itu di mohon kiranya dapat diberikan bantuan seperlunya. Demikian di sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.	
			Makassar, 16 Desember 2016	
			Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar,  Dr. H. ENVAISYAH T. AZIKIN, M.Kes. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19601014 198902 2 001	
			Tembusan : 1. Yang Bersangkutan 2. Arsip	

**b. Surat izin penelitian ditujukan untuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923/Makassar  
Kampus II: Jl. HM. Yasin Limpo No.36 Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400 Samata-Gowa

---

Nomor : B. 65 /FKIK/PP.00.9/04/2017. Samata, 12 April 2017  
Lamp : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah**  
di-  
Makassar.

*Assalamu 'alaikum Wa. Wa.*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Andi Try Resti Fauziah Sahib
NIM	: 70100113073
Program Studi	: Farmasi
Judul Penelitian	: Hubungan Konseling Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Pada Terapi Diare Balita Di Puskesmas Pampang kota Makassar
Dosen Pembimbing	: 1. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. 2. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.

untuk melakukan penelitian.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
*Wassalam.*

an Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns. M. Kes.**  
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip

**c. Surat Izin penelitian ditujukan untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar**

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
 Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

  
**MC**  
 SOBER & SMART CITY

Makassar, 26 April 2017

**K e p a d a**

Nomor : 070 / 1353 -II/BKBP/VI/2017 Yth. **KEPALA DINAS KESEHATAN**  
 Sifat : Di - **KOTA MAKASSAR**  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5327 /S.01.P/P2T/04/2017, Tanggal 20 April 2017, Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **ANDI TRY RESTI FAUZIAH SAHIB**  
 NIM/ Jurusan : 70100113073 / Farmasi  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN  
 Alamat : Jl. Muh. Yasin limpo No.36 samata, Sungguminasa-Gowa  
 Judul : **"HUBUNGAN KONSELING TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN IBU PADA TERAPI DIARE BALITA DI PUSKESMAS PAMPANG KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **26 April s/d 25 Mei 2017**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan **bantuan dan fasilitas** seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. **WALIKOTA MAKASSAR**  
**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**  
 LH. KABITA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

  
**Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.**  
 Pangkat : Penata Tk.I  
 NIP. 196705242006041004

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip

d. **Surat Izin Penelitian ditujukan untuk Kepala Puskesmas Pampang Kota Makassar**

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 881549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221  
email: [dinkes@kotamakassar.go.id](mailto:dinkes@kotamakassar.go.id) home page: [dinkes.kotamakassar.net](http://dinkes.kotamakassar.net)



Nomor : 440/696 /PSDK/IV /2017 Kepada Yth,  
Lampiran : Ka. Puskesmas Pampang  
Perihal : Izin penelitian Di-  
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik ,No. 070/ 1353 - II/BKBP/IV/2017, tanggal 26 April 2017, perihal tersebut di atas,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

NAMA : ANDY TRY RESTI FAUZIAH SAHIB  
NIM : 70100113073  
JURUSAN : FARMASI  
INSTANSI : UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
JUDUL : HUBUNGAN KONSELING TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN IBU PADA TERAPI DIARE BALITA DI PUSKESMAS PAMPANG

Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja saudara, yang akan di laksanakan mulai tanggal 26 April s/d 25 Mei 2017  
Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Makassar, 28 April 2017  
an Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar  
Sekretaris  
  
d. H. Tasmin, M. Kes  
NIP. 19620701198901 1002

**Lampiran 6: Nilai-Nilai r Product Moment ( $r_{\text{tabel}}$ )**

**Nilai-Nilai r Product Moment ( $r_{\text{tabel}}$ )**

N	Tarf Signifikan		N	Tarf Signifikan		N	Tarf Signifikan	
	5 %	1 %		5 %	1 %		5 %	1 %
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,476	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	<b>30</b>	<b>0,361</b>	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,285
9	0,686	0,798	33	0,344	0,422	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,583	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,283
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,173	0,225
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,216
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,149	0,183
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,161
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,488	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,458	0,575	43	0,301	0,389	500	0,068	0,116
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,61			

Sumber: Sugiyono, 2007;188



Pernyataan 11	Pearson Correlation	,218	,389	,201	-.111	-.111	,259	-.111	-.089	,259	-.089	1	,408	,523	,356	,149	,333	-.062	,356	,131	,389	,481
	Sig. (2-tailed)	,247	,034	,287	,559	,559	,167	,559	,640	,167	,640		,025	,003	,053	,432	,072	,745	,053	,491	,034	,007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pernyataan 12	Pearson Correlation	,386	,272	,339	,408	,408	,181	,408	,327	,181	,327	,408	1	,480	,327	,548	,272	,227	,327	-.480	,272	,694
	Sig. (2-tailed)	,035	,146	,067	,025	,025	,337	,025	,077	,337	,077	,025		,007	,077	,002	,146	,227	,077	,007	,146	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pernyataan 13	Pearson Correlation	,257	,294	,237	,196	,523	-.131	,523	,288	-.131	,288	,523	,480	1	,681	,351	,392	,473	,288	-.135	,294	,663
	Sig. (2-tailed)	,171	,115	,208	,299	,003	,491	,003	,122	,491	,122	,003	,007		,000	,057	,032	,008	,122	,478	,115	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pernyataan 14	Pearson Correlation	,175	,200	,161	,356	,356	-.089	,356	-.071	-.089	,464	,356	,327	,681	1	,239	,267	-.050	-.071	-.288	,200	,452
	Sig. (2-tailed)	,355	,288	,395	,053	,053	,640	,053	,708	,640	,010	,053	,077	,000		,203	,153	,795	,708	,122	,288	,012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pernyataan 15	Pearson Correlation	,098	,224	,067	,149	,447	,149	,447	,239	-.149	,239	-.149	,548	,351	,239	1	,089	,415	,598	-.351	,447	,557
	Sig. (2-tailed)	,608	,235	,723	,432	,013	,432	,013	,203	,432	,203	,432	,002	,057	,203		,638	,023	,000	,057	,013	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pernyataan 16	Pearson Correlation	,384	,167	,302	,111	,111	,111	,111	,000	,111	,000	,333	,272	,392	,267	,089	1	,186	,267	,000	,167	,494
	Sig. (2-tailed)	,048	,379	,105	,559	,559	,559	,559	1,000	,559	1,000	,072	,146	,032	,153	,638		,326	,153	1,000	,379	,005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pernyataan 17	Pearson Correlation	,122	-.093	,112	-.062	,557	-.062	,557	,695	-.062	-.050	-.062	,227	,473	-.050	,415	,186	1	,695	,073	,371	,452
	Sig. (2-tailed)	,522	,626	,556	,745	,001	,745	,001	,000	,745	,795	,745	,227	,008	,795	,023	,326		,000	,702	,043	,012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pernyataan 18	Pearson Correlation	,175	,200	,161	-.089	,356	,356	,356	,464	,356	-.071	,356	,327	,288	-.071	,598	,267	,695	1	,105	,535	,611
	Sig. (2-tailed)	,355	,288	,395	,640	,053	,053	,053	,010	,053	,708	,053	,077	,122	,708	,000	,153	,000		,581	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pernyataan 19	Pearson Correlation	-.257	-.294	-.237	-.523	-.523	-.196	-.523	-.288	-.196	-.681	,131	-.480	-.135	-.288	-.351	,000	,073	,105	1	,196	,387
	Sig. (2-tailed)	,171	,115	,208	,003	,003	,299	,003	,122	,299	,000	,491	,007	,478	,122	,057	1,000	,702	,581		,299	,031
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pernyataan 20	Pearson Correlation	-.036	,167	-.075	-.167	,111	,389	,111	,200	,389	-.134	,389	,272	,294	,200	,447	,167	,371	,535	,196	1	,475
	Sig. (2-tailed)	,849	,379	,692	,379	,559	,034	,559	,288	,034	,481	,034	,146	,115	,288	,013	,379	,043	,002	,299		,008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor Total	Pearson Correlation	,479	,574	,456	,481	,712	,481	,712	,571	,481	,531	,481	,694	,663	,452	,557	,494	,452	,611	-.343	,475	1
	Sig. (2-tailed)	,007	,001	,011	,007	,000	,007	,000	,001	,007	,003	,007	,000	,000	,012	,001	,005	,012	,000	,063	,008	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2) Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,796	20

## b. Analisis Univariat

## 1) Frequencies

		Statistics					
		Nama Responden	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Pendahuluan 1	Pendahuluan 2
N	Valid	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0

		Nama Responden			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ant	1	3,3	3,3	3,3
	Anw	1	3,3	3,3	6,7
	Arm	1	3,3	3,3	10,0
	Atk	1	3,3	3,3	13,3
	Bhr	1	3,3	3,3	16,7
	Hdr	1	3,3	3,3	20,0
	Hjr	1	3,3	3,3	23,3
	Hrf	1	3,3	3,3	26,7
	Hrw	1	3,3	3,3	30,0
	Hsm	1	3,3	3,3	33,3
	Hsn	1	3,3	3,3	36,7
	Irw	1	3,3	3,3	40,0
	Jmd	1	3,3	3,3	43,3
	Ksn	1	3,3	3,3	46,7
	Mad	1	3,3	3,3	50,0
	Mld	1	3,3	3,3	53,3
	Mrn	1	3,3	3,3	56,7
	Mrs	1	3,3	3,3	60,0
	Msn	1	3,3	3,3	63,3

	Msni	1	3,3	3,3	66,7
	Mul	1	3,3	3,3	70,0
	Nkm	1	3,3	3,3	73,3
	Rrn	1	3,3	3,3	76,7
	Rtn	1	3,3	3,3	80,0
	Spr	1	3,3	3,3	83,3
	Srm	1	3,3	3,3	86,7
	Str	1	3,3	3,3	90,0
	Syn	1	3,3	3,3	93,3
	Wj	1	3,3	3,3	96,7
	yy	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	
<b>Usia Responden</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-20	1	3,3	3,3	3,3
	21-25	5	16,7	16,7	20,0
	26-30	6	20,0	20,0	40,0
	31-35	13	43,3	43,3	83,3
	>35	5	16,7	16,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	
<b>Usia Anak</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0-1	6	20,0	20,0	20,0
	1-2	8	26,7	26,7	46,7
	2-3	11	36,7	36,7	83,3
	3-4	2	6,7	6,7	90,0
	4-5	3	10,0	10,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	
<b>Pendidikan Terakhir</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	8	26,7	26,7	26,7
	SMP	9	30,0	30,0	56,7
	SMA/SMK	8	26,7	26,7	83,3
	Perguruan Tinggi	5	16,7	16,7	100,0

	Total	30	100,0	100,0	
<b>Pekerjaan</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak/beum bekerja	28	93,3	93,3	93,3
	Karyawan	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	
<b>Pendahuluan 1</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diobati sendiri	1	3,3	3,3	3,3
	Sarana Kesehatan	27	90,0	90,0	93,3
	Menggunakan ramuan tradisional	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	
<b>Pendahuluan 2</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak mengobati	18	60,0	60,0	60,0
	L-Bio	1	3,3	3,3	63,3
	oralit	9	30,0	30,0	93,3
	zinc	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

### c. Analisis Bivariat

#### 1) Hasil Uji Normalitas data dengan *Shapiro-Wilk*


	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Skor pengetahuan Pre Test	,182	30	,013	,858	30	,001
Skor Pengetahuan Post Test	,517	30	,000	,404	30	,000

a. Lilliefors Significance Correction

2) Hasil Uji *Wilcoxon Signed Ranks Test*

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor Pengetahuan Post Test - Skor pengetahuan Pre Test	Negative Ranks	0 <sup>a</sup>	,00	,00
	Positive Ranks	30 <sup>b</sup>	15,50	465,00
	Ties	0 <sup>c</sup>		
	Total	30		
a. Skor Pengetahuan Post Test < Skor pengetahuan Pre Test				
b. Skor Pengetahuan Post Test > Skor pengetahuan Pre Test				
c. Skor Pengetahuan Post Test = Skor pengetahuan Pre Test				
		Test Statistics <sup>a</sup>		
		Skor Pengetahuan Post Test - Skor pengetahuan Pre Test		
Z			-4,837 <sup>b</sup>	
Asymp. Sig. (2-tailed)			,000	
a. Wilcoxon Signed Ranks Test				
b. Based on negative ranks.				

### Lampiran 8. Resep untuk anak diare di Puskesmas Pampang Kota Makassar



Gambar 4. Gambar resep untuk anak diare

#### Konseling Pengobatan Diare :

##### Zink :

- Digunakan untuk pengobatan diare pada anak
- Diminum 1 kali sehari sebanyak 1 tablet dan diberikan selama 10 hari berturut-turut walaupun diare sudah berhenti. Dapat diberikan dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI.

(Bila ada pemberian Antibiotik, di instruksikan untuk dihabiskan)

## Lampiran 9. Hasil Pengisian kuesioner

### A. Kuesioner *pre test*

**KUESIONER PRE-TEST**  
**HUBUNGAN KONSELING TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN IBU PADA**  
**TERAPI DIARE BALITA DI PUSKESMAS PAMPANG**  
**KOTA MAKASSAR**

NO. 01

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : Refna .  
 2. Umur : 32 th / 4th  
 3. Alamat : Pampang 1 No. 9.  
 4. No Telp/HP : 085 29 77 82 946  
 5. Pendidikan terakhir : a. Tidak tamat SD  
 b. SD atau sederajat  
 c. SMP  
 d. SMA/SMK  
 e. Perguruan Tinggi D3/S1/S2  
 (Jurusan.....)  
 6. Pekerjaan :  a. Tidak/belum bekerja  
 b. Karyawan  
 c. Guru  
 d. Pegawai negeri (.....)  
 e. Lainnya, sebutkan : .....

**II. PENDAHULUAN**

1. Jika ada keluarga yang mengalami diare, tindakan apa yang biasanya anda lakukan?  
 a. Diobati sendiri  b. Ke Tenaga Kesehatan (dokter, puskesmas, RS)  
 c. Tidak diobati d. Menggunakan ramuan tradisional  
 2. Apakah anak anda pernah mengalami diare, obat apa yang biasa anda berikan pada anak?  
 Jawab: 0Tol

**III. PENGETAHUAN TENTANG PENANGANAN DIARE**

NO	PERNYATAAN	BENAR	SALAH
1.	Diare merupakan penyakit yang tidak berbahaya karena diare hanya menyerang umur tertentu saja.		<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Penyakit diare biasanya ditandai dengan keluarnya tinja lunak atau cair tiga kali atau lebih dalam satu hari.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Diare tidak bersifat fatal karena tidak menyebabkan kematian.		<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Diare mudah menyerang anak karena ditularkan lewat media yang dekat dengan manusia (peralatan rumah tangga, alat makan, pakaian, dan lain-lain).	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	Diare dapat menyerang anak di rumah karena kondisi lingkungan domestik rumah yang tidak sehat atau kurang bersih, dan pembuangan tinja yang tidak sehat.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	Diare dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan gizi anak.	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	Diare dapat menyebabkan lemas, kekurangan cairan (dehidrasi), berat badan berkurang, dan berkurangnya nafsu makan bila tidak segera ditangani.	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	Penanganan awal diare pada anak adalah mencegah terjadinya kekurangan cairan (dehidrasi) yaitu harus diberikan air minum yang lebih banyak.	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	Tanda-tanda anak mengalami dehidrasi adalah gelisah/rewel, mulut kering, mata cekung, tampak kehausan.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	Anak yang mengalami diare lebih dari 2 hari, muntah berulang, demam, tinja berdarah atau berlendir, perlu penanganan khusus (dibawa ke dokter atau rumah sakit).	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.	Anak yang mengalami dehidrasi berat perlu penanganan khusus (dibawa ke dokter atau rumah sakit).	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Anak yang menderita diare perlu diberikan makanan yang dapat merangsang usus untuk bekerja lebih keras, seperti makanan yang bertekstur keras dan mengandung asam.	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	Anak yang mengalami diare dan mengonsumsi susu formula, harus menghentikan terlebih dahulu pemberian susu formula pada anak.	<input checked="" type="checkbox"/>	
14.	Ibu tetap memberikan ASI kepada anak yang mengalami diare agar dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang.	<input checked="" type="checkbox"/>	
15.	Anak dibawah 5 tahun yang mengalami diare boleh diberi obat antibiotik.	<input checked="" type="checkbox"/>	
16.	Anak dibawah 5 tahun yang mengalami diare boleh diberi obat bebas yang dibeli di apotik tanpa resep dokter (seperti kaolin, pektin, imodium, dan lain-lain).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17.	Oralit merupakan alternative pertama penanganan diare anak di rumah.	<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	Bahan untuk membuat oralit adalah gula, garam, dan air putih matang.	<input checked="" type="checkbox"/>	
19.	Larutan oralit harus diberikan pada anak diare sesuai anak minum dan bila larutan oralit tersebut tidak habis boleh disimpan untuk keesokan harinya.		<input checked="" type="checkbox"/>
20.	Anak yang mengalami diare diberi suplemen zinc untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah terjadinya resiko diare dalam 3 bulan ke depan.	<input checked="" type="checkbox"/>	

## B. Kuesioner Post test

**KUESIONER POST-TEST**  
**HUBUNGAN KONSELING TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN IBU PADA**  
**TERAPI DIARE BALITA DI PUSKESMAS PAMPANG**  
**KOTA MAKASSAR**

NO. 01

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : Retna  
 2. Umur : 32 th 14 th.  
 3. Alamat : Pampang 1 no 9  
 4. No Telp/HP : 089 997 899 916  
 5. Pendidikan terakhir : a. Tidak tamat SD  
 b. SD atau sederajat  
 c. SMP  
 d. SMA/SMK  
 e. Perguruan Tinggi D3/S1/S2  
 (Jurusan.....)  
 6. Pekerjaan :  a) Tidak/belum bekerja  
 b. Karyawan  
 c. Guru  
 d. Pegawai negeri (.....)  
 e. Lainnya, sebutkan : .....

**II. PENDAHULUAN**

1. Jika ada keluarga yang mengalami diare, tindakan apa yang biasanya anda lakukan?  
 a. Diobati sendiri  b. Ke Tenaga Kesehatan (dokter, puskesmas, RS)  
 c. Tidak diobati d. Menggunakan ramuan tradisional

2. Apakah anak anda pernah mengalami diare, obat apa yang biasa anda berikan pada anak?  
 Jawab: Oralit .....

**III. PENGETAHUAN TENTANG PENANGANAN DIARE**

NO	PERNYATAAN	BENAR	SALAH
1.	Diare merupakan penyakit yang tidak berbahaya karena diare hanya menyerang umur tertentu saja.		<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Penyakit diare biasanya ditandai dengan keluarnya tinja lunak atau cair tiga kali atau lebih dalam satu hari.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Diare tidak bersifat fatal karena tidak menyebabkan kematian.		<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Diare mudah menyerang anak karena ditularkan lewat media yang dekat dengan manusia (peralatan rumah tangga, alat makan, pakaian dan lain-lain).	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	Diare dapat menyerang anak di rumah, karena kondisi lingkungan disekitar rumah yang tidak sehat atau kurang bersih, dan pembuangan tinja yang tidak sehat.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	Diare dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan gizi anak.	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	Diare dapat menyebabkan lemas, kekurangan cairan (dehidrasi), berat badan berkurang, dan berkurangnya nafsu makan bila tidak segera ditangani.	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	Penanganan awal diare pada anak adalah mencegah terjadinya kekurangan cairan (dehidrasi) yaitu harus diberikan air minum yang lebih banyak.	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	Tanda-tanda anak mengalami dehidrasi adalah gelisah/rewel, mulut kering, mata cekung, tampak kehausan.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	Anak yang mengalami diare lebih dari 2 hari, muntah berulang, demam, tinja berdarah atau berlendir, perlu penanganan khusus (dibawa ke dokter atau rumah sakit).	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.	Anak yang mengalami dehidrasi berat perlu penanganan khusus (dibawa ke dokter atau rumah sakit).	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Anak yang menderita diare perlu diberikan makanan yang dapat merangsang usus untuk bekerja lebih keras, seperti makanan yang bertekstur keras dan mengandung serat.		<input checked="" type="checkbox"/>
13.	Anak yang mengalami diare dan mengonsumsi susu formula, harus menghentikan terlebih dahulu pemberian susu formula pada anak.	<input checked="" type="checkbox"/>	
14.	Ibu tetap memberikan ASI kepada anak yang mengalami diare agar dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang.	<input checked="" type="checkbox"/>	
15.	Anak dibawah 5 tahun yang mengalami diare boleh diberi obat antibiotik.		<input checked="" type="checkbox"/>
16.	Anak dibawah 5 tahun yang mengalami diare boleh diberi obat bebas yang dibeli di apotik tanpa resep dokter (seperti kaolin, pektin, modium, dan lain-lain).		<input checked="" type="checkbox"/>
17.	Oralit merupakan alternative pertama penanganan diare anak di rumah.	<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	Bahan untuk membuat oralit adalah gula, garam, dan air putih matang.	<input checked="" type="checkbox"/>	
19.	Larutan oralit harus diberikan pada anak diare semua anak minum dan bila larutan oralit tersebut tidak habis boleh disimpan untuk keesokan harinya.		<input checked="" type="checkbox"/>
20.	Anak yang mengalami diare diberi suplemen zinc untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah terjadinya resiko diare dalam 3 bulan ke depan.		<input checked="" type="checkbox"/>

Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian



Gambar 5. Penandatanganan informed consent



Gambar 6. Pengisian kuesioner *pre test*



Gambar 7. Pemberian konseling oleh apoteker



Gambar 8. Pengisian kuesioner *post test*

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Andi Try Resti Fauziah Sahib, akrab dipanggil Resti/Tetty, anak dari pasangan H. Muh. Sahib, S.Pd, S.H, M.H dan Hj. Andi Rahmah, S.Pd.I, M.M, lahir di Bulukumba pada tanggal 28 Maret 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara ini memulai pendidikannya di TK Negeri Pembina Bulukumba kemudian lanjut sekolah dasar di SDN 3 kasimpureng dan SDN 221 Unggulan Tanah kong-kong selama 6 tahun. Tamat dibangku sekolah dasar pada tahun 2009, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Bulukumba dan bergabung dalam organisasi Karya Ilmiah Remaja.

Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan Sekolah Menengah di SMK Kesehatan Pinisi Bulukumba program studi Keperawatan medis. Setelah tamat kemudian penulis melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada tahun 2013.

Penulis aktif ikut berorganisasi di jurusan yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi dalam bidang logistik dan keuangan pada periode 2013 hingga 2014, kemudian masuk dalam pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada periode 2014 hingga 2016, dan bergabung dalam pengurus SC Al A'fiah tahun 2017.

Dengan tekad, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Alhamdulillah penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia kesehatan khususnya dalam bidang kefarmasian.

*“Banyak hal yang dapat mendorongmu namun hal paling utama adalah tekad dari dirimu sendiri”*

*“Man Jadda Wa Jadda”*

(Wassalamua'laikum Warohmatullaahi Wabarokatuh)