

**PENGARUH EKSTRAK DAUN PATIKAN KEBO (*Euphorbia hirta* L.)
TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI (*Staphylococcus aureus*
dan *Escherichia coli*) dan JAMUR *Candida albicans***



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar
Oleh

ZULKARNAIN

NIM. 60300107013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa sripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau disusun oleh orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperlukan karenanya, batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2011

Penyusun

ZULKARNAIN
NIM. 60300107013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Ekstrak Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri (*Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*) dan Jamur (*Candida albicans*)**” yang disusun oleh Zulkarnain, NIM: 60300107013, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, tanggal, bertepatan dengan tanggal H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan)*

Makassar, 22 Agustus 2011 M
22 Ramadhan 1432 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd (.....)

Sekretaris : Hafsan, S.Si, M.Si (.....)

Munaqisy I : Fatmawati Nur, S.Si., M.Si (.....)

Munaqisy II : Jamilah, S. Si., M.Si (.....)

Munaqisy III : Drs. M. Arif Alim, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Hj. Yusminah Hala, MS (.....)

Pembimbing II: Cut Muthiadin S.Si, M.Si (.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

(Dr. Muhammad Halifah Mustami, MPd.)
Nip. 19711204 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Tiada kalimat yang pantas terucap, selain kalimat Alhamdulillah Rabbil alamin, yang mana atas berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga skripsi yang berjudul **“PENGARUH EKSTRAK DAUN PATIKAN KEBO (*Euphorbia hirta L.*) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI (*Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*) dan JAMUR (*Candida albicans*)”** ini dapat terselesaikan, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Shalawat dan salam semoga tetap tecurah kepada Baginda Rasulullah Saw yang telah mengajarkan beberapa ilmu pengetahuan yang dijadikan lampu penerang dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara khusus iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis ayahanda Rabasing, A.Ma. Pd. dan Ibunda (Almh.) Nuriati tersayang yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayang dengan ketulusan dan keikhlasan, yang tak henti-hentinya melantukan doa terbaik di setiap akhir sujud beliau bagi penulis serta rela mengorbankan segalanya demi tercapainya harapan dari sang anak tercinta yang tidak akan pernah mampu untuk dibalas, serta saudara-saudara penulis Zulfarman, Zulchairun, dan Muh. Syukri yang menjadi motivator penulis. Semoga berkah dan rahmat Allah Swt. selalu menaungi mereka. Selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Kadir Gassing, HT MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A, selaku mantan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Halifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Bahaking Rama, M.S, Selaku Mantan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Fatmawati Nur Khalik, S.Si., M.Si, selaku Ketua Jurusan Biologi sekaligus sebagai penguji/pembahas I. dan Ibu Hafisah, S.Si., M.Pd, selaku sekretaris jurusan Biologi sekaligus sebagai penasehat akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama aktif menjalani proses perkuliahan.
6. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Yusminah Hala, M.S dan Ibu Cut Muthiadin, S.Si, M.Si selaku pembimbing I dan II dalam proses penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Ibu Jamilah, S.Si. M.Si, dan Bapak Drs. M. Arif Alim, M.Ag selaku penguji/pembahas II dan III
8. Bapak dan Ibu Dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi.
9. Kurniati, S.Si, Iwan S.Si, Ummi Aminah S.Si, Sarah Shakina, S.Si dan Ali Malaka S.Si yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis melakukan penelitian.

10. Saudara seperjuanganku, Ka'bah dan Ernawati yang telah banyak memberikan masukan dan semangat satu sama lain, serta setia menemani penulis dalam suka dan duka hingga tercapainya harapan bersama.
11. Teman-teman mahasiswa Jurusan Biologi (Apol, Asrul, Wahab, Madi, Firman, Said, Uni, Kia, Ayu, Icha, Asri, Anthi, Hasnah, Devi, Lisda, Fera, Rani, Mega, kak Muli, Kokom, Ander, dan Ana) yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dan menghadirkan cerita indah selama kurang lebih 4 tahun bersama.
12. Adik-adik mahasiswa jurusan Biologi angkatan 2008, 2009, dan 2010.
13. Teman-teman KKN-46 di Wette'E, Panca Lautang, Kabupaten Sidrap.
14. Teman-teman Kerja Praktek (KP) di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar (Risma, Nhia, Dilla, Wawa, Kiki, Ines, Kak Nash dan Teman-teman yang lain).
15. Ibunda Suharni, yang dengan tulus senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan cinta kasihnya, serta semangat yang tak pernah putus kepada penulis, dan telah menganggap penulis sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi.
16. Hj. Sutiah Muslim dan Drs. H. Muslimin, serta keluarga besar yang selama ini telah banyak memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
17. Rezkiwati Maulud (Ninerzq 05), yang telah setia mendampingi penulis dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
18. Serta Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca, guna perbaikan ke depannya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, Amin.

Makassar, 18 Agustus 2011




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat.....	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	9-41
A. Tinjauan Umum Patikan Kebo (<i>Euphorbia hirta L</i>).....	9
B. Tinjauan Umum Bakteri.....	13
C. Tinjauan Umum Jamur.....	22
D. Tinjauan Umum Ekstraksi.....	26
E. Antimikroba.....	31
F. Tinjauan Islam Tentang Penyakit dan Pengobatannya.....	36
BAB III	
METODE PENELITIAN	42-50
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Variabel Penelitian.....	42
C. Defenisi Operasional Variabel.....	42
D. Ruang Lingkup dan Batasan.....	43
E. Desaian Penelitian.....	44
F. Alat dan Bahan.....	45

	G. Prosedur Kerja.....	40
	H. Analisis Data.....	50
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	51-67
	A. Hasil Penelitian.....	51
	B. Pembahasan.....	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Bakteri Gram Positif dan Negatif.....	15
Tabel 2. Kombinasi Perlakuan Ekstrak Patikan Kebo Pada Mikroba Uji.....	44
Tabel 3. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 24 Jam.....	52
Tabel 4. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 48Jam.....	52
Tabel 5. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Bakteri <i>Escherichia coli</i> Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 24 Jam.....	55
Tabel 6. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Bakteri <i>Escherichia coli</i> Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 48 Jam.....	55
Tabel 7. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Jamur <i>Candida albicans</i> Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 24 Jam.....	58
Tabel 8. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Jamur <i>Candida albicans</i> Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 48 Jam.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tumbuhan Patikan kebo (<i>Euphorbia hirta L.</i>).....	10
Gambar 2. Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	18
Gambar 3. Bakteri <i>Escherichia coli</i>	21
Gambar 4. Gambar <i>Candida albicans</i>	25
Gambar 5. Histogram Zona Hambat Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> Masa Inkubasi 24 Jam dan 48 Jam.....	53
Gambar 6. Histogram Zona Hambat Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> Masa Inkubasi 24 Jam dan 48 Jam.....	56
Gambar 7. Histogram Zona Hambat Bakteri <i>Candida albicans</i> Masa Inkubasi 24 Jam dan 48 Jam.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 a. Uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) <i>Staphylococcus aureus</i> 24 jam.....	72
Lampiran 1 b. Uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) <i>Staphylococcus aureus</i> 48 jam.....	73
Lampiran 1 c. Uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) <i>Escherichia coli</i> 24 jam.....	74
Lampiran 1 d. Uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) <i>Escherichia coli</i>	75
Lampiran 1 e. Uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) <i>Candida albicans</i> 24 jam.....	76
Lampiran 1 f. Uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) <i>Candida albicans</i> 48 jam.....	78
Lampiran 2a. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> masa inkubasi 24 jam.....	80
Lampiran 2b. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> masa inkubasi 48 jam.....	81
Lampiran 2c. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri <i>Escherichia coli</i> masa inkubasi 24 jam.....	82
Lampiran 2d. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri <i>Escherichia coli</i> masa inkubasi 48 jam.....	83
Lampiran 2e. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri <i>Candida albicans</i> masa inkubasi 24 jam.....	84

Lampiran 2f. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> masa inkubasi 48 jam.....	85
Lampiran 3. Proses Destilasi.....	86
Lampiran 4. Hasil Ekstraksi dan Beberapa macam konsentrasi Ekstrak Daun Patikan Kebo (<i>Euphorbia hirta</i>).....	86
Lampiran 5. Pembuatan Suspensi Mikroba.....	87
Lampiran 6. Pengujian Daya Hambat.....	88
Lampiran 7. Skema Kerja.....	89

ABSTRAK

Nama Penulis: Zulkarnain

Nim : 60300107013

Judul Skripsi : “Pengaruh Ekstrak Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri (*Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*) dan Jamur (*Candida albicans*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun patikan kebo (*Euphorbia hirta* L) dalam menghambat pertumbuhan Bakteri (*Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*) dan Jamur (*Candida albicans*). Dimana penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu dengan memberikan ekstrak Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) dalam beberapa konsentrasi, yaitu konsentrasi 40%, 45%, 50%, 55%, dan 60% serta kontrol (aquadest) pada bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan jamur *Candida albicans* dengan tiga kali pengulangan. Parameter yang diukur ialah besarnya diameter daya hambat yang terbentuk di sekitar cakram kertas dalam masa 24 jam dan 48 jam. Data yang diperoleh dengan tiga kali pengulangan dan pengamatan 24 jam dan 48 jam menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan jamur *Candida albicans*. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam (uji-F) pada taraf α 0,05 dan dilanjutkan dengan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) α 0,05 dimana diperoleh hasil bahwa pemberian ekstrak patikan kebo berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan mikroba uji (*Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan *Candida albicans*), yang mana semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun patikan kebo, maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk di sekitaran *paper disk*.

Kata kunci: Ekstrak Daun Patikan kebo (*Euphorbia hirta* L), *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan *Candida albicans*, Rancangan Acak Lengkap (RAL)

ABSTRACT

Nama Penulis: Zulkarnain

Nim : 60300107013

Judul Skripsi : “Pengaruh Ekstrak Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri (*Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*) dan Jamur (*Candida albicans*)

The aim of this research is to determine the effect of leaf extract patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) in inhibiting the growth of bacteria (*Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*) and fungi (*Candida albicans*). it is an experiment research which are prepared by using Completely Randomized Design (CRD) is to give extracts patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) in several concentrations, they are 40%, 45%, 50%, 55%, and 60% and distilled water as control on the bacterium *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, and the fungus *Candida albicans* with three repetitions. Parameters to be measured is the magnitude of the diameter of the inhibition that formed around the paper disk in a period of 24 hours and 48 hours. Data obtained with three times of the repetition and observation 24 hours and 48 hours showed that the leaf extract patikan kebo in several concentration effect in inhibiting the growth of bacteria *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, and the fungus *Candida albicans*. Furthermore, the data obtained were analyzed by using analysis of variance (F-test) at α level of 0.05 and continued with using Smallest Real Difference test (LSD) α 0.05 obtained results that administration of extract patikan kebo significantly affect to microbial growth test (*Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, and *Candida albicans*), and then the higher concentration of leaf extract patikan kebo, the bigger inhibition zone formed around the paper disks.

Key words: The leaf extract patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L), *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan *Candida albicans*, Completely Randomized Design (CRD)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan tumbuhan berkhasiat obat. Penggunaan tanaman sebagai obat telah dikenal sejak zaman nenek moyang dan telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya tumbuhan berkhasiat di Indonesia yang berjumlah kurang lebih dari 1 juta spesies tumbuhan. Pengobatan tradisional dengan memanfaatkan tumbuhan berkhasiat obat merupakan pengobatan yang dimanfaatkan dan diakui oleh masyarakat dunia yang menandai kesadaran untuk kembali ke alam. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu *mega biodiversity country* dikenal sebagai gudangnya tumbuhan obat. Diduga dari sekitar 30.000 jenis flora yang ada di hutan tropika Indonesia, sekitar 9.600 spesies telah diketahui berkhasiat obat. Dari jumlah tersebut tercatat 283 spesies merupakan tumbuhan obat penting bagi industri obat tradisional¹.

Pengobatan tradisional merupakan pengobatan yang menggunakan ramuan obat dari tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mudah didapat di pekarangan rumah dan juga tidak mengandung resiko yang membahayakan pasien dan mudah dikerjakan oleh siapa saja dalam keadaan yang mendesak sekalipun. Sebaliknya pengobatan modern mempunyai resiko yang kadang berbahaya bagi kesehatan, susah didapatkan, dan harganya relatif

¹Fauzi R. Kusuma dan B. Muhammad Zaky, *Tumbuhan Liar Berkhasiat Obat* (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2005), h. 2.

mahal. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ternyata tidak menggeser atau mengesampingkan begitu saja peranan obat–obatan tradisional tetapi justru saling melengkapi. Hal ini terbukti dari banyaknya peminat pengobatan tradisional², Salah satunya adalah patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*).

Patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) merupakan suatu tumbuhan liar yang banyak ditemukan di daerah kawasan tropis. Di Indonesia, tumbuhan Patikan kebo dapat ditemukan di antara rerumputan di tepi jalan, sungai, kebun-kebun, atau tanah pekarangan rumah yang tidak terawat. Biasanya patikan kebo ini hidup jadi satu dengan Patikan Cina (*Euphorbia Prostrata*) pada ketinggian 1 - 1400 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan patikan kebo mampu bertahan hidup selama 1 tahun dan berkembang biak melalui biji berhadap-hadapan, sedangkan bunganya muncul pada ketiak daun dan hidupnya merambat (merayap) di tanah³.

Patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) saat ini banyak digunakan sebagai obat tradisional, misalnya penduduk Surabaya telah terbiasa menggunakan getah tanaman patikan kebo sebagai obat bagi penyakit bengkak pada kelopak mata⁴.

Tanaman ini juga telah banyak digunakan sebagai obat tradisional di negara-negara yang terletak di kawasan tropis, seperti Afrika, Asia, Amerika, dan Australia. Tanaman

²Prapti Utami, *Buku Pintar Tanaman Obat* (Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2008) h. 2.

³Ipteknet, *Tanaman Obat Indonesia*, http://www.iptek.net.id/ind/pd.tanobat/patikan_kerbau (20 Oktober 2010).

⁴Racik, Kearifan Tradisional Masyarakat Selamatkan Tumbuhan Obat, *Blog Racik*, <http://racik.wordpress.com/category/tumbuhan-obat/> (20 Oktober 2010).

tersebut telah dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit, seperti disentri, diare, borok, asma, bronkhitis, demam, penyakit pada alat genital (misalnya *gonorrhoea*)⁵.

Hal ini menunjukkan bahwa semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini memiliki khasiat dan kegunaan, khususnya patikan kebo yang tumbuhnya liar dan kadang tidak diperhatikan oleh orang-orang, bahkan dianggap sebagai tumbuhan pengganggu (gulma) bagi para petani, ternyata memiliki khasiat yang sangat baik bagi beberapa penyakit.

Sehingga sungguh benarlah firman Allah yang terdapat pada Q.S Ali Imran: 3/191, yang berbunyi:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا

Terjemahnya :

*“Wahai Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia”*⁶

Ayat di atas sangatlah jelas bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini pasti tidaklah sia-sia, artinya semuanya memiliki manfaat dan kegunaan, bahkan patikan kebo pun yang merupakan gulma yang menurut sebagian orang tidak memiliki manfaat apapun, ternyata memiliki kandungan kimia yang dapat digunakan sebagai salah satu obat tradisional.

Hal ini juga menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis penyakit yang ada di muka bumi ini semakin beragam jenisnya. Sehingga diperlukan berbagai macam jenis pengobatan terhadap suatu penyakit. Mulai dari jenis pengobatan

⁵Medical Plants, *Euphorbia hirta* L. http://www.ics.trieste.it/MAPs/MedicinalPlants_Plant. (20 Oktober 2010).

⁶Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Madinah al-Munawwarah : Percetakan Alqur'an Raja Fahd, 2007), h. 110.

yang modern hingga pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan alamiah, baik itu dari hewan maupun dari tumbuhan. yang mana akhir-akhir ini banyak lembaga ilmiah penelitian dan perguruan tinggi mencurahkan perhatiannya terhadap tumbuhan-tumbuhan di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan pengobatan tradisional Indonesia⁷.

Salah satu jenis penyakit yang paling sering terjadi adalah penyakit infeksi oleh mikroorganisme. Infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan berpoliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan penyakit. Yang mana tanpa disadari hidup kita sehari-hari tidak pernah luput dari incaran mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Mikroorganisme tersebut berkeliaran di dekat kita. Beberapa jenis tidak berbahaya, namun beberapa jenis yang lain dapat mengancam kesehatan jika masuk ke dalam tubuh kita.

Beberapa mikroorganisme secara umum menyebabkan penyakit manusia terutama hidup pada binatang dan secara tidak sengaja menginfeksi manusia. Misalnya *Staphylococcus* dan bakteri *coliform* yang secara khas disebarkan melalui makanan kepada manusia⁸.

Selain melalui makanan, beberapa bakteri juga disebarkan dari satu orang ke orang yang lain melalui tangan, misalnya seseorang sebagai pembawa *S. Aureus* dalam nares anterior pada rongga hidungnya kemungkinan saat menggosok hidung, membawa staphylococcus pada tangannya dan selanjutnya menyebarkan bakteri tersebut ke bagian tubuh orang lain, sehingga menimbulkan infeksi⁹.

⁷Sjamsul Arifin Achmad dan Euis Holisotan Hakim, *Ilmu Kimia dan Kegunaan Tumbuh-tumbuhan Obat Indonesia Jilid 5*, (Bandung : Penerbit ITB, 2009), h. 1.

⁸Jawetz, Melnik, dan Adelberg's, *Mikrobiologi Kedokteran* (Jakarta: Salemba Medika, 2005), h. 208.

⁹*Ibid.*

Staphylococcus aureus juga merupakan bakteri patogen yang utama pada manusia. Hampir setiap orang pernah mengalami berbagai infeksi *S. aureus* selama hidupnya, dari keracunan makanan berat atau infeksi kulit yang kecil, sampai infeksi yang tidak bisa disembuhkan. Infeksi *Staphylococcus aureus* dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui selaput mukosa yang bertemu dengan kulit. Bakteri ini dapat menyebabkan endokarditis, osteomielitis akut hematogen, meningitis, ataupun infeksi paru-paru¹⁰.

Selain *Staphylococcus aureus* yang menyebabkan penyakit adalah bakteri *Escherichia coli*. Bakteri ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit saluran pencernaan makanan, seperti kolera, tipus, disentri, diare, dan penyakit cacingan. Bibit penyakit ini berasal dari feses manusia yang menderita penyakit-penyakit tersebut. Indikator yang menunjukkan bahwa air rumah tangga sudah dikotori feses adalah dengan adanya *E.coli* dalam air tersebut, karena dalam feses manusia baik sakit maupun sehat terdapat bakteri ini¹¹.

Selain dari jenis bakteri, ada juga dari jenis fungi (jamur) yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Salah satu jenisnya adalah *Candida albicans* yang menyebabkan penyakit Candidiasis. Candidiasis merupakan penyakit jamur yang bersifat akut yang menyerang mulut, vagina, kuku, dan rektum. Sebenarnya *Candida albicans* secara alami terdapat pada daerah-daerah tersebut, hanya saja jika pertumbuhannya pesat yang kemudian akan mengakibatkan peradangan yang disebut dengan candidiasis¹².

¹⁰*Ibid.*

¹¹Mawar, Penyakit Yang Disebabkan oleh Bakteri, *Blog Mawar*, <http://mawarmawar.wordpress.com/2009/02/27/penyakit-yang-disebabkan-oleh-bakteri/> (23 Januari 2011)

¹²Small Crab, candidiasis, *Blog Small Crab*, <http://smallcrab.blogspot.com/candidiasis> (23 Januari 2011).

Penyakit infeksi tersebut dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi, dan bakteri tanah, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Yang mana penggunaan antibiotik secara besar-besaran untuk terapi dan pengobatan inilah yang merupakan faktor utama terjadinya resistensi¹³.

Oleh karena itu perlunya sebuah alternatif pengganti antibiotik yang berasal dari tumbuhan yang memiliki toksisitas bagi mikroorganisme penyebab penyakit infeksi, yang mana dalam hal ini tumbuhan Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L.) diharapkan dapat menjadi salah satu antimikroba alami yang aman dan efektif untuk digunakan dalam mengatasi penyakit infeksi.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Yanti Hamdiyati, Kusnadi, Irman Rahadian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak daun patikan kebo (*euphorbia hirta*) terhadap pertumbuhan bakteri *staphylococcus epidermidis* dimana hasil analisis datanya diketahui bahwa nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) ekstrak daun patikan kebo berada pada konsentrasi 20 mg/ml dengan rata-rata diameter daya hambat sebesar 7,67 mm yang berbeda signifikan dengan kontrol negatif, yaitu 6,90 mm. Penghambatan yang terjadi pada bakteri *S. epidermidis* membuktikan bahwa daun patikan kebo mengandung senyawa aktif yang bersifat antibakteri¹⁴.

¹³Ika Nur Fajariah, *Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Etil Asetat Ekstrak Etanol Kayu Secang (caesalpinia sappan l.) Terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae Serta Bioautografinya* (Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

¹⁴Yanti Hamdiyati, Kusnadi, Irman Rahadian, *Aktivitas antibakteri ekstrak daun patikan kebo (euphorbia hirta) terhadap pertumbuhan bakteri staphylococcus epidermidis* (Jurnal Pengajaran MIPA, Vol. 12 ISSN: 1412-0917 No. 2 Desember 2008 Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia).

Demikian juga dengan uji pendahuluan yang telah dilakukan bahwa ekstrak patikan kebo dalam beberapa konsentrasi dapat menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan *Candida albicans*. Dimana konsentrasi yang digunakan adalah 2%, 5%, 8%, 10%, dan 20%. Untuk hasil yang paling efektif menghambat adalah pada konsentrasi tertinggi, yaitu 20% untuk masing-masing mikroba uji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh ekstrak daun patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) dalam menghambat pertumbuhan bakteri (*Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) dan jamur (*Candida albicans*)?

C. Tujuan


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) dalam menghambat pertumbuhan bakteri (*Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) dan jamur (*Candida albicans*).

D. Manfaat

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi peneliti, dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang antimikroba yang berasal dari tumbuhan, dalam hal ini Patikan Kebo (*Euphorbia hirta L.*).

2. Bagi masyarakat, dapat menjadi tambahan informasi tentang pemanfaatan patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) sebagai antimikroba yang efektif dan alami terhadap penyakit infeksi.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut terhadap ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) sebagai antimikroba terhadap penyakit infeksi lain berdasarkan komponen kimia yang dikandungnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Patikan Kebo (Euphorbia hirta L.)*

1. Morfologi

Patikan kebo merupakan terna, tegak atau memanjat, tinggi lebih kurang 20 cm, batang berambut, percabangan selalu keluar dan pangkal batang dan tumbuh ke atas, warna merah atau keunguan. Patikan kebo mempunyai warna dominan kecoklatan dan bergetah. Banyak pohonnya memiliki cabang dengan diameter ukuran kecil¹⁵.

Patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) berbatang lunak, beruas, berbulu, dan bergetah putih. Warna batangnya adalah hijau kecoklatan. Daun Patikan kebo mempunyai bentuk bulat memanjang dengan taji-taji. Tepi daun bergerigi. Panjang helaian daun mencapai 50 mm dan lebarnya 25 mm. Daunnya yang gampang rapuh berwarna hijau atau hijau kelabu. Perbungaan bentuk bola keluar dan ketiak daun bergagang pendek, berwarna merah kecoklatan. Bunga mempunyai susunan satu bunga betina dikelilingi oleh lima bunga yang masing-masing terdiri atas empat bunga jantan dan satu bunga betina¹⁶.

¹⁵Djauhariya, Endjo, dan Hernani, *Gulma Berkhasiat Obat* (Jakarta : Penebar Swadaya, 2004), h. 56.

¹⁶G. Kartasapoetra, *Budi Daya Tanaman Berkhasiat Obat* (Jakarta : Rineke Cipta, 2006), h. 56.



(Sumber Simplisia, *Tanaman Obat Patikan Kebo*,
<http://www.simplisia.com/simplisia/tanaman-obat/tanaman-obat-patikan-kebo.html>).

Gambar 1: Tumbuhan Patikan kebo (*Euphorbia hirta* L.)

2. Nama daerah

Patikan kebo memiliki beberapa nama daerah diantaranya adalah, Fei Yang Cao (Cina), Amanpat chairisi (India); Gelang susu (Malaysia), Patikan Kerbau (Indonesia); Nanangkaan (Sunda), Patikan Kebo, Patikan Jawa (Jawa); Kak sekaan (Madura), Lobi-lobi (Halmahera)¹⁷.

3. Klasifikasi

Regnum : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Sub Kelas : Rosidae
Ordo : Euphorbiales
Familia : Euphorbiaceae

¹⁷*Ibid.*

Genus : Euphorbia

Species : *Euphorbia hirta* L¹⁸.

4. Kandungan

Patikan kebo mengandung beberapa unsur, diantaranya alkaloid, tanin, senyawa folifenol, flavonoid, asam organik palmitat oleat, asam lanolat, terpenoid eufosterol, tarakseron, myricil alkohol, taraxerol, friedlin, betasitosterol, beta eufol, euforbol, triterpenoid eufol, tirukalol, eufosterol, hentriacontane, dan pada bunga terdapat alagic acid¹⁹.

5. Sifat dan Khasiat

Patikan kebo memiliki sifat agak pahit, asam, sejuk, dan sedikit beracun. Berkhasiat sebagai anti-inflamasi (radang), peluruh air seni, dan menghilangkan gatal (anti-puritik)²⁰.

Allah Swt Menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit dengan beraneka ragam, baik jenis maupun manfaatnya, sebagaimana dalam Q.S. an- Nahl: 16/11 Allah berfirman:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“ Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang

¹⁸Syamsiah, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2009), h. 92.

¹⁹Fauzi R. Kusuma dan B. Muhammad Zaky, *Tumbuhan Liar Berkhasiat Obat* (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2005). h. 40.

²⁰*Ibid.*

demikian itu benarbenar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Q.s. An-nahl/16: 11)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tumbuhan itu terdiri dari berbagai macam jenis. Setiap jenis mempunyai manfaat tersendiri berdasarkan kandungan zat aktif yang terdapat di dalamnya. Seperti tanaman patikan kebo yang mengandung zat-zat aktif yang biasa dimanfaatkan sebagai antibiotik. Manfaat-manfaat tersebut hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mau memikirkan dan mengkaji secara mendalam tentang kandungannya. Sehingga bisa mempertebal keyakinan akan kebesaran Allah Swt. Dan menambah wawasan akan manfaat keanekaragaman tumbuhan untuk kemaslahatan umat manusia.

6. Kegunaan

Patikan kebo memiliki beberapa kegunaan sebagai pengobatan herbal, diantaranya:

- a. Membantu mengatasi radang tenggorokan, bronkitis, dan asma.
- b. Mengatasi disentri, radang perut, dan diare.
- c. Mengatasi radang kelenjar susu dan payudara bengkak.
- d. Mengobati eksim, penyakit kulit atau gatal-gatal.
- e. Mengobati luka bakar²¹.

B. Tinjauan Umum Bakteri

Bakteri merupakan mikrobia prokariotik uniseluler, yaitu suatu struktur sel yang tidak mempunyai inti sejati (inti yang tidak dikelilingi oleh membran inti), sedangkan

²¹Simplisia, *Tanaman Obat Patikan Kebo*, <http://www.simplisia.com/simplisia/tanaman-obat/tanaman-obat-patikan-kebo.html> (20 Oktober 2010).

komponen genetisnya terdapat di dalam molekul DNA atau RNA tunggal yang berenang bebas di dalam sitoplasma. Bakteri termasuk dalam kelas *Schizomycetes*, berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel, yang mana bakteri ini tidak berklorofil kecuali ada beberapa yang bersifat fotosintetik²².

Bakteri merupakan makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Untuk menyelidiki ukuran bakteri, dalam pemeriksaan mikrobiologis biasanya menggunakan satuan mikron, seperti misalnya pada pengukuran virus. Bakteri tersusun atas dinding sel dan isi sel. Di sebelah luar dinding sel terdapat selubung atau kapsul²³.

Bakteri dianggap sebagai organisme paling melimpah di bumi. Mereka tersebar dan menghuni hampir semua tempat: di tanah, air, udara, atau dalam simbiosis dengan organisme lain. Banyak patogen merupakan bakteri. Kebanyakan dari mereka kecil, biasanya hanya berukuran 0,5-5 μm , meski ada jenis dapat menjangkau 0,3 mm dalam diameter (*Thiomargarita*). Mereka umumnya memiliki dinding sel, seperti sel tumbuhan dan jamur, tetapi dengan bahan pembentuk sangat berbeda (peptidoglikan). Banyak bakteri yang bergerak menggunakan flagela, yang berbeda dalam strukturnya dari flagela kelompok lain²⁴.

Bakteri dibagi dalam golongan Gram positif dan Gram negatif berdasarkan reaksinya terhadap prosedur pewarnaan Gram. Prosedur ini dinamakan sesuai dengan nama seorang histologis, Hans Cristian Gram, yang mengembangkan metode perbedaan warna

²²Hafsah, *Mikrobiologi Umum* (Makassar: UIN Alauddin, 2009), h. 18.

²³Koes Irianto, *Mikrobiologi Mengukir Dunia Mikroorganisme* (Bandung: Yrama Widya, 2007), h.

²⁴“Bakteri”, *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, <http://id.wikipedia.org/wiki/disentri>. (31 Januari 2010).

dalam usaha mewarnai bakteri pada jaringan yang terinfeksi²⁵. Mula-mula sel-sel tersebut diwarnai dengan pewarna ungu yang disebut dengan Kristal violet, kemudian preparat itu diberi alkohol atau aseton, selanjutnya diberikan larutan safranin. Dimana bakteri yang tidak luntur warnanya oleh alkohol/aseton disebut dengan bakteri gram positif, sedangkan yang luntur disebut dengan bakteri gram negatif. Pada bakteri Gram positif, kandungan utama dinding sel adalah peptidoglikan dan asam teikoat, sedangkan pada bakteri Gram negatif dinding sel meliputi peptidoglikan dan membran luar²⁶.



²⁵Jawetz, Melnik, dan Adelberg's, *Mikrobiologi Kedokteran* (Jakarta: Salemba Medika, 2005), h.56.

²⁶John W Kimball, *Biologi Jilid III* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 835.

Berikut adalah perbedaan relatif antara bakteri gram positif dan negatif.

Tabel 1. Perbedaan Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif

Ciri	Gram Positif	Gram Negatif
Struktur	Tebal (15-80 nm)	Tipis (10-15 nm)
Dinding sel	1 lapis (mono)	3 lapis (multi)
Komposisi dinding sel	Lipid (1-4%) Peptidoglikan 50-90 % berat kering dan memiliki Asam teikoat	Lipid (11-22%). Peptidoglikan 10% dari berat kering, Tidak ada asam teikoat.
Syarat nutrisi	Lebih rumit	Relatif sederhana
Resistensi	Lebih resisten	Kurang resisten

(Sumber : Hafsah, *Mikrobiologi Umum* (Makassar: UIN Alauddin, 2009)

1. Bakteri Gram Positif

Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan Gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop.

Bakteri gram positif seperti *Staphylococcus aureus* (bakteri patogen yang umum pada manusia) hanya mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan. Sekitar 90% dari dinding sel tersebut tersusun atas peptidoglikan sedangkan sisanya berupa molekul lain bernama asam teikoat.

Salah satu jenis bakteri yang tergolong dalam kelompok bakteri gram positif adalah *Staphylococcus aureus*.

a. Bakteri *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram Positif, tidak bergerak, tidak berspora dan mampu membentuk kapsul, berbentuk kokus dan tersusun seperti buah anggur. Pembentukan kelompok ini karena pembelahan sel-sel anaknya cenderung tetap berada di dekat sel induknya. Ukuran *Staphylococcus* berbeda-beda tergantung pada media pertumbuhannya. Apabila ditumbuhkan pada media agar, *Staphylococcus* memiliki diameter 0,5-1,0 mm dengan koloni berwarna kuning. Dinding selnya mengandung asam teikoat, yaitu sekitar 40% dari berat kering dinding selnya. Asam teikoat adalah beberapa kelompok antigen dari *Staphylococcus*. Suhu optimum untuk pertumbuhan *Staphylococcus aureus* adalah 35° – 37° C dengan suhu minimum 6,7° C dan suhu maksimum 45,4° C. Bakteri ini dapat tumbuh pada pH 4,0 – 9,8 dengan pH optimum 7,0 – 7,5. Pertumbuhan pada pH mendekati 9,8 hanya mungkin bila substratnya mempunyai komposisi yang baik untuk pertumbuhannya²⁷.

Staphylococcus aureus mempunyai 4 karakteristik khusus, yaitu faktor virulensi yang menyebabkan penyakit berat pada *normal host*, faktor differensiasi yang menyebabkan penyakit yang berbeda pada sisi atau tempat berbeda, faktor persisten bakteri pada lingkungan dan manusia yang membawa gejala karier, dan faktor resistensi terhadap berbagai antibiotik yang sebelumnya masih efektif²⁸.

S. aureus merupakan mikroflora normal manusia. Bakteri ini biasanya terdapat pada saluran pernafasan atas dan kulit. Keberadaan *S. aureus* pada saluran pernafasan atas dan kulit pada individu jarang menyebabkan penyakit, individu sehat biasanya

²⁷Queen Sheeba, Bakteri *Staphylococcus aureus*, *Blog Quen Sheeba*, <http://queenofsheeba.wordpress.com/2008/07/22/bakteri-staphylococcus-aureus/> (23 Januari 2011).

²⁸Ika Dahayu Wasitaningrum, *Uji Resistensi Bakteri S. aureus dan E. coli Dari Isolat Susu sapi Segar Terhadap Beberapa Antibiotik* (Surakarta : Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

hanya berperan sebagai karier. Infeksi serius akan terjadi ketika resistensi inang melemah karena adanya perubahan hormon; adanya penyakit, luka, atau perlakuan menggunakan steroid atau obat lain yang memengaruhi imunitas sehingga terjadi pelemahan inang.

Infeksi *Staphylococcus aureus* diasosiasikan dengan beberapa kondisi patologi, diantaranya bisul, jerawat, pneumonia, dan meningitis. Sebagian besar penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini memproduksi nanah, oleh karena itu bakteri ini disebut piogenik.

b. Klasifikasi Ilmiah

Kindom : Plantae
Divisio : Protophyta
Class : Schizomycetes
Ordo : Eubacteriales
Familia : Micrococcaceae

Genus : *Staphylococcus*
Spesies : *Staphylococcus aureus*²⁹.

c. Gambar *Staphylococcus aureus*

²⁹Garrity GM Bell J.A. and Lilburn, T.G, *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Sistematic Bacteriologi, 2nd Edition* (United State of Amerika: Berlin Heidelberg, 2004)



(Sumber Wikipedia Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/ Staphylococcus aureus](http://id.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus)).
Gambar 2. Bakteri *Staphylococcus aureus*

d. Penyakit yang ditimbulkan

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi pada folikel rambut dan kelenjar keringat, bisul, infeksi pada luka, meningitis, endocarditis, pneumonia, pyelonephritis, dan osteomyelitis. Selain itu, *Staphylococcus aureus* dapat menimbulkan infeksi bernanah dan abses. Infeksinya akan lebih berat bila menyerang anak-anak, usia lanjut dan orang yang daya tahan tubuhnya menurun, seperti penderita penyakit DM (Diabetes mellitus). Maka hal ini, pencegahan harus dilakukan dengan meningkatkan daya tahan tubuh, salinitas lingkungan dan kebersihan pribadi³⁰.

2. Bakteri Gram Negatif

³⁰Indan Entjang, Mikrobiologi dan Parasitologi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), h. 118.

Bakteri gram negatif adalah bakteri bakteri yang tidak mampu mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan Gram sehingga akan berwarna merah di bawah mikroskop.

Bakteri gram negatif (seperti *E. coli*) memiliki sistem membran ganda di mana membran plasmanya diselimuti oleh membran luar permeabel. Bakteri ini mempunyai dinding sel tebal berupa peptidoglikan, yang terletak di antara membran dalam dan membran luarnya.

Salah satu jenis bakteri yang tergolong dalam kelompok bakteri gram negatif adalah *Escherichia coli*.

a. Bakteri *Escherichia coli*

Bakteri ini berbentuk batang, gram negatif, fakultatif aerob, dan tumbuh baik pada daerah sederhana. Dapat melakukan fermentasi laktosa dan fermentasi glukosa serta menghasilkan gas. *Escherichia coli* merupakan flora normal, hidup komensal di dalam colon manusia dan diduga membantu pembuatan vitamin K yang penting untuk pembekuan darah³¹.

Escherichia coli digunakan untuk menilai tentang baik tidaknya persediaan air untuk keperluan rumah tangga. Hal ini penting karena air untuk keperluan rumah tangga sering kali menyebabkan terjadinya epidemi penyakit-penyakit saluran pencernaan makanan, seperti diare, kolera, tifus, disentri, dan penyakit cacing. Bibit penyakit ini berasal dari feses manusia yang menderita penyakit-penyakit tersebut. Karena itu, diusahakan agar air rumah tangga dijaga jangan sampai dikotori feses

³¹Indan Entjang, *op. cit.*,h. 103.

manusia, karena mungkin dalam feses manusia itu terdapat bibit-bibit penyakit tersebut³².


b. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom : Plantae
Divisio : Protophyta
Classis : Scizomycetes
Ordo : Eubacteriales
Familia : Enterobacteriaceae
Genus : *Escherichia*
Species : *Escherichia coli*³³.

c. Gambar bakteri *Escherichia coli*

³²*Ibid.*

³³Garrity GM Bell J.A. and Lilburn, T.G, *loc.cit.*,.



(Sumber: Wikipedia Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Escherichia coli](http://id.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli))
Gambar 3. Bakteri *Escherichia coli*

d. Penyakit yang ditimbulkan

Escherichia coli merupakan flora normal di dalam usus manusia dan akan menimbulkan penyakit bila masuk ke dalam organ atau jaringan lain. Strain (jenis) tertentu dari *Escherichia coli* (enteropathogenic *Escherichia coli*) dapat menyebabkan penyakit diare. Bakteri ini sering menumbulkan wabah diare pada anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit. Sebenarnya *Escherichia coli* merupakan flora normal di dalam saluran usus, tetapi *Escherichia coli* tetap dicurigai sebagai penyebab diare. Hal ini disebabkan ada dua mekanisme yaitu (1) dengan memproduksi enterotoksin yang secara tidak langsung menyebabkan kehilangan cairan dan (2) terjadinya invasi pada lapisan epitelium dinding usus yang menyebabkan terjadinya peradangan dan kehilangan cairan³⁴.

C. Tinjauan Umum Fungi (Jamur)

³⁴M. Natsir Djide dan Sartini, *Mikrobiologi Klinik* (Universitas Hasanuddin : Makassar, 2008), h. 117.

Dalam dunia mikrobial, jamur termasuk dalam divisi Mycota (fungi). Mycota berasal dari kata *mykes* (bahasa Yunani), disebut juga fungi (bahasa Latin). Ada beberapa istilah yang dikenal untuk menyebut jamur:

1. Mushroom, yaitu jamur yang dapat menghasilkan badan buah besar, termasuk jamur yang dapat dimakan.
2. Mold, yaitu jamur yang berbentuk seperti benang-benang.
3. Khamir yaitu jamur yang bersel satu³⁵.

Jamur merupakan mikrobial eukariot yang mempunyai ciri-ciri spesifik antara lain: mempunyai inti sel, membentuk spora, tidak berklorofil, saprofit, dan dapat berkembangbiak secara seksual, maupun aseksual³⁶.

Habitat (tempat hidup) jamur terdapat pada air dan tanah. Cara hidupnya bebas atau bersimbiosis, tumbuh sebagai saprofit atau parasit pada tanaman, hewan, dan manusia³⁷.

Salah satu jenis jamur (fungi) yang dapat menimbulkan penyakit infeksi adalah *Candida albicans*. *Candida albicans* merupakan jamur dimorfik karena kemampuannya untuk tumbuh dalam dua bentuk yang berbeda yaitu sebagai sel tunas yang akan berkembang menjadi blastospora dan menghasilkan kecambah yang akan membentuk hifa semu. Perbedaan bentuk ini tergantung pada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Sel ragi (blastospora) berbentuk bulat, lonjong atau bulat lonjong dengan ukuran 2-5 μm x 3-6 μm hingga 2-5,5 μm x 5-28 μm ³⁸.

³⁵ Hafsah, *op.cit.*, h. 28.

³⁶ Yusminah Hala, Muhammad Khalifah M, dan Achmad Abubakar, *Biologi Umum I* (Makassar: CV Berkah Utami, 2006) h. 105.

³⁷ Hafsah, *loc. Cit.*

³⁸ Dian Hendrawati, *Candida albicans* (Jurnal Kedokteran volume 3).

Candida albicans dapat tumbuh pada variasi pH yang luas, tetapi pertumbuhannya akan lebih baik pada pH antara 4,5-6,5. Jamur ini dapat tumbuh dalam perbenihan pada suhu 28°C - 37°C . *C. albicans* membutuhkan senyawa organik sebagai sumber karbon dan sumber energi untuk pertumbuhan dan proses metabolismenya. Unsur karbon ini dapat diperoleh dari karbohidrat. Jamur ini merupakan organisme anaerob fakultatif yang mampu melakukan metabolisme sel, baik dalam suasana anaerob maupun aerob. Proses peragian (fermentasi) pada *C. albicans* dilakukan dalam suasana aerob dan anaerob. Karbohidrat yang tersedia dalam larutan dapat dimanfaatkan untuk melakukan metabolisme sel dengan cara mengubah karbohidrat menjadi CO_2 dan H_2O dalam suasana aerob³⁹.

Pada proses fermentasi, jamur ini menunjukkan hasil terbentuknya gas dan asam pada glukosa dan maltosa, terbentuknya asam pada sukrosa dan tidak terbentuknya asam dan gas pada laktosa. Pada proses asimilasi menunjukkan adanya pertumbuhan pada glukosa, maltosa dan sukrosa namun tidak menunjukkan pertumbuhan pada laktosa⁴⁰.

Dinding sel *C. albicans* berfungsi sebagai pelindung dan juga sebagai target dari beberapa antimikotik. Dinding sel berperan pula dalam proses penempelan dan kolonisasi serta bersifat antigenik. Fungsi utama dinding sel tersebut adalah memberi bentuk pada sel dan melindungi sel ragi dari lingkungannya. *C. albicans* mempunyai struktur dinding sel yang kompleks, tebalnya 100 sampai 400 nm⁴¹.

1. Klasifikasi Ilmiah

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

Menurut Lodder (1970) dalam Suprihatin (1982), taksonomi *Candida albicans* adalah sebagai berikut:

Kingdom : Fungi

Divisio : Deuteromycota

Familia : Cryptococcaceae

Sub famili : Candidoidea

Genus : *Candida*

Species : *Candida albicans*⁴²

2. Gambar *Candida albicans*



(Sumber: Wikipedia Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans)
Gambar 4. Gambar *Candida albicans*

3. Penyakit yang ditimbulkan

Candida albicans dapat menyebabkan penyakit Candidiasis. Candidiasis merupakan penyakit jamur yang bersifat akut yang menyerang mulut, vagina, kuku, dan rektum.

⁴²Suprihatin, S.D, *Candida dan Kandidiasis pada Manusia* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1982)

Sebenarnya *Candida albicans* secara alami terdapat pada daerah-daerah tersebut, hanya saja jika pertumbuhannya pesat yang kemudian akan mengakibatkan peradangan yang disebut dengan kandidiasis/kandidosis. Salah satu jenis kandidosis adalah kandidosis kulit. Dimana jamur ini sering ditemukan di daerah lipatan, misalnya ketiak, di bawah payudara, lipat paha, lipat pantat dan sela jari kaki. Kulit yang terinfeksi tampak kemerahan, agak basah, bersisik halus dan berbatas tegas. Gejala utama adalah rasa gatal dan rasa nyeri bila terjadi maserasi atau infeksi sekunder oleh kuman⁴³.

D. Tinjauan Umum Ekstraksi

1. Defenisi

Ekstraksi merupakan proses penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan, dan beberapa jenis dari biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dan pelarut tertentu dalam mengekstraksi⁴⁴.

2. Mekanisme Kerja

Proses terestraksinya zat aktif dalam tanaman adalah mula-mula pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke rongga sel yang mengandung zat aktif, selanjutnya zat aktif terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan

⁴³Small Crab, *Karakteristik Candida albicans*, <http://www.smallcrab.com/kesehatan/415-karakteristik-candida-albicans> (23 januari 2011).

⁴⁴A.Rahim Alam G, *Fitokimia* (Makassar: Farmasi UIN Alauddin, 2008), h. 1.

terpekat akan berdifusi keluar sel dan proses ini akan berulang terus hingga terjadi keseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel⁴⁵.

3. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Tujuan ekstraksi secara umum terdapat empat situasi:

- a. Secara kimia telah diketahui identitasnya untuk diekstraksi dari organisme. Dalam kasus ini prosedur yang telah dipublikasikan dapat diikuti dan dibuat modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyeimbangkan dengan kebutuhan pemakai.
- b. Bahan diperiksa untuk menentukan kelompok senyawa kimia tertentu, misalnya : alkaloid, flavanoid, atau saponin. Dalam situasi ini metode umum yang digunakan untuk senyawa kimia yang diminati dapat diperoleh dari pustaka.
- c. Organisme (hewan atau tumbuhan) digunakan dalam pengobatan tradisional dan biasanya dibuat dengan berbagai cara misalnya *Tradisional Chinese Medicine* (TCM) seringkali membutuhkan herba yang dididihkan dalam air

⁴⁵*Ibid.*

untuk diberikan sebagai obat. Proses ini harus ditiru sedekat mungkin jika ekstrak akan melalui kajian ilmiah biologi atau kimia lebih lanjut, khususnya jika tujuannya untuk memvalidasi penggunaan obat tradisional.

- d. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara apapun. Situasi ini (umumnya dalam program skrining) dapat timbul jika tujuannya adalah menguji organisme, baik yang dipilih secara acak ataupun yang didasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa dengan aktivitas biologi tertentu⁴⁶.

4. Prinsip Ekstraksi

Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari (larutan) yang sesuai selama tiga hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan.

5. Jenis Ekstraksi

Ada beberapa jenis ekstraksi yaitu:

⁴⁶*Ibid.*, h. 11-12.

a. Ekstraksi secara dingin

Ekstraksi secara dingin terdiri atas beberapa macam, yaitu;

1. Metode maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Metode maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, tiraks dan lilin.

Keuntungan dari metode ini adalah peralatannya sederhana. Sedangkan kerugiannya antara lain waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama, cairan penyari yang digunakan lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks dan lilin⁴⁷.

2. Metode Soxhletasi

Soxhletasi merupakan penyarian simplisia secara berkesinambungan, cairan penyari dipanaskan sehingga menguap, uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia dalam klongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon.

Keuntungan metode ini adalah dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung,

⁴⁷Medicafarma, Ekstraksi, *Blog Medicafarma*, <http://medicafarma.blogspot.com/ekstraksi> (20 Oktober 2010).

digunakan pelarut yang lebih sedikit, dan pemanasannya dapat diatur sedangkan kerugian dari metode ini adalah karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas dan bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok untuk menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi, seperti metanol atau air, karena seluruh alat yang berada di bawah kondensor perlu berada pada temperatur ini untuk pergerakan uap pelarut yang efektif⁴⁸.

3. Metode Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Keuntungan metode ini adalah tidak memerlukan langkah tambahan yaitu sampel padat telah terpisah dari ekstrak. Kerugiannya adalah kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode refluks, dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien⁴⁹.

b. Ekstraksi secara panas

1. Metode refluks

Keuntungan dari metode ini adalah digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

Kerugiannya adalah membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator⁵⁰.

2. Metode destilasi uap

Destilasi uap adalah metode yang populer untuk ekstraksi minyak-minyak menguap (esensial) dari sampel tanaman. Metode destilasi uap air diperuntukkan untuk menyari simplisia yang mengandung minyak menguap atau mengandung komponen kimia yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan udara normal⁵¹.

E. Antimikroba

1. Defenisi

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotika, antiseptika, desinfektan, dan preservatif. Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan, maupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif, artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidak toksik terhadap hospes atau inang⁵².

Antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan.

Mikroorganisme dapat menyebabkan bahaya karena kemampuan menginfeksi dan

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²M. Natsir Djide dan Sartini, *Dasar-dasar mikrobiologi* (Universitas Hasanuddin : Makassar, 2008), h. 328.

menimbulkan penyakit serta merusak bahan pangan. Antibakteri termasuk kedalam antimikroba yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri⁵³.

2. Prinsip Kerja Antimikroba

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksik terhadap mikroorganismenya dibandingkan pada sel hospes atau inangnya. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi-reaksi biokimia yang penting dalam sel parasit lebih unggul daripada pengaruhnya terhadap hospes. Disamping itu juga struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (hospes atau inang)⁵⁴.

Mekanisme kerja antibakteri yaitu:

- a. Merusak dinding sel yaitu dengan menghambat pembentukan dan mengubahnya setelah selesai terbentuk. Contoh: penisilin.
- b. Mengganggu permeabilitas sel yaitu dengan merusak membran sel. Fungsi membran sel adalah mempertahankan bahan-bahan dalam sel serta mengatur aliran keluar masuknya bahan lain. Adanya kerusakan pada membran ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel. Contoh: polimiksin.
- c. Merubah molekul protein dan asam nukleat yaitu dengan mendenaturasikan protein dan asam nukleat sehingga kerusakan sel tidak dapat diperbaiki lagi karena hidup suatu sel tergantung pada molekul protein dan asam nukleat dalam keadaan alamiah. Contoh: fenolat dan persenyawaan fenolat.

⁵³“Antibakteri”, *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, <http://id.wikipedia.org/wiki/antibakteri>. (20 Oktober 2010).

⁵⁴M. Natsir Djide dan Sartini, *loc.cit*.

- d. Menghambat kerja enzim dengan mengganggu reaksi biokimiawi. Penghambatan ini dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme sel. Contoh: sulfonamid.
- e. Menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Gangguan pada pembentukan atau fungsi-fungsi DNA, RNA dan protein dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel, karena zat-zat tersebut memegang peranan penting dalam proses kehidupan normal sel. Contoh: tetrasiklin⁵⁵.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kerja zat antimikroba menurut Pelczar adalah sebagai berikut⁵⁶:

- a. Konsentrasi atau intensitas zat antimikroba

Semakin tinggi konsentrasi suatu zat antimikroba semakin tinggi zat antimikrobanya, artinya banyak bakteri akan terbunuh lebih cepat bila konsentrasi zat tersebut lebih tinggi.

- b. Jumlah mikroorganisme

Semakin banyak jumlah organisme yang ada makin banyak pula waktu yang diperlukan untuk membunuhnya

- c. Suhu

Kenaikan suhu yang besar dapat menaikkan keefektifan suatu desinfektan atau bahan mikrobial lain. Hal ini disebabkan karena zat kimia merusak mikroorganisme melalui reaksi kimia. Dan reaksi kimia dipercepat dengan meningkatkan suhu

- d. Spesies mikroorganisme

⁵⁵Pelczar, J Michael dan ECS. Chan. *Dasar-dasar Mikrobiologi*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.) h.

⁵⁶*Ibid.*

Spesies mikroorganisme menunjukkan ketahanan yang berbeda-beda terhadap suatu bahan kimia tertentu.

e. Adanya bahan organik

Adanya bahan organik asing dapat menurunkan keefektifan zat kimia antimikrobal dengan cara menginaktivkan bahan kimia tersebut. Adanya bahan organik dalam campuran zat antimikrobal dapat mengakibatkan Penggabungan zat antimikrobal dengan bahan organik membentuk produk yang tidak bersifat antimicrobial, Penggabungan zat antimikrobal dengan bahan organik menghasilkan suatu endapan sehingga antimikrobal tidak mungkin lagi mengikat mikroorganisme, dan akumulasi bahan organik pada permukaan sel mikroba menjadi suatu pelindung yang akan mengganggu kontak antara zat antimicrobial dengan sel.

f. Keasaman atau kebasaaan (pH)

Mikroorganisme yang hidup pada pH asam dapat dibasmi pada suhu yang lebih rendah dan dalam waktu yang lebih singkat bila dibandingkan dengan mikroorganisme yang sama di dalam lingkungan yang basa.

3. Sifat Antimikroba

Antimikroba memiliki 2 sifat utama, yaitu;

a. Bakteriostatik

Zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi bermultiplikasi dan berkembang biak. Contoh dari bakteriostatik adalah sulfonamida, tetrasiklin, kloramfenikol, dan eritromisin.

b. Bakteriosida

Zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan akan habis dan tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak. Contoh dari bakteriosida adalah penisilin sefalosporin, dan neomisin⁵⁷.

Bahan antimikrobia dapat bersifat bakteristatik pada konsentrasi yang rendah, namun bersifat bakterisida pada konsentrasi tinggi. Bahan kemoterapeutik yang baik adalah mempunyai daya mematikan mikroba, namun tidak menyebabkan keracunan pada induk atau inang yang menggunakan bahan tersebut⁵⁸.

Selain itu antibiotika juga memiliki beberapa sifat yang lain, yaitu menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak sel inang, tidak menyebabkan resistensi pada kuman (bakteri), memiliki spektrum yang luas efektif digunakan bagi banyak spesies bakteri, baik kokus (bulat), basil (batang), maupun spiral (koma), tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, tetap aktif dalam plasma, cairan badan atau eksudat, larut di dalam air serta stabil⁵⁹.

Kebanyakan zat antimikroba yang efektif kerjanya mengganggu sintesis, penyusunan atau fungsi komponen-komponen makromolekul sel, seperti

⁵⁷M. Natsir Djide dan Sartini, *op.cit.*, h. 328.

⁵⁸Lud Waluyo, *Teknik Metode Dasar Mikrobiologi* (Malang : UMM Press, 2008),

⁵⁹*Ibid.*, h. 239.

penghambatan pembentukan dinding sel oleh polimiksin, penghambatan sintesis protein oleh kloramfenikol⁶⁰.

F. Tinjauan Islam Tentang Penyakit dan Pengobatannya

Allah SWT sebagai Sang Pencipta alam ini menciptakan semuanya dengan tidak sia-sia, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan tersendiri, sehingga dari situ kita akan memperoleh hikmah dan manfaat. Seperti halnya Allah SWT menciptakan kita di muka bumi ini selain untuk mengabdikan dan menyembah kepadanya, Dia juga menginginkan kita untuk senantiasa menggali potensi yang ada pada diri kita, salah satunya adalah potensi keilmuan yang kita miliki.

Tuhan selalu menginginkan hamba-Nya untuk selalu berfikir dalam menghadapi hambatan dan permasalahan hidup agar kita tidak tinggal diam menghadapinya, akan tetapi dengan membuat perubahan yang bermanfaat sehingga kita dapat mengatasinya.

Allah SWT berfirman pada Q.S. Yunus: 10/57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman⁶¹.

⁶⁰Koes Irianto, op.cit., h. 93.

⁶¹Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah : Percetakan Alqur'an Raja Fahd, 2007), h. 315.

Pada ayat tersebut terdapat kata-kata “telah datang pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit”. Kutipan ini merupakan sebuah pertanda dan isyarat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang berilmu untuk senantiasa menggali dan mengembangkan potensi keilmuan yang kita miliki, terlebih lagi dalam hal pengobatan penyakit yang berasal dari alam, baik itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, maupun dari hewan-hewan serta organisme lainnya. Selain itu hal ini juga akan membuat kita berfikir bahwa semua penyakit yang ada hanya dapat sembuh jikalau Allah SWT mengizinkannya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S. Asy-Syuaraa’: 26/80:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembukanku⁶².

Ayat tersebut di atas merupakan bantahan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada para penyembah berhala pada saat itu, bahwa segala macam penyakit itu hanya dapat disembuhkan atas seizin Allah, yang juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa penyakit akan sembuh berkat izin Allah tetapi prosesnya tidak langsung terjadi begitu saja, melainkan Allah menyuruh kita untuk senantiasa berusaha dan berihktiar untuk mencari pengobatannya, karena Allah tidak menginginkan kita untuk berpangku tangan dan menunggu kejaiban datang menghampiri kita. Sehingga Ayat ini juga memotifasi kita untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan tentang penyakit dan pengobatannya,

⁶²*Ibid.*, h. 579.

khususnya pengobatan herbal atau tumbuhan alami yang tidak memerlukan biaya yang banyak untuk mengobati suatu penyakit.

Allah SWT menurunkan penyakit ke muka bumi ini bersamaan juga dengan obat atau penawar dari penyakit tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa setiap penyakit ada obatnya.

Diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda :

...أَنْزَلَ اللهُ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ (رواه البخاري)

Artinya :

.....Allah yang menurunkan penyakit, dan Dia juga yang menurunkan obatnya.(HR. Bukhari).⁶³

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda :

...لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى (رواه مسلم)

Artinya :

... Setiap penyakit ada obatnya. Dan jika suatu obat mengenai tepat pada penyakitnya, ia akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. (HR. Muslim)⁶⁴.

Hadits nabi tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap penyakit pasti memiliki obat. Oleh karena itu tugas dari kita adalah menggali dan mencari tahu tentang pengobatan dari suatu penyakit yang Allah turunkan, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan penelitian tentang pengobatan alamiah (herbal) yaitu dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai penyembuh dari suatu penyakit.


⁶³Imam az- Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Bandung: Mizan, 2008), h. 833.

⁶⁴M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Depok : Gema Insani, 2008), h. 718.

Hal ini adalah merupakan salah satu bentuk usaha dan ikhtiar kita untuk tidak berpangku tangan dalam menghadapi penyakit, karena Allah sangat melarang hambanya untuk berpasrah diri tanpa melakukan usaha apapun dalam menghadapi suatu penyakit.

Sekalipun telah kita sadari bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah, tetapi kita harus ingat kembali bahwa Allah menurunkan penyakit dan dia juga yang menurunkan obatnya yang berarti bahwa ada pesan tersirat dari hadits nabi tersebut bagi kita untuk mencari obat dari penyakit tersebut karena kesembuhan tidak datang dengan sendirinya. Perlu juga kita ketahui bahwa obat tidak lain hanyalah merupakan perantara atau faktor penyebab kesembuhan dari Allah, sebagai media ikhtiar dan usaha demi mematuhi Sunnatullah dan hukum alam yang berlaku.

G. Kerangka Teori



H. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan bakteri (*Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) dan jamur (*Candida albicans*).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yaitu melihat pengaruh ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) terhadap pertumbuhan bakteri (*Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) dan jamur (*Candida albicans*).

B. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu:

1. Variabel bebas, yaitu ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*)
2. Variabel terikat, yaitu pertumbuhan bakteri (*Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) dan jamur (*Candida albicans*).

C. Defenisi Operasional Variabel

1. Ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) adalah ekstrak atau cairan yang diperoleh dari hasil penyaringan dan destilasi daun patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) dengan menggunakan pelarut etanol 96%, dimana diperoleh hasil destilasi sebesar 100% yang selanjutnya akan diencerkan menjadi beberapa macam konsentrasi sesuai dengan perlakuan.
2. Pertumbuhan bakteri (*Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) dan jamur (*Candida albicans*) adalah kemampuan tumbuh dan berkembangbiak dari bakteri (*Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) secara invitro yang diinokulasikan pada medium NA (Nutrien Agar) dan jamur (*Candida albicans*) pada medium PDA (Potato Dekstrosa Agar) dan telah diberikan ekstrak patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi yang ditandai dengan adanya zona hambat pada *paper disk*.

D. Ruang Lingkup dan Batasan

1. Ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta L.*) diperoleh dari hasil penyaringan dan destilasi daun patikan kebo dengan menggunakan pelarut etanol 96%.
2. Pertumbuhan bakteri bakteri (*Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) dan jamur (*Candida albicans*) ditentukan dengan melihat besar zona bening atau zona hambat yang terdapat pada daerah sekeliling *paper disk* yang telah dijenuhkan dengan ekstrak patikan kebo dengan masa inkubasi selama 24 sampai 48 jam.

3. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni hingga 12 Juli 2011 di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang diberikan ekstrak patikan kebo dengan perlakuan sebagai berikut:

- a. A0 = kontrol negatif (dijenuhkan dalam aquadest)
- b. A1 = konsentrasi ekstrak patikan kebo 40%
- c. A2 = konsentrasi ekstrak patikan kebo 45%
- d. A3 = konsentrasi ekstrak patikan kebo 55%
- e. A4 = konsentrasi ekstrak patikan kebo 55%
- f. A5 = konsentrasi ekstrak patikan kebo 60%

Dimana untuk masing-masing biakan (mikroba) uji diberikan kode B untuk *Staphylococcus aureus*, kode C untuk *Escherichia coli*, dan kode D untuk *Candida albicans*, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Kombinasi Perlakuan Ekstrak Patikan Kebo Pada Mikroba Uji

No	Kode	Perlakuan
1	A0	Kontrol (aquadest)
2	A1B	Konsentrasi 40% patikan kebo pada <i>S.aureus</i>
3	A2B	Konsentrasi 45% patikan kebo pada <i>S.aureus</i>
4	A3B	Konsentrasi 50% patikan kebo pada <i>S.aureus</i>
5	A4B	Konsentrasi 55% patikan kebo pada <i>S.aureus</i>
6	A5B	Konsentrasi 60% patikan kebo pada <i>S.aureus</i>
7	A1C	Konsentrasi 40% patikan kebo pada <i>E. coli</i>
8	A2C	Konsentrasi 45% patikan kebo pada <i>E. coli</i>
9	A3C	Konsentrasi 50% patikan kebo pada <i>E. coli</i>

10	A4C	Konsentrasi 55% patikan kebo pada <i>E. coli</i>
11	A5C	Konsentrasi 60% patikan kebo pada <i>E. coli</i>
12	A1D	Konsentrasi 40% patikan kebo pada <i>C. albicans</i>
13	A2D	Konsentrasi 45% patikan kebo pada <i>C. albicans</i>
14	A3D	Konsentrasi 50% patikan kebo pada <i>C. albicans</i>
15	A4D	Konsentrasi 55% patikan kebo pada <i>C. albicans</i>
16	A5D	Konsentrasi 60% patikan kebo pada <i>C. albicans</i>

F. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cawan petri, inkubator, *laminar air flow*, ose bulat, neraca analitik, labu takar 100 ml, tabung reaksi, gelas ukur, batang pengaduk, blender, oven, bunsen, jangka sorong, pelubang kertas, labu erlenmeyer, perlengkapan destilasi, bunsen spirtus, spoit, pinset, botol semprot, vortex, rak tabung, corong, gelas kimia dan kulkas.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tumbuhan patikan kebo (*Euphorbia hirta L*), isolat bakteri (*Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) dan jamur (*Candida albicans*), aquadest, alumunium foil, kertas HVS, kertas saring, medium NA (Nutrient Agar), medium PDA (Potato Dekstrosa Agar), pelarut etanol 96%, spirtus, kapas penutup, tissue, dan alkohol 70%.

G. Prosedur Kerja

1. Tahap persiapan

a. Pembuatan medium NA (Nutrien Agar)

Masing-masing bahan (ekstrak beef 1,5 gram, pepton 2,5 gram, bacto agar 7,5 gram) ditimbang dengan teliti, lalu dilarutkan ke dalam aquadest 500 ml, kemudian dipanaskan sambil diaduk hingga homogen. Selanjutnya wadah ditutup dengan baik, kemudian disterilkan dalam otoklaf pada tekanan 2 atm, suhu 121°C selama 15 menit.

b. Pembuatan medium PDA (Potato Dekstrosa Agar)

Masing-masing bahan (kentang 200 gram, dekstrosa 7,5 gram, bacto agar 7,5 gram) ditimbang dengan teliti, lalu dilarutkan ke dalam aquadest 500 ml, kemudian dipanaskan sambil diaduk hingga homogen. Selanjutnya wadah ditutup dengan baik, kemudian disterilkan dalam otoklaf pada tekanan 2 atm, suhu 121°C selama 15 menit.

c. Sterilisasi Alat dan Bahan

1. Sterilisasi menggunakan oven

Alat-alat yang tahan terhadap panas tinggi misalnya labu erlenmeyer, cawan petri, dan tabung reaksi, disterilkan dengan menggunakan oven biasanya pada suhu 180°C, tetapi terlebih dahulu dicuci bersih dan disterilkan dengan menggunakan alkohol kemudian dibungkus dengan kertas.

2. Sterilisasi menggunakan autoklaf

Media dan bahan distrilkan dengan tekanan tinggi, dengan menggunakan autoklaf, pada tekanan 2 ATM dengan suhu 121°C selama 15

– 30 menit. Biasanya tergantung pada jenis dan banyaknya bahan. Medium yang disterilkan adalah medium NA (Nutrient Agar), PDA (Potato Dekstrosa Agar) dan aquadest.

3. Sterilisasi menggunakan bunsen

Alat yang terbuat dari kawat platina seperti kawat ose, disterilkan dengan menggunakan bunsen dengan cara membakar alat tersebut di atas api sampai pijar, disamping itu juga digunakan dalam pengerjaan secara aseptis untuk menghindari terjadinya kontaminasi.

4. Sterilisasi aquadest

Aquadest dimasukkan kedalam labu erlenmeyer kemudian ditutup dengan menggunakan kapas dan aluminium foil kemudian disterilkan ke dalam autoklaf pada tekanan 2 ATM dengan suhu 121°C selama 20 menit.

2. Tahap pelaksanaan

a. Pembuatan ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta* L.)

Daun patikan kebo (*Euphorbia hirta* L.) yang segar telah dibersihkan dengan menggunakan aquadest lalu diangin-anginkan selama 1 minggu hingga kering. Selanjutnya daun yang sudah kering diblender dan ditimbang sebanyak 200 gram kemudian dimaserasi dengan menggunakan etanol 800 ml selama 24 jam. Kemudian disaring untuk memisahkan ampas dan larutan yang akan didestilasi. Selanjutnya dilakukan destilasi selama \pm 2 jam dan hasilnya di simpan di gelas kimia serta ditutup dengan aluminium foil. Selanjutnya ekstrak yang diperoleh kemudian diencerkan sesuai dengan konsentrasi yang telah di

tentukan. Adapun proses pengenceran adalah sebagai berikut : ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dipipet masing-masing sebanyak 4 ml, 4,5 ml, 5 ml, 5,5 ml, dan 6 ml, kemudian disuspensikan dengan aquadest steril dalam 6 ml, 5,5 ml, 5 ml, 4,5 ml, dan 4 ml hingga diperoleh konsentrasi ekstrak masing-masing 40%, 45 %, 50%, 55% dan 60%.

Adapun penentuan konsentrasi tersebut di atas didasarkan pada hasil uji pendahuluan sebelumnya.

b. Peremajaan mikrobiologi uji

Biakan *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* masing-masing 1 kawat ose diinokulasikan ke dalam medium NA miring, sementara *Candida albicans* diinokulasikan ke dalam medium PDA kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37°C.

c. Pembuatan suspensi mikroba

Biakan *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*, dan *Candida albicans* yang telah diremajakan diambil dalam beberapa ose lalu diinokulasikan ke dalam 10 ml aquadest steril kemudian digoyangkan hingga homogen.

d. Pengujian daya hambat

1. Biakan *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* diambil secara aseptis lalu dituangkan ke dalam masing-masing cawan petri lalu diikuti dengan penuangan medium NA sebanyak \pm 15 ml, sementara untuk *Candida albicans* diikuti dengan penuangan medium PDA. Penuangan dilakukan

apabila medium telah mencapai 45°C–50°C kemudian dihomogenkan dengan cara cawan petri digoyang-goyangkan ke kiri dan ke kanan.

2. Paper disk yang telah dijenuhkan dengan aquadest sebagai kontrol dan larutan ekstrak daun patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dengan konsentrasi 40%, 45 %, 50%, 55% dan 60% diletakkan secara aseptis pada cawan petri yang berisi medium NA dan PDA.
 3. Sampel pengujian diinkubasi pada suhu 37°C dalam inkubator selama 24 jam dan 48 jam.
- e. Pengamatan pengolahan data

Pengamatan dan pengolahan data dilakukan setelah masa inkubasi yang dilakukan selama 24 jam dan 48 jam pada suhu 37°C yaitu dengan melihat dan mengukur diameter zona hambatan yang terbentuk di sekeliling paper disk. Selanjutnya data diolah secara statistik.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil Pengamatan dianalisis dengan menggunakan sidik ragam rancangan acak lengkap (RAL) pada taraf kepercayaan $\alpha = 0,05$ dan jika dalam pengujian tersebut berpengaruh nyata, maka pengujian dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaruh Beberapa Macam Konsentrasi Ekstrak Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*

Hasil pengamatan besarnya rata-rata diameter zona bening/hambat bakteri *Staphylococcus aureus* setelah diberikan beberapa macam konsentrasi ekstrak patikan kebo dengan tiga kali pengulangan ditunjukkan pada tabel lampiran 1. Dimana hasil uji analisis statistik dengan menggunakan uji F α 0,05 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi dengan tiga kali pengulangan berpengaruh nyata terhadap dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* melalui zona bening di sekeliling *paper disk* untuk pengamatan 24 jam dan 48 jam (tabel lampiran 1a.1 dan 1d.1)

Hasil uji BNT α 0,05 inkubasi 24 jam menunjukkan bahwa pemberian ekstrak patikan kebo dengan konsentrasi 40% berbeda nyata dengan kontrol dan demikian juga pada konsentrasi 45%, 50%, 55%, dan 60%, akan tetapi untuk konsentrasi yang satu dengan konsentrasi lainnya berbeda tidak nyata. Demikian juga untuk uji BNT α 0,05 inkubasi 48 jam diperoleh hasil yang sama dengan uji BNT α 0,05 inkubasi 24 jam.

Dimana rata-rata diameter zona bening pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* ditunjukkan pada tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus* Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 24 Jam

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata diameter zona hambat (mm)
	I	II	III		
A0 (kontrol)	0	0	0	0	0,00 ^a
A1B (40%)	3,2	3	2,5	8,7	2,90 ^b
A2B (45%)	4,2	3,2	3,3	10,7	3,56 ^{bc}
A3B (50%)	5,0	3,5	3,5	12,00	4,00 ^{cd}
A4B (55%)	6,5	4,7	4,6	15,8	5,26 ^{de}
A5B (60%)	7,0	4,8	4,7	16,5	5,5 ^e
Jumlah	25,9	19,2	18,6	63,7	21,22
BNT α 0,05 = 1,50					


Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%)

Tabel 4. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus* Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 48 Jam

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata diameter zona hambat (mm)
	I	II	III		
A0 (kontrol)	0	0	0	0	0,00 ^a
A1B (40%)	2	2,1	1,9	6	2,00 ^b
A2B (45%)	2,5	2,3	2,3	7,1	2,36 ^{bc}
A3B (50%)	3,3	3	2,5	8,8	2,93 ^{cd}
A4B (55%)	4,3	3,2	3	10,5	3,50 ^d
A5B (60%)	5	4	4,1	13,1	4,36 ^e
Jumlah	17,1	14,6	13,8	45,5	15,15
BNT α 0,05 = 0,71					

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%)

Rata-rata diameter zona bening pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* yang diberi perlakuan dengan ekstrak patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi pada masa inkubasi 24 dan 48 jam dapat ditunjukkan pada gambar 5.



Gambar 5. Histogram Zona Hambat Bakteri *Staphylococcus aureus* Masa Inkubasi 24 Jam dan 48 Jam

Keterangan:

- A0 = Kontrol (aquadest)
- A1B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 40%
- A2B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 45%
- A3B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 50%
- A4B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 55%
- A5B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 60%

Berdasarkan gambar pada histogram di atas menunjukkan bahwa pada masa inkubasi 24 jam semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan, maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk. Sebaliknya terdapat penurunan zona hambat setelah memasuki hari kedua (48 jam).

2. Pengaruh Beberapa Macam Konsentrasi Ekstrak Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L)

Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli*

Hasil pengamatan besarnya rata-rata diameter zona bening/hambat bakteri *Escherichia coli* setelah diberikan beberapa macam konsentrasi ekstrak patikan kebo

dengan tiga kali pengulangan ditunjukkan pada tabel lampiran 1. Dimana hasil uji analisis statistik dengan menggunakan uji F α 0,05 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi dengan tiga kali pengulangan berpengaruh nyata terhadap dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* melalui zona bening di sekeliling *paper disk* untuk pengamatan 24 jam dan 48 jam (tabel lampiran 1b.1 dan 1e.1)

Hasil uji BNT α 0,05 inkubasi 24 jam menunjukkan bahwa pemberian ekstrak patikan kebo dengan konsentrasi 40% berbeda nyata dengan kontrol dan demikian juga pada konsentrasi 45%, 50%, 55%, dan 60%, akan tetapi untuk konsentrasi yang satu dengan konsentrasi lainnya berbeda tidak nyata. Demikian juga untuk uji BNT α 0,05 inkubasi 48 jam diperoleh hasil yang sama dengan uji BNT α 0,05 inkubasi 24 jam.

Rata-rata diameter zona bening pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* ditunjukkan pada tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 24 Jam

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata diameter zona hambat (mm)
	I	II	III		
A0 (kontrol)	0	0	0	0	0,00 ^a
A1C (40%)	3,3	3,1	2,7	9,1	3,03 ^b
A2C (45%)	3,6	3,2	3,2	9,5	3,16 ^{bc}
A3C (50%)	4	3,5	3,7	11,2	3,73 ^{cd}
A4C (55%)	4,2	4,5	4,6	13,3	4,43 ^{de}
A5C (60%)	4,5	5,1	5	14,6	4,86 ^e
Jumlah	19,6	19,4	15,5	57,7	19,21
BNT α 0,05 = 1,02					


Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%)

Tabel 6. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 48 Jam

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata diameter zona hambat (mm)
	I	II	III		
A0 (kontrol)	0	0	0	0	0,00 ^a
A1C (40%)	3,9	2,9	2	8,8	2,93 ^b
A2C (45%)	4	3	2,4	9,4	3,13 ^{bc}
A3C (50%)	4,8	3,2	2,9	10,9	3,63 ^{cd}
A4C (55%)	5	4	3	12	4,00 ^{de}
A5C (60%)	5,1	4,7	4,7	14,3	4,76 ^e
Jumlah	22,8	17,8	14,8	55,40	18,46
BNT α 0,05 = 1,40					

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%)

Rata-rata diameter zona bening pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* yang diberi perlakuan dengan ekstrak patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi pada masa inkubasi 24 dan 48 jam dapat ditunjukkan pada gambar 6.



Gambar 6. Histogram Zona Hambat Bakteri *Escherichia coli* Masa Inkubasi 24 Jam dan 48 Jam

Keterangan:

- A0 = Kontrol (aquadest)
- A1C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 40%
- A2C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 45%
- A3C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 50%
- A4C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 55%
- A5C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 60%

Berdasarkan gambar pada histogram di atas menunjukkan bahwa pada masa inkubasi 24 jam semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan, maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk. Sebaliknya terdapat penurunan zona hambat setelah memasuki hari kedua (48 jam).

3. Pengaruh Beberapa Macam Konsentrasi Ekstrak Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L)

Terhadap Pertumbuhan Jamur *Candida albicans*

Hasil pengamatan besarnya rata-rata diameter zona bening/hambat jamur *Candida albicans* setelah diberikan beberapa macam konsentrasi ekstrak patikan kebo dengan tiga kali pengulangan ditunjukkan pada tabel lampiran 1. Dimana hasil uji analisis statistik dengan menggunakan uji F α 0,05 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi dengan tiga kali pengulangan berpengaruh nyata terhadap dalam menghambat pertumbuhan Jamur *Candida albicans* melalui zona bening di sekeliling *paper disk* untuk pengamatan 24 jam dan 48 jam (tabel lampiran 1c.1 dan 1f.1)

Hasil uji BNT α 0,05 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak patikan kebo konsentrasi 40% berbeda nyata dengan kontrol dan demikian juga pada konsentrasi 45%, 50%, 55%, dan 60%, akan tetapi untuk konsentrasi 40% berbeda tidak nyata dengan konsentrasi 45%, 50% dan 55%, hanya pada konsentrasi 60% yang berbeda nyata dengan konsentrasi lainnya. Sedangkan untuk uji BNT α 0,05 inkubasi 48 jam menunjukkan bahwa pemberian ekstrak patikan kebo dengan konsentrasi 40% berbeda nyata dengan kontrol dan demikian juga pada konsentrasi 45%, 50%, 55%, dan 60%, akan tetapi untuk konsentrasi yang satu dengan konsentrasi lainnya berbeda tidak nyata.

Rata-rata diameter zona bening pertumbuhan jamur *Candida albicans* ditunjukkan pada tabel 7 dan 8.

Tabel 7. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Jamur *Candida albicans* Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 24 Jam

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata diameter zona hambat (mm)
	I	II	III		
A0 (kontrol)	0	0	0	0	0,00 ^a
A1D (40%)	4,1	3,2	2,5	9,8	3,26 ^b
A2D (45%)	4,2	4	3	11,2	3,73 ^{bc}
A3D (50%)	5,6	4,7	3,5	13,8	4,60 ^{cd}
A4D (55%)	6	5,5	4,8	16,3	5,40 ^d
A5D (60%)	7,3	6,1	5,5	18,9	6,3 ^e
Jumlah	27,2	23,5	19,3	70	23,29
BNT α 0,05 = 1,43					

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%)


Tabel 8. Rata-rata Diameter Zona Bening (hambatan) Pertumbuhan Jamur *Candida albicans* Oleh Ekstrak Daun Patikan Kebo Masa Inkubasi 48 Jam

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata diameter zona hambat (mm)
	I	II	III		
A0 (kontrol)	0	0	0	0	0,00 ^a

A1D (40%)	3	2,8	2,4	8,2	2,73 ^b
A2D (45%)	3,1	2,9	2,9	8,9	2,96 ^{bc}
A3D (50%)	3,5	3,1	3,1	9,7	3,23 ^{cd}
A4D (55%)	3,9	4	3,8	11,7	3,90 ^{de}
A5D (60%)	4	4,3	4,7	13	4,33 ^e
Jumlah	17,5	17,1	16,9	51,5	17,16
BNT α 0,05 = 1,36					

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%)

Rata-rata diameter zona bening pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* yang diberi perlakuan dengan ekstrak patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi pada masa inkubasi 24 dan 48 jam dapat ditunjukkan pada gambar 7.



Gambar 7. Histogram Zona Hambat Bakteri *Candida albicans* Masa Inkubasi 24 Jam dan 48 Jam

Keterangan:

- A0 = Kontrol (aquadest)
- A1D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 40%
- A2D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 45%
- A3D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 50%
- A4D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 55%

A5D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 60%

Berdasarkan gambar pada histogram di atas menunjukkan bahwa pada masa inkubasi 24 jam semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan, maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk. Sebaliknya terdapat penurunan zona hambat setelah memasuki hari kedua (48 jam).

B. Pembahasan

1. Pengaruh Ekstrak Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri (*Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengukuran rata-rata zona hambat diketahui bahwa pemberian ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta* L) dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, hal ini dapat dilihat pada tabel 3 dan 4. Dari hasil tersebut terjadi kenaikan rata-rata zona hambat di setiap konsentrasi, dimana semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, maka semakin besar pula diameter rata-rata zona hambat yang terbentuk di sekeliling *paper disk*. Hasil uji analisis statistik dengan menggunakan uji F α 0,05 juga menunjukkan bahwa pemberian ekstrak patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi dengan tiga kali pengulangan berpengaruh nyata dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja zat antimikroba, diantaranya adalah: umur bakteri, konsentrasi zat antimikroba, suhu, kandungan bahan antimikroba, dan sebagainya. Dimana kecepatan populasi mikroba mengalami kematian erat hubungannya dengan umur mikroba. Pada umumnya mikroba yang lebih

muda daya tahannya lebih rendah dibandingkan dengan bakteri yang lebih tua (fase stasioner). Kemampuan suatu bahan dalam menghambat atau membentuk mikroba tergantung pada tinggi rendahnya konsentrasi dan bahan antimikroba. Pada umumnya, kecepatan kematian mikroba berhubungan secara langsung dengan konsentrasi antimikroba. Ini berarti semakin tinggi konsentrasi antimikroba yang digunakan, semakin cepat mikroba terbunuh⁶⁵.

Terbentuknya zona bening (zona hambat) di sekeliling paper disk ini disebabkan oleh karena adanya zat-zat yang bersifat antimikroba yang terkandung dalam daun Patikan kebo (*Euphorbia hirta L*), sebagaimana yang telah diketahui bahwa patikan kebo mengandung beberapa unsur kimia diantaranya adalah diantaranya alkaloid, tanin, senyawa folifenol, flavonoid, terpen, dan asam lanolat.

Menurut Robinson T, Tanin mempunyai aktivitas antimikroba terhadap *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Streptococcus faecalis*. Tanin dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan pada konsentrasi tinggi tanin bekerja sebagai antibakteri dengan mengkoagulasikan protoplasma bakteri karena terbentuk ikatan yang stabil dengan protein bakteri. Secara garis besar mekanisme yang diperkirakan adalah sebagai berikut: toksisitas tanin dapat merusak membran sel bakteri, senyawa tanin dapat menginduksi pembentukan kompleks senyawa ikatan terhadap enzim atau substrat mikroba dan pembentukan suatu kompleks ikatan tanin terhadap ion logam yang dapat menambah daya toksisitas tanin itu

⁶⁵Ristiati, N. P. 2000. *Pengantar Mikrobiologi Umum*. Jakarta: Proyek Pengembangan sekolah menengah IBRD Loan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan Nasional, 2000).

sendiri⁶⁶. Efek antibakteri tanin antara lain melalui: reaksi dengan membran sel, inaktivasi enzim, dan destruksi atau inaktivasi fungsi materi genetik.

Selain itu senyawa lain yang bekerja adalah Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol yang mempunyai kecenderungan untuk mengikat protein bakteri sehingga menghambat aktivitas enzim yang pada akhirnya mengganggu proses metabolisme bakteri. flavonoid merupakan senyawa fenol sementara senyawa fenol dapat bersifat koagulator protein. Selanjutnya adalah senyawa alkaloid yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme kerjanya adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut.

Data hasil pengamatan menunjukkan rata-rata bahwa *Staphylococcus aureus* menghasilkan diameter zona hambat lebih besar dibandingkan dengan *Escherichia coli*. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan struktur dinding sel pada bakteri Gram positif (*Staphylococcus aureus*) dengan bakteri Gram negatif (*Escherichia coli*). Menurut Pelczar (1986) struktur dinding sel bakteri Gram negatif lebih kompleks dibandingkan struktur dinding sel bakteri Gram positif. Bakteri Gram negatif memiliki dinding sel yang terdiri dari 3 lapisan yaitu, lapisan luar, lapisan tengah dan lapisan dalam. Sedangkan bakteri Gram positif hanya mempunyai lapisan tunggal pada dinding selnya⁶⁷.

⁶⁶Robinson, T, *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Edisi ke-6.* (Terjemahan: K. Padmawinata. Bandung: ITB-Press, 1995)

⁶⁷Pelczar, J Michael dan ECS. Chan, *Dasar-dasar Mikrobiologi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008)

Struktur dinding sel bakteri Gram negatif yang relatif kompleks tersebut menyebabkan antibiotik lebih sukar masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja. Untuk menunjukkan kerja antibiotik pada bakteri Gram negatif, antibiotik pertama-tama harus menembus membran terluar selubung bakteri secara difusi pasif melalui saluran yang terbentuk oleh pori protein. Sesudah menembus membran terluar, antibiotik masuk melalui dinding sel melewati ruang periplasma dan mencapai sasaran, yaitu enzim serin protease yang terdapat pada membran terdalam (sitoplasma). Enzim inilah yang bertanggung jawab terhadap biosintesis dinding sel. Sehingga diperoleh hasil bahwa bakteri gram positif memiliki diameter yang lebih besar dari bakteri gram positif⁶⁸.

Berdasarkan hasil pengamatan juga diketahui bahwa terjadi penurunan keefektifan antimikroba dari patikan kebo, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3 dan 4, dimana terjadi penurunan luas zona hambat dari masa inkubasi 24 jam ke 48 jam. Hal ini menandakan bahwa sifat antimikroba dari ekstrak patikan kebo adalah sebagai bakteriostatik, yang berarti antimikroba ini hanya mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, dimana pada daerah atau zona hambatan yang terbentuk, secara perlahan-lahan ditumbuhi kembali oleh bakteri tersebut. Sehingga sifat antimikroba dari patikan kebo ini tidak dapat digolongkan ke dalam bakterisida karena tidak dapat membunuh. Adanya zona bening yang kembali ditumbuhi oleh bakteri pada masa inkubasi 48 jam ini disebabkan oleh karena menurunnya keefektifan kerja dari senyawa-senyawa yang terdapat pada

⁶⁸Siswandono dan Bambang S, *Kimia Medisinal* (Surabaya: Erlangga. 1995)

ekstrak patikan kebo tersebut, sehingga mikroba tersebut dapat tumbuh kembali pada daerah hambatan tersebut.

2. Pengaruh Ekstrak Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) Terhadap Pertumbuhan Jamur *Candida albicans*

Hasil yang diperoleh dari pengukuran rata-rata zona hambat diketahui bahwa pemberian ekstrak patikan kebo (*Euphorbia hirta* L) juga dapat menghambat pertumbuhan *Candida albicans*, hal ini dapat dilihat pada tabel 5. Dari hasil tersebut terjadi kenaikan rata-rata zona hambat di setiap konsentrasi, seperti halnya pada kedua jenis bakteri uji, dimana semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, maka semakin besar pula diameter rata-rata zona hambat yang terbentuk di sekeliling *paper disk*. Hasil uji analisis statistik dengan menggunakan uji F α 0,05 juga menunjukkan bahwa pemberian ekstrak patikan kebo dalam beberapa macam konsentrasi dengan tiga kali pengulangan berpengaruh nyata dalam menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans*. Begitu juga dengan hasil uji BNT α 0,05 menunjukkan bahwa setiap perlakuan berbeda nyata dengan kontrol (tabel 5). Hal ini sesuai dengan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa pada umumnya, kecepatan kematian mikroba berhubungan secara langsung dengan konsentrasi antimikroba. Ini berarti semakin tinggi konsentrasi antimikroba yang digunakan, semakin cepat mikroba tersebut terbunuh⁶⁹.

Salah satu senyawa yang terdapat pada patikan kebo yang bersifat sebagai antifungi adalah flavonoid, dimana flavonoid ini dapat bertindak sebagai antijamur

⁶⁹Ristiati, N. P., *loc.cit.*,

karena mempunyai fenol yang dapat mendenaturasi protein dan dapat merusak membran sel yang bersifat *irreversible* (tidak dapat diperbaiki lagi)⁷⁰. Mekanisme kerja fenol yaitu fenol dapat membentuk kompleks dengan ergosterol yang terdapat dalam membran sel jamur, kompleks tersebut menyebabkan pori- pori membesar pada sel jamur. Lewat pori – pori inilah komponen kecil dari isi sel jamur keluar seperti asam nukleat dan protein lainnya. Hal tersebut bila terus berlangsung akan menyebabkan kematian jamur. Kompleks fenol berada dalam keadaan lemah, disosiasi tidak langsung yang menyebabkan fenol menembus sel. Pada konsentrasi tinggi senyawa fenol dapat menyebabkan lisis pada sel membran. Fenol mempunyai kelarutan yang tinggi pada lipid, maka efek terbesar fenol adalah kemampuannya bergabung dengan komponen lipid sel. Membran sel pada jamur tersusun atas fosfolipid yang akan menyebabkan permeabilitas membran sel terganggu sehingga jamur terhambat.

Fenol apabila digunakan dalam konsentrasi tinggi, maka akan merusak membran sitoplasma secara total dan mengendapkan protein sel, yang mana dengan rusaknya membran sitoplasma akan menyebabkan bocornya metabolit penting dan disamping itu menginaktivkan sejumlah sistem enzim bakteri. Fenol efektif terhadap bentuk vegetatif bakteri dan kebanyakan fungi⁷¹.

Hasil pengamatan pada tabel 5 juga diketahui bahwa terjadi penurunan keefektifan antimikroba (antifungi) dari patikan kebo, dimana terjadi penurunan luas

⁷⁰Pelczar, J Michael dan ECS, *loc.cit.*,

⁷¹Volk dan Wheler, *Basic Microbiology, fifth edition*, (Terjemahan: Markham Jakarta: Erlangga, 1993).

zona hambat dari masa inkubasi 24 jam ke 48 jam. Menurut Jawetz dalam istilah antifungi dikenal ada 2 pengertian yaitu fungisidal dan fungistatik. Fungisidal didefinisikan sebagai suatu senyawa yang dapat membunuh fungi sedangkan fungistatik dapat menghambat pertumbuhan fungi tanpa membunuhnya⁷². Sehingga dapat ditentukan sifat antimikroba (antifungi) dari ekstrak patikan kebo adalah sebagai fungistatik, yang berarti hanya mampu untuk menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans*, dimana pada daerah atau zona hambatan yang terbentuk, secara perlahan-lahan juga mulai ditumbuhi kembali oleh jamur tersebut. Sehingga sifat antimikroba (antifungi) dari patikan kebo ini tidak dapat digolongkan ke dalam fungisida karena tidak dapat membunuh. Adanya zona bening yang kembali ditumbuhi oleh jamur pada masa inkubasi 48 jam ini disebabkan oleh karena menurunnya keefektifan kerja dari senyawa-senyawa yang terdapat pada ekstrak patikan kebo tersebut, sehingga mikroba tersebut dapat tumbuh kembali pada daerah hambatan tersebut.

Berdasarkan hasil yang diperoleh sesuai dengan tabel 3 dan 4, 5 dan 6, serta 7 dan 8, maka diketahui bahwa dari ketiga mikroba uji yang digunakan yaitu *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan *Candida albicans*, yang memiliki zona hambat terbesar adalah *Candida albicans*, sehingga ekstrak daun patikan kebo ini efektif sebagai antifungi/antijamur.

⁷²Jawetz, Melnik, dan adalberg's, *Mikrobiologi Kedokteran* (Jakarta : Salemba Medika, 2005).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun patikan kebo (*Euphorbia hirta L*) dapat menghambat pertumbuhan bakteri (*Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*) dan jamur *Candida albicans* pada beberapa macam konsentrasi, dimana pemberian konsentrasi ekstrak yang efektif adalah pada konsentrasi 60% yang memiliki luas zona hambat terbesar dari konsentrasi lainnya. Selain itu diantara ketiga jenis mikroba uji yang digunakan, ekstrak patikan kebo ini efektif sebagai antifungi berdasarkan zona hambat yang terbesar terdapat pada jamur *Candida albicans*.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan adalah:

1. Perlunya dilakukan sebuah penelitian lanjutan mengenai uji toksisitas daun patikan kebo pada hewan uji guna mengetahui efektifitas daun patikan kebo sebagai antimikroba yang tepat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menggunakan konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi untuk mengetahui konsentrasi yang optimum dan diujikan pada mikroba uji lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad. Shigellosis. Blog *Muhammad Akbar*. <http://ababar.blogspot.com/2008/12/shigellosis/html>. (20 Oktober 2010).
- Alif dan Kayla, Shigellosis-Penyakit Usus Besar, *Blog Alif dan Kayla*. <http://alifdankayla.wordpress.com/2008/03/27/shigellosis-penyakit-usus-besar/html>. (20 Oktober 2010).
- Arifin, Sjamsul, Achmad dan Euis Holisotan Hakim. *Ilmu Kimia dan Kegunaan Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 5*. Bandung : Penerbit ITB, 2009.
- Bell, Garrity GM J.A. and Lilburn, T.G, *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Sistematic Bacteriologi, 2nd Edition* . United State of Amerika: Berlin Heidelberg, 2004.
- Braunwald, Isselbacher, dan Petersdorf. *Harrison (Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam)*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1991.
- Crab, Small. *Karakteristik Candida albicans*, <http://www.smallcrab.com/kesehatan/415-karakteristik-candida-albicans> (23 januari 2011).
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*. Madinah al-Munawwarah : Percetakan Alqur'an Raja Fahd, 2007.
- Djauhariya, Endjo, dan Hernani. *Gulma Berkhasiat Obat*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2004.
- Djide, M. Natsir dan Sartini. *Dasar-dasar mikrobiologi* . Universitas Hasanuddin : Makassar, 2008.
- Entjang, Indan. *Mikrobiologi dan Parasitologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fajariah, Ika Nur. *Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Etil Asetat Ekstrak Etanol Kayu Secang (caesalpinia sappan l.) Terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae Serta Bioautografinya* (Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).
- Hala, Yusminah, Muhammad Khalifah M, dan Achmad Abubakar. *Biologi Umum I* Makassar: CV Berkah Utami, 2006.

- Hamdiyati, Yanti, Kusnadi, dan Irman Rahadian, *Aktivitas antibakteri ekstrak daun patikan kebo (euphorbia hirta) terhadap pertumbuhan bakteri staphylococcus epidermidis* (Jurnal Pengajaran MIPA, Vol. 12 ISSN: 1412-0917 No. 2 Desember 2008 Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia).
- Hendrawati, Dian. *Candida albicans* (Jurnal Kedokteran volume 3).
- Ipteknet, *Tanaman Obat Indonesia*, http://www.iptek.net.id/ind/pd.tanobat/patikan_kerbau (20 Oktober 2010).
- Irianto, Koes. *Mikrobiologi Menguak Dunia Mikroorganisme Jilid 1*. Bandung : Yrama Widya, 2007.
- Jawetz, Melnik, dan adelberg's. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta : Salemba Medika, 2005.
- Kartasapoetra, G. *Budi Daya Tanaman Berkhasiat Obat*. Jakarta : Rineke Cipta, 2006.
- Kimball, John W. *Biologi Jilid III*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Kusuma, Fauzi R dan B. Muhammad Zaky. *Tumbuhan Liar Berkhasiat Obat* Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2005.
- Mawar, Penyakit Yang Disebabkan oleh Bakteri, *Blog Mawar*, <http://mawarmawar.wordpress.com/2009/02/27/penyakit-yang-disebabkan-oleh-bakteri/> (23 Januari 2011).
- Medicafarma. Ekstraksi. *Blog Medicafarma*. <http://medicafarma.blogspot.com/ekstraksi> (20 Oktober 2010).
- Medical Plants, *Euphorbia hirta* L. http://www.ics.trieste.it/MAPs/MedicinalPlants_Plant. (20 Oktober 2010).
- Nashiruddin, M. al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*. Depok : Gema Insani, 2008.
- Pelczar, J Michael dan ECS. Chan. *Dasar-dasar Mikrobiologi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Racik, Kearifan Tradisional Masyarakat Selamatkan Tumbuhan Obat, *Blog Racik*, <http://racik.wordpress.com/category/tumbuhan-obat/> (20 Oktober 2010).
- Rahim, A. Alam G. *Fitokimia*. Makassar: Farmasi UIN Alauddin, 2008.
- Robinson, T. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Edisi ke-6*. Terjemahan: K. Padmawinata. Bandung: ITB-Press, 1995

Sheeba, Queen, Bakteri Staphylococcus aureus, *Blog Queen Sheeba*, <http://queenofsheeba.wordpress.com/2008/07/22/bakteri-staphylococcus-aureus/> (23 Januari 2011).

Simplisia, *Tanaman Obat Patikan Kebo*, <http://www.simplisia.com/simplisia/tanaman-obat/tanaman-obat-patikan-kebo.html> (20 Oktober 2010).

Siswandono dan Bambang S. *Kimia Medisinal*. Surabaya: Erlangga. 1995

Suprihatin, S.D. *Candida dan Kandidiasis pada Manusia*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1982.

Syamsiah. *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2009.

Utami, Prapti. *Buku Pintar Tanaman Obat*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2008.

Waluyo, Lud. *Teknik Metode Dasar Mikrobiologi*. Malang : UMM Press, 2008.

Wasitaningrum, Ika Dahayu . *Uji Resistensi Bakteri S. aureus dan E. coli Dari Isolat Susu sapi Segar Terhadap Beberapa Antibiotik* (Surakarta : Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

Volk dan Wheler. *Basic Microbiology fifth edition*. Terjemahan: Markham Jakarta: Erlangga, 1993.

az- Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Mizan, 2008.



Lampiran-Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**Lampiran 1 a. Uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT)
Staphylococcus aureus 24 jam**

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rerata
	I	II	III		
A0	0	0	0	0	0
A1B	3,2	3	2,5	8,7	2,90
A2B	4,2	3,2	3,3	10,7	3,56
A3B	5,0	3,5	3,5	12	4,00
A4B	6,5	4,7	4,6	15,8	5,26
A5B	7,0	4,8	4,7	16,5	5,5
Jumlah	25,9	19,2	18,6	63,7	21,22

$$F_k = 63,7^2/18 = 225,42$$

$$JK \text{ total} = 293,93 - 225,42 = 68,51$$

$$JK \text{ perlakuan} = 856,07/3 - 225,42 = 285,35 - 224,42 = 59,93$$

$$JK \text{ galat} = 68,51 - 59,93 = 8,58$$

1. Ansira (uji F)

SK	DB	JK	KT	F Hitung	F Tabel	
					5 %	1 %
perlakuan	5	59,93	11,98	*16,76	3,26	5,41
Galat	12	8,53	0,715			
Total	17	68,51	-			

Ket. * Berbeda Nyata

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{0,715}}{3,53} \times 100\% = 23,95\%$$

2. Uji BNT

$$V = 12 \quad r = 3 \quad t_{0,05} (12) = 2,179$$

$$S - d = \frac{\sqrt{2KTG}}{r}$$

$$= \frac{\sqrt{2(0,715)}}{3} = 0,689927$$

$$BNT_{0,05} = 2,179 \times 0,689927 = 1,50$$

**Lampiran 1 b. uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT)
Escherichia coli 24 jam**

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rerata
	I	II	III		
A0	0	0	0	0	0
A1C	3,3	3,1	2,7	9,1	3,03
A2C	3,6	3,2	3,2	9,5	3,16
A3C	4	3,5	3,7	11,2	3,73
A4C	4,2	4,5	4,6	13,3	4,43
A5C	4,5	5,1	5	14,6	4,86
Jumlah	19,6	19,4	15,5	57,7	19,21

$$F_k = 57,7^2/18 = 184,96$$

$$JK \text{ total} = 233,48 - 184,96 = 48,52$$

$$JK \text{ perlakuan} = 688,55/3 - 184,96 = 229,51 - 184,96 = 44,55$$

$$JK \text{ galat} = 48,52 - 44,55 = 3,97$$

1. Ansira (uji F)

SK	DB	JK	KT	F Hitung	F Tabel	
					5 %	1%
Perlakuan	5	44,55	8,91	*27	3,26	5,41
Galat	12	3,97	0,33			
Total	17	48,52				

Ket. * Berbeda Nyata

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{0,33}}{3,20} \times 100\% = 17,95\%$$

2. Uji BNT

$$V = 12 \quad r = 3 \quad t_{0,05} (12) = 2,179$$

$$S - d = \frac{\sqrt{2KTG}}{r}$$

$$= \frac{\sqrt{2(0,33)}}{3} = 0,469041$$

$$BNT_{0,0i5} = 2,179 \times 0,469041 = 1,02$$

Lampiran 1 c. uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil *Candida albicans* 24 jam

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rerata
	I	II	III		
A0	0	0	0	0	0
A1D	4,1	3,2	2,5	9,8	3,26
A2D	4,2	4	3	11,2	3,73
A3D	5,6	4,7	3,5	13,8	4,60
A4D	6	5,5	4,8	16,3	5,40
A5D	7,3	6,1	5,5	18,9	6,30
Jumlah	27,2	23,5	19,3	70	23,29

$$F_k = 70^2/18 = 272,22$$

$$JK \text{ total} = 351,68 - 272,22 = 79,46$$

$$JK \text{ perlakuan} = 1031,57/3 - 272,22 = 343,85 - 272,22 = 71,63$$

$$JK \text{ galat} = 79,46 - 71,63 = 7,83$$

1. Ansira (uji F)

SK	DB	JK	KT	F Hitung	F Tabel	
					5 %	1%
Perlakuan	5	71,63	14,326	*21,97	3,26	5,41
Galat	12	7,83	0,652			
Total	17	79,46				

Ket. * Berbeda Nyata

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{0,652}}{3,88} \times 100\% = 20,81\%$$

2. Uji BNT

$$V = 12 \quad r = 3 \quad t_{0,05} (12) = 2,179$$

$$S - d = \frac{\sqrt{2KTG}}{r}$$

$$= \frac{\sqrt{2(0,652)}}{3} = 0,685786$$

$$BNT_{0,05} = 2,179 \times 0,685786 = 1,43$$

Lampiran 1 d. Uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT)
Staphylococcus aureus 48 jam

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rerata
	I	II	III		
A0	0	0	0	0	0
A1B	2	2,1	1,9	6	2
A2B	2,5	2,3	2,3	7,1	2,36
A3B	3,3	3	2,5	8,8	2,93
A4B	4,3	3,2	3	10,5	3,5
A5B	5	4	4,1	13,1	4,36
Jumlah	17,1	14,6	13,8	45,5	15,15

$$F_k = 45^2/18 = 115,01$$

$$JK \text{ total} = 150,53 - 115,01 = 35,52$$

$$JK \text{ perlakuan} = 445,71/3 - 115,01 = 148,57 - 115,01 = 33,56$$

$$JK \text{ galat} = 35,52 - 33,56 = 1,96$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Ansira (uji F)

SK	DB	JK	KT	F Hitung	F Tabel	
					5 %	1%
Perlakuan	5	33,56	6,172	*41,17	3,26	5,41
Galat	12	1,96	0,163			
Total	17	35,52				

Ket. * Berbeda Nyata

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{0,163}}{2,52} \times 100\% = 1,60\%$$

2. Uji BNT

$$V = 12 \quad r = 3 \quad t_{0,05} (12) = 2,179$$

$$S - d = \frac{\sqrt{2KTG}}{r}$$

$$= \frac{\sqrt{2(0,163)}}{3} = 0,134577$$

$$BNT_{0,05} = 2,179 \times 0,329545 = 0,71$$

Lampiran 1 e. uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil *Escherichia coli* 48 jam

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rerata
	I	II	III		
A0	0	0	0	0	0
A1C	3,9	2,9	2	8,8	2,93
A2C	4	3	2,4	9,4	3,13
A3C	4,8	3,2	2,9	10,9	3,63
A4C	5	4	3	12	4,00
A5C	5,1	4,7	4,7	14,3	4,76
Jumlah	22,8	17,8	14,8	55,40	18,46

$$F_k = 55,4^2/18 = 170,50$$

$$JK \text{ total} = 218,42 - 170,50 = 47,92$$

$$JK \text{ perlakuan} = 633,1/3 - 170,50 = 211,03 - 170,50 = 40,53$$

$$JK \text{ galat} = 47,92 - 40,59 = 7,33$$

1. Ansira (uji F)

SK	DB	JK	KT	F Hitung	F Tabel	
					5 %	1%
Perlakuan	5	40,53	7,85	*13,66	3,26	5,41
Galat	12	7,33	0,61			
Total	17	47,86				

Ket. * Berbeda Nyata

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{0,61}}{3,07} \times 100\% = 25,44\%$$

2. Uji BNT

$$V = 12 \quad r = 3 \quad t_{0,05} (12) = 2,179$$

$$S - d = \frac{\sqrt{2KTG}}{r}$$

$$= \frac{\sqrt{2(0,61)}}{3} = 0,637181$$

$$BNT_{0,05} = 2,179 \times 0,637181 = 1,38$$

**Lampiran 1 f. uji analisis sidik ragam (uji F) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT)
Candida albicans 48 jam**

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rerata
	I	II	III		
A0	0	0	0	0	0
A1D	3	2,8	2,4	8,2	2,73
A2D	3,1	2,9	2,9	8,9	2,96
A3D	3,5	3,1	3,1	9,7	3,23
A4D	3,9	4	3,8	11,7	3,90
A5D	4	4,3	4,7	13	4,33
Jumlah	17,5	17,1	16,9	51,5	17,16

$$F_k = 51,5^2/18 = 147,34$$

$$JK \text{ total} = 182,73 - 147,34 = 35,39$$

$$JK \text{ perlakuan} = 546,43/3 - 147,34 = 182,14 - 147,34 = 34,8$$

$$JK \text{ galat} = 35,39 - 34,8 = 0,59$$

1. Ansira (uji F)

SK	DB	JK	KT	F Hitung	F Tabel	
					5 %	1%
Perlakuan	5	34,8	6,96	*174	3,26	5,41
Galat	12	0,59	0,04			
Total	17	35,39				

Ket. * Berbeda Nyata

$$\begin{aligned}
 KK &= \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100\% \\
 &= \frac{\sqrt{0,59}}{2,86} \times 100\% = 26,85\%
 \end{aligned}$$



2. Uji BNT

$$V = 12 \quad r = 3 \quad t_{0,05} (12) = 2,179$$

$$\begin{aligned}
 S - d &= \frac{\sqrt{2KTG}}{r} \\
 &= \frac{\sqrt{2(0,04)}}{3} = 0,626897
 \end{aligned}$$

$$BNT_{0,05} = 2,179 \times 0,626897 = 1,36$$

Lampiran 2a. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri *Staphylococcus aureus* masa inkubasi 24 jam





Keterangan:

- A. Cawan Petri berisi medium dan mikroba uji
- B. Paper disc
- C. Zona hambat

- A1B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 40%
- A2B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 45%
- A3B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 50%
- A4B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 55%
- A5B = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 60%

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2b. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri *Escherichia coli* masa inkubasi 24 jam



Keterangan:

- A. Cawan Petri berisi medium dan mikroba uji
- B. Paper disc
- C. Zona hambat

A1C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 40%

A2C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 45%


A3C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 50%

A4C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 55%

A5C = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 60%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Lampiran 2c. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri *Candida albicans* masa inkubasi 24 jam



Keterangan:

A. Cawan Petri berisi medium dan mikroba uji

B. Paper disc

C. Zona hambat


A1D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 40%

A2D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 45%

A3D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 50%


A4D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 55%

A5D = Ekstrak patikan kebo konsentrasi 60%




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 2a. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri *Staphylococcus aureus* masa inkubasi 24 jam




Keterangan:

- A. Cawan Petri berisi medium dan mikroba uji
- B. Zona hambat
- C. Paper disc




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN
 MAKASSAR

Lampiran 2b. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri *Escherichia coli* masa inkubasi 24 jam



Keterangan:

- A. Cawan Petri berisi medium dan mikroba uji
- B. Zona hambat
- C. *Paper disc*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN


M A K A S S A R

Lampiran 2c. Gambar zona hambat ekstrak daun patikan kebo dalam beberapa konsentrasi pada bakteri *Candida albicans* masa inkubasi 24 jam



Keterangan:


- A. Cawan Petri berisi medium dan mikroba uji
- B. Zona hambat
- C. *Paper disc*




Lampiran 3. Proses Destilasi



Lampiran 4. Hasil Ekstraksi dan Beberapa macam konsentrasi Ekstrak Daun Patikan Kebo (Euphorbia hirta)




Lampiran 5. Pembuatan Suspensi Mikroba



Lampiran 6. Pengujian Daya Hambat



Lampiran 7. Skema Kerja



RIWAYAT HIDUP



Zulkarnain, lahir di Ujung Pandang, 15 September 1988. Anak Pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Rabasing, A. Ma. Pd. dan Nuriati (almh.). Penulis memulai pendidikan Sekolah dasarnya pada tahun 1994-2000 di SDN Mattoangin III Mariso Kodya Ujung Pandang. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di Pondok Pesantren DDI AD Mangkoso Kabupaten Barru; Madrasah I'dadiyah (2000-2001), Madrasah Tsanawiyah Putra (2001-2004), Madrasah Aliyah putra (2004-2007). Setelah itu penulis dinyatakan lulus pada ujian SPMB Lokal dan akhirnya melanjutkan jenjang study pada jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2007.

Selama tercatat sebagai mahasiswa Biologi, penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Biologi, sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Periode 2008) dan sebagai wakil Ketua HMJ Biologi (periode 2009). Dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa FST divisi pembinaan akhlak dan moral. Selain itu penulis juga aktif tercatat sebagai asisten praktikum mata kuliah; Biologi Dasar, Fisiologi Hewan, Fisiologi Tumbuhan, dan Genetika.