

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY"”H”
DENGAN RETENSIO PLASENTA DI RS UMUM DAERAH
SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Oleh :
MASNI
NIM : 70400114032**

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASNI
NIM : 70400114032
Tempat/tgl. Lahir : Parepare, 12 April 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/ Diploma
Alamat : Jl. Bacukiki Raya No.22 Parepare
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Inranatal pada Ny
“H” dengan Retensio Plasenta di RS Umum Daerah
Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun



MASNI

NIM : 70400114032

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : MASNI

NIM : 70400114032

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny" H" dengan Retensio Plasenta di RS Umum Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk di ajukan dalam seminar Ujian Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 7 Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Sitti. Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb
NIP: 19760126 200604 2 001



dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes
NIP: 19810623 201101 2 009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada NY “H” dengan Retensio Plasenta di RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017”, yang disusun oleh Masni, Nim: 70400114032, Mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Jumat 25 Agustus 2017 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 25 Agustus 2017 M
3 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S. Si.T, M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,SKM.,M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes.,Sp.A	(.....)
Penguji II	: Dr. Sabir Maidin, M.Ag	(.....)

Mekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penyusun ucapkan atas kehadiran Allah swt.karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang sederhana ini dengan judul “ Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan Retensio Plasenta di RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017”. Dengan penyusunan karya tulis ilmiah ini, sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan diploma dan syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada ibu saya, yang saya cintai dan banggakan , memberikan didikan yang bermanfaat, kasih sayang serta perhatian. Almarhum Bapak yang memberikan didikan dan menanamkan kedisiplinan hingga usia 5 tahun. Kepada adik dan kakak tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan setiap saat.
2. Gubernur Sulawesi Selatan
3. Bupati Kabupaten Gowa
4. Direktur dan Staff RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
5. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof.Dr.H.Musafir Pababbari., M.Si.
6. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin.,M.Sc.

7. Ibunda Dr.Hj.Sitti Saleha,S.SiT.,S.KM.,M.Keb selaku Ketua prodi Kebidanan dan sebagai pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya demi membimbing,membantu,serta memberikan saran kepada penyusun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
8. Ibunda dr.Andi Sitti Rahma,M.Kes sebagai pembimbing kedua,yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing serta memberikan arahan yang sifatnya membangun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
9. Ibunda dr. Syatirah Jalaluddin,M.Kes.,Sp.A sebagai penguji pertama yang telah memberi dukungan dan arahan yang sifatnya membangun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
10. Ayahanda Dr.Sabir Maidin.,M.Ag sebagai penguji kedua yang telah memberi dukungan dan arahan yang sifatnya membangun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
11. Ibunda Firdayanti,S.S.iT.,M.Keb sebagai sekretaris jurusan Kebidanan,yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing serta memberikan arahan yang sifatnya membangun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
12. Segenap dosen khususnya para dosen Prodi Kebidanan Dan para Staf akademik.
13. Teman-teman seperjuangan Prodi Kebidanan yang telah memberikan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini semoga apa yang telah dilakukan mendapat berkah dan rahmat dari pencipta kita sebagai manusia.

Penyusun menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penyusun, berharap semoga dapat membantu dan bermanfaat walaupun kecilnya pada dunia ilmu pengetahuan khusus-Nya Kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya.

Samata-Gowa,

Agustus 2017

Penyusun



MASNI

70400114032



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Asuhan Persalinan Kala III.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Retensio Plasenta.....	21
C. Tinjauan Islam Tentang Pembentukan Manusia.....	34

D. Konsep Dasar Asuhan Manajemen Kebidanan.....	40
 BAB III. STUDI KASUS	
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah Varney..	56
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan.	79
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar.	94
B. Langkah II Interpretasi Data Dasar.	96
C. Langkah III Identifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial.....	102
D. Langkah IV Identifikasi Kebutuhan yang Memerlukan Penanganan Segera.....	104
E. Langkah V Perencanaan Asuhan yang Menyeluruh.	106
F. Langkah IV Pelaksanaan.	110
G. Langkah IV Evaluasi.	111
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gambaran dan Dugaan Penyebab Retensio Plasenta	28
Tabel 1.2 Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas Yang Lalu	58
Tabel 1.3 Pemantuan Kala IV.	76
Table 1.4 Tinggi Fundus Uteri dan Berat Badan Menurut Masa Invulsi. .	114



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Bagan Penatalaksanaan Retensio Plasenta.....	31
Bagan 1.2 Bagan Alur Proses Manajemen Kebidanan	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar kegiatan konsultasi	122
<hr/>		
Lampiran II	: Surat Permohonan Pengambilan Data Awal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada kepala RSUD Syekh Yusuf Gowa.	126
<hr/>		
Lampiran III	: Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (kepala balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)	127
<hr/>		
Lampiran IV	: Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah(Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.	128
<hr/>		
Lampiran V	: Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.	129
<hr/>		
Lampiran VI	: Daftar Riwayat Hidup	130
<hr/>		

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2017

Masni, 70400114032

Pembimbing I: Hj.Sitti Saleha

Pembimbing II: Andi Sitti Rahma

”Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny”H” dengan Retensio Plasenta di RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017”

Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, penyebab kematian ibu masih di dominasi oleh perdarahan. Salah satu penyebab perdarahan pada proses persalinan khususnya kala III yakni retensio plasenta. Retensio plasenta adalah plasenta yang tertinggal dalam uterus setengah jam setelah bayi lahir dan sukar dilepaskan dengan pertolongan aktif kala III karena adhesi yang kuat antara plasenta dan uterus. Retensio plasenta menyebabkan perdarahan segera dilakukan, maka tindakan manual plasenta. Secara etiologi retensio plasenta terjadi karena perlekatan plasenta, terdiri dari plasenta *adhesive, akreta, inkreta, perkreta dan inkarserata*. Faktor resiko terjadinya plasenta riwayat retensio plasenta, persalinan premature, bekas luka operasi uterus, usia diatas 30 tahun dan grandemultipara. Komplikasi yang dapat terjadi perdarahan *postpartum*, syok *hemoragik* atau syok *hipovolemik*, anemia dan infeksi. Oleh karena itu, kejadian retensio plasenta perlu penanganan dan pencegahan secara cepat dan tepat agar tidak mengakibatkan komplikasi dan kematian.

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny”H” dengan retensio plasenta di RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil studi kasus yang dilakukan pada Ny “H” dengan retensio plasenta terdapat beberapa hambatan dalam penanganan kasus ini. Penanganan yang dilakukan pada Ny “H” yakni penanganan syok tidak dilakukan sesuai SOP, manual plasenta, transfuse tidak segera dilakukan karena darah tidak tersedia, observasi tanda-tanda vital, kontrol *hemoglobin*, pemenuhan nutrisi, pencegahan infeksi, konseling tentang ASI eksklusif, KB dan perawatan bayi

Kesimpulan dari kasus yakni 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pelaksanaan tindakan, pemantauan dan analisa data pada Ny “H” dengan retensio plasenta di RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017 selama 2 hari, maka didapatkan hasil yakni plasenta lahir dengan tindakan manual plasenta, anemia teratasi, syok tidak terjadi, tanda-tanda vital normal dan tanda-tanda infeksi tidak tampak serta terdapat faktor resiko retensio plasenta.

Daftar Pustaka : 42 (1993-2016)

Kata kunci : Retensio Plasenta, Manual Plasenta, Anemia, Syok Dan 7 langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAKASSAR
RESEARCH PAPER, AUGUST 2017

Masni, 70400114032

Supervisor I: Hj.SittiSaleha

Supervisor II: Andi SittiRahma

"Intranatal Midwifery Management on Mrs. "H "with Placenta Retention in Regional Public Hospital Sheikh Yusuf Gowa Regency Year of 2017"

Maternal mortality in Indonesia is still high. The cause of maternal death is still dominated by bleeding. One of the causes of bleeding in labor process, especially in the third stage is the retention of the placenta. Placental retention is a placenta left within the uterus half an hour after birth and it is difficult to remove with active aid in the third stage due to a strong adhesion between the placenta and the uterus. Placental retention causes immediate bleeding which needs manual placental treatment. In etiology, placenta retention is due to placental attachment, consisting of placenta adhesive, accreta, increta, percreta and incarcerated. Risk factors identified for retention include a history of placental retention, premature labor, scar due to uterine surgery, age over 30 years and grand multipara. Complications that can occur include postpartum bleeding, hemorrhagic shock or hypovolemic shock, anemia and infection. Therefore, the placental retention requires a quick and appropriate treatment and prevention in order not to cause complications and death.

This research paper aims to implement the Intranatal Midwifery Management to Mrs. "H" with placental retention at the Public Hospital of Sheikh Yusuf Gowa regency in 2017 in accordance with 7 steps Varney and SOAP.

The result of case study conducted on Mrs. "H" with placental retention shows some obstacles in the treatment of this case. The treatment on Mrs. "H" such as shock treatment was not done according to the placenta manual of standard operational procedure (SOP). Transfusion is not given immediately due to the blood unavailability. Some errors also occurred on the observation of vital signs, hemoglobin control, nutrition fulfillment, infection prevention, counseling about exclusive breastfeeding, birth control, and baby care.

As the conclusions of the case, 7 steps Varney and SOAP used for the process of midwifery problem solving had been conducted in the form of assessment of the treatment, monitoring and data analysis on Mrs. "H" with placenta retention in Public Hospital of Shaikh Yusuf Gowa regency for 2 days in year of 2017. The results show that placenta was born with manual placental treatment, shock was resolved, anemia was resolved, vital signs were normal, there was no sign of invisible infection and placental retention factor risk was present.

Reference: 42 (1993-2016)

Keywords: Placenta Retention, Placenta Manual, Anemia, Shock, and 7 Varney Steps

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Plasenta yang tertinggal dalam uterus setengah jam setelah anak lahir disebut sebagai retensio plasenta. Plasenta yang sukar dilepaskan dengan pertolongan aktif kala III dapat disebabkan oleh adhesi yang kuat antara plasenta dan uterus (Prawirohardjo,2014:526). Retensio plasenta di artikan sebagai tertahannya plasenta di dalam uterus karena kontraksi uterus tidak adekuat selama proses persalinan (Maritalia,2014:64). Retensio plasenta merupakan kondisi di mana plasenta belum lahir dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir, rata-rata gangguan pelepasan plasenta disebabkan oleh kontraksi uterus (Kuswanti dan Melina,2014:131).

Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya Retensio plasenta setelah kelahiran bayi dan menimbulkan komplikasi. Retensio plasenta dapat terjadi karena kelainan pada plasenta dan beberapa faktor resiko. Kelainan pada plasenta yakni *plasenta inkarserata*, *plasenta previa*, dan *plasenta akreta* dan faktor resiko lainnya yakni riwayat retensio plasenta, persalinan premature, bekas luka operasi uterus, usia 35 tahun dan Grandemultipara. Adapun komplikasi secara umum yang dapat terjadi karena retensio plasenta meliputi perdarahan, infeksi, trauma saluran genital, perforasi uterus, dan inversi uterus (Akinola dkk,2013:280).

Pada kejadian retensio plasenta, perdarahan merupakan bahaya secara umum yang mengancam jiwa seorang ibu yang kemungkinan terjadi pada proses persalinan kala III dalam proses pengeluaran plasenta. Menurut WHO 2009 tindakan

penanganan manual plasenta merupakan prosedur kebidanan secara umum yang dilakukan pada kala III persalinan sebagai penanganan plasenta yang tertahan, apabila tidak dirujuk lebih dari 30 menit (Vijayalakshmi dan Shavi,2015:5078). Hal ini tampak pada angka kejadian di negara maju atau berkembang yang diperoleh dari gambaran angka kematian ibu dan etiologi karena perdarahan. Menurut WHO 2008 angka kematian ibu di dunia karena perdarahan (25%) dan kematian ibu karena retensio plasenta (15%-25%) (Riyanto,2015:38).

Menurut Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 angka kematian ibu di Indonesia sebesar 359/100.000 kelahiran hidup. Hal ini mengalami peningkatan dari SDKI 2007 sebesar 228/100.000 kelahiran hidup, kemudian hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2015 sebesar 305/100.000 dan tidak mencapai target MDGs 2015 sebesar 102/100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu dari data profil kesehatan Sulawesi Selatan 2014,tahun 2012 yakni 110,26/100.000 kelahiran hidup,mengalami penurunan tahun 2013 yakni 78,35/100.000 kelahiran hidup, kemudian tahun 2014 meningkat yakni 94,51/100.000 kelahiran hidup. Sementara data profil kesehatan kabupaten Gowa 2014, dalam waktu 3 tahun terakhir angka kematian ibu terus menurun, tahun 2012 yakni 149,6/100.000, tahun 2013 yakni 80/100.000 dan tahun 2014 yakni 24/100.000 kelahiran hidup. Meskipun angka kematian ibu secara nasional,provinsi dan daerah menurun, tetapi upaya untuk terus menurunkan penyebab kematian ibu tersebut tetap harus dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai komplikasi.

Penyebab kematian ibu berdasarkan data profil kesehatan Indonesia 2015 masih di dominasi oleh perdarahan (30,3%),hipertensi gestasional (27,1%), infeksi

(7,3%), partus lama (0%) dan abortus (0%). Selain penyebab obstetrik juga non obstetrik sebesar (40,8%) (Kemenkes RI,2016 : 119). Gambaran etiologi kejadian berkisar 5% sampai 15% yang diperoleh dari atonia uteri (50%-60%), sisa plasenta (23%-24%), retensio plasenta(16%-17%), laserasi jalan lahir (4%-5%), kelainan darah (0,5 %- 0,8%) (Hikmah dan Yani,2015:144). Dalam sebuah penelitian terdapat lebih dari 12.000 kelahiran, dicombs dan laros ditemukan resiko perdarahan yang meningkat setelah 30 menit dengan terjadinya retensio plasenta (Urner,dkk:2014).

Menurut Indo Santalia dalam suatu kajian studi islam tentang proses perkembangan manusia, bahwa manusia dalam Al-Qur'an terdapat beberapa istilah yakni *ins*, *insan*, *basyar*, *bani Adam*, *nas*. Asal-usul manusia berasal dari Nabi Adam a.s, dalam penciptaannya merujuk dalam QS Surah as-Sajadah, proses kejadian manusia selain nabi Adam terdapat dalam QS Surah al-Mu,minum, QS Surah Nahl, QS Surah Maryam, QS Surah al-An'am, QS Surah Surah Nuh, QS Surah al-Furqan dan QS Surah al-An,biya. Proses penciptaan manusia mulai dari tanah sampai akhir kehidupan terdapat beberapa tahap yakni alam roh, arham, dunia, barzah dan akhirat. Merujuk dalam QS Surah al-mulk, QS Surah al-Baqarah, QS Surah al-,Ankabut, QS Surah al-Qashash, dan QS Surah adz-Dzariyat.

Dalam proses terjadinya manusia tersebut terdapat tempat perkembangan yang mantap yakni uterus dan untuk perkembangan embrio dalam suatu wadah sebagai awal dari pembentukan manusia dalam al-Qur'an terdapat tiga tabir kegelapan atau lapisan dinding sebagai pelindung yakni dinding *abdomen*, *Uterus* dan plasenta dengan membrane khorion-allontoisya. Dengan demikian, jika ketiga lapisan dinding tersebut sangat berpengaruh dalam proses perkembangan embrio, maka untuk

mencegah apabila terjadi retensio plasenta ketiga lapisan dinding tersebut juga sangat berpengaruh.

Berdasarkan data profil kesehatan Indonesia dari tahun 2005 sampai 2015 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan, menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun demikian, terdapat penurunan dari 90,88% pada tahun 2013 menjadi 88,55% pada tahun 2015. Pada tahun 2013 tingkat provinsi cakupan tertinggi terdapat di tiga provinsi, Jawa Tengah 99,89%, Sulawesi Selatan 99,78% dan Sulawesi utara 99,59%, sedangkan tahun 2015 Sulawesi Selatan pada urutan ke-9 (86,91%) setelah berada di urutan ke dua di tahun 2013 (profil kesehatan Indonesia,2015:113). Hal demikian cakupan pertolongan persalinan dan dilakukan di fasilitas kesehatan mengalami penurunan secara nasional dan provinsi,terkhusus provinsi Sulawesi Selatan. Dengan angka kejadian perdarahan yang cukup tinggi di Indonesia yang melebihi dari angka kejadian dunia. Retensio plasenta merupakan salah satu penyebab perdarahan. Sementara cakupan pertolongan persalinan tampak mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2015, penurunan tersebut menggambarkan bahwa terdapat masalah dalam penatalaksanaan dalam memberi pelayanan pertolongan persalinan salah satu masalah yang dapat timbul yakni pada proses penatalaksanaan manajemen aktif kala III oleh tenaga bidan dan tidak segera dirujuk.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Anggraeni dan Sri Anita Kusuma (2015) di Puskesmas Blega Kabupaten Bangkala tentang gambaran penatalaksanaan manajemen aktif kala III dari 23 bidan menunjukkan bahwa sebagian besar bidan mampu dalam penyuntikan oksitosin, yakni sebanyak 12 orang (52.2%). Sebagian

besar bidan perlu perbaikan dalam melakukan penegangan tali pusat terkendali, yakni sebanyak 14 orang (60.9%). Sebagian besar bidan mampu dalam melakukan massase fundus uteri, yakni sebanyak 13 orang (56.5%). Hasil ini tidak sesuai dengan cakupan pertolongan persalinan yang secara nasional sangat tinggi, namun dalam penatalaksanaan khususnya manajemen kala aktif III masih banyak bidan belum mampu melakukan penyuntikan *oxytosin*, penanganan tali pusat terkendali dan masase uteri secara cepat dan benar (Anggreni dan kusuma,2015:70).

Upaya untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan ibu akibat perdarahan yang disebabkan oleh retensio plasenta dengan penatalaksanaan manajemen aktif kala III dengan cepat serta benar dan penatalaksanaan program *safe motherhood*. Manajemen aktif kala III adalah penatalaksanaan dengan intervensi dari penolong persalinan untuk pelepasan dan pengeluaran plasenta dan meningkatkan kontraksi uterus secara efektif untuk mempersingkat durasi kala III dan menurunkan resiko perdarahan *postpartum*. Manajemen aktif kala III persalinan menggunakan uterotonika profilaksis disetujui sebagai standar asuhan. Manajemen aktif kala III persalinan meliputi pemberian oksitosin intravena, penjepitan tali pusat, pemijatan tali pusat serta penegangan tali pusat terkendali (Urner, dkk:2014). *Safe Motherhood* adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinan sehat dan aman serta melahirkan bayi yang sehat. Dalam program *safe motherhood* terdapat pelayanan obstetric esensial yakni pelayanan secara terus menerus selama 24 jam salah satu pelayanan tersebut adalah pengeluaran plasenta secara manual. Penatalaksanaan manajemen aktif kala III yang cepat dan benar dapat menghindari terjadinya retensio plasenta yang dapat berakibat perdarahan dan Program *safe motherhood* dibutuhkan untuk kasus kegawatdaruratan seperti retensio plasenta.

Angka kejadian retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa sebagai rumah sakit umum dan rujukan, dari jumlah persalinan normal, dengan komplikasi dan *sectio caesarea* tiga tahun terakhir yakni tahun 2014 sebanyak 1956 ibu bersalin dengan 51 kejadian retensio plasenta, tahun 2015 sebanyak 1804 ibu bersalin dengan 44 kejadian retensio plasenta, tahun 2016 sebanyak 1578 ibu bersalin dengan 12 kejadian retensio plasenta. Dari hasil tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah persalinan dan kejadian retensio plasenta ikut menurun, namun satu kejadian retensio plasenta tidak ditangani dengan cepat dan benar menimbulkan beberapa komplikasi dan berakibat mengancam jiwa seorang ibu. Angka kejadian retensio plasenta tidak secara spesifik terjadi di RSUD Syekh Yusuf Gowa, akan tetapi merupakan kasus rujukan dari puskesmas wilayah dan rumah sakit daerah yang tidak mampu menangani kasus tersebut dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit atau tenaga kesehatan terlatih yang tidak tersedia untuk penanganan retensio plasenta (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 standar kompetensi bidan, dalam standar kompetensi empat bahwa bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, mengenai situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir. Kegawatdaruratan kebidanan dengan indikasi distosia bahu, asfiksia neonatal, retensio plasenta, perdarahan karena atonia uteri dan menangani renjatanya dan melaksanakan manajemen aktif kala III, pemasangan infus dan mengambil darah untuk pemeriksaan hemoglobin (Hb) dan hematokrit (Ht)

serta melakukan pengeluaran plasenta secara manual(Yulifah,Surachmindari,2014: 93-95).

Oleh karena itu, uraian diatas penyusun tertarik untuk menerapkan manajemen asuhan kebidanan berdasarkan 7 langkah varney dengan metode penelitian studi kasus. Penerapan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah varney tersebut pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017. Dengan tujuan dapat mendeteksi dan mencegah secara dini kemungkinan terjadi komplikasi serta lebih meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya penatalaksanaan kala III untuk menghindari penyebab terjadinya perdarahan yang berakibat kematian ibu.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penyusunan karya tulis ilmiah dengan studi kasus meliputi Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny''H'' dengan Retensio Plasenta di RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menerapkan penatalaksanaan manajemen asuhan kebidanan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan menggunakan pendekatan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kompetensi dan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisa data pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.
- b. Dirumuskannya untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosis atau masalah aktual pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.
- c. Dirumuskannya untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosis atau masalah potensial pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.
- g. Dilakukannya evaluasi hasil asuhan kebidanan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.
- h. Didokumentasikannya semua hasil temuan dan tindakan asuhan kebidanan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penyusunan pada kasus Ny''H'' dengan tersebut diatas adalah:

1. Manfaat praktis

Menjadikan sumber informasi untuk penentuan kebijakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa dalam membuat perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kejadian retensio plasenta sebagai sumber perdarahan dalam persalinan.

2. Manfaat ilmiah

Pada hasil penelitian dalam bentuk asuhan tersebut dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kebidanan yang berkaitan dengan retensio plasenta.

3. Manfaat institusi

Bahan yang dapat dijadikan acuan bagi institusi pendidikan dalam penerapan proses manajemen asuhan kebidanan dengan retensio plasenta serta dapat digunakan untuk rekanita-rekanita mahasiswa kebidanan khususnya dalam penyusunan karya tulis ilmiah berikutnya yang relevan dengan sumber pustaka dan karya tulis ilmiah ini.

4. Manfaat bagi penyusun

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan khususnya dalam penerapan manajemen asuhan kebidanan dengan retensio plasenta.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan dasar teori serta perpaduan praktek dengan metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Yakni penyusun mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan profil kesehatan diantaranya buku, artikel, teksbook serta jurnal dan mengakses data melalui internet dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

2. Studi kasus

Melaksanakan studi kasus dengan menggunakan metode pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian data, analisis data, rumusan diagnosa atau masalah, perencanaan tindakan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi untuk menentukan masalah aktual dan potensial, merencanakan tindakan, pelaksanaan asuhan kebidanan dengan retensio plasenta untuk menghimpun data yang akurat dengan menggunakan teknik :

a. Anamnesa

Penyusun melakukan tanya jawab dengan ibu, suami dan keluarga yang dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki (*head to toe*) yang meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi dan pemeriksaan penunjang (*laboratorium*).

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian status emosional, pola interaksi ibu terhadap keluarganya, tetangga, petugas kesehatan lingkungannya dan pengetahuan tentang kesehatan, respon terhadap keadaan yang dialami.

d. Studi dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan bidan, dokter, petugas, laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

e. Diskusi

Melakukan tanya jawab dengan tenaga kesehatan yakni dokter maupun bidan yang menangani langsung klien tersebut serta berdiskusi dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Asuhan Persalinan Kala III

1. Fisiologi Kala III

Dimulai sejak lahir bayi sampai lahirnya plasenta atau uri yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Rata-rata kala III berkisar 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan adanya tekanan pada fundus uteri, baik pada primipara maupun multipara. Tempat implantasi plasenta sering pada dinding depan dan belakang korpus uteri atau lateral. Serta sangat jarang pada fundus uteri. Setelah bayi lahir uterus akan teraba keras dengan fundus akan setinggi pusat beberapa menit kemudian uterus akan berkontraksi untuk melepaskan plasenta dari tempat implantasinya. Pengeluaran akan disertai dengan pengeluaran darah serta akan mengalami pengerutan akibat kavim uteri dan kontraksi lanjutan sehingga plasenta dilepaskan dari perlekatannya dan pengumpulan darah pada ruang utero-plasenter akan mendorong plasenta keluar.

Pada kala III, miometrium berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Tempat implantasi plasenta semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka plasenta akan terlipat, menebal, dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau kedalam vagina (Tando, 2013:97)

2. Mekanisme Pelepasan Plasenta

Setelah lahir bayi, uterus masih mengadakan kontraksi yang mengakibatkan penciutan kavum uteri, tempat implantasi plasenta. Hal ini mengakibatkan plasenta lepas dari tempat implantasinya.

a. Macam-macam pelepasan plasenta:

1) Metode Schulze

Pelepasan dimulai pada bagian tengah (sentral) dari plasenta dan akan terjadi hematoma retro plasenta yang selanjutnya mengangkat plasenta dari dasarnya. Plasenta dengan hematoma bagian atas akan jatuh ke bawah dan akan menarik selaput plasenta. Bagian plasenta yang akan muncul pada vulva adalah permukaan fetal, sedangkan hematoma terdapat dalam kantong yang terputar balik. Maka saat pelepasan plasenta secara schultze tidak akan terjadi perdarahan sebelum plasenta lahir atau sebagian terlepas seluruhnya, setelah plasenta lahir akan ada darah menggumpal mengalir. Pelepasan plasenta dengan metode Schultze adalah cara yang paling banyak ditemui dalam proses kala uri.

2) Metode Duncan

Plasenta lepas mulai dari bagian pinggir (marginal) yang ditandai dengan adanya perdarahan dari vagina apabila plasenta sudah mulai terlepas. Umumnya perdarahan tidak melebihi 400ml (Kuswanti dan Melina, 2014: 120). Darah yang mengalir keluar antara selaput janin dan dinding uterus, perdarahan ini telah terjadi sejak sebagian dari plasenta dan akan berlangsung sampai seluruh

plasenta lepas. Pelepasan secara Duncan akan terjadi pada plasenta letak rendah (Eniyati dan Sholihah,2013:132).

Apabila plasenta telah lahir, umumnya otot-otot uterus segera berkontraksi, pembuluh-pembuluh darah akan terjepit dan perdarahan akan segera berhenti. Pada keadaan normal plasenta lahir spontan dalam waktu lebih kurang 6 menit setelah anak lahir lengkap.

b. Tanda-tanda pelepasan plasenta

1) Perubahan bentuk uterus dan tinggi fundus uterus

Setelah bayi lahir dan sebelum myometrium mulai berkontraksi,uterus berbetuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya di bawah pusat(Tando,2015:98). Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus yang semula discoid menjadi glober (bundar) akibat dari kontraksi uterus dan fundus berada di atas pusat (Kuswanti dan Melina,2013: 120).

2) Semburan darah tiba-tiba

Darah yang terkumpul dibelakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dengan adanya gaya gravitasi. Apabila retroplasenter pooling dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas maka retroplasenter akan pecah, sehingga terjadi semburan darah dari tepi plasentayang terlepas. Tanda ini tampak dalam waktu satu menit setelah bayi lahir sampai lima menit(Tando,2015: 98).

3) Tali pusat memanjang

Tali pusat akan tampak menjulur keluar melalui vulva (tanda Ahfeld) (Tando NM : 2015:99). Hal ini karena plasenta turun ke segmen uterus yang lebih bawah atau rongga vagina (Kuswanti dan Melina,2013: 121).

4) Perubahan posisi uterus

Setelah plasenta lepas dan menempati segmen bawah Rahim, maka uterus muncul pada rongga abdomen (uterus naik di dalam abdomen) (Kuswanti dan Melina,2013: 121).

c. Pengawasan perdarahan

Prasat-prasat untuk mengetahui plasenta lepas dari tempat implantasinya :

1) Prasat Kustner

Tangan kanan meregangkan atau menarik sedikit tali pusat. Tangan kiri menekan diatas simfisis. Apabila tali pusat masuk ke dalam vagina menandakan plasenta belum terlepas, sebaliknya bila tetap atau tambah maju menandakan plasenta telah lepas dari dinding uterus. Prasat ini hendaknya dilakukan secara hati-hati, jika hanya sebagian plasenta terlepas perdarahan abnormal akan terjadi (Eniyati dan Sholihah,2013:132).

2) Prasat Strassman

Prasat ini dilakukan dengan mengetok-ngetok fundus uterus dengan tangan kiri dan tangan kanan meregangkan tali pusat, apabila tali pusat bergetar berarti plasenta belum lepas, sebaliknya bila tidak terasa getaran berarti plasenta sudah lepas dari dinding uterus. Prasat ini menimbulkan tanda pelepasan plasenta yakni rahim menonjol di atas simfisis, tali pusat bertambah panjang, rahim bundar dan keras, serta keluar darah tiba-tiba (Eniyati dan Sholihah,2013:132).

3) Prasat Klien

Untuk melakukan prasat ini, minta pasien untuk meneran, jika tali pusat tampak turun atau bertambah panjang berarti plasenta telah lepas bila pengejanan dihentikan dan tali pusat masuk kembali ke dalam vagina, berarti plasenta belum lepas dari dinding uterus (Kuswanti dan Melina, 2013: 122).

4) Prasat Manuaba

Tangan kiri memegang uterus pada segmen bawah Rahim, sedangkan tangan kanan memegang dan mengencangkan tali pusat kemudian tangan ditarik secara berlawanan.

3. Manajemen Aktif Kala III

Manajemen aktif kala III adalah mengupayakan kala III selesai secepat mungkin dengan melakukan langkah-langkah yang memungkinkan plasenta lepas dan lahir dengan cepat. Tujuan manajemen aktif kala III adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif, mempersingkat waktu kala III, mencegah perdarahan dan mengurangi kehilangan darah kala III persalinan jika dibandingkan dengan penatalaksanaan fisiologis, sehingga dapat mengurangi angka kematian dan angka kesakitan yang berhubungan dengan perdarahan.

Penatalaksanaan manajemen kala III dapat mencegah terjadinya kasus perdarahan pasca persalinan yang disebabkan oleh atonia uteri dan retensio plasenta. Syarat manajemen aktif kala III yakni janin tunggal atau memastikan tidak ada lagi janin di uterus. Dengan membuat kontraksi uterus lebih efektif dapat memberi keuntungan di antaranya persalinan kala III lebih

singkat, mencegah perdarahan post partum dan menurunkan kejadian retensio plasenta.

Manajemen aktif kala III dalam persalinan terdapat tiga intervensi utama yakni pemberian uterotonika setelah kelahiran bayi, penegangan tali pusat terkendali dengan menunggu pelepasan dan pengeluaran plasenta serta masase fundus uteri

a. Pemberian oksitosin

Pemberian oksitosin perlu dilakukan pengkajian dengan melakukan palpasi pada abdomen untuk meyakinkan hanya ada bayi tunggal. Pemberian oksitosin secara intramuscular pada sepertiga paha bagian luar diberikan 1 menit setelah bayi lahir. Bila 15 menit plasenta belum lahir, maka pemberian oksitosin kedua, evaluasi kandung kemih apakah penuh atau tidak, bila penuh lakukan kateterisasi. Setelah 30 menit belum lahir, maka berikan oksitosin ketiga sebanyak 10 mg dan rujuk pasien (Kuswanti dan Melina Fitria, 2012:123).

Oksitosin dan ergometri kedua obat uterotonika tersebut dapat mengurangi perdarahan pada periode postpartum. Berdasarkan penelitian ibu hamil di Nigeria, ditemukan bahwa penggunaan ergometri aman untuk klien dengan tekanan darah normal. Pada resiko tinggi seperti riwayat hipertensi tidak dapat diberi ergometri karena ergometri meningkatkan tekanan darah secara bermakna membahayakan jiwa ibu, sebaiknya menggunakan oksitosin untuk lebih aman bagi ibu (Fauziyah Yulia, 2012:152).

b. Penengangan tali pusat terkendali

Penengangan tali pusat terkendali dilakukan dengan cara menegangkan tali pusat secara berkala dengan mendorong uterus kearah *dorso cranial* yakni kearah kepala ibu dengan tangan penolong diletakkan di atas simphisis pubis ibu. Efek samping dari tindakan ini walaupun jarang terjadi adalah putusya tali pusat atau terjadinya inversi uterus. Walaupun dikaitkan dengan kesalahan metode pelaksanaannya, namun kejadian inversi uterus harus diwaspadai. Setelah kelahiran plasenta, lakukan masase fundus uteri secara aktif untuk menunjang kontraksi uterus hingga mencegah perdarahan postpartum (Fauziyah Yulia,2012:154).

c. Masase fundus uteri

Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase fundus uteri dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memastikan bahwa kotiledon dan selaput plasenta dalam keadaan lengkap dari sisi maternal dan fetal. Masase fundus uteri perlu dilakukan untuk merangsang kontraksi uterus yang adekuat, sehingga perdarahan postpartum yang sering diakibatkan oleh atonia uteri dapat dihindari (Fauziyah Yulia,2012:154).

4. Pemeriksaan Plasenta

a. Plasenta

Pastikan bahwa seluruh plasenta telah lahir lengkap dengan memeriksa jumlah kotiledon yang rata-rata 15- 20 kotiledon. Periksa dengan seksama pada bagian pinggir plasenta apakah kemungkinan masih ada hubungan dengan plasenta lain (plasenta suksenturiata). Amati apakah ada bagian tertentu yang seperti tertinggal atau tidak utuh, jika kemungkinan itu ada maka segera lakukan eksplorasi untuk membersihkan sisa plasenta (Walyani,Purwoastuti,2015:83).

b. Selaput ketuban

Pada pemeriksaan selaput ketuban setelah plasenta lahir, menilai kelengkapan selaput ketuban untuk memastikan tidak ada bagian yang tertinggal di dalam uterus. Dengan cara meletakkan plasenta diatas tempat yang datar dan pertemukan setiap tepi selaput ketuban sambil mengamati apakah ada tanda-tanda robekan dari tepi selaput ketuban. Jika ditemukan kemungkinan ada bagian yang robek, maka segera lakukan eksplorasi uterus untuk mengeluarkan sisa selaput ketuban karena sisa selaput ketuban atau bagian plasenta yang tertinggal di dalam uterus akan menyebabkan perdarahan dan infeksi (Walyani, Purwoastuti, 2015:83).

c. Tali pusat

Setelah plasenta lahir, periksa mengenai data yang berhubungan dengan tali pusat yakni panjang tali pusat, bentuk tali pusat (besar, kecil atau terpilin-pilin), insersio tali pusat, jumlah vena dan arteri pada tali pusat serta adanya lilitan tali pusat (Kuswanti dan Melina, 2013:126).

5. Pemantauan kala III

a. Perdarahan

Jumlah darah diukur, disertai dengan bekuan darah atau tidak. Bila jumlah darah lebih dari 500 cc, segera lakukan penatalaksanaan sesuai faktor penyebab (Tando, 2013:104).

b. Kontraksi uterus

Setelah plasenta terlepas dan lahir, maka uterus akan melakukan kontraksi. Kontraksi harus dipantau sampai kala IV persalinan, jika didapatkan uterus

berkontraksi jelek atau bahkan tidak berkontraksi, kemungkinan terjadi atonia uteri sebagai factor terjadinya perdarahan pasca persalinan (Tando,2013: 104).

c. Robekan jalan lahir dan perineum

Saat melakukan PTT saat tidak adanya kontraksi, bidan akan melakukan pengkajian terhadap robekan jalan lahir dan perineum. Pengkajian dilakukan sejak awal sehingga bidan dapat segera menentukan derajat robekan dan teknik jahitan yang tepat yang akan digunakan sesuai kondisi pasien. Bidan memastikan apakah jumlah darah yang keluar merupakan akibat dari robekan jalan lahir atau karena pelepasan plasenta (Walyani,Purwoastuti,2015:83).

d. Tanda-tanda Vital

Tekanan darah yakni tekanan sistolik dan diastolik mulai kembali ke tingkat sebelum persalinan. Nadi yakni secara bertahap meningkat secara perlahan. Pernapasan akan kembali normal dan aktivitas gastrointestinal, apabila tidak terpengaruh obat-obatan, motilitas lambung dan absorbs kembali ke aktivitas normal, ibu bersalin yang mengalami mual muntah selama kala III adalah hal yang abnormal (Tando,2013: 105).

e. Personal Hygiene

Menjaga kebersihan tubuh pasien terutama pada daerah genitalia dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi terhadap luka robekan jalan lahir dan kemungkinan infeksi intrauterus. Kondisi pasien yang sangat kotor akibat pengeluaran air ketuban, darah, atau feses saat proses kelahiran janin. Saat plasenta telah lahir dan tidak adanya perdarahan, maka segera keringkan bagian bawah pasien dari air ketuban dan darah. Pasang underpad sebagai pengalas bokong yang

berfungsi untuk menampung darah. Apabila diperlukan untuk menghitung volume darah, maka dapat dipasang bengkok dibagian bokong pasien atau dapat di ketahui dari pemakaian pembalut (Walyani,Purwoastuti,2015:84).

6. Kebutuhan Ibu Pada Kala III

- a. Dukungan mental dari bidan dan keluarga atau pendamping.
- b. Penghargaan terhadap proses kelahiran janin yang telah dilalui.
- c. Informasi yang jelas tentang keadaan pasien sekarang dan tindakan apa yang akan dilakukan.
- d. Menjelaskan pada pasien yang harus dilakukan untuk membantu mempercepat kelahiran plasenta yakni kapan akan meneran dan posisi apa yang mendukung untuk pelepasan dan kelahiran plasenta.
- e. Merasa nyaman karena terbebas dari bagian bawah yang basah dikarenakan darah dan air ketuban.
- f. Hidariasi (Kuswanti dan Melina,2013:127).

B. Tinjauan Umum Tentang Retensio Plasenta

1. Defenisi Retensio Plasenta

Retensio plasenta merupakan plasenta yang tidak terpisah dan menimbulkan hemorhage yang tidak disadari dan disadari ketika durasi waktu yang berlalu antara kelahiran bayi dan kelahiran plasenta yang diharapkan. Dalam berbagai ilmu atau tenaga kesehatan khususnya bidan akan menunggu selama setengah jam untuk mengetahui bahwa plasenta tertahan dalam uterus atau belum lepas atau pun terlepas,namun tertahan akibat konstriksi yang terjadi pada ostium uteri (Tando,2013: 90).

Plasenta yang tertinggal dalam uterus setengah jam setelah anak lahir disebut sebagai retensio plasenta. Plasenta yang sukar dilepaskan dengan pertolongan aktif kala III dapat disebabkan oleh adhesi yang kuat antara plasenta dan uterus (Saifuddin,2014:526). Retensio plasenta merupakan tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga atau melebihi waktu 30 menit setelah bayi lahir (Nugroho T,2011 :158).

Retensio plasenta merupakan kondisi di mana plasenta belum lahir dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir, rata-rata gangguan pelepasan plasenta disebabkan oleh kontraksi uterus (Kuswanti dan Melina,2014:131).Retensio plasenta merupakan tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga atau lebih dari 30 menit setelah bayi lahir, namun sebagian besar gangguan pelepasan plasenta disebabkan oleh gangguan kontraksi uterus (Nugroho,2010:143).

2. Klasifikasi Retensio Plasenta

Klasifikasi retensio plasenta terdiri dari beberapa jenis yakni:

- a. Plasenta adhesiva merupakan implantasi yang kuat dari jonjot karion plasenta sehingga menyebabkan kegagalan mekanisme separasi fisiologis.
- b. Plasenta akreta merupakan implantasi jonjot karion plasenta hingga menembus sebagian lapisan miometrium.
- c. Plasenta inkreta merupakan implantasi jonjot karion plasenta hingga mencapai atau menembus miometrium.
- d. Plasenta perkreta adalah implantasi jonjot karion plasenta yang menembus lapisan otot hingga mencapai lapisan serosa dinding uterus.

- e. Plasenta inkarserata merupakan tertahannya plasenta di dalam kavum uteri, karena kontraksi ostium uteri.

3. Predisposisi Retensio Plasenta

Faktor resiko yang dapat terjadi pada tertahannya plasenta atau plasenta tidak lahir selama durasi 30 menit yakni riwayat retensio plasenta, persalinan premature, bekas luka operasi uterus, usia diatas 35 tahun dan Grandemultipara (Akinola, dkk:2013:280).

Menurut Walyani, Purwoastuti (2013) bahwa predisposisi retensio plasenta atau faktor resiko retensio plasenta adalah grandemultipara, bekas operasi pada uterus, plasenta previa karena pada bagian isthmus uterus, pembuluh darah sedikit sehingga menembus jauh kedalam dan kehamilan gemeli atau ganda yang memerlukan implantasi plasenta yang sedikit luas serta infertilitas disebabkan karena lapisan endometriumpunya tipis.

4. Etiologi Retensio Plasenta

Penyebab retensio plasenta:

- a. Plasenta belum terlepas dari dinding uterus karena melekat dan tumbuh lebih dalam. Menurut tingkat perlekatannya :
 - 1) Bila plasenta belum lepas sama sekali, maka tidak akan terjadi perdarahan tetapi bila sebagian plasenta telah terlepas maka akan terjadi perdarahan, hal ini akan menjadi indikasi untuk segera mengeluarkannya.
 - 2) Plasenta kemungkinan tidak keluar disebabkan oleh vesika urinaria atau kandung kemih dan rektum penuh, hal yang harus dilakukan dengan mengosongkannya.

- 3) Dapat diketahui plasenta telah lepas atau belum saat tindakan pemeriksaan dalam dan tarikan tali pusat serta terjadi lebih dari 30 menit maka dapat dilakukan plasenta manual (Maryunani, Yulianingsih, 2009).
- b. Plasenta telah terlepas dari dinding uterus, namun belum keluar karena atonia uteri atau adanya konstiksi pada bagian bawah Rahim (akibat kesalahan penanganan kalau III) yang menyebabkan plasenta tidak lahir (plasenta inkarserata) (Walyani, Purwoastuti, 2015:91). Penyebab fungsional terjadinya retensio plasenta yakni his kurang kuat (sebab terpening), plasenta sukar terlepas karena tempat insersi di sudut tuba, bentuknya plasenta membranacea, plasenta anularis dan ukuran plasenta sangat kecil disebut plasenta adhesive. Sedangkan sebab patologi-anatomis yakni klasifikasi dari perlekatan plasenta (Pudiasuti, 2012 :85).

5. Anatomi

a. Plasenta

1) Bentuk dan ukuran

Plasenta berbentuk bundar atau oval, ukuran dari diameter 15-20 cm, tebal 2-3 cm, berat 500-600 gram. Rata-rata plasenta atau uri berbentuk lengkap pada kehamilan kira-kira 16 minggu, tampak ruang amnion telah mengisi seluruh rongga uterus.

2) Letak plasenta dalam uterus

Letak plasenta normal umumnya pada korpus uteri bagian depan atau belakang agak kearah fundus uteri. Apabila letak plasenta dibagian bawah dikatakan plasenta previa parsial, marginal dan totalis.

3) Pembagian plasenta

Plasenta terbagi dua yakni pada bagian fetal (janin) terdiri dari karion frondosom dan vili, di bagian permukaan janin terdapat amnion yang tampak licin, sedangkan pada bagian bawah amnion terdapat banyak cabang-cabang pembuluh darah tali pusat. Tali pusat akan melakukan insersi pada plasenta bagian permukaan janin. Sedangkan pada bagian maternal (ibu) terdiri atas desidua kompakta yang terbentuk dari beberapa lobus dan kotiledo (15-20 buah). Desidua basalis plasenta matang disebut lempeng karion dimana sirkulasi utero-plasenta berjalan ke ruang-ruang intervili melalui tali pusat. Sehingga untuk aliran darah ibu dan janin terpisah.

4) Faal plasenta

Nutrisi diperlukan untuk pemberian makanan terhadap janin. Respirasi digunakan sebagai alat penyalur zat asam dan pembuangan CO₂. Ekskresi sebagai alat pengeluaran sampah metabolisme. Produksi sebagai alat penghasil hormone-hormon. Imunisasi sebagai alat penyalur bermacam-macam antibody ke janin. Dan pertahanan digunakan sebagai alat menyaring obat-obatan dan kuman-kuman yang dapat melewati plasenta.

5) Hormone plasenta

Hormone-hormon yang di hasilkan plasenta yakni HCG (human chorionic gonadotropin), plasenta lactogen (chorionic somatomotropin), estrogen, progesteron serta hormone lainnya.

6) Tipe plasenta

Menurut bentuknya terdiri atas plasenta normal, plasenta membranosa (tipis), plasenta suksenturiata (1 lobus), plasenta spuria, plasenta bilobus (2 lobus), dan plasenta trilobus (3 lobus). Menurut perlekatannya terdiri dari plasenta adhesive (melekat), plasenta akreta (lebih melekat), plasenta ankreta (melekat sampai ke otot polos) dan plasenta perkreta (sampai serosa) (Jannah, 2012: 75).

b. Selaput ketuban

Ruang yang dilapisi oleh selaput janin (amnion dan khorion) berisi air ketuban (liquor amnii). Ciri-ciri kimiawi dari amnion yakni volume air ketuban pada kehamilan cukup bulan kira-kira 1000-1500cc. Bila volume air ketuban < 500cc disebut oligohidramnion, volume air ketuban > 2000cc disebut polihidramnion. Air ketuban berwarna putih keruh, berbau amis, dan berasa manis. Reaksi agak alkalis atau netral dengan beta jenis 1,0008 dengan komposisi terdiri dari 98% air, sisanya albumin, urea, verniks caseosa, rambut lanugo, asam urine, kreatin sel-sel epitel dan garam anorganik. Kadar protein kira-kira 2,6% g/liter, terutama albumin.

Faak dari air ketuban yakni untuk proteksi janin, mencegah perlekatan janin dengan amnion, janin dapat bergerak bebas, regulasi terhadap panas dan perubahan suhu, meratakan tekanan intra uteri, membersihkan jalan lahir bila ketuban sudah pecah, dapat mempercepat peredaran darah ibu dan perputaran cepat kira-kira 350-500 cc.

Air ketuban berasal dari kencing janin (fetal urine), transfusi dari darah ibu, sekresi dari epitel amnion dan nasal campuran (mixed origin). Beberapa cara untuk mengenali air ketuban di antaranya dengan lakmus yang akan berwarna biru ketika

lakmus terpapar air ketuban. Secara makroskopis akan berbau amis, adanya lanugo, verniks caseosa dan ketuban akan bercampur mekonium. Namun secara mikroskopis akan tampak lanugo dan rambut serta dalam pemeriksaan laboratorium kadar urea rendah dibanding dengan air kemih (Jannah, 2012: 71).

d. Tali pusat

Struktur tali pusat merentang dari pusat janin hingga ke plasenta bagian permukaan fetal janin. Warna bagian luar putih merupakan tali yang terpilin dengan panjang rata-rata 55-59 cm, diameter 1-2,5 cm. Terdiri dari zat seperti agar-agar yang disebut *jelly harton* yang mencegah kompresi pembuluh darah sehingga pemberian makanan yang kontinu untuk embrio-janin. Struktur dari tali pusat terdiri atas 2 arteri umbilikalis (menghubungkan sistem kardiovaskuler) terbentuk kira-kira minggu ke sepuluh) serta *jelly harton* (jaringan lembek yang berfungsi untuk melindungi pembuluh darah). Adapun jenis dari tali pusat yaitu insersi sentralis (di tengah), insersi lateralis, insersi marginal dan insersi velamentosa (Jannah, 2012: 73).

6. Tanda dan Gejala Retensio Plasenta

Gejala yang secara umum selalu ada yakni plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit dan perdarahan segera kontraksi uterus baik. Gejala yang kadang timbul yakni tali pusat putus akibat traksi berlebihan, inversi uteri akibat tarikan, dan perdarahan lanjutan. Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah) tidak lengkap dan perdarahan segera dan kontraksi uterus baik tapi tinggi fundus tidak berkurang.

Tabel 1.1 Gambaran dan Dugaan Penyebab Retensio Plasenta

Gejala	Separasi/akreta parsial	Plasenta inkarserata	Plasenta akreta
Konstriksi uterus	Kenyal	Keras	Cukup
Tinggi fundus	Sepusat	2 jari bawah pusat	Sepusat
Bentuk fundus	Diskoid	Agak globuler	Discoid
Perdarahan	Sedang-banyak	Sedang	Sedikit atau tidak ada
Tali pusat	Terjuler sebagian	Terjuler	Tidak terjuler
Ostium uteri	Terbuka	Konstriksi	Terbuka
Separasi plasenta	Lepas sebagian	Sudah lepas	Melekat seluruhnya
Syok	Sering	Jarang	Jarang sekali

Sumber : Nugroho ,2011:144

Pada gambaran dan dugaan penyebab retensio, untuk jenis retensio plasenta dengan separasi parsial penatalaksanaan tindakan, dapat melakukan peregangan tali pusat terkendali. Untuk pelaksanaan sebelumnya melakukan pemasangan infus oksitosin 20 unit dalam 500cc NS/RL dengan 40 tetesan per menit. Bila perlu, kombinasikan dengan misoprostol 400mg melalui rectal (sebaiknya tidak menggunakan ergometrin karena kontraksi tonik yang timbul dapat menyebabkan plasenta terperangkap dalam kavum uteri). Jika peregangan tali pusat terkendali gagal maka lakukan manual plasenta. Pemberian cairan untuk menghindari hipovolemia dan melakukan transfusi darah apabila diperlukan dan pemberian

antibiotika profilaksis (ampisilin 2g IV/oral dan metronidazol 1g supositoria/oral) (Pudiasuti,2012:89).

Plasenta inkarserata adalah tertahannya plasenta dalam kavum uteri, disebabkan oleh konstiksi ostium uteri. Penanganan pada plasenta inkarserata yakni dengan mencoba 1-3 kali dengan prasad *Crede*. Bila prasad *Crede* gagal, maka lakukan manual plasenta,transfusi darah bila perlu dan pemberian uterotonika dan antibiotik (Kuswanti dan Melina,2014:132).

Plasenta akreta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan implantasi plasenta yang sangat kuat menempel pada dinding uterus, akibat dari tidak adanya desidua basalis dan ketidaksempurnaan pembentukan lapisan fibrinoid atau lapisan nitabuch. Plasenta akreta umumnya dapat diketahui ketika pecahnya ketuban disertai perdarahan vagina,kegawatan janin, bahkan kematian janin. Ketika terjadi perdarahan akut dari plasenta akreta yang pecah, direkomendasikan untuk segera melahirkan. Plasenta akreta dapat didiagnosis sebelum kelahiran dengan menggunakan USG. Penatalaksanaan utama untuk plasenta akreta bergantung pada diagnosis prenatal yakni melalui tindakan operatif (Fauziah,Yulia 2012:79-83).

7. Penanganan Retensio Plasenta

a. Penanganan secara umum


- 1) Jika plasenta terlihat dalam vagina, mintalah ibu untuk mengedan dan jika terasakan plasenta dalam vagina, keluarkan plasenta tersebut.
- 2) Pastikan kandung kemih sudah kosong. Apabila diperlukan lakukan kateterisasi kandung kemih.

- 3) Jika plasenta belum keluar, berikan oksitosin 10 unit secara Intramuskular, jika belum dilakukan pada kala III.
 - 4) Jangan berikan ergometri karena dapat menyebabkan kontraksi uterus yang tonik yang bisa memperlambat pengeluaran plasenta.
 - 5) Jika plasenta belum dilahirkan setelah 30 menit pemberian oksitosin dan uterus teraba berkontraksi lakukan penarikan tali pusat terkendali.
 - 6) Jika traksi pusat terkendali belum berhasil, cobalah untuk mengeluarkan plasenta secara manual. Jika perdarahan terus berlangsung, lakukan uji pembekuan darah sederhana. Kegagalan terbentuknya pembekuan setelah 7 menit atau adanya bekuan lunak yang dapat pecah dengan mudah menunjukkan koagulapati.
 - 7) Jika terdapat tanda-tanda infeksi (demam, secret vagina yang berbau), berikan antibiotik untuk metritis.
- b. Penanganan secara khusus
- 1) Tentukan jenis retensio yang terjadi karena berkaitan dengan tindakan yang di ambil.
 - 2) Regangkan tali pusat dan minta pasien untuk mengedan. Bila ekspulsi plasenta tidak terjadi coba traksi terkontrol tali pusat.
 - 3) Pasang infus oksitosin 20 IU dalam 500 mL NS/RL dengan 40 tetes permenit. Bila perlu kombinasikan dengan misoprostol 400 mg per rektal (sebaiknya tidak menggunakan ergometrin karena kontraksi tonik yang timbul dapat menyebabkan plasenta terperangkap dalam kavum uteri).

- 4) Bila traksi terkontrol gagal untuk melahirkan plasenta lakukan manual plasenta secara hati-hati dan halus untuk menghindari terjadinya perforasi dan perdarahan.
- 5) Lakukan transfusi darah apabila diperlukan.
- 6) Berikan antibiotika profilaksis (ampisilin 2g IV/oral+metronidazole 1g supositoria/oral).
- 7) segera atasi bila terjadi komplikasi perdarahan hebat,infeksi dan syok hemoragik.

8. Penatalaksanaan Retensio Plasenta

Bagan 1.1 Penatalaksanaan Retensio Plasenta



Sumber: Kemenkes dan HOGSI,2013

Menurut WHO, Pengeluaran dengan manual plasenta merupakan prosedur kebidanan yang umum dilakukan pada tahap kala III persalinan sebagai tindakan segera terhadap plasenta yang tertahan selama durasi 30 menit (Akinola,dkk:2013). Manual Plasenta adalah tindakan untuk melepaskan plasenta secara manual dengan tindakan menjemput dengan tangan dari tempat implantasinya dan kemudian melahirkan melalui kavum uteri.

Prosedur

a. Persiapan

- 1) Pasang infus set dan cairan infus.
- 2) Jelaskan pada ibu prosedur dan tujuan tindakan.
- 3) Lakukan anastesi verbal atau analgesia per rectal.
- 4) Siapkan dan jelaskan prosedur pencegahan infeksi.

b. Tindakan penetrasi ke dalam kavum uteri

- 1) Pasang sarung tangan panjang DTT
- 2) Pastikan kandung kemih dalam keadaan kosong
- 3) Jepit tali pusat dengan klem pada jarak 5-10 cm dari vulva, tegangkan dengan satu tangan sejajar lantai.
- 4) Secara obstetric masukkan tangan lainnya (punggung tangan menghadap ke bawah) ke dalam vagina dengan menelusuri sisi bawah tali pusat.
- 5) Setelah mencapai ujung serviks, minta asisten atau penolong lain untuk memegang klem tali pusat kemudian pindahkan tangan luar untuk menahan fundus uteri.
- 6) Sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan dalam hingga ke kavum uteri sehingga mencapai tempat implantasi plasenta.

- 7) Bentangkan tangan obstetric menjadi datar seperti posisi jari-jari merapat.
- 8) Menentukan implantasi plasenta, temukan tepi plasenta yang paling bawah. Bila plasenta berimplantasi dikorpus belakang, tali pusat tetap di sebelah atas dan sisipkan ujung-ujung jari tangan diantara plasenta dan dinding uterus dimana punggung tangan menghadap kebawah. Bila korpus depan maka pindahkan tangan ke sebelah atas tali pusat dan sisipkan ujung-ujung jari-jari tangan diantara plasenta dan dinding uters serta punggung tangan menghadap ke atas.
- 9) Setelah ujung-ujung jari masuk diantara plasenta dan dinding uterus maka perluas pelepasan plasenta dengan jalan menggeser tangan ke kanan dan kiri sambil digeserkan ke atas (cranial ibu) hingga semua perlekatan plasenta terlepas dari dinding uterus.
- 10) Sementara satu tangan masih di dalam kavum uteri, lakukan eksplorasi untuk menilai tidak ada sisa plasenta yang tertinggal.
- 11) Pindahkan tangan luar dari fundus ke supra simfisis (tahan segmen bawah uterus) kemudian instruksikan asisten atau penolong untuk menarik tali pusat sambil tangan dalam membawa plasenta keluar.
- 12) Lakukan penekanan (dengan tangan yang menahan suprasimfisi) uterus kearah dorso-kranial setelah plasenta dilahirkan dan tempatkan plasenta di dalam wadah yang telah di sediakan.
- 13) Dekontaminasi sarung tangan (sebelum dilepas) dan peralatan lain yang digunakan.
- 14) Lepaskan dan rendam sarung tangan dan peralatan lainnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.

- 15) Cuci tangan dengan prinsip 6 langkah cuci tangan dibawah air mengalir dengan sabun, kemudian keringkan dengan handuk bersih.
- 16) Periksa kembali tanda-tanda vital
- 17) Mencatat keadaan umum ibu dan laporan tindakan
- 18) Menulis rencana pengobatan, tindakan yang masih diperlukan dari asuhan lanjutan.
- 19) Memberitahu pada ibu dan keluarga bahwa tindakan telah selesai tetapi ibu masih memerlukan pemantauan dan asuhan lanjutan.
- 20) Melanjutkan pemantauan ibu hingga 2 jam pasca tindakan sebelum dipindahkan keruang rawat gabung.

C. Tinjauan Islam tentang Penciptaan Manusia

Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang fase-fase penciptaan manusia ketika *nuthfah* masuk kedalam rahim sebagai *nuthfah*, bukan sebagai *alaqah* untuk beberapa saat, ketika telah menggantung maka disebut *alaqah* sebagaimana firman Allah swt.

dalam QS Al-Mu'minun/23:13-14

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَنَبَأْرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ١٤

Terjemahnya :

“Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”(Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012).

Dalam Tafsir Al-Azhar karya Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka) menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam QS Sural al-Mu'minum ayat 13-14

yakni dengan kehendak ilahi bertemulah zat tampang dari laki-laki yang berupa cacing sangat kecil, berpadu satu dengan zat mani pada perempuan yang merupakan telur yang sangat kecil. Keduanya, dinamai sebagai *Nutfah*, *Nutfah* akan berkembang dalam empat puluh hari yang akan beransur menjadi segumpal darah. Dari *Nutfah* menjadi segumpal darah yang akan ditempatkan dalam tempat yang terjamin aman, panas dingin yang seimbang, dan tempat yang terpelihara yakni rahim kandungan dari ibu itulah disebut dengan "*qaraarin makiin*". Kemudian akan lepas empat puluh hari akan menjadi darah, beransur membeku menjadi segumpal darah, terus membeku hingga berubah sifatnya menjadi tulang yang kian lama akan diselimuti oleh daging. Pada saat itu dianugerahkan kepadanya "roh" maka bernafaslah dia. Dengan hembusan nafas tersebut maka sekumpulan dari tulang dan daging itu berubah sifatnya dan akan menjadi manusia.

Dalam Tafsir Al-Maragi karya Ahmad Mustafa Al-Maragi menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam QS Surah al-Mu'minun ayat 13-14 yakni menjadikan keturunannya dari air mani yang terdapat pada tulang rusuk bapak, kemudian dilemparkannya kedalam rahim hingga menetap di suatu tempat yang sangat kokoh yakni rahim di sebut sebagai "*al-qarar al-makin*". kemudian air mani itu dari sifatnya yang kedua menjadi sifat darah yang beku, darah beku itu dijadikan sepotong daging sebesar apa yang dikunyah. Segumpal darah itu akan dijadikan sedemikian rupa dan bagian-bagiannya yang akan di uraikan yakni pembentukan tulang, yang kemudian akan diselimuti oleh daging serta unsur pembentuk dari makanan akan tersebar di dalam darah. Daging tersebut sebagai penutup yakni menutupi tulang hingga menyerupai pakaian yang menutupi tubuh. Maka akan dijadikan makhluk lain yang berbeda dari kejadian awalnya karena makhluk yang

berbeda itu telah ditupkan roh padanya setelah sebelumnya menyerupai benda mati sampai bisa berbicara, mendengar, dan melihat serta dititipkannya sekian banyak keanehan, baik lahir maupun batin.

Dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam QS Sural al-Mu'minum ayat 13-14 yakni dalam prosesnya dari *nutfah* yang berarti dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi, namun terdapat pemahaman bahwa pertemuan sperma dan ovum. Dalam penemuan ilmiah menjelaskan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang yang berhasil bertemu dengan undung telur wanita hanya satu saja. Kemudian dari *nutfah* menjadi *'alqah* terdapat arti segumpal darah yang membeku, sesuatu yang seperti cacing, berwarna hitam, terdapat dalam air, yang hila air itu diminum cacing tersebut menyangkut kerongkongan dan sesuatu yang bergantung atau berdempet. Namun dari kemajuan ilmu pengetahuan cenderung menafsirkan *'alqah* sesuatu yang bergantung atau berdempet di dinding rahim. Dalam periode ini belum terdapat aliran darah sehingga tidak tepat jika *'alqah* atau *alqa* dalam arti segumpal darah. Dalam proses *'alqah* akan menjadi *mudghah* yang berarti menguyah. *Mudghah* adalah sesuatu yang dapat dikunyah.

Sayyid Quthub menuliskan mengenai hakikat pembentukan janin yang ditemukan oleh embriologi bahwa sel-sel daging berbeda dengan sel-sel tulang, terbukti sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging dan tidak terdeteksi adanya satu sel daging sebelum terlihat sel-sel tulang. Dari fase *mudghah* akan menjadi tulang belulang kemudian akan dibungkus oleh daging . dari peralihan *nutfah* ke

'*alaqah* serta dari tulang yang terbungkus daging menuju makhluk lain yang merupakan peralihan yang sangat menakjubkan melebihi ketakjuban yang muncul pada peralihan '*alaqah* ke *mudghah* atau *mudghah* ke tulang hingga terbungkus. Namun terdapat anugerah terhadap makhluk lain yakni dianugerahkan roh ciptaanya yang tidak di anugerahkan kepada siapa pun kendati kepada malaikat.

Dari ketiga tafsir tersebut menjelaskan tentang proses pembentukan manusia dalam QS Surah Al-Mu'minin ayat 13-14 bahwa dari *nutfah* ke *alaqah* kemudian menjadi *mudghah* menjadi tulang belulang yang akan di bungkus oleh daging. Dan memperlihatkan perubahan sifatnya yang akan menjadi manusia setelah di tiupkan roh yang hanya dianugerahkan oleh manusia sebagai ciptaannya.

Dalam *Dalil Al-Anfus baina Al-Qur'an wa Al-Ilm Al-Hadis*, karya Muhammad Izzuddin Taufiq menjelaskan proses penciptaan manusia yakni: Penyebutan rahim dengan istilah *qarar makin* (tempat yang kukuh). Seandainya rahim itu bukan tempat yang kukuh, *nutfah* tentu tidak dapat bergantung padanya dan tidak akan disebut '*alaqah*. Rahim adalah tempat yang kukuh sebelum *nutfah* menempatnya. Ketika *nutfah* masuk ke dalam rahim, ia dapat bergantung pada dinding rahim dan disebut '*alaqah*. Kata *qarar* dalam ayat tersebut menunjukkan kestabilan (*istiqrar*) bagi *alaqah*, sedangkan kata *makin* (*kukuh*) menunjukkan adanya perlindungan (*himayah*). Untuk mencapai *istiqrar* itu diperlukan dinding bagian dari rahim sedangkan untuk mencapai *himayah* diperlukan posisi rahim secara umum di dalam tubuh perempuan. Istilah tersebut digabungkan dari berbagai faktor anatomi, fisiologi, fisik maupun kimia hingga menjadi rahim sebagai tempat yang kukuh (Taufiq, Muhammad Izzuddin, 2006:24-26).

Dua ayat diatas menunjukkan dua tanda kebesaran tuhan dalam rahim. Pertama, kemantapan dan kekukuhan rahim pada tempatnya. Kedua, kemampuannya untuk tumbuh dan meluas. Seandainya rahim tidak memiliki kedua tersebut kemungkinan dinding rahim akan robek atau tidak mampu berkontraksi saat persalinan.

Dalam *Dalil Al-Anfus baina Al-Qur'an wa Al-Ilm Al-Hadis*, karya Muhammad Izzuddin Taufiq, Menurut Ibnu Jauzi dalam *Luqath Al-Manafi'* menyatakan bila air mani masuk kedalam rahim, ia akan menjadi buih selama enam atau tujuh hari. Selama itu air mani tidak mendapat bantuan dari rahim, tetapi setelah itu di bantu oleh rahim. Terdapat temuan bahwa setelah dibuahi menampakkan perilaku baru yakni morula blastula (ovum yang dibuahi beserta sel-selnya yang membelah) sampai ke dalam rahim, perilaku ovum berubah. Salah satu perubahan tersebut blastula berusaha menggantung pada selaput rahim dengan cara meleburkan sel-selnya untuk membuka lubang kecil, tempat untuk menggantung dan menempel. Sel-sel ini yang akan menjadi jonjot-jonjot yang nantinya akan menjadi inti plasenta pertama.

Kemudian *'alaqah* masuk ke dalam selaput rahim hingga bercampur dan menyatu dengan sempurna, seolah-olah berada dalam sebuah roti yang seluruh sisinya dikelilingi dengan selaput rahim yang ketebalan selalu bertambah, terutama tempat *'alaqah* berada. lalu terbentuklah aliran darah diantara *'alaqah* dan rahim yang membuatnya tumbuh berkembang. Ketika ovum telah stabil melaksanakan tugasnya maka dimulailah tugas kedua bagi sel-sel sekunder untuk melaksanakan implantasinya (pelekatan embrio pada dinding rahim) pada trofoblas (bagian dari plasenta) dengan melepaskan hormone HCG (*Human Chorionic Gonadotrohin*) yang

secara berkelanjutan akan memberi perintah pada ovum tepatnya *corpus luteum* untuk terus menerus melepaskan hormone progesterone. Pelepasan hormone berkelanjutan sangat penting untuk untuk membuat selaput rahim saling merekat. Sehingga proses '*alaqah* tidak sia-sia dan dua tugas sel-sel sekunder '*alaqah* telah dilakukan. Dengan demikian fase '*alaqah* mempersiapkan diri ke fase *mudhgah* (Taufiq, Muhammad Izzuddin,2006: 63-65).

Mudhgah adalah sepotong daging tempat pembentukan janin. Pada fase ini akan terlihat permulaan munculnya anggota-anggota tubuh terpenting hingga fase pertumbuhan dasar berhenti dengan kesempurnaan plasenta,trofoblas dan sel-sel yang menembus dinding rahim. Pada minggu kelima tampak pertumbuhan tulang dan pertumbuhannya. Minggu keenam alat indra sudah ada dan jantung sudah mulai memompa darah dengan kuat ke tubuh janin dan terdapat aliran darah yang berhubungan dengan plasenta. Fase tersebut berakhir di minggu ketujuh dan untuk pertama kalinya darah mengalir dari tubuh ibu ke janin melalui plasenta. Pada minggu kedelapan akan disesuaikan dengan waktu Al-Qur'an. Yang berarti dari fase minggu keempat sampai bulan keempat, hal tersebut berkaitan dengan peniupan roh dan telah disepakati bahwa terdapat fase-fase sebelumnya (Taufiq, Muhammad Izzuddin,2006:69-70).

Dari penjelasan penciptaan manusia dari fase *nuthfah*, '*alaqah* dan *Mudhgah* hingga peniupan roh. Sesuai dengan teori sebelum menjadi manusia berasal air mani (ovum dan sperma) fase tersebut yakni fase *nuthfah*, *nuthfah* tersebut akan berimplantasi pada rahim. Dalam pembentukan dan implantasi plasenta pada rahim dijelaskan tentang kekakuan dan kestabilan rahim, apabila rahim tidak memiliki hal tersebut maka dalam proses persalinan rahim tidak berkontraksi.

Dalam kitab shahih Bukhari diriwayatkan dari Abdullah r.a.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَ فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيَقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ (١٤٢٦) (زواه البخارى)

Artinya:

Abdullah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w menceritakan kepada kami dan beliau seorang yang sangat lagi dipercaya . Beliau bersabda: “Masing-masing kamu diciptakan dalam perut ibunya empat puluh hari. Lalu menjadikan segumpal darah selama itu pula, menjadikan segumpal daging selama itu pula. Kemudian tuhan mengutus malaikat dan diperintahkan menulis empat kalimat (perintah). Diperintahkan menuliskan amal, rezekinya, ajalnya, dan nasib celaka atau berbahagia. Kemudian ditiupkan ruh kedalamnya. (HR. Shahih Bukhari).

Dalam kitab shahih bukhari diriwayatkan dari Aisyah r.a.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا أَلْتَفَّ وَمَاتَتْ أَوْ خَلَّتْ مِنْهَا الْخَتَأَفَ (١٤٦٨) (زواه البخارى)

Artinya

Dari Aisyah r.a., katanya: Saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda: “ Ruh (jiwa) itu bagai tentara yang berbaris. Mana yang bersesuaian berdampinganlah dia dan mana yang bertentangan berjauhanlah ia” (HR. Shahih Bukhari).

D. Konsep Dasar Asuhan Manajemen Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Menurut IBI (50 Tahun IBI). Manajemen asuhan kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnose kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Menurut Depkes RI. Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Menurut Helen Varney. Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien.

Menurut Varney's (1997), manajemen kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengordinasikan pikiran dan tindakan dengan urutan logis dan menguntungkan, menguraikan perilaku yang diharapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan teori ilmiah, penemuan, keterampilan dalam rangka atau tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang terfokus pada klien (Purwandari, 2008: 76).

Manajemen kebidanan adalah bentuk pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode pemecahan masalah (Nurhayati, dkk., 2013: 139).

2. Tahapan Asuhan Manajemen kebidanan Varney

Langkah-langkah manajemen kebidanan merupakan suatu proses penyelesaian masalah yang menuntut bidan untuk lebih kritis di dalam mengantisipasi masalah. Ada tujuh langkah dalam manajemen kebidanan menurut Varney yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Langkah I : Identifikasi data dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengakajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien secara lengkap (Mangkuji,dkk,2013:5). Data yang dikumpulkan antara lain :

1) Data Subjektif

Data subyektif adalah data yang diperoleh dan hasil bertanya dari pasien, suami atau keluarga.

a) Identitas klien

- (1) Nama digunakan untuk membedakan klien, mengetahui dan mengenal pasien.
- (2) Umur untuk mengetahui adanya faktor resiko
- (3) Suku atau Bangsa untuk mengetahui social budaya ibu yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan.
- (4) Agama untuk mengetahui keyakinan pasien tersebut untuk membimbing atau mengarahkan pasien dalam berdoa.
- (5) Pendidikan untuk mengetahui konseling yang penting dalam pemberian KIE.
- (6) Pekerjaan untuk mengetahui dan mengukur tingkat sosial ekonomi.
- (7) Alamat untuk mengetahui keadaan social,lingkungan dan mempermudah kunjungan rumah bila perlu.

Pada pengumpulan data yakni identintitas pasien, umur merupakan termasuk faktor resiko dari kasus retensio plasenta

b) Keluhan Utama

Keluhan utama ditanyakan untuk mengetahui alasan pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Keluhan yang muncul adalah mengalami perdarahan yang lebih banyak, lemas, pucat dan merasa mules.

c) Riwayat Menstruasi

Umur *menarche*, siklus, lamanya haid, dan adanya *dismenorrhoe*.

d) Riwayat Perkawinan

Untuk mengetahui pasien menikah umur berapa kali menikah, lama menikah dan merupakan istri atau suami yang ke berapa.

e) Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas yang Lalu

Riwayat kehamilan yang lalu meliputi jumlah anak, anak yang lahir hidup, persalinan aterm, persalinan premature, keguguran atau kegagalan kehamilan, persalinan dengan tindakan (*forceps*, vakum atau operasi *seksio sesaria*), riwayat perdarahan pada kehamilan, persalinan atau nifas sebelumnya, kehamilan dengan tekanan darah tinggi, berat badan bayi <2.500 gram atau > 4.000 gram dan masalah-masalah lain yang dialami ibu.

f) Riwayat Kehamilan Sekarang

Menurut Rohani,dkk (2011) data subjektif dari riwayat kehamilan antara lain:

- (1) Haid pertama dan haid terakhir merupakan data dasar yang diperlukan untuk menentukan usia kehamilan, apakah cukup bulan atau prematur.
- (2) Kapan bayi lahir (menurut taksiran ibu) merupakan data dasar untuk menentukan usia kehamilan menurut tafsiran atau perkiraan ibu.
- (3) Tafsiran persalinan.
- (4) Keluhan pada waktu trimester I, II, III.
- (5) 33

(6) Apakah ibu pernah memeriksakan kehamilannya dan dimana ibu memeriksakan kehamilannya. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi masalah potensial yang dapat terjadi pada persalinan ini.

(7) Imunisasi TT, sudah pernah diimunisasi TT atau belum, berapa kali, dimana, teratur atau tidak.

g) Riwayat Keluarga Berencana

Dikaji untuk mengetahui apakah pasien pernah ikut keluarga berencana (KB) dengan kontrasepsi jenis apa, berapa lama, adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi.

h) Riwayat Kesehatan

(1) Riwayat kesehatan sekarang dikaji untuk mengetahui keluhan yang ibu alami saat ini, yang berhubungan dengan kesehatannya.

(2) Riwayat Kesehatan yang Lalu

Dikaji untuk mengetahui apakah pasien pernah menderita suatu penyakit kronis, menular maupun penyakit infeksi, apakah pasien pernah menjalani operasi. Jika pernah jenis operasi apa yang dialami dan kapan operasi tersebut berlangsung.

i) Riwayat Kesehatan Keluarga

Merupakan data mengenai latar belakang kesehatan keluarga yang meliputi anggota keluarga yang mempunyai penyakit tertentu terutama penyakit menular, penyakit yang dapat diturunkan, penyakit kronis dan penyakit menahun, seperti: diabetes melitus, jantung hipertensi, ginjal, asma, TBC, gonorrhoe, AIDS dan kelainan pembekuan darah.

j) Riwayat Psikososial

Untuk mengetahui respon ibu dan keluarga terhadap bayinya. Dapat menanyakan langsung kepada klien mengenai bagaimana perasaannya terhadap kehamilannya.

k) Riwayat Sosial dan Ekonomi

Riwayat sosial dan ekonomi meliputi status perkawinan, respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan ibu, riwayat KB, dukungan keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, gizi yang dikonsumsi dan kebiasaan makan, kebiasaan hidup sehat, merokok dan minuman-minuman keras, mengkonsumsi obat terlarang, beban kerja dan kegiatan sehari-hari, tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan untuk membantu persalinan.

l) Pola Kebiasaan Sehari-hari

- (1) Nutrisi digunakan untuk data nutrisi perlu diketahui pola makan dan minum klien yang meliputi frekuensi, kualitas, porsi makan, jenis makanan yang disukai dan jenis makanan pantangan.
- (2) Eliminasi dapat menggambarkan berapa kali sehari klien BAK dan BAB, warna fesesnya, konsistensi fesesnya dan keluhannya.
- (3) Pola Istirahat untuk mengetahui berapa lama ibu tidur siang dan berapa lama ibu tidur pada malam hari.
- (4) Pola Seksual untuk mengkaji berapa frekuensi yang dilakukan akseptor dalam hubungan seksual.

- (5) Pola Hygiene untuk mengetahui frekuensi mandi, gosok gigi, kebersihan perawatantubuh terutama genetalia berapa kali dalam sehari.
- (6) Aktivitas untuk mengetahui kondisi tubuh yang lemah atau adanya nyeri akibat penyakit-penyakit yang dialaminya.
- (7) Penggunaan Obat-obatan dan Rokok

Dikaji untuk mengetahui apakah ibu perokok dan pemakai obat-obatan atau jamu-jamuan selama hamil atau tidak. Jamu-jamuan dapat menyebabkan perlekatan plasenta semakin kuat sehingga memicu terjadinya retensio plasenta.

2) Data Objektif

(1) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara memeriksa keadaan umum ibu yakni:

- (a) Keadaan Umum untuk mengetahui keadaan umum ibu apakah baik, sedang, atau buruk. Pada Ny''H'' dengan retensio plasenta, keadaan umum ibu sedang.
- (b) Kesadaran untuk mengetahui tingkat kesadaran ibu apakah composmentis, somnolen atau koma. Kesadaran composmentis pada ibu bersalin dengan retensio plasenta.
- (c) Tekanan Darah untuk mengetahui faktor resiko hipertensi dengan dinilai hipertensi dengan satuan mmHg. Batas normalnya tensi adalah 90/60 – 130/90 mmHg.
- (d) Suhu untuk mengetahui suhu badan waktu inpartu tidak melebihi dari 37,2°C, sesudah partus dapat naik 0,5°C dari keadaan normal tetapi tidak melebihi 38°C. Normalnya 36,5°C – 37,5°C.

- (e) Nadi Untuk mengetahui denyut nadi pasien dengan menghitung dalam 1 menit, sedangkan normal denyut nadi dalam 1 menit adalah 60-100 x/ menit.
- (f) Pernapasan untuk mengetahui pernapasan pasien dalam waktu 1 menit. Sedangkan normalnya pernapasan dalam 1 menit adalah 16-24 x/ menit.
- (g) Berat Badan untuk mengetahui adanya kenaikan berat badan selama hamil, penambahan badan rata-rata 0,3-0,5 kg/ minggu, tetapi nilai normal untuk penambahan berat badan selama hamil 9-12 kg.
- (h) Tinggi Badan untuk mengetahui tinggi badan pasien kurang dari 145 cm atau tidak, termasuk resiko tinggi atau tidak.
- (i) LILA untuk mengetahui lingkaran lengan ibu 23,5 cm atau tidak, termasuk resiko tinggi atau tidak.

(2) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik menggunakan empat cara yakni :

(a) Inspeksi

Inspeksi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatannya untuk mendeteksi karakteristik normal atau tanda tertentu dari bagian tubuh atau fungsi tubuh pasien. Inspeksi digunakan untuk mendeteksi bentuk, warna, posisi, ukuran, tumor dan lainnya dari tubuh pasien (Ambarwati dan Sunarsih, 2011:119).

(b) Palpasi

Palpasi adalah suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan perabaan dan penekanan bagian tubuh dengan menggunakan jari atau tangan. Palpasi dapat

digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh, adanya getaran, pergerakan, bentuk, konsisten dan ukuran. Rasa nyeri tekan dan kelainan dari jaringan atau organ tubuh. Dengan kata lain bahwa palpasi merupakan tindakan penengasan dari hasil inspeksi, di samping untuk menemukan yang tidak terlihat (Ambarwati dan Sunarsih, 2011:120).

(c) Perkusi

Perkusi adalah tindakan pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi getaran atau gelombang suara yang dihantarkan ke permukaan tubuh dari bagian tubuh yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan ketukan jari atau tangan pada permukaan tubuh (Ambarwati dan Sunarsih, 2011:121).

(d) Auskultasi

Auskultasi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi yang berbentuk di dalam organ tubuh untuk mendeteksi adanya kelainan dengan cara membandingkan dengan bunyi normal (Ambarwati dan Sunarsih, 2011:122).

(a) Wajah untuk mengetahui apakah oedema atau tidak

(b) Mata untuk mengetahui keadaan *conjunctiva* pucat atau merah muda, warna *sclera* putih atau kuning.

(c) Leher untuk mengetahui ada pembesaran vena jugularis, kelenjar thyroid atau kelenjar getah bening.

(d) Payudara untuk mengetahui keadaan payudara membesar atau tidak, simetris atau tidak, puting susu menonjol atau tidak, ada benjolan atau nyeri tekan atau tidak.

- (e) Abdomen untuk mengetahui terdapat bekas operasi, striae, linea atau tidak serta ukuran, bentuk uterus dan tinggi fundus uterus (TFU).
- (f) Genitalia untuk mengetahui ada atau tidak oedema, varices, dan laserasi.
- (g) Anus untuk mengetahui adanya *haemoroid*
- (h) Ekstremitas untuk mengetahui adanya *oedema*, *varices* dan kelainan atau tidak, reflek patela apabila ada kontraksi berarti refleks otot baik (Kusmiyanti, 2012:155).

(3) Data Pemeriksaan Laboratorium

Data penunjang diperlukan sebagai pendukung diagnosis apabila diperlukan. Misalnya pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan hemoglobin dan hemotokrit.

b. Langkah II: Interpretasi data dasar

Menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan perihai yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan dari hasil pengkajian (Mangkuji, dkk, 2013 : 5).

Dari data dasar yang diperoleh yakni plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, pemeriksaan fisik khususnya abdomen yakni tinggi fundus uteri, penataksanaan manajemen aktif kala III yakni pemberian suntikan oxytocin di paha dan drips pada cairan infus dan penegangan tali pusat terkendali (PTT), faktor resiko, dan perdarahan,. Dengan demikian diagnosis nonmenklatur yakni retensio plasenta.

c. Langkah III :Identifikasi diagnosis atau masalah potensial

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan temuan tersebut, bidan dapat melakukan antisipasi agar diagnosis atau masalah tidak terjadi. Selain itu, bidan harus bersiap-siap apabila diagnosis atau masalah tersebut benar-benar terjadi (Mangkuji,dkk, 2013 : 5).

Masalah potensial yang dapat terjadi akibat retensio plasenta adalah perdarahan penatalaksanaan segera yang dapat dilakukan manual plasenta.

d. Langkah IV: Identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh memerlukan tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi (Mangkuji,dkk, 2013 : 6).

Tindakan segera yang harus dilakukan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta sesuai dengan keadaan umum dan tanda-tanda vital adalah memperbaiki keadaan umum dengan pemasangan infus.

e. Langkah V: Perencanaan asuhan yang menyeluruh

Direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi hal yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi dilihat juga dari apa yang akan diperkirakan terjadi selanjutnya, apakah dibutuhkan konseling dan apakah perlu merujuk klien. Setiap

asuhan yang direncanakan harus disetujui oleh kedua pihak, yakni bidan dan pasien (Mangkuji,dkk, 2013 : 6).

Retensio plasenta membutuhkan penanganan kegawatdaruratan obstetric yakni penatalaksanaan manual plasenta, untuk menghindari perdarahan hebat. Dengan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi obat sebelum dan sesudah penatalaksanaan, persiapan darah untuk transfusi apabila dibutuhkan.

f. Langkah VI: Pelaksanaan

Melaksanakan rencana asuhan yang sudah dibuat pada langkah ke-5 secara aman dan efisien.kegiatan ini bisa dilakukan oleh bidan atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri,bidan tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaanya. Dalam situasi ini, bidan harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain atau dokter. Dengan demikian, bidan harus bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut (Mangkuji,dkk, 2013 : 6).

Perencanaan penatalaksanaan manual plasenta untuk retensio plasenta, dapat dilakukan dengan adanya kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi, dan melakukan transfusi darah apabila diperlukan.

g. Langkah VII: Evaluasi

Melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan, untuk menilai apakah sudah benar-benar terlaksana atau terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak


efektif untuk mengetahui mengapa proses manajemen ini tidak aktif (Manguji,dkk,2013 :6).

Evaluasi yang dapat dilakukan pada retensio plasenta yakni plasenta lahir lengkap,keadaan umum,tanda-tanda vital,infus dan terapi obat,kontraksi, tinggi fundus uteri dan perdarahan.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Dokumentasi adalah catatan tentang interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, dan tim kesehatan tentang hasil pemeriksaan, prosedur tindakan,pengobatan pada pasien, dan respon pasien terhadap semua asuhan yang telah diberikan (Sudarti, Afroh Fauzia, 2010 :38-39).Pendokumentasian yang benar adalah mengenai asuhan yang telah dan akan dilakukan pada seorang pasien, didalamnya tersirat proses berfikir bidan yang sistematis dalam menghadapi langkah-langkah manajemen kebidanan. Menurut Varney, alur berpikir bidan saat merawat klien meliputi tujuh langkah. Pendokumentasian atau catatan asuhan kebidanan dapat diterapkan dengan menggunakan metode SOAP .

Bagan 1.2 Alur proses manajemen kebidanan



Proses manajemen kebidanan



Sumber : Purwandari,2008:84

Dokumentasi asuhan kebidanan



7 Langkah (Varney)	5 langkah (kompetensi bidan)	SOAP NOTES
Data	Data	Subjektif Objektif
Masalah/diagnosis	Assesment /diagnosis	Assesment /diagnosis
Antisipasi kemungkinan masalah/diagnosis lain		
Menetapkan kebutuhan segera untuk konsultasi,kolaborasi		
Perencanaan	Perencanaan	<i>Plan::</i> 1. Konsul 2. Uji diagnostic/lab 3. Rujukan 4. Pendidikan/konseling 5. <i>Follow Up</i>
Implementasi	Implementasi	
Evaluasi	Evaluasi	

Menurut Varney, alur berpikir bidan saat merawat klien meliputi tujuh langkah. dengan tujuan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan bidan melalui proses berpikir sistematis, dokumentasi dibuat dalam bentuk SOAP sebagai berikut :

S: Subjective (data subyektif)

Data subyektif (S) adalah pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah pertama adalah pengkajian data, terutama data yang diperoleh melalui anamnesis, berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis (Sudarti, Afroh Fauzia, 2010 :39).

O: Data Objektif

Data yang berhubungan dengan pengkajian, terutama yang di peroleh dari hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaandiagnostik lain. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat di masukkan dalam data objektif. Data tersebut dapat sebagai bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis (Saminem,2010 :45)

A: Assessment

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi dari data subyektif dan objektif. Sehingga mencakup hal-hal berikut ini diagnosis atau masalah kebidanan, diagnosis atau masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi tindakan mandiri, tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien. *Assessment* merupakan manajemen kebidanan menurut Helen Varneyyang merupakan langkah kedua, ketiga dan keempat (Sudarti, Afroh Fauzia, 2010 :42).

P: Planning

Planning atau perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. *Planning* dalam metode pendokumentasian SOAP merupakan gambaran dari implementasi dan evaluasi yang merupakan langkah kelima, keenam dan ketujuh menurut Helen Varney. Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien. Dalam proses implementasi pasien harus dilibatkan karena jika kondisi pasien berubah, maka analisis, rencana asuhan serta implementasinya kemungkinan besar akan berubah atau harus disesuaikan. Dalam *planning* mencantumkan evaluasi yakni efek tindakan untuk menilai efektifitas asuhan atau hasil tindakan (Sudarti, Afroh Fauzia, 2010 :41-42).

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY "H"
DENGAN RETENSIO PLASENTA DI RS UMUM DAERAH

SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA

TANGGAL 18-19 JULI 2017

No.Register :472XXX
Tanggal Masuk : 18 JULI 2017 PUKUL 13.30 WITA
Tanggal Partus : 18 JULI 2017 PUKUL 11.43 WITA
Tangga Pengkajian : 18 JULI 2017 PUKUL 13.40 WITA
Nama pengkaji :MASNI

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

DATA SUBJEKTIF (S)

A. Identitas Istri / Suami

Nama : NY"H" /TN"A"
Umur : 38 tahun /39 tahun
Nikah : 1x / ±11 tahun
Suku : Gorontalo /Makassar
Agama : Islam /Islam
Pendidikan :SMA /SMA
Pekerjaan :IRT /Security
Alamat : Borong Karamasa

B. Data Biologis/Fisiologis

1. Keluhan Utama

Plasenta tidak lahir 2 jam setelah bayi lahir, perdarahan yang lebih banyak, lemas, pucat dan merasa mules serta sesak.

2. Riwayat keluhan utama

Plasenta tidak lahir 2 jam setelah bayi lahir, plasenta belum lahir setelah melakukan manajemen aktif kala III, pemberian oxytocin ulang setelah 15 menit plasenta belum lahir, karena plasenta tidak lahir setelah setengah jam bayi lahir maka dilakukan tindakan manual plasenta di puskesmas kampili namun plasenta tidak berhasil lahir dan terjadi perdarahan banyak. Sesak dirasakan sejak perjalanan rujukan dari puskesmas kampili ke rumah sakit.

C. Riwayat Reproduksi

1. Menarche : 15 tahun
2. Siklus haid : 28-30 hari
3. Lamanya : 5 hari
4. Dismenorrhoe : tidak nyeri bagian bawah yang dapat mengganggu aktivitas

D. Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas Yang Lalu

Table 1.2

Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas yang lalu

Kehamilan		Persalinan							Nifas	
Gravid	Umur kehamilan	Tahun lahir	Tempat bersalin	Jenis persalinan	Ditolong oleh	BBL	JK	Penyulit	Keadaan anak	ASI
I	Aterm	2006	Rumah	Normal	Bidan	4100g	P	Tidak ada	Hidup	±1 thn
II	Aterm	2008	Rumah	Normal	Bidan	3200g	L	Tidak ada	Hidup	±2 thn
II	Aterm	2014	Polindes	Normal	Bidan	3200g	L	Tidak ada	Hidup	±2 thn
IV	Aterm	2015	Puskesmas	Normal	Bidan	3100g	P	Retensio plasenta	Hidup	±1 thn

E. Riwayat kehamilan sekarang

1. Kehamilan kelima dan tidak pernah keguguran
2. Hari Pertama Haid Terakhir tanggal 22 Oktober 2016
3. Tafsiran Persalinaan tanggal 29 Juli 2017
4. Keluhan selama hamil

Trimester I : tidak ada keluhan yang dialami ibu pada usia kehamilan muda.

Trimester II : mengeluh sering pusing dan mudah lelah

Trimester III : mengeluh sering kencing

1. Pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali dipuskesmas
2. Ibu tidak mendapat imunisasi TT

F. Riwayat persalinan di Puskesmas Kampili tanggal 18 juli 2017

1. Kala I

- a. Pukul 10.30 WITA, Ibu masuk puskesmas kampili dengan nyeri perut tembus belakang disertai pelepasan lender dan darah dengan pembukaan 5 cm.
- b. Lama kala I satu jam
- c. Pukul 11.35 WITA, Pembukaan lengkap.

2. Kala II

- a. Ibu melahirkan tanggal 18 JULI 2017 pukul 11.43 WITA.
- b. Jenis persalinan spontan dan bayi langsung menangis.
- c. Lama kala II 8 menit

3. Kala III

- a. Plasenta belum lahir 2 jam setelah bayi lahir
- b. Ibu sudah mengganti sarung atau underpad 3 kali
- c. Perdarahan di Puskesmas ± 500 cc
- d. Teraba kontraksi uterus lemah
- e. Keadaan umum ibu lemah, tampak wajah pucat dan konjungtiva tampak pucat.
- f. Tanda-tanda vital
 Tekanan darah :90/60 mmHg Nadi :88 x/menit
 Pernafasan :22 x/menit Suhu :36,6⁰C
- g. Terdapat ruptur tingkat II dan telah dijahit dengan tehnik jelujur di puskesmas kampili.
- h. Pukul 12.00 WITA, pemberian suntikan oxytocin ulang 1 ampul secara intramuscular.

- i. Pukul 12.15 WITA, pemberian drips oxytocin 1 ampul dalam 500ml cairan infus ringer laktat.
- j. Pukul 12.25 WITA, dilakukan tindakan manual plasenta, namun plasenta tidak berhasil untuk dilahirkan.
- k. Pukul 12.30 WITA, infus cairan glukosa 5% pertama dengan jumlah tetesan 20 tetes permenit.

G. Riwayat Kesehatan yang Lalu

1. Tidak ada riwayat penyakit hipertensi, diabetes mellitus, jantung dan asma.
2. Tidak ada riwayat penyakit menular seksual.
3. Tidak ada riwayat alergi obat, makanan dan minum serta ketergantungan obat-obatan.
4. Tidak ada riwayat operasi

H. Riwayat Kesehatan Keluarga

1. Tidak ada riwayat keluarga menderita penyakit menurun seperti hipertensi, jantung, ginjal, asma dan diabetes melitus.
2. Tidak ada riwayat keluarga menderita penyakit menular seperti TBC, hepatitis, dan HIV/AIDS.
4. Tidak ada riwayat keluarga menderita penyakit gangguan system organ reproduksi seperti infeksi, kista, tumor dan kanker.

I. Data Psikologis

1. Ibu tampak lemah dan cemas dengan keadaan yang dialami
2. Ibu senang dengan pendampingan suami dan keluarga dalam proses persalinan rujukan.

J. Riwayat KB

Pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan selama 6 bulan sejak kelahiran anak ke empat,berhenti karena peningkatan berat badan dan haid tidak teratur.

K. Data Spiritual

1. Suami dan keluarga bersyukur atas kelahiran anak kelimanya dan berdoa untuk keadaan istrinya.
2. Ibu berdoa dalam menghadapi keadaannya saat ini.
3. Dukungan support dari keluarga agar ibu tetap tenang dan tidak cemas dengan keadaannya.

L. Pola Kebiasaan Sehari-hari

1. Nutrisi

Makan 3x sehari, 1porasi terdiri dari nasi,sayur dan lauk pauk dan tidak ada makanan pantangan. Minum 8 gelas perhari dengan minum sedikit demi sedikit.

2. Eliminasi

Buang Air Kecil (BAK) sering dan BAB satu kali sehari di pagi hari dan tidak terdapat keluhan.

3. Istirahat

Tidur siang 1-2 jam dan malam hari tidur 6-8 jam selama hamil.

4. Personal hygiene

Mandi 2x sehari pagi dan sore hari, gosok gigi pagi hari dan sebelum tidur dan mengganti pakaian setelah mandi serta pakaian dalam atau merasa tidak nyaman dengan pakaian yang digunakan.

5. Aktivitas

Beraktivitas seperti biasanya seperti sebelum hamil dan mengurangi pekerjaan rumah yang berat selama hamil seperti mengangkat cucian.

6. Penggunaan Obat-obat dan Rokok

Tidak mengkonsumsi obat-obatan apabila tidak dari resep dokter, ibu tidak merokok, kecuali suami perokok aktif.

DATA OBJEKTIF

A. Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan umum lemah
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 80/60 mmHg Nadi : 88x/menit

Pernafasan : 24x/menit Suhu : 36,8⁰C

4. Berat badan sebelum hamil : 50 kg
5. Berat badan saat sekarang : 62 kg
6. Tinggi badan : 155 cm
7. LILA : 25,5 cm

B. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah

Tampak wajah pucat dan tidak ada oedema pada wajah

b. Mata

Konjungtiva tampak pucat dan sklera putih

c. Leher

Tidak ada pembesaran pada vena jugularis, pada kelenjar tyroid dan pada kelenjar limfe.

d. Payudara

Tampak pembesaran akibat ASI, kedua puting menonjol,hiperpigmentasi areola mammae,tidak nyeri tekan, tidak ada benjolan atau massa dan terdapat pengeluaran pada kedua kolostrum payudara.

e. Abdomen

Tidak ada bekas operasi,tampak linea nigra,striae albican dan kontraksi uterus teraba lemah dan TFU 1 jari atas pusat dan kandung kemih penuh.

f. Genetalia

Tidak ada kelainan dan tampak pengeluaran darah,tampak tali pusat terjulur dan masih terjepit klem,tampak ruptur tingkat II dan penjahitan tehnik jelujur .

g. Anus

Tidak ada *hemoroid*

h. Ekstremitas

Tidak ada varises pada betis dan tidak tampak oedema pada tungkai atas dan bawah.

C. Pemeriksaan Penunjang

1. Hb : 6,4 g%
2. HbSAg : Negatif

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Retensio plasenta dengan perdarahan postpartum dan Anemia Berat

A. Retensio Plasenta

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Plasenta belum lahir setelah 2 jam bayi lahir
2. Terdapat riwayat retensio plasenta
3. Usia ibu termasuk faktor resiko
4. Telah melahirkan lebih dari dua kali atau grandemultipara
5. Ibu sudah ganti underpad 3x di puskesmas
6. Ibu sudah diberikan tindakan pengeluaran plasenta secara manual di puskesmas tetapi gagal.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan ibu lemah
2. Tanda-tanda vital
Tekanan darah : 80/60mmHg Nadi: 88x/menit
Pernafasan : 24x/menit Suhu: 36,8°C
3. Keadaran composmentis
4. Ibu melahirkan di puskesmas tanggal 18 juli 2017 pukul 11.43 WITA
5. Plasenta belum lahir 2 jam setelah bayi lahir
6. Tampak tali pusat pada vulva disertai pengeluaran darah ±200cc.
7. Tinggi fundus uteri 1 jari atas pusat, kontraksi uterus lemah
8. Plasenta terlepas sebagian sehingga terjadi perdarahan

Analisa dan Interpretasi Data

Retensio plasenta adalah plasenta yang tertinggal dalam uterus setengah jam setelah anak lahir. Plasenta yang sukar dilepas dengan manajemen aktif kala III dapat disebabkan oleh adhesi yang kuat antara plasenta dan uterus (Saifuddin,2014:526). Faktor resiko pada ibu yang mengakibatkan plasenta tertahan atau tidak lahir setelah 30 menit setelah bayi lahir yakni riwayat retensio plasenta,usia diatas 35 tahun dan grandemultipara (Akinola,dkk:2013:280). Dengan demikian, Plasenta yang belum lepas tidak akan mengakibatkan perdarahan tetapi bila sebagian plasenta telah terlepas maka akan terjadi perdarahan,hal ini mengindikasikan untuk segera mengeluarkannya dengan tindakan manual plasenta.

B. Perdarahan Postpartum

DATA SUBJEKTIF

1. Jumlah darah yang keluar dari jalan lahir banyak
2. Merasa lemas
3. Telah mengganti sarung atau underpad di puskesmas kampili sebanyak 3 kali dan 1 kali setelah sampai di rumah sakit.

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Tanda-tanda vital

Tekanan darah	: 80/60mmHg	Nadi: 88x/menit
Pernafasan	: 24x/menit	Suhu: 36,8°C

3. Kesadaran composmentis
4. Terdapat ruptur tingkat II dan penjahitan jelujur
5. Perdarahan di puskesmas kampili \pm 500cc
6. Perdarahan dirumah sakit \pm 200cc

Analisa dan Interpretasi Data

Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang melebihi 500ml setelah bayi lahir. Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang masih berasal dari tempat implantasi plasenta, retensio plasenta, sisa plasenta, atonia uteri robekan pada jalan lahir dan jaringan sekitarnya. Pada praktisnya tidak perlu mengukur jumlah perdarahan hingga sebanyak itu sebab menghentikan perdarahan lebih dini akan memberikan prognosis lebih baik. Pada umumnya jika perdarahan yang lebih dari normal dan menyebabkan perubahan tanda-tanda vital, sehingga penanganan segera harus dilakukan (Prawirohardjo, 2014:523).

C. Anemia Berat

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengeluh pusing
2. Pandangan berkunang-kunang
3. Merasa lemas

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu tampak lemah
2. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 80/60 mmHg Nadi : 88x/menit

Pernafasan :24x/menit Suhu :36,8°C

3. Kesadaran composmentis
4. Wajah tampak pucat dan konjungtiva tampak pucat
5. Kontraksi uterus lemah
6. Plasenta terlepas sebagian sehingga terjadi perdarahan
7. Pengeluaran darah dirumah sakit ± 200 cc.
8. Hasil pemeriksaan penunjang (laboratorium)
Hb : 6,4g%

Analisa dan Interpretasi Data

Anemia pada ibu bersalin dapat menyebabkan kontraksi serat-serat *myometrium* terutama yang berada di sekitar pembuluh darah yang mensuplai darah pada tempat perlekatan *plasenta* menjadi lemah sehingga memperbesar resiko terjadinya *retensio plasenta* karena *myometrium* tidak dapat berkontraksi. Ibu dengan anemia dapat menimbulkan gangguan pada kala uri yang diikuti *retensio plasenta* dan perdarahan postpartum (Wiknjosastro, 2007).

LANGKAH III : IDENTIFKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah Potensial: Syok *Hemoragik* atau Syok *Hipovolemik*

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Plasenta belum lahir ± 2 jam setelah bayi lahir
2. Merasa lemah

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum tampak lemah

2. Tanda-tanda vital

Tekanan darah	: 80/60 mmHg	Nadi	:88x/menit
Pernafasan	:24x/menit	Suhu	:36,8 ⁰ C

3. Kesadaran composmentis

4. Konjungtiva tampak pucat

5. Hb 6,4%

6. Tinggi fundus uteri 1 jari di atas pusat

7. Kontraksi uterus lemah

8. Pengeluaran darah dari jalan lahir di rumah sakit \pm 200cc

Analisa dan Interpretasi Data

Perdarahan *postpartum* yang dapat bersifat banyak, bergumpal-gumpal atau terus merembes sedikit demi sedikit tanpa henti hingga menyebabkan syok. Syok merupakan suatu keadaan disebabkan gangguan sirkulasi darah ke dalam jaringan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan hingga tidak mampu mengeluarkan hasil metabolisme. Penyebab terjadinya syok dalam kebidanan yang dominan yakni perdarahan, gejala dari syok umumnya yakni tekanan darah menurun, nadi cepat dan lemah, keringat dingin, sianosis jari-jari, sesak napas, penglihatan kabur, gelisah dan akhirnya oliguria atau anuria (Prawirohardjo, 2014:401).

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tanggal 18 juli 2017 pukul 13.30 WITA

1. Pukul 13.30 WITA, penatalaksanaan pemasangan oksigen dengan pemberian oksigen sebanyak 5 liter, karena ibu mengalami sesak, sesak terjadi ketika

rendahnya pasokan oksigen yang menstimulasi otak untuk meningkatkan laju pernapasan agar kadar oksigen kembali normal.

2. Pukul 13.35 WITA, penatalaksanaan pemasangan infus tangan kiri dengan cairan glukosa 5% dengan 20tetes permenit.
3. Pukul 13.45 WITA, penatalaksanaan pemasangan infus dengan cairan Ringer Laktat (RL).
4. Pukul 13.50 WITA, penatalaksanaan drips $\frac{1}{2}$ oxytosin dalam 500 ml larutan RL (1 botol) dengan jumlah tetesan 20tpm dipertahankan.
5. Pukul 14.00 WITA, penatalaksanaan manual plasenta
 - a. Pasang sarung tangan panjang DTT
 - b. Pastikan kandung kemih dalam keadaan kosong
 - c. Jepit tali pusat dengan klem pada jarak 5-10 cm dari vulva, tegangkan dengan satu tangan sejajar lantai.
 - d. Secara obstetric masukkan tangan lainnya (punggung tangan menghadap ke bawah) ke dalam vagina dengan menelusuri sisi bawah tali pusat.
 - e. Setelah mencapai ujung serviks, minta asisten atau penolong lain untuk memegang klem tali pusat kemudian pindahkan tangan luar untuk menahan fundus uteri.
 - f. Sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan dalam hingga ke kavum uteri sehingga mencapai tempat implantasi plasenta.
 - g. Bentangkan tangan obstetric menjadi datar seperti posisi jari-jari merapat.
 - h. Menentukan implantasi plasenta, temukan tepi plasenta yang paling bawah. Bila plasenta berimplantasi dikorpus belakang, tali pusat tetap di sebelah atas dan sisipkan ujung-ujung jari tangan diantara plasenta dan dinding uterus dimana

punggung tangan menghadap kebawah. Bila korpus depan maka pindahkan tangan ke sebelah atas tali pusat dan sisipkan ujung-ujung jari-jari tangan diantara plasenta dan dinding uteri serta punggung tangan menghadap ke atas.

- i. Setelah ujung-ujung jari masuk diantara plasenta dan dinding uteri maka perluas pelepasan plasenta dengan jalan menggeser tangan ke kanan dan kiri sambil digeserkan ke atas (cranial ibu) hingga semua perlekatan plasenta terlepas dari dinding uteri.
 - j. Sementara satu tangan masih di dalam kavum uteri, lakukan eksplorasi untuk menilai tidak ada sisa plasenta yang tertinggal.
 - k. Pindahkan tangan luar dari fundus ke supra simfisis (tahan segmen bawah uteri) kemudian instruksikan asisten atau penolong untuk menarik tali pusat sambil tangan dalam membawa plasenta keluar.
 - l. Lakukan penekanan (dengan tangan yang menahan suprasimfisi) uteri kearah dorso-kranial setelah plasenta dilahirkan dan tempatkan plasenta di dalam wadah yang telah di sediakan.
 - m. Dekontaminasi sarung tangan (sebelum dilepas) dan peralatan lain yang digunakan.
 - n. Lepaskan dan rendam sarung tangan dan peralatan lainnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
 - o. Cuci tangan dengan prinsip 6 langkah cuci tangan dibawah air mengalir dengan sabun, kemudian keringkan dengan handuk bersih.
6. Pukul 14.05 WITA, plasenta lahir lengkap secara manual, kesan lengkap dengan jumlah kotiledon dan selaput amnion dan karion. Kontraksi uteri

baik, perineum tampak ruptur perineum tingkat II telah dijahit dengan teknik jelujur dan perdarahan $\pm 150\text{cc}$.

LANGKAH V : RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Diagnosa	:Retensio plasenta	
Masalah actual	:perdarahan postpartum dan Anemia berat	
Masalah potensial	: syok <i>hemoragik</i> atau <i>hipovolemik</i>	
Tujuan	: Plasenta lahir lengkap	
Kriteria	Perdarahan postpartum dapat teratasi	
	Anemia berat dapat teratasi	
	Syok <i>hemoragik</i> dan <i>hipovolemik</i> tidak terjadi	
	: Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap	
	Perdarahan berhenti	
	Anemia teratasi	
Tanda-tanda vital	Syok <i>hemoragik</i> dan <i>hipovolemik</i> tidak terjadi	
	Keadaan umum ibu baik	
	Tekanan darah	systole : 90-130 mmHg
		Diastole : 60-90 mmHg
Nadi	:60-100 x/menit	
Pernafasan	:16-24 x/menit	

Suhu : 36,5⁰C-37,5⁰C

Kontraksi Uterus

Kontrol Hb

Rencana Tindakan

1. Jelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan
 Rasional : Dengan memberi penjelasan pada ibu tentang keadaan dan tindakan yang akan dilakukan, ibu dan keluarga akan mengerti dan bekerjasama untuk tindakan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.
2. Melakukan *inform consent* untuk tindakan yang akan dilakukan
 Rasional : untuk mengetahui bahwa pasien setuju atas tindakan yang akan dilakukan tenaga kesehatan, sehingga dapat bekerjasama dalam pelaksanaannya dan menerima segala hasil dari tindakan tersebut.
3. Mengajarkan pada ibu, suami atau keluarga untuk melakukan masase fundus uteri.
 Rasional : Untuk merangsang uterus agar berkontraksi dengan baik
4. Observasi jumlah tetesan infus RL dengan ½ oxytocin
 Rasional : Untuk mengetahui jumlah cairan yang masuk kedalam tubuh dengan tujuan agar uterus berkontraksi dengan baik.
5. Kosongkan kandung kemih
 Rasional : Membantu memperlancar proses pengeluaran plasenta dan kontraksi uterus.
6. Observasi kontraksi uterus, Tinggi Fundus Uteri (TFU), perdarahan dan pengeluaran lochia

Rasional : Dengan melakukan pemantauan kontraksi uteri, TFU, perdarahan dan Lochia dapat mengetahui proses involusi uteri berlangsung normal dan untuk mengetahui tindakan selanjutnya atau apabila ada komplikasi.

7. Kolaborasi dokter untuk penatalaksanaan plasenta manual.

Rasional : untuk penatalaksanaan manual plasenta agar plasenta dapat dilahirkan dengan lengkap dan untukantisipasi terjadinya komplikasi.

8. Kolaborasi dengan dokter pemberian antibiotic

Rasional : untuk pemberian dosis yang tepat dalam pencegahan infeksi setelah tindakan manual plasenta.

9. Melakukan skintest sebelum pemberian antibiotik melalui Intravena

Rasional : untuk menguji antibiotik cocok dengan ibu atau tidak, sebelum diberikan secara intravena.

10. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup dan menciptakan suasana yang tenang.

Rasional : memberi kesempatan pada otot dan otak untuk relaksasi setelah proses bersalin untuk pemulihan tenaga dapat berlangsung tenang dan nyaman.

11. Menganjurkan ibu untuk tetap makan dan minum

Rasional : untuk membahantu memulihkan kehilangan cairan dan memulihkan tenaga.

12. Melakukan penyuntikan secara intravena (bolus) dan drips antibiotic

Rasional : untuk mencegah terjadinya Infeksi

13. Pemantauan kala IV, pemantauan dilakukan 15 menit jam pertama dan 30 menit pada jam ke 2 setelah plasenta lahir lengkap.

Rasional : untuk mencegah terjadinya resiko perdarahan pascapersalinan.

14. Memberikan transfusi darah 2 kantong Whole Blood (WB) dengan golongan darah B.

Rasional : untuk mengatasi masalah anemia yang terjadi akibat dari kehilangan darah saat proses persalinan.

15. Observasi Hb setelah transfusi darah, 10 jam setelah transfuse karena pasien ingin pulang.

Rasional : mengetahui perubahan yang terjadi terhadap kadar hemoglobin dalam darah.

16. Memberikan *Health Education* tentang nutrisi, istirahat, *personal hygiene*, Asi eksklusif dan rencana KB.

Rasional : untuk memberikan informasi tentang kebutuhan ibu untuk pemulihan kesehatan, mencegah terjadinya infeksi, untuk pemenuhan gizi dan kesehatan bayi, membantu proses involusio uterus dan menjaga jarak kehamilan atau umur anak apabila masih ingin memiliki anak.

LANGKAH VI: TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

1. Jelaskan pada pasien keadaan dan tindakan yang akan dilakukan, ibu mengerti dengan keadaannya dan bersedia dengan tindakan yang akan dilakukan.

2. Mengajarkan pada ibu, suami atau keluarga untuk melakukan masase fundus uteri, suami bersedia melakukan masase setelah plasenta lahir karena ibu masih tampak lemah.
3. Observasi jumlah tetesan infus RL tanggal 18 juli 2017 pukul 14.20 WITA, jumlah tetesan 28tpm
4. Kosongkan kandung kemih, telah dilakukan kateter untuk megosongkan kandung kemih dan jumlah.
5. Observasi kontraksi uterus, TFU, perdarahan dan pengeluaran lochia, kontraksi uterus teraba keras dan bulat, TFU 1jari bawah pusat, perdarahan ± 150 cc dan pengeluaran lochia rubra.
6. Kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan untuk tindakan penatalaksanaan manual plasenta, kolaborasi via telepon untuk penatalaksanaan manual plasenta dilakukan oleh bidan yang memiliki kompetensi dalam melakukan manual plasenta.
7. Kolaborasi dengan dokter pemberian antibiotik, kolaborasi via telepon untuk pemberian antibiotic setelah tindakan manual plasenta yakni cefotaxime 500 mg/8jam secara IV dan metronidazole 500mg/12jam secara IV. Pemberian antibiotik untuk pencegahan infeksi dari tindakan pengeluaran plasenta secara manual, pemberian secara intravena untuk mempercepat reaksi dari antibiotik.
8. Melakukan skintest sebelum pemberian antibiotik melalui Intravena, skintest cefotaxime telah dilakukan dan tampak tidak terjadi tanda-tanda alergi.
9. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup dan ciptakan suasana yang tenang, ibu beristirahat dengan tetap berbaring.

10. Menganjurkan ibu untuk tetap makan dan minum,ibu minum dan makan dibantu oleh suami.
11. Melakukan penyuntikan antibiotic secara intravena, pukul 15.00 WITA penyuntikan cefotaxime 500 mg/8jam secara bolus dan pukul 15.20 WITA drips metronidazone 500 mg/8jam.
12. Pemantauan kala IV, pemantauan dilakukan 15 menit jam pertama dan 30 menit pada jam ke 2 setelah plasenta lahir lengkap.

Pemantauan Kala IV

Tabel 1.3

Jam ke	Waktu (WITA)	TD (mmHg)	N (x/menit)	S °C	TFU	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
I	14.20	90/70	88x/menit	36,9°C	1jrbpst	Baik	Kosong	±50cc
	14.35		88x/menit		1jrbpst	Baik	Kosong	±50cc
	14.50		84x/menit		1jrbpst	Baik	Kosong	±35cc
	15.05		84x/menit		1jrbpst	Baik	Kosong	±35cc
II	15.35	90/70	80x/menit	36,6°C	1jrbpst	Baik	Kosong	±15cc
	16.05		80x/menit		1jrbpst	Baik	Kosong	±15cc

13. Pukul 16.00 WITA, memberikan transfuse *whole blood* 2 unit (1 unit 500cc),1 unit telah terpasang, keterlambatan transfuse karena persediaan darah tidak tersedia dirumah sakit.

14. Tanggal 19 juli 2017 pukul 10.00 WITA, Observasi Hb setelah transfuse darah, kadar Hb dalam darah 8,9g% .
15. Memberikan *Healthh Education* tentang nutrisi, istirahat, *personal hygiene*, Asi eksklusif dan rencana KB, ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi,beristirahat yang cukup,menjaga *personal hygiene*, berusaha menyusui bayi, bayi tampak mengisap dengan baik, ibu berencana ber KB jangka panjang,namun ingin membicarakan dengan suami terlebih dahulu.

LANGKAH VII: EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 18-19 Juli 2017 Pukul 16.05 -11.45 WITA

1. Keadaan umum ibu baik
2. Tanda-tanda vital
 - a. Hari Pertama

Tekanan darah	:90/70 mmHg	Nadi	:80 x/menit
Pernafasan	:22 x/menit	Suhu	:36,6 ⁰ C
 - b. Hari Kedua

Tekanan Darah	: 100/80 mmHg	Nadi	: 80x/menit
Pernafasan	: 20x/menit	Suhu	: 36,6 ⁰ C
3. Pukul 14.05 WITA, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap .
4. Kontraksi uterus baik,teraba bundar dan keras dan kandung kemih kosong.
5. Tanggal 18 juli 2017, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat.
6. Tanggal 19 juli 2017, tinggi fundus 2 jari bawah pusat.
7. Perdarahan berhenti.

8. Tanggal 19 juli 2017 pukul 10.00 WITA, kontrol kadar Hb dalam darah yakni Hb 8,9g%.
9. Tidak Terjadi Syok *Hemoragik* atau Syok *Hipovolemik*.
10. Anemia teratasi dengan peningkatan kadar Hb dalam darah.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
PADA NY "H" DENGAN RETENSIO PLASENTA DIRS UMUM DAERAH**

SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA

TANGGAL 18 JULI 2017

No.Register :472XXX
 Tanggal Masuk : 18 JULI 2017 PUKUL 13.30 WITA
 Tanggal Partus : 18 JULI 2017 PUKUL 11.43 WITA
 Tanggal Pengkajian : 18 JULI 2017 PUKUL 13.40 WITA
 Nama pengkaji :MASNI

Identitas Istri / Suami

Nama : NY"H" / TN"A"
 Umur : 38 tahun / 39 tahun
 Nikah : 1x / ±11 tahun
 Suku : Gorontalo / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan :SMA / SMA
 Pekerjaan :IRT / Security
 Alamat : Borong Karamasa

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Plasenta tidak lahir 2 jam setelah bayi lahir,perdarahan yang lebih banyak,lemas,pucat dan merasa mules serta merasa sesak.
2. Melahirkan di Puskesmas Kampili tanggal 18 juli 2015 pukul 11.43 WITA dengan spontan, segera menangis, BBL:4000gram, PBL 50 cm dan jenis kelamin laki-laki.

3. Banyak darah yang keluar dari jalan lahir dipuskesmas.
4. Perdarahan ± 500 cc di Puskesmas Kampili
5. Sudah mengganti sarung atau underpad 3 kali.
6. Terdapat ruptur tingkat II dan telah dijahit dengan tehnik jelujur di puskesmas kampili.
7. Pukul 12.00 WITA, pemberian suntikan oxytocin ulang 1 ampul secara intramuscular.
8. Pukul 12.15 WITA, pemberian drips oxytocin 1 ampul dalam 500ml cairan infus ringer laktat.
9. Pukul 12.25 WITA, dilakukan tindakan manual plasenta, namun plasenta tidak berhasil untuk dilahirkan.
10. Pukul 12.30 WITA, infus cairan glukosa 5% pertama dengan jumlah tetesan 20 tetes permenit.
11. Pukul 12.25 WITA, Tindakan manual plasenta telah dilakukan di puskesmas tetapi plasenta tidak berhasil lahir.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum lemah
2. Kesadaran Composmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 80/60 mmHg Nadi : 88x/menit

Pernafasan : 24x/menit Suhu : 36,8⁰C

4. Kesadaran composmentis
5. Berat badan sebelum hamil : 50 kg
6. Berat badan saat sekarang : 62 kg

7. Tinggi badan : 155 cm

8. LILA : 25,5 cm

9. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah

Tampak wajah pucat dan tidak ada oedema pada wajah

b. Mata

Konjungtiva tampak pucat dan sklera putih

c. Leher

Tidak ada pembesaran pada vena jugularis, pada kelenjar tyroid dan pada kelenjar limfe.

d. Payudara

Tampak pembesaran akibat ASI, kedua puting menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak nyeri tekan, tidak ada benjolan atau massa dan terdapat pengeluaran pada kedua kolostrum payudara.

e. Abdomen

Tidak ada bekas operasi, tampak linea nigra, striae albican dan kontraksi uterus teraba lembek dan TFU 1 jari atas pusat dan kandung kemih penuh.

f. Genetalia

Tidak ada kelainan dan tampak pengeluaran darah, tampak tali pusat terjulur dan masih terjepit klem, tampak ruptur tingkat II dan penjahitan teknik jelujur .

g. Anus

Tidak ada *hemoroid*

h. Ekstremitas

Tidak ada varises pada betis dan tidak tampak oedema pada tungkai atas dan bawah

10. Pemeriksaan penunjang

Hb : 6,4gr%

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : Retensio Plasenta

Masalah Aktual : Perdarahan postpartum dan Anemia berat

Masalah potensial : Syok *hemoragik* atau *hipovolemik*

PLANNING (P)

Tanggal 18 juli 2017 pukul 13.35 WITA

1. Jelaskan pada pasien keadaan dan tindakan yang akan dilakukan, ibu mengerti dengan keadaannya dan bersedia dengan tindakan yang akan dilakukan.
2. Mengajarkan pada ibu, suami atau keluarga untuk melakukan masase fundus uteri, suami bersedia melakukan masase setelah plasenta lahir karena ibu masih tampak lemah.
3. Observasi jumlah tetesan infus RL tanggal 18 juli 2017 pukul 14.20 WITA, jumlah tetesan 28tpm
4. Kosongkan kandung kemih, telah dilakukan kateter untuk megosongkan kandung kemih dan jumlah

5. Observasi kontraksi uterus, TFU, perdarahan dan pengeluaran lochia, kontraksi uterus teraba keras dan bulat, TFU 1 jari bawah pusat, perdarahan ± 150 cc dan pengeluaran lochia rubra.
6. Kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk tindakan penatalaksanaan manual, kolaborasi via telepon untuk penatalaksanaan manual plasenta dilakukan oleh bidan yang memiliki kompetensi dalam melakukan manual plasenta.
7. Kolaborasi dengan dokter pemberian antibiotik, kolaborasi via telepon untuk pemberian antibiotic setelah tindakan manual plasenta yakni cefotaxine 500mg/8jam secara IV dan metronidazole 500mg/12jam secara IV.
8. Melakukan skintest sebelum pemberian antibiotik melalui Intravena, skintest cefotaxine telah dilakukan dan tampak tidak terjadi tanda-tanda alergi.
9. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup dan ciptakan suasana yang tenang, ibu beristirahat dengan tetap berbaring.
10. Memberikan Menganjurkan ibu untuk tetap makan dan minum, ibu minum dan makan dibantu oleh suami.
11. Melakukan penyuntikan secara intravena dan drips antibiotik, penyuntikan cefotaxine 500mg/8jam secara intravena tanggal 18 juli 2017 pukul 15.00 WITA dan drips metronidazole 500mg/12 jam tanggal 18 juli 2017 pukul 15.20 WITA.
12. Pemantauan kala IV, pemantauan dilakukan 15 menit jam pertama dan 30 menit pada jam ke 2 setelah plasenta lahir lengkap.

Tabel 1.3
Pemantauan Kala IV

Jam ke	Waktu (WITA)	TD (mmHg)	N (x/menit)	S °C	TFU	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
I	14.20	90/70	88x/menit	36,9 ⁰ C	1jrbpst	Baik	Kosong	±50cc
	14.35		88x/menit		1jrbpst	Baik	Kosong	±50cc
	14.50		84x/menit		1jrbpst	Baik	Kosong	±35cc
	15.05		84x/menit		1jrbpst	Baik	Kosong	±35cc
II	15.35	90/70	80x/menit	36,6 ⁰ C	1jrbpst	Baik	Kosong	±15cc
	16.05		80x/menit		1jrbpst	Baik	Kosong	±15cc

13. Memberikan transfuse darah 2 kantong, bag kantong satu telah terpasang tanggal 18 juli 2017 pukul 16.00 WITA.

14. Observasi Hb setelah transfuse darah, dilakukan setelah transfusi selesai.

15. Memberikan *Health Education* tentang nutrisi, istirahat, *personal hygiene*, Asi dan rencana KB, ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, menjaga *personal hygiene*, berusaha menyusui bayi, bayi tampak mengisap dengan baik, ibu berencana ber KB jangka panjang, namun ingin membicarakan dengan suami terlebih dahulu.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
PADA NY “H” DENGAN RETENSIO PLASENTA DIRS UMUM DAERAH**

SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA

TANGGAL 19 JULI 2017

No.Register :472XXX
 Tanggal Masuk : 18 JULI 2017 PUKUL 13.30 WITA
 Tanggal Partus : 18 JULI 2017 PUKUL 11.43 WITA
 Tanggal Pengkajian : 19 JULI 2017 PUKUL 09.00 WITA
 Nama pengkaji :MASNI

Identitas Istri / Suami

Nama : NY”H” / TN”A”
 Umur : 38 tahun / 39 tahun
 Nikah : 1x / ±11 tahun
 Suku : Gorontalo / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan :SMA / SMA
 Pekerjaan :IRT / Security
 Alamat : Borong Karamasa

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Nyeri perut bagian bawah abdomen
2. Sudah dapat istirahat dengan tidur saat bayi tidur atau sementara menyusui
3. Sudah dapat melakukan mobilisasi dini dengan duduk dan berjalan ke kamar mandi dengan didampingi suami atau keluarga.
4. Sudah menyusui

5. Produksi ASI masih sedikit
6. BAK telah lancar dan belum BAB
7. Tidak merasa pusing dan penglihatan tidak tampak berkunang-kunang
8. Berencana pulang

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Tanda-tanda vital

Tekanan darah	: 100/70 mmHg	Nadi	: 80x/menit
Pernafasan	: 22x/menit	Suhu	: 36,5 ⁰ C
3. Kesadaran composmentis
4. Bayi menyusu dengan baik dan isapan bayi kuat
5. Pemeriksaan Fisik Terfokus
 - a. Wajah

Tidak tampak pucat dan tidak tampak oedema
 - b. Mata

Konjungtiva tampak sedikit pucat dan sklera tampak putih
 - c. Leher

Tidak terdapat pembesaran pada vena jugularis, kelenjar limfe dan pada kelenjar tyroid.
 - d. Payudara

Tampak pembesaran payudara, tidak nyeri tekan, tidak ada benjolan atau massa, kedua puting menonjol, pengeluaran ASI atau kolostrum pada kedua payudara.

e. Abdomen

Tidak ada bekas operasi,tampak linea nigra dan striae albicans,kontraksi uterus teraba keras dan bulat danTFU 2 jrbpst.

f. Genetalia

Tampak pengeluaran lochia rubra,tampak laserasi tingkat II dengan tehnik jelujur,tidak ada oedema,tidak ada varices,tidak ada tanda infeksi,tampak bersh.

g. Anus

Tidak tampak *hemoroid* pada anus.

h. Ekstremitas

Bergerak aktif,tidak ada varices pada betis dan tidak tampak oedema pada tungkai atas dan bawah.

6. Kontrol Hb (post transfusi) tanggal 19 juli 2017 pukul 10.00 WITA dengan hasil 8,9g%.

ASSESSMENT (A)

Post partum hari kedua,anemia ringan dengan nyeri abdomen bagian bawah

PLANNING (P)

Tanggal 19 juli 2017 pukul 09.10 WITA

1. Memberitahu ibu bahwa keadaan ibu baik, nyeri perut bagian bawah dirasakan karena proses involusio uterus yakni uterus berkontraksi agar uterus kembali ke bentuk semula seperti sebelum hamil, dan ibu mengalami anemia ringan yakni kadar hemoglobin dalam darah ibu masih kurang setelah dilakukan transfuse 2 kantong, ibu mengerti dengan keadaan kesehatan saat ini dan tetap berencana pulang.

2. Pukul 09.15 WITA, mengobservasi involusi uteri, kontraksi uterus teraba keras dan bulat, TFU 2jrbpst dan pengeluaran lochia rubra serta perdarahan ± 30 cc .
3. Melakukan pelepasan infus, infus telah dilepas karena ibu berencana pulang
4. Memberikan Health Education tentang:
 - a. Nutrisi yakni mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang seperti makan sayuran daun hijau seperti daun kelor, daun bayam, daun singkong dan sawi serta kangkung. Roti yang dapat memberikan 20 persen zat besi jika dikonsumsi setiap hari dan jagung kaya akan zat besi . Buah-buahan yang dapat memperlancar aliran darah dan menambah jumlah sel darah merah seperti apel, anggur dan melon. Minum susu untuk menambah jumlah sel darah. Menghindari konsumsi teh, kopi dan coklat untuk menghindari zat besi yang telah dikonsumsi larut dan tidak dapat digunakan oleh darah untuk pembentukan kadar Hb dalam darah.
 - b. Istirahat yakni istirahat yang cukup sangat dibutuhkan untuk pemulihan tenaga dan kesehatan, dianjurkan istirahat dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 8 jam, beristirahat ketika bayi sedang menyusu dan tidur.
 - c. Personal hygiene yakni mandi 2x sehari, gosok gigi minimal 2x sehari, keramas minimal 3x seminggu, mengganti pakaian apabila kotor, lembab dan tidak nyaman terutama pakaian dalam, membersihkan daerah genitalia tidak dengan bahan-bahan yang mengandung kimia, membersihkan dengan baik apabila selesai BAK/BAB dengan membersihkan dari depan kebelakang untuk menghindari penyebab infeksi dari anus, mengganti pembalut apabila selesai BAK/BAB. Tujuan dari kebersihan diri tersebut untuk mencegah terjadinya infeksi.

d. ASI Eksklusif

Menganjurkan ibu untuk menyusui secara eksklusif, menyusui dengan memberi ASI eksklusif, dengan pemberian ASI saja, termasuk kolostrum tanpa tambahan apapun sejak dari lahir, dengan kata lain pemberian susu formula, air matang, gula dan madu tidak dibenarkan. Proses ini berlangsung selama 6 bulan, dapat dilanjutkan sampai umur 2 tahun. Manfaat dari ibu menyusui bayi secara eksklusif, dapat membantu kontraksi uterus sehingga tidak terjadi perdarahan karena isapan bayi dapat merangsang saraf yang terdapat di dalam glandula pituitaria posterior menghasilkan hormone oksitosin selain untuk pengeluaran air susu dapat juga untuk kontraksi uterus, proses involusi, mencegah anemia defisiensi zat besi dan dapat digunakan sebagai kontrasepsi apabila ibu menyusui 2 sampai 3 kali dalam setiap jam untuk memberikan fungsi benar-benar efektif. Manfaat bagi bayi yakni mendapatkan antibody alami dan nutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.

e. Rencana KB

Menganjurkan untuk ber-KB karena melihat dari usia ibu dan jumlah anak yang dimiliki. Adapun jenis, indikasi, kontraindikasi, kelebihan, kerugian serta cara penggunaan KB yakni;

1) KB Pil

Obat yang berbentuk pil, tablet atau kapsul yang berisi hormone estrogen dan progesterone untuk mencegah kehamilan dikondumdi secara oral dengan cara menekan sekresi FSH sehingga menghalangi maturase folikel dan ovum. Indikasi penggunaan yakni tiak dalam keadaan hamil dan

kontraindikasi yakni hamil, menderita diabetes mellitus, tumor yang dipengaruhi hormone, mioma uteri, hipertensi, oligomenorea dan amenorea.

Keuntungan dari penggunaan KB Pil, kontrasepsi yang sangat efektif, tidak mengganggu hubungan seksual, dan keluhan dismenorea berkurang. Kerugian dari pemakaian KB Pil yakni mengurangi produksi ASI berkurang, kesuburan kembali agak lambat, memerlukan disiplin waktu dalam pemakaian serta tidak cocok pada ibu lupa. Efek samping merasakan mual, sakit kepala dan rasa tidak nyaman pada payudara, perdarahan secara tiba-tiba diluar masa haid dan peningkatan berat badan.

2) KB Suntik (1 bulan dan 3 bulan)

Kontrasepsi hormonal yang disuntikkan pada lengan atas, paha atau bokong ibu untuk mencegah kehamilan. Indikasi penggunaan yakni menghendaki pemakaian kontrasepsi jangka pendek, akseptor telah memiliki 3 anak, dan nyeri haid hebat. Kontraindikasi yakni hamil atau curiga hamil.

Keuntungan kontrasepsi suntik tidak mempengaruhi produksi ASI untuk suntik 3 bulan, mencegah kehamilan, dapat mengurangi nyeri haid, dan tidak mempengaruhi aktivitas seksual serta dapat dihentikan penggunaan tanpa tindakan medis oleh tenaga kesehatan. Kerugian gangguan siklus haid, merasa mual, sakit kepala, peningkatan berat badan, pemulihan kesuburan terlambat dan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kekeringan pada vagina.

3) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)

Jenis kontrasepsi yang dipasang dibawah kulit untuk mencegah kehamilan dengan cara mengentalkan lender serviks, menekan ovulasi,

mengurangi transportasi sperma. Indikasi usia reproduksi, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi pasca persalinan dan baik untuk penggunaan jangka panjang serta ingin mengatur jarak kehamilan. Kontraindikasi yakni hamil atau dicurigai hamil dan perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.

Keuntungan dari penggunaan kontrasepsi AKBK sangat efektif (kegagalan 0,2-0,1 kehamilan/100 perempuan), daya guna tinggi, jangka panjang (3 tahun), pemulihan kesuburan cepat setelah pencabutan, bebas dari pengaruh estrogen sehingga aman untuk ibu menyusui, mencegah kehamilan tak terencana untuk jangka panjang, dapat dilepas kapan saja. Kekurangan yakni membutuhkan tindakan pembedahan untuk pemasangan dan pencabutan, tidak mencegah penyakit infeksi menular seksual, tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian karena pencabutan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli.

4) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Kontrasepsi yang dipasang didalam rahim dengan kandungan tembaga yang dapat mengganggu mobilitas sperma agar tidak membuahi sel telur dan mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Manfaat dari penggunaan AKBK yakni mencegah kehamilan tak terencana untuk jangka panjang, pilihan perlindungan pencegahan kehamilan selama 3,5 dan 10 tahun, produksi dan kualitas ASI tetap normal serta seketika melindungi dan tidak mengganggu kesuburan dan dapat dilepas kapan saja. Untuk cara pemasangan dilakukan oleh bidan atau tenaga medis

terlatih dan dipasang di dalam rahim, pemasangan yang cepat dan dapat dipasang segera setelah melahirkan.

Kerugian yang secara umum yakni perubahan siklus haid, haid lebih lama dan banyak, perdarahan di antara siklus menstruasi, saat haid tidak terasa nyeri, sedikit nyeri dan perdarahan segera setelah pemasangan AKDR, biasanya menghilang dalam 1-2 hari, tidak dapat digunakan pada pasien dengan IMS atau yang sering berganti pasangan, tidak dapat melepas AKDR sendiri, AKDR mungkin keluar dari uterus dengan sendiri dan tidak mencegah kehamilan ektopik. Komplikasi lain yakni merasakan nyeri 3 sampai 5 hari setelah pemasangan, perdarahan berat pada waktu haid yang dapat berakibat anemia dan perforasi dinding uterus akan tetapi jarang terjadi.

5. Pukul 10.00 WITA, melakukan pemeriksaan Hb kontrol yakni kadar Hb dalam darah 8,9g%.
6. Melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn untuk pemeriksaan keadaan umum ibu sebelum pulang kerumah, keadaan umum ibu baik dan boleh pulang dengan tetap menjaga pola nutrisi dan mengkonsumsi tablet Fe secara teratur untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel, menambah sel darah merah (*hemoglobin*) sehingga daya angkut oksigen mencukupi kebutuhan, akibat kehilangan dari perdarahan yang terjadi pada proses persalin dan untuk mencegah terjadi anemia selama masa nifas atau menyusui.
7. Melakukan kolaborasi dengan dokter dengan pemberian tablet Fe (30 tablet).
8. Pukul 11.00 WITA, melakukan observasi tanda-tanda vital

Tekanan Darah	: 100/80 mmHg	Nadi	: 80x/menit
Pernafasan	: 20x/menit	Suhu	: 36,6 ⁰ C

9. Pukul 11.45 WITA, membantu persiapan ibu untuk pulang kerumah,ibu keluar dari perawatan rumah sakit.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang ketidaksesuaian antara tinjauan teori terhadap tinjauan kasus yang terjadi pada Ny''H'' merupakan pasien rujukan dari puskesmas dengan retensio plasenta. Pembahasan akan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney meliputi pengkajian sampai evaluasi. Pembahasan dilakukan untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah dan kesimpulan dari tinjauan teori dengan tinjauan kasus sehingga dapat digunakan sebagai tindak lanjut dalam penerapan asuhan kebidanan yang efektif dan efisien khususnya pada pasien ibu bersalin dengan retensio plasenta.

Langkah I Identifikasi Data Dasar

Kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien secara lengkap. Data dapat diperoleh dari pasien, suami atau keluarga dan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan serta data penunjang yang berhubungan dengan keadaan pasien (Mangkuji, dkk 2013: 5).

Pengkajian didapatkan data subjektif Ny''H'' dengan keluhan ibu plasenta belum lahir lebih dari 2 jam bayi lahir dan tindakan manual dilakukan setelah manajemen aktif kala III berlangsung selama setengah jam setelah bayi lahir, namun kedua tindakan tidak berhasil melahirkan plasenta. Perjalanan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit merasa sesak. Pengeluaran darah dari jalan lahir yang banyak dan mengganti underpad 3 kali di puskesmas kampili. Data objektif yang ditemukan pada Ny''H'' yakni keadaan umum ibu lemah, kesadaran composmentis, tekanan darah

80/60 mmHg, nadi 88x/menit, suhu 36.8⁰C, pernafasan 24x/menit, kontraksi lemah, pengeluaran darah lewat pervaginam di rumah sakit \pm 200cc, ruptur perineum tingkat II telah dijahit secara jelujur dan tampak dari vulva tali pusat terjelujur dan TFU 1 jari atas pusat. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada Ny'H" pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah, kadar hemoglobin dalam darah 6,4g%.

Hasil pengkajian pada Ny'H" dengan keluhan plasenta belum lahir 2 jam setelah bayi lahir dan pengeluaran darah dalam jumlah banyak dan penurunan tanda-tanda vital merupakan tanda dari terjadinya retensio plasenta dan perdarahan postpartum, hal ini sesuai dengan tinjauan kasus dan tinjauan teori, Retensio plasenta merupakan plasenta yang tidak terpisah dan menimbulkan hemorhage yang tidak disadari dan disadari ketika durasi waktu yang berlalu antara kelahiran bayi dan kelahiran plasenta yang diharapkan. Dalam berbagai ilmu atau tenaga kesehatan khususnya bidan akan menunggu selama setengah jam untuk mengetahui bahwa plasenta tertahan dalam uterus atau belum lepas atau pun terlepas,namun tertahan akibat kontriksi yang terjadi pada ostium uteri (Tando,2013: 90).

Dalam penanganan persalinan kala III dalam tinjauan teori menjelaskan bahwa fase kala III atau proses pengeluaran plasenta dalam persalinan merupakan masa setelah lahirnya bayi dan berlangsung proses pengeluaran plasenta dengan manajemen aktif kala III setelah penyuntikan oksitosin secara intramuskular 1 menit pertama setelah bayi lahir. Perlu diperhatikan bila melakukan penegangan tali pusat terkendali dan plasenta belum lahir selama 15 menit maka lakukan pemberian oksitosin 10 IU dosis kedua,kosongkan kandung kemih bila penuh dan melakukan penanganan tali pusat terkendali ulang. Apabila dalam setengah jam telah terlampaui (tidak di anjurkan mencoba cara lain untuk melahirkan plasenta walaupun tidak

terjadi perdarahan) segera rujuk ke fasilitas kesehatan rujukan, namun bila plasenta belum lahir dan mendadak terjadi perdarahan segera lakukan manual plasenta untuk mengosongkan kavum uteri(Eniyati dan Sholihah,2013:133-135).

Pemberian oksitosin baik secara intramuscular maupun secara intravena, memiliki tujuan untuk membuat uterus berkontraksi dengan kuat dan efektif sehingga dapat membantu pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah (Tando,2013:101). Kelebihan dari cara pemberian, pemberian secara intramuscular dengan tujuan untuk pemberian obat dalam jumlah yang lebih besar, absorbs cepat dibandingkan dengan secara subkutan karena lebih banyak suplai darah di otot tubuh dan jauh dari syaraf sedangkan secara intravena untuk mempercepat reaksi obat, sehingga obat langsung masuk ke system sirkulasi darah pemberian dapat diberikan secara langsung pada vena atau dengan cara pemasangan infus (Kusmiyati,2012:50 dan 56). Pengkajian yang dilakukan pada pasien rujukan dari puskesmas, tidak terdapat adanya kesenjangan antara tinjauan kasus dan tinjauan teori.

Langkah II Interpretasi Data

Menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan dari hasil pengkajian (Manguji,dkk 2013: 5).

Pada Ny”H” didapatkan diagnosa dengan retensio plasenta. Sedangkan masalah actual yang muncul yakni perdarahan *postpartum* dan Anemia Berat. Perdarahan *postpartum* terjadi karena plasenta tidak segera lahir setelah setengah jam bayi lahir dan telah dilakukan plasenta manual dipuskesmas pada tanggal 18 juli 2017

pukul 12.25 WITA tapi tidak berhasil mengakibatkan perdarahan akibat plasenta terlepas sebagian dari tempat implantasi dan laserasi jalan lahir yang menyebabkan perdarahan aktif. Perdarahan post partum dapat mengakibatkan ibu mengalami kehilangan darah, kehilangan darah dalam jumlah banyak dapat menurunkan tanda-tanda vital yang mengakibatkan anemia dan syok. Kebutuhan untuk mengatasi masalah tersebut yakni informasi mengenai keadaan dan tindakan yang akan dilakukan seperti manual plasenta, dukungan psikologis pada ibu, pemenuhan oksigen dan cairan .

Hasil interpretasi pada Ny'H" menunjukkan kesesuaian tinjauan teori bahwa, Retensio plasenta adalah suatu keadaan plasenta belum lahir dalam waktu lebih dari setengah jam setelah bayi lahir (Maritalia, 2012: 64). Perdarahan *postpartum* merupakan kehilangan darah lebih dari 500ml melalui jalan lahir yang terjadi selama atau setelah persalinan kala III. Perdarahan yang terjadi dalam waktu 24 jam setelah persalinan disebut perdarahan *postpartum* dini atau perdarahan *postpartum primer*. Berdasarkan Penyebabnya perdarahan postpartum dapat disebabkan oleh kesalahan penanganan manajemen aktif kala III, retensio plasenta, atonia uteri, sisa plasenta dan laserasi jalan lahir (Kuswanti dan Fitria, 2014:129-131).

Tindakan manual plasenta dan penjahitan ruptur tingkat II dilakukan di puskesmas kampili setelah setengah jam lebih plasenta tidak lahir. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengeluarkan plasenta dan menghentikan perdarahan akibat laserasi perineum. Pasca tindakan manual plasenta, plasenta tidak berhasil dilahirkan dan terjadi perdarahan serta melanjutkan tindakan penjahitan ruptur tingkat II sebelum dilakukan rujukan. Tinjauan teori menjelaskan bahwa, tindakan manual plasenta merupakan tindakan untuk melepas plasenta secara manual dengan menggunakan

tangan dari tempat implantasinya dan kemudian melahirkan melalui kavum uteri (Tando,2013:108).

Pengawasan kala III sebelum melakukan manual plasenta yakni perhatikan dan temukan robekan perineum, pada Ny'H' terdapat ruptur tingkat II dan melakukan penjahitan teknik jelujur, hal ini sesuai tinjauan teori bahwa robekan perineum yang melebihi ruptur tingkat satu harus dijahit karena menyebabkan perdarahan aktif. Penjahitan dapat dilakukan sebelum plasenta lahir tetapi apabila ada kemungkinan plasenta harus dikeluarkan secara manual lebih baik tindakan ditunda sampai plasenta lahir (Kuswanti dan Fitria:2014:146).

Retensio plasenta yang menyebabkan perdarahan dapat mengakibatkan anemia. Data menunjukkan pada anamnesa riwayat perdarahan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang menunjukkan anemia pada Ny'H'. Data awal tersebut memiliki data penunjang dengan pemeriksaan kadar *hemoglobin* dalam darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar *hemoglobin* 6,4g%. Kadar Hb<7g% diklasifikasikan sebagai anemia berat. Penanganan retensio plasenta dan laserasi perineum yang menyebabkan perdarahan aktif mendapatkan penanganan segera, maka penanganan anemia dengan transfusi harus dipersiapkan.

Hasil identifikasi diagnosa aktual sesuai dengan tinjauan kasus menunjukkan bahwa masalah retensio plasenta dapat menyebabkan perdarahan dan Anemia. Perdarahan yang disebabkan oleh retensio plasenta dapat mengakibatkan anemia. Anemia adalah suatu kondisi dimana terdapat kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Hal ini sesuai dengan tinjauan teori bahwa, kehilangan jumlah darah yang banyak disamping mengakibatkan anemia juga syok. Akibat anemia yang

dialami ibu *inpartu* dapat menyebabkan kontraksi serat-serat myometrium terutama yang berada disekitar pembuluh darah yang mensuplai darah pada tempat implantasi plasenta sehingga menjadi lemah, beresiko besar terjadinya retensio plasenta, karena myometrium tidak dapat berkontraksi. Anemia pada ibu bersalin dapat menimbulkan gangguan kala uri yang diikuti retensio plasenta dan perdarahan *postpartum* (Riyanto,2015:43). Anemia merupakan keadaan kadar *hemoglobin* dalam darah kurang dari 10g% akan mempengaruhi keadaan umum dan faktor predisposisi terjadinya jumlah darah pada kala III dan kala IV. Anemia terjadi karena penurunan kadar oksigen dalam darah sehingga penurunan tersebut mengganggu proses oksigenasi dan metabolisme otot-otot uterus yang mengakibatkan terjadinya gangguan kontraksi myometrium *postpartum* yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kehilangan jumlah darah (Fauziah,2012:148).

Data awal yang menunjukkan terjadinya anemia dalam tinjauan teori bahwa tanda dan gejala anemia yakni gejala kelelahan,keletihan dan sesak merupakan gejala yang paling sering ditemukan. Tanda pucat pada kulit dan membrane mukosa dapat dilihat, dan memungkinkan tampak pada telapak tangan, wajah, mukosa mulut dan konjungtiva, walaupun tanda ini bersifat subjektif dan tidak dapat di andalkan. Pada anemia berat, tanda dan gejala klinis tampak secara langsung kerana ketidakadekuatan suplai oksigen dan mencakup takikardi (frekuensi pernapasan teratur namun cepat secara tidak normal >24x/menit) dan palpitasi,angina dan klaudikasi intermiten (berjalan pincang-*red*) (Wylie dan Helen,2010:87-88).

Pengkajian data dasar subjektif menunjukkan bahwa usia ibu 38 tahun, terdapat riwayat retensio plasenta pada persalinan anak ke empat pada tahun 2015 dan ibu telah melahirkan lebih dari dua kali yakni ibu telah menjalani proses persalinan lima kali dengan persalinan saat ini. Data objektif menunjukkan keadaan umum ibu lemah, pemeriksaan fisik didapatkan wajah pucat, dan konjungtiva pucat serta data penunjang menunjukkan pemeriksaan Hb 6,4g%, data tersebut menunjukkan ibu mengalami anemia berat. Sehingga pada tahap ini terjadi kesesuaian antara tinjauan teori dan tinjauan kasus .

Kejadian retensio plasenta pada Ny'H' karena beberapa faktor resiko yang terdapat pada ibu yakni faktor umur, riwayat retensio plasenta dan grandemultipara. Hal ini sesuai dengan teori bahwa faktor resiko yang dapat terjadi pada tertahannya plasenta atau plasenta tidak lahir selama durasi 30 menit yakni terdapat riwayat retensio plasenta, persalinan premature, bekas luka operasi uterus, usia diatas 35 tahun dan grandemultipara (Akinola,dkk,2013:280).

Faktor pertama, umur dapat menjadi faktor resiko terjadinya retensio plasenta yakni dalam kurun waktu reproduksi sehat dikenal bahwa umur aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-35 tahun. Wanita pada umur kurang dari 20 tahun mempunyai resiko lebih tinggi karena endometrium masih belum matang, dan juga sering terjadi pada ibu yang berumur di atas 35 tahun karena pertumbuhan endometrium menjadi kurang subur (Fauziyah,2012:69-70). Ibu relatif tua yang berisiko tinggi dapat menyebabkan inkoordinasi kontraksi otot rahim sehingga dapat mengganggu proses pelepasan plasenta dari dinding rahim. Makin tua usia ibu maka akan terjadi kemunduran yang progresif dari endometrium sehingga untuk mencukupi

kebutuhan nutrisi janin diperlukan pertumbuhan plasenta yang lebih luas, plasenta akan mengadakan perluasan implantasi dan vili khorialis akan menembus dinding uterus lebih dalam lagi sehingga akan terjadi plasenta adhesiva sampai perkreta (Oxorn, 2010).

Kedua, riwayat retensio plasenta berhubungan dengan tindakan yang dilakukan untuk melahirkan plasenta seperti tindakan manual plasenta yang melakukan insisi secara manual terhadap uterus menimbulkan cedera sehingga pada kehamilan selanjutnya akan mengganggu proses perlekatan plasenta pada desidua. Trauma pada uterus karena terdapat penyulit dalam proses persalinan, jhal ini terjadi spontan dan adanya tindakan dalam pertolongan persalinan. Selain tu adanya kesalahan dalam pertolongan kala III yang dapat menyebabkan trauma pada uterus, sehingga untuk kehamilan selanjutnya akan mempengaruhi implantasi plasenta (Fauziah.2012:146-147).

Ketiga grandmultipara atau paritas tinggi, hasil penelitian khotijah,dkk tentang hubungan usia dan paritas dengan kejadian retensio plasenta pada ibu bersalin di RSUD Banjarnegara tahun 2011 menunjukkan paritas >4 sebagian besar mengalami retensio plasenta. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan elastisitas otot-otot uterus akibat berulang-ulang mengalami penegangan selama kehamilan sehingga terjadi gangguan otot-otot uterus untuk berkontraksi sesaat setelah kelahiran bayi untuk proses kala uri. Gangguan tersebut dapat menghambat plasenta lahir segera setelah bayi lahir dan mengakibatkan perdarahan (Fauziah,2012:48). Ibu dengan paritas tinggi terjadi kemunduran dan cacat pada *endometrium* yang mengakibatkan terjadinya *fibrosis* pada bekas *implantasi plasenta* pada persalinan

sebelumnya, sehingga *vaskularisasi* menjadi berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan janin, *plasenta* akan mengadakan perluasan *implantasi* dan *vili khorialis* akan menembus dinding uterus lebih dalam lagi sehingga akan terjadi *plasenta adhesiva* sampai *perkreta* (Riyanto,2015:42).

Langkah III Identifikasi diagnosis atau masalah potensial

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan temuan tersebut, bidan dapat melakukan antisipasi agar diagnosis atau masalah tidak terjadi. Selain itu, bidan harus bersiap-siap apabila diagnosis atau masalah tersebut benar-benar terjadi (Mangkuji,dkk, 2013 : 5).

Pada Ny''H'' dapat berpotensi mengalami syok, dengan data riwayat perdarahan, data penunjang tampak anemia berat, tekanan darah menurun namun,terdapat ketidaksesuaian teori pada penurunan tanda-tanda vital lainnya seperti nadi masih dalam batas normal dan pernapasan masih dalam batas normal, namun ibu merasa sesak dan dilakukan penatalaksanaan pemasangan oksigen. Dalam tahap penatalaksanaan syok pemasangan oksigen dan pemasangan infus di kedua tangan, pemasangan oksigen tidak berlangsung lama dan dilakukan pelepasan oksigen saat keadaan ibu membaik karena akan dilakukan penatalaksanaan manual plasenta.

Pada Ny''H'' diagnosa potensial retensio plasenta dapat terjadi perdarahan postpartum, anemia,infeksi dan syok *hemoragik* atau syok *hipovolemik*. Beberapa masalah potensial yang terjadi pada Ny''H'' telah menjadi masalah aktual kecuali infeksi dan syok . Perdarahan *postpartum* yang dapat bersifat banyak,bergumpal-

gumpal atau terus merembes sedikit demi sedikit tanpa henti hingga menyebabkan syok. Syok adalah suatu keadaan disebabkan gangguan sirkulasi darah ke dalam jaringan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan dan tidak mampu mengeluarkan hasil metabolisme. Syok *hemoragik* adalah suatu syok yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak yang dapat disebabkan oleh perdarahan antepartum dan pascapersalinan seperti retensio plasenta, atonia dan lacerasi (Prawirohardjo, 2014:402).

Menurut Kolecki dan Menckhoff, 2005 syok *hipovolemik* adalah kondisi medis atau bedah dengan kehilangan cairan yang cepat, menyebabkan kegagalan organ multiple akibat perfusi yang tidak adekuat. Syok *hipovolemik* merupakan kondisi klinis dengan perfusi jaringan relatif tidak adekuat karena hilangnya darah atau plasma setelah cedera pada pembuluh darah. Syok *hipovolemik* juga dapat memicu pertimbangan diagnosis banding deprivasi cairan (dehidrasi berat, muntah dan diare berlebihan) dan kondisi yang menyebabkan perpindahan cairan yang tidak tepat seperti pre-eklamsi, sepsis dan anafilaksis (Billington dan Mandy, 2010:192). Dengan demikian tidak ada kesenjangan antara tinjauan kasus dan tinjauan teori.

Tinjauan teori mengenai masalah potensial tentang infeksi bahwa infeksi puerperalis adalah infeksi pada traktus genitalia setelah persalinan biasanya dari endometrium bekas insersi plasenta. Setelah kala III daerah bekas insersio plasenta merupakan sebuah luka dengan permukaan yang tidak rata, daerah ini tempat yang baik untuk berkembangnya bakteri (Saleha, 2013:96). Proses terjadinya infeksi dipengaruhi oleh salah satunya adalah perdarahan, ketika retensio plasenta menimbulkan perdarahan, maka akan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan pengendalian perdarahan bersama –sama perbaikan jaringan yang luka, tindakan yang

dilakukan yakni manual plasenta yang dapat membawa mikroorganisme penyebab infeksi yang telah ada pada vagina atau serviks akan terbawa masuk ke kavum uteri (Fauziah,2013:164-165). Dengan demikian tidak ada kesenjangan antara tinjauan kasus dan teori.

Langkah IV: Identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh memerlukan tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi (Manguji,dkk, 2013 : 6).

Dari data yang didapatkan tindakan segera yang harus dilakukan dengan keadaan umum ibu yang lemah, tanda-tanda vital menurun yakni tekanan darah, pemeriksaan fisik, jumlah perdarahan dan pemeriksaan penunjang. Penanganan segera dan kolaborasi dokter obgyn yakni penanganan retensio plasenta,perdarahan dan anemia berat untuk memperbaiki keadaan umum ibu,kemudian penanganan retensio plasenta yang menyebabkan perdarahan. Tindakan yang dilakukan pemasangan oksigen,pemasangan infus, dan manual plasenta. Hal ini sesuai dengan tinjauan teori bahwa terdapat data yang memerlukan tindakan segera sementara kondisi lain dapat dilakukan untuk beberapa waktu. Hal ini terjadi pada Ny'H" data yang membutuhkan tindakan segera yakni mengatasi retensio plasenta,perdarahan dan mencegah syok *hemoragk*, sementara masalah lain yakni anemia dapat ditindaki dengan transfuse setelah terdapat hasil pemeriksaan penunjang dan persediaan darah telah ada.

Dalam tinjauan teori penganan syok secara umum data dilakukan sesuai prosedur sebagai berikut:

Penatalaksanaan syok secara umum yakni ;

1. Carilah bantuan tenaga kesehatan lain.
2. Pastikan jalan napas bebas dan oksigen.
3. Miringkan ibu ke kiri.
4. Hangatkan ibu.
5. Pasang infus intravena (2jalur bila mungkin) dengan menggunakan jarum terbesar (no.16 atau 18 atau ukuran terbesar yang tersedia).
6. Berikan cairan kristaloid (NaCl 9,9% atau Ringer Laktat) sebanyak 1 liter dengan cepat (15-20 menit).
7. Pasang kateter urin (kateter Folly) untuk memantau jumlah urin yang keluar;
8. Lanjutkan pemberian cairan sampai 2 liter dalam 2-3 jam (pantau kondisi ibu dan tanda vital).
9. Cari penyebab syok, apabila disertai gejala perdarahan, muntah, diare dan dehidrasi tipe syok hipovolemik.
10. Pantau tanda-tanda vital dan kondisi ibu setiap 15 menit.
11. Bila ibu sesak dan pipi membengkak, turunkan kwcwpatan infus menjadi 0,5 ml/enit (8-10 tetes/menit), pantau keseimbangan cairan.
12. Tanda-tanda bahwa kondisi ibu sudah stabil atau ada perbaikan adalah tekanan darah sistolik $>100\text{mmHg}$, nadi <90 kali/menit, status mental (gelisah berkurang), dan produksi urin >30 ml/jam.
13. Setelah kehilangan cairan dikoreksi (frekuensi nadi < 100 kali/menit dan tekanan darah sistolik >100 mmHg), pemberian infus dipertahankan dengan

kecepatan 500 mL tiap 3-4 jam (40-50 tetes/menit) (Kemenkes dan HOGSI, 2013 :68-70).

Pada tinjauan teori mengenai penatalaksanaan syok pada Ny'H' dapat dilakukan langkah tersebut. Terjadinya syok dapat terjadi karena kehilangan jumlah darah, untuk mengukur kehilangan darah dapat dilakukan dengan tak langsung yakni dengan melihat gejala dan perubahan tekanan darah yang menyebabkan lemas, pusing, kesadaran menurun, tekanan darah sistolik turun lebih dari 10 mmHg dari kondisi sebelumnya, dan apabila terjadi syok *hipovolemik* maka jumlah kehilangan darah sebanyak 50% dari total darah ibu (2 L-2,5 L). Kehilangan cairan selama proses persalinan dapat mengakibatkan dehidrasi.

Dehidrasi dalam persalinan dapat memperlambat kontraksi uterus atau membuat kontraksi tidak efisien dan efektif. Bila kontraksi uterus tidak berlangsung baik pada kala III maka hal tersebut dapat mengganggu pelepasan plasenta sehingga terjadi retensio plasenta menyebabkan perdarahan berakibat syok dan jumlah kehilangan darah memungkinkan terjadi anemia (Tando.2013:124-125). Tindakan segera yang dilakukan sesuai masalah yang membutuhkan tindakan segera telah ditangani namun tindakan yang dilakukan tidak ada kesenjangan antara tinjauan kasus dan teori, namun untuk beberapa tahap tindakan tidak dilakukan dengan pertimbangan keadaan ibu.

Langkah V: Perencanaan asuhan yang menyeluruh

Direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi hal yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan,

tetapi dilihat juga dari apa yang akan diperkirakan terjadi selanjutnya, apakah dibutuhkan konseling dan apakah perlu merujuk klien. Setiap asuhan yang direncanakan harus disetujui oleh kedua pihak, yakni bidan dan pasien (Mangkuji,dkk, 2013 : 6).

Rencana tindakan yang menyeluruh yang dilakukan untuk pelaksanaan ibu bersalin dengan retensio plasenta yakni:

1. Observasi keadaan umum,tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik terfokus dan pemeriksaan penunjang.
2. Melakukan *inform consent* untuk tindakan yang akan dilakukan.
3. Observasi jumlah tetesan infus RL dan cairan glukosa.
4. Kosongkan kandung kemi.
5. Observasi kontraksi uterus, Tinggi Fundus Uteri (TFU),perdarahan dan pengeluaran lochia.
6. Kolaborasi dokter untuk penatalaksanaan plasenta manual.
7. Kolaborasi dengan dokter pemberian antibiotic.
8. Melakukan skintes sebelum pemberian antibiotik melalui Intravena.
9. Mengajarkan pada ibu,suami atau keluarga untuk melakukan masase fundus uteri.
10. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup dan menciptakan suasana yang tenang.
11. Menganjurkan ibu untuk tetap makan dan minum.
12. Melakukan penyuntikan secara intravena (bolus) dan drips antibiotic.
13. Pemantauan kala IV, pemantauan dilakukan 15 menit jam pertama dan 30 menit pada jam ke 2 setelah plasenta lahir lengkap.

14. Memberikan transfusi darah 2 kantong Whole Blood (WB) dengan golongan darah B.
15. Observasi Hb setelah transfusi darah.
16. Memberikan *Health education*

Pada Ny''H'' dengan retensio plasenta rencana tindakan secara menyeluruh bertujuan untuk mengatasi dan mencegah masalah yang telah terjadi dan berpotensi terjadi. Tahapan ini pada dasarnya prosedur pelaksanaan tinjauan kasus sesuai dengan tinjauan teori, namun terdapat beberapa tindakan yang berbeda yakni tindakan manual plasenta tidak diberikan sedative dan analgetik dan beberapa tindakan penanganan syok. Rencana tindakan yang akan dilakukan akan sesuai dengan kebutuhan tinjauan kasus.

Tinjauan teori mengenai observasi cairan yang masuk dan keluar (*intake and out put*) dari tubuh dengan tujuan dalam menentukan status keseimbangan cairan tubuh dan tingkat dehidrasi (Ambarwati dan Sri,2011:38). Tanda-tanda vital merupakan tanda-tanda yang penting pada tubuh yang dapat berubah bila tubuh mengalami gangguan atau masalah. Tanda-tanda vital yang sering digunakan sebagai indikator bagi tubuh yang mengalami gangguan atau masalah kesehatan adalah nadi,pernafasanm suhu dan tekanan darah. Tanda-tanda vital dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, bila suhu tubuh meningkat, maka nadi dan pernafasan akan meningkat (Maritalia,2012:24).

Kadung kemih dikosongkan dengan tujuan agar uterus dapat berkontraksi dengan kuat guna mencegah terjadinya perdarahan akibat dari kejadian retensio plasenta (Kuswanti dan Fitria,2014:145). Kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri

digunakan untuk pencegahan perdarahan dan tinggi fundus untuk mengetahui involusio uteri berlangsung normal. Tinggi fundus secara normal saat bayi lahir setinggi pusat dan 2 jari dibawah pusat, pertengahan pusat simpisis dalam waktu 1 minggu,tinggi fundus tidak teraba pada minggu ke 2,tinggi fundus normal dan normal tapi sebelum hamil involusio minggu ke 6 dan ke 8 (Saleha,2013:66).

Pemeriksaan kadar *hemoglobin* dalam darah menghasilkan 6,4%,kadar hemoglobin dalam darah <7g% mengindikasikan dilakukan transfusi. Hal ini dalam tinjauan kasus menunjukkan terdapat kesesuaian dengan teori untuk melaksanakan transfusi darah. Transfusi darah bertujuan untuk pengobatan atau pemulihan kesehatan. Beberapa macam komponen darah transfuse, yaitu *Whole blood* (darah lengkap atau darah segar), *Packed Red Cell* (PRC), Plasma Beku Segar (*Fresh Frozen Plasma*), trombosit,*Kriopresipitat*. *Whole blood* biasanya disediakan hanya untuk transfusi pada perdarahan pasif. *Whole blood* biasa diberikan untuk perdarahan akut, *shoch hipovolemik* serta bedah mayor dengan perdarahan lebih dari 1500ml. *Whole blood* akan meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen dan peningkatan volume darah. Transfusi satu unit *whole blood* akan meningkatkan *hemoglobin* 1g/dl(Faudda,dkk,2016:2-4).

Pengeluaran lochia adalah cairan secret yang berasal dari cavum uteri dan vagina selama masa nifas. Lochia terbagi yaitu lochia rubra, sanguilenta,serosa dan alba, lochia mempunyai bau yang khas. Dengan bau khas tersebut dapat membedakan bau yang menandakan dengan terjadinya infeksi. Lokia dimulai sebagai suatu pelepasan cairan dalam jumlah yang banyak pada jam pertama setelah melahirkan. Jumlah rata-rata pengeluaran lokia adalah kira-kira 240ml-270ml (Saleha,2013:55-

56). Rencana tindakan secara menyeluruh telah direncana sesuai kebutuhan ibu, tidak ada kesenjangan antara tinjauan kasus dengan tinjauan teori.

Langkah VI: Pelaksanaan

Melaksanakan rencana asuhan yang sudah dibuat pada langkah ke-5 secara aman dan efisien. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh bidan atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri, bidan tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam situasi ini, bidan harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain atau dokter. Dengan demikian, bidan harus bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut (Mangkuji,dkk, 2013 : 6).

Pelaksanaan rencana asuhan telah terlaksana baik secara mandiri maupun secara kolaborasi dengan dokter obgyn untuk tindakan yang membutuhkan seperti penatalaksanaan manual plasenta dan pemberian terapi obat. Pada tahap ini penatalaksanaan tindakan sesuai tinjauan teori, namun beberapa tindakan tidak dilakukan karena disesuaikan dengan kondisi ibu yakni pada tindakan manual plasenta tidak diberikan sedatif dan analgetik. Dalam tinjauan teori kasus retensio plasenta berpotensi mengalami *syok*, namun dalam tanda-tanda *syok* pasien dapat dikatakan dalam keadaan *syok* akan tetapi dalam penetalaksanaannya tidak dilakukan penganganan *syok*. Dalam pencatatan medis sebagai catatan untuk riwayat ibu tidak dicantumkan bahwa ibu mengalami *syok*. Hal ini menunjukkan rencana asuhan yang telah direncanakan secara menyeluruh tidak dilakukan dan menyesuaikan dengan keadaan ibu, sehingga penatalaksanaan tersebut tidak tercatat dalam catatan medis ibu.

Langkah VII: Evaluasi

Melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan, untuk menilai apakah sudah benar-benar terlaksana atau terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui mengapa proses manajemen ini tidak aktif (Mangkuji,dkk,2013:6).

Pada Ny''H'' dengan retensio plasenta didapatkan hasil yakni plasenta lahir lengkap, keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal,infus dan terapi obat,kontraksi baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat dan perdarahan hari pertama $\pm 150\text{cc}$ dan $\pm 50\text{cc}$ hari kedua. Diagnose potensial tidak terjadi *syok hemoragik* dan telah diatasi dengan transfusi dan hasil dari observasi kadar *hemoglobin* dalam darah 8,9g% .

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada Ny''H'', dalam tinjauan teori menunjukkan bahwa hasil tindakan menyeluruh yang dilakukan berlangsung normal. Keadaan umum baik meliputi status kesadaran dan tanda-tanda vital, status kesadaran bertujuan menilai kesadaran. Penilaian status kesadaran ada dua yaitu penialaian secara kuantitatif dankualitatif. Penilaian kualitatif di gunakan yakni compos mentis, apatis, sannolen, spoor, koma dan delirium.

Composmentis yaitu mengalami kesadaran penuh dengan memberikan respon yang cukup terhadap stimulus yang diberikan. Apatis yaitu bersikap acuh tak acuh terhadap keadaan sekitarnya. Samnolen yaitu kesadaran yang lebih rendah, tampak mengantuk, selalu ingin tidur. Dan tidak responsive terhadap rangsangan ringan, tapi masih memberikan respon terhadap rangsangan yang kuat. Sopor yaitu tidak memberi respon ringan maupun sedang,tetapi masih memberi respon sedikit terhadap rangsangan kuat dengan adanya refleks pupil terhadap cahaya yang masih positif. Koma yaitu tidak dapat bereaksi terhadap stimulus atau rangsangan apapun sehingga

reflex terhadap pupil terhadap cahaya tidak ada. Delirium yaitu tingkat kesadaran yang paling bawah, ditandai dengan disorientasi yang sangat iritatif, kacau dan salah persepsi terhadap rangsangan sensorik (Uliyah dan Aziz,2009:153).

Penilaian kesadaran secara kuantitatif dapat diukur melalui penilaian skala koma (nilai koma di bawah 10) yang dinyatakan dengan *Glassgow Coma Sacle* (GCS) (Uliyah dan Aziz,2009:154). Adapun penilaian sebagai berikut:

1. Aspek membuka mata
 - a. Spontan : 4
 - b. Dengan diajak bicara : 3
 - c. Dengan rangsangan nyeri : 2
 - d. Tidak membuka : 1
2. Respon verbal
 - a. Sadar dan orientasi ada : 5
 - b. Berbicara tanpa kacau : 4
 - c. Berkata tanpa arti : 3
 - d. Hanya mengeran : 2
 - e. Tidak ada suara : 1
3. Respon motoric
 - a. Sesuai perintah : 6
 - b. Terhadap rangsangan nyeri
 - 1) Timbul gerakan : 5
 - 2) Fleksi cepat dan abduksi bahu : 4
 - 3) Fleksi lengan dan adduksi bahu : 3

- 4) Ekstensi lengan, adduksi, endototasi bahu, : 2
dan pronasi lengan bawah
- 5) Tidak ada gerakan : 1

Dalam keadaan normal, uterus akan mencapai ukuran besar pada masa sebelum hamil sampai kurang dari 4 minggu, berat uterus setelah kelahiran kurang lebih 1kg sebagai involusi. Otot-otot uterus segera berkontraksi setelah *postpartum*. Pembuluh darah yang berada di antara anyaman otot uterus akan terjepit. Proses ini akan menghentikan perdarahan setelah plasenta lahir. Adapun proses involusi dapat dilihat dari perubahan tinggi fundus uteri dan berat uterus sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi

Involusi	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus
Bayi lahir	Setinggi pusat, 2 jari dibawah pusat	1000gr
1 minggu	Pertengahan pusat simfisis	750gr
2 minggu	Tidak teraba di atas simfisis	500gr
6 minggu	Normal	50gr
8 minggu	Normal tapi sebelum hamil	30gr

Sumber : Saleha, 2013:55

Tindakan transfusi darah dengan *whole blood* 2 unit (1 unit 500ml), setelah pasca transfusi dilakukan pemeriksaan *hemoglobin* kadar *hemoglobin* yang awalnya 6,4gr%, pada pemeriksaan pasca transfuse 8,9g%. Dalam teori bahwa setiap unit sel darah merah yang transfuse akan meningkatkan *hemoglobin* \pm 1g/dl pada perempuan dengan berat badan 70 kg. Namun tidak di ketahui jumlah sel darah merah (eritrosit) dalam darah lengkap sehingga tidak di ketahui berapa persen yang dapat menaikkan jumlah kadar darah yakni kadar hemoglobin. Eritrosit tersedia dalam bentuk sel darah merah atau darah lengkap (*whole blood*). Indikasi pemberian eritrosi adalah untuk meningkatkan daya angkut oksigen pada pasien anemia. Pemberian transfusi untuk mencapai batas normal tidak dilakukan karena pasien tidak bersedia.

Upaya yang dilakukan yakni kolaborasi dengan dokter obgyn dalam pemberian terapi untuk peningkatan zat besi dan asuhan untuk nutrisi yang baik bagi ibu dengan anemia. Dengan demikian dalam tindakan evaluasi tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan kasus dan tinjauan teori.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan studi kasus manajemen asuhan kebidanan intranatal pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RS Umum Daerah Kabupaten Gowa dengan 7 Langkah Varney dapat disimpulkan bahwa:

1. Telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Hasil dari analisa data didapatkan Ny''H'', umur 38 tahun, G5P4A0 dengan keluhan plasenta tidak lahir 2jam setelah bayi lahir dan perdarahan ± 500 cc.
2. Telah dilaksanakan perumuskan untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosis atau masalah aktual pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Hasil dari interpretasi data sehingga Ny''H'', umur 38 tahun mengalami masalah actual retensio plasenta, perdarahan dan anemia berat.
3. Telah dilaksanakan perumuskan untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosis atau masalah potensial pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Hasil dari analisa dan interpretasi data actual Ny''H'' berpotensi mengalami syok hemoragik.
4. Telah dilaksanakan identifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan hasil telah dilakukan tindakan segera karena keadaan umum pasien yang lemah, sehingga dilakukan tindakan segera untuk mencegah terjadinya

komplikasi, yakni kolaborasi penanganan retensio plasenta dengan manual plasenta dan perdarahan dengan pemberian terapi serta untuk tindakan segera pemberian oksigen.

5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa berdasarkan diagnose atau masalah actual dan masalah potensial dengan rencana asuhan yang telah ditetapkan maka dilakukan,penanganan manual plasenta, pemberian oxytocin dan transfuse darah.
6. Telah dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan hasil semua rencana tindakan dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya hambatan.
7. Telah dilakukan evaluasi hasil asuhan kebidanan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan tinjauan kasus dan tinjauan teori dari hasil evaluasi yakni tanda-tanda vital dalam keadaan normal,anemia teratasi dengan Hb:8,9g%,perdarahan telah berhenti.
8. Telah dilakukan pendokumentasikan semua hasil temuan dan tindakan asuhan kebidanan pada Ny''H'' dengan retensio plasenta di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dalam bentuk 7 langkah varney dan SOAP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penyusun akan menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi peneliti

Mengharapkan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara nyata dalam memberikan asuhan kebidanan intranatal dengan retensio plasenta. Untuk penelitian dengan kasus yang sama, berharap dapat meningkatkan anamnesa yang lebih baik untuk menunjang masalah potensial yang membutuhkan data penunjang dari anamnesa, sehingga mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

2. Bagi Profesi

Mengharapkan agar dapat lebih meningkatkan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam memberikan asuhan kebidanan secara menyeluruh khususnya bagi ibu bersalin dengan retensio plasenta, untuk menghindari terjadinya komplikasi dari retensio plasenta.

3. Bagi Institusi

a) Pendidikan

Diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan baik secara teori maupun dengan praktik di lahan agar mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya untuk penataksanaan persalinan patologi.

b) Rumah Sakit

Mutu pelayanan baik dari segi sarana dan prasarana, namun untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang maksimal perlu system yang baik agar dalam pelayanan tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan, sehingga

mengakibatkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi seperti komplikasi-komplikasi dari kasus yang terjadi berakhir dengan kematian.



DAFTAR PUSTAKA








- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementerian Agama. 2012
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka). *Tafsir Al-Azhar Juz 17-18-19-20*. Jakarta: Pustaka Panjimas Jakarta.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1993. *tafsir Al-Maragi Juz 16,17 dan 18*. Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang.
- Al-Bukhary, Al-Imam. 2009. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I,II,III & IV*. Kuala Lumpur: Klang Book Centre.
- Akinola,dkk."Manual removal of the placenta:Evaluation of some risk faktor and management outcome in tertiary maternity unit. A case controlled study". *Open Journal of Obstetrica and Gynekology* 3,(2013):hal 279-284. Diakses tanggal 10 April 2017 pukul 03.00 WITA).
- Ambarwati,Eny Retna dan Tri Sunarsih.2011.*KDPK Kebidanan Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Nuha Medika.
- Anggraeni,Novi dan Sri Anita Kusuma."Gambaran Penatalaksanaan Manajemen Aktif Kala III oleh Bisan Wilayah Kerja Puskesmas Blega Kabupaten Bangkalan", *Skripsi*. Bangkalan. Akademi Kebidanan Ngudia Husada Madura.2015.
- Billington,Mary dan Mandy Stevenson.2010.*Kegawatan dalam Kehamilan-Persalinan Buku Saku Bidan (critical care in childbearing for midwives)*.Jakarta:EGC.
- Damayanti .*Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian retensio plasenta di RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin*.An nada 1,no.3 (2014):h.77-81. (Diakses tanggal 12 Mei 2017 pukul 11.20 WITA).
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.2014.*Profil Kesehatan Indonesia*.Official Website Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. http://www.depkes.go.id/resource/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2014/Sulawesi_Selatan_2014.pdf (Diakses tanggal 02 April 2017 pukul 14.20 WITA).
- Fuadda,Rahmatullah dkk.*Perbedaan Reaksi Pemberian Transfusi Darah Whoole Blood (WB) dan Packed Red Cell (PRC) pada Pasien Section Caesare*.*Jurnal human care*.Volume 1.No.3 (2016).(Diakses tanggal 17 Agustus 2017 pukul 22.08 WITA).
- Eniyati dan Putri R.2012. *asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Eniyati dan Sholihah 2013.*Asuhan Kebidanan pada Persalinan Patologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziyah,Yulia.*Obstetri Patologi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*.2012.Yogyakarta:Nuha Medika.
- Hikmah Nurul dan Dian Puspita Yani. *Gambaran Hemoragic Postpartum pada Ibu Bersalin dengan Kejadian Anemia di ruang PONEK RSUD Kabupaten Jombang*.*Jurnal Edu Healthh* 5.no.2 (2015):h.142 147. (Diakses tanggal 17 Mei 2017 pukul 01.30 WITA).

- Kementerian Kesehatan Indonesia. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia*. <http://www.depkes.go.id/resource/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2015/.pdf>. (Diakses tanggal 02 April 2017 pukul 15.15 WITA).
- Kementerian Kesehatan dan Himpunan *Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI)*.2013.*Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*.Jakarta:Bina Kesehatan Ibu.
- Kusmiyati Yuni.2012.*Penuntun Belajar Keterampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan*.Yogyakarta:Fitramaya
- Khotijah,dkk.*Hubungan Usian dan Paritas dengan Kejadian retensio Plasenta di RSUD Banjarnegara Tahun 2011*.Jurnal Ilmiah Kebidanan.Volume 5 No.1 (2014):hlm.27-32. (Diakses tanggal 09 Agustus 2017 pukul 02.56 WITA).
- Jannah Nurul.2012.*Buku Ajar Asuhan Kehamilan*.Yogyakarta: Ansi Pffesr.
- Kuswanti Ina dan Fitria Melina.2014. *Askeb II Persalinan*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Maryuni dan Yulianingsih.2009.*Asuhan Kegawatdaruratan dalam Kebidanan*.Jakarta:Trans Info Media.
- Mangukuji,Betty,dkk.2013.*Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney SOAP*.Jakarta.:EGS.
- Nurhayati,dkk.2013.*Konsep Kebidanan*.Jakarta: Salemba Medika.
- Nugraheny,Esti.2010.*Asuhan Kebidanan Patologi*.Yogyakarta:Pustaka Rihama.
- Oxorn, Harry. 2010. *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica (YEM)
- Prawirohardjo,Sarwono.2014.*Ilmu Kebidananan*.Jakarta:PT Bina Pustaka.
- Pudiasuti Ratna Dewi.2012.*Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Patologi*.Yogyakarta:Nuha Medical.
- Riyanto.*Faktor Risiko Kejadian Retensio Plasenta Pada Ibu Bersalin Di RSUD Dr.H. Bob Bazar, SKM Kalianda*. Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai.Volume VIII No.1(2015). (Diakses 07 Maret 2017 pukul 20.00 WITA).
- Rohani,dkk.2010.*Asuhan Kebidanan II (persalinan)*.Jakarta:Cv Trans Info Media.
- Shihab,M.Quraish.2009.*Tafsir Al-Misbah Pesan,Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.Jakarta: Lentera Hati.
- Santalia, Indo. 2013. *Proses Perkembangan Manusia (Suatu kajian Studi Islam)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Saleha Sitti.2013. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*.Jakarta:Salemba Medika.
- Saminem. 2010.*Dokumentasi Asuhan Kebidanan Konsep dan Praktik*. Jakarta:EGC.
- Sudarti,Afroh Fauziah.2011.*Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan*.Yogyakarta:Nuha Medika.
- Saifuddin Abdul Bari.2014.*Ilmu Kebidananan*.Jakarta:PT Bina Pustaka.

- Taufiq Muhammad Izzuddin.2006.*Dalil Anfus Al-Qur'an dan Embriologi (ayat-ayat tentang penciptaan manusia)*.Jakarta: Tiga Serangkai.
- Tando Naomi Marie.2013.*Asuhan Kebidanan persalinan dan Bayi Baru Lahir*.Jakarta:In Media.
- Uliyah,Musrifatul dan Aziz Alimul Hidayat.2009. Keterampilan Dasar Praktik Klinik untuk Kebidanan.Jakarta:Salemba Medika.
- Urner Fiona,dkk."*Manual Removal of the Placenta Vaginal Delivery:An Unsolved Problem in Obstetrics*".*Journal of Pregnancy*.(2014). (Diakses tanggal 16 maret 2017 pukul 23.45 WITA).
- Vijayalakshmi.B, dan Kaveri Shavi. "Retained Placenta in an Unicornuate Uterus: A Case Report". *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences*,Vol. 4.Issue 29, (April 2015). (Diakses tanggal Mei 2017 pukul 10,15 WITA)
- Walyani dan purwoastuti.2015.*Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*.Yogyakarta:Pustaka Baru.
- Wylie,Linda dan Helen Bryce.2010.*Manajemen Kebidanan Gangguan Medis & Persalinan*.Jakarta:EGC.
- Yulifah,Rita dan Surachmindari.2014.*Konsep Kebidanan untuk Pendidikan Kebidanan*.Jakarta:Salemba Medika.

LEMBAR KONSULTASI PROPOSAL

KONSULTASI PROPOSAL PEMBIMBING I
Dr. H. Sitti Saleha, S.Si, S.KM M. Feb

No.	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	Konsultasi judul	22/4/2017	
2.	Konsultasi Bab I	04/8/2017 perbaikan	
3.	Tata cara pendalaman BAB I	15/5/2017	
4.	Koreksi Bab I	21/6-2017	
5.	Perbaikan Bab I, II	12/6-2017	
6.	Acc perbaikan Bab I, dan II	14/6/2017	
7.	Acc w/ UP	14/6/2017	






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR






LEMBAR KONSULTASI PROPOSAL

KONSULTASI PROPOSAL pembimbing II
 dr. Andi Sitti Rahma, M-kes

No.	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
	Konsul Judul	15/4-17	
	Bab I & Bab 2	12/5-17	
	Perbaikan I	26/5-17	
	Perbaikan II	4/6-17	
	Aca	15/6-17	






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

LEMBAR KONSULTASI HASIL

	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
1	Konsul 1 Bab III	07/08/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SrT, S.KM, M. Keb
2	Konsul II Bab IV dan V	10/8/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SrT, S.KM, M. Keb
3	Konsul III	14/8/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SrT, S.KM, M. Keb
4	Konsul IV dan V	16/8/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SrT, S.KM, M. Keb
5	Kee yia hial	17/8/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SrT, S.KM, M. Keb

LEMBAR KONSULTASI HASIL

LEMBAR KONSULTASI HASIL

	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
7	Konsul 2 Bab III	07/08/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., S.K.M., M.KeB
8	Konsul II Bab IV dan V	10/8/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., S.K.M., M.KeB
9	Konsul III	14/8/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., S.K.M., M.KeB
10	Konsul IV dan V	16/8/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., S.K.M., M.KeB
11	Free yjian hnd	17/8/2017	 Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., S.K.M., M.KeB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Peneliti**

Nama : Masni
Nim : 70400114032
Tempat, tanggal Lahir : Parepare, 12 April 1995
Suku : Bugis
Asal Daerah : Parepare
Agama : Islam
Alamat : Jl Bacukiki Raya No.22 Parepare

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 32 Parepare :2001-2007
SMP Negeri 3 Parepare :2007-2010
SMA Negeri 2 Parepare :2010-2013
UIN Alauddin Makassar :2014-2017