

**UJI EFEKTIVITAS TEMEPHOS DAN EKSTRAK DAUN SIRIH
(*Piper betle*) TERHADAP PERKEMBANGAN LARVA
*Aedes aegypti***



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

**OLEH:
NURQOMARIAH
NIM: 60300107034**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011/2012**

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar , Agustus 2011
Penyusun

NURQAMARIAH
NIM : 60300107034



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “ **Uji Efektivitas Temephos dan Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*) terhadap Perkembangan Larva *Aedes aegypti***” yang disusun oleh **Nur Qamariah**, NIM: 603001067034, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2011 M., bertepatan dengan 26 Ramadhan 1432 H., dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Agustus 2011 M
26 Ramadhan 1432 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. (.....)

Sekretaris : Ir. Syarif Beddu, M.T. (.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M. S. (.....)

Munaqisy II : Dr. Hj. A. Asmawati Azis, M.Si. (.....)

Munaqisy III : Sitti Saenab S. Pd., M.Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Syahribulan, M. Si. (.....)

Pembimbing II : Mashuri Masri, S.Si, M.Kes. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Dr, Muhammad Halifah Mustami, M. Pd.

NIP 19711204 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT pemilik rahmat dan hidayah bagi seluruh alam semesta, shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Atas izin dan kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Uji Efektivitas Temephos dan Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*) terhadap Perkembangan Larva *Aedes aegypti*** yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian jenjang studi strata satu (S1) pada jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sembah sujud dan ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan tak terhingga penulis haturkan kepada Ayahanda tercinta **H. Muh. Zubair Wahid**, dan ibunda tersayang **Hj. St. Rosnaeni, S.Pd.** yang telah banyak memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang, kesabaran dan doa yang tulus tak henti-hentinya, dan kepada adiku yang sangat saya sayangi **Nur Hunain** dan **Nur Sakinah**, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan perhatian serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan mendukung secara moril maupun material.

Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi ini kepada Ibu **Dr. Syahribulan S. Si, M. Si.** sebagai pembimbing

utama dan Keluarga, Bapak **Mashuri Masri S.Si, M. Kes.** sebagai pembimbing kedua, yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan, nasehat dan dorongan moril yang sangat terasa manfaatnya bagi penulis sendiri atas segala bimbingan dan saran serta dukungan yang diberikan sejak perencanaan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ditujukan pula kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Qadir Gassing M.A**, Selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
2. **Bapak Dr. Khalifah Mustami, M. Si.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta staf yang telah memerikan bantuan dan kemudahan dalam setiap pengurusan akademik.
3. **Ibu Fatmawati Nur Khalik, S. Si., M. Si.** dan **Ibu Hafsan, S.Pd, M.Pd.** selaku ketua dan sekretaris jurusan Biologi yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan moril dan pengetahuan yang sangat besar manfaatnya.
4. **Ibu Cut Muthiadin S. Si., M. Si.** dan dosen-dosen biologi UIN alauddin yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan.
5. **Ibu Dr. Hj. A. Asmawati Azis, M. Si., Ibu Sitti Saenab, S.Si, M.Pd., dan Bapak Prof. Dr. Bahaking Rama, M.S.** selaku penguji yang banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.
6. Saudaraku, rekan penelitian : **A. Ernawati** yang telah memberikan bantuan, motivasi, kerjasama, hingga semuanya bisa terlewati meskipun banyak rintangan, tantangan maupun suka dan duka selama penelitian.

7. Sahabat-sahabatku biologi angkatan “07” : Rusmadi Rukaman, Aisyah, Ka’bah, Lisdawati, St Asriati, Muh. Said, Zulkarnain, Ernawati, Reskianti, Devi Septiviani, A. Indra Ayu, Zaqiyah Bakri, Abdul Wahab. H, Megawati Bukhari, Muliati, Firmansyah, Hasrul, A. Rezki Ferawati, Jumriani, Muh. Aryan R Suci, Suryana, A. Ernawati yang telah banyak memberikan motivasi, saran, dukungan serta kenangan terindah yang sangat berharga.
8. Teman-teman KKN Desa Je’netallasa dan terkhusus kepada kakakku Rahman Saputra yang memberikan motivasi, saran, dukungan serta kenangan terindah yang sangat berharga.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Kakak Muh. Rusydi, S.Far.,Apt di Lab. Farmatognosi UIN Alauddin Makassar dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Penulis memohon kepada **Allah SWT** semoga dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.-

Makassar, Agustus 2011

Penulis

ABSTRAK

Nama : Nurqamariah
Nim : 60300107034
Jurusan : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi

Penelitian mengenai “**Uji Efektivitas Temephos dan Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*) terhadap Perkembangan Larva *Aedes Aegypti***” telah dilakukan pada bulan Januari - Agustus, 2011. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas temephos dan ekstrak daun sirih terhadap perkembangan larva nyamuk *Ae. aegypti*. Pembuatan ekstrak dilakukan di Lab. Farmakognosi-Fitokimia Fak. Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dan uji efektivitas dilakukan di Lab. Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Makassar. Uji efektivitas dilakukan dengan menggunakan konsentrasi temephos dan ekstrak daun sirih masing-masing sebanyak 2 mg/2 L air, 4 mg/2 L air, 6 mg/2 L air, 8 mg/2 L air, 10 mg/2 L air terhadap 20 ekor larva instar I-IV pada masing-masing wadah perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna pada kematian larva oleh larvasida ekstrak daun sirih dengan kematian larva akibat larvasida temephos. Temephos pada berbagai konsentrasi dalam waktu 4 jam efektif menghambat perkembangan larva (100%), sebaliknya ekstrak daun sirih pada berbagai konsentrasi efektif menghambat dalam waktu 12 jam

Kata Kunci : Larva *Aedes Aegypti*, Ekstrak Daun Sirih, Temephos.

ABSTRACT

Nama : Nurqamariah
Nim : 60300107034
Jurusan : Biologi
Fakultas : Sains and Teknologi

The research on “The Effectivity test of temephos and sirih’s leave (*Piper betle*) extracts to the growth of *Ae. aegypti* larva has been conducted on January to August 2011. The research is aimed to know the effectivity of temephos and sirih’s leave extract to *Ae. aegypti* larval growth. Extract of sirih’s leaves are made at Farmakognosi-Fitokimia laboratory, Faculty of Health and the effectivity test is done at Biology laboratory, Faculty of Science and Technology, University of Islam Alauddin Makassar. The effectivity test of both temephos and extract of sirih’s leave using various concentration are as follow : 2 mg/2 l water, 4 mg/2 l water, 6 mg/2 l water, 8 mg/2 l water, 10 mg/2 l water applied to the larval of *Ae. aegypti* I-IV instar as much as 20 larval per container. The result showed that there is significantly differences in the mortality of larva by using sirih’s extract and temephos. Temephos in all four concentration can inhibit the growth of larva (100 %) in four hours, otherwise extract of sirih’s leave only effective to inhibit the larval growth in 12 hours.

Lock word : Larva *Aedes aegypti*, extract leave sirih, temephos

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Islam Tentang Penyakit Dan Pengobatannya.....	6
B. Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	12
1. Klasifikasi.....	12
2. Morfologi.....	13
3. Siklus Hidup.....	13
C. Tanaman Sirih (<i>Piper betle</i>).....	25

D. Metode Ekstraksi Secara Umum.....	27
E. Abatisasi Selektif.....	30
F. Beberapa Upaya Pengendalian Nyamuk <i>Aedes. Aegypti</i>	31
1. Pengendalian Menggunakan Senyawa Kimia.....	32
2. Pengendalian Biologis.....	35
3. Pengendalian Fisik.....	36
G. Kerangka Penelitian.....	38
BAB. III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Variabel Penelitian.....	40
C. Devenisi Operasional.....	40
D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	41
E. Alat dan Bahan.....	42
F. Prosedur Penelitian.....	42
G. Pengumpulan Data Primer.....	45
H. Analisis Data.....	46
BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	57
BAB. V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1. Telur <i>Ae.</i>	
<i>Aegypti</i>	14
2. Jentik/larva <i>Ae.</i>	
<i>Aegypti</i>	16
3. Pupa <i>Ae.</i>	
<i>Aegypti</i>	17
4. Nyamuk dewasa <i>Ae.</i>	
<i>Aegypti</i>	20
5. (a) bak mandi (b)	
baskom.....	21
6. (a) Pot bunga (b) Bank	
bekas.....	21
7. (a) Potongan bambu (b)	
Tempurung.....	22
8. Tanaman Sirih (<i>Piper betle</i>).....	26
9. Histogram 1. Persentase kematian larva instar I dengan menggunakan Ekstrak daun sirih (<i>Piper betle</i>) setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi.....	48
10. Histogram 2. Persentase kematian larva instar I dengan menggunakan temephos setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi.....	49

11. Histogram 3. Persentase kematian larva instar II dengan menggunakan ekstrak daun sirih, setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi....	50
12. Histogram 4. Persentase kematian larva instar II dengan menggunakan temephos, setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi.....	51
13. Histogram 5. Persentase kematian larva instar III dengan menggunakan ekstrak daun sirih setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi.....	52
14. Histogram 4. Persentase kematian larva instar III dengan menggunakan temephos, setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi.....	53
15. Histogram 7. Persentase kematian larva instar IV dengan menggunakan ekstrak daun sirih pada setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi.....	54
16. Histogram 8. Persentase kematian larva instar IV dengan menggunakan temephos pada setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi.....	55
17. Larva <i>Aedes aegypti</i> Instar I yang mengalami kematian.....	56
18. Larva <i>Aedes aegypti</i> Instar II yang mengalami kematian.....	56
19. Larva <i>Aedes aegypti</i> Instar III dan IV yang mengalami kematian.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Bagan Kerja Pengujian ekstrak daun Sirih.....	66
2. Bagan Kerja Pengujian Temephos.....	67
3. Bagan Kerja Identifikasi Alkaloid	68
4. Bagan Kerja Identifikasi Saponin	69
5. Hasil Uji one-way Anova uji Efektifitas Ekstrak Dan Sirih Terhadap Perkembangan Larva <i>Ae. Aegypti</i>	70
6. Foto Saat Melakukan Pembuatan Ekstrak Daun Sirih (<i>Piper betle</i>).....	72
7. Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Alkaloid dan Saponin Ekstrak Daun Sirih (<i>Piper betle</i>).....	73
8. Pengambilan Sampel jentik Pada TPA.....	74
9. Saat melakukan pengujian ekstrak daun sirih (<i>Piper betle</i>) dan temephos terhadap larva <i>Ae. Aegypti</i>	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aedes aegypti adalah salah satu anggota ordo Diptera famili Culicidae. *Ae. aegypti* ^{ditemukan} hidup di pemukiman padat penduduk, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Larva *Ae. aegypti* berkembang biak pada berbagai tempat penampungan air buatan, seperti: bak mandi, drum, dll. Selain itu juga ditemukan berkembang biak pada tempat penampungan air alami, seperti: lubang pohon, tempurung kelapa dan lubang bambu sebagai tempat bertelur¹.

Ae. aegypti merupakan vektor utama penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan chikungunya. Demam berdarah dengue (DBD) adalah salah satu penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obat maupun vaksinnnya, yang ada hanyalah penanggulangan vektor, yaitu dengan cara menghambat perkembangan larva dan dikenal sebagai program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Cara lain adalah penggunaan agen penolak nyamuk (repleen), misalnya baygon, autan, dll².

Pengendalian larva merupakan kunci strategi program pengendalian vektor di berbagai belahan dunia. Penggunaan insektisida merupakan cara yang paling umum digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan populasi vektor tersebut. Larvasida

¹ Braks, MA, Honoris, N.A de Oliviera, L, Juliono, SA'' *Lombos, L. P Convergen Habitat Segregation Of Aedes aegypti and (Diptera: Culicidae) in Southeasten Brazil and Florida. J. Med. Eatomol, 2003: 785-94.*

² Dinas Kesehatan,. Mencegah dan memberantas DBD. Dinkes Propinsi Dati I Jateng Semarang:1989 h, 5.

yang umum digunakan di Indonesia adalah abate. Abate merupakan larvasida pembasmi larva/jentik nyamuk yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Penggunaan abate di Indonesia sudah sejak tahun 1976. Selanjutnya pada tahun 1980, temephos 1% (abate) ditetapkan sebagai bagian dari program penanggulangan massal *Ae.aegypti* di Indonesia (Dinas Kesehatan dalam Aradilla, 2009)³.

Berbagai upaya pengendalian vektor telah dilakukan yaitu pengendalian secara fisik, biologi maupun kimiawi. Pengendalian yang banyak dilakukan adalah pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida kimiawi. Insektisida kimiawi ini bekerjanya lebih efektif dan hasilnya dapat dilihat dengan cepat dibandingkan dengan pengendalian biologis maupun fisik. Contohnya dengan penggunaan insektisida dapat mengakibatkan keracunan pada manusia dan hewan ternak, polusi lingkungan, dan resisten terhadap serangga⁴. Sehubungan dengan dampak insektisida yang telah terjadi, maka dilakukan suatu usaha untuk mendapatkan insektisida alternatif untuk menghambat pertumbuhan serangga serta aman dengan resiko terhadap organisme dan kehidupan yang minimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, para ahli menggunakan cara alternatif dalam pengendalian secara kimiawi yakni menggunakan insektisida alami, misalnya dengan penggunaan insektisida alami yang berasal dari senyawa yang dihasilkan oleh tanaman.

Penelitian tentang insektisida alamiah dalam upaya mengendalikan nyamuk, khususnya pada stadium larva, pertama kali dirintis oleh Campbell dan Sulifan

³ Aradilla, Uji Efektivitas Larvasida Ekstrak Ethanol Daun Mimba (*Azadiracthta indica*) Terhadap Larva *Aedes aegypt* Skripsi: (Semarang, Fakultas Kedokteran Diponegoro, 2009), h 1.

⁴ *Ibid.*

(1933). Eram Tunggul Paweang (1959) menyatakan bahwa tanaman yang mengandung senyawa *alkaloid, nikotin, anabasin dan lupinin* dapat menghambat pertumbuhan larva *Ae. Aegypti*. Lexinton pada tahun 1970 melaporkan bahwa ekstrak daun kemangi (*Olium basikicum*) pada dosis 100 ppm dapat menghambat pertumbuhan larva *Ae. aegypti*. Lebih lanjut Sry Wahyuni (2005) telah melaporkan bahwa ekstrak serai (*Andropongen nordus*) dengan konsentrasi 60% dapat membunuh nyamuk *Ae. aegypti* sebanyak 3,2% dalam waktu 24 jam setelah perlakuan. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan maka peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas ekstrak daun sirih (*Piper betle*) terhadap perkembangan larva *Ae. aegypti*.

Allah SWT dalam Al-Qur'an berfirman yang terdapat pada surah As-yuaraa (26): 7, yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik⁵.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan banyak tumbuh-tumbuhan di bumi untuk diperhatikan dan dimanfaatkan, seperti halnya daun sirih diketahui mengandung beberapa senyawa seperti minyak atsiri, zat penyamak,

⁵ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Madinah al-Munawwarah : Percetakan Alqur'an Raja Fahd, 2007), h. 330.

saponin dan senyawa *alkoloid*⁶. Senyawa *saponin* dan *alkaloid* yang nantinya dapat digunakan untuk menghambat larva nyamuk dengan cara kerja mirip bubuk abate.

Allah SWT dalam surah Al-Imran (3): 191 berfirman:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka"⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini pasti tidaklah sia-sia, artinya semuanya memiliki manfaat dan kegunaan, seperti daun sirih yang memiliki kandungan kimia yang dapat digunakan sebagai larvasida untuk menghambat perkembangan larva *Ae. aegypti*.

B. Rumusan Masalah

Apakah ekstrak daun sirih (*Piper betle*) efektif digunakan dalam mengendalikan larva *Ae. aegypti* seperti halnya abate?

C. Tujuan Penelitian

⁶ Hafshah, *Khasiat Daun Sirih*”, [http://id.Org/khasiat Daun Sirih.com](http://id.Org/khasiat-Daun-Sirih.com), 10 November 2010.

⁷Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Madinah al-Munawwarah : Percetakan Alqur'an Raja Fahd, 2007), h. 110.

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas temephos dan ekstrak daun sirih dalam menghambat perkembangan larva *Ae. Aegypti*.

b. Tujuan Khusus

Mengetahui efektivitas berbagai konsentrasi temephos dan ekstrak daun sirih (*Piper betle*) terhadap perkembangan larva nyamuk *Ae. Aegypti*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti diharapkan dapat mengetahui konsentrasi ekstrak daun sirih (*Piper betle*) yang efektif untuk membunuh larva *Ae. aegypti*.
2. Dapat memperkaya khasanah penelitian tentang larvasida yang dapat digunakan sebagai pengendalian vektor penular penyakit DBD.
3. Bagi masyarakat dapat diketahui manfaat tanaman daun sirih yang dapat dijadikan sebagai larvasida alamiah yang lebih ramah lingkungan dalam mengendalikan nyamuk di rumah tangga.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Islam tentang Penyakit dan Pengobatannya

Allah SWT dalam Al-Qur'an menyerukan kepada manusia bahwa banyak tanda kebesaran-Nya, diantaranya adalah menciptakan tanaman, dan tanaman tersebut memiliki fungsi masing-masing. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam dan melihat tanda-tanda di dalamnya. Semua makhluk hidup dan tidak hidup di alam semesta diliputi oleh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka semua diciptakan, bahwa mereka menunjukkan kekuasaan, ilmu dan seni dari Pencipta mereka⁸. Manusia bertanggung jawab untuk mengenali tanda-tanda ini dengan menggunakan akal budinya, untuk memuliakan Allah SWT. Beberapa tanda tersebut dapat dilihat pada Q.S Yunus: 24.

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَيْنَاهَا أُمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

⁸ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Madinah al-Munawwarah : Percetakan Alqur'an Raja Fahd, 2007), h. 211.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.

Berbagai manfaat jenis dedaunan yang diciptakan oleh Allah SWT dibumi ini bukannya tanpa manfaat, akan tetapi kita diserukan untuk mempelajari agar dapat mengetahui dari manfaat makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT⁹.

Menurut ahli tafsir, dedaunan diartikan sebagai seberkas ilmu dan secerca hikmah yang terbentuk dengan jelas untuk menuntun kita dalam memahami Firman Allah SWT dalam Qu'ran *Q.S Yasin: 36* sebagai berikut :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya...

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang telah ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka ketahui "

Maka dedaunan menurut ayat tersebut termasuk di antara makhluk yang tumbuh di muka bumi, yang oleh Sang Pencipta dibentuk dengan sedemikian rupa, dengan keindahan yang selalu menjadi pesona bagi manusia dari makhluk lainnya. Dari sinilah Allah SWT memasukkan rahasia ilmu dan lautan hikmah-Nya untuk menjadi

⁹ Anonymous. 2010. *Manfaat Daun Menurut Tinjauan Islam* (http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=255312)

pelajaran kita sebagai makhluk yang paling sempurna agar mampu mempelajari rahasia Allah SWT tersebut.

Allah SWT sebagai Sang Pencipta telah menciptakan semuanya dengan tidak sia-sia, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan tersendiri, sehingga dari situ kita akan memperoleh hikmah dan manfaat. Seperti halnya Allah SWT menciptakan kita di muka bumi ini selain untuk mengabdikan dan menyembah kepada-Nya, Dia juga menginginkan kita untuk senantiasa menggali potensi yang ada pada diri kita, salah satunya adalah potensi keilmuan yang kita miliki. Allah SWT selalu menginginkan hamba-Nya untuk selalu berfikir dalam menghadapi hambatan dan permasalahan hidup agar kita tidak tinggal diam menghadapinya, akan tetapi dengan membuat perubahan yang bermanfaat sehingga kita dapat mengatasinya. Dalam Al-Qur'an surah Yunus: 57 Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*Hai sekalian manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman*¹⁰.

Ayat tersebut terdapat kata-kata “telah datang pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit ini merupakan sebuah pertanda dan isyarat yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya yang berilmu untuk senantiasa menggali dan mengembangkan potensi keilmuan yang kita miliki, terlebih lagi dalam hal pengobatan penyakit yang berasal dari alam, baik itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, maupun dari hewan-hewan serta organisme lainnya¹¹. Selain itu hal ini juga akan membuat kita berfikir bahwa semua penyakit yang ada hanya dapat sembuh jikalau Allah SWT mengizinkannya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syu’araa’ : 80:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

*Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembukanku*¹².

¹⁰Departemen Agama, *Alqur’an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah : Percetakan Alqur’an Raja Fahd, 2007), h. 315.

¹¹ Bin Muhsin, *Petunjuk Al-Quran Tentang Pengobatan*, (Invertasi Syariah, 2009) h. 2

¹²*Loc-cit.*, h. 579.

Ayat tersebut merupakan bantahan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada para penyembah berhala pada saat itu, bahwa segala macam penyakit itu hanya dapat disembuhkan atas seizin Allah SWT, yang juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa penyakit akan sembuh berkat izin Allah SWT tetapi prosesnya tidak langsung terjadi begitu saja, melainkan Allah SWT menyuruh kita untuk senantiasa berusaha dan berikhtiar untuk mencari pengobatannya, karena Allah SWT tidak menginginkan kita untuk berpangku tangan dan menunggu keajaiban datang menghampiri kita. Sehingga Ayat ini juga memotivasi kita untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan tentang penyakit dan pengobatannya, khususnya pengobatan herbal atau tumbuhan alami yang tidak memerlukan biaya yang banyak untuk mengobati suatu penyakit¹³.

Allah SWT menurunkan penyakit ke muka bumi ini bersamaan juga dengan obat atau penawar dari penyakit tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

...أَنْزَلَ اللَّهُ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ (رواه البخاري)

Terjemahnya :

... Allah yang menurunkan penyakit, dan Dia juga yang menurunkan obatnya. (HR. Bukhari¹⁴).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Imam az-zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Bandung, Mizan 2008), h 833

Hadits Nabi tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap penyakit pasti memiliki obat. Oleh karena itu tugas dari kita adalah menggali dan mencari tahu tentang pengobatan dari suatu penyakit yang Allah SAW turunkan, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan penelitian tentang pengobatan alamiah (herbal) yaitu dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai penyembuh dari suatu penyakit. Ini merupakan salah satu bentuk usaha dan ikhtiar kita untuk tidak berpangku tangan dalam menghadapi penyakit, karena Allah sangat melarang hamba-Nya untuk berpasrah diri tanpa melakukan usaha apapun dalam menghadapi suatu penyakit. Sekalipun telah kita sadari bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah SWT, tetapi kita harus ingat kembali bahwa Dia menurunkan penyakit dan juga menurunkan obatnya yang berarti bahwa ada pesan tersirat dari hadits nabi tersebut bagi kita untuk mencari obat karena kesembuhan tidak datang dengan sendirinya. Perlu juga kita ketahui bahwa obat tidak lain hanyalah merupakan perantara atau faktor penyebab kesembuhan dari Allah SWT, sebagai media ikhtiar dan usaha demi mematuhi Sunnatullah dan hukum alam yang berlaku¹⁵.

¹⁵ Agus Rasyidi, 2009, Herba Sebagai Pengobatan Moderen Alternatif, tinjauan medis dan syariat Islam, Ar-Royyan-8796

B. Nyamuk *Aedes aegypti*

1. Klasifikasi

Klasifikasi *Ae. aegypti* yaitu sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Class	: Insecta
Ordo	: Diptera
Famili	: Culicidae
Genus	: <i>Aedes</i>
Spesies	: <i>Aedes aegypti</i> ¹⁶ .

2. Morfologi

Morfologi nyamuk *Ae.aegypti* dapat dibagi menurut masa pertumbuhan dan perkembangan menjadi 4 tahap, yaitu: telur, larva, pupa, dan dewasa, sehingga termasuk metamorfosis sempurna (*holometabola*)¹⁷.

2. Siklus Hidup

a) Telur

Telur berbentuk lonjong seperti torpedo berwarna hitam, panjang + 0,6 – 0,8 mm dengan berat 0,0113 mg. Jumlah telur (sekali bertelur) sekitar 100-300 butir,

¹⁶ Borror, Dj & DM Delong, *An Introduction to the study of Insec.* (USA Library of Congres, Catalog Card, 1954), h. 54

¹⁷ Ruide. L. M, *Zootaxa: Key pictorial for the identivication of mosquitos (Diptera: Culicidae) associate with dengue transmission (new zeland: magnolia Press, 2005)*, h. 17.

rata-rata 150 butir. Frekuensi nyamuk betina bertelur 2-3 hari sekali. Telur biasanya diletakkan di atas permukaan air dan akan menetas bila tergenang/terendam air. Populasi biasanya berkurang pada musim kemarau dan musim dingin. Telur bertahan terhadap kekeringan selama musim kemarau/kering dan larva yang bertahan akan hidup pada musim hujan, hal ini menjadi salah satu penyebab epidemi dengue¹⁸.

Kontak pertama dengan air merupakan rangsangan bagi nyamuk untuk bertelur. Telur *Ae. aegypti* berukuran 0,80 mm, berbentuk oval, berwarna hitam atau berwarna gelap seperti sarang tawon. Telur tersebut diletakkan satu demi satu pada dinding kontainer sedikit di atas permukaan air dalam jarak kira-kira 2,5 cm dan dinding tempat perindukan. Pada telur dikeluarkan berwarna putih dan selang 30 menit kemudian berangsur-angsur berubah menjadi hitam pekat. 70 jam kemudian setelah kontak dengan air pada suhu 25°C-30°C telur akan menetas menjadi larva. Telur tersebut dapat bertahan pada tempat yang kering (tanpa air) sampai berbulan-bulan pada suhu 20°C-42°C, namun bila tempat tersebut tergenang air atau kelembaban tinggi maka dapat menetas dengan cepat, suhu lingkungan sangat berpengaruh pada daya tahan telur untuk menetas menjadi larva, nyamuk mengeluarkan telur sebanyak +¹⁹100-300 butir sekali dengan ukuran sekitar 5 mm²⁰.

¹⁸ Haslthead, S.B. *Dengue : Tropical medicine Science and Practce*, vol.5. Imperial College Press, 2008, h. 75-99

¹⁹ Akhmadi, "Daur Kehidupan ", <http://id.wikipedia.org/wiki/Nyamuk>, 2009 (14 januari 2011)

²⁰ Yotopranoto S, *Dinamika Populasi Vektor Pada Lokasi Dengan Kasus Demam Berdarah Dengue yang Tinggi di Kotamadya Surabaya* (Surabaya: Majalah Kedokteran Tropis Indonesia, 1998), h. 23



Gambar 1. Telur *Ae. aegypti*.¹

b) Larva/Jentik

Jentik nyamuk *Ae. aegypti* berukuran panjang 0,5-1 cm saat baru menetas. Jentik tersebut bergerak aktif dalam air. Gerakannya berulang-ulang dari bawah keatas permukaan air untuk bernafas (mengambil udara) kemudian turun, kembali ke bawah dan seterusnya. Selama periode jentik/larva dalam pertumbuhannya akan menjalani 4 tahapan perkembangan, lamanya perkembangan larva akan bergantung pada suhu, kesediaan makanan, dan kepadatan larva. Pada kondisi optimum, waktu yang dibutuhkan mulai dari penetasan sampai pemunculan nyamuk dewasa akan berlangsung sedikitnya selama 7 hari, termasuk 2 hari menjadi pupa, pada waktu istirahat, posisinya hampir tegak lurus dengan permukaan air. Biasanya berada di sekitar dinding tempat penampungan air²¹.

Larva nyamuk *Ae. aegypti* tubuhnya memanjang tanpa kaki dengan rambut-rambut (seta) yang tersusun bilateral simetris. Dalam perkembangannya larva mengalami 4 kali pergantian kulit (ecdysis) yang disebut larva instar I, II, III, dan IV. Larva instar I, tubuhnya sangat kecil, warna transparan, panjang 1-2 mm, rambut-

²¹ Clement, *The Biology of Mosquitos, Vol. 2 : Sensory Reception and Behavior* (New York, CABI Publishing, (1992), h.

rambut (seta) pada dada (thorax) belum jelas, dan corong pernafasan (siphon) belum menghitam. Larva instar II bertambah besar, ukuran 2,5-3,9 mm, duri dada belum jelas, dan corong pernafasan sudah berwarna hitam. Larva instar III berukuran 4-5 mm, rambut-rambut dada mulai jelas dan corong pernapasan berwarna coklat kehitaman. Larva instar IV telah lengkap struktur anatominya dan jelas tubuh dapat dibagi menjadi bagian kepala (cephal), dada (thorax), dan perut (abdomen). Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk, sepasang antena tanpa rambut-rambut, dan alat-alat mulut tipe pengunyah (chewing). Perut tersusun atas 8 ruas. Larva *Ae. aegypti* ini tubuhnya langsing dan bergerak sangat lincah, bersifat fototaksis negatif, dan waktu istirahat membentuk sudut hampir tegak lurus dengan bidang permukaan air²².

Pertumbuhan dan perkembangan larva dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu, cukup tidaknya bahan makanan, keberadaan binatang lainnya yang mirip predator.



Gambar 2. Jentik/larva *Ae. aegypti*²³.

²² Wibowo H. A. 2008. *Demam Berdarah Dengue*. <http://www.Ajangberkarya.wordpress.com>. (14 Maret 2010).

²³ Penelitian 2011

c) Pupa

Pupa *Ae. aegypti* berbentuk seperti koma, dengan bagian kepala-dada (cephalothorax) lebih besar bila dibandingkan dengan bagian perutnya. Pada bagian punggung (dorsal) dada terdapat alat pernafasan seperti terompet. Pada ruas perut ke-8 terdapat sepasang alat pengayuh yang berguna untuk berenang. Alat pengayuh terdapat berjumbai panjang dan rambut di nomor 7 pada ruas perut ke-8 tidak bercabang. Pupa adalah bentuk tidak makan, tampak gerakannya lebih lincah bila dibandingkan dengan larva. Waktu istirahat, posisi pupa sejajar dengan bidang permukaan air. pupa tidak memerlukan makanan, tetapi memerlukan oksigen dan pengambilan oksigen melalui terompetnya. Biasanya stadium ini berlangsung selama satu sampai lima hari pada suhu air²⁴.



Gambar 3 : Pupa *Ae. aegypti*²⁵.

²⁴ Sumarmo, *Demam Berdarah Dengue di Indonesia, Situasi Sekarang dan Harapan di Masa Mendatang. Semilokal Berbagai Aspek Demam Berdarah Dengue dan Penanggulangannya*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 56

²⁵ Syahribulan. Loc.cit

d) Nyamuk Dewasa

Nyamuk *Ae. aegypti* dewasa memiliki ukuran sedang dengan tubuh berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan gari-garis putih keperakan. Di bagian punggung (*dorsal*) tubuhnya tampak dua garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan yang menjadi ciri dari spesies ini. Sisik-sisik pada tubuh nyamuk pada umumnya mudah rontok atau terlepas sehingga menyulitkan identifikasi pada nyamuk-nyamuk tua. Ukuran dan warna nyamuk jenis ini kerap berbeda antar populasi, tergantung dari kondisi lingkungan dan nutrisi yang diperoleh nyamuk selama perkembangan. Nyamuk jantan umumnya lebih kecil dari betina dan terdapatnya rambut-rambut tebal pada antena nyamuk jantan. Nyamuk *Ae.aegypti* tubuhnya tersusun dari tiga bagian, yaitu kepala, dada dan perut. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk dan antena yang berbulu. Alat mulut nyamuk betina tipe penusuk-pengisap (*piercingsucking*) dan termasuk lebih menyukai manusia (*anthropophagus*), sedangkan nyamuk jantan bagian mulut lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia, karena itu tergolong lebih menyukai cairan tumbuhan (*phytophagus*). Nyamuk betina mempunyai antena tipe *pilose*, sedangkan nyamuk jantan tipe *plumose*.

Dada nyamuk ini tersusun dari 3 ruas, *prothorax*, *mesothorax*, dan *metathorax*. Setiap ruas dada ada sepasang kaki yang terdiri dari *femur*, *tibia*, dan *tarsus*. Pada ruas-ruas kaki ada gelang-gelang putih, tetapi pada bagian *tibia* kaki belakang tidak ada gelang putih. Pada bagian dada juga terdapat sepasang sayap tanpa noda-noda hitam. Bagian punggung (*mesentum*) ada gambaran garis-garis putih yang


dapat dipakai untuk membedakan dengan jenis lain. Gambaran punggung nyamuk *Ae. aegypti*. Berupa sepasang garis lengkung putih (bentuk *lyre*) pada tepinya dan sepasang garis *submedian* di tengahnya. Perut terdiri dari 8 ruas dan pada ruasruas tersebut terdapat bintik-bintik putih. Waktu istirahat posisi tubuh *Ae.aegypti* sejajar dengan bidang permukaan yang dihinggapinya²⁶.

Umur nyamuk jantan lebih singkat daripada nyamuk betina (+ 1 minggu), makanannya berupa cairan tumbuhan atau nektar, sedangkan umur nyamuk betina berkisar antara 2 minggu sampai 3 bulan atau rata-rata 1½ bulan, tergantung dari suhu kelembaban udara sekelilingnya. Makanan nyamuk betina adalah darah mamalia terutama darah manusia (*antrofofilik*) yang digunakan untuk pematangan telurnya. Nyamuk dewasa biasanya aktif selama siang hari. Puncak aktivitas terjadi pada pukul 08.00 – 10.00 dan pukul 15.00 – 17.00. hal ini dikarenakan perilaku yang *diurnal* dan kebanyakan dari nyamuk menggunakan waktu siang harinya untuk beristirahat. Umur nyamuk betina berkisar antara 2 minggu sampai 3 bulan²⁷.

²⁶ Soegijanto S. 2004. *Demam Berdarah Dengue*. Surabaya : Airlangga University Press. Hal:45-51.

²⁷ Womack, *The yellow fever mosquito, Aedes aegypti*. <http://www.WingBeat.co.id> (3 November 2010)

²⁰ Ruede, L, M, *Zootaxa : Key pictorial for the identification of moskoitos (Diptera: Culicidae) associate with dengue transmision (new zaeland: mangnolia Pree, 2005)*, h 17.



Gambar 4. Nyamuk dewasa *Ae. aegypti*²⁰.

e) Habitat


Ae. aegypti mempunyai dua habitat yaitu *aquatik* (perairan) untuk fase pradewasanya (telur, jentik dan pupa) dan daratan atau udara untuk serangga dewasa. Walaupun habitat imago di daratan atau udara, namun juga mencari tempat di dekat permukaan air untuk meletakkan telurnya. Habitat jentik yang keluar dari telur tersebut hidup mengapung di bawah permukaan air. Habitat seluruh masa pradewasanya dari telur, jentik dan pupa hidup di dalam air walaupun kondisi airnya sangat terbatas²⁸. Berbeda dengan habitat dewasanya yaitu hidup bebas di daratan atau udara, *Ae. aegypti* lebih menyukai tempat di dalam rumah penduduk, sering hinggap pada pakaian yang digantung untuk beristirahat dan bersembunyi menantikan saat tepat inang datang untuk mengisap darahnya.

²⁸ Hasteed, S.B. *op. cit.* . h. 67

Ae. aegypti betina lebih menyukai tempat penampungan air yang tertutup longgar untuk meletakkan telurnya dibandingkan dengan tempat penampungan air yang terbuka, karena tempat penampungan air yang tertutup longgar tutupnya jarang dipasang dengan bak sehingga mengakibatkan ruang di dalamnya lebih gelap²⁹.

Habitat nyamuk biasanya berupa genangan-genangan air yang tertampung di suatu wadah yang biasa disebut kontainer dan bukan pada genangan-genangan air tanah. Pada waktu survei larva/jentik, kontainer ini dibedakan sebagai berikut:

- a) Tempat penampungan air (TPA), yaitu tempat-tempat untuk menampung air guna keperluan sehari-hari seperti : drum, tempayan, bak mandi, bak WC, ember dan lain-lain.



Gambar 5. (a) bak mandi (b) baskom

- b) Bukan tempat penampungan air (non TPA), yaitu tempat-tempat yang biasa menampung air tetapi bukan keperluan sehari-hari seperti : tempat minum hewan piaraan (ayam, burung, dll), barang bekas (kaleng, ban, botol, pecahan gelas, dll), vas bunga, perangkap semut, penampungan air dispenser dan sebagainya.

²⁹ Departemen Kesehatan RI, Pedoman Ekologi dan Aspek Perilaku Vektor. (Jakarta: Ditjen P2M & PL. 2004). h. 12.



Gambar 6. (a) Pot bunga (b) Ban bekas³⁰.

- c) Tempat penampungan air buatan alam (alamiah/natural) seperti : lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, kulit kerang, pangkal pohon pisang, potongan bambu, dll.



Gambar 7. (a) Potongan bambu (b) Tempurung³¹

Kontainer ini pada umumnya ditemukan di dalam rumah, disekitar rumah dan tidak jauh dari rumah. Tempat istirahat yang paling di senangi *Ae. Aegypti* adalah vegetasi yang ditemukan tumbuh di sekitar tempat perkembangan yang tidak secara langsung terkena oleh sinarmatahari. Jika yang menjadi tempat istirahat spesies ini benda-benda di dalam rumah, benda tersebut berupa benda tergantung seperti

³⁰ Dr. Syahribulan, Hasil Penelitian Gowa.

³¹ *ibid*

pakaian, kelambu, gordena atau perabot rumah yang terletak/berada ditempat yang gelap, berbau dan lembab³².

f) Perilaku

Waktu menggigit nyamuk *Ae. aegypti* adalah pukul 08.00 – 12.00 siang dan 15.00 – 17.00. Nyamuk *Ae. aegypti* lebih banyak menggigit di dalam rumah (endofagik) dapat daripada diluar rumah (eksofagik) dan dapat menggigit beberapa orang secara bergantian dalam waktu singkat (multiple bitter). Perilaku yang demikian sangat membantu dalam memindahkan virus dengue beberapa orang sekaligus. Setelah menggigit dan selama menunggu kematangan telur, nyamuk *Ae. aegypti* beristirahat di tempat gelap dan sedikit angin³³.

Ae. aegypti hinggap (beristirahat) setelah menghisap darah di dalam rumah atau kadang-kadang di luar rumah, berdekatan dengan tempat berkembang biaknya. Tempat hinggap yang disenangi ialah berbeda-beda yang tergantung seperti: pakaian, kelambu atau tumbuh-tumbuhan di dekat tempat perkembangbiakannya. Biasanya di tempat yang agak gelap dan lembab. Di tempat tersebut nyamuk menunggu proses pematangan telurnya. Setelah beristirahat dan proses pematangan telur selesai, nyamuk betina akan meletakkan telurnya di dinding tempat berkembang biaknya. Telur itu di tempat yang kering dapat bertahan berbulan-bulan pada suhu -2⁰C sampai

³² Borror, Dj & DM DeLong, *An Introduction to the study of Insec.* (USA Library of Congress, Catalog Card, 1954), h. 54.

³³ Clements, A.N. 1999. *The Biology of Mosquitos, Vol. 2 : Sensory Reception and Behavior*, (New York, CABI Publishing, 1999). H. 11.

42⁰C, dan bila tempat tersebut kemudian tergenang air maka telur dapat segera menetas lebih cepat³⁴.

g) Makanan

Nyamuk *Ae. aegypti* jantan memperoleh makanan dari sari-sari tumbuhan dan tidak menghisap darah, sedangkan nyamuk *Ae. aegypti* betina menghisap darah manusia dan binatang. Nyamuk ini menghisap darah dengan tujuan mematangkan telur³⁵. Darah (proteinnya) dibutuhkan untuk mematangkan telur agar jika dibuahi oleh sperma nyamuk jantan dapat menetas. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkembangan telur, mulai dari nyamuk menghisap darah sampai telur dikeluarkan bervariasi antara 3 – 4 hari. Jangka waktu tersebut dinamakan satu siklus gonotropik (*gonotropic cycle*). Sebagai spesies yang aktif pada siang hari (*diurnal*), nyamuk *Ae. aegypti* betina mempunyai dua waktu aktifitas menggigit yaitu beberapa jam dipagi hari (pukul 08.00 sampai pukul 12.00) dan beberapa jam sebelum menjelang gelap (Pukul 15.00 sampai pukul 17.00) dan lebih banyak menggigit di dalam rumah daripada di luar rumah³⁶.

Ae. aegypti dalam proses perkembangannya, menghabiskan kebanyakan waktunya dengan memakan alga, bakteri dan mikroorganisme lain yang ada di air. Jentik memangsa mikroba di dasar genangan atau di dasar tempat penampungan air sehingga disebut *bottom feeder* yaitu pemakan makanan di dasar. Jentik mendapatkan

³⁴ Sungkar, S, “*Bionomik Aedes aegypti Vektor demam Berdarah Dengue*” (Majalah Kedokteran Indonesia, Jakarta). h. 1.

³⁵ Departemen Kesehatan Ri, *Op. cit.* h 14.

³⁶ Depkes Ri, “*Ekologi Vektor dan Beberapa aspek Perilaku*” (Jakarta: Dit. Jend. PPM & PLP, 1987), h, 23.

makanan dengan membuat pusaran air kecil dalam air menggunakan bagian ujung dari tubuh mereka yang ditumbuhi bulu sehingga mirip kipas.³⁷

C. Tanaman Sirih (*Piper betle*)

1. Klasifikasi *Piper betle*

Tanaman Sirih (*Piper betle*) diklasifikasikan sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta

Anak Divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Anak kelas : Monochlamydae

Bangsa : Piperales

Suku : Piperaceae

Spesies : *Piper betle*³⁸.

2. Morfologi Tanaman

Sirih sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Tanaman ini banyak ditanam orang di pekarangan. Batangnya berwarna hijau kecoklatan, permukaan kulit kasar dan berkerut-kerut, mempunyai nodul atau ruas yang besar tempat keluarnya akar. Tumbuh memanjat dan bersandar pada batang lain,

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Tjitrosoepomo *Daun Sirih (Piper betle)*. [http:// Let' s Study .co.id](http://Let's Study .co.id) (10 November 2010)

tinggi dapat mencapai 5 – 15 m. daun tebal daun berseling, bertangkai daun berbentuk jantung, daging ujung daun meruncing. Lebar 2,5 – 10 cm, panjang 5 – 18 cm, mengeluarkan bau aromatik bila diremas³⁹.

Sirih merupakan tanaman terna, tumbuh merambat atau menjalar menyerupai tanaman lada. Tinggi tanaman sirih bisa mencapai 15 m, tergantung pada kesuburan media tanam dan rendahnya media untuk merambat. Batang berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, berkerut, dan beruas yang merupakan tempat keluarnya akar⁴⁰.



Gambar 8. Tanaman Sirih (*Piper betle*)³⁴

3. Kandungan Kimia dan Sifat-Sifat Kimia

Sirih sangat kaya dengan kandungan zat berkhasiat. Di antaranya minyak atsiri, alkaloid, hidrosikavicol, kavicol, kavibetol, allylpyrokatekol, cyneol, caryophyllen, cadinen, estragol, terpen, seskuiterpen, fenil propana, tanin, diastase, gula, dan pati. Efek zat aktif yang dikandung seluruh bagian tanaman sirih adalah

³⁹ Budi Sugianti, *Pemanfaatan Tumbuhan obat Tradisional Dalam Pengendalian Penyakit*, (Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2005), h. 7.

⁴⁰ Tjitrosuepomo. *Lok.cit.*

³⁴. *Penelitian 2011*

merangsang sistem syaraf pusat dan daya pikir, meningkatkan gerakan peristaltik, merangsang kejang, meredakan sifat mendengkur. Daun sirih memiliki efek mencegah ejakulasi prematur, mematikan jamur *Candida albicans*, anti kejang, analgesik, anestetik, pereda kejang pada otot polos, penekan pengendali gerak.⁴¹

D. Metode Ekstraksi Secara Umum

Ekstraksi adalah penguraian zat-zat berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat dalam sel, namun sel tanaman diperlukan metode ekstraksi dan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya. Zat aktif yang terdapat pada tanaman, hewan, biota laut atau beberapa jenis ikan pada umumnya mudah larut dalam pelarut organik. Pelarut organik yang sering dalam mengekstraksi zat aktif dari sel dalam tanaman adalah metanol, etanol, heksan, dietil eter, benzen, dan etil asetat⁴².

Jenis-jenis ekstraksi bahan alam yang sering digunakan adalah ekstraksi secara panas dan dingin. Ekstraksi secara panas umumnya digunakan untuk sampel yang mempunyai bentuk dan dinding sel yang tebal. Metode ekstraksi secara panas digunakan untuk sampel yang tahan panas dan mempunyai tekstur yang keras seperti batang, akar, dan biji. Ekstraksi secara panas dilakukan dengan metode refluks dan destilasi uap air. Ekstraksi secara dingin digunakan untuk sampel yang lunak, tidak

⁴¹ Hafshah, *Khasiat Daun Sirih*”, [http://id.Org/khasiat Daun Sirih.com](http://id.Org/khasiat%20Daun%20Sirih.com), 10 November 2010.

⁴²J.B Harborne, *Metode Fitokimia Modern Menganalisis Tumbuhan*, (Bandung : Institut Teknologi Bandung, 2006), h. 102.

tahan panas dan tidak mudah mengembang dalam cairan penyinaran. Ekstraksi secara dingin dilakukan dengan metode maserasi, perkolasi, dan soxhletasi⁴³.

Ragam ekstraksi yang tepat sudah tentu bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis senyawa yang diisolasi. Umumnya dalam melakukan ekstraksi awalnya perlu membunuh jaringan tumbuhan untuk mencegah terjadinya oksidasi enzim atau hidrolisis. Mencemplungkan jaringan daun segar atau bunga bila perlu dipotong-potong ke dalam etanol mendidih adalah suatu cara yang baik untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimanapun juga, alkohol merupakan pelarut serba guna yang baik untuk ekstraksi pendahuluan. Selanjutnya bahan dapat dimaserasi dalam suatu pelumat, lalu di saring. Tetapi hal ini betul-betul diperlukan bila kita ingin mengekstraksi habis. Bila mengisolasi senyawa dari jaringan hijau, keberhasilan ekstraksi dengan alkohol berkaitan langsung dengan seberapa jauh klorofil tertarik oleh pelarut tersebut. Bila ampas jaringan, pada ekstraksi ulang, sama sekali tak berwarna hijau lagi, dapat dianggap semua senyawa berbobot molekul rendah telah terekstraksi⁴⁴.

Salah satu contoh ekstraksi adalah sistem pembuatan minyak atsiri yang bahan bakunya memiliki rendemen kecil, rusak pada suhu tinggi, dan rata-rata larut dalam air. Cara ekstraksi biasanya digunakan untuk bahan baku minyak atsiri berupa daun dan bunga. Beberapa komoditas minyak atsiri yang menggunakan sistem

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, h. 6.

ekstraksi di antaranya daun, mawar, melati, dan sedap malam. Cara ekstraksi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu ekstraksi dengan pelarut menguap, ekstraksi dengan lemak dingin, dan ekstraksi dengan lemak panas. Ekstraksi minyak atsiri secara komersial umumnya dilakukan dengan pelarut menguap (solvent extraction). Prinsip metode ekstraksi dengan pelarut menguap adalah melarutkan minyak atsiri di dalam bahan pelarut organik yang mudah menguap. Pelarut yang dapat digunakan di antaranya alkohol, heksana, benzena, dan toluena. Selain itu, dapat juga menggunakan pelarut non-polar seperti metanol, etanol, kloroform, aseton, petroleum eter, dan etilasetat dengan kadar 96%⁴⁵.

Ciri dari minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah. Selain itu, susunan senyawa komponennya kuat mempengaruhi saraf manusia (terutama di hidung) sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu (baunya kuat). Setiap senyawa penyusun memiliki efek tersendiri, dan campurannya dapat menghasilkan rasa yang berbeda. Secara kimiawi, minyak atsiri tersusun dari campuran yang rumit berbagai senyawa, namun suatu senyawa tertentu biasanya bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak/lipofil⁴⁶.

⁴⁵Cara Ekstraksi Minyak Atsiri, *Artikel Agromedia*, <http://distributor.agromedia.net/artikel/>, (23 Oktober 2010).

⁴⁶Minyak Atsiri, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, Ensiklopedia Bebas, <http://Wikipedia.org/ir/index.php.minyak-atsiri&action.> (22 Oktober 2010).

E. Abatisasi selektif (Temephos)

Abatisasi selektif adalah menaburkan bubuk abate ke dalam tempat panampungan air yang ditemukan jentik pada waktu Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) yang dilakukan oleh petugas kesehatan setiap sebulan sekali di rumah-rumah dan tempat-tempat umum⁴⁷.

Bubuk abate berwarna kecoklatan, terbuat dari pasir yang dilapisi dengan zat kimia yang dapat membunuh jentik nyamuk, cara melakukan abatisasi yaitu: Takaran penggunaan bubuk abate adalah untuk 10 liter air cukup dengan 1 gr abate atau 10 gr untuk 100 liter air dan seterusnya. Bila tidak ada alat untuk menakar, gunakan sendok makan, satu sendok makan berisi 10 gr abate. Selanjutnya tinggal membaginya atau menambahnya sesuai dengan banyaknya air yang akan diabatisasi. Takaran tidak perlu tepat betul⁴⁸.

Abate adalah larvasida pembasmi larva/jentik nyamuk yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Produsen abate adalah pt basf Indonesia, dan kini untuk kemudahan pemakaian di rumah saat ini tersedia abate kemasan 10 gr untuk pemakaian 100 liter air dalam kemasan aluminium foil berwarna hijau dan biru dengan logo basf⁴⁹.

Abate terbukti efektif sebagai larvasida dari larva *Aedes aegypti*. Toksisitas abate yang rendah baik terhadap mamalia, burung, ikan maupun serangga lainnya

⁴⁷ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Petunjuk Teknis Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD)” (Jakarta, 1992), h. 32

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Dewi Sudirman, ” <http://id. Org. Blogger/ Abate>. 13 Desember 2010.

menyebabkan abate aman dipakai pada tempat-tempat penyimpanan air kebutuhan sehari-hari abate juga bersifat *anticholinesterase* yang kerjanya menghambat enzim *cholinesterase* baik pada vertebrata maupun invertebrata sehingga menimbulkan gangguan pada aktivitas syaraf karena tertimbunnya *acetylcholin* pada ujung syaraf tersebut, hal inilah yang mengakibatkan kematian. Penetrasi abate ke dalam larva berlangsung sangat cepat dimana lebih dari 99% abate dalam medium diabsorpsi dalam waktu satu jam setelah perlakuan. Keracunan fosfat organik pada serangga diikuti oleh ketidaknenangan, hipereksitasi, tremor dan konvulsi, kemudian kelumpuhan otot (paralisa), pada larva nyamuk kematiannya disebabkan oleh karena tidak dapat mengambil udara untuk bernafas⁵⁰.

F. Beberapa Upaya Pengendalian Nyamuk *Aedes aegypti*

Pada umumnya pengendalian nyamuk dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap stadium pra-dewasa maupun dewasanya. Secara langsung apabila upaya pengendalian secara langsung mengenai sasaran, misalnya penggunaan sapu lidi dan penyemprotan nyamuk secara individual. Sedangkan secara tidak langsung secara fisik tidak langsung mengenai sasaran antara lain penyemprotan residual pada dinding rumah⁵¹.

⁵⁰ Ivan Veriswan, *Uji Efektivitas Abate Dalam Penghambatan Larva Aedes Aegypti*, **Skripsi** (Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2006), h .11.

⁵¹ Depkes RI, h. 27.

1) Pengendalian menggunakan Senyawa Kimia

Cara kimiawi dilakukan dengan menggunakan senyawa atau bahan kimia yang digunakan baik untuk membunuh nyamuk (insektisida) maupun jentiknya (larvasida), mengusir atau menghalau nyamuk (*repellent*) supaya nyamuk tidak menggigit. Disamping itu masih banyak senyawa kimia yang dapat digunakan dalam rangka pemberantasan nyamuk maupun jentiknya, yaitu senyawa-senyawa kimia yang bersifat menarik nyamuk (*attractant*), menghambat pertumbuhan (*Insect Growth Regulator* atau *Insect Growth Inhibitor*) dan memandulkan nyamuk⁵².

a) Senyawa Kimia alamiah

Penggunaan senyawa kimia alamiah disebabkan karena senyawa kimia nabati mudah terurai oleh sinar matahari sehingga tidak berbahaya, tidak merusak lingkungan dan tidak berpengaruh pada hewan non target. Penggunaan insektisida nabati seperti Ekstrak bunga krisan (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) untuk pengendalian sejak beberapa tahun sebelum masehi. Penelitian Campbell dan.....⁵³, menyatakan bahwa tanaman yang mengandung senyawa *alkaloid*, *nikotin*, *anabasin* dan *lupinin* dapat membunuh larva *Ae. aegypti* dan tanaman yang tergolong dalam family : *Panaceae*, *Cucurbitaceae*, *Umbelliferae*, *Leguminoseae*, *Labiatae*, *Liliaceae*,

⁵² Barodji, *Efikasi Insektisida Serumi 100 EC Terhadap Nyamuk Aedes Aegypti dan culex quinquefasciatus Metode Pengasapan*, (Badan Litbankes Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit, 2003), h 50.

⁵³ Eram Tunggul Pawenang, *Analisis Kolerasi, regresi, dan Jalur dalam Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), h 22.

Compositae, dan *Euphorbiaceae* beracun terhadap nyamuk. Ekstrak bawang putih (*Alium sativum*) dapat membunuh larva *Culex peus*, *Culex tarsalis*, dan *Ae. aegypti*.

Ajibau (1999: 43), telah melakukan uji efikasi daun tumbuhan paitan (*Tithonia diversifolia* Grey) terhadap larva *Ae. aegypti* dan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi yang efektif membunuh sebesar 90% berada pada dosis minimal 0,24%, sedangkan umur residu efektif setelah diamati 24 jam ternyata masih dapat membunuh larva sebesar 70-86%.

Pengendalian vektor penyakit, terutama larva nyamuk *Ae. aegypti* telah dilakukan pengujian potensi ekstrak daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb) dalam membunuh larva nyamuk. Hasil ujicoba 24 jam setelah perlakuan menunjukkan bahwa kematian 50% ada pada konsentrasi 2198,4655 ppm. Sedangkan kematian larva 48 jam setelah perlakuan menunjukkan kematian 50% ada pada konsentrasi 1669,1678 ppm.⁵⁴

b) Senyawa Kimia Non Nabati

Senyawa kimia non nabati berupa derivat-derivat minyak bumi seperti minyak tanah dan minyak pelumas yang mempunyai daya insektisida. Caranya minyak dituang diatas permukaan air sehingga terjadi suatu lapisan tipis yang dapat menghambat pernafasan larva nyamuk. Untuk mempertahankan daya insektisidanya maka harus diulangi misalnya 1 minggu sekali, sehingga terjadi suatu lapisan tipis yang dapat menghambat pernafasan larva nyamuk⁵⁵.

⁵⁴ Ibid, h. 54.

⁵⁵Eram Tunggul Pawenang, *op cit*, h. 24.

c) Senyawa Kimia Sintetik

Senyawa kimia sintetik dikenal dengan cara menggunakan larvasida. Larvasida yang biasa digunakan adalah Abate . Dosis yang digunakan adalah untuk 10 liter air cukup dengan 1 gr abate atau 10 gr untuk 100 liter air dan seterusnya. Bila tidak ada alat untuk menakar, gunakan sendok makan, satu sendok makan berisi 10 gr abate. Selanjutnya tinggal membaginya atau menambahnya sesuai dengan banyaknya air yang akan diabatisasi. Takaran tidak perlu tepat betul⁵⁶..

Pengendalian vektor secara kimia sintetik juga dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida. Insektisida merupakan semua bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membunuh, mengendalikan, mencegah, menolak atau mengurangi serangga⁵⁷. Sasaran insektisida berupa stadium dewasa maupun stadium pra dewasa. Insektisida merupakan racun yang bersuifat toksik, oleh sebab itu penggunaannya pun harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan organism yang bukan sasaran termasuk mamalia. Di dalam pelaksanaanya penentuan jenis insektisida, dosis dan metode aplikasi merupakan syarat yang penting dipahami dalam kenijakan pengendalian vektor. Aplikasi insektisida yang berulang di satuan ekosistem akan menimbulkan terjadinya resistensi serangga sasaran.pendapat itu juga didukung oleh, beliau mengatakan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat resistensi nyamuk terhadap pestisida. Variabel-variabel tersebut antara lain konsentrasi pestisida, frekuensi penyemprotan, dan luas penyemprotan. Fenomena

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Hadi UK. *Hama Pemukiman Indonesia, Fakultas Kedokteran Hewan,*(Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006), h. 31.

resistensi itu selanjutnya dapat dijelaskan dengan teori evolusi yaitu suatu ketika lokasi dilakukan penyemprotan pestisida, nyamuk yang peka akan mati, sebaliknya yang tidak peka akan melangsungkan hidupnya. Paparan pestisida yang terus menerus menyebabkan nyamuk beradaptasi sehingga jumlah nyamuk yang kebal bertambah banyak. Apalagi nyamuk yang kebal tersebut dapat membawa sifat resistensinya keketurunannya. Tak berhenti sampai disitu, nyamuk yang sudah kebal terhadap suatu jenis pestisida tertentu akan terus mengembangkan diri agar bisa kebal terhadap jenis pestisida yang lain⁵⁸.

2) Pengendalian Biologis

Pengendalian biologis dapat dilakukan dengan menyebarkan musuh alami seperti parasit dan predator di daerah terjangkit atau daerah *endemis*. Hasilnya tergantung pada iklim dan tidak akan daerah tersebut disemprot dengan insektisida. Berbagai jenis ikan pemakan larva dapat membantu program pengendalian vektor, seperti ikan nila merah (*Oreochromis niloticus*), nilai hitam (*Tilapia nilotica*), dan Tombro (*Cyprinus carpio*) dapat digunakan untuk penengendalian larva *Ae. aegypti*. Pengendalian vektor dengan bakteri *Bacillus thuringiensis* H-14 tidak menimbulkan kerugian pada mamalia, tanaman dan organisme bukan sasaran. Biosida ini dalam dosis 0,28 g/m² efektif membunuh jentik *Anopheles barbirostris* pada semua instar. Kematian rata-rata jentik *Anopheles barbirostris* 24 jam setelah aplikasi *Bacillus thuringiensis* H-14 berkisar antara 80% - 100% (Umi Widyastuti *dkk*, 1997: 34).

⁵⁸ Kasumbago, Dampak Fogging Insektisida Malathion, Fendona, Cynoff dan Icon terhadap Angka Jentik Nyamuk Aedes Aegypti, (Jakarta: Puslitbang Ekologi dan Status Kesehatan. Depkes Ri, 2005), h 11.

Bacillus thuringiensis memproduksi toksin yang terdapat dalam bentuk kristal yang sangat beracun dengan larutan alkalis yang terdapat dalam usus serangga terjadi perubahan kristal-kristalnya dan apabila diabsorpsi ke dalam darah menyebabkan kenaikan PH darah. Penggunaan *B. thuringiensis* H-14 (Vectobac 12 AS) untuk penurunan kepadatan jentik *Anopheles* di Teluk Dalam, Pulau Nias, setelah penyemprotan pertama dan kedua berkisar antara 70,44-89,74% (Mujiyono dkk, 1996: 41). Pengamatan eksperimental, eksploratif dan studi literatur tentang efek bioremediasi yang berorientasi pada perbaikan lingkungan menggunakan metode metode ekologi dalam melakukan perubahan kualitas air habitat nyamuk dengan suatu gagasan pengolahan air limbah rumah tangga, telah dilakukan oleh I (2001: 25) bahwa ada kecenderungan menurunnya kepadatan *Ae. aegypti* akibat efek bioremediasi beberapa jenis tumbuhan berintegrasi dengan efek Pengendalian Hama Terpadu (PHT)⁵⁹.

c) Secara Fisik

Menurut (Depkes RI, 2003), cara fisik untuk mengurangi atau menghindari gigitan nyamuk atau gangguan nyamuk dilakukan dengan pemasangan kawat kasa (kawat nyamuk) pada semua lubang yang ada di rumah, seperti lubang angin, jendela, pintu dan lainnya. Cara ini sangat baik dan bersifat permanen, walaupun dalam pembuatannya diperlukan biaya yang mahal. Tidur menggunakan kelambu sangat

⁵⁹ Gede Seregeg, *Penyakit Demam Berdarah dan Cara Penanggulangannya. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jurnal* (Vol. XV 2001), h, 41-46.

dianjurkan untuk mengurangi gigitan nyamuk waktu tidur di daerah endemis. Upaya untuk mengurangi jumlah kepadatan nyamuk antara lain dengan cara:

- 1) Menguras air dan menyikat dinding tempat penampungan air seminggu sekali. Kegiatan ini dikenal dengan pembersihan sarang nyamuk. Menyikat merupakan hal yang penting, karena telur nyamuk *Aedes* dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan dalam kekeringan.
- 2) Mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air waktu hujan, seperti kaleng, ban-ban bekas dan lain-lain atau mengusahakan waktu hujan air tidak tertampung pada tempat-tempat yang bisa menampung air di lingkungan rumah (memotong bambu tepat ruas, tempurung kelapa dibalik).
- 3) Membersihkan atau mengangkat tanaman air atau lumut di tempat perindukan nyamuk penular.
- 4) Penggelontoran atau membuat banjir buatan dengan membuat dam-dam atau pintuair pada tempat perindukan yang berupa genangan-genangan air sepanjang sungai atau selokan-selokan yang airnya tergenang pada musim.
- 5) Mengalirkan air, penimbunan atau pemerataan tempat perindukan yang berupa genangan-genangan air di tanah sebagai akibat penggalian atau alamiah⁶⁰.

⁶⁰ Depkes RI, *Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Di Indonesia* (Jakarta: Ditjend P2PL, 2003), h 4.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan cara menguji efektivitas temephos dan ekstrak daun sirih (*Piper betle*) terhadap perkembangan larva *Ae. aegypti*.

B. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi temephos dan ekstrak daun sirih (*Piper betle*).
2. Variabel Terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah jumlah perkembangan larva *Ae. aegypti* yang mati.

C. Devenisi operasional

1. Uji efektivitas dalam penelitian ini di defenisikan sebagai kemampuan abate dan ekstrak daun sirih (*Piper betle*) terhadap perkembangan larva *Ae. aegypti*.
2. Ekstrak daun sirih (*Piper betle*) adalah ekstrak dalam bentuk cair yang diperoleh dari hasil penyaringan dan destilasi serbuk daun sirih (*Piper betle*) dengan menggunakan pelarut etanol 96%.

3. Abate (Temephos) merupakan larvasida pembasmi larva/jentik nyamuk, yang terbuat dari pasir yang dilapisi dengan zat kimia yang dapat membunuh jentik/larva nyamuk
4. Larva *Ae. aegypti* adalah larva instar I, instar II, instar III dan instar IV yang di ujikan terhadap abate dan ekstrak daun sirih pada kosentrasi kosentrasi 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, dan 10 mg.
5. Tempat Penampungan Air (TPA) yaitu tempat untuk pengambilan larva *Ae. aegypti*.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Pengambilan sampel larva *Ae. Aegypti* diambil secara acak di berbagai tempat penampungan air (TPA) yang terdapat larva, misalnya pada bak mandi, tempayan, ember, dan baskom.
2. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari - Agustus 2011 ekstraksi di laboratorium Farmakognosi-Fitokimia Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan pengujian ekstrak daun sirih (*Piper betle*) dan temephos terhadap larva *Ae. aegypti* di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Makassar .

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan adalah blender, botol sampel, pisau, pipet, wadah plastik, stopwatch, gelas kimia, tabung reaksi, cawan petri, toples, pipet skala, wadah pelastik, pisau, destilatop, mikroskop dan bunsen.

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah temephos, ekstrak daun sirih (*Piper betle*), larva *Ae. aegypti*, air, etanol 96%. HCL 2 %, larutan dragendorf, larutan mayer, air panas, HCL 2 N.

F. Prosedur Penelitian

1. Cara Pembuatan Ekstrak daun sirih (*Piper betle*)

- a. Daun sirih dicuci, kemudian ditiriskan lalu diangin-anginkan selama seminggu tanpa terkena sinar matahari. Daun yang sudah kering digiling atau diblender hingga berbentuk serbuk.
- b. Memasukkan serbuk ke dalam wadah (*becker glass*) sebanyak 100 gr kemudian menambahkan etanol 96% 500 ml sehingga serbuk terendam. Kemudian mengaduk dan mendinginkan selama 24 jam. Menyaring lalu didestilasi (memanaskan) selama satu jam. Kemudian mendinginkan selama 2 hari tanpa ditutup sehingga etanolnya menguap. Mendapatkan ekstrak

kental daun sirih (*Piper betle*) 50 mg kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau botol.

2. Persiapan Temephos

Sampel bubuk temephos diperoleh dari Dinas Kesehatan Makassar.

3. Cara Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Alkaloid dan Saponin

a. Identifikasi Alkaloid

- 1) 5 g serbuk daun sirih dilarutkan ke dalam botol di sari dengan etanol 96% 10 ml. Kemudian dilakukan pengocokan berkali-kali dan sari yang diperoleh kemudian didestilasi.
- 2) Dilarutkan dengan 1,5 ml HCL 2 %. Kemudian dibagi menjadi tiga tabung, masing-masing tabung diisi larutan ekstrak daun sirih 10 ml, tabung I sebagai pembanding, tabung II ditetesi dengan 2 atau 3 tetes larutan dragendorff positif jika ada endapan jingga kecoklatan. Kemudian tabung III ditetesi dengan 2 atau 3 tetes larutan mayer, positif jika ada endapan putih kekuningan.

b. Identifikasi Saponin

- 1) Memasukkan 3 g serbuk yang diperiksa dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan dengan air panas 10 ml, kemudian didinginkan lalu dikocok kuat-kuat selama 10 detik.

- 2) Keberadaan saponin akan ditandai dengan terbentuknya buih yang mantap selama tidak kurang 10 menit setinggi 1-10 cm. Pada penambahan HCL 2 N buih tidak hilang.

4. Persiapan Sampel Larva *Ae. aegypti*

Larva nyamuk *Ae. aegypti* yang digunakan dalam penelitian ini adalah instar I, II, III dan IV.

- a) Instar I tubuhnya sangat kecil, berukuran (1-2 mm), rambut-rambut (seta) pada dada (thorax) belum jelas, dan corong pernafasan (siphon) bening.
- b) Instar II ukuran (2,5-3,9 mm), rambut dada belum jelas, dan corong pernafasan sudah berwarna hitam.
- c) Instar III berukuran 4-5 mm, rambut-rambut dada mulai jelas dan corong pernafasan berwarna coklat kehitaman.
- d) Instar IV telah lengkap struktur anatominya dan jelas tubuh dapat dibagi menjadi bagian kepala (cephal), dada (thorax), dan perut (abdomen).

5. Cara Pengujian Temephos dan Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*) terhadap Larva *Ae. aegypti*

- a) **Uji Efektivitas Temephos terhadap Larva *Ae. aegypti***
 - 1) Menyiapkan wadah untuk memasukkan sampel.
 - 2) Larva instar I, II, III, dan IV masing-masing sebanyak 20 ekor kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah terisi air 2 liter

lalu ditambahkan temephos pada konsentrasi 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg dan 10 mg.

- 3) Melakukan pengamatan terhadap larva untuk setiap perlakuan konsentrasi yaitu konsentrasi 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg dan 10 mg dan dilakukan perhitungan larva yang mati setiap 4 jam pertama, 8 jam, dan 12 jam.

1) Uji Efektivitas Ekstrak daun Sirih (*Piper betle*) terhadap Larva *Ae. aegypti*

- a) Menyiapkan wadah plastik untuk memasukkan sampel.
- b) Larva instar I, II, III, dan IV masing-masing sebanyak 20 ekor kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah terisi air 2 liter lalu ditambahkan ekstrak daun sirih (*Piper betle*) pada konsentrasi 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg dan 10 mg.
- c) Melakukan pengamatan terhadap larva untuk setiap perlakuan konsentrasi yaitu konsentrasi 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg dan 10 mg dan dilakukan perhitungan larva yang mati setiap 4 jam pertama, 8 jam, dan 12 jam.

G. Pengumpulan Data Primer

Data yang diperoleh dilakukan dengan cara menghitung jumlah larva yang mati pada setiap konsentrasi 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, dan 10 mg. Menghitung larva yang mati pada 4 jam, 8, dan 12 jam.

H. Analisa Data

Pengolahan data dengan menggunakan rumus Mulla *et. al.* (1971) dalam Blondine *et, al.*, 2005) :


$$\text{Persentase kematian} = \frac{\sum \alpha}{\sum \beta} \times 100$$

Keterangan :

$\sum \alpha$ = Jumlah Kumulatif Yang Mati

$\sum \beta$ = Jumlah Jentik

- Analisis data dengan ANOVA



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa temephos dan ekstrak daun sirih (*Piper betle*) berpengaruh terhadap perkembangan larva nyamuk *Ae. aegypti* (instar I - IV). Data hasil perlakuan uji efektivitas temephos dan ekstrak daun sirih (*Piper betle*) disajikan sebagai berikut:

1. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*) dan Temephos terhadap Perkembangan larva *Ae. aegypti* Instar I.

1.1 Perlakuan dengan menggunakan Ekstrak Daun Sirih

Persentase kematian larva *Ae. aegypti* instar I dengan menggunakan ekstrak daun sirih dalam waktu 4 jam baik konsentrasi 2 mg/ 2 liter air, 4 mg/2 liter air, 6 mg/2 liter air, 8 mg/2 liter air maupun 10 mg/2 liter air menunjukkan kematian larva yang tinggi (52-98%) dan mencapai kematian tertinggi (100%) dalam waktu 8 jam.




Histogram 1. Persentase kematian larva instar I dengan menggunakan Ekstrak daun sirih (*Piper betle*) pada setiap jam pengamatan dengan berbagai konsentrasi

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi ekstrak daun sirih tidak memberikan efek yang nyata terhadap kematian larva ($\alpha = 1,00$), sebaliknya terhadap perlakuan waktu menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih efektif membunuh larva dalam kurun waktu 8 jam ($\alpha = 0,00$).

2.1 Perlakuan dengan menggunakan Temephos

Persentase kematian larva instar I dengan menggunakan temephos menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 2 mg/2 liter air, 4 mg/2 liter air, 6 mg/ 2 liter air, 8 mg/ 2 liter air, maupun pada konsentrasi 10 mg/ 2 liter air dalam kurun waktu 4 jam menunjukkan kematian 100%.




Histogram 2. Persentase kematian larva instar I dengan menggunakan abate setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi

2. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*) dan Temephos Terhadap Perkembangan larva *Ae. aegypti* Instar II.

2.1 Perlakuan dengan menggunakan Ekstrak Daun Sirih

Persentase kematian larva *Ae. aegypti* instar I dengan menggunakan ekstrak daun sirih dalam waktu 4 jam baik konsentrasi 2 mg/ 2 liter air, 4 mg/2 liter air, 6 mg/2 liter air, 8 mg/2 liter air maupun 10 mg/2 liter air menunjukkan kematian larva yang tinggi (33-100%) dan mencapai kematian tertinggi (100%) dalam waktu 8 jam. Kecuali perlakuan konsentrasi 10 mg/2 liter air menunjukkan kematian larva 100% dalam waktu 4 jam.




Histogram 3. Persentase kematian larva instar II dengan menggunakan ekstrak daun sirih, setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi ekstrak daun sirih tidak memberikan efek yang nyata terhadap kematian larva ($\alpha = 1,00$), sebaliknya terhadap perlakuan waktu menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih efektif membunuh larva dalam kurun waktu 8 jam.

2.2. Perlakuan dengan menggunakan Temephos

Persentase kematian larva *Ae. aegypti* instar II dengan perlakuan temephos konsentrasi 2 mg/ 2 liter air, 4 mg/2 liter air, 6 mg/2 liter air, 8 mg/2 liter air maupun 10 mg/2 liter air menunjukkan kematian larva 100% dalam waktu 4 jam.




Histogram 4. Persentase kematian larva instar II dengan menggunakan temephos, setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi

3 Uji Efektivitas Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*) dan Temephos terhadap Perkembangan larva *Ae. aegypti* Instar III

3.1 Perlakuan dengan menggunakan Ekstrak Daun Sirih

Persentase kematian larva *Ae. aegypti* instar I dengan menggunakan ekstrak daun sirih dalam waktu 4 jam baik konsentrasi 4 mg/2 liter air, 6 mg/2 liter air maupun 8 mg/2 liter air 10 mg/2 liter air menunjukkan kematian larva yang tinggi (32-75%) dan mencapai kematian 100% dalam waktu 8 jam. Sedangkan perlakuan 2 mg/ 2 liter air menunjukkan kematian larva 23 % dalam waktu 4 jam, 85% dalam waktu 8 jam dan 100% dalam waktu 12 jam. Kecuali perlakuan konsentrasi 10 mg/2 liter air menunjukkan kematian larva 100% dalam waktu 4 jam.


Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi ekstrak daun sirih tidak memberikan efek yang nyata terhadap kematian larva ($\alpha = 1,00$), sebaliknya terhadap perlakuan waktu menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih efektif membunuh larva dalam kurun waktu 8 jam.



Histogram 5. Persentase kematian larva instar III dengan menggunakan ekstrak daun sirih setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi

3.2 Perlakuan dengan menggunakan Temephos

Persentase kematian larva *Ae. aegypti* instar III dengan perlakuan temephos konsentrasi 2 mg/ 2 liter air, 4 mg/2 liter air, 6 mg/2 liter air, 8 mg/2 liter air maupun 10 mg/2 liter air menunjukkan kematian larva 100% dalam waktu 4 jam.




Histogram 6. Persentase kematian larva instar III dengan menggunakan temephos pada setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi

4 Uji Efektivitas Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*) dan Temephos terhadap Perkembangan larva *Ae. aegypti* Instar IV

4.1 Perlakuan dengan menggunakan Ekstrak Daun Sirih

Persentase kematian larva *Ae. aegypti* instar IV dengan menggunakan ekstrak daun sirih dalam waktu 4 jam baik konsentrasi 6 mg/2 liter air, 8 mg/2 liter air maupun 10 mg/2 liter air menunjukkan kematian larva yang tinggi (35-87%) dan mencapai kematian 100% dalam waktu 8 jam. Perlakuan 2 mg/ 2 liter air menunjukkan kematian larva 7 % dalam waktu 4 jam, 85% dalam waktu 8 jam dan 100% dalam waktu 12 jam. Sedangkan perlakuan 4 mg/2 liter air menunjukkan

kematian larva 17% dalam waktu 4 jam, 95% dalam waktu 8 jam, dan 100% dalam waktu 12 jam.




Histogram 7. Persentase kematian larva instar IV dengan menggunakan ekstrak daun sirih pada setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi ekstrak daun sirih tidak memberikan efek yang nyata terhadap kematian larva ($\alpha = 1,00$), sebaliknya terhadap perlakuan waktu menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih efektif membunuh larva dalam kurun waktu 12 jam ($\alpha = 0,00$).

4.2 Perlakuan dengan menggunakan Temephos

Persentase kematian larva *Ae. aegypti* instar IV dengan perlakuan temephos konsentrasi 2 mg/ 2 liter air, 4 mg/2 liter air, 6 mg/2 liter air, 8 mg/2 liter air maupun 10 mg/2 liter air menunjukkan kematian larva 100% dalam waktu 4 jam.



Histogram 8. Persentase kematian larva instar IV dengan menggunakan temephos pada setiap jam pengamatan pada berbagai konsentrasi

Pengamatan uji efektivitas terhadap Kontrol (air) tidak ditemukan adanya larva yang mati. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada faktor lain yang mematikan larva *Ae. aegypti*, dibuktikan dengan tidak ditemukannya larva yang mati pada kontrol. Larva tetap hidup dan berkembang menjadi pupa dan selanjutnya menjadi nyamuk dewasa.

Perubahan morfologi larva saat perlakuan dengan menggunakan ekstrak daun sirih, ditandai dengan adanya kerusakan tubuh larva akibat keracunan (intoksifikasi). Tampak tubuh larva menjadi berwarna hitam. Pada larva instar I kerusakan tampak pada kepala larva yang hancur dan berwarna kecoklatan setelah perlakuan ekstrak terhadap larva, sedangkan sebelum mengkonsumsi ekstrak warna larva bening dan struktur kepalanya tidak sempurna (Gambar 8).



Gambar 8. Larva *Ae. aegypti* Instar I yang mengalami kerusakan

Pengamatan terhadap larva instar II tidak jauh berbeda dengan larva instar I, tampak kepala mengalami kerusakan akibat keracunan yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar10. Larva *Ae.aegypti* Instar II yang mengalami kerusakan

Pengamatan terhadap larva instar III dan IV disajikan dilihat pada gambar berikut :



Gambar 11. Larva *Aedes aegypti* Instar III dan IV yang mengalami kematian

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa temephos lebih efektif mematikan larva *Ae. aegypti* dibandingkan dengan ekstrak daun sirih (*Piper betle*).

1. Efektifitas Temephos terhadap Perkembangan Larva *Ae. aegypti*

Tingkat kematian larva *Ae. aegypti* (instar I - IV) dengan menggunakan temephos dalam waktu 4 jam diperoleh sebesar 100%, Temephos terbukti efektif sebagai larvasida bagi larva *Ae. Aegypti*. Temephos merupakan senyawa fosfat organik yang mengandung gugus *Phosphorothioate*. Seperti halnya senyawa-senyawa fosfat organik lainnya, temephos bersifat *anticholinesterase* yang kerjanya menghambat enzim *cholinesterase* baik pada vertebrata maupun invertebrata sehingga menimbulkan gangguan pada aktivitas syaraf karena tertimbunnya

acetylcholin pada ujung syaraf tersebut⁶¹. Hal inilah yang mengakibatkan kematian terhadap larva pada berbagai tahapan perkembangan. Penetrasi temephos ke dalam tubuh larva berlangsung sangat cepat dimana dalam waktu 1-4 jam senyawa menyebabkan kematian. Keracunan fosfat organik pada serangga diikuti oleh ketidaktenangan, hipereksitasi, tremor dan konvulsi, kemudian kelumpuhan otot (paralisa), pada larva nyamuk kematiannya disebabkan oleh karena tidak dapat mengambil udara untuk bernafas¹.

2. Efektivitas Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*) terhadap Perkembangan Larva *Ae. aegypti*

Pada instar I dan II tingkat kematian larva tidak jauh berbeda dimana instar I mengalami kematian larva 52% dalam waktu 4 jam dan 100% dalam waktu 8 jam dan dengan konsentrasi 2 mg/2 liter air, instar II mengalami kematian larva 33% dalam waktu 4 jam dan 100% dalam waktu 8 jam. Konsentrasi yang menunjukkan pengaruh pada kematian larva adalah konsentrasi 2 mg/ 2 liter air. Hal ini disebabkan karena daya tahan larva pada tahapan ini terhadap berbagai perubahan lingkungan/pengaruh ekstrak masih rendah.

Perlakuan ekstrak daun sirih terhadap larva instar III dan IV menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dimana persentase kematian yang ditunjukkan mengalami penurunan sejalan dengan peningkatan/perkembangan hidup larva. Ini

⁶¹ Depkes RI, 2003.. *Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Di Indonesia* .Jakarta: Ditjend P2PL..

disebabkan karena larva instar II dan IV sudah memiliki kemampuan untuk hidup yang lebih baik dalam lingkungannya. Hal ini ditunjukkan pada perlakuan konsentrasi 2 mg/2 L yang tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan larva tersebut. Sama halnya larva Instar IV yang diberi perlakuan ekstrak daun sirih konsentrasi 2 mg dalam waktu 4 jam hanya menunjukkan persentase kematian sebesar 7%. Makin bertambahnya ukuran larva akan semakin menambah kemampuan/daya tahan hidup larva tersebut sehingga pemberian ekstrak daun sirih hanya menyebabkan tingkat kematian yang rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak daun sirih dapat menyebabkan kematian terhadap larva *Ae. aegypti*. Kematian larva kemungkinan disebabkan oleh kandungan senyawa kimia dalam hal ini alkaloid dan saponin yang terdapat dalam ekstrak daun sirih tersebut. Senyawa kimia tersebut dapat meracuni larva lewat dinding tubuh ataupun melalui jalan pernafasan⁶². Pada saat ekstrak dimasukkan ke dalam media air tempat hidup larva, media kemudian berubah warna menjadi pekat kehijauan dan adanya lapisan minyak. Makin tinggi nilai konsentrasi yang digunakan dalam perlakuan, maka akan makin tebal pula lapisan minyaknya. Lapisan minyak yang dihasilkan oleh ekstrak daun sirih berpengaruh dalam proses pengambilan oksigen saat larva berada dalam air, sehingga larva akan mengalami gangguan pernafasan yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Senyawa-senyawa yang ada pada ekstrak daun sirih diduga memiliki sifat sebagai racun dehidrasi

⁶² Lia Ayu Widjaya, *Daya Bunuh Ekstrak Biji Kecubang Terhadap Larva Aedes Aegypti*. Skripsi. (Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), h. 39.

(*dessicant*), yaitu racun kontak yang akan menyebabkan kematian pada larva karena larva kehilangan cairan tubuhnya secara terus menerus Alkaloid dan saponin merupakan kelompok senyawa sekunder yang banyak dijumpai pada tumbuhan, alkaloid bermanfaat sebagai pelindung tumbuhan dari serangga /serangan hama atau penyakit, pengatur tumbuh, atau sebagai basa mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion⁶³.

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak daun sirih pada berbagai konsentrasi kurang efektif dalam menghambat perkembangan larva, baik pada instar I, II, III maupun instar IV ($\alpha = 1,00$). Hal dibuktikan dengan persentase kematian larva pada berbagai konsentrasi yang bervariasi. Sebaliknya pemberian ekstrak daun sirih pada berbagai waktu pengamatan menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih efektif menghambat perkembangan larva ($\alpha = 0,00$). Hal ini dibuktikan dengan persentase kematian larva sebesar 100% dalam kurun waktu 12 jam pada instar IV dan 8 jam pada instar I, II dan III.

⁶³ *Ibid.*

BAB V KESIMPULAN

A.

Kesimpul

an

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Temephos pada berbagai konsentrasi efektif menghambat perkembangan larva instar I – IV dalam waktu 4 jam karena adanya senyawa kimia *anticholinesterase* yang kerjanya menghambat enzim *cholinesterase* baik pada invertebrata maupun vertebrata.
2. Ekstrak daun sirih (*Piper betle*) pada berbagai konsentrasi kurang efektif menghambat perkembangan larva ($\alpha = 1,00$), sebaliknya efektif sejalan dengan perlakuan waktu ($\alpha = 0,00$).

B.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk sediaan ekstrak daun sirih (*Piper betle*) yang dapat digunakan sebagai Larvasida untuk menghambat nyamuk dewasa dengan penambahan konsentrasi seperti halnya menggunakan baygon semprot.

DAFTAR PUSTAKA

- Aradilla Ashyi Sikka, *Uji Efektivitas Larvasida Ekstrak Ethanol Daun Mimba (Azadiracthta indica) Terhadap Larva Aedes aegypt* **Skripsi**: Semarang, Fakultas Kedokteran Diponegoro, 2009.
- Barodji. . *Efikasi Insektisida Serumi 100 EC Terhadap Nyamuk Aedes Aegypti dan culex quinquefasciatus Metode Pengasapan*. Badan Litbankes Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit, 2003.
- Cara Ekstrksi Minyak Atsiri, *Artikel Agromedia*, <http://distributor.agromedia.net/artikel/>, (23 Oktober 2010).
- Clements, A.N.. *The Biology of Mosquitos, Vol. 2 : Sensory Receptcion and Behafior*, New York, CABI Publishing, 1999.
- Delong dan Borrer DM, Dj, *An Introduction to the study of Insec.* USA Library of Congres, Catalog Card, 1954.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Yayasan Pentahsis dan Penerjemah Al-Qur'an, 1990.
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah : Percetakan Alqur'an Raja Fahd, 2007),
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD)*”(Jakarta,: departemen Kesehatan, 1992.
- Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Ekologi dan Aspek Perilaku Vektor*. Jakarta: Ditjen P2M & PL, 2004.
- Depkes Ri, . *Survai entomologi DBD*. Ditjen P3M dan PLP Depkes RI, 1990.
- Depkes RI.. *Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Di Indonesia* .Jakarta: Ditjend P2PL. 2003.
- Dinas Kesehatan PSN. *Mencegah dan memberantas DBD*. Dinkes Propinsi Dati I Jateng Semarang: 1989.

- Distribution Rao T. R. , Density and Seasonal Prevalence of *Aedes aegypti* in the Indian Subcontinent and South-East Asia. *Bull.org.mond,santé & bull. Wld. Hlth Org Jurnal* Distribusi: 1967.
- Gadahunada S dkk , “*Parasitologi Kedokteran Edisi ke 3*” Jakarta: Indonesia Press 2000
- Hadi, *Tumbuhan Berkhasiat Larvasida* Bogor: IPB Institut Pertanian Bogor: 2006.
- Hafshah, *Khasiat Daun Sirih*”, [http://id.Org/khasiat Daun Sirih.com](http://id.Org/khasiat%20Daun%20Sirih.com), 10 November 2010.
- Haslthead, S.B. *Dengue : Tropical medicine Science and Practce*, vol.5. Imperial College Press: 2008.
- J.B Harborne, *Metode Fitokimia Modern Menganalisis Tumbuhan*, (Bandung : Institut Teknoligi Bandung, 2006), h. 102
- Mooryati, S. *Alam Sumber Kesehatan*, 347-349, Balai Pustaka, Jakarta: 1998.
- Paweang Eram Tunggul., *Analisis Kolerasi , regresi, dan Jalur dalam Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia: 1999. Press. Hal:45-51.
- Ruede, *Pictorial Keys For The Identification Of Mosquitoes (Diptera Culicidae) Associated With Dengue Virus Transmission*, Syahribulan, *Kunci Identifikasi Nyamuk Ordo Diptera Sebagai Pembawa Virus Dengue : New Zeland: Magnolia Pres Aukland; 2004.*
- Ruide. L. M, *Zootaxa: Key pictorial for the identivication of mosquitos (Diptera: Culicidae) associate with dengue transmission (new zaeland: magnolia Press: 2005.*
- Seregeg Gede.. *Penyakit Demam Brdarah dan Cara Penanggulangannya. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jurnal :2001, Vol. XV*
- Soegijanto S.. *Demam Berdarah Dengue. Surabaya : Airlangga University :2004.*
- Soeroso, Thomas. *Tinjauan keadaan dan dasar-dasar dalam pemberantasan Demam Berdarah di Indonesia.* Jakarta : Sub. Dit Arbovirus Dit P2B2 Direktorat P3M: 1983.

- Subarnas, A, S. *Farmakologi dan penggunaannya sebagai obat tradisional Warta Tumbuhan Obat Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 1993.
- Sudirman Dewi, ” [http://id.Org.Bloger/ Abate](http://id.Org.Bloger/Abate). 13 Desember 2010.
- Sugianti Budi. *Pemanfaatan Tumbuhan obat Tradisional Dalam Pengendalian Penyakit*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2005.
- Sumarmo, *Demam Berdarah Dengue di Indonesia, Situasi Sekarang dan Harapan di Masa Mendatang. Semilokal Berbagai Aspek Demam Berdarah Dengue dan Penanggulangannya*, (Jakarta: UI Press, 1985)
- Supartha, I.W., *Pengendalian Terpadu Vector Virus Demam Berdarah Dengue Aedes aegypti (Linn.)*. Denpasar: Fakultas Pertanian Universitas Udayana: 2008.
- Suroso T. “ *Masalah Demam Berdarah Dengue di Indonesia dalam Naskah Lengkap. Pelatihan Dokter spesialis Penyakit Dalam dan Tatalaksana kasus Demam Berdarah Dengue DBD* Jakarta: Balai Penerbit FKUI: 2004.
- Syarifa, U.. *Analisis Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Jentik di RW III Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun. Karya Tulis Ilmiah*. Semarang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 2007.
- Syukur, C. dan Hernani.. *Budidaya Tanaman Obat Tradisional*. PT.Penebar Swadaya, Jakarta:1999
- Tjitrosoepomo *Daun Sirih (Piper betle)*. [http:// Let' s Study .co.id](http://Let'sStudy.co.id) (10 November 2010)
- Veriswan Ivan, *Uji Efektivitas Abate Dalam Penghambatan Larva Aedes Aegypti, Skripsi* .Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2006.
- Womack, *The yellow fever mosquito, Aedes aegypti*. [http:// www. Wing Beat. co . id](http://www.WingBeat.co.id) (3 November 2010).
- Womack, M.. *The yellow fever mosquito, Aedes aegypti*. Wing Beats, Vol. 5(4), 1993
- Yahya Harun, “Menyikap Rahasia Alam Semesta”, <http://Menyikap.com> (Diakses Tanggal 20 Desember 2010)

Yotopranoto S, *Dinamika Populasi Vektor Pada Lokasi Dengan Kasus Demam Berdarah Dengue yang Tinggi di Kotamadya Surabaya*, Surabaya: Majalah Kedokteran Tropis Indonesia. 1998



Lampiran 5. Hasil uji one-way ANOVA uji efektivitas ekstrak daun sirih terhadap perkembangan larva *Ae. aegypti* instar I – IV

1. Hasil uji one-way ANOVA uji efektivitas ekstrak daun sirih terhadap perkembangan larva *Ae. aegypti* instar I - IV

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: angmati

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1614,900(a)	6	269,150	8,988	,000
Intercept	1500,000	1	1500,000	50,091	,000
konsentrasi	,000	4	,000	,000	1,000
waktu	1614,900	2	807,450	26,964	,000
Error	1587,100	53	29,945		
Total	4702,000	60			
Corrected Total	3202,000	59			

a R Squared = ,504 (Adjusted R Squared = ,448)

2. Hasil uji one-way ANOVA uji efektivitas ekstrak daun sirih terhadap perkembangan larva *Ae. aegypti* instar II

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: angmati

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1146,900(a)	6	191,150	5,772	,000
Intercept	1500,000	1	1500,000	45,297	,000
kosentrasi	,000	4	,000	,000	1,000
waktu	1146,900	2	573,450	17,317	,000
Error	1755,100	53	33,115		
Total	4402,000	60			
Corrected Total	2902,000	59			

a R Squared = ,395 (Adjusted R Squared = ,327)

3. Hasil uji one-way ANOVA uji efektivitas ekstrak daun sirih terhadap perkembangan larva *Ae. aegypti* instar III

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: angmati

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	708,100(a)	6	118,017	3,824	,003
Intercept	1500,000	1	1500,000	48,597	,000
kosentrasi	,000	4	,000	,000	1,000
waktu	708,100	2	354,050	11,471	,000
Error	1635,900	53	30,866		
Total	3844,000	60			
Corrected Total	2344,000	59			

a R Squared = ,302 (Adjusted R Squared = ,223)

4. Hasil uji one-way ANOVA uji efektivitas ekstrak daun sirih terhadap perkembangan larva *Ae. aegypti* instar IV

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: angkakematian

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	300,400(a)	6	50,067	1,589	,169
Intercept	1500,000	1	1500,000	47,616	,000
konsentrasi	,000	4	,000	,000	1,000
waktu	300,400	2	150,200	4,768	,012
Error	1669,600	53	31,502		
Total	3470,000	60			
Corrected Total	1970,000	59			

a R Squared = ,152 (Adjusted R Squared = ,057)

Lampiran 6 . Foto Saat Melakukan Pembuatan Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*)



Melakukan destilasi



Setelah Didestilasi




Lampiran 7, Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Alkaloid dan Saponin Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle*)



A. Uji alkaloid

B. Uji saponin




Keterangan
A= kontrol (Pembanding)
B= Terdapat Endapan putih Kekuningan
C= Terdapat endapan jingga kecoklatan

Keterangan:
Buih tidak hilang saat penambahan HCL 2 N.

Lampiran 8. Pengambilan Sampel jentik Pada TPA



Sampel Jenitik




Bubuk Abate (Temephos)




Lampiran 9, Saat melakukan pengujian ekstrak daun sirih (*Piper betle*) dan Temephos terhadap larva *Ae. Aegypti*.

1. Saat melakukan pengujian ekstrak daun sirih (*Piper betle*) terhadap larva *Ae. aegypti*



2. Saat melakukan pengujian temephos terhadap larva *Ae. aegypti*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NURQAMARIAH, lahir di kota Kolaka pada tanggal 1 Januari 1990, merupakan buah hati dari pasangan H. Muh. Zubair Wahid dan Hj. St. Rosnaeni, S. Pd. Penulis menempuh pendidikan formal pada tahun 1995-2001 di SD I Negeri Iwoimendaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan melanjutkan pendidikan di SMP Ulukalo Kec Wolo Kab. Kolaka pada tahun 2001 - 2004. Pada tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan di MAN I Radhiyatan Mardhiyah Kota Balikpapan (Kalimantan Timur) dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis

melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui ujian SPMB dan di terima di Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Selama menjalani kehidupan dengan status mahasiswi penulis aktif pada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Biologi, tahun 2010. Penulis menyelesaikan rangkaian tugas akhir, mengikuti Kerja Praktek (KP) Di Balitsereal Maros Sulawesi Selatan pada tahun 2010, Kuliyah Kerja Nyata (KKN) Desa Je'netallasa Kec. Barombong Kab. Gowa pada tahun 2011. Terakhir penulis menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan dengan menulis skripsi yang berjudul “ *Uji Efektivitas Temephos dan Ekstrak Daun Sirih (Piper betle) Terhadap Perkembangan Larva Aedes. aegypti.*

