

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE  
PADA NY “A” DENGAN INERSIA UTERI  
DI RSUD HAJI MAKASSAR  
TAHUN 2017**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan  
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**NURJAYANTI**  
**NIM. 70400114002**  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**JURUSAN KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjayanti  
Nim : 70400114002  
Tempat tanggal lahir : Sungguminasa, 18 Agustus 1996  
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan  
Fakultas/Program : Kedokteran dan ilmu kesehatan/Diploma  
Alamat : Bontonomate'ne Kelurahan Bontonompo  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Pada Ny "A" dengan Inersia Uteri Di RSUD Haji Makassar Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan dupliat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh oleh demi hukum

Samata-Gowa, 28 Agustus 2017

Penyusun

**NURJAYANTI**  
**70400114002**

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Pada Ny “A” dengan Inersia Uteri di RSUD Haji Makassar Tahun 2017”**, yang disusun oleh **Nurjayanti NIM: 70400114002**, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 29 Agustus 2017 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 29 Agustus 2017 M

7 Dzulhijjah 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Firdayanti, S.SiT, M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **dr. Raully Rahmadani, M.Kes** (.....)

Penguji I : **dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes** (.....)

Penguji II : **Dr. Wahyuddin G, M.Ag** (.....)

Dekan

**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**  
NIP: 19550203 198312 1 001



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, semoga rahmat, hidayah, tercurah kepada kita semua sehingga segala aktivitas bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabiyullah Muhammad Saw yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun proposal yang berjudul **“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA NY “A” DENGAN INERSIA UTERI DI RSUD HAJI MAKASSAR”**.

Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun merupakan masukan dan penyempurnaan selanjutnya sangat dibutuhkan. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya. Untuk hal itu pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pattabari, M.Si, sebagai rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN

Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.sc, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, dan pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, M.keb, selaku ketua jurusan Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajarkan kami banyak hal.
4. Ibu Firdayanti, S.SiT, M.keb, selaku sekretaris jurusan Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan selaku pembimbing I Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb.
5. Ibu dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG, M.kes, dan dr. Raully Rahmadani, M.kes, selaku pembimbing II Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb.
6. Ibu dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku penguji I Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan banyak masukan dan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb.

7. Bapak Dr. Wahyuddin G, M.Ag selaku penguji agama Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan masukan serta motivasi khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menimba ilmu di Jurusan Kebidanan.
9. Yang tercinta orang tua saya serta saudaraku dan orang-orang yang memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang tak henti-hentinya kepada saya.
10. Kepada semua saudari seperjuanganku di Kebidanan UIN Alauddin Makassar Angkatan 2014 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan motifasinya serta do'a kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya semoga menjadi ibadah dan amal jariyah. Amin

Samata-Gowa, 2017

Penulis

**NURJAYANTI**  
**70400114002**

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN KTI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup Penulisan .....	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan .....	6
E. Metode Penulisan .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	9
A. Tinjauan Umum Persalinan Normal.....	9
B. Tinjauan Umum Inersia Uteri .....	17
C. Konsep Dasar Manajemen Kebidanan .....	23
D. Tinjauan Islam Tentang Persalinan .....	31

BAB III STUDI KASUS.....	37
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah Varney .....	37
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan.....	83
BAB IV PEMBAHASAN.....	101
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar .....	101
B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual .....	106
C. Langkah III Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial .....	108
D. Langkah IV Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi.....	110
E. Langkah V Rencana Asuhan Kebidanan.....	111
F. Langkah VI Implementasi Asuhan Kebidanan .....	114
G. Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan .....	115
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119

**DAFTAR GAMBAR**


Gambar 1.1 Mekanisme Persalinan Normal .....13



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Inersia Uteri Hipotonis dan Hipertonis .....	19
Tabel 1.2 Skor Bishop.....	28



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, MARET 2017

**NURJAYANTI, 70400114002**

**Pembimbing I : Firdayanti**

**Pembimbing II : Raully Rahmadhani**

**“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Pada Ny”A” dengan Kasus Inersia Uteri di RSUD Haji Makassar Tahun 2017”**

---

Inersia uteri adalah his yang kekuatannya tidak adekuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin keluar. Ditemukan pada penderita keadaan umum kurang baik seperti anemia, uterus yang terlalu teregang serta penderita dengan keadaan emosi yang kurang baik. Inersia uteri dapat menyebabkan persalinan akan berlangsung lama.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care pada Ny”A” dengan inersia uteri di RSUD Haji Makassar pada tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP. Yaitu langkah I pengkajian data dasar, langkah II diagnosa masalah aktual, langkah III diagnosa masalah potensial, langkah IV tindakan segera/kolaborasi, langkah V menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VI implementasi, langkah VII evaluasi.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny”A” dengan inersia uteri, tidak ditemukan hambatan pada saat penanganan kasus ini. Penanganan yang dilakukan pada Ny”A” ini yaitu dengan memberikan infus RL+Oksitosin dengan 8 tetes/menit. Dengan pemberian infus ini menyebabkan his yang dimiliki oleh ibu kembali bagus.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada Ny”A” dengan inersia uteri di RSUD Haji Makassar 2017 dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny”A” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan antara teori dan studi kasus.

---

Daftar pustaka : 27 literatur (2012-2016)

Kata kunci : Persalinan, Inersia Uteri, 7 Langkah Varney

## ABSTRACT

DEPARTMENT OF MIDWIFERY  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC WRITING, MARCH 2017

NURJAYANTI, 70400114002

Advisor I : Firdayanti

Advisor II : Raully Rahmadhani

"Management of Midwifery Intranatal Care at Ny "A" with Case of Inertia Uteri In Haji Makassar Hospital 2017"

---

Inertia uteri is his inadequate strength to perform cervical dilatation or to push the fetus out. Found in patients with less good general circumstances such as anemia, a stretched uterus and patients with poor emotional state. Inertial uterine can cause labor to be prolonged

This study aims to implement Intranatal Care Midwifery on Ny "A" with uterine inertia at RSUD Haji Makassar in 2017 in accordance with 7 steps Varney and SOAP. That is step I of the baseline data review, step II diagnosis of the actual problem, step III diagnosis potential problem, step IV immediate action / collaboration, step V prepare a comprehensive care plan, step VI implementation, step VII evaluation

The results of the case study conducted on Ny "A" with inertia uteri, found no obstacles during the handling of this case. Handling is done on Ny "A" This is by giving infusion of RL + Oxytocin with 8 drops / minute. With the intravenous infusion this caused his mother's good return.

The conclusion of the case study that is 7 steps Varney and SOAP used for the process of problem solving obstetrics has been done assessment and analysis of data on Ny "A" with inertia uteri in RSUD Haji Makassar 2017 and has done the documentation of all findings and actions that have been implemented on Ny "A" with the result of no discrepancy between theory and case studies.

---

References : 27 literatures (2012-2016)

Keywords : Labor, Inertia Uteri, 7 Step Varney

M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Persalinan merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para ibu hamil, sebuah waktu yang menyenangkan, namun disisi lain merupakan hal yang paling mendebarkan. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh bayi (Kuswanti, Melina, 2014:1).

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Persalinan lama, disebut juga “distosia”, didefinisikan sebagai persalinan yang abnormal/sulit. Sebab-sebabnya dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu: kelainan tenaga (kelainan his), kelainan janin, dan kelainan jalan lahir (Prawirohardjo, 2014:562).

Kelainan his yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya menyebabkan kerintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan, tidak dapat diatasi sehingga persalinan mengalami hambatan atau kemacetan (Prawirohardjo, 2014:562). Persalinan dapat mengalami gangguan atau kemacetan karena kelainan dalam letak atau dalam bentuk janin. Kelainan dalam ukuran dan bentuk jalan lahir bisa menghalangi kemajuan persalinan atau menyebabkan kemacetan (Prawirohardjo, 2014:562).

Angka kematian ibu (AKI) di Dunia mencapai angka 289.000 jiwa dimana dibagi atas beberapa negara antara lain Amerika Serikat mencapai 9300 jiwa, Afrika Utara 179.000 jiwa dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu (AKI) di Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia (39/100.000 kelahiran hidup), Thailand (44/100.000 kelahiran hidup), Philipina (170/100.000 kelahiran hidup), Brunei Darussalam (60/100.000 kelahiran hidup), Vietnam (160/100.000 kelahiran hidup), serta Singapore (3/100.000 kelahiran hidup). Jumlah AKI di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara lainnya (WHO, 2014).

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, rata-rata AKI tercatat mencapai 359/100.000 kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibandingkan hasil SDKI tahun 2007 yang mencapai 228/100.000 kelahiran hidup. Dalam hal ini faktor melonjaknya AKI tersebut tentu sangat jauh dari rata-rata yang akan ditargetkan *Mellenium Develoment Goal* (MDG's) pada tahun 2015 yang mencapai 108/100.000 kelahiran hidup dan di Indonesia sendiri sebenarnya mempunyai target 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2012).

Di Sulawesi Selatan, tahun 2013 jumlah kematian ibu yang dilaporkan menjadi 115 orang atau 78.38 /100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 18 orang (15,65%), kematian ibu bersalin 59 orang (51,30%), kematian ibu nifas 38 orang (33,04%). Sedangkan Tahun 2014 jumlah kematian ibu yang dilaporkan menjadi 138 orang atau 93,20/100.000 kelahiran hidup, terdiri dari

kematian ibu hamil 15 orang (10,86%), kematian ibu bersalin 54 orang (39,13%), kematian ibu nifas 69 orang (50,00%) (Profil Kesehatan Prov. SulSel, 2015:27).

Angka kematian ibu maternal yang dilaporkan di Sulawesi Selatan dari tahun 2009-2014 masih berfluktuasi yaitu tahun 2009 sebesar 78,84/100.000 kelahiran hidup, menurun pada tahun 2010 menjadi 77,13/100.000 kelahiran hidup, tahun 2011 meningkat menjadi 78,88/100.000 kelahiran hidup, tahun 2012 meningkat secara signifikan 31,38% yaitu 110,26/100.000 kelahiran hidup, tahun 2013 menurun 78,38/100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 93,20/10000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Prov. SulSel, 2015:26).

Menurut SDKI 2012 53% ibu tidak mengalami komplikasi selama persalinan, persalinan lama sebesar 37%, perdarahan berlebihan sebesar 9%, demam sebesar 7%, komplikasi kejang 2% dan KPD lebih dari 6 jam 17% (Kemenkes RI, 2012). Penyumbang AKI salah satunya adalah partus lama. Pada tahun 2013 angka kejadian partus lama adalah 1,1%, sedangkan pada tahun 2014 angka kejadian partus lama meningkat menjadi 1,8% (Direktorat Kesehatan Ibu, 2014:2).

Pada tahun 2015 jumlah persalinan di RS Haji Makassar mencapai 692 orang, dari 692 wanita yang mengalami persalinan terdapat 12 wanita yang mengalami distosia persalinan yang disebabkan dengan kelainan his. Pada tahun 2016 jumlah persalinan di RS Haji Makassar mencapai 720 orang, dari 720 wanita yang mengalami persalinan terdapat 27 wanita yang mengalami distosia persalinan yang disebabkan dengan kelainan his. Pada tahun 2016 angka kejadian distosia

persalinan yang disebabkan oleh inersia uteri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari sisi obstetri ada empat penyebab utama kematian ibu, janin, bayi baru lahir ialah perdarahan, infeksi dan sepsis, hipertensi dan preeklamsia/eklamsia, serta persalinan macet (distosia). Persalinan macet hanya dapat terjadi pada saat persalinan berlangsung. Penyebab dari persalinan lama dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu: kelainan tenaga (kelainan his), kelainan janin, dan kelainan jalan lahir (Prawirohardjo, 2014:391).

Banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh distosia persalinan maka bidan perlu mengetahui manajemen penatalaksanaan distosia persalinan sebagai salah satu menurunkan angka mortalitas dan morbiditas pada ibu. Olehnya itu dalam penatalaksaaanya harus berdasarkan evidence based yang ada.

Mengingat pentingnya hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian pada kasus distosia persalinan yang disebabkan oleh kelainan tenaga (kelainan his) di RS Haji Makassar berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang ada.

### ***B. Ruang Lingkup Penulisan***

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ini adalah asuhan kebidanan pada Ny "A" dengan inersia uteri di RS Haji Makassar tahun 2017.

### ***C. Tujuan Penulisan***

#### **1. Tujuan Umum**

Dilaksanakannya asuhan kebidanan pada Ny “A” dengan inersia uteri berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan di RS Haji Makassar sesuai dengan wewenang bidan.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Dilaksanakan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny “A” dengan inersia uteri di RS Haji Makassar tahun 2017.
- b. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnosa/masalah aktual pada Ny “A” dengan inersia uteri di RS Haji Makassar tahun 2017
- c. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnosa/masalah potensial pada Ny “A” dengan inersia uteri di RS Haji Makassar tahun 2017
- d. Dilaksanakan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “A” dengan inersia uteri di RS Haji Makassar tahun 2017
- e. Dilaksanakan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “A” dengan inersia uteri di RS Haji Makassar tahun 2017
- f. Dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “A” dengan inersia uteri di RS Haji Makassar tahun 2017
- g. Dilaksanakan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny “A” dengan inersia uteri di RS Haji Makassar tahun 2017
- h. Didokumentasikan asuhan kebidanan pada Ny “A” dengan inersia uteri di RS Haji Makassar tahun 2017.

#### ***D. Manfaat Penulisan***

##### 1. Instansi

Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada instansi terkait dengan meningkatnya kualitas pelayanan.

##### 2. Institusi

Sebagai bahan ilmiah atau bahan bacaan untuk penulisan berikutnya.

#### ***E. Metode Penulisan***

Metode yang digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Studi kepustakaan

Yaitu dengan membaca buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan inersia uteri.

##### 2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam asuhan kebidanan yang meliputi: pengkajian dan analisa data dasar, mengidentifikasi diagnosa/masalah aktual, mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial, melakukan tindakan segera dan kolaborasi, menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan, melaksanakan tindakan asuhan kebidanan, mengevaluasi asuhan kebidanan, serta mendokumentasikan asuhan kebidanan, untuk menghimpun data dan informasi dalam pengkajian dilakukan dengan menggunakan teknik:

##### a. Anamnesa

Mengadakan tanya jawab langsung dengan petugas di ruangan intranatal care yang berhubungan dengan masalah inersia uteri.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

c. Studi Dokumentasi

Dengan membaca dan mempelajari kasus serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah persalinan ibu, baik dari catatan dokter, bidan, maupun sumber lain yang menunjang.

d. Diskusi

Diskusi dengan tenaga kesehatan yakni dokter, bidan, maupun pembimbing karya tulis ilmiah serta sumber lain yang menunjang.

***F. Sistematika Penulisan***

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu: pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang persalinan, tinjauan khusus tentang inersia uteri tinjauan persalinan menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana

tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RS Haji Makassar dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu yang melahirkan dengan kasus inersia utei. Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum Persalinan Normal***

##### 1. Definisi Persalinan

- a. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang cukup bulan, lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput ketuban dari tubuh ibu, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Nurasiah, Rukmawati, Badrih, 2012:3).
- b. Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam produk konsepsi dikeluarkan sebagai akibat kontraksi teratur, progresif, sering dan kuat yang nampaknya tidak saling berhubungan bekerja dalam keharmonisan untuk melahirkan bayi (Walyani, Purwoastuti, 2015:5).
- c. Dalam Walyani, Purwoastuti, 2015, hal. 4, Varney mengatakan persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati, dan diakhiri dengan kelahiran plasenta.
- d. Dalam Lailiyana, dkk, 2012, hal 1, Manuaba mengatakan persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan/kekuatan sendiri.

e. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hamper cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Kuswanti, Melina 2014:1)

## 2. Kala dalam Persalinan

### a. Kala I

Pada kala I serviks membuka sampai terjadi pembukaan 10 cm. Kala I dinamakan pula kala pembukaan. Dapat dinyatakan artus dimulai bila timbul his dan wanita tersebut mengeluarkan lender yang bersemu darah disertai dengan pendataran (*effacement*). Lender bersemu darah berasal dari lender kanalis servikalis karena serviks mulai membuka dan mendatar. Darah berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler yang berada di sekitar kanalis servikalis (kanalis servikalis pecah karena gesekan-gesekan ketika serviks membuka).

Proses pembukaan serviks dibagi dalam 2 macam:

#### 1. Fase Laten

Berlangsung selama 7-8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm.

#### 2. Fase Aktif

Fase ini berlangsung selama 6 jam dan dibagi menjadi 3 macam yaitu:

##### a. Fase akselerasi

Dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.

##### b. Fase dilatasi maksimal

Dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.

c. Fase deselarasi

Pembukaan menjadi lambat, dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap. Fase-fase tersebut dijumpai pada primigravida. Pada multigravida pun terjadi demikian, namun fase laten, fase aktif terjadi lebih pendek. Mekanisme membukanya serviks berbeda antara primigravida dan multigravida. Pada primigravida Ostium Uteri Interna (OUI) akan membuka terlebih dahulu sehingga serviks akan mendatar dan menipis, baru kemudian Ostium Uteri Eksterna (OUE) membuka. Pada multigravida OUI sudah sedikit membuka, OUI dan OUE serta penipisan dan pendataran serviks terjadi dalam saat yang sama.

Ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir lengkap atau telah lengkap. Kala I selesai apabila pembukaan serviks uteri telah lengkap. Pada primigravida kala I berlangsung kira-kira 13 jam dan pada multigravida kira-kira 7 jam (Kuswanti, Melina, 2014:5).

b. Kala II

Kala ini disebut juga sebagai kala pengeluran. Kala ini dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya janin. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira 2 sampai 3 menit sekali. Pada fase ini dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul yang dapat menimbulkan rasa mencedan. Wanita juga merasakan tekanan pada rectum dan hendak buang air besar. Kemudian perineum mulai menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka.

Labia mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada waktu his. Bila dasar panggul sudah lebih berelaksasi maka kepala janin tidak masuk lagi di luar his, dan dengan his dan kekuatan mengejan maksimal,

kepala janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah simfisis dan dahi, muka dan dagu melewati perineum. Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi untuk mengeluarkan badan dan anggota bayi. Pada primigravida kala II berlangsung rata-rata 1,5 jam dan pada multigravida rata-rata 0,5 jam (Kuswanti, Melina, 2014:7).

c. Kala III


Disebut juga sebagai kala uri. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit, kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah, kira-kira 100-200 cc (Kuswanti, Melina, 2014:8).

d. Kala IV

Kala IV adalah kala pengawasan selama 1-2 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengawasi keadaan ibu terutama terhadap bahaya perdarahan postpartum. Pada primigravida, lama kala I yaitu 13 jam, kala II 1 jam, kala III  $\frac{1}{2}$  jam, dan lama persalinan  $14 \frac{1}{2}$  jam. Pada multigravida, lama kala I yaitu 7 jam, kala II  $\frac{1}{2}$  jam, kala III  $\frac{1}{4}$  jam, dan lama persalinan  $7 \frac{3}{4}$  jam (Kuswanti, Melina, 2014:8).

3. Mekanisme Persalinan

Dalam mekanisme persalinan normal terjadi gerakan-gerakan penting dari janin, yaitu penurunan, fleksi, putaran paksi dalam (rotasi internal), ekstensi, putaran paksi luar (rotasi eksternal), dan ekspulsi.



Gambar 1.1 Mekanisme Persalinan Normal

Sumber: Eniyati, Sholihah. *Asuhan Kebidanan pada Persalinan Patologi*. 2013:33

a. Penurunan

Para primipara kepala janin turun dalam rongga panggul, masuk ke PAP pada akhir minggu 36 kehamilan sedangkan pada multipara terjadi saat mulainya persalinan. Masuknya kepala janin melintasi PAP dapat dalam keadaan sinklitismus atau asinklitismus, dalam juga dalam keadaan melintang atau serong, dengan fleksi ringan (dengan diameter kepala janin oksitofrontalis 11,75 cm) atau fleksi sedang (dengan diameter kepala janin terjadi selama suboksipitofrontalis 11,25 cm). Penurunan kepala janin terjadi selama persalinan karena daya dorong dari kontraksi dan posisi serta peneranan (selama kala II) oleh ibu. Fiksasi (*engagement*) ialah tahap penurunan pada waktu diameter biparietal dari kepala janin telah masuk panggul ibu (Lailiyana dkk, 2012:50).

Sinklitismus adalah bila arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang PAP (sutura sagitalis berada di tengah-tengah jalan lahir atau PAP). Asinklitismus adalah bila arah sumbu kepala janin miring dengan bidang PAP (sutura sagitalis mendekati promontorium atau simfisis pubis). Asinklitismus anterior yaitu bila sutura sagitalis mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah daripada os parietal belakang. Asinklitismus posterior yaitu bila sutura sagitalis mendekati simfisis pubis sehingga os parietal belakang lebih rendah daripada os parietal depan (Lailiyana dkk, 2012:50).

b. Fleksi

Semakin turun ke rongga panggul, kepala janin semakin fleksi, sehingga mencapai fleksi maksimal (biasanya di hodge III) dengan ukuran diameter kepala janin yang terkecil, yaitu diameter suboksipitobregmatika (9,5 cm). Menurut Hokum Koppel, fleksi kepala janin terjadi akibat sumbu kepala janin yang eksentrik atau tidak simetris, dengan sumbu lebih mendekati sub oksiput, maka tahanan oleh jaringan di bawahnya terhadap kepala yang akan menurun, menyebabkan bahwa kepala mengadakan fleksi di dalam rongga panggul. Fleksi sangat penting dalam penurunan selama kala II.

Melalui fleksi ini, diameter dari kepala janin dapat masuk ke dalam panggul dan terus menuju ke dasar panggul. Pada saat kepala berada di dasar panggul tahanannya akan meningkat sehingga akan terjadi fleksi yang beryambah besar yang sangat di perlukan agar diameter terkecil dapat terus turun (Lailiyana dkk, 2012:51).

c. Putaran Paksi Dalam

Kepala yang sedang turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke arah depan. Akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intra-uterin yang disebabkan oleh his yang berulang-ulang, kepala mengadakan rotasi atau putaran paksi dalam, yaitu UUK memutar ke arah depan (UUK berada dibawah simfisis) (Lailiyana dkk, 2012:51).

d. Ekstensi

Sesudah kepala janin berada di dasar panggul dan UUK berada di bawah simfisis sebagai hipomoklion, kepala mengadakan gerakan defleksi/ekstensi untuk dapat dilahirkan, maka lahirlah berturut-turut UUB, dahi, muka dan akhirnya dagu (Lailiyana dkk, 2012:51).

e. Putaran Paksi Luar

Setelah kepala janin lahir, kepala segera mengadakan rotasi (putaran paksi luar), yaitu gerakan kembali sebelum putaran paksi dalam terjadi untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung anak (Lailiyana dkk, 2012:51).

f. Ekspulsi

Setelah kepala lahir, bahu akan berada dalam posisi depan belakang. Selanjutnya bahu depan dilahirkan terlebih dahulu baru kemudian bahu belakang. Menyusul trochanter depan terlebih dahulu, kemudian trochanter belakang. Maka lahirlah bayi seluruhnya (ekspulsi) (Lailiyana dkk, 2012:51).

#### 4. Faktor-faktor yang Berperan dalam persalinan

Ada beberapa faktor-faktor yang berperan dalam persalinan yaitu:

##### a. Faktor kekuatan his (*Power*)

His adalah kekuatan kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Sifat his yang baik adalah kontraksi simetris, fundus dominan, terkoordinasi dan relaksasi. Walaupun his itu kontraksi yang fisiologis akan tetapi bertentangan dengan kontraksi fisiologis lainnya, seperti nyeri. Kontraksi uterus juga bersifat intermiten sehingga ada periode relaksasi uterus diantara kontraksi, fungsi penting relaksasi, yaitu mengistirahatkan otot uterus, memberi kesempatan istirahat bagi ibu, mempertahankan kesejahteraan bayi karena kontraksi uterus menyebabkan kontriksi pembuluh darah plasenta (Nurasiah, 2014:21)

##### b. Faktor jalan lahir (*Passage*)

Passage atau jalan lahir merupakan salah satu faktor yang berperan dalam proses persalinan. Passage atau jalan lahir dibagi menjadi dua yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras yaitu tulang panggul dan bagian lunak itu otot-otot dan ligament-ligament. Faktor jalan lahir yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya persalinan abnormal antara lain: panggul sempit, kelainan pada vulva, kelainan pada vagina, kelainan uterus (Nurasiah, 2014:26).

Kelainan-kelainan ini dapat terdeteksi secara dini dengan pemeriksaan kehamilan yang adekuat. Oleh karena itu faktor pemeriksaan kehamilan sangat penting dalam memperkirakan proses persalinan (Nurasiah, 2014:26).

c. Faktor bayi (*Passenger*)

Faktor bayi atau janin sangat berpengaruh terhadap proses persalinan. Pada keadaan normal, bentuk bayi, berat badan, posisi, dan letak dalam perkembangannya sampai pada akhir kehamilannya dan siap untuk dilahirkan. Bayi mempunyai kekuatan mendorong dirinya keluar sehingga persalinan berjalan spontan (Nurasiah, 2014:32)

Distosia atau penyulit persalinan yang disebabkan oleh kelainan janin atau bayi antara lain: kelainan pada letak kepala, letak sungsang, letak melintang. Kelainan janin selama dalam kandungan dapat terdeteksi secara dini apabila ibu melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) secara rutin minimal 4 kali selama kehamilan. Mulai awal kehamilan pada tenaga kesehatan (Nurasiah, 2014:33)

**B. Tinjauan Umum Inersia Uteri**

1. Definisi Inersia Uteri

- a. Inersia uteri adalah his yang tidak normal, fundus berkontraksi lebih kuat dan lebih dulu daripada bagian lain (Nugroho, 2012:166).
- b. Inersia uteri adalah his yang sifatnya lebih lemah, lebih singkat, dan jarang dibandingkan dengan his yang normal (Sofian, 2013:216).
- c. Inersia uteri adalah his yang kekuatannya tidak adekuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin keluar. Disini kekuatan his lemah dan frekuensinya jarang. Sering dijumpai pada penderita keadaan umum kurang baik seperti anemia, uterus yang terlalu teregang misalnya akibat hidramnion atau kehamilan kembar atau makrosomia, grandemultipara atau primipara, serta para penderita dengan keadaan emosi yang kurang baik.

- d. Inersia uteri merupakan his yang sifatnya lebih lemah, lebih singkat, dan lebih jarang dibandingkan dengan his yang normal. Inersia uteri terjadi karena perpanjangan fase laten dan fase aktif atau kedua-duanya dari kala pembukaan. Pemanjangan fase laten dapat disebabkan oleh serviks yang belum matang atau karena penggunaan analgetik yang terlalu dini. (Fauziyah, 2014:102).
- e. Inersia uteri merupakan kontraksi uterus tidak cukup kuat atau tidak terkoordinasi secara tepat selama kala satu persalinan untuk menyebabkan pembukaan dan penipisan serviks. Selama kala dua, kombinasi mengejan *volunteer* dengan kontraksi uterus tidak cukup untuk menyebabkan penurunan dan ekspulsi (pengeluaran) janin (Reeder, dkk, 2014:393).

## 2. Macam-macam Inersia Uteri

Menurut Dr. Amru Sofian, 2013:216 inersia uteri dibagi dalam 2 bagian yaitu:

- a. Inersia uteri primer adalah kelemahan his timbul sejak dari permulaan persalinan. Hal ini harus dibedakan dengan his pendahuluan yang juga lemah dan kadang-kadang menjadi hilang (*false labour*)
- b. Inersia uteri sekunder adalah kelemahan his yang timbul setelah adanya his yang kuat teratur dan dalam waktu yang lama.

Menurut Yulia Fauziyah, 2014:102 inersia uteri dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Inersia uteri hipertonis, yaitu kontraksi uterin tidak terkoordinasi, misalnya kontraksi segmen tengah lebih kuat dari segmen atas. Inersia uteri ini sifatnya hipertonis, sering disebut sebagai inersia spastis. Pasien biasanya sangat

kesakitan. Inersia uteri hipertonis terjadi dalam fase laten. Oleh karena itu dinamakan juga sebagai inersia primer.

- b. Inersia uteri hipotonis, yaitu kontraksi terkoordinasi tetapi lemah. Melalui deteksi dengan menggunakan *cardio Tocography* (CTG), terlihat tekanan yang kurang dari 15 mmHg. Dengan palpasi, his jarang dan pada puncak kontraksi dinding rahim masih dapat ditekan ke dalam. His disebut naik bila tekanan intrauterine mencapai 50-60 mmHg. Biasanya terjadi dalam fase aktif atau kala II. Oleh karena itu, dinamakan juga kelemahan his sekunder.

Tabel 1.1 Perbedaan Inersia Uteri Hipotonis dan Hipertonis

Variabel	Hipotonis	Hipertonis
Kejadian	4% dari persalinan	1% dari persalinan
Saat terjadi	Fase aktif	Fase laten
Nyeri	Tidak nyeri	Nyeri berlebihan
Fetal distress	Lambat terjadi	Cepat
Reaksi terhadap oksitosin	Baik	Tidak baik
Pengaruh sedative	Sedikit	Besar

Sumber: Fauziyah. *Obstetri patologi*.2014:103

### 3. Penyebab Inersia Uteri

Menurut Reeder, Martin, Griffin tahun 2014:395 penyebab terjadinya inersia uteri yaitu:

1. Distensi berlebihan pada uterus, disebabkan oleh janin yang besar, kehamilan kembar, atau polihidroamnion
2. Kekakuan serviks yang dihubungkan dengan fibrosis serviks dan nulipara yang berusia lanjut
3. Klien yang sangat gemuk (berhubungan dengan persalinan yang lebih lambat dan lebih tidak konsisten)

4. Usia maternal yang lanjut (pengerasan taut jaringan ikat antara komponen tulang panggul yang dihubungkan dengan memanjangnya kala dua persalinan)
5. Pemberian analgesik yang berlebihan

Menurut dr. Taufan Nugroho, 2012:168 penyebab inersia uteri yaitu:

1. Kelainan his terutama ditemukan pada primigravida khususnya primigravida tua
2. Inersia uteri sering dijumpai pada multigravida
3. Faktor herediter
4. Faktor emosi dan ketakutan
5. Salah pimpinan persalinan
6. Bagian terbawah jani tidak berhubungan rapat dengan segmen bawah uterus, seperti pada kelainan letak janin atau pada disproporsi sefalipelvik
7. Kelainan uterus seperti uterus bikornis unikolis
8. Salah pemberian obat-obatan, oksitosin dan obat penenang.
9. Peregangan Rahim yang berlebihan pada kehamilan ganda atau hidramnion
10. Kehamilan postmatur.

Faktor penyebab inersia uteri diantaranya:

1. Faktor umum seperti umur, paritas, anemia, ketidaktepatan penggunaan analgetik, pengaruh hormonal karena kekurangan prostaglandin atau oksitosin, perasaan tegang dan emosional,

2. Faktor lokal seperti overdistensi uterus, hidramnion, malpresentasi, malposisi, dan disproporsi cephalopelvik, mioma uteri (Sastrawinata, 2015:45)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lula Adillia dan kawan-kawannya, dalam jurnal yang berjudul “serum calcium and magnesium levels ratio in patients with and without hypotonic uterine inertia” kejadian inersia uteri dalam persalinan dapat diprediksi dengan menilai *cut-off* tingkat kalsium dan magnesium (Adillia, dkk, 2015: vol 3(2)). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tri Anasari ada hubungan antara paritas dan anemia dengan kejadian inersia uteri (Anasari, 2012: vol 2(4))

#### 4. Komplikasi Persalinan Inersia Uteri

Inersia uteri yang tidak diatasi dapat memanjakan wanita terhadap bahaya kelelahan, dehidrasi, dan infeksi intrapartum. Tanda-tanda terjadinya gawat janin tidak tampak sampai terjadinya infeksi selama intrapartum. Walaupun terapi infeksi intrauterin dengan antibiotik memberikan proteksi terhadap wanita, tetapi manfaatnya kecil dalam melindungi janin. Lain halnya dengan inersia uteri sekunder, gawat janin cenderung muncul pada awal persalinan ketika terjadi inersia uteri sekunder. Tonus otot yang meningkat dengan konstan merupakan predisposisi terjadinya hipoksia pada janin. Kadang kala, pecahnya selaput ketuban dalam waktu lama dapat menyertai kondisi ini dan dapat menyebabkan infeksi intrapartum (Reeder, dkk, 2014:396)

Inersia uteri dapat menyebabkan persalinan akan berlangsung lama dengan akibat terhadap ibu dan janin yaitu infeksi, kehabisan tenaga, dan dehidrasi (Nugroho, 2012:169).

#### 5. Penanganan inersia uteri

Apabila penyebabnya bukan kelainan panggul dan atau kelainan janin yang tidak memungkinkan terjadinya persalinan pervaginam, apabila ketuban positif dilakukan pemecahan ketuban terlebih dahulu. Jika upaya ini tidak berhasil, berikut langkah-langkah penanganan selanjutnya:

- 1) Berikan oksitosin drips 5-10 satuan dalam 500 cc dekstrosa 5%, dimulai dengan 12 tetes per menit, dinaikkan setiap 30 menit sampai 40-50 tetes per menit. Maksud dari pemberian oksitosin adalah supaya serviks dapat membuka.
- 2) Pemberian oksitosin tidak usah terus menerus, sebab bila tidak mempekuat his setelah pemberian beberapa lama, hentikan dulu dan ibu dianjurkan untuk istirahat. Keesokan harinya bias diulang pemberian oksitosin drips.
- 3) Bila inersia disertai dengan disproporsi sefalopelvis, maka sebaiknya dilakukan seksio sesarea.
- 4) Bila semua his kuat tetapi kemudian terjadi inersia sekunder/hipertonis, pengobatan yang terbaik ialah petidin 50 mg atau tokolitik, seperti ritodine dengan maksud menimbulkan relaksasi dan istirahat, dengan harapan bahwa setelah pasien itu bangun kembali timbul his yang normal. Mengingat bahaya infeksi intrapartum, kadang-kadang dicoba juga oksitosin, tetapi

dalam larutan yang lebih lemah. Namun jika his tidak menjadi lebih baik dilakukan seksio sesarea (Fauziah, 2014:103).

Standar operasional prosedur pada kasus inersia uteri yaitu:

1. Nilai keadaan umum ibu, tanda-tanda vital ibu
2. Tentukan keadaan janin, pastikan DJJ dalam batas normal. Jika ketuban sudah pecah, air ketuban kehijau-hijauan atau bercampur darah pikirkan kemungkinan terjadi gawat janin. Jika terdapat gawat janin lakukan seksio sesarea.
3. Apabila terdapat disproporsi sefalopelvis maka sebaiknya lakukan seksio sesarea
4. Berikan penanganan umum yang kemungkinan akan memperbaiki kontraksi seperti berjalan-jalan. Lakukan penilaian frekuensi dan lamanya kontraksi berdasarkan partograf.
5. Apabila tidak ada kemajuan persalinan maka lakukan induksi dengan oksitosin drip 5 IU dalam 500 cc RL dengan tetas 8/menit dan dinaikkan tiap 30 menit maksimal 40 tetes.
6. Apabila ada kemajuan persalinan, maka evaluasi kemajuan tiap 2 jam. Namun apabila tidak ada maka sebaiknya lakukan seksio sesarea.

### ***C. Konsep Dasar Manajemen Kebidanan***

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dengan urutan logis dan menguntungkan, menguraikan perilaku yang diharapkan dan pemberian asuhan

yang berdasarkan teori ilmiah, penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang terfokus pada klien.

Proses manajemen kebidanan ini terdiri dari 7 langkah Varney. 7 langkah asuhan kebidanan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan diakhiri dengan evaluasi.

## 2. Tahapan Manajemen Kebidanan

Mengingat bahwa manajemen kebidanan suatu yang kontinum perlu dilakukan secara sistematis, yang dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Proses ini terdiri dari tujuh langkah yang membentuk suatu kerangka lengkap sebagai berikut:

### a. Langkah 1 : Identifikasi dan Analisa Data Dasar

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.

Anamnesa, meliputi Tanya jawab untuk memperoleh biodata meliputi riwayat kesehatan, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data social, ekonomi, dan psikologi serta keadaan klien meliputi HPHT, HTP, pergerakan janinnya, umur kehamilan, sakit perut tembus belakang sejak kapan, ada pelepasan lendir dan darah.

Pemeriksaan fisik meliputi: pemeriksaan tanda-tanda vital, keadaan umum klien, dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi meliputi: Leopold I

(mengetahui TFU dan umur kehamilan), Leopold II (mengetahui dimana letak punggung dan bagian terkecil dari janin apakah dikiri atau dikanan perut ibu), Leopold III (mengetahui bagian terendah dari janin), Leopold IV (mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk PAP).

Menilai kontraksi atau frekuensi his (amplitudo dikalikan dengan frekuensi his dalam 10 menit menggambarkan keaktifan uterus. Amplitudo uterus meningkat terus sampai 60mmHg pada akhir kala I dan frekuensi his menjadi 2-4 kontraksi tiap 10 menit). Auskultasi DJJ dengan menggunakan lenek untuk mendengar denyut jantung janin.

Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium (Hb, Reduksi), Ultrasonografi (USG). Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang akan menentukan, oleh karena itu proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap yang selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif, dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien selanjutnya.

Pemeriksaan Hb ini bertujuan untuk mengetahui apakah ibu menderita positif anemia atau tidak, sedangkan pemeriksaan reduksi urin ini bertujuan untuk mengetahui apakah ibu kadar gula ibu mengalami peningkatan atau tidak. Pemeriksaan USG ini bertujuan untuk mengetahui dimana posisi plasenta, mengukur jumlah cairan ketuban yang berlebihan atau terlalu sedikit, mengetahui jenis kelamin, dan lain-lain. Pemeriksaan USG ini dilakukan oleh dokter spesialis kandungan.

#### b. Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat menemukan diagnosis dan masalah yang spesifik.

Jika didapatkan persalinan dengan kelainan his yang kekuatannya tidak adekuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin keluar, disini kekuatan his lemah, fundus kontraksi lebih kuat dan lebih dulu daripada bagian lainnya, dan frekuensinya jarang. Kelainan juga terletak pada kontraksinya yang singkat dan jarang. Keadaan umum penderita biasanya baik dan merasakan nyeri yang tidak seberapa. Selama kekuatan his lemah dan frekuensinya jarang itu tidak terjadi perubahan pada serviks yakni pendataran dan/atau pembukaan, maka dapat didiagnosa sebagai kelainan his atau inersia uteri.

Jika kelemahan his timbul sejak dari permulaan persalinan maka dapat dikatakan sebagai inersia uteri primer. Hal ini harus dibedakan dengan his pendahuluan yang kadang juga lemah dan kadang-kadang menjadi hilang (*false labour*), namun jika kelemahan his timbul setelah adanya his yang kuat, teratur, dan dalam waktu yang lama maka dapat dikatakan sebagai inersia uteri sekunder.

#### c. Langkah III: Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini dilakukan identifikasi diagnosa atau masalah potensial berdasarkan hasil pengkajian dari data subjektif dan data objektif. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar

terjadi dilakukan asuhan yang aman. Pada kasus inersia uteri dapat menyebabkan persalinan berlangsung lama dengan akibat terhadap ibu dan janin yaitu infeksi, kehabisan tenaga, dan dehidrasi.

Salah satu penyebab terjadinya infeksi pada ibu yang akan melahirkan adalah pemeriksaan dalam atau pemeriksaan vagina. Kehabisan tenaga dan dehidrasi ditandai dengan nadi dan suhu meningkat, pernapasan cepat. Selama proses persalinan berlangsung upayakan agar ibu untuk tetap makan dan minum agar ibu tidak kehabisan tenaga dan dehidrasi. Penetalaksanaan dehidrasi bertujuan untuk mengatasi defisit cairan dan mengembalikan keseimbangan cairan (Leksana, 2015: vol 42(1)).

d. Langkah IV: Tindakan *Emergency* dan Kolaborasi

Pada langkah ini, bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan berdasarkan kebutuhan klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses terus menerus ini menghasilkan baru yang segera dinilai, data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan darurat dimana bidan harus segera bertindak untuk menyelamatkan klien dengan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan.

Untuk kasus inersia uteri terlebih dahulu periksa keadaan serviks, presentasi dan keadaan janin, penerunan bagian terbawah janin dan keadaan panggul. Apabila ada disproporsi sefalovelpik maka lakukan seksio sesarea. Apabila kepala janin sudah masuk ke dalam panggul, penderita bisa disuruh berjalan-jalan. Tindakan

sederhana ini kadang-kadang menyebabkan his menjadi kuat dan selanjutnya persalinan berjalan lancar.

Untuk hal itu kita juga perlu melakukan nilai/skor Bishop. Skor Bishop adalah suatu cara untuk menilai kematangan serviks setelah proses yang terjadi menjelang kelahiran, dimana serviks menjadi lunak, menipis dan dilatasi.

Tabel 1.2 Skor Bishop

Skor	0	1	2	3
Pembukaan	0	1-2	3-4	5-6
Pendataran	0-30	40-50%	60-70%	80%
Station	-3	-2	-1	+1, +2
Konsistensi	Keras	Sedang	Lunak	Amat lunak
Posisi Ostium Uteri	Posterior	Tengah	Anterior	Anterior

Sumber: Nugroho. *Patologi Kebidanan*. 2012:59

Metode ini telah digunakan selama beberapa tahun dan telah terbukti memuaskan. Nilai bishop >6 bisa berhasil dalam induksi dan persalinan pervaginam. Nilai bishop yang buruk dan fase laten yang berkepanjangan memiliki hubungan yang paling kuat dalam kegagalan induksi persalinan (Khan, dkk, 2012: vol 62(1)). Induksi persalinan adalah intervensi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah bahaya janin, dan atau maternal yang mungkin terjadi (Ojo, Akintayo, 2013: vol 4(7)).

Namun bila tidak ada kemajuan persalinan saat penderita disuruh berjalan, maka berikan oksitosin drips 5-10 satuan dalam Dextrosa 5% (12 tetes/menit) kemudian naikkan setiap 10-15 menit sampai 40-50 tetes/menit. Bila his tidak kuat, oksitosin drips dihentikan supaya penderita dapat beristirahat. Kemudian coba lagi dalam beberapa jam. Kalau masih belum ada kemajuan, maka lebih baik lakukan seksio sesarea.

e. Langkah V: Intervensi/Rencana Tindakan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, langkah ini merupakan kelanjutan dari masalah yang telah diidentifikasi. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan kasus inersia uteri harus ditolong di rumah sakit untuk perbaikan keadaan umum ibu, lalu diberikan oksitosin drips 5-10 satuan dalam Dextrosa 5%, bila his tidak menjadi kuat setelah pemberian oksitosin, maka hentikan dulu pemberian drips oksitosin dan anjurkan ibu untuk istirahat. Kemudian coba lagi untuk beberapa jam. Kalau masih belum ada kemajuan, lebih baik dilakukan seksio sesario. Namun apabila ada disproporsi sefalopelvik berarti harus dilakukan seksio sesario.

Bila semua his kuat tetapi kemudian terjadi inersia sekunder/hipertonis, pengobatan yang terbaik ialah petidin 50 mg atau tokolitik, seperti ritodine dengan maksud menimbulkan relaksasi dan istirahat, dengan harapan bahwa setelah pasien itu bangun kembali timbul his yang normal. Kemudian lanjutkan pemantauan lebih lanjut, serta intervensi hal-hal yang dapat mempercepat proses persalinan.

f. Langkah VI : Implementasi/Pelaksanaan Asuhan

Pada langkah ini pelaksanaan asuhan langsung secara efisien dan aman yang dapat dilakukan seleuruhnya oleh bidan dan sebagian oleh pasien. Meski telah kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan, bidan tetap bertanggung jawab dengan manajemen asuhan klien agar penanganan kasus pada inersia uteri dapat berhasil dan memuaskan.

Apabila terjadi kasus inersia uteri pada puskesmas maka harus dilakukan rujukan ke rumah sakit untuk menyelesaikan kasus dengan tindakan/penanganan yang semestinya agar persalinan tidak berlangsung terlalu lama. Sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit, terlebih dahulu rumah sakit yang menerima rujukan harus dihubungi supaya pasien tidak akan ditolak.

g. Langkah VII: Evaluasi

Langkah ini dilakukan pengevaluasian keefektifan dari asuhan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan terhadap masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan teori yang ada.

Beberapa hal yang dievaluasi, yaitu: apa ibu sudah mengerti penjelasan yang diberikan, apa ibu sudah melakukan apa yang telah di anjurkan dan telah diajarkan, bagaimana keadaan umum ibu, mengukur tanda-tanda vital ibu untuk memantau keadaan ibu, apa kecemasan ibu teratasi, apa persalinan dengan inersia uteri dapat teratasi.

h. Pendokumentasian Asuhan kebidanan (SOAP)

Dokumentasi merupakan catatan tentang interaksi antar tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, serta respon pasien terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Asuhan itu harus dicatat dengan benar, jelas, teratur, logis, sehingga dapat mengkomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah dilakukan secara sistematis dalam bentuk SOAP yaitu:

1) Subjektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa sebagai langkah I varney

## 2) Objektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, pemeriksaan penunjang, untuk mendukung asuhan yang telah diberikan sebagai langkah I varney

## 3) Assessment

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan data objektif dalam suatu identifikasi:

- a. Diagnosa/masalah
- b. Antisipasi masalah/masalah potensial
- c. Perlunya tindakan segera, konsultasi dan kolaborasi oleh bidan dan dokter rujukan 2,3, dan 4 varney

## 4) Planning

Menggambarkan pendokumentasian dari hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian asuhan yang telah diberikan sebagai langkah 5, 6 dan 7 varney.

SOAP ini dilakukan pada asuhan tahap berikutnya, dan atau pada evaluasi hari berikutnya/kunjungan berikutnya (bergantung ini adalah kasus yang hanya menunggu 2 jam PP atau, asuhan ibu nifas, asuhan ibu hamil, asuhan skseptor KB) dapat dilakukan kunjungan rumah untuk lebih efektifnya asuhan.

### ***D. Tinjauan Islam Tentang Persalinan***

Manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan dibanding dengan semua makhluk karena memiliki kepribadian, penciptaan yang sempurna dan banyak potensi yang dimilikinya, akal, keinginan, spiritual, perasaan, dan emosi.

Semua ini terdapat dalam satu tubuh yang menakjubkan. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Mu'minum (23):12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ

عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٤

Terjemahan:

*Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah (12) kemudian kami menjadikan air mani (yang disimpang) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13) kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yangn (berbentuk) lain. Maha suci Allah, Pencipta paling baik (14) (Kementrian Agama, 2013).*

Dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia itu berasal dari “nuthfah”. Yang dimaksud dengan “nuthfah” ialah setetes mani. Setetes mani laki-laki itu mengandung beribu-ribu sperma yang tidak dapat dilihat dengan mata, tanpa menggunakan alat pembesar. Salah satu dari sperma ini bertemu dengan ovum dalam rahim wanita dengan perantaraan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua jenis manusia itu. Pertemuan sperma dan ovum ini merupakan perkawinan yang sebenarnya, dan pada waktu itulah terjadi proses pertama dari kejadian manusia yang serupa terjadi pula pada binatang.

Sperma dan ovum yang telah menjadi satu itu bergantung pada dinding rahim si ibu dan setelah beberapa lama berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Kemudian ada yang menjadi segumpal daging yang sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan pada permulaan kejadiannya, dan ada pula yang menjadi segumpal daging yang tidak sempurna, terdapat cacat dan kekurangan. Berdasarkan kejadian sempurna dan tidak sempurna inilah menimbulkan perbedaan bentuk kejadian bentuk manusia, perbedaan tinggi dan pendeknya manusia dan sebagainya.

Proses kejadian “nuthfah” menjadi “‘alaqah” adalah empat puluh hari, dari “‘alaqah” menjadi “mudghah” (segumpal daging) juga empat puluh hari. Kemudian setelah lewat empat puluh hari sesudah ini, Allah s.w.t meniupkan ruh, menetapkan rezeki, amal, bahagia dan sengsara, menetapkan ajal dan sebagainya, sebagaimana tersebut dalam hadits: “Sesungguhnya awal kejadian seseorang kamu (yaitu sperma dan ovum) berkumpul dalam perut ibunya selama 40 malam, kemudian menjadi segumpal darah selama itu (pula) lalu menjadi segumpal daging selama itu (pula) kemudian Allah mengutus malaikat, setelah Allah meniupkan ruh ke dalamnya. maka malaikat itu diperintahkan-Nya menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara.

Kemudian jika telah sampai waktunya, maka lahirlah bayi yang masih kecil itu dari dalam rahim ibunya. Masa kandungan yang sempurna ialah sembilan bulan, tetapi jika Allah menghendaki masa kandungan itu dapat berkurang menjadi enam bulan atau lebih dan ada pula yang lebih dari sembilan bulan. Pada permulaan masa lahir itu manusia dalam keadaan lemah, baik jasmani maupun rohaninya, lalu Allah

menganugerahkan kekuatan kepadanya sedikit demi sedikit, bertambah lama bertambah besar, hingga sampai masa kanak-kanak, kemudian sampai masa dewasa. Pada masa manusia sempurna jasmani dan rohaninya, badannya sedang kuat, pikirannya sedang berkembang, kemampuannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sedang ada pula. Kemudian manusia menjadi tua, bertambah lama bertambah lemah, seakan-akan kembali lagi kepada masa kanak-kanak dan menjadi pikun, akhirnya iapun meninggalkan dunia yang fana ini; ada di antara manusia yang meninggal sebelum mencapai umur dewasa, ada pula yang meninggal di waktu dewasa dan ada yang diberi Allah umur yang lanjut, sampai tua Bangka. (Shihab, 2009:336)

Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Maryam (19):23-25

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِء مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ۝

Terjemahnya:

*Maka dia mengandung, lalu dia menyisihkan diri dengan kandunganya ke tempat yang jauh (22) Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, “wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan (23) (Kementrian Agama, 2013).*

Setelah menyampaikan ketetapan Allah Swt di atas, malaikat jibril meniupkan ruh ke tubuh Maryam, maka dia pun mengandungnya, yakni anak lelaki itu yakni Isa As. Lalu ketika dia sadar akan kandunganya, dia menyisihkan diri dengannya, yakni dengan kandungannya itu, ketempat yang jauh dari tempatnya sebelum itu. Maka rasa sakit akibat kontraksi akan melahirkan anak memaksa dia

menuju ke pangkal pohon kurma untuk bersandar. Kini, terbayang olehnya sikap dan cemooh yang akan didengarnya karena dia melahirkan anak tanpa memiliki suami, dan karena itu dia berkata “aduhai, alangkah baiknya aku mati, yakni tidak pernah wujud sama sekali di pentas hidup sebelum ini, yakni sebelum kehamilan ini, agar tidak memikul aib dan malu dari satu perbuatan yang sama sekali tidak ku kerjakan dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan selamalamanya.

Dalam proses ini persalinan terdiri dari dua cara yaitu pervaginam dan seksio sesarea. Maka dari itu lahirlah seorang bayi tanpa mengetahui sesuatu apapun.

Allah SWT berfirman dalam surah Q.S An-nahl (16):78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

Terjemahan:

*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (Kementrian Agama, 2013).*

Sayyid Quthub menjadikan ayat ini sebagai pemaparan contoh sederhana yang tidak dapat terjangkau olehNya, yakni kelahiran. Salah satu bukti kuasa Allah SWT menghidupkan kembali siapa yang meninggal dunia serta membangkitkan kembali pada hari kiamat. Ayat ini menyatakan Dan sebagaimana Allah SWT mengeluarkan kamu berdasarkan kuasa dan ilmu-Nya dari perut ibumu sedang

tadinya kamu tidak wujud, demikian Dia juga dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika Dia mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kamu semua dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun yang ada disekeliling kamu dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan-penglihatan, dan aneka hati sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah SWT menganugrah-kannya kepada kamu.

Setelah kamu keluar dari perut ibu dan ketika kamu berada di muka bumi ini dan melalui lagi proses dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, tua, dan pikun, dan pada akhirnya benar-benar kamu mati baik pada masa pikun maupun sebelumnya. Kemudian setelah kamu mati dan dikuburkan, sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dari kubur kamu untuk dimintai pertanggungjawaban, lalu masing-masing kami beri balasan dan ganjaran (Shihab, 2009:665)

**BAB III**  
**STUDI KASUS**  
**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PATOLOGI**  
**PADA NY “A” GESTASI 39 MINGGU 4 HARI DENGAN INERSIA UTERI**  
**DI RSUD HAJI MAKASSAR SULAWESI SELATAN**

**TANGGAL 29 MARET 2017**

No. Registrasi : 23 30 69  
Tanggal Masuk : 29 Maret 2017 Jam 14:25 Wita.  
Tanggal Pengkajian : 29 Maret 2017 Jam 14:30 Wita.  
Tanggal Partus : 29 Maret 2017 Jam 21:33 Wita.  
Nama Mahasiswa : Nurjayanti

**KALA I**

**LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR**

**A. Identitas Istri / Suami**

Nama : Ny “A” / Tn. “D”  
Umur : 20 Tahun / 27 Tahun  
Nikah / Lamanya : 1x /  $\pm$  6 Tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SD / SMP  
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian  
Alamat : Jl. Kumala

## B. Data Biologis

1. Keluhan utama: Ibu mengatakan merasakan sakit perut tembus belakang disertai pelepasan lendir dan darah.
2. Riwayat keluhan utama

Sakit dirasakan sejak tanggal 29 Maret 2017 jam 05:00 Wita. Lokasi mulai dari perut tembus kebelakang. Sifat nyeri bersifat hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan lama. Usaha ibu untuk mengatasi keluhannya yaitu dengan mengurut-urut punggungnya sambil berjalan-jalan.

## C. Riwayat Kesehatan yang Lalu

Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit hipertensi, jantung, asma, dan diabetes milietus. Ibu juga tidak pernah menderita penyakit menular dan tidak pernah menjalani operasi. Ibu tidak pernah minum alkohol, merokok dan tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan jamu selama hamil.

## D. Riwayat Reproduksi

Menarche pada umur 13 tahun, siklus 28-30 hari, lama 6-7 hari serta tidak ada nyeri pada saat haid.

## E. Riwayat Kehamilan Sekarang

1. GIII PII A0
2. HPHT 24-06-2016
3. HTP 01 04 2017
4. Ibu mengatakan ini kehamilan ketiga dan tidak pernah keguguran.
5. Ibu mengatakan umur kehamilannya sudah 9 bulan

6. Ibu mengatakan bahwa janinnya bergerak sejak umur kehamilannya memasuki usia  $\pm$  5 bulan
7. Ibu mengatakan pergerakan janinya terutama dirasakan pada sebelah kiri
8. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil
9. Ibu melakukan kunjungan ANC sebanyak 3x dan mendapatkan imunisasi TT 1x yaitu pada bulan September 2016

F. Riwayat Kehamilan, Persalinan, Nifas

1. Anak pertama lahir tahun 2012 di RS Petramedika dengan jenis kelamin laki-laki dan dengan berat lahir 3200 gram dengan persalinan normal, ibu menyusui selama  $\pm$  1,5 tahun
2. Anak kedua lahir tahun 2014 di RS Petramedika dengan jenis kelamin laki-laki dan dengan berat lahir 3000 gram dengan persalinan normal, ibu menyusui selama  $\pm$  1,5 tahun

G. Riwayat Keluarga Berencana

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB

H. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Pola Nutrisi

a. Saat Hamil

Frekuensi 3x dengan porsi 1 piring. Pola makanan nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, dan kadang-kadang minum susu. Nafsu makan baik serta minum 6-8 gelas perhari.

b. Selama Inpartu

Pola makan tidak teratur, nafsu makan kurang, kebutuhan minum  $\pm$  2 gelas.

## 2. Pola Eliminasi

### a. Saat Hamil

Buang Air Besar (BAB) 1x sehari, berwarna kekuning-kuningan dan konsistensi lunak. Buang Air Kecil (BAK) 4-5x sehari dan berwarna kuning muda berbau amoniak.

### b. Selama Inpartu

Ibu pernah BAB dan BAK

## 3. Istirahat

### a. Saat Hamil

Pola tidur 2x sehari

### b. Selama Inpartu

Ibu berbaring di tempat tidur karena rasa nyeri yang dirasakan

## 4. Personal Hygiene

### a. Saat Hamil

Ibu mandi 2x sehari dan keramas 2x seminggu, sikat gigi sehabis makan dan sebelum tidur. Ibu membersihkan alat genitalianya setiap mandi dan sehabis BAB dan BAK

## I. Pemeriksaan Fisik

### 1. Keadaan Umum

#### a. Wajah ibu tampak meringis

#### b. Ibu tampak lemah

- c. Kesadaran komposmentis
- d. Umur kehamilan 39 minggu 4 hari
- e. LILA 26 cm
- f. Berat badan sebelum hamil 48 kg dan berat badan selama hamil 54 kg
- g. Tanda-Tanda Vital

TD : 110/70 mmHg

P : 21 x/menit

S : 36,5 C

N : 80 x/menit

2. Muka

Ekspresi wajah tampak meringis dan tidak ada oedema pada wajah.

3. Mata

Konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus

4. Telinga

Simertis kiri kanan, tampak bersih, tidak ada pengeluaran serumen

5. Gigi dan Mulut

Gigi dan mulut tampak bersih, mukosa bibir tampak lembab, tidak ada caries.

6. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar limfe, kelenjar thyroid dan vena jugularis

7. Payudara

Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk, hiperpigmentasi areola mammae dan tidak ada benjolan pada mammae

## 8. Abdomen

Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba dan tidak ada nyeri tekan

Leopold I : TFU 3 jrbpx, 37 cm teraba bokong

Leopold II : Punggung kanan

Leopold III: Kepala

Leopold IV: BDP, 4/5

Lingkar Perut : 82 cm

Tafsiran Berat Janin :  $TFU \times LP = 37 \text{ cm} \times 82 \text{ cm} = 3060 \text{ gram}$

His: 3 x 10 menit durasi 30-35

DJJ terdengar kuat, jelas, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 120x/menit

## 9. Genitalia

Tidak ada varises, tampak pengeluaran lendir dan darah

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 14:30 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Lunak, tipis

Pembukaan : 6 cm

Ketuban : Utuh

Presentase : UUK kanan lintang

Penurunan : Hodge I ke hodge II

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah

#### 10. Ekstremitas

Tidak ada varices, tidak ada oedema.

#### h. Mengobservasi his dan djj serta melakukan VT tiap 4 jam

Jam 15:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 15:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 16:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 16:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 17:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 17:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 18:00 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 18:30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 120x/menit nadi 80x/menit

TD 110/70 mmHg suhu 36,5 C

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 18:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Lunak, tipis

Pembukaan : 8 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK kanan depan

Penurunan : Hodge III

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada  
 Kesan panggul : Normal  
 Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban

Jam 19:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 130x/menit nadi 80x/menit

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 19:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Lunak, tipis

Pembukaan : 8 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK kanan depan

Penurunan : Hodge III

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban

Mengobservasi his, nadi djj tiap 30 menit

Jam 19:35 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 130x/menit nadi 80x/menit

Jam 20:00 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 136x/menit nadi 80x/menit

Mengobservasi his, nadi djj tiap 30 menit

Jam 20:31 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 136x/menit nadi 80x/menit

Jam 21:00 wita his 4 x 10 menit durasi 45-50 djj 136x/menit nadi 80x/menit

Jam 21:30 wita his 4 x 10 menit durasi 45-50 djj 136x/menit nadi 80x/menit

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 21:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Tidak teraba

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK dibawah simpisis

Penurunan : Hodge IV

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban.

#### I. Data Psikologis

Ibu berencana melahirkan di RS Haji Makassar. Ibu senang dengan kehamilannya dan berharap agar anaknya segera lahir. Ibu ditunggu oleh keluarganya selama proses persalinan

#### J. Data Spiritual

Selama persalinan ibu berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan dirinya dan bayinya dan berharap agar persalinannya berjalan lancar.

### **LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL**

Diagnosa / Masalah aktual : GIII PII A0, Gestasi 39 minggu 4 hari, Letak memanjang, Intra uteri, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu baik, Keadaan janin baik, Inpartu kala I fase aktif.

### 1. GIII PII A0

DS : Ibu mengatakan hamil yang ketiga dan tidak pernah keguguran.

DO : - Tampak striae alba.

Analisa dan interpretasi data

- Pada kehamilan multigravida terdapat garis-garis yang memanjang yang berwarna putih atau yang disebut striae alba.

### 2. Gestasi 39 minggu 4 hari

DS : - Ibu mengatakan HPHT 24-06-2016.

- Ibu mengatakan umur kehamilannya sudah 9 bulan.

DO : - Tanggal pengkajian 29-03-2017.

- Leopold I : TFU 3 jrbpx, 37 cm teraba bokong

Analisa dan interpretasi data

- Berdasarkan rumus Naegele dari HPHT ibu tanggal 24-06-2016 sampai dengan tanggal 29-03-2017 maka gestasi ibu 39 minggu 4 hari.

### 3. Letak memanjang

DS : - Ibu mengatakan pergerakan janinya terutama dirasakan pada sebelah kiri.

DO : - Leopold I : TFU 3 jrbpx, 37 cm teraba bokong

Leopold II : Punggung kanan

Leopold III: Kepala

Leopold IV: BDP, 4/5

#### Analisa dan interpretasi data

- Pada palpasi Leopold II disatu sisi teraba struktur dan resisten adalah punggung dan disisi lain terdapat bagian-bagian kecil dari janin. Bunyi jantung janin terdengar lebih baik dipunggung janin dari pada presentase vertex dan bokong, biasanya bunyi jantung dihantarkan melalui lambung janin (punggung) yang terletak paling dekat dengan dinding uterus.
- Letak janin dalam kehamilan sesuai dengan sumbu ibu dimana letak sumbu janin terdapat sumbu yang memanjang.

#### 4. Intra uteri

DS : - Ibu mengatakan selama hamil tidak ada nyeri perut yang hebat.

DO : - Pada saat palpasi ibu tidak merasa nyeri.

- Pembesaran perut sesuai umur kehamilan.

#### Analisa dan interpretasi data

- Bagian dari uterus yang merupakan tempat perkembangan janin adalah kavum uteri dimana bagian ini hasil konsepsi dapat tumbuh dan berkembang hingga aterm tanpa menyebabkan adanya rasa nyeri.
- Letak janin dalam kehamilan sesuai dengan sumbu ibu dimana letak sumbu janin terdapat sumbu yang memanjang.

#### 5. Tunggal

DS : - Ibu mengatakan pergerakan janinya kuat pada kuadran kiri perut ibu.

DO : - Leopold I : TFU 3 jrbpx, 37 cm teraba bokong

- Leopold II : Punggung kanan

- Leopold III : Kepala
- Leopold IV : BDP, 4/5
- DJJ terdengar kuat, jelas, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 120x/menit.

Analisa dan interpretasi data

- Pembesaran perut sesuai umur kehamilan, teraba 1 kepala dan bokong dan terdengar djj pasa satu tempat yaitu kuadran kanan bawah serta pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu pada sebelah kiri perutnya. Hal ini menandakan tunggal.

#### 6. Hidup

DS : - Ibu mengatakan pergerakan janinya kuat pada sebelah kiri bawah perutnya.

DO : - Djj terdengar kuat, jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 120 x/menit.

Analisan dan interpretasi data

- Adanya pergerakan yang dirasakn oleh ibu pada saat pengkajian dan djj terdengar jelas menandakan jantung janin berfungsi dengan baik menandakan janin hidup.

#### 7. Keadaan ibu baik

DS : - Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit serius.

DO : - Konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus.

- Tidak ada oedema pada wajah dan tungkai.

- TTV dalam batas normal

TD : 110/70 mmHg

P : 21 x/menit

S : 36,5 C

N : 80 x/menit

Analisan dan interpretasi data

- Tekanan darah 120/70 mmHg dalam batas normal menandakan ibu dalam keadaan tidak pre eklamsia atau eklamsia dan oedema pada wajah tidak ada.
- Konjungtiva merah muda normal menandakan ibu dalam keadaan tidak anemis dan skelera menandakan ibu tidak ikterus.

#### 8. Keadaan janin baik

DS : Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kiri bawah perutnya.

DO : Djj terdengar kuat, jelas, dan teratur pada kuadran kanan perut ibu dengan frekuensi 120 x/menit.

Analisa dan interpretasi data

- Adanya pergerakan janin yang dirasak ibu serta terdengarnya djj 120 x/menit yang dalam batas normal, teratur, menandakan janin dalam keadaan baik.

#### 9. Inpartu kala 1 fase aktif

DS : - Ibu mengatakan sakit perut tembus belakang.

- Ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dan darah dari jalan lahir.

DO : - Genitalia luar nampak ada pelepasan lendir dan darah.

- Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 14:30 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Lunak, tipis

Pembukaan : 6 cm

Ketuban	: Utuh
Presentase	: UUK kanan lintang
Penurunan	: Hodge I ke hodge II
Molase	: O
Penumbungan	: Tidak ada
Kesan panggul	: Normal
Pelepasan	: Lendir, darah

#### Analisa dan interpretasi data

- Pada saat 1-2 minggu sebelum persalinan kadar hormone progesterone dan estrogen mulai menurun sehingga fungsinya akan berkurang yang akan menyebabkan kekejangan pembuluh darah sehingga menimbulkan his atau kontraksi dari uterus. Pada waktu kontraksi uterus otot-otot akan mengalami anoxia yang akan menyebabkan nyeri.
- Pada saat pace maker memulai kontraksi gelombang his akan bergerak kedalam dan kebawah yaitu fundus, korpus dan seluruh uterus dimana otot pada fundus semakin tebal dan otot-otot uterus mengadakan retraksi sehingga korpus uteri lebih pendek dan dengan sendirinya serviks yang kurang mengandung otot dan banyak mengandung kolagen akan mudah tertarik dan membuka.

Malasah Aktual : Inersia uteri

DS : - Ibu mengatakan sakig perut tembus kebelakang.

- Ibu mengatakan adanya pengeluaran darah dari jalan lahir.

DO : - Kontraksi uterus

Jam 15:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 15:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 16:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 16:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 17:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 17:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 18:00 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 18:30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 120x/menit nadi 80x/menit

TD 110/70 mmHg suhu 36,5 C

Analisa dan interpretasi data

- Nyeri yang timbul berasal dari his persalinan dan mulainya persainan
- Penurunan kadar hormone progesterone pada ibu mempengaruhi pengeluaran oksitosin dari hipofise anterior yang dapat menyebabkan kontraksi uterus.
- Pembukaan serviks disebabkan kontraksi SBR dan serviks diregang oleh isi uterus sehingga menyebabkan dilatasi serviks.
- Pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis servikalis lepas dan terjadi pengeluaran darah karena kapiler pembuluh darah pecah.

### **LANGKAH III. ANTISIPASI MASALAH POTENSIAL**

Inersia uteri yang tidak diatasi dapat menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan infeksi intrapartum.

#### **LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY ATAU KOLABORASI**

Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan dengan via telephone dan dokter menyarangkan untuk memberikan infus dengan cairan RL+Oksitosin.

#### **LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN**

Diagnosa aktual : GIII PII A0, Gestasi 39 minggu 4 hari, Letak memanjang, Intra uteri, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu baik, Keadaan janin baik, Inpartu kala I fase aktif.

Maslah aktual : Inersia uteri

Masalah potensial : Kelelahan, dehidrasi, dan infeksi intrapartum.

Tujuan : - Kala I dalam batas normal  
- Kondisi ibu dan janin baik.

Kriteria : - Kala I tidak melebihi 7 jam  
- Kontraksi adekuat 3-4 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik

- Djj teratur dan kuat dalam batas normal (120=160 x/menit)

- Tanda-tanda vital dalam batas normal

TD: 100-130/60-9- mmHg

N : 60-80 x/menit

S : 36,5-37,5 C

P : 20-24 x/menit

Intervensi tanggal 29 Maret 2017

1. Anjurkan ibu untuk BAK dan cuci kaki

Rasional : Kandung kemih yang kosong dapat memberi rasa nyaman pada ibu dan mempercepat proses turunya bagian terendah janin, cuci kaki untuk mencegah terjadinya infeksi.

2. Observasi his dan Djj tiap 30 menit

Rasional : Kontraksi uterus merupakan tanda inpartu dan adanya kemajuan persalinan serta untuk memantau keadaan janin.

3. Observasi TTV tiap 4 jam

Rasional : memantau keadaan ibu

4. Monitor kemajuan persalinan tiap 4 jam bila indikasi dengan pemeriksaan dalam

Rasional : Untuk memantau majunya persalinan

5. Anjurkan ibu untuk bernafas panjang saat ada his

Rasional : Suplai oksigen dalam jaringan dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan

6. Damping ibu

Rasional : Ibu merasa aman dan diperhatikan

7. Melakukan pemasangan infus RL

Rasional : Agar terjadi kontraksi

8. Beri support pada ibu dan keluarga

Rasional : Agar ibu dan keluarga tetap bersemangat dan optimis dalam menghadapi persalinan dan kelahiran.

9. Pantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf

Rasional : Dengan partograf dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencana asuhan selanjutnya.

10. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan

Rasional : Untuk membantu bidan dalam mengatasi persalinan dengan inersia uteri

#### **LANGKAH VI. IMPLEMENTASI**

Diagnosa aktual : GIII PII A0, Gestasi 39 minggu 4 hari, Letak memanjang, Intra uteri, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu baik, Keadaan janin baik, Inpartu kala I fase aktif.

Maslah aktual : Inersia uteri

Masalah potensial : Kelelahan, dehidrasi, dan infeksi intrapartum.

Implementasi tanggal 29 Maret 2017

1. Mengobservasi his dan djj serta melakukan VT tiap 4 jam

Jam 15:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 15:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 16:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 16:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 17:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 17:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 18:00 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 18:30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 120x/menit nadi 80x/menit

TD 110/70 mmHg suhu 36,5 C

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 18:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Lunak, tipis

Pembukaan : 8 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK kanan depan

Penurunan : Hodge III

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban

Jam 19:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 130x/menit nadi 80x/menit

2. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 19:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Lunak, tipis

Pembukaan : 8 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK kanan depan

Penurunan : Hodge III

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban

3. Melakukan pemasangan infus dengan dengan cairan RL dengan tetes 8/30 menit pada pukul 19:30 wita

4. Mengobservasi his, nadi djj tiap 30 menit

Jam 19:35 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 130x/menit nadi 80x/menit

Jam 20:00 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 136x/menit nadi 80x/menit

5. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan dengan cara via telephone pukul 20:30 wita dan dokter menyarankan pemberian infus dengan cairan RL+Oksitosin dengan tetes 8/30 menit.

6. Mengobservasi his, nadi djj tiap 30 menit

Jam 20:31 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 136x/menit nadi 80x/menit

Jam 21:00 wita his 4 x 10 menit durasi 45-50 djj 136x/menit nadi 80x/menit

Jam 21:30 wita his 4 x 10 menit durasi 45-50 djj 136x/menit nadi 80x/menit

7. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 21:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Tidak teraba

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK dibawah simpisis

Penurunan : Hodge IV

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban.

8. Menganjurkan ibu bernafas panjang saat ada his

9. Memberi minum kepada ibu

10. Mendampingi ibu

11. Memberi support kepada ibu

12. Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf

#### **LANGKAH VII. EVALUASI**

Diagnosa aktual : GIII PII A0, Gestasi 39 minggu 4 hari, Letak memanjang, Intra uteri, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu baik, Keadaan janin baik, Inpartu kala I fase aktif.

Maslah aktual : Inersia uteri

Masalah potensial : Kelelahan, dehidrasi, dan infeksi intrapartum.

Tanggal 29 Maret 2017 jam 21:30 wita

1. Ibu mengatakan mempunyai dorongan kuat untuk meneran
2. Ibu mengatakan terasa ingin BAB
3. His 4 x 10 menit durasi 45-50 detik
4. Djj 136 x/menit

5. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 21:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan  
 Portio : Tidak teraba  
 Pembukaan : 10 cm  
 Ketuban : Pecah, jernih  
 Presentase : UUK dibawah simpisis  
 Penurunan : Hodge IV  
 Molase : O  
 Penumbungan : Tidak ada  
 Kesan panggul : Normal  
 Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban.

## **KALA II**

### **LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR**

DS : - Ibu mengatakan nyeri perut makin bertambah

- Ibu mengatakan ingin BAB
- Ibu mengatakan ada dorongan kuat untuk meneran

DO : - Perineum menonjol

- Vulva dan vagina membuka
- Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 21:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Tidak teraba

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Pecah, jernih  
 Presentase : UUK dibawah simpisis  
 Penurunan : Hodge IV  
 Molase : O  
 Penumbungan : Tidak ada  
 Kesan panggul : Normal  
 Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban.

## **LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL**

Diagnosa Aktual : Perlangsunan kala II

Masalah Aktual : Kelelahan

DS : - Ibu mengatakan adanya dorongan kuat untuk meneran

- Ibu merasakan sakit pada perut tembus kebelakang
- Ibu mengatakan ada pengeluaran lendir dan darah
- Ibu merasa ingin BAB
- Ibu merasa lelah

DO : - Kontraksi uterus 4 x 10 menit durasi 45-50 detik

- Djj 136 x/menit
- Perineum menonjol
- Anus membuka
- Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 21:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Tidak teraba

Pembukaan	: 10 cm
Ketuban	: Pecah, jernih
Presentase	: UUK dibawah simpisis
Penurunan	: Hodge IV
Molase	: O
Penumbungan	: Tidak ada
Kesan panggul	: Normal
Pelepasan	: Lendir, darah, air ketuban.

#### Analisa dan interpretasi data

- Keinginan meneran ibu merupakan refleks yang ditimbulkan oleh penekanan kepala bayi pada dinding vagina, rectum.
- Hormon oksitosin sintetik merangsang otot polos uterus, meningkatkan eksitabilitas sel-sel otot yang meningkatkan kekuatan kontraksi

#### **LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL**

Tidak ada data yang menunjang

#### **LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY**

Tidak ada data yang menunjang

#### **LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN**

Diagnosa Aktual : Perlangsungan kala II

Masalah Aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : -

Tujuan : - Kala II berjalan lancar

Kriteria : - Djj dalam batas normal (120-160 x/menit)  
 - Kontraksi uterus dalam batas normal (lebih dari 3-5 kali dalam 10 menit) dengan durasi lebih dari 40 detik.

1. Melakukan informed consent

Rasional : Untuk memudahkan dalam melakukan tindakan dan sebagai perlindungan hukum.

2. Lihat tanda gejala kala II

Rasional : Dapat mengetahui mulainya persalinan

3. Siapkan peralatan

Rasional : Agar pertolongan persalinan dilakukan dengan sebaik-baiknya

4. Memakai celemek

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang dan menghindari percikan darah

5. Cuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir

Rasional : Mencegah infeksi silang

6. Mengisi spoit dengan oksitosin dan memakai sarung tangan DTT

Rasional : Mencegah infeksi silang

7. Bersihkan vulva dan perineum

Rasional : Membersihkan jalan lahir dan mencegah infeksi silang

8. Melakukan VT

Rasional : Untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Mencecupkan tangan kedalam larutan clorin 0,5% dan buka sarung tangan secara terbalik

Rasional : Mencegah infeksi silang

10. Periksa Djj

Rasional : Mengetahui keadaan janin

11. Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik

Rasional : Agar ibu mengetahui kemajuan persalinannya serta keadaan bayinya baik

12. Minta bantuan keluarga dalam membantu ibu dalam posisi mendedan

Rasional : Dapat membantu proses persalinan

13. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman saat ibu tidak mempunyai dorongan untuk meneran

Rasional : Supaya ibu mempunyai dorongan untuk meneran

14. Lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mendedan

Rasional : Memperlancar berlangsungnya proses persalinan

15. Pasang handuk bersih diatas perut ibu

Rasional : Mengeringkan badan bayi dari lendir dan darah agar bayi tidak hipotermi

16. Pasang handuk bersih 1/3 bagian di bawah bokong ibu

Rasional : Digunakan untuk menyokong bayi

17. Membuka partus set

Rasional : Untuk memudahkan mengambil sarung tangan dan peralatan lainnya

18. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang

19. Pimpin persalinan dan sokong perineum

Rasional : Membantu ibu dalam meneran dan mencegah agar perineum tidak  
ruptur

20. Bersihkan mulut, hidung dan muka bayi dengan has steril

Rasional : Mengupayakan agar lendir dan air ketuban yang terhisap oleh bayi  
tidak tertelan

21. Periksa lilitan tali pusat

Rasional : Mencegah terjadinya asfiksia pada bayi

22. Tunggu putaran paksi luar kepala bayi

Rasional : Menghindari adanya distosia pada leher dan punggung bayi

23. Lahirkan bahu depan dan kemudian bahu belakang

Rasional : Membantu kelahiran bahu bayi agar tidak terjadi ruptur perineum

24. Lahirkan badan bayi dengan sanggah susur

Rasional : Membantu kelahiran badan bayi agar tidak terjadi ruptur perineum

25. Susur badan bayi, bahu hingga kaki

Rasional : Membantu menyanggah badan bayi agar tidak terjatuh

26. Perhatikan kondisi bayi

Rasional : Untuk menilai Apgar score

27. Keringkan dan bungkus badan bayi

Rasional : Agar bayi tidak kedinginan oleh suhu lingkungan

28. Jepit tali pusat dengan 2 klem

Rasional : Menghentikan darah yang berasal dari plasenta dan badan bayi

29. Gunting tali pusat

Rasional : Memisahkan bayi dengan plasenta dan membantu proses pernafasan serta sirkulasi bayi

30. Ganti pembungkus bayi dengan yang kering

Rasional : Memberikan kenyamanan dan kehangatan pada bayi.

#### **LANGKAH VI. IMPLEMENTASI**

Diagnosa : Perlangsungan kala II

Masalah Aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : -

Implementasi tanggal 29 Maret 2017

1. Melakukan informed consent

Hasil : Sudah dilakukan

2. Melihat tanda gejala kala II

- Adanya dorongan untuk meneran
- Adanya tekanan pada anus

Hasil : Sudah terlihat

### 3. Menyiapkan peralatan persalinan

#### a. Partus set steril

- 2 buah klem
- 1 gunting tali pusat
- ½ kocher
- 1 pasang handscoon
- Pengikat tali pusat/ klem tali pusat
- Kasa steril secukupnya

#### b. Bak heacting steril

- Neilvuder
- Catgut
- Pinset anatomi
- Pinset serurgi
- Guntung benang

#### c. Diluar bak partus

- APD
- Perlak
- Larutan clorin
- Spoit 3 ml
- Tempat plasenta
- Kapas alkohol
- Under pad

- Waslap
- 2 buah handuk
- Dee lee
- Kantong plastik
- Pakaian bersih ibu bayi

Hasil : Sudah tersedia

4. Memakai celemek

Hasil : Celemek telah dipakai

5. Mencuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir

Hasil : Terlaksana

6. Mengisi spoit dengan oksitosin dan memakai sarung tangan DTT

Hasil : Terlaksana

7. Membersihkan vulva dan perineum

Hasil : Terlaksana

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap

Hasil : Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 21:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Tidak teraba

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK dibawah simpisis

Penurunan : Hodge IV

Molase : O  
Penumbungan : Tidak ada  
Kesan panggul : Normal  
Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban.

9. Mencelupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5% dan buka sarung tangan secara terbalik

Hasil : Terlaksana

10. Memeriksa DJJ

Hasil : Djj terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kana bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit

11. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik

Hasil : Terlaksana

12. Meminta bantuan keluarga dalam membantu ibu dalam posisi meneran

Hasil : Terlaksana

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran

Hasil : Terlaksana

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman saat ibu belum mempunyai dorongan kuat untuk meneran

15. Memasang handuk bersih di atas perut ibu

Hasil : Terlaksana

16. Memasang duk bersih 1/3 bagian dibawah bokong ibu

Hasil : Terlaksana

17. Membuka partus set dan memastikan kelengkapan alat

Hasil : Terlaksana

18. Memakai sarung tangan pada kedua tangan

Hasil : Terlaksana

19. Melakukan pimpinan meneran dan menyokong perineum

Hasil : Terlaksana

20. Membersihkan mulut, hidung dan muka bayi dengan has steril

Hasil : Terlaksana

21. Memeriksa lilitan tali pusat

Hasil : Terlaksana

22. Menunggu kepala melakukan putaran paksi luar

Hasil : Terlaksana

23. Melahirkan bahu depan dan kemudian bahu belakang

Hasil : Terlaksana

24. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur

Hasil : Terlaksana

25. Susur badan bayi, bahu hingga kaki

Hasil : Terlaksana

26. Perhatikan kondisi bayi

Hasil : Terlaksana

27. Mengeringkan dan bungkus badan bayi

Hasil : Terlaksana

28. Menjepit tali pusat dengan 2 klem

Hasil : Terlaksana

29. Mengunting tali pusat

Hasil : Terlaksana

30. Menganti pembungkus bayi dengan yang kering

Hasil : Terlaksana

#### **LANGKAH VII. EVALUASI**

Diagnosa : Perlangsungan kala II

Masalah Aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : -

Evaluasi tanggal 29 Maret jam 21:35 wita

1. Kala II berlangsung  $\pm$  3 menit
2. Bayi lahir spontan segera menangis tanggal 29 maret 2017 pukul 21:33 wita,  
laki-laki A/S : 7/10
3. BBL/PBL : 3100 gram / 48 cm
4. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
5. TFU 1jbpst
6. Darah yang keluar  $\pm$  200 cc
7. Plasenta belum lahir.

### **KALA III**

#### **LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR**

DS : - Ibu mengatakan nyeri perut

- Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya

DO : - Kala II berlangsung  $\pm$  3 menit

- Bayi lahir spontan segera menangis tanggal 29 maret 2017 pukul 21:33 wita,  
laki-laki A/S : 7/10
- BBL/PBL : 3100 gram / 48 cm
- Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
- TFU 1jbpst
- Darah yang keluar  $\pm$  200 cc
- Plasenta belum lahir

#### **LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL**

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala III

DS : - Ibu mengatakan nyeri perut

- Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya

DO : - Kala II berlangsung  $\pm$  3 menit

- Bayi lahir spontan segera menangis tanggal 29 maret 2017 pukul 21:33 wita,  
laki-laki A/S : 7/10
- BBL/PBL : 3100 gram / 48 cm
- Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
- TFU 1jbpst

- Darah yang keluar  $\pm$  200 cc
- Plasenta belum lahir

Analisa dan interpretasi data

- Kala II dimulai sejak bayi lahir seluruhnya dan berakhir sampai plasenta lahir lengkap
- Pada waktu kala III volume uterus sudah berkurang dapat teraba TFU 1 jari bawah pusat pada saat uterus berkontraksi memperkecil permukaan uteri sehingga akan terasa sakit dan teraba bulat dan keras.

### **LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL**

DS : -

DO : - TFU 1jrbwpst

- Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras

Analisan dan interpretasi data

- Plasenta yang sudah terlepas dari dinding uterus tapi belum keluar disebabkan oleh tidak adanya usaha untuk melahirkan atau karena salah penanganan kala III sehingga terjadi lingkaran konstiksi pada bagian bawah uterus yang menghalangi keluarnya plasenta.

### **LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY**

Tidak ada indikasi

### **LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN**

Diagnosa : Perlangsungan kala III

Masalah aktual : -

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya rest plasenta

Tujuan : - Kala III berlangsung normal

- Perdarahan tidak terjadi

- Tidak terjadi rest plasenta

Kriteria : - Lamanya kala III  $\pm$  30 menit

- Perdarahan kala III  $\pm$  250 cc

- Pelepasan plasenta lengkap

Intervensi tanggal 29 Maret 2017

31. Periksa fundus uteri

Rasional : Untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

32. Beritahu ibu akan disuntikkan oksitosin

Rasional : Oksitosin dapat membantu terlepasnya plasenta

33. Suntikkan oksitosin 10 unit (IM) dan lakukan PTT

Rasional : Suntikan oksitosin dapat membantu kontraksi uterus dan perengangan tali pusat terkendali (PTT) akan memudahkan keluarnya plasenta.

34. Pindahkan klem pada tali pusat 5-10 cm dari vulva

Rasional : Memudahkan perengangan tali pusat

35. Letakkan satu tangan di atas simpisis (dorso cranial) regangkan tali pusat saat berkontraksi

Rasional : Dengan PTT akan memudahkan plasenta terlepas dan tangan di atas simpisis untuk mencegah terjadinya rest plasenta.

36. Keluarkan plasenta dengan menarik kearah bawah dan kearah atas

Rasional : Untuk membantu pengeluaran plasenta

37. Jemput plasenta dengan kedua tangan dengan memutar searah jarum jam

Rasional : Mencegah robekan plasenta dan selaput ketuban serta menghindari tertinggalnya sisa-sisa plasenta

38. Lakukan masase uterus sambil memeriksa kelengkapan plasenta

Rasional : Merangsang kontraksi uterus dan mencegah terjadinya terjadinya perdarahan

39. Periksa plasenta dan selaput ketuban lahir, jumlah ketiledon, insersi tali pusat

Rasional : Dengan adanya sisa plasenta dan ketuban yang tertinggal akan menyebabkan perdarahan.

40. Masukkan plasenta kedalam kantong plastik

Rasional : Mencegah infeksi silang

## **LANGKAH VI. IMPLEMENTASI**

Diagnosa : Perlangsungan kala III

Masalah aktual : -

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya rest plasenta

Implementasi tanggal 29 Maret 2017

31. Memeriksa fundus uteri

Hasil : Terlaksana

32. Memberitahu ibu akan disuntikkan oksitosin

Hasil : Terlaksana

33. Menyuntikkan oksitosin 10 unit (IM) dan lakukan PTT

Hasil : Terlaksana

34. Memindahkan klem pada tali pusat 5-10 cm dari vulva

Hasil : Terlaksana

35. Meletakkan satu tangan di atas simpisis (dorso cranial) regangkan tali pusat saat berkontraksi

Hasil : Terlaksana

36. Mengeluarkan plasenta dengan menarik kearah bawah dan kearah atas

Hasil : Terlaksana

37. Menjemput plasenta dengan kedua tangan dengan memutar searah jarum jam

Hasil : Terlaksana, plasenta lahir lengkap tanggal 29 Maret 2017 jam 21:40 wita

38. Melakukan masase uterus sambil memeriksa kelengkapan plasenta

Hasil : Terlaksana

39. Memeriksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban lahir, jumlah ketiledon, insersi tali pusat

Hasil : Terlaksana

40. Memasukkan plasenta kedalam kantong plastik

Hasil : Terlaksana

#### **LANGKAH VII. EVALUASI**

Diagnosa : Perlangsungan kala III

Masalah aktual : -

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya rest plasenta

Evaluasi tanggal 29 Maret 2017

1. Kala III berlangsung 7 menit
2. Plasenta lahir lengkap dan selaput ketiledon
3. Kontraksi uterus baik terba keras dan bundar
4. TFU 1 jari bawah pusat
5. Perdarahan  $\pm$  200 cc
6. Tidak terjadi laserasi

#### **KALA IV**

##### **LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR**

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO : - Kala III berlangsung 7 menit

- Plasenta lahir lengkap dan selaput ketiledon
- Kontraksi uterus baik terba keras dan bundar
- TFU 1 jari bawah pusat
- Perdarahan  $\pm$  200 cc
- Tidak terjadi laserasi

##### **LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL**

Diagnosa : Perlangsungan kala IV

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO : - Kala III berlangsung 7 menit

- Plasenta lahir lengkap dan selaput ketiledon
- Kontraksi uterus baik terba keras dan bundar

- TFU 1 jari bawah pusat
- Perdarahan  $\pm$  200 cc
- Tidak terjadi laserasi

Analisa dan interpretasi data

- Saat kala II berlangsung diperlukan tenaga untuk meneran sehingga tekanan cardiac meningkat yang menyebabkan TTV sedikit meningkat. Setelah plasenta lahir maka otot uterus berkontraksi sehingga dapat menutup pembuluh darah pada dinding uterus yang bermuara pada bekas implantasi plasenta.

### **LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL**

Antisipasi terjadinya perdarahan

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO : - Kala III berlangsung 7 menit

- Plasenta lahir lengkap dan selaput ketiledon
- Kontraksi uterus baik terba keras dan bundar
- TFU 1 jari bawah pusat
- Perdarahan  $\pm$  200 cc
- Tidak terjadi laserasi

Analisa dan interpretasi data

- Kelelahan yang dialami setelah persalinan menyebabkan kontraksi uterus tidak baik.
- Kala IV merupakan kala pengawasan yang memungkinkan terjadi perdarahan atonia uteri atau rest plasenta.

#### **LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY**

Tidak ada data yang menunjang

#### **LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN**

Diagnosa : Perlangsungan kala III

Masalah Aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya perdarahan

Tujuan : Kala IV berlangsung normal

Kriteria : - Kontraksi uterus baik terba keras dan bundar  
- Perdarahan tidak terjadi  
- Tanda-tanda vital dalam batas normal

Intervensi tanggal 29 Maret 2017

41. Periksa adanya robekan jalan lahir

Rasional : Mengantisipasi terjadinya perdarahan jalan lahir

42. Lakukan evaluasi kontraksi uterus

Rasional : Mengantisipasi terjadinya perdarahan akibat kontraksi uterus yang kurang baik

43. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ibu selama sejam

Rasional : Agar terjalin ikatan batin

44. Lakukan penimbangan setelah sejam kontak kulit ibu bayi

Rasional : Untuk menegtahui pertumbuhan bayi

45. Memberikan suntikan HB0 pada paha kanan bayi

Rasional : Agar bayi terhindar dari infeksi

46. Lanjutkan pemantuan kontraksi uterus

Rasional : Agar tidak terjadi perdarahan

47. Ajarkan ibu masase uterus

Rasional : Agar kontraksi uterus baik

48. Mengevaluasi jumlah kehilangan darah

Rasional : Agar tidak terjadi anemia

49. Periksa tanda-tanda vital dan kandung kemih

Rasional : Sebagai indikator mengantisipasi terjadinya perdarahan post partum

50. Periksa kembali kondisi bayi

Rasional : Agar bayi dalam kondisi baik-baik saja

51. Menempatkan semua peralatan dalam larutan clorin 0,5%

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang

52. Membuang sampah yang terkontaminasi

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang

53. Bersihkan ibu dari sisa cairan ketuban, darah, dan lendir

Rasional : Agar ibu merasa nyaman

54. Memastikan ibu merasa nyaman dan membantu ibu memberikan ASI

Rasional : Agar produksi ASI ada

55. Dekontaminasi tempat bersalin

Rasional : Agar tidak terjadi infeksi

56. Mencelupkan tangan yang bersarung tangan dan merendamnya dalam keadaan terbalik

Rasional : Mencegah terjadinya infeksi silang

57. Mencuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir

Rasional : Agar tidak terjadi infeksi

58. Melengkapi partograf

Rasional : Sebagai lembar pertanggung jawaban hasil pertolongan persalinan

#### **LANGKAH VI. IMPLEMENTASI**

Diagnosa : Perlangsungan kala III

Masalah Aktual : Kelelahan

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya perdarahan

Implementasi tanggal 29 Maret 2017

41. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Hasil : Tidak terjadi robekan

42. Melakukan evaluasi terhadap kontraksi uterus

Hasil : Kontraksi uterus baik

43. Membiarkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu selama sejam

Hasil : Terlaksana

44. Melakukan penimbangan berat badan, panjang badan setelah sejam kontak kulit ibu bayi

Hasil : BB : 3100 gram, PB : 48 cm

45. Memberikan suntikan HB0 pada paha kanan bayi

Hasil : Terlaksana

46. Melanjutkan pemantuan kontraksi uterus

Hasil : Kontraksi uterus baik

47. Mengajarkan ibu cara masase uterus

Hasil : Terlaksana

48. Mengevaluasi jumlah kehilangan darah

Hasil : perdarahan  $\pm$  200 cc

49. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan kandung kemih setiap 15 menit pada satu jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke dua pasca persalinan

Hasil :

Jam pertama pasca persalinan

Pukul 21:55, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  200 cc.

Pukul 22:10, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  180 cc.

Pukul 22:25, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  150 cc.

Pukul 22:40, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  100 cc.

Jam kedua pasca persalinan

Pukul 23:10, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  50 cc.

Pukul 23:40, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  20 cc.

50. Memeriksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bayi bernafas baik serta suhu tubuh normal

Hasil : Terlaksana

51. Menempatkan semua peralatan dalam larutan clorin 0,5%

Hasil : Terlaksana

52. Membuang sampah yang terkontaminasi kedalam tempat sampah yang sesuai

Hasil : Terlaksana

53. Membersihkan ibu dari sisa cairan ketuban, darah, dan lendir

Hasil : Terlaksana

54. Memastikan ibu merasa nyaman dan membantu ibu memberikan ASI

Hasil : Terlaksana

55. Mendekontaminasi tempat bersalin dengan larutan clorin 0,5%

Hasil : Terlaksana

56. Mencelupkan tangan yang bersarung tangan dan merendamnya dalam keadaan terbalik

Hasil : Terlaksana

57. Mencuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir

Hasil : Terlaksana

58. Melengkapi partograf

Hasil : Partograf telah lengkap.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE  
PADA NY “A” GESTASI 39 MINGGU 4 HARI DENGAN INERSIA UTERI  
DI RSUD HAJI MAKASSAR SULAWASI SELATAN**

**TANGGAL 29 MARET 2017**

No. Registrasi : 23 30 69  
Tanggal Masuk : 29 Maret 2017 Jam 14:25 Wita.  
Tanggal Pengkajian : 29 Maret 2017 Jam 14:30 Wita.  
Tanggal Partus : 29 Maret 2017 Jam 21:33 Wita.  
Nama Mahasiswa : Nurjayanti  
A. Identitas Istri / Suami  
Nama : Ny “A” / Tn. “D”  
Umur : 20 Tahun / 27 Tahun  
Nikah / Lamanya : 1x /  $\pm$  6 Tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SD / SMP  
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian  
Alamat : Jl. Kumala

**KALA I**

**DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu merasakan nyeri perut bagian bawah tembus belakang terasa sejak tanggal  
29 maret 2017 jam 05:00 wita

2. Sifat nyeri bersifat hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan lama.
3. Pelepasan lendir dan darah sudah ada sejak tanggal 29 maret 2017 pukul 06:00 wita
4. Merupakan anak ke 3 dan tidak pernah keguguran
5. Anak pertama lahir tahun 2012 di RS Petramedika dengan jenis kelamin laki-laki dan dengan berat lahir 3200 gram dengan persalinan normal, ibu menyusui selama  $\pm$  1,5 tahun
6. Anak kedua lahir tahun 2014 di RS Pertamedika dengan jenis kelamin laki-laki dan dengan berat lahir 3000 gram dengan persalinan normal, ibu menyusui selama  $\pm$  1,5 tahun
7. Ibu mengatakan HPHT tanggal 24-06-2016
8. Ibu menarche umur 13 tahun, siklus haid 28-30 hari, lama haid 6-7 hari dan tidak ada disminorea
9. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada sebelah kanan
10. Tidak ada riwayat asma, jantung, hipertensi dan penyakit menular seksual
11. Tidak pernah menjadi akseptor KB
12. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami dan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh suami serta ibu berdoa untuk keselamatan dirinya dan janinnya dan berharap agar persalinannya lancar

#### **DATA OBJEKTIF**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran compasmentis

3. HTP 01-04-2017
4. UK 39 minggu 4 hari
5. TTV; TD : 110/70 mmHg

P : 21 x/menit

S : 36,5 C

N : 80 x/menit

6. Melakukan pemeriksaan fisik

- a. Wajah

Ekspresi wajah tampak meringis saat ada his, tidak ada cloasma gravidarum dan tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan

- b. Payudara

Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk, hiperpigmentasi areola mammae dan tidak ada benjolan pada mammae

- c. Abdomen

Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba, dan tidak ada nyeri tekan

Leopold I : TFU 3 jrbpx, 37 cm teraba bokong

Leopold II : Punggung kanan

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

Lingkar Perut : 82 cm

Tafsiran Berat Janin :  $TFU \times LP = 37 \times 82 = 3060$  gram

His : 3 x 10 menit durasi 30-35

DJJ terdengar kuat, jelas, dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 120x/menit

d. Genitalia

Tidak ada varises, tampak pengeluaran lendir dan darah

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 14:30 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Lunak, tipis

Pembukaan : 6 cm

Ketuban : Utuh

Presentase : UUK kanan depan

Penurunan : Hodge I ke hodge II

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah

e. Ekstremitas

Tidak ada varices, dan tidak ada oedema

**ASSESSMENT**

GIII PII A0, Gestasi 39 minggu 4 hari, Situs memanjang, Intrauterin, Hidup, Tunggal,

Keadaan ibu dan janin baik, Inpartu kala I fase aktif

## PLANNING

Tanggal 29 maret 2017

1. Memberitahukan ibu dan keluarga hasil pemeriksaan

Hasil : Terlaksana

2. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri yang dirasakan bahwa nyeri terjadi akibat kontraksi pada otot perut yang mengakibatkan jalan lahir tertekan oleh bagian terendah janin

Hasil : Ibu menegerti

3. Menganjurkan ibu untuk teknik relaksasi pada saat ada his

Hasil : Terlaksana

4. Menganjurkan ibu untuk tidur miring

Hasil : Ibu tidur miring

5. Mengobservasi his dan djj serta melakukan VT tiap 4 jam

Jam 15:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 15:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 16:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 16:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 17:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 17:30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 18:00 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 120x/menit nadi 80x/menit

Jam 18:30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 120x/menit nadi 80x/menit

TD 110/70 mmHg suhu 36,5 C

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 18:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Lunak, tipis

Pembukaan : 8 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK kanan depan

Penurunan : Hodge III

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban

Jam 19:00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 130x/menit nadi 80x/menit

6. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 19:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Lunak, tipis

Pembukaan : 8 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK kanan depan

Penurunan : Hodge III

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban

7. Melakukan pemasangan infus dengan dengan cairan RL dengan tetes 8/30 menit pada pukul 19:30 wita

8. Mengobservasi his, nadi djj tiap 30 menit

Jam 19:35 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 130x/menit nadi 80x/menit

Jam 20:00 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 136x/menit nadi 80x/menit

9. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan dengan cara via telephone pukul 20:30 wita dan dokter menyarankan pemberian infus dengan cairan RL+Oksitosin dengan tetes 8/30 menit.

10. Mengobservasi his, nadi djj tiap 30 menit

Jam 20:31 wita his 3 x 10 menit durasi 35-40 djj 136x/menit nadi 80x/menit

Jam 21:00 wita his 4 x 10 menit durasi 45-50 djj 136x/menit nadi 80x/menit

Jam 21:30 wita his 4 x 10 menit durasi 45-50 djj 136x/menit nadi 80x/menit

11. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 21:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan

Portio : Tidak teraba

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Pecah, jernih

Presentase : UUK dibawah simpisis

Penurunan : Hodge IV

Molase : O

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban.

12. Megobservasi tekanan darah beserta suhu

Hasil : TD : 110/70 mmHg

S : 36,7 C

13. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan di partograf

Hasil : Terlaksana

**KALA II**

**DATA SUBJEKTIF**

1. Nyeri perut makin bertambah
2. Ada dorongan kuat untuk meneran
3. Ibu merasa ingin BAB

**DATA OBJEKTIF**

1. Perineum menonjol
2. Vulva dan vagina membuka
3. His 4 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik
4. Djj 136 x/menit

**ASSESMEN**

Perlangsungan kala II

## PLANNING

### 1. Melihat tanda gejala kala II

- Ibu merasakan adanya tekanan pada anus
- Ibu merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran
- Perineum menonjol
- Vulva dan vagina membuka

Hasil : Sudah terlihat

### 2. Menyiapkan peralatan persalinan

#### a. Partus set steril

- 2 buah klem
- 1 gunting tali pusat
- ½ kocher
- 1 pasang handscoon
- Pengikat tali pusat/ klem tali pusat
- Kasa steril secukupnya

#### b. Bak heacting steril

- Neilvuder
- Catgut
- Pinset anatomi
- Pinset serurgi
- Guntung benang

c. Diluar bak partus

- APD
- Perlak
- Larutan clorin
- Spoit 3 ml
- Tempat plasenta
- Kapas alkohol
- Under pad
- Waslap
- 2 buah handuk
- Dee lee
- Kantong plastik
- Pakaian bersih ibu bayi

Hasil : Sudah tersedia

3. Memakai celemek

Hasil : Celemek telah dipakai

4. Mencuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir

Hasil : Terlaksana

5. Memakai sarung tangan DTT

Hasil : Terlaksana

6. Mengisi spoit dengan oksitosin dengan menggunakan satu tangan

Hasil : Terlaksana

7. Membersihkan vulva dan perineum

Hasil : Terlaksana

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap

Hasil : Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 29 maret 2017 jam 21:31 Wita

Vulva dan vagina : Tidak ada kelainan  
 Portio : Tidak teraba  
 Pembukaan : 10 cm  
 Ketuban : Pecah, jernih  
 Presentase : UUK dibawah simpisis  
 Penurunan : Hodge IV  
 Molase : O  
 Penumbungan : Tidak ada  
 Kesan panggul : Normal  
 Pelepasan : Lendir, darah, air ketuban.

9. Menceleupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5% dan buka sarung tangan secara terbalik

Hasil : Terlaksana

10. Memeriksa DJJ setelah kontraksi uterus selesai

Hasil : Djj terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kana bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit

11. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik

Hasil : Terlaksana

12. Meminta bantuan keluarga dalam membantu ibu dalam posisi meneran

Hasil : Terlaksana

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran

Hasil : Terlaksana

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman saat ibu belum mempunyai dorongan kuat untuk meneran

15. Memasang handuk bersih di atas perut ibu

Hasil : Terlaksana

16. Memasang duk bersih 1/3 bagian dibawah bokong ibu

Hasil : Terlaksana

17. Membuka partus set dan memastikan kelengkapan alat

Hasil : Terlaksana

18. Memakai sarung tangan pada kedua tangan

Hasil : Terlaksana

19. Melakukan pimpinan meneran dan menyokong perineum

Hasil : Terlaksana

20. Membersihkan mulut, hidung dan muka bayi dengan has steril

Hasil : Terlaksana

21. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika itu terjadi

Hasil : Terlaksana

22. Menunggu kepala melakukan putaran paksi luar secara spontan

Hasil : Terlaksana

23. Melahirkan bahu depan dan kemudian bahu belakang

Hasil : Terlaksana

24. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur

Hasil : Terlaksana

25. Susur badan bayi, bahu hingga kaki

Hasil : Terlaksana

26. Perhatikan kondisi bayi

Hasil : Terlaksana

27. Mengeringkan dan bungkus badan bayi

Hasil : Terlaksana

28. Menjepit tali pusat dengan 2 klem

Hasil : Terlaksana

29. Mengunting tali pusat

Hasil : Terlaksana

30. Menganti pembungkus bayi dengan yang kering

Hasil : Terlaksana

### **KALA III**

#### **DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu merasa lemas
2. Nyeri pada bagian perut

**DATA OBJEKTIF**

1. Keadaan umum ibu lemas
2. Bayi lahir tanggal 29 Maret 2017 pukul 21:33 wita jk : laki-laki
3. Kontraksi uterus baik
4. Kandung kemih kosong
5. Plasenta belum lahir

**ASSESSMENT**

Perlangsungan kala III

**PLANNING**

31. Memeriksa fundus uteri  
Hasil : Terlaksana
32. Memberitahu ibu akan disuntikkan oksitosin  
Hasil : Terlaksana
33. Menyuntikkan oksitosin 10 unit (IM) dan lakukan PTT  
Hasil : Terlaksana
34. Memindahkan klem pada tali pusat 5-10 cm dari vulva  
Hasil : Terlaksana
35. Meletakkan satu tangan di atas simpisis (dorso cranial) regangkan tali pusat saat berkontraksi  
Hasil : Terlaksana
36. Mengeluarkan plasenta dengan menarik kearah bawah dan kearah atas  
Hasil : Terlaksana

37. Menjemput plasenta dengan kedua tangan dengan memutar searah jarum jam

Hasil : Terlaksana, plasenta lahir lengkap tanggal 29 Maret 2017 jam 21:40 wita

38. Melakukan masase uterus sambil memeriksa kelengkapan plasenta

Hasil : Terlaksana

39. Memeriksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban lahir, jumlah ketiledon, insersi tali pusat

Hasil : Terlaksana

40. Memasukkan plasenta kedalam kantong plastik

Hasil : Terlaksana

#### **KALA IV**

#### **DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu mengeluh kelelahan
2. Ibu merasa sedikit mules

#### **DATA OBJEKTIF**

1. Keadaan ibu masih lelah
2. Kandung kemih kosong
3. Kontraksi uterus baik
4. TFU setinggi pusat
5. Perdarahan  $\pm$  200 C

#### **ASSESMENT**

Perlangsungan kala IV

## PLANNING

41. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Hasil : Tidak terjadi robekan

42. Melakukan evaluasi terhadap kontraksi uterus

Hasil : Kontraksi uterus baik

43. Membiarkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu selama sejam

Hasil : Terlaksana

44. Melakukan penimbangan berat badan, panjang badan setelah sejam kontak kulit ibu bayi

Hasil : BB : 3100 gram, PB : 48 cm

45. Memberikan suntikan HB0 pada paha kanan bayi

Hasil : Terlaksana

46. Melanjutkan pemantuan kontraksi uterus

Hasil : Kontraksi uterus baik

47. Mengajarkan ibu cara masase uterus

Hasil : Terlaksana

48. Mengevaluasi jumlah kehilangan darah

Hasil : perdarahan  $\pm$  200 cc

49. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan kandung kemih setiap 15 menit pada satu jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke dua pasca persalinan

Hasil :

Jam pertama pasca persalinan

Pukul 21:55, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  200 cc.

Pukul 22:10, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  180 cc.

Pukul 22:25, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  150 cc.

Pukul 22:40, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  100 cc.

Jam kedua pasca persalinan

Pukul 23:10, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  50 cc.

Pukul 23:40, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 80x/i, suhu 36,7 C, TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong serta perdarahan  $\pm$  20 cc.

50. Memeriksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bayi bernafas baik serta suhu tubuh normal

Hasil : Terlaksana

51. Menempatkan semua peralatan dalam larutan clorin 0,5%

Hasil : Terlaksana

52. Membuang sampah yang terkontaminasi kedalam tempat sampah yang sesuai

Hasil : Terlaksana

53. Membersihkan ibu dari sisa cairan ketuban, darah, dan lendir

Hasil : Terlaksana

54. Memastikan ibu merasa nyaman dan membantu ibu memberikan ASI

Hasil : Terlaksana

55. Mendekontaminasi tempat bersalin dengan larutan clorin 0,5%

Hasil : Terlaksana

56. Mencelupkan tangan yang bersarung tangan dan merendamnya dalam keadaan terbalik

Hasil : Terlaksana

57. Mencuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir

Hasil : Terlaksana

58. Melengkapi partograf

Hasil : Partograf telah lengkap.



**CATATAN PERSALINAN**

- Tanggal: 29-03-2017
- Nama bidan : .....
- Tempat Persalinan :  
 Rumah Ibu  Puskesmas  
 Polindes  Rumah Sakit  
 Klinik Swasta  Lainnya : .....
- Alamat tempat persalinan : .....
- Catatan :  rujuk, kala : I / II / III / IV
- Alasan merujuk : .....
- Tempat rujukan : .....
- Pendamping pada saat merujuk :  
 Bidan  Teman  
 Suami  Dukun  
 Keluarga  Tidak ada

**KALA I**

- Partogram melewati garis waspada **Y/T**
- Masalah lain, sebutkan :  
 ins. kebans
- Penatalaksanaan masalah Tsb :  
 urut LC + dihisap
- Hasilnya : .....

**KALA II**

- Episiotomi :  
 Ya, Indikasi .....  
 Tidak
- Pendamping pada saat persalinan  
 Suami  Teman  Tidak ada  
 Keluarga  Dukun
- Gawat Janin :  
 Ya, tindakan yang dilakukan  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 Tidak
- Distosia bahu :  
 Ya, tindakan yang dilakukan  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 Tidak
- Masalah lain, sebutkan : .....
- Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
- Hasilnya : .....

**KALA III**

- Lama kala III : 7 menit
- Pemberian Oksitosin 10 U im ?  
 Ya, waktu : ..... menit sesudah persalinan  
 Tidak, alasan : .....
- Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?  
 Ya, alasan : .....
- Penanganan tali pusat terkendali ?  
 Ya  
 Tidak, alasan : .....

- Masase fundus uteri ?  
 Ya  
 Tidak, alasan : .....
- Plasenta lahir lengkap (intact) **Ya** / Tidak  
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :  
 a. ....  
 b. ....
- Plasenta tidak lahir > 30 menit : **Ya** **Tidak**  
 Ya, tindakan :  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....
- Laserasi :  
 Ya, dimana .....  
 Tidak
- Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4  
 Tindakan :  
 Penjahitan, dengan / tanpa anestesi  
 Tidak dijahit, alasan : .....
- Atoni uteri :  
 Ya, tindakan  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 Tidak
- Jumlah perdarahan : 200 ml
- Masalah lain, sebutkan : .....
- Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
- Hasilnya : .....

**BAYI BARU LAHIR :**

- Berat badan 3100 gram
- Panjang 48 cm
- Jenis kelamin **U/P**
- Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit  
 Bayi lahir :  
 Normal, tindakan :  
 mengeringkan  
 menghangatkan  
 rangsang taktil  
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu  
 Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas/, tindakan :  
 mengeringkan  bebaskan jalan napas  
 rangsang taktil  menghangatkan  
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu  
 lain - lain sebutkan : .....
- Cacat bawaan, sebutkan : .....
- Hipotermi, tindakan :  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....
- Pemberian ASI  
 Ya, waktu : **segera** jam setelah bayi lahir  
 Tidak, alasan : .....
- Masalah lain, sebutkan : .....
- Hasilnya : .....

**PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV**

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	21:55	110/60 mmHg	80 x/i	36,7°C	1000gr	Baik	kosong	1200 cc
	22:10	110/60 mmHg	80 x/i		1000gr	Baik	kosong	1100 cc
	22:25	110/60 mmHg	80 x/i		1000gr	Baik	kosong	1100 cc
	22:40	110/60 mmHg	80 x/i		1000gr	Baik	kosong	1100 cc
2	23:10	110/60 mmHg	80 x/i	36,7°C	1000gr	Baik	kosong	1100 cc
	23:40	110/60 mmHg	80 x/i		1000gr	Baik	kosong	1200 cc

Masalah kala IV : .....

Penatalaksanaan masalah tersebut : .....

Hasilnya : .....

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang kesenjangan antara teori hasil studi pada pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan pada klien Ny “A” dengan kasus inersia uteri di ruang intranatal care di RS Haji Makassar tanggal 29 Maret 2017. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus. Untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi agar tindakan yang direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat dianalisa secara teoritis yang dimulai dari pengkajian data, interpretasi data, analisa data, perencanaan, implementasi dan evaluasi asuhan kebidanan untuk memudahkan memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus ini.

#### **A. Identifikasi dan Analisa Data Dasar**

Pada pengumpulan data dasar merupakan proses manajemen kebidanan yang kegiatannya ditujukan untuk mengumpulkan informasi. Mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.

Berdasarkan pengkajian data diperoleh bahwa Ny “A” berusia 20 tahun, hamil yang ketiga dan tidak pernah keguguran. Ny “A” mengatakan bahwa haid pertama haid terakhirnya pada tanggal 24 juni 2016, menurut rumus Naegele usia kehamilan ibu sudah memasuki 39 minggu 4 hari dan tafsiran persalinannya pada tanggal 01 bulan

april 2017. Ibu mengatakan merasakan sakit perut tembus ke belakang sejak tanggal 29 maret 2017 pukul 05:00 wita bersifat hilang timbul dan ibu mengatakan janinya bergerak kuat pada sebelah kiri perut ibu. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang sangat hebat selama hamil dan ibu memeriksakan kandungannya sebanyak 3x dan mendapat suntika TT 1x. Ibu juga tidak pernah menderita hipertensi, asma, maupun jantung dan ibu tidak pernah menjadi akseptor KB.

Dari hasil pemeriksaan TTV ibu diperoleh TTV dalam batas normal, pemeriksaan leopard diperoleh TFU 3jrbpx, 37 cm dan teraba bokong di fundus uteri, punggung kanan, presentase kepala dan kepala sudah masuk kedalam rongga panggul. Hasil pemeriksaan dalam pukul 14:30 wita didapatkan pembukaan 6 cm dan pembukaan lengkap pada jam 21:30 wita sampai jam 21:33 wita bayi lahir.

Dari hasil pemeriksaan pukul 14:30 wita didapatkan pembukaan 6 cm dan penurunan kepala janin berada pada hodge I ke hodge II, frekuensi his 3 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik, serta DJJ dan nadi dalam batas normal. Pada pukul 18:30 wita dilakukan pemeriksaan dalam dan didapatkan ibu dalam pembukaan 8 cm dan penurunan kepala berada dalam hodge III, frekuensi his 4 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik. Pada pukul 19:00 wita sampai 20:30 wita his ibu 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 35-40 detik. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam pukul 19:30 wita didapatkan ibu masih dalam pembukaan 8 cm dan penurunan kepala masih berada dalam hodge III. Pembukaan ibu menjadi lengkap pada pukul 21:30 wita dan penurunan kepala janin sudah berada di hodge IV.

Pada VT pertama didapatkan ibu dalam pembukaan 6 cm dan penurunan kepala janin berada dalam hodge I ke hodge II. Frekuensi his ibu 3 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik serta DJJ dan nadi dalam batas normal. Hasil observasi his ibu pada pukul 15:00 wita samapai 17:00 wita frekuensi his ibu masih dalam 3 kali dalam 10 menit durasi 30-35 detik. Pada pukul 17:30 wita frekuensi his ibu menjadi 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik, dan pada pukul 18:00 wita frekuensi his ibu menjadi 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi his ibu mengalami peningkatan. Menurut Kuswanti dan Fitria (2014:27) his akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pula oksitosin yang dilepaskan oleh hipofisis posterior sehingga bisa membantu proses kelahiran bayi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Hayah tahun 2014 “Pengaruh Oksitosin dalam Kontraksi Uterus Otot Polos” oksitosin mempengaruhi kontraksi otot polos uterus melalui mekanisme “Ca<sup>2+</sup> dependent” dan “Ca<sup>2+</sup> independent”.

Pada VT kedua didapatkan ibu dalam pembukaan 8 cm dan penurunan kepala janin berada di hodge III, frekuensi his 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik. DJJ dan nadi dalam batas normal. VT ini dilakukan 4 jam setelah VT pertama dan VT pertama didapatkan pembukaan 6 cm kemudian VT kedua didapatkan pembukaan 8 cm. Hal ini menunjukkan bahwa serviks hanya membuka 2 cm dan seharusnya setiap 1 jam serviks ini mengalami pembukaan 1 cm. Ada beberapa hal yang dapat menghambat terjadinya pembukaan serviks salah satu diantaranya adalah perasaan yang tegang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk tahun 2012 “Pengaruh *Deep Back Massage* Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan

Kala I Fase Aktif Dan Kecepatan Pembukaan Pada Ibu Bersalin Primigravida” semakin ibu merasa rileks saat menjalani persalinan maka pembukaan serviks dapat berlangsung lebih cepat.

Pada VT ketiga didapatkan ibu masih dalam pembukaan 8 cm dan penurunan kepala masih berada di hodge III. Frekuensi his 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 35-40 detik. DJJ dan nadi dalam batas normal. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi his mengalami penurunan. Frekuensi his yang pada awalnya meningkat mengalami penurunan itu diakibatkan karena kurangnya pelepasan oksitosin. Kurangnya pelepasan oksitosin ini dipicu karena adanya perasaan cemas, tegang, serta takut. Menurut Cristina (2013:46) hormon oksitosin merupakan hormon yang juga berperan dalam perasaan gembira. Hipotalamus merupakan pusat kontrol dari emosi, ketika merasakan emosi positif (senang, gembira) akan merangsang hipotalamus untuk memerintahkan hipofisis untuk mensekresikan oksitosin. Efek yang terjadi pada tubuh ialah tubuh akan merasakan perasaan tenang, damai, gembira, dan bersemangat.

Pada VT keempat yaitu pada pukul 21:30 wita, ibu dalam pembukaan lengkap. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi his yang mengalami peningkatan. Frekuensi his yang tadinya 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 35-40 detik kini menjadi 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik. Hal ini menunjukkan bahwa his yang dimiliki ibu kembali bagus sehingga dapat melakukan pembukaan serviks dan penurunan kepala janin. Menurut Fauziyah (2014:78) his yang bagus adalah his yang kontraksi yang simetris, kontraksi paling kuat atau didominasi di fundus uteri dan terjadi relaksasi

setelahnya. His yang tidak bagus adalah his yang kontraksinya lemah dan his yang terjadi <3 kali dalam 10 menit dengan durasi <40 detik.

Penyebab dari kurangnya pembukaan yang dialami oleh ibu adalah kurang adekuatnya his untuk melakukan pembukaan serviks dan penurunan kepala janin. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi his yang pada awalnya mengalami peningkatan dan bagus namun secara perlahan mengalami penurunan frekuensi. Hal inilah yang menyebabkan tidak terjadinya pembukaan pada serviks dan penurunan kepala janin. Menurut Sarwono (2014:290) di samping tekanan air ketuban pada permulaan kala I dan selanjutnya oleh kepala janin yang makin masuk ke rongga panggul dan sebagai benda keras yang mengadakan tekanan kepada serviks sehingga menimbulkan pembukaan, his juga salah satu menjadi faktor penyebab pembukaan dan penipisan hingga pembukaan menjadi lengkap.

Teori mengatakan apabila his tidak bagus maka tidak akan terjadi pembukaan dan apabila tidak ada pembukaan maka persalinan akan menjadi lama. Seharusnya pada primigravida kala I berlangsung kira-kira 13 jam dan pada muligravida kira-kira 7 jam (Kuswanti, Melina, 2014:5). Sedangkan pada kasus Ny "A" ditemukan perlangsungan kala I selama  $\pm$  11 jam. Hal ini disebabkan karena kurangnya adekuat his untuk melakukan pembukaan serviks pada saat proses persalinan. Kurangnya his untuk melakukan pembukaan serviks dinamakan inersia uteri, karena his ini tidak dapat membuka serviks dan penurunan kepala janin sehingga menyebabkan persalinan menjadi lama.

Menurut teori inersia uteri sering dijumpai pada multigravida. Hal ini menunjukkan bahwa ibu yang seringkali melahirkan dapat menyebabkan keadaan rahim biasanya sudah lemah sehingga menimbulkan persalinan lama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhiyanti dan Susanti dalam jurnalnya yang berjudul “faktor ibu yang berhubungan dengan kejadian persalinan lama di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru” pada tahun 2016 paritas berisiko dapat menyebabkan terjadinya persalinan lama dikarenakan otot-otot rahim pada ibu sering melahirkan sudah melemah sehingga bisa mengakibatkan lamanya proses persalinan.

Pada Ny ”A” didapatkan bahwa ibu hamil yang ketiga, dan tidak pernah mengalami keguguran. Hal ini menunjukkan bahwa Ny ”A” adalah ibu yang multigravida. Pada kasus di atas terjadi partus lama yang disebabkan oleh kurangnya his. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan penerapan manajemen asuhan kebidanan.

### **B. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual**

Dalam pengkajian data dapat ditemukan diagnosa dan masalah kebidanan berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang didukung oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan.

Dalam persalinan, ada 3 faktor yang berperan diantaranya adalah *Power*. *Power* dalam hal ini adalah kekuatan his. His yang sempurna bila terdapat kontraksi yang simetris, kontraksi paling kuat atau adanya dominasi di fundus uteri, dan sesudah itu

terjadi relaksasi. Pada tiap kontraksi tekanan akan terus meningkat sehingga terjadi pembukaan serviks dan penurunan.

Pada persalinan didapatkan juga kelainan his yang kekuatannya tidak adekuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin keluar, disini kekuatan his lemah, kontraksi lebih kuat dan lebih dulu daripada bagian lainnya, dan frekuensinya jarang. Kelainan juga terletak pada kontraksinya yang singkat dan jarang. Keadaan umum penderita biasanya baik dan merasakan nyeri yang tidak seberapa. Selama kekuatan his lemah dan frekuensinya jarang itu maka tidak terjadi perubahan pada serviks yakni pendataran dan/atau pembukaan, maka dapat didiagnosa sebagai kelainan his atau inersia uteri.

Di sini inersia uteri adalah his yang bersifat biasa dalam arti bahwa fundus ini berkontraksi lebih dahulu dan lebih kuat daripada bagian-bagian lainnya. Inersia uteri ini timbul sejak dari permulaan persalinan dan dapat juga timbul pada saat setelah berlangsungnya his kuat untuk waktu yang lama. Inersia uteri yang timbul pada saat permulaan persalinan ini harus dibedakan dengan his pendahuluan yang kadang juga lemah dan kadang-kadang menjadi hilang (*false labour*),

Pada kasus Ny "A" didapatkan kekuatan his yang lemah, singkat, dan jarang. His yang lemah ini menyebabkan tidak terjadinya pembukaan serviks dan penurunan kepala janin. Menurut teori his dapat menyebabkan pembukaan serviks dan penurunan kepala janin, namun hal ini tidak terjadi pada Ny "A". Maka dapat disimpulkan bahwa Ny "A" mengalami diagnosa/masalah aktual yaitu inersia uteri. Hal ini menunjukkan bahwa persalinan yang dialami oleh Ny "A" mengalami hambatan yang menyebabkan

terjadinya persalinan lama akibat tidak adekuatnya kekuatan his sehingga tidak terjadi pembukaan serviks dan penurunan kepala.

Dalam buku ilmu kebidanan Sarwono Prawirohardjo mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya persalinan lama adalah kelainan tenaga atau kekuatan his yang kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhiyanti dan Susanti dalam jurnalnya yang berjudul “faktor ibu yang berhubungan dengan kejadian persalinan lama di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru” pada tahun 2016 ibu dengan his lemah pada saat persalinan lebih berisiko mengalami persalinan lama dibandingkan ibu dengan his kuat pada saat persalinan.

### **C. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial**

Dalam merumuskan diagnosa/masalah potensial dengan manajemen asuhan kebidanan adalah pengambilan keputusan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dan membahayakan klien. Bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar terjadi dapat dilakukan asuhan yang aman.

Pada umumnya persalinan yang normal tidak akan terjadi masalah apapun selama persalinan berlangsung. Hal ini pun tidak dapat dipastikan bahwa setiap persalinan tidak akan mengalami hambatan ataupun komplikasi. Kasus inersia uteri apabila tidak teratasi dapat memanjakan wanita terhadap bahaya kelelahan, dehidrasi, dan infeksi. Selain bahaya kelelahan, dehidrasi serta infeksi persalinapun akan menjadi lama.

Bagi ibu yang akan dialami adalah kelelahan, dehidrasi serta infeksi. Salah satu penyebab terjadinya infeksi pada ibu yang akan melahirkan adalah pemeriksaan dalam atau pemeriksaan vagina yang dilakukan secara terus menerus.. Dalam proses persalinan terjadi kontraksi uterus dan setiap kali kontraksi dapat mengakibatkan rasa nyeri yang sangat hebat. Rasa nyeri yang sangat ini dapat membuat ibu merasa sakit dan lama kelamaan akan mengalami kelelahan. Akibat dari kelelahan ini ibu seringkali mengalami dehidrasi. Pada saat ibu merasa lelah maka ibu tidak mempunyai tenaga untuk mengejan. Menurut Ermi (2015:67) pada kala 1 saat kontraksi berlangsung secara konsisten 90 detik, jumlah kontraksi adalah 3–4 kali tiap 10 menit atau terjadi tiap 2–3 menit, kontraksi uterus yang berlebihan atau kurang sempurna dan lamanya persalinan dan teknik mengejan yang aktif berlangsung lebih dari 1 jam pada ibu yang akan melahirkan maka dapat menyebabkan ibu kelelahan dan gangguan pada sirkulasi utero–plasenter.

Bagi janin akan mengalami gawat janin. Gawat janin ini cenderung muncul pada awal persalinan ketika terjadi inersia uteri sekunder. Tonus otot yang meningkat dengan konstan merupakan predisposisi terjadinya hipoksia pada janin. Kadang kala, pecahnya selaput ketuban dalam waktu lama dapat menyertai kondisi ini dan dapat menyebabkan infeksi intrapartum. Menurut Fauziyah (2014:56) his yang terlampau kuat biasanya mengalami partus presipitatus dimana bagi ibunya akan mengalami perlukaan luas pada jalan lahir, khususnya vagina dan perineum. Bayi bisa mengalami perdarahan dalam tengkorak karena bagian tersebut mengalami tekanan kuat dalam

waktu yang singkat serta terjadinya hipoksia karena pasokan oksigen terhambat karena peregangan uterus yang secara terus menerus.

Pada kasus Ny “A” didapatkan ibu tampak merasa lelah dan dehidrasi. Dehidrasi membuat tubuh menjadi lebih cepat lelah. Kelelahan ini terjadi karena terhambatnya proses pemecahan glikogen menjadi tenaga. Asam laktat yang seharusnya dapat digunakan sebagai tenaga tidak berfungsi karena tubuh kekurangan cairan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

#### **D. Tindakan *Emergency* dan Kolaborasi**

Bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan berdasarkan kebutuhan klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses terus menerus ini menghasilkan baru yang segera dinilai, data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan darurat dimana bidan harus segera bertindak untuk menyelamatkan klien dengan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan.

Pada kasus yang terjadi pada Ny “A” harus dilakukan tindakan segera dan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh Ny “A”. Teori mengatakan untuk kasus inersia uteri terlebih dahulu periksa keadaan serviks, presentasi dan keadaan janin, penerunan bagian terbawah janin dan keadaan panggul. Apabila ada disproporsi sefalovepik maka lakukan seksio sesarea. Apabila kepala janin sudah masuk ke dalam panggul, penderita bisa disuruh berjalan-jalan. Tindakan sederhana ini kadang-kadang menyebabkan his menjadi kuat dan selanjutnya persalinan berjalan lancar.

Jika upaya ini tidak berhasil, maka dapat diberikan infus oksitosin drips 5 IU dalam 500 cc RL dimulai dengan 8 tetes permenit, yang dinaikkan 4 tetes/menit setiap 30 menit sampai his menjadi adekuat, maksimal 40 tetes. Maksud dari pemberian oksitosin ini adalah untuk memperbaiki his sehingga serviks dapat membuka. Larutan Ringer Laktat adalah komposisi elektrolit dan konsentrasinya yang sangat serupa dengan yang dikandung cairan ekstraseluler. Bermanfaat mengganti cairan hilang karena dehidrasi, syok hipovolemik dan kandungan natriumnya menentukan tekanan osmotik pada pasien. Induksi oksitosin ini juga tidak bisa diberikan sekaligus dalam dosis yang besar karena dapat menyebabkan terjadinya kematian janin karena kontraksi uterus yang terlalu kuat dan lama, dan dapat menyebabkan pula terjadinya ruptur uteri.

Berdasarkan kasus Ny”A” ditemukan adanya data yang menunjang untuk melakukan tindakan emergency atau segera pada kala I yaitu kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan. Dokter pun menyarankan untuk pemberian infus drips oksitosin 5 unit 8 tetes permenit, yang dinaikkan 4 tetes/menit setiap 30 menit sampai his menjadi adekuat, maksimal 40 tetes. Hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

#### **E. Intervensi/Rencana Tindakan**

Direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan secara efektif. Pada persalinan normal rencana tindakan yang

diberikan adalah tirah baring, pemantauan dengan partograf, observasi his, nadi, djj dan memberikan motivasi pada klien.

Pada kasus Ny “A” pada saat pembukaan 6 cm hal yang dilakukan adalah melakukan pemantauan TTV, mengobservasi his, nadi, serta DJJ. Menilai keadaan ketuban apakah ketuban masih utuh atau sudah pecah. Memberikan motivasi kepada ibu agar ibu lebih bersemangat. Memberitahu ibu agar selalu berdoa dan berdzikir dalam hati agar dimudahkan dan diperlancar proses persalinannya. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum supaya nanti pada saat persalinan berlangsung ibu mempunyai tenaga untuk mengedan.

Menganjurkan suami atau keluarga untuk mendampingi ibu agar ibu merasa diperhatikan dan merasa tenang agar ibu tidak merasa cemas sehingga ibu merasa mampu untuk melahirkan anaknya tanpa ada kendala sedikit pun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailia dan Fauziyatun 2015 “Pendampingan Suami Terhadap Kelancaran Proses Persalinan” ada hubungan antara pendampingan suami dengan kelancaran proses persalinan. Persalinan tanpa pendamping akan menambah resiko terjadinya persalinan tidak lancar. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan pada suami mengenai pentingnya pendampingan ibu bersalin.

Pada pembukaan 8 cm dilakukan pemantauan keadaan ibu dengan mengobservasi tekanan darah, his, DJJ, serta nadi. Menganjurkan ibu tidur miring kiri agar sirkulasi oksigen pada janin tidak terhambat dan mempercepat proses penurunannya kepala janin. Serta menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih agar penurunan kepala janin menjadi cepat. Kemudian melakukan rehidrasi

dengan infus agar keadaan umum ibu menjadi baik dan berharap agar his menjadi bagus sehingga dapat terjadi pembukaan. Menurut Sarwono (2014:567) keadaan umum penderita inersia uteri sementara itu harus diperbaiki dan kandung kencing serta rectum dikosongkan. Apabila kepala atau bokong janin sudah masuk ke dalam rongga panggul, penderita bisa disuruh untuk berjalan-jalan. Tindakan sederhana ini kadang-kadang menyebabkan his menjadi kuat dan selanjutnya persalinan akan berjalan lancar.

Setelah mengevaluasi selama  $+1$  jam tidak ditemukan adanya kemajuan persalinan. Hal ini ditandai dengan pembukaan ibu masih dalam pembukaan 8 cm dan frekuensi his ibu masih dalam 3 kali dalam 10 menit durasi 35-40 detik. Pada akhirnya dokter spesialis kandungan menyarankan agar dilakukan pemberian induksi oksitosin dengan melalui infus intravena dengan kecepatan 8 tetes/menit dan dinaikkan 4 tetes/menit setiap 30 menit sampai his menjadi adekuat, maksimal 40 tetes. Menurut Sarwono (2014:568) maksud dari pemberian oksitosin ini adalah memperbaiki his sehingga serviks dapat membuka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri, Joserizal, Efrida tahun 2015 “hubungan induksi dengan kejadian persalinan lama di RSUP Dr. M. Djamil” oksitosin diberikan dengan tujuan meningkatkan kontraksi uterus setiap 3-5 menit. Penuntun utamanya adalah jika persalinan sudah masuk fase aktif dan pembukaan yang terjadi kurang dari 1 cm per jam serta harus dipastikan bahwa tidak ada *fetal distress*.

Pada kasus inersia uteri ini harus ditolong di rumah sakit dan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan. Lalu diberikan oksitosin drips 5-10 satuan dalam Dextrosa 5%, bila his tidak menjadi kuat setelah pemberian oksitosin,

maka hentikan dulu pemberian drips oksitosin dan anjurkan ibu untuk istirahat. Kemudian coba lagi untuk beberapa jam. Kalau masih belum ada kemajuan, lebih baik dilakukan seksio sesario. Namun apabila ada disproporsi sefalopelvik berarti harus dilakukan seksio sesario.

Pada kasus Ny “A” menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang menguntungkan dengan berbaring tidur dalam posisi miring kiri, memantau persalinan dengan partograf dan memberikan motivasi kepada ibu dalam menghadapi proses persalinan. Lalu diberikan infus oksitosin drips 5 IU dalam 500 cc dekstrosa 5%, dimulai dengan 8 tetes per menit, dinaikkan 4 tetes/menit setiap 30 menit maksimal 40 tetes. Hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan teori dengan studi kasus.

#### **F. Implementasi/Pelaksanaan Asuhan**

Sesuai dengan manajemen asuhan kebidanan bahwa dilaksanakan rencana tindakan harus efisien dan manajemen rasa aman klien, implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan sesuai dengan rencana tindakan yang telah direncanakan.

Pada kasus Ny “A” dengan inersia uteri semua tindakan yang telah direncanakan yaitu dengan pemberian infus oksitosin 5 IU dalam 500 cc dekstrosa 5% dimulai dengan 8 tetes/menit lalu dinaikkan 4 tetes/menit setiap 30 menit maksimal 40 tetes sudah dilakukan seluruhnya dengan baik, tanpa ada hambatan karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari Ny “A” serta dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan yang ada di ruang bersalin RS Haji Makassar.

## G. Evaluasi

Dilakukan pengevaluasian keefektifan dari asuhan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan terhadap masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan teori yang ada. Beberapa hal yang dievaluasi, yaitu: apa ibu sudah mengerti penjelasan yang diberikan, apa ibu sudah melakukan apa yang telah di anjurkan dan telah diajarkan, bagaimana keadaan umum ibu, mengukur tanda-tanda vital ibu untuk memantau keadaan ibu, apa kecemasan ibu teratasi, apa persalinan dengan inersia uteri dapat teratasi.

Pada kasus Ny "A" dengan inersia uteri dapat teratasi dengan baik. Hal ini ditandai dengan kekuatan his yang pada awalnya tidak bagus akhirnya menjadi bagus ketika kita melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan dengan pemberian infus oksitosin. His yang tadinya tidak mampu untuk melakukan membuka serviks akhirnya dapat juga melakukan pembukaan serviks setelah diinduksi dengan infus oksitosin.

Pada kasus Ny "A" bayi lahir spontan, pada tanggal 29 maret 2017 pukul 21:33 wita segera menangis dengan apgar score 7/10. Bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki, BBL: 3100 gram, PBL: 48 cm. Bayi tidak mengalami asfiksia dan hipotermia. Kala III ibu berlangsung selama  $\pm$  7 menit dan plasenta lahir lengkap bersama ketiledon dan selaput ketuban pada tanggal 29 maret 2017 pukul 21:40 wita. Kala IV yaitu kala pemantau selam 2 jam pasca persalinan. Pada kala IV ini ibu tidak mengalami masalah.

## BAB V

### PENUTUP

Setelah mempelajari teori, konsep dan prinsip-prinsip asuhan pada kasus inersia uteri dan pengalaman langsung di lahan praktek studi kasus Ny “A” dengan inersia uteri maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pada Ny “A” didapatkan bahwa terjadi nyeri perut tembus belakang disertai pelepasan lendir dan darah.
2. Diagnosa Ny “A” ditegakkan berdasarkan adanya kekuatan his yang kurang bagus untuk melakukan pembukaan dan penurunan kepala janin, disini kekuatan his lemah, kontraksi lebih kuat dan lebih dulu daripada bagian lainnya, dan frekuensinya jarang. his yang seperti ini dinamakan inersia uteri.
3. Pada Ny “A” masalah yang mungkin terjadi adalah persalinan akan menjadi lama, dampaknya bagi ibu akan mengalami kelelahan, dehidrasi, dan infeksi dan bagi janin akan terjadi gawat janin.
4. Pada Ny “A” dilakukan tindakan segera atau kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan untuk memperbaiki kekuatan his supaya bisa melakukan pembukaan serviks dan penurunan.
5. Rencana tindakan yang disusun pada Ny “A” bertujuan agar persalinan menjadi normal kembali dan his dapat melakukan pembukaan serviks dan

memberikan infus oksitosin 5 IU dengan 8 tetes/menit dan dinaikkan 4-8 tetes setiap 30 menit.

6. Tindakan yang dilakukan bertujuan agar rencana yang dilakukan tercapai dengan adanya kerja sama antara bidan, dokter dan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien.
7. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah asuhan yang diberikan berhasil atau tidak. Dan hasil pemantauan, didapatkan bahwa tindakan yang dilakukan pada Ny "A" berhasil dan terlaksana dengan baik serta mencapai tujuan yang diinginkan yaitu his yang tidak bagus akhirnya menjadi bagus dan pembukaan pun dapat terjadi.

## **B. Saran**

1. Untuk Klien
  - a. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi serta memperdalam pengetahuan tentang persalinan
  - b. Menganjurkan ibu mengetahui tentang apa-apa saja yang menjadi penghambat persalinan.
2. Untuk Bidan
  - a. Bidan harus memperdalam ilmu lagi mengetahui tentang hal-hal apa saja yang menjadi wewenangnya dan apa-apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan dan tindakan apa saja yang harus melakukan penanganan segera maupun kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan.

- b. Bidan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang baik selama masa kehamilan, persalinan, maupun pada masa nifas agar ibu bisa merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan.

### 3. Untuk Institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya pembelajaran tentang penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan professional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ade-Ojo IP and Akintayo AA "Induction of labour in the developing countries – an overview" *Journal of Medicine and Medical Sciences* vol 4(7) pp. 258-262, July, 2013 <http://www.interestjournals.org/full-articles/induction-of-labour-in-the-developing-countries-an-overview.pdf?view=inline> (diakses tanggal 21 Mei 2016)
- Anasari Tri "Hubungan Paritas dan Anemia dengan Kejadian Inersia Uteri Pada Ibu Bersalin Di RSUD PROF dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Tahun 2011" *Jurnal Involusi Kebidanan*, Vol. 2, No. 4, Juni 2012, 22-32 <http://www.ejmanager.com/mnstemp/67/67-1390812681.pdf> (diakses tanggal 21 Mei 2016)
- Angka Kematian Ibu "Profil kesehatan Provinsi Sulawesi selatan 2014" [http://www.27\\_Sulawesi\\_Selatan\\_2014.pdf](http://www.27_Sulawesi_Selatan_2014.pdf). (diakses tanggal 14 April 2016)
- Ardhiyanti Yulrina, Susi Susanti "Faktor Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian Persalinan Lama di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru" *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 3, No. 2, Mei 2016 [http://www.jurnal%20valid/jurnal%20baru/108-1-193-1-10-20170210%20\(1\).pdf](http://www.jurnal%20valid/jurnal%20baru/108-1-193-1-10-20170210%20(1).pdf) (diakses tanggal 22 Agustus 2017)
- Cristina. *Asuhan Persalinan Normal dan Patologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2013
- Ermis, Handayani. *Asuhan Persalinan Normal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015
- El-Hayah "Pengaruh Oksitosin dalam Kontraksi Uterus Otot Polos" *Vol. 5, No.1 September 2014* <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=339845&val=5270&title=PENGARUH%20OKSITOSIN%20TERHADAP%20KONTRAKSI%20OTOT%20POLOS%20UTERUS>(diakses tanggal 21 Agustus 2017)
- Eniyati, Sholihah Afifin. *Asuhan Kebidanan pada Persalinan Patologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013
- Eri Leksana "Strategi Terapi Cairan pada Dehidrasi" *CDK-224/ vol. 42 no. 1, th. 2015* [http://kalbemed.com/Portals/6/23\\_224PraktisStrategi%20Terapi%20Cairan%20pada%20Dehidrasi.pdf](http://kalbemed.com/Portals/6/23_224PraktisStrategi%20Terapi%20Cairan%20pada%20Dehidrasi.pdf) (diakses tanggal 22 Mei 2016)
- Fauziyah, Yulia. *Obstetri Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2014

- Kuswanti Ina, Melina Fitria. *Askeb II Persalinan*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2014
- Lailia Irmah Nur, Fauziyatun Nisa “Pendampingan Suami Terhadap Kelancaran Proses Persalinan di BPM Arifin Surabaya” *jurnal%20valid/jurnal%20baru/29-54-1-SM.pdf* (diakses tanggal 22 Agustus 2017)
- Lailiyana, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta: EGC. 2012
- Lestari, Indah, Agus Abadi, Windhu Purnomo “Pengaruh *Deep Back Massage*” *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol. 9 No. 1, Juli 2012: 37–50 <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-phc755254d60full.pdf> (diakses tanggal 22 Mei 2016)
- Fauziah, Yulia. *Obsetri Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2014
- LulaAdillia, Anita Deborah Anwar, Benny Hasan Purwara, Dian Tjahyadi, Tita Husnitawati Madjid, Hadi Susiarno, Jusuf Sulaeman Effendi “Serum Calcium and Magnesium Levels Ratio In Patients with and without Hypotonic Uterine Inertia” *American Journal of Research Communication Adillia, et al., 2015: Vol 3(2)* [http://www.usa-journals.com/wp-content/uploads/2015/01/Adillia\\_Vol32.pdf](http://www.usa-journals.com/wp-content/uploads/2015/01/Adillia_Vol32.pdf) (diakses tanggal 21 mei 2016)
- Neelofur Babar Khan, Iffat Ahmed, Ayesha Malik, Lumaan Sheikh “Factors associated with failed induction of labour in a secondary care hospital” *Original Article Vol. 62, No. 1, January 2012*
- Nurasiah Ai, Rukmawati Ani, Badriah Dewi Laelatul. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012
- Putri Mega Redha, Joserizal Serudji, Efrida “Hubungan Induksi dengan Kejadian Persalinan Lama di RSUP Dr. M. Djamil” *jurnal%20valid/jurnal%20baru/ipi359556%20(1).pdf* (diakses tanggal 22 Agustus 2017)
- Penyebab Kematian Ibu “Infodatin pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI” <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/info datin-ibu.pdf> (diakses tanggal 21 April 2016)
- Prawirohardjo Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014
- Sastrawinata, S, dkk. *Obsetri Patologi Ilmu Kesehatan*. Jakarta: EGC. 2015

- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2009
- Sofian Amru. *Rustam Mochtar Sinopsis Obstetri*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2013
- T. Chutia, D. J. Talukdar\*, B. Konwar, F. A. Ahmed, K. Lalrintluanga and G. Das  
“Management of Incomplete Uterine Inertia in a Labrador Bitch - A Case Report” *International Journal of Livestock Research* eISSN : 2277-1964  
Vol 6 (9) Sept'16.  
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4856191/pdf/CroatMedJ\\_57\\_0100.pdf](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4856191/pdf/CroatMedJ_57_0100.pdf) (diakses tanggal 21 Mei 2016)
- Walyani Elisabeth Siwi, Purwoastuti Th. Endah. *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015
- Yeyeh Al, Yulianti Lia. *Asuhan Kebidanan Patologi Kebidanan 4*. Jakarta: Trans Info Media. 2013



## RIWAYAT HIDUP



**Nurjayanti**, dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1996 di Sungguminasa, Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Putri Pertama dari pasangan Ayahanda Nurdin dan Ibunda Fatima.

Jenjang pendidikan yang pernah di lalui penulis adalah:

Tamat SD Inpres Kampung Mejang, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa tahun 2008, Tamat SMP Negeri 1 Bontonompo tahun 2011, Tamat SMA Negeri 1 Bontonompo tahun 2014. Pada Tahun 2014, Penulis melanjutkan studinya pada Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pengalaman organisasi internal kampus:

1. Anggota Advokasi dan Pengabdian Masyarakat Dewan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2016-2017



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)864924 Fax.(0411) 864923 Samata-Gowa  
Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.(0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-0291/FKIK/PP.00.9/05/2017

Makassar, 05 Mei 2017

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth,  
**Direktur RSUD Haji Makassar**  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Jayanti  
NIM : 70400114002  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Kasus Intersia Uteri di RSUD Haji Makassar.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Ang. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. As. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.**

Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR**

Alamat : Jl. Dg. Ngeppe No. 14 Makassar ,Telp. 855934 – 856091 Fax (0411)855934

**SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA**

Nomor : 2296/ TU / RSUD / V / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : **H. AHDY SYAFAR, SKM, S.Kep, M.Kes**  
NIP : 19630706 198603 1 028  
PANGKAT/GOL. : Pembina, IV/a  
JABATAN : Kabid Diklat, Litbang Dan Etika

Dengan ini menerangkan :

NAMA : **NURJAYANTI**  
NIM : 70400114002  
JURUSAN : DIII KEBIDANAN  
MAHASISWA : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Adalah benar telah melakukan Pengambilan Data dan Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah pada tanggal 09 Mei 2017 dengan Judul :

***“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA KASUS INERSIA UTERI DI RSUD HAJI MAKASSAR”.***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Mei 2017



**Kabid Diklat, Litbang & Etika,**

**H.Ahdy Syafar,SKM, S.Kep,M.Kes.**  
NIP. :19630706 198603 1 028



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR**

Alamat : Jl. Dg. Ngeppe No. 14 Makassar ,Telp. 855934 – 856091 Fax (0411)855934

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 5262/ TU / RSUD / VIII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : H. AHDY SYAFAR, SKM, S.Kep, M.Kes  
NIP : 19630706 198603 1 028  
PANGKAT/GOL. : Pembina, IV/a  
JABATAN : Kabid Diklat, Litbang Dan Etika

Dengan ini menerangkan :

NAMA : NURJAYANTI  
NIM : 70400114002  
JURUSAN : DIII KEBIDANAN  
MAHASISWA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka penyusunan *Karya Tulis Ilmiah (KTI)* pada tanggal 06 Juni s/d 06 Agustus 2017 dengan Judul :


**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA KASUS INERSIA UTERI DI RSUD HAJI MAKASSAR"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 AGUSTUS 2017

Kabid Diklat, Litbang & Etika,

  
**H.Ahdy Syafar, SKM, S.Kep, M.Kes.**  
NIP. :19630706 198603 1 028





1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 9 7 7 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9600/S.01P/P2T/07/2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Direktur RSUD Haji Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.829/FKIK/PP.00.9/05/2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURJAYANTI**  
Nomor Pokok : 70400114002  
Program Studi : Kebidanan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA KASUS INERSIA DI RSUD HAJI MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Juli s/d 06 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM  
Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 03 Juli 2017

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Portinggal.*