

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY "S" DENGAN
PERSALINAN *GEMELLI* DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh :

SRI NUR FITRIWATI

NIM : 70400114033

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Nur Fitriwati
NIM : 70400114033
Tempat/tgl. Lahir : Kambutta Toa, 19 Juni 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/ Diploma
Alamat : Jl. Beroanging Kelurahan Panggentungan
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Inranatal pada Ny
“S” dengan Persalinan *Gemelli* di RSUD Syekh
Yusuf Gowa Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, 21 Agustus 2017

Penyusun



SRI NUR FITRIWATI

NIM : 70400114033

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada NY “S” dengan Persalinan *Gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”, yang disusun oleh Sri Nur Fitriwati, Nim: 70400114033, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Jumat 25 Agustus 2017 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 25 Agustus 2017 M

3 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S. Si.T, M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,SKM.,M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Sohrah, M.Ag	(.....)

Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny”S” dengan persalinan Gemelli di RSUD Syekh Tusuf Gowa Tahun 2017”**. Karya Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekuarangan dan kesalahan yang ada.

Cinta dan penghormatan kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, ayahanda Ruddin. S dan ibunda Rahnan, dua orang yang menjadi sosok panutan sebelumku tersentuh dengan dunia luar, mereka adalah orang pertama yang telah memberikanku kasih sayang, cinta, perhatian, doa dan bimbingan yang begitu besar, serta dasar hidup

yang senantiasa ditanamkan sejak kecil. Adikku satu-satunya Amelia Ainun Nurhusna serta kakakku Muh. Syam Arianto.

Penyusunan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. beserta seluruh staf administrasi.
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T, S.KM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan dan sebagai pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya demi membimbing, serta memberikan saran kepada penulis.
4. Ibunda dr. Raully Rahmadhani, M.Kes sebagai pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing serta memberikan arahan.
5. Ibunda dr. Miswani Mukani, M.Kes selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
6. Ibunda Dr. Hj. Zohra, M.Ag selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
7. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.

8. Gubernur Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Bapak Bupati Kabupaten Gowa yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan studi kasus.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
11. Kepada kedua saudara beda ayah dan ibu yaitu Masni dan titin prahayu yang selalu menjadi rekan dalam segala kondisi dari awal sampai saat yang tidak dapat di dijangkau oleh indra.
12. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2014 serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi-Nya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata-Gowa, 23 Agustus 2017

Penulis

Sri Nur Fitriwati
NIM : 70400114033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN TEORI	11
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan.....	11
B. Tinjauan Tentang Kehamilan Dan Persalinan <i>Gemelli</i>	24
C. Pandangan Islam Terhadap Persalinan.....	41
D. Konsep Dasar Manajemen Asuhan Kebidanan.....	44
BAB III STUDI KASUS.....	56
A. Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan 7 Langkah Varney	56
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	104
BAB IV PEMBAHASAN.....	127
A. Kala I.....	127
B. Kala II.....	131
C. Kala III	136
D. Kala IV	137
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144
DAFTAR LAMPIRAN.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas lalu.....	55
Tabel 3.2 Pemantauan kala I fase aktif	71
Tabel 3.3 Penilaian APGAR <i>score</i> bayi pertama.....	83
Tabel 3.4 Penilaian APGAR <i>score</i> bayi kedua	84
Tabel 3.5 Pemantauan kontraksi uterus pada dua jam pertama setelah melahirkan .	96
Tabel 3.6 Pemantauan kala IV	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Plasenta dan selaput janin kembar *monozigotik*.....32

Gambar 2.2 plasenta dan selaput janin *dizigotik*.....33



DAFTAR SINGKATAN

AKB	Angka Kematian Ibu
AKI	Angka Kematian Bayi
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
CT/BT	<i>Clothing Time</i> (masa pembekuan darah)/ <i>Blooding Time</i> (masa perdarahan)
DJJ	Denyut Jantung Janin
DTT	Desinfeksi Tingkat Tinggi
HGB	Hemoglobin
HPHT	Hari Pertama Haid Terakhir
HR	<i>Heart Rate</i> (detak jantung)
MDGs	<i>Millenium Development Goals</i> atau tujuan pembangunan milenium adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 180 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
OUE	Ostium Uteri Interna
OUI	Ostium Uteri Eksterna
PLT	Platelet (Angkat trombosit)
PMS	Penyakit Menular Seksual

PX	<i>Prosesus Xipoides</i> . Bagian bawah tulang dada yang berbentuk seperti ujung atau taju pedang
RBC	<i>Red Blood Cell</i> atau sel darah merah
SAR	Segmen Atas Rahim
SBR	Segmen Bawah Rahim
TBJ	Tafsiran Berat janin
TT	Tetanus Toksoid
TTTS	<i>Twin to Twin Transfusion Syndrom</i> atau sindrom transfusi dari kembar ke kembar
UUK	Ubun-Ubun Kecil
VT	<i>Vaginal Tousse</i> . Pemeriksaan dalam melalui alat kelamin wanita.
WBC	<i>White Blood Cell</i> atau sel darah putih
WHO	<i>World Health Organization</i> atau Organisasi Kesehatan Dunia, adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional
USG	<i>Ultrasonografi</i>

DAFTAR ISTILAH

<i>Amenorrhea</i>	Suatu kondisi dimana seorang wanita tidak dapat mengalami menstruasi pada masa menstruasi sebagaimana mestinya.
<i>APGAR score</i>	Nilai APGAR, suatu metode praktis yang digunakan untuk menilai keadaan bayi sesaat setelah dilahirkan apakah mengalami asfiksia atau tidak.
<i>Assessment</i>	Penilaian klinis.
<i>Blastula</i>	Bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan.
<i>Clinical judgement</i>	Penilaian klinis.
<i>Corpus uteri</i>	Bagian uterus/rahim yang utama dan terbesar.
<i>Diamniotik</i>	Terdapat dua selaput amnion.
<i>Dikorionik</i>	Terdapat dua selaput korion.
<i>Dismenorrhea</i>	Kondisi medis yang ditandai dengan nyeri perut pada saat menstruasi.
<i>Dizigotik</i>	Kembar non identik terjadi ketika dua sel ovum dibuahi dan membentuk 2 zigot.
<i>Dorsal recumbent</i>	Posisi setengah duduk dengan kaki ditebuk.
<i>Dyspnea</i>	Istilah kedokteran untuk sesak napas.
<i>Effacement</i>	Pemendekan dan penipisan servik selama tahap pertama persalinan.

<i>Eklampsia</i>	Akibat yang ditimbulkan oleh preeklampsia yang ditandai dengan kejang atau bahkan koma.
<i>Gemelli</i>	Istilah yang digunakan apabila terdapat lebih dari satu janin di dalam rongga uterus.
<i>Gluteus</i>	Salah satu dari tiga otot besar pada pantat.
<i>Handsocon</i>	Sarung tangan yang biasa digunakan oleh tenaga medis.
HbsAg	Antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B aktif.
<i>Hecting set</i>	Perlengkapan jahit yang digunakan dalam medis.
His	Kontraksi uterus.
<i>Lennece</i>	Stetoskop monokuler.
<i>Linea nigra</i>	Garis hitam yang terbentang di atas simfisis sampai ke pusat
<i>Medical Record</i>	Rekam medik.
<i>Menarcho</i>	Menstruasi yang datang pertama kali pada seorang wanita yang menginjak usia remaja.
<i>Monoamniotik</i>	Terdapat satu selaput amnion
<i>Monokorionik</i>	Terdapat satu selaput korion
<i>Monozigotik</i>	Kembar identik, terjadi ketika satu sel ovum dibuahi dan membentuk zigot yang membelah menjadi embrio yang berbeda.
<i>Overdistensi</i>	Faktor resiko yang paling sering mengakibatkan atonia uteri.

<i>Plannning</i>	Rencana tindakan.
<i>Preterm</i>	Persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu.
<i>Preeklampsia</i>	Sebuah komplikasi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) dan tanda-tanda kerusakan ginjal ditunjukkan oleh tingginya kadar protein urine (<i>proteinuria</i>).
<i>Primitive Streak</i>	Lempeng awal.
<i>SC (Sectio Caesarea)</i>	Tindakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding perut dan dinding uterus dan dilakukan oleh spesialis beda obstetri dan ginekologi.
<i>Striae albicans</i>	Garis-garis yang berwarna putih pada ibu multigravida dan biasanya terdapat pada perut, payudara, dan paha.
<i>Twins</i>	Kembar dua.
<i>Triples</i>	Kembar tiga.
<i>Underped</i>	Pengalas/perlak, biasa digunakan dalam persalinan untuk menyerap cairan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Partograf	148
Lampiran II	: Lembar kegiatan konsultasi	152
Lampiran II	: Surat Permohonan Pengambilan Data Awal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada kepala RSUD Syekh Yusuf Gowa.	156
Lampiran III	: Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (kepala balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)	157
Lampiran IV	: Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah(Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.	158
Lampiran IV	: Surat Isin atau Rekomendasi Penelitian dari Bupati Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.	159
Lampiran V	: Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.	160

Lampiran VI : Gambar Pasien 161

Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup 162



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2017

Sri Nur Fitriwati, 70400114033

Pembimbing I : Hj. Sitti Saleha

Pembimbing II : Andi Sitti Rahma

“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “S” Dengan Persalinan *Gemelli* Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”

Kehamilan *gemelli* merupakan suatu istilah yang digunakan apabila terdapat lebih dari satu janin di dalam rongga uterus. Pada umumnya kehamilan dan persalinan memiliki resiko bagi ibu dan maupun janin. Pada kehamilan multipel atau *gemelli* resiko yang dapat terjadi pada ibu dengan kehamilan *gemelli* atau kembar diantaranya preeklampsia, anemia akibat peningkatan kebutuhan janin terhadap zat besi dua kali lebih tinggi, perdarahan antepartum, persalinan, post partum, serta terjadinya solusio plasenta.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada NY “S” dengan Persalinan *Gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil yang didapatkan pada manajemen asuhan kebidanan intranatal pada NY “ S” dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017. Penatalaksanaan kasus persalinan *gemelli* yang dilakukan dengan penatalaksanaan kala I sampai IV, Kedua bayi lahir normal dengan kondisi baik, keadaan umum ibu baik, serta tidak terjadi komplikasi pada masa persalinan maupun pasca persalinan.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemantauan dan analisa data NY “S” dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf tahun 2017 proses persalinan kala I-IV berlangsung normal, tanpa komplikasi, bayi lahir spontan dengan jenis kelamin kedua bayi perempuan, plasenta lahir kesan lengkap (1 plasenta) dan telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada NY “S” dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan kasus.

Daftar Pustaka : 31 (2002-2016)

Kata Kunci : Persalinan, *Gemelli*, 7 Langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAKASSAR

RESEARCH PAPER, JULY 2017

Sri Nur Fitriwati, 70400114033

Supervisor I : Hj. Sitti Saleha

Supervisor II : Andi Sitti Rahma

"Intranatal Midwifery Care on Mrs" S "with Gemelli Birth in Regional Public Hospital Shekh Yusuf Gowa Year of 2017"

Gemelli pregnancy is a term used in a situation when there is more than one fetus in the uterine cavity. In general, pregnancy and childbirth are at risk for both mother and fetus. In twin pregnancies or gemelli the risks that can occur in mothers with gemelli or twin pregnancies include preeclampsia, anemia due to an increase in fetal need for iron which is twice as high, antepartum bleeding, labor, postpartum, and the occurrence of placental abruption.

This research paper is intended to implement the Intranatalmidwifery care on Mrs "S" with gemelli labor in Regional Public Hospital Sheikh Yusuf Gowa Year 2017 following the 7 steps of Varney and SOAP.

Results are obtained on intranatal midwifery care on Mrs. "S" with gemelli delivery at Regional Public Hospital Sheikh Yusuf Gowa 2017. The treatment ofgemelli labor was performed ontreatment stage I to IV. Both babies wereborn normal with good condition. The mother was in good condition, and there was no complication during labor and postpartum.

As a conclusion, the 7 Varney steps and SOAP used for the process of obstetric problem solving had undergone an assessment in the form of monitoring and data analysis of Mrs. "S" with gemelli delivery in Regional Public Hospital Sheikh Yusuf Gowa 2017. The process of labor in stages I-IV was normal without any complication. The babies wereborn females. The placenta was born completely (1 placenta) and hadbeen through documentations of all findings and treatments that had been given to Mrs "S" with not gap between the theory and the case as the result.

References: 31 (2002-2016)

Keywords: Labor, Gemelli, and 7 Varney Steps

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Ada beberapa pengertian dari kehamilan kembar, diantaranya ada yang mendefinisikan kehamilan *gemelli* merupakan suatu istilah yang digunakan apabila terdapat lebih dari satu janin di dalam rongga uterus. *Twins* menggambarkan dua janin dan *triplet* menggambarkan 3 janin dan seterusnya (Liu, 2011: 283). Sumber lain mengatakan bahwa kehamilan kembar adalah suatu kehamilan dengan dua janin atau lebih (Pudiastuti, 2012).

Persalinan dengan kehamilan *gemelli* dapat memberikan kontribusi secara tidak langsung terhadap mortalitas dan morbiditas pada ibu dan bayi. Pada ibu, seperti perdarahan dan atonia uteri. Perdarahan dan atonia dapat meningkatkan morbiditas pada ibu bahkan sampai menyumbangkan angka mortalitas. Pada bayi, berat badan lahir rendah (BBLR) dan asfiksia dapat meningkatkan morbiditas bahkan sampai meningkatkan mortalitas pada bayi (Oxorn dan William, 2010 : 266).

Pada umumnya kehamilan dan persalinan memiliki resiko bagi ibu dan maupun janin. Pada kehamilan multipel atau *gemelli* resiko yang dapat terjadi pada ibu dengan kehamilan *gemelli* atau kembar diantaranya preeklampsia, anemia akibat peningkatan kebutuhan janin terhadap zat besi dua kali lebih tinggi, perdarahan antepartum, persalinan, post partum, serta terjadinya solusio plasenta. Sedangkan mortalitas

perinatal mencapai enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan tunggal. Resiko yang dapat terjadi pada janin kembar diantaranya kelainan plasenta, insersi tali pusat, kelainan perkembangan, kembar siam, lilitan tali pusat, kelahiran *preterem*, resiko *prolaps* tali pusat, dan kematian salah satu atau kedua janin. (Woodward dkk, 2012: 95-96).

Angka kejadian kesakitan dan kematian ibu pada kehamilan kembar jauh lebih tinggi dibanding dengan kehamilan tunggal yaitu 2,5 kali lipat dari kehamilan tunggal. Sedangkan angka kematian perinatal pada bayi kembar adalah 3-4 kali lebih besar dibanding bayi tunggal, akibat prematuritas dan kesulitan-kesulitan lainnya (NICE, 2011:6).

Kematian ibu pada saat ini masih menjadi masalah kesehatan reproduksi yang sangat penting di Indonesia. Indikator kesehatan yang menggambarkan tingkat kesehatan ibu dan anak adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Disamping itu AKI merupakan tolok ukur untuk menilai keadaan pelayanan obstetrik di suatu negara. Bila AKI masih tinggi berarti sistem pelayanan obstetrik belum sempurna, sehingga memerlukan perbaikan (Profil Kesehatan Indonesia, 2015).

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) AKI di dunia masih tinggi, dan Indonesia berada di posisi teratas dengan jumlah kematian ibu tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. AKI di dunia tahun 2014 yaitu 289.000 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa negara memiliki AKI cukup tinggi seperti Afrika Sub-Saharan 179.000 jiwa, Asia Selatan 69.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara dimana Indonesia

yaitu 190 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 49 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 26 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, AKI di Indonesia pada tahun 2012 meningkat tajam menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan milenium dalam target MDGs pada 2015 adalah AKI dapat diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, berdasarkan data yang didapat AKI pada tahun 2015 sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini sangat jauh dari target MDGs. (Profil Kesehatan Indonesia, 2015: 104).

Di Sulawesi Selatan jumlah kematian ibu yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2012 jumlah kematian ibu sebanyak 160 orang atau 110,26 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 115 orang atau 78.38 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 138 orang atau 93.20 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2011 sebanyak 868 bayi atau 5.90 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.056 bayi atau 7.23 per 1000 kelahiran hidup, dengan penyebab utama kematian adalah perdarahan, infeksi, hipertensi, preeklamsi-eklamsi, abortus, dan partus lama (Profil Kesehatan Sulsel, 2014: 19-27).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, AKI dan AKB mengalami penurunan. Yaitu AKI pada tahun 2012 sebanyak 12 orang atau 106,53 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 menurun menjadi 10 orang atau

80 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 sebanyak 3 orang atau 24 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2012 sebanyak 57 bayi atau 4,5 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 menurun menjadi 17 bayi atau 1 per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 sebanyak 10 bayi atau 1 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Gowa, 2014: 25-29).

Data yang diperoleh dari *medical record* RSUD Syekh Yusuf pada bulan Januari 2016 sampai Maret 2017 sebanyak 2.519 ibu yang bersalin dengan jumlah persalinan *gemelli* sebanyak 25 kasus. Namun, sebagian besar berakhir pada proses persalinan dengan *sectio caesarea* (SC) dan hanya 6 pasien yang melahirkan secara normal.

Seorang bidan memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menolong persalinan *gemelli*. Hal ini terdapat dalam kompetensi bidan yang ke-4 yaitu bidan harus mengetahui pengelolaan dan penatalaksanaan persalinan dengan kehamilan normal dan ganda. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memaparkan secara spesifik sebagai wujud perhatian dalam memberikan kontribusi pemikiran pada berbagai pihak yang berkompeten dengan masalah tersebut guna mencari solusi terbaik atas permasalahan di atas dengan harapan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi dengan menerapkan asuhan kebidanan pada ibu dengan persalinan *gemelli* (Yulifah dan Surachmindari, 2014: 57 dan 93).

Penulisan Proposal ini memberikan penekanan dan penerapan manajemen asuhan kebidanan pada ibu dengan persalinan *gemelli* yang diuraikan dalam tujuh langkah varney dalam penerapan manajemen asuhan kebidanan yang akurat dan

diharapkan dapat mendeteksi lebih dini keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan terjadinya komplikasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam proposal ini adalah.

1. Bagaimana melaksanakan identifikasi dan analisa data dengan kasus persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa?
2. Bagaimana merumuskan dan menegakkan diagnosis/masalah aktual dengan kasus persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa?
3. Bagaimana merumuskan dan menegakkan diagnosis/masalah potensial dengan kasus persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa?
4. Bagaimana melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi guna pemecahan masalah dengan kasus persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa?
5. Bagaimana menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan dengan kasus persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa?
6. Bagaimana melaksanakan tindakan asuhan kebidanan yang telah disusun dengan kasus persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa?
7. Bagaimana mengevaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan dengan kasus persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa?
8. Bagaimana mendokumentasikan temuan dan tindakan manajemen asuhan kebidanan yang telah diberikan dengan kasus persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan data dan informasi tentang kasus persalinan *gemelli* serta mampu menerapkan manajemen asuhan kebidanan secara nyata sesuai standar dan wewenang bidan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Mampu melakukan identifikasi dan analisis data dasar pada ibu dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- b. Mampu menentukan dan merumuskan diagnosa/masalah aktual pada ibu dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- c. Mampu menentukan dan merumuskan diagnosa/masalah potensial pada ibu dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- d. Mampu melaksanakan indentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada ibu dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- e. Mampu menentukan rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- f. Mampu melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada ibu dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- g. Mampu melaksanakan evaluasi tindakan asuhan kebidanan pada ibu dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

- h. Mampu mendokumentasikan semua temuan dan tindakan dalam asuhan kebidanan yang dilaksanakan pada ibu dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan ujian akhir dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada jenjang pendidikan Program Diploma III Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Kebidanan yang khususnya berkaitan dengan asuhan kebidanan pada persalinan *gemelli*

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam penerapan proses manajemen asuhan kebidanan pada persalinan *gemelli* serta sebagai acuan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan dalam penyusunan karya tulis berikutnya yang relevan dengan karya tulis ini.

E. Metode penulisan

Metode yang digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah ini adalah

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari literatur-literatur yang relevan seperti profil kesehatan, buku kebidanan dan mengakses data melalui internet dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

2. Studi Kasus

Melakukan studi kasus dengan melakukan metode pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan yang meliputi pengkajian data, analisis data, rumusan diagnosa/ masalah, perencanaan tindakan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Menentukan masalah aktual dan potensial, merencanakan tindakan, pelaksanaan asuhan kebidanan dengan persalinan *gemelli* untuk menghimpun data yang akurat dengan menggunakan tehnik:

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan ibu, suami/keluarga yang dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Penulis melakukan pemeriksaan fisik pada pasien secara terfokus yang meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan pemeriksaan penunjang lainnya.

c. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan bidan, dokter, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.

d. Diskusi

Melakukan tanya jawab dengan tenaga kesehatan yaitu bidan maupun dokter yang menangani langsung pasien tersebut serta berdiskusi dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ini terdiri dari BAB I sampai BAB V, yaitu: BAB I terdiri dari pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan metode penulisan. BAB II yaitu tinjauan pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori yang meliputi tentang tinjauan umum tentang persalinan, tinjauan tentang kehamilan dan persalinan *gemelli*, dan konsep dasar

manajemen asuhan kebidanan. BAB III yaitu studi kasus, pada bab ini akan diuraikan kasus yang telah dikaji dengan menggunakan 7 langkah Varney dan pendokumentasian SOAP. BAB IV yaitu pembahasan tentang kesesuaian antara tinjauan teori dengan studi kasus. BAB V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

1. Pengertian Persalinan

Ada beberapa pengertian persalinan, yaitu persalinan dapat didefinisikan secara medis sebagai kontraksi uterus yang teratur dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi serviks di sepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir melawan resistansi jaringan lunak, otot, dan struktur tulang panggul (Kennedy dkk, 2013:2). Sumber lain mengemukakan bahwa persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Kuswanti dan Melina, 2014:1).

Proses terjadinya persalinan karena adanya kontraksi uterus yang dirasakan oleh ibu. Kontraksi ini terjadi salah satu faktornya adalah akibat tuanya plasenta. Plasenta yang tua menyebabkan turunnya kadar progesteron yang mengakibatkan ketegangan pada pembuluh darah, hal ini menimbulkan kontraksi pada rahim (Indrayani dan Djami, 2013: 48). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. yang telah dijelaskan dalam QS. Maryam/19: 22-23, yaitu.

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِءَ مَكَانًا قَصِيًّا ۝۲۳ ﴾

﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّوَسِيًّا ۝۲۴ ﴾

Terjemahan : “Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh (22). Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: “Aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2012).

Setelah menyampaikan ketetapan Allah di atas, malaikat Jibril as. meniupkan , lelaki itu, yaitu Isa as., lalu ketika dia sadar akan kandungannya dia menyisihkan diri dengannya itu ke tempat yang jauh dari tempatnya sebelum ini. Maka, rasa sakit akibat kontraksi akan melahirkan anak memaksa dia menuju ke pangkal pohon kurma untuk bersandar. Kini, terbayang olehnya sikap hinaan yang akan didengarnya karena dia melahirkan anak tanpa memiliki suami, dan karena itu dia berkata “aduhai, alangkah baiknya aku mati, yaitu tidak pernah wujud sama sekali di pentas hidup sebelum ini, yaitu sebelum kehamilan ini, agar aku tidak memikul aib dan malu sari suatu perbuatan yang sama sekali tidak kukerjakan dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan selama-lamanya” (Shihab, 2002: 429).

Ayat tersebut menjelaskan tentang rasa sakit yang dialami oleh Maryam ketika akan melahirkan, dimana rasa sakit tersebut membuatnya berfikir bahwa “alangkah lebih baiknya aku mati sebelum ini”. Ayat ini telah memberikan gambaran Maha besar Allah SWT yang memberikan rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh setiap perempuan yang akan melahirkan untuk membantu

lahirnya bayi. Rasa sakit sakit tersebut dalam ilmu kesehatan disebut his dalam persalinan. His dalam persalinan terjadi karena adanya kontraksi uterus yang adekuat sehingga menimbulkan rasa sakit yang hebat pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke bawah dan membantu lahirnya bayi, his yang disertai dengan pengeluaran lendir dan darah adalah salah satu tanda dimulainya persalinan. Jadi ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan pengetahuan khususnya dalam kesehatan yang dipelajari saat ini yaitu setiap ibu hamil pasti akan mengalami rasa sakit yang hebat saat menjelang persalinan dan hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT jauh sebelum ilmu pengetahuan tentang persalinan ditemukan.

2. Tahapan Persalinan

Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 bagian:

a. Kala I

Pada kala I serviks membuka sampai terjadi pembukaan 10 cm. Kala I dinamakan pula kala pembukaan. Dapat dinyatakan partus dimulai bila timbul his dan ibu tersebut mengeluarkan lendir yang bersemu darah disertai dengan pendataran (*effacement*). Lendir bersemu darah berasal dari lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka dan mendatar. Darah berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler (kanalis serviks pecah karena pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka). Proses membukanya serviks dibagi dalam 2 macam:

1) Fase laten

Berlangsung selama 7-8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm.

2) Fase aktif

Fase ini berlangsung selama 6 jam dibagi menjadi 3 macam, yaitu fase akselerasi dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Fase dilatasi maksimal dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. Fase deselerasi pembukaan menjadi lambat, dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap (10 cm).

Fase-fase tersebut dijumpai pada primigravida. Pada multigravida pun terjadi demikian, namun fase laten, fase aktif terjadi lebih pendek. Mekanisme membukanya serviks berbeda antara primigravida dan multigravida. Pada primigravida Ostium Uteri Interna (OUI) akan membuka lebih dahulu sehingga serviks akan mendarat dan menipis, baru kemudian Ostium Uteri Eksterna (OUE) membuka. Pada multigravida OUI sudah sedikit membuka, OUI dan OUE serta penipisan dan pendataran serviks terjadi dalam saat yang sama.

Ketuban akan pecah dengan sendiri ketika pembukaan hampir lengkap atau kala I selesai apabila pembukaan serviks uteri telah lengkap. Pada primigravida kala I berlangsung kira-kira 13 jam dan pada multigravida kira-kira 7 jam (Kuswanti dan Melina, 2014: 5-6).

a. Kala II

Kala ini disebut juga sebagai kala pengeluaran. Kala ini dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya janin. Dalam fase ini ibu merasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul yang dapat menimbulkan rasa mencedan. Ibu merasakan ada tekanan pada rektum sehingga hendak buang air besar, perineum tampak menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Labia mulai membuka kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada saat his hingga lahirnya kepala, badan, ekstremitas, dan anggota tubuh janin yang lain. Pada primigravida kala II berlangsung rata-rata 1,5 jam dan pada multigravida rata-rata 0,5 jam (Indrayani dan Djami, 2013: 52). Adapun asuhan persalinan kala II adalah sebagai berikut.

- 1) Mendengar & Melihat Adanya Tanda Persalinan Kala Dua.
- 2) Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin & memasukan alat suntik sekali pakai 2½ ml ke dalam wadah partus set.
- 3) Memakai celemek plastik.
- 4) Melepas semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk bersih.
- 5) Menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

- 6) Mengisap oksitosin ke dalam tabung suntik dan meletakkan kembali di partus set.
- 7) Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang (DTT), dengan gerakan vulva ke perineum.
- 8) Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.
- 9) Mendekontaminasi sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.
- 10) Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan DJJ dalam batas normal (120 – 160 x/menit).
- 11) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.
- 12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).
- 13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.
- 14) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi.

- 15) Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.
- 16) Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.
- 17) Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.
- 18) Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenon (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi). Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum.
- 19) Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih.
- 20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi.
- 21) Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.
- 22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental. Dan menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan

lembut gerakan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

- 23) Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.
- 24) Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)
- 25) Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah daripada tubuh ibunya. Bila bayi mengalami asfiksia, lakukan resusitasi.
- 26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan biarkan kontak kulit ibu dengan bayi.
- 27) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mengurut tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua pada 2 cm dari klem pertama.
- 28) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi perut bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara kedua klem tersebut.
- 29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala.

- 30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu mengendakinya.
- 31) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua.
- 32) Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.
- 33) Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM (intramaskuler) di *gluteus* atau 1/3 atas paha kanan ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu.
- 34) Memindahkan klem pada tali pusat.
- 35) Meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan kiri untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. Tangan lain memegang tali pusat dengan klem.
- 36) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokrinal. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.
- 37) Melakukan penegangan dan dorongan dorsokrinal hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan

arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso-kranial).

- 38) Setelah plasenta tampak di introitus vagina, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu (terasa ada tahanan), pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.
- 39) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras).
- 40) Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa plasenta dan elaput ketuban lengkap dan utuh.
- 41) Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.
- 42) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
- 43) Mencilupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air DTT dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering.

- 44) Menempatkan klem tali pusat DTT atau steril atau mengikat tali DTT dengan simpul mati di sekeliling tali pusat sekitar 2 cm dari pusat.
- 45) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan dengan simpul mati pertama.
- 46) Melepas klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin 0,5%.
- 47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya.
- 48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI.
- 49) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.
 - a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalihan.
 - b) Setiap 15 menit pada jam pertama pascapersalihan.
 - c) Setiap 30 menit pada jam kedua pascapersalihan.
 - d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri.
 - e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan penjahitan dengan anestesi lokal dan menggunakan teknik yang sesuai.
- 50) Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
- 51) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.

- 52) Memeriksa tekanan darah, nadi, dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa suhu tubuh ibu setiap jam pada dua jam pertama pascapersalinan, dan melakukan tindakan sesuai untuk temuan yang tidak normal.
- 53) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.
- 54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
- 55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.
- 56) Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.
- 57) Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.
- 58) Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.
- 59) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- 60) Melengkapi partograf halaman depan dan belakang (Saifuddin, 2014 : 341-347).

b. Kala III

Disebut sebagai kala uri. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak diatas pusat. Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai pengeluaran darah, kira-kira 100-200 cc (Kuswanti dan Melina, 2014: 7-8).

c. Kala IV

Kala IV adalah kala pengawasan selama 1-2 jam setelah bayi dan plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap bahaya perdarahan postpartum (Kuswanti dan Melina, 2014: 8).

3. Penggunaan partograf dalam Asuhan Persalinan

a. Pengertian partograf

Partograf merupakan alat untuk mencatat informasi berdasarkan observasi, anamnesis dan pemeriksaan fisik ibu dalam persalinan dan sangat penting khususnya untuk membuat keputusan klinik selama kala I persalinan (Eniyati dan Putri, 2012: 47).

b. Kriteria pasien yang dapat dipantau menggunakan partograf:

- 1) Persalinan diperkirakan spontan
- 2) Janin tunggal

- 3) Usia kehamilan 36-42 minggu
 - 4) Presentasi kepala
 - 5) Tidak ada penyulit persalinan
 - 6) Persalinan sudah masuk dalam kala I fase aktif
- c. Kriteria pasien yang tidak perlu dipantau menggunakan partograf:
- 1) Tinggi badan pasien kurang dari 145 cm
 - 2) Ada perdarahan antepartum
 - 3) Mengalami preeklampsia atau eklampsia
 - 4) Anemia
 - 5) Adanya kelaianan letak janin
 - 6) Persalinan prematur
 - 7) Adanya induksi persalinan
 - 8) *Gemelli*
 - 9) Adanya rencana persalinan *Sectio Caesarea* (SC) (Kuswanti dan Melina, 2014: 55-57).

B. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan dan persalinan *Gemelli* (Kembar)

1. Pengertian Kehamilan *Gemelli*

Terdapat beberapa pengertian kehamilan *gemelli* yaitu merupakan suatu istilah yang digunakan apabila terdapat lebih dari satu janin di dalam rongga uterus. *Twins* menggambarkan dua janin, *triplets* menggambarkan tiga janin dan seterusnya (Liu, 2011: 283). Pada sumber lain mengatakan bahwa kehamilan

gemelli adalah kehamilan dengan dua janin atau lebih. Kehamilan kembar termasuk dalam kehamilan resiko tinggi karena kematian perinatal 3-5 kali lebih tinggi dari kehamilan tunggal (Fadlun dan Feryanto, 2013: 97). Kehamilan kembar telah dijelaskan oleh Allah SWT. di dalam QS. Ar-Ra'd/13: 8-9 yaitu:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۗ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۙ

Terjemahan : Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan dan bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukuran(nya). (Allah) yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak; Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012).

Setelah ayat-ayat yang lalu membuktikan kekuasaan Allah SWT., kini diuraikan ilmu-Nya yang sangat luas lagi mencakup segala yang kecil dan yang besar. Tuhan Yang Maha Mengetahui-lah yang menentukan juga jenis ayat atau mukjizat yang diturunkan-Nya kepada setiap rasul.

Salah satu objek pengetahuan-Nya adalah tentang kandungan. Allah mengetahui keadaan janin sejak masih berbentuk sperma. Calon bapak lalu membuahi ovum yang berada dalam diri seorang calon ibu. Allah mengetahui juga apa yang dikandung oleh setiap perempuan atau betina setelah pertemuan sperma dan ovum yang kemudian menempel di dinding rahim. Allah mengetahui, bukan saja jenis kelaminnya, tetapi berat badan dan bentuknya, keindahan dan keburukannya, usia dan reskinya, masa kini dan masa depannya, dan lain-lain. Dan

Allah mengetahui juga apa, yakni sperma dan ovum, yang berkurang di dalam rahim yang dapat mengakibatkan janin lahir cacat atau keguguran dan Allah mengetahui juga yang bertambah, yakni tumbuh atau yang dalam keadaan kembar. Dan segala sesuatu, baik menyangkut kandungan maupun selain kandungan. Pada sisi-Nya ada ukurannya yang sangat teliti, baik dalam kualitas, kuantitas, maupun kadar, waktu tempatnya. Jangan heran menyangkut pengetahuan itu karena Allah adalah yang mengetahui semua yang gaib dan yang tampak; Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang gaib bagi-Nya.

Kata (غَيْضٌ) *taghidh* dipahami oleh al-Biqā'i dalam arti berkurangnya sesuatu yang cair yang terdapat di suatu tempat yang sangat dalam. dari sini, ulama tersebut memahami penggalan ayat tersebut dalam rahim atas cairan yang ada sebelumnya yang merupakan unsur kelahiran dan yang kemudian dapat berakibat lahirnya anak kembar (Shihab, 2002 Vol. 6: 225-226).

2. Etiologi Kehamilan *Gemelli*

Beberapa faktor resiko terjadinya kehamilan *gemelli* diantaranya adalah herediter, umur, dan paritas hanya mempunyai pengaruh terhadap kehamilan *gemelli* yang berasal dari dua telur. Juga obat klomid dan hormon gonadotropin yang dipergunakan untuk menimbulkan ovulasi dilaporkan menyebabkan kehamilan dizigotik. Faktor lain dengan mekanisme tertentu menyebabkan matangnya 2 atau lebih folikel de graaf atau terbentuknya 2 ovum atau lebih dalam

satu folikel. Kemungkinan pertama dibuktikan dengan ditemukannya 21 korpora lutea pada kehamilan kembar (Pudiastuti, 2012: 138).

Menurut referensi lain. Fertilisasi *in vitro* dapat pula terjadi kehamilan *gemelli*, jika telur-telur yang diperoleh dapat dibuahi lebih dari satu dan jika semua embrio yang kemudian di masukkan ke dalam rongga rahim ibu tumbuh berkembang lebih dari satu. Pada kembar yang berasal dari satu telur, faktor bangsa, hereditas, umur dan paritas tidak atau sedikit sekali yang mempengaruhi terjadinya kehamilan *gemelli* itu. Diperkirakan penyebabnya ialah faktor penghambat pada masa pertumbuhan dini hasil konsepsi. Faktor penghambat yang mempengaruhi segmentasi sebelum *blastula* terbentuk, menghasilkan kehamilan *gemelli* dengan 2 amnion, 2 korion, dan 2 plasenta seperti pada kehamilan *dizigotik*. Bila faktor penghambat terjadi setelah *blastula* tetapi sebelum amnion terbentuk, maka akan terjadi kehamilan *gemelli* dengan 2 amnion, sebelum *primitive streak* tampak, maka akan terjadi kehamilan *gemelli* dengan 1 amnion. Setelah *primitive streak* terbentuk, maka akan terjadi kembar dempet dalam berbagai bentuk (Pudiastuti, 2012: 138).

3. **Diagnosis Kehamilan Gemelli**

Diagnosis kehamilan *gemelli* adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan yang memberikan petunjuk:
 - 1) Riwayat keluarga

- 2) Uterus dan abdomen tampak lebih besar dari yang diharapkan sesuai lamanya lamanya amenorrhea
- 3) Pertumbuhan uterus lebih cepat dari normal
- 4) Ada kenaikan berat badan berlebihan yang tidak diketahui

b. Gejala-gejala positif

- 1) Teraba dua kepala atau dua bokong.
- 2) Dua denyut jantung janin yang didengarkan pada waktu bersamaan oleh dua orang pemeriksa mempunyai selisih frekuensi paling sedikit 10 per menit.
- 3) Sinar -X abdomen menunjukkan dua skeleton. Ini dapat terlihat pada minggu ke-18 atau sebelumnya. Akan tetapi skeleton kedua baru dapat terlihat setelah minggu ke-25.
- 4) Ultrasonografi menunjukkan adanya dua atau lebih tengkorak janin (Eniyati dan Sholihah, 2013: 81).

Adanya (walaupun hanya satu) temuan klinis berikut harus mengingatkan bidan terhadap kemungkinan kehamilan kembar menurut Woodward dkk, 2012: 94, yaitu:

- 1) Tinggi fundus uteri lebih dari perkiraan untuk periode gestasi
- 2) Lingkar abdomen lebih dari 100 cm pada ibu yang memiliki ukuran tubuh rata-rata.
- 3) Batas lateral uterus meluas ke arah pinggul dan mengandung bagian janin.

- 4) Sedikitnya 3 kutub janin dapat dipalpasi yaitu dua kepala dan satu bokong atau dua bokong dan satu kepala.
- 5) Ekstremitas janin teraba multipel.
- 6) Denyut jantung janin kuat dan terdengar jelas di dua kuadran uterus yang berbeda, dengan frekuensi berbeda sedikitnya sepuluh detak dan keduanya tidak sinkron dengan denyut nadi ibu.
- 7) Kelahiran bayi lebih kecil dari perkiraan dan uterus masih besar.

4. Pengaruh Kehamilan *Gemelli*

a. Pengaruh pada ibu

Beberapa literatur yang menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada ibu akibat kehamilan *gemelli* adalah sebagai berikut:

- 1) Oleh karena ukuran intrauterin besar, sering timbul keluhan dari hanya berupa rasa tidak enak sampai nyeri perut. Tekanan terhadap diafragma menyebabkan *dyspnea*.
- 2) Beban mekanis dan metabolik menambah kompleksnya kehamilan.
- 3) Hidramnion, banyaknya air ketuban berlebihan, lebih sering terdapat dibanding kehamilan tunggal.
- 4) Sering didapatkan anemia.
- 5) Kenaikan berat badan berlebihan terjadi oleh karena beberapa sebab, meliputi makan berlebihan, retensi air, adanya lebih dari satu janin, dan hidramnion.

- 6) Banyak keluhan karena overaktivitas janin (Oxorn dan William, 2010 : 264-265).
- 7) Preeklampsia terjadi 2 sampai 5 kali lebih sering pada kehamilan gemelli. 15%-20% wanita dengan kehamilan *gemelli* akan mengalami preeklampsia. Preeklampsia didiagnosis saat tekanan darah ibu menjadi tinggi dan protein terdeteksi dalam urin. Kondisi itu bisa berkembang dan mengancam kesehatan ibu dan bayinya. bahkan dapat menyebabkan eklampsi, stroke atau komplikasi yang mengancam jiwa lainnya (Lazarov, Vol 14 No 1, 2016).
- 8) Angka kejadian SC meningkat. Baik sebagai tindakan efektif maupun gawat darurat, angka SC pada hamil *gemelli* lebih tinggi daripada hamil tunggal. Hal ini mungkin karena adanya malpresentasi, kelainan letak plasenta, ataupun penyulit ibu seperti hipertensi (Fadlun dan Feryanto, 2013).

Masalah kecil yang dialami banyak wanita hamil, seperti *morning sickness*, pergelangan kaki bengkak, varises, sakit punggung dan kelelahan, lebih sering terjadi pada kehamilan *gemelli*. Mereka menjadi lebih baik secara alami setelah bayi lahir. Setiap masalah yang muncul dalam kehamilan lebih sering terjadi pada bayi kembar dan termasuk anemia yang biasanya disebabkan oleh kekurangan zat besi karena bayi yang sedang berkembang

banyak menggunakan zat besi (*Royal College of Obstetricians and Gynecologists*, 2016).

Kesakitan dan kematian ibu jauh lebih tinggi pada kehamilan kembar dibanding kehamilan tunggal. Terdapat peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan anemia, peningkatan kejadian infeksi saluran kemih, lebih banyak preeklampsia-eklampsia, hidramnion, dan inersia uteri (*overdistensi*) dan kemungkinan perdarahan yang lebih besar (sebelum, selama dan setelah kelahiran). Sedangkan angka kematian perinatal pada bayi kembar adalah 3-4 kali lebih besar dibanding bayi tunggal, akibat prematuritas dan kesulitan-kesulitan lainnya (Benson dan Pernoll, 2013: 355).

a. Pengaruh pada janin dan bayi

- 1) Berat masing-masing lebih kecil dari rata-rata, berat totalnya lebih besar dari bayi tunggal. Salah satu anak akan lebih berat 50 sampai 1.000 gram dari lainnya. Sepuluh kasus janin mempunyai berat badan cukup bulan, seperdelapan kehamilan kedua bayinya dibawah 1.500 gram. Tiga perdelapan sisanya antara 1.500 sampai 2.500 gram.
- 2) Kombinasi janin kecil dengan air ketuban banyak menyebabkan kenaikan insiden mal presentasi.
- 3) Mortalitas janin meningkat pada kehamilan *gemelli* sampai empat kali kehamilan tunggal.

- 4) Resiko anak kedua hampir dua kali anak pertama, karena insidensi tindakan operatif yang lebih tinggi, interval terlalu lama antara kelahiran anak pertama dengan kedua, pengurangan kapasitas uterus setelah kelahiran anak pertama ini dapat mengubah hemodinamika plasenta yang dapat menyebabkan anoksia janin, anak kedua menempati posisi yang kurang menyenangkan di segmen atas uterus yang aktif berkontraksi, insidensi malpresentasi anak kedua lebih tinggi.
- 5) Malformasi kongenital lebih sering terjadi pada kehamilan *gemelli* daripada tunggal (Oxorn dan William, 2010 : 265).
- 6) Masalah dengan pertumbuhan Setelah kembar meningkatkan kemungkinan plasenta tidak bekerja sebaik seharusnya. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan bayi.
- 7) Sindrom transfusi kembar-ke-kembar (*Twin-to-twin transfusion syndrome/TTTS*) Kembar berbagi plasenta (kehamilan *monokorionik*) juga berbagi suplai darah. Sekitar 15 dari 100 kehamilan kembar *monokorionik*, aliran darah mungkin tidak seimbang yang disebut sindrom transfusi kembar-ke-kembar (TTTS). Satu bayi (pendonor), menerima terlalu sedikit darah dan memiliki tekanan darah rendah sementara bayi lainnya (penerima), menerima terlalu banyak darah dan memiliki tekanan darah tinggi (*Royal College of Obstetricians and Gynecologists*, 2016: 3).

- 8) Terjadinya BBLR lebih sering pada kehamilan *gemelli*
- 9) Kelahiran preterm (Lumempow, Jurnal e-Clinic (eCl), Volume 3, 2015).

b. Pengaruh pada persalinan

Peregangan uterus berlebihan karena besarnya janin, dua plasenta, dan air ketuban yang banyak menyebabkan hal-hal berikut.

- 1) Ketuban pecah awal sering terjadi dan merupakan salah satu sebab partus prematurus.
- 2) Kebanyakan persalinan anak kembar berjalan lancar. Kadang-kadang otot uterus yang teregang berlebihan menghasilkan kontraksi yang lemah dan tidak efisien, menyebabkan kemajuan yang lambat.
- 3) Insidensi yang tinggi dan bahaya perdarahan postpartum harus selalu diingat.
- 4) Terjadinya malpresentasi.
- 5) Tali pusat menubung karena ketuban yang pecah dengan mengalirnya air ketuban yang banyak terutama pada anak kedua
- 6) Kehamilan ganda mempercepat keadaan inkompetensi serviks dan dapat mengakibatkan pendataran dan pembukaan kadang-kadang sudah terjadi pada trimester pertama (Oxorn dan William, 2010 : 266).
- 7) Prematuritas. Terjadinya kelahiran prematur pada kehamilan *gemelli* lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan tunggal. Sekitar 60 dari


100 pasang bayi kembar akan lahir secara spontan sebelum 37 minggu kehamilan, sekitar 75 dari 100 set kembar tiga akan lahir spontan sebelum 35 minggu. Sebagai perbandingan, hanya sekitar 10 dari 100 wanita yang hamil dengan satu bayi akan melahirkan sebelum 37 minggu. Bayi yang lahir lebih awal dari 37 minggu kehamilan memiliki peningkatan risiko masalah, terutama dengan pernapasan, makan dan infeksi. Semakin dini bayi lahir, semakin besar kemungkinan hal ini terjadi (*Royal College of Obstetricians and Gynecologists*, 2016: 2-3).

5. Jenis Kehamilan Gemelli

- a. Kembar *monozigotik* atau *monokorionik* (*uniovular/monovular/identik*)

Kembar seperti ini dihasilkan jika ovum membagi ke dalam bentuk dua janin. Kembar ini dapat menjadi *dikorionik diamiotik*, *monokorionik diamiotik* atau *monokorionik monoamniotik*. Angka kembar dua *monozigotik* sebanyak 3-5 per 1000 sama semua kelompok etnik. (jenis kelamin selalu sama).

Gambar 2.1. Plasenta dan selaput janin kembar *monozigotik*




Sumber : Google Image: (A): *dikorionik, diamniotik* dan dua plasenta, (B): *dikorionik, diamniotik*, dan satu plasenta, (C): *monokorionik, diamniotik*, satu plasenta, (D): *Monokorionik, monoamniotik*, satu plasenta.

b. Kembar *dizigot* (*binovular, non-identik*)

Pada kembar *dizigotik* dua telur terpisah, biasanya pada siklus menstruasi yang sama, dan dibuahi oleh dua sperma yang berbeda. Jenis kelamin janin sering berbeda. Angka kembar berbeda-beda pada kelompok etnik yang berbeda dan dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan penyubur untuk meninduksi ovulasi (Liu, 2011: 283-284).

Gambar 2.2. plasenta dan selaput janin *dizigotik*



Sumber : *Google Image* : (A): dua plasenta, *dikorionik, diamniotik*, (B): satu plasenta, *dikorionik, diamniotik*.

6. Penatalaksanaan Kehamilan dan Persalinan Gemelli

a. Saat Hamil

Pemeriksaan antenatal lebih sering, yaitu setiap minggu setelah kehamilan 20 minggu. Timbulnya hipertensi dapat dicegah dan gula darah harus diperiksa. Perdarahan antepartum tidak dapat dihindari dengan pemeriksaan antenatal yang lebih sering. Fe dan asam folat diberikan pada trimester I. Diagnosis dini dapat menghindari komplikasi yang sering timbul, adanya kelainan kongenital dan kembar siam dapat ditegakkan saat hamil 19-20 minggu. Kelainan jantung bawaan dapat ditentukan dengan ultrasonografi yaitu dengan melihat 2 atrium dan 2 ventrikel dengan ketepatan 30% (Fadlun dan Feryanto, 2012: 108).

Hal-hal yang harus dilakukan seorang ibu hamil kembar selama kehamilan adalah sebagai berikut.

- 1) Pasien harus meninggalkan pekerjaan di luar rumah mulai umur 24 minggu. Ia memerlukan waktu istirahat lebih banyak.
- 2) Bepergian dibatasi karena kemungkinan persalinan lebih dini besar
- 3) Dianggap bahwa salah satu penyebab persalinan prematur adalah ketidakmampuan serviks menahan kehamilan yang membesar.
- 4) Kunjungan prenatal lebih sering sehingga terjadinya taksomia dapat diketahui seawal mungkin.

- 5) Anemia yang terjadi pada kebanyakan pasien harus dapat diobati cara intensif (Oxorn dan William, 2010: 268).

b. Saat persalinan

Persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Dapat dilakukan induksi persalinan apabila ada hipertensi atau pertumbuhan janin terhambat. Waspadai timbulnya perdarahan antepartum. Sebaiknya dipasang infus pada saat mulainya partus dan diperiksa golongan darah. Lakukan pemantauan dengan kardiografi pada persalinan per vaginam. Antibiotik ampisilin 2 g/iv diberikan tiap 6 jam, jika ada persalinan preterm. Pada kembar 3, dianjurkan untuk melakukan persalinan dengan SC untuk mencegah asfiksia dan kematian perinatal (Fadlun dan Feryanto, 2013: 109).

Pada umumnya persalinan hamil kembar dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan presentasi janin.

- 1) Janin pertama dan kedua presentasi kepala. Apabila presentasinya kepala-kepala, maka dilahirkan per vaginam, walaupun berat janinnya kurang dari 1500 g.
- 2) Janin pertama presentasi kepala, janin kedua bukan kepala. Masih ada silang pendapat, ada yang menganjurkan SC untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas, tetapi ada yang tidak ada bedanya antara persalinan per vaginam dan SC. Akan tetapi hati-hati penilaian ada presentasi bokong,

harus disingkirkan adanya disproporsi sefalo-pelvik, dan janin besar lebih dari 3.500 gram.

- 3) Janin pertama bukan presentasi kepala. Apabila janin pertama bukan kepala dianjurkan SC. Hal ini untuk menghindari adanya *interlocking* (Fadlun dan Feryanto, 2013: 109-110).

Dalam menolong persalinan *gemelli* bidan harus melakukan beberapa langkah berikut:

- 1) Memantau kesejahteraan ibu dan janin serta memperjelas catatan tentang keputusan yang diambil, tindakan yang dilakukan, asuhan yang diberikan, dan hasil observasi terhadap ibu dan janin. Pemeriksaan dalam harus dilakukan saat ketuban pecah, untuk menyingkirkan dugaan prolaps uteri dan menentukan presentasi, letak, dan penurunan bagian presentasi janin. Air dapat diberikan jika ibu haus, tetapi makanan tidak dianjurkan pada tahap ini.
- 2) Ketika ibu mulai mengejan aktif, ibu harus dibantu untuk menemukan posisi yang nyaman. Posisi *dorsal recumbent* (setengah duduk) berguna karena memaksimalkan ruang bawah panggul dan memungkinkan mekanisme normal persalinan tanpa hambatan. Posisi ini juga membantu oksigenasi janin, sebaiknya jangan diberikan intervensi seperti episiotomi kecuali ada indikasi yang jelas, misalnya janin mengalami bradikardia kala dua lanjut. Saat bayi pertama lahir, bidan mencatat waktu, mengkaji

kondisi bayi, mengeringkan, dan membedong bayi dengan handuk untuk mencegah hipotermia. Dua klem harus digunakan untuk memotong tali pusat.

- 3) Setelah bayi pertama lahir, bidan harus mengkaji kondisi, presentasi, dan letak kembar kedua melalui pemeriksaan abdomen, yang diikuti dengan pemeriksaan dalam jika perlu. Bidan dapat mempertimbangkan sengaja memecah selaput ketuban jika bagian presentasi sudah masuk rongga panggul (setinggi spina iskiadika) dan ibu aktif mengejan. Jika letak kembar kedua obliq atau lintang, bidan harus mengoreksinya menjadi longitudinal sesegera mungkin menggunakan versi sefalik eksternal maupun versi sefalik internal.
- 4) Jika bagian presentasi dipanggul, dan ibu kembali mengejan aktif, pimpin ibu untuk melahirkan kembar kedua. Selain itu waktu kelahiran harus dicatat, mengkaji kondisi dan mengklem tali pusat serta menjaga kehangatan bayi.
- 5) Bidan harus melakukan manajemen aktif kala III.
- 6) Melakukan pemantauan kala IV pada ibu (Woodward dkk, 2012: 98-105).

Tindakan operatif dipertimbangkan apabila presentasi janin abnormal, terjadi gawat janin, keadaan ibu buruk, atau apabila anak kedua belum juga lahir spontan setelah 15 menit. Oleh karena resiko anak kedua semakin besar dengan bertambahnya waktu (Eniyati dan Sholihah, 2013: 83).

7. Kompetensi Bidan Dalam Menolong Persalinan Gemelli

Berdasarkan keputusan menteri kesehatan Nomor: 396/MENKES/SK/III/2007 Tanggal 27 Maret 2007 tentang kompetensi bidan yang ke-4 tentang Asuhan Selama Persalinan dan Kelahiran yaitu bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebidayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir. Kompetensi bidan dalam menolong persalinan *gemelli* terdapat pada point ke-9 pengetahuan dasar kompetensi bidan yaitu tentang pengelolaan dan dan penatalaksanaan persalinan dengan kehamilan normal dan ganda (Yulifah dan Surachmindari, 2014: 57 dan 93).

Wanita dengan kehamilan kembar harus memiliki kesempatan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang perawatan mereka, dalam kemitraan dengan profesional layanan kesehatan mereka. Jika wanita tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan, profesional kesehatan harus mengikuti saran Departemen Kesehatan untuk menyetujui dan kode praktik yang menyertai Undang-Undang Kapasitas Mental (NICE, 2011: 8).

C. *Pandangan Islam Terhadap Persalinan*

Mengenai proses penciptaan manusia, Allah SWT. telah memberitahukan dalam QS. Fatir/35: 11.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

Terjemahan : Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun yang mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012).

Dia Memulai menciptakan kakek moyang kalian (Adam) dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya dari air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan yakni jenis laki-laki dan jenis perempuan, sebagai belas kasihan dan rahmat dari-Nya buat kalian. Karena itu, Allah menjadikan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian tenang bersamanya. Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Yakni Dia mengetahui hal itu, tiada sesuatu pun dari hal itu yang tersembunyi bagi-Nya (Shihab, 2002: 387).

Asuhan yang diberikan kepada ibu yang akan melahirkan merupakan suatu tindakan pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun jiwa manusia atau pasien sebagaimana yang tertuang dalam muqashid syariah berdasarkan penelitian para ahli

ushul fiqh ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Harahap Vol 9 , 2014). Setiap tindakan yang dilakukan dalam membantu orang lain, akan dicatat sebagai amalan saleh dan perbuatan terpuji yang dilakukan oleh seorang manusia. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam QS. Lukman/31: 8.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝

Terjemahan : sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012).

Mereka hidup bersenang-senang di dalamnya, merasakan berbagai macam kenikmatan dan kegembiraan yang berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, wanita, pemandangan yang indah-indah, serta mendengarkan nyanyian yang merdu-merdu. Semuanya itu merupakan kenikmatan yang belum pernah terdetik di dalam hati seorang manusia pun. Mereka hidup kekal di dalamnya, tidak akan berpindah darinya, dan sama sekaali tidak mau pindah darinya (Shihab, 2002: 273).

Ayat di atas menjelaskan mengenai balasan yang berikan oleh Allah kepada setiap manusia yang melakukan perbuatan yang baik secara ikhlas. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan dengan menolong seseorang dan memberikan kebaikan dengan berlandaskan iman dan keyakinan kepada Allah, maka Allah swt menjanjikan syurga baginya.

D. Konsep Dasar Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan merupakan metode atau bentuk pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan sehingga langkah-langkah kebidanan merupakan alur pikir bidan dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan klinis. Asuhan kebidanan yang diberikan harus dicatat secara benar, sederhana, jelas dan logis sehingga perlu metode pendokumentasian. Metode pendokumentasian yang digunakan dalam asuhan kebidanan adalah dengan SOAP yaitu Subjektif, Objektif, *Assessment*, dan *Planning* (Handayani, 2012: 58).

2. Proses manajemen kebidanan (7 langkah)

a. Langkah I : pengumpulan dan analisa data dasar

1) Biodata

Mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk menilai keadaan klien secara keseluruhan yang terdiri atas data istri dan suami, meliputi nama ibu dan suami, umur, pernikahan keberapa dan lamanya, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.

2) Alasan masuk dan keluhan utama

Alasan ibu datang ke tempat pelayanan kesehatan dan keluhan yang dirasakan ibu sekarang. dalam kasus persalinan, keluhan yang sering

dirasakan oleh ibu seperti nyeri perut tembus belakang serta pengeluaran lendir, darah, atau air ketuban dari jalan lahir. Jika dalam persalinan gemelli keluhan utama yang sering dialami oleh ibu seperti nyeri perut hebat atau bahkan belum merasakan sakit sama sekali sehingga ibu datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan tindakan operatif (anjuan dokter).

3) Riwayat kehamilan sekarang

Mengumpulkan semua data yang dibutuhkan mengenai riwayat kehamilan ibu yang sekarang, meliputi:

- a) Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) untuk menghitung usia kehamilan ibu berdasarkan siklus haid ibu.
- b) Keluhan yang dialami ibu selama hamil, pada kasus kehamilan kembar keluhan yang sering dialami seperti nyeri perut, pusing dan sakit kepala akibat dari hipertensi atau preeklampsi, mual muntah, mengalami sesak karena ukuran perut yang lebih besar dari pada kehamilan tunggal, sering buang air kecil.
- c) Pergerakan janin pertama kali, pada kehamilan kembar pergerakan janin dapat dirasakan ibu pada dua sisi perut atau pada keseluruhan perut ibu.

4) Riwayat kebidanan

a) Riwayat menstruasi

Data ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan dasar dari organ reproduksi pasien. Beberapa data yang harus kita peroleh dari riwayat menstruasi antara lain yaitu menarche (usia pertama kali mengalami menstruasi yang pada umumnya wanita Indonesia mengalami menarche pada usia sekitar 12 sampai 16 tahun), siklus menstruasi (jarak antara menstruasi yang dialami dengan menstruasi berikutnya dalam hitungan hari yang biasanya sekitar 21 sampai 34 hari), volume darah data ini menjelaskan seberapa banyak darah menstruasi yang dikeluarkan biasanya acuan yang digunakan berupa kriteria banyak atau sedikitnya, keluhan, beberapa wanita menyampaikan keluhan yang dirasakan ketika mengalami menstruasi dan dapat merujuk kepada diagnosa tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

b) Gangguan kesehatan alat reproduksi

Data ini sangat penting untuk kita karena akan memberikan petunjuk bagi kita tentang organ reproduksi pasien. Ada beberapa penyakit organ reproduksi yang berkaitan erat dengan personal hygiene pasien, atau kebiasaan lain yang tidak mendukung kesehatan reproduksinya.

c) Riwayat Kontrasepsi

Riwayat kontrasepsi sangat diperlukan karena kontrasepsi hormonal

d) Riwayat Obstetri

Informasi esensial tentang kehamilan terdahulu mencakup bulan dan tahun kehamilan tersebut berakhir, usia gestasi pada saat itu, tipe persalinan (spontan, forsep, ekstraksi vakum, atau bedah sesar), berat lahir, jenis kelamin, dan komplikasi lain. Dalam kasus ini data obstetri yang dikumpulkan berupa riwayat kehamilan dan persalinan lalu ibu, apakah ada riwayat hamil dan melahirkan kembar atau tidak.

e) Riwayat kesehatan

Data riwayat kesehatan ini dapat kita gunakan sebagai penanda akan adanya penyulit masa hamil. Beberapa data penting tentang riwayat kesehatan pasien yang perlu diketahui adalah apakah pasien pernah atau sedang menderita penyakit seperti jantung, diabetes melitus, ginjal, hipertensi atau hipotensi, hepatitis, dan lain-lain.

f) Riwayat keluarga

Informasi tentang keluarga pasien penting untuk mengidentifikasi wanita yang beresiko menderita penyakit genetik yang dapat mempengaruhi hasil akhir kehamilan atau beresiko memiliki bayi yang menderita penyakit genetik. Dalam kasus ini data yang diperlukan adalah apakah ada salah satu dari keluarga yang juga pernah hamil kembar (riwayat kembar dari keluarga).

g) Riwayat sosial

Riwayat sosial yang perlu untuk diketahui seperti status perkawinan, sumber dukungan, respon ibu terhadap kehamilan ini, respon keluarga terhadap kehamilan ini, pengetahuan ibu tentang perawatan kehamilan, adat istiadat setempat yang berkaitan dengan masa hamil, perencanaan KB. Berdasarkan kasus ini, data yang diperlukan meliputi, respon keluarga mengenai kehamilan ibu sekarang ini (kehamilan kembar) terutama suami.

h) Pola kehidupan sehari-hari

Data pola kehidupan sehari-hari yang perlu untuk dikaji adalah pola makan ibu, pola minum, pola istirahat, dan aktivitas sehari-hari (Romauli, 2011:164-170).

5) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik digunakan untuk mengetahui kondisi pasien secara menyeluruh. Langkah-langkah pemeriksaan fisik sebaiknya dilakukan secara sistematis, meliputi:

- a) Keadaan umum pasien
- b) Kesadaran (komposmentis, somnolen, apatis, dan lainnya)
- c) Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - (1) Tekanan darah, dikatakan tinggi bila lebih dari 140/90 mmHg. Bila tekanan darah meningkat, yaitu sistolik 30 mmHg atau lebih dan diastolik 15 mmHg atau lebih, kelainan ini dapat berlanjut menjadi preeklampsia dan eklampsia kalau tidak ditangani dengan cepat. Pada kehamilan kembar, tekanan darah ibu meningkat dikarenakan suplai darah ke janin yang lebih banyak dibandingkan dengan janin tunggal.
 - (2) Nadi, dalam keadaan santai denyut nadi ibu sekitar 60-100 x/i menit. Denyut nadi akan meningkat dan melebihi 100 x/i menit jika ibu dalam keadaan tegang, ketakutan dan cemas, demam, gangguan jantung dan jika sedang his dalam proses persalinan.
 - (3) Pernapasan, untuk mengetahui fungsi sistem pernapasan. Normalnya 16-24 x/i menit.

(4) Suhu tubuh, normalnya adalah $36,5-37,5^{\circ}\text{C}$.

d) Pemeriksaan fisik khusus pada ibu bersalin

Inspeksi adalah memeriksa dengan cara melihat atau memandang meliputi:

(1) Mata

Bentuk simetris, konjungtiva normal warna merah muda, bila pucat menandakan anemia. Sklera normal berwarna putih, bila kuning menandakan ibu mungkin terinfeksi hepatitis, bila merah kemungkinan ada konjungtivitis, kelopak mata yang bengkak kemungkinan adanya preeklampsia.

(2) Wajah

Tampak kloasma gravidarum sebagai akibat deposit pigmen yang berlebihan, tidak sembab, bentuk simetris, bila tidak menunjukkan adanya kelumpuhan.

(3) Leher

Normal tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan tidak ditemukan bendungan vena jugularis.

(4) Payudara

Normal bentuk simetris, hiperpigmentasi pada areola mammae, puting susu bersih dan menonjol, ada atau tidak pengeluaran ASI.

(5) Abdomen

Bentuk, bekas luka operasi, terdapat linea nigra, striae dan pembesaran abdomen. Pembesaran perut pada kehamilan kembar lebih besar dari usia kehamilan dibandingkan dengan kehamilan tunggal.

(6) Genitalia

Tidak oedema, tidak ada varises dan kelainan lainnya

(7) Ektremitas atas dan bawah

Normal tidak oedema dan tidak ada varises, bentuk simetris tidak dan ada kelainan.

Palpasi adalah pemeriksaan dengan cara meraba, meliputi:

Periksa raba adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menilai suatu keadaan pasien dan bisa digunakan pada kehamilan atau masa persalinan dengan cara meraba perut pasien pada posisi *dorsal recumbent*. Melalui

palpasi dapat ditentukan usia kehamilan berdasarkan TFU, bagian-bagian janin dalam rahim, letak janin dalam rahim, sejauh mana bagian terendah janin masuk dalam panggul, ada atau tidaknya keseimbangan antara ukuran kepala janin dengan panggul, janin tunggal atau kembar, letak DJJ, dan perkiraan taksiran berat badan janin dalam rahim. Pada kehamilan kembar tinggi fundus uteri melebihi usia kehamilan, teraba dua punggung, bokong, kepala dan bagian terkecil janin, dan taksiran berat janin bisa melebihi taksiran berat janin normal.

Auskultasi atau periksa dengan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menilai kesejahteraan janin dalam kandungan dengan menggunakan stetoskop monokuler (*Lennece*), atau doppler. Periksa dengar harus dilakukan 1 menit penuh dan menilai denyut jantung janin dalam batas normal yaitu 120-160 kali per menit. Pada kehamilan kembar, denyut jantung janin terdapat pada dua sisi perut ibu dengan frekuensi yang berbeda.

e) Pemeriksaan dalam

Beberapa hal yang dinilai pada pemeriksaan dalam adalah, keadaan perineum dan vagina, porsio, keadaan serviks, keadaan

ketuban, letak atau presentasi janin, penurunan bagian terendah janin, adanya penyusupan atau tidak, penumbungan, kesesuaian ukuran panggul dalam dengan bagian terendah janin, dan menilai pelepasan cairan seperti lendir, darah dan air ketuban. Pada kehamilan kembar, hasil dari pemeriksaan dalam hanya akan mendapatkan bagian terendah janin pertama baik presentasi kepala, bokong ataupun posisi janin lintang. (Baety, 2012 : 9 dan 19-42).

b. Langkah II : merumuskan diagnosa/masalah aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi sesuai dengan data yang dikumpulkan. Data yang akurat diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Diagnosa yang ditegakkan oleh bidan dalam lingkup praktik kebidanan harus memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan, yaitu:

- 1) Diakui telah disahkan oleh profesi.
- 2) Berhubungan langsung dengan praktik kebidanan.
- 3) Memiliki ciri khas kebidanan.
- 4) Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan.
- 5) Didukung oleh *Clinical Judgement* dalam lingkup praktik kebidanan.

Berdasarkan kasus ini, maka kemungkinan interpretasi data yang timbul adalah gravid, usia gestasi, keadaan janin, gemelli, intrauterin, presentasi, bagian punggung, keadaan umum ibu dan janin baik, dengan berdasarkan data subjektif dan objektif.

c. Langkah III : merumuskan diagnosa/masalah potensial.

Dari kumpulan diagnosis dan masalah, identifikasi faktor-faktor potensial yang memerlukan antisipasi segera, maupun tindakan pencegahan. Untuk persalinan kembar, diagnosa potensialnya yaitu terjadinya preeklamsi-ekplamsi dan solusio plasenta.

d. Langkah IV : melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi

Proses manajemen kebidanan dilakukan secara terus menerus yang dapat menghasilkan data baru, dimana harus segera dinilai. Data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan yang memerlukan tindakan segera, beberapa data yang memerlukan indikasi adanya situasi yang membutuhkan tindakan segera sambil menunggu intervensi dari dokter. Dalam situasi lain yang tidak darurat tetapi membutuhkan konsultasi atau kolaborasi dokter. Melakukan pertolongan persalinan *gemelli* harus dilakukan oleh tenaga ahli atau melakukan kolaborasi dengan spesialis kandungan untuk antisipasi kegawatdaruratan seperti didapatkan temuan-temuan yang abnormal selama sebelum, sementara dan setelah proses persalinan.

e. Langkah V : Perencanaan tindakan/intervensi

Dikembangkan berdasarkan intervensi saat sekarang dan antisipasi diagnosa masalah serta meliputi data tambahan setelah data dasar. Rencana tindakan komprehensif bukan meliputi keadaan pasien serta hubungan dengan masalah yang dialami akan tetapi meliputi antisipasi dengan bimbingan terhadap pasien, serta konseling bila perlu mengenai ekonomi, agama, budaya, dan psikologis. Rencana tindakan harus didiskusikan dengan pasien. Semua tindakan diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya serta situasi dan kondisi dimana tindakan harus dapat dianalisa secara teoritis.

f. Langkah VI : Pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan

Implementasi dapat dikerjakan secara keseluruhan oleh bidan atau bekerjasama dengan tim kesehatan lain. Bidan harus bertanggungjawab terhadap tindakan secara langsung maupun tindakan kolaborasi dan konsultasi. Implementasi yang efisien akan meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien.

g. Langkah VII : Evaluasi

Langkah akhir dari manajemen kebidanan adalah evaluasi, namun sebenarnya evaluasi ini dilakukan pada setiap langkah manajemen kebidanan. Pada tahap evaluasi, bidan harus mengetahui sejauh mana keberhasilan

asuhan yang diberikan kepada pasien. Proses evaluasi yang dilakukan berupa penilaian keadaan umum, kesadaran tanda-tanda vital, kontraksi uterus, dan menilai jumlah perdarahan.

Dari 7 proses pikir di dokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu:

1. Proses pikir langkah I di dokumentasikan dalam bentuk subjektif (S) dan objektif (O).
2. Proses pikir langkah II,III dan IV di dokumentasikan dalam bentuk *assessment* (A).
3. Proses pikir langkah V, VI, dan VII di dokumentasikan dalam bentuk *planning* (P) (Tresnawati, 2013: 181-186).

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY "S" DENGAN

PERSALINAN GEMELLI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 01-02 MEI 2017

No. Register : 467xxx
Tanggal Masuk : 01 Mei 2017, jam 22.00 WITA
Tanggal Pengkajian : 01 Mei 2017, jam 22. 10 WITA
Tanggal Partus : 02 Mei 2017, jam 04.15 WITA
Nama Pengkaji : Sri Nur Fitriwati

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny " S " / Tn " I "
Umur : 29 Tahun / 34 Tahun
Nikah/Lamanya : 1 X / ± 12 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMP
Pekerjaan : IRT / Supir

Alamat : Manyampa, Pallangga

2. Data Biologis / Fisiologi

1. Keluhan utama

Ibu mengeluh merasakan nyeri perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir dan darah

2. Riwayat keluhan utama

- a. Nyeri perut tembus belakang sejak tanggal 02-05-2017 jam 02.00 WITA
- b. Sifat nyeri hilang timbul dan semakin lama semakin sakit.
- c. Pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 02-05-2015 jam 02.40 WITA

3. Riwayat Kehamilan Sekarang

- a. Kehamilan ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran.
- b. HPHT tanggal 28-7-2016.
- c. Usia kehamilan ibu \pm 10 bulan.
- d. Tidak pernah merasakan nyeri perut hebat selama hamil.
- e. Ibu merasakan pergerakan janin sejak usia kehamilan \pm 4 bulan sampai sekarang dan terasa pada bagian kanan dan kiri perut ibu.
- f. Memeriksa kehamilan sebanyak 9 kali di RSUD Syekh Yusuf
 - 1) Kunjungan 1 tanggal 20-12-2016
 - 2) Kunjungan 2 tanggal 23-01-2017
 - 3) Kunjungan 3 tanggal 20-02-2017
 - 4) Kunjungan 4 tanggal 12-03-2017
 - 5) Kunjungan 5 tanggal 02-04-2017

6) Kunjungan 6 tanggal 20-04-2017

7) Kunjungan 7 tanggal 21-04-2017

8) Kunjungan 8 tanggal 28-04-2017

9) Kunjungan 9 tanggal 29-04-2017

g. Ibu mendapat suntik Tetanus Toksoid (TT) 1 kali di RSUD Syekh Yusuf tanggal 02-04-2017

4. Riwayat Kehamilan, Persalinan, Nifas Lalu

Tabel 3.1. Riwayat kehamilan, persalinan nifas lalu ibu

Kehamilan	Persalinan						Nifas		
	Anak Ke	Tanggal Lahir	JK	BBL	Proses	Tempat persalinan	Penolong	Kondisi	ASI
I		11-04-2007	P	3.900 gr	Normal	RS St. Fatimah	Bidan	Hidup	± 2 thn
II		21-11-2015	L	3.700 gr	Normal	BPS Pallangga	Bidan	Hidup	± 9 bln
III	Kehamilan sekarang								

3. Riwayat Reproduksi

a. *Menarche* : 13 Tahun

b. Siklus : 26-28 hari

c. Lamanya : 7 hari

d. *Dismenorrhea* : hari 1-3

e. Banyaknya : ganti pembalut 2-3 kali sehari pada hari 1-3

4. Riwayat Kesehatan Lalu

a. Pernah dirawat opname karena demam berdarah selama \pm 1 minggu

b. Tidak ada riwayat penyakit menular seksual (PMS).

c. Tidak ada riwayat alergi obat-obatan

5. Riwayat Kesehatan Keluarga

Ada anggota keluarga yang menderita hipertensi, asma dan kista ovarium, ada riwayat keluarga kembar.

6. Riwayat Kontrasepsi

Ibu adalah akseptor KB suntuk 3 bulan setelah kelahiran anak pertama selama \pm 2 tahun.

7. Pola Pemenuhan Kebutuhan Dasar

a. Nutrisi

1) Makan : 2 x sehari dengan porsi 1 piring

2) Minum : ibu biasa minum air putih 7-8 gelas sehari

3) Selama inpartu ibu telah makan $\frac{1}{2}$ piring nasi+lauk, dan minum lebih dari 3 gelas

b. Eliminasi

1) BAB : 1-2 x sehari dengan konsistensi padat warna kuning

2) BAK : 4-5 kali sehari bau amoniak warna kekuningan

3) Selama inpartu ibu belum BAB, dan sudah BAK 2 kali.

c. Istirahat

- 1) Tidur siang : \pm 2 jam
- 2) Tidur malam : \pm 8 jam
- 3) Selama inpartu ibu duduk dan berbaring

8. Riwayat Sosial Ekonomi

- a. Ibu mengerjakan sendiri pekerjaan dalam keluarga
- b. Suami adalah pengambil keputusan utama dalam keluarga
- c. Suami dan keluarga senang dengan kehamilan sekarang

9. Data Psikologi

- a. Ibu merasa cemas menghadapi persalinannya
- b. Ibu selalu mendapat dukungan/support dari keluarga

10. Data Spiritual

- a. Ibu selalu sholat lima kali sehari.
- b. Ibu rutin mengaji setiap hari.
- c. Ibu selalu berdoa kepada Allah swt agar diberi keselamatan dan kesehatan untuk diri dan janinnya.

11. Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan ibu baik
- b. Kesadaran komposmentis
- c. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - 1) Tekanan darah : 130/90 mmHg
 - 2) Nadi : 80 kali permenit

- 3) Pernapasan : 20 kali permenit
- 4) Suhu : 36,6⁰C
- d. Mata : konjungtiva tidak pucat sklera tidak ikterus, kelopak mata tidak oedema
- e. Wajah : tidak pucat dan tidak oedema
- f. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid, dan kelenjar limfe, pergerakan baik
- g. Payudara : puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada areolal mammae, tidak ada massa dan nyeri tekan, ada pengeluaran ASI saat ditekan
- h. Abdomen :
- 1) Tampak *striae albicans* dan *linea nigra*, pembesaran perut melebihi usia kehamilan, tidak ada bekas operasi.
 - 2) Tidak ada nyeri tekan
 - 3) Leopold I : TFU 2 jari di bawah *Processus Xipioideus* (PX) 36 cm, teraba dua bokong.
 - Leopold II : PUKA-PUKI (Punggung Kanan-Punggung Kiri)
 - Leopold III : dua Kepala
 - Leopold IV : BDP, 2/5
- 4) Lingkar panggul : 94 cm
- 5) Taksiran Berat Janin (TBJ) : 3.384 gram

- 6) His : 3 kali dalam 10 menit dengan frekuensi 35-40 detik.
- 7) Denyut Jantung Janin (DJJ) :
- FI : terdengar jelas pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 kali permenit teratur.
- FII : terdengar jelas pada kadran kiri atas perut ibu dengan frekuensi 130 kali permenit teratur.
- i. Genitalia : tidak ada varises dan tidak oedema
- Hasil pemeriksaan dalam atau VT (*vaginal tousche*) tanggal 02-05 - 2017, jam 03.10 WITA
- 1) Vulva-vagina: tidak ada kelainan
 - 2) Porsio : lunak tipis
 - 3) Pembukaan : 9 cm
 - 4) Ketuban : utuh
 - 5) Presentasi : ubun-ubun kecil (UUK) kanan depan
 - 6) Penurunan : hodge III
 - 7) Penyusupan : o
 - 8) Penumbungan : tidak ada
 - 9) Kesan panggul : normal
 - 10) Pelepasan : lendir dan darah
- j. Ekstremitas : tidak ada varises, pergerakan baik, terpasang infus pada tangan kiri (cairan RL), tidak oedema.

12. Pemeriksaan Penunjang

a. Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 01 Mei 2017, jam 18.30 WITA.

WBC : $14.2 \times 10^3 / \mu\text{L}$

RBC : $4.10 \times 10^3 / \mu\text{L}$

HGB : 10.0 g/dl

PLT : $322 \times 10^3 / \mu\text{L}$

CT/BT : 7'20/ 2'25

Protein : negatif

Reduksi : negatif

HbsAg : negatif

b. Hasil pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG) tanggal 07-04-2017

1) GIII PII A0, gravid *gemelli*, hidup

2) Letak : F1 : kepala

F2 : Bokong

3) FHR : F1 : 103 bpm

F2 : 134 bpm

4) TBJ : F1 : ± 1.954 gr

F2 : ± 2.000 gr

5) UK : $\pm 32-33$ minggu, TP: $\pm 30-05-2017$.

6) Plasenta di *posterofundal grade 1*

7) Cairan amnion normal

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : G III P I A O, gestasi 39 minggu 6 hari, situs memanjang, intra uterin, *gemelli*, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase aktif.

A. G III P I A O

Data Subjektif :

1. Ibu mengatakan ini kehamilan yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran.
2. Ibu merasakan pergerakan janin sejak usia kehamilan ± 4 bulan sampai sekarang

Data Objektif :

1. Tonus otot tampak kendur, tampak *striae albicans*.
2. Palpasi abdomen

Leopold I : TFU 2 jari di bawah *Processus Xipioideus* (PX) 36 cm, teraba 2

bokong

Leopold II : PUKA-PUKI

Leopold III : 2 kepala

Leopold IV : BDP, 2/5

Analisa dan interpretasi data

1. Pada multigravida tonus otot perut tampak kendur karena sudah mengalami peregangan pada kehamilan sebelumnya.

2. Pada multigravida terdapat garis-garis putih yang merupakan bekas ldari striae gravidarum pada kehamilan yang lalu disebut striae albikan yang timbul akibat hiperfungsi glandula supranalis dan timbul garis lurus berwarna hitam disebut linea nigra.
3. Tanda pasti hamil diantaranya teraba bagian-bagian janin saat palpasi.

B. Gestasi 39 minggu 5 hari

Data Subjektif :

1. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 28-07-2016.
2. Ibu mengatakan umur kehamilannya \pm 10 bulan.

Data Objektif :

1. Hari taksiran persalinan tanggal 04-05-2017.
2. Leopold I : Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah PX, 36 cm, teraba bokong pada fundus.
3. Tanggal pengkajian 01-05-2017.

Analisa dan interpretasi data

1. Dari hari pertama haid terakhir tanggal 28-07-2016 sampai tanggal pengkajain 01-05-2017 maka ibu *amenorrhoe* selama 277 hari atau umur kehamilan ibu 39 minggu 5 hari.
2. Menurut rumus Mc. Donald : $\frac{\text{TFU dalam cm}}{3.5} = \text{Tuanya kehamilan} = 10.2 \text{ bulan}$

C. Situs memanjang

Data Subjektif : ibu mengatakan pergerakan janin kuat terasa pada bagian kiri dan kanan perut ibu.

Data Objektif :

1. Leopold I : tinggi fundus uteri 2 jari di bawah PX 36 cm, teraba 2 bokong pada fundus.
2. Leopold II : PUKA-PUKI
3. Leopold III : 2 kepala
4. Leopold Iv : BDP, 2/5
5. Denyut jantung janin terdengar jelas pada kuadran kanan perut ibu dengan frekuensi 136 kali permenit teratur dan kuadran kiri perut ibu dengan frekuensi 130 kali permenit.

Analisa dan interpretasi data

Jika ukuran janin adalah ukuran bokong/ kepala dan sesuai dengan sumbu panjang ibu maka janin dalam keadaan letak memanjang.

D. Intra Uterin

Data Subjektif :

1. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat
2. Ibu mengatakan tidak pernah mengalami nyeri perut hebat selama hamil

Data Objektif : ibu tidak merasakan nyeri saat di palpasi. Pada palpasi didapatkan

1. Leopold I : TFU 2 jari di bawah PX 36 cm, teraba 2 bokong.
2. Leopold II : PUKA-PUKI
3. Leopold III : 2 Kepala
4. Leopold IV : BDP, 2/5

Analisa dan interpretasi data

Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intra uterin.

E. *Gemelli*

Data Subjektif : Ibu mengatakan pergerakan janin pada bagian kanan dan kiri perut ibu

Data Objektif :

1. Pembesaran perut besar dari masa kehamilan
2. Leopold I : TFU 2 jari di bawah PX 36 cm, teraba 2 bokong
3. Leopold II : PUKA-PUKI
4. Leopold III : 2 Kepala

5. Leopold IV : BDP, 2/5
6. Terdengar dua jantung janin dengan frekuensi yang berbeda yaitu pada kuadran kanan perut ibu dengan frekuensi 136 kali permenit teratur dan kuadran kiri perut ibu dengan frekuensi 130 kali permenit.

Analisa dan interpretasi data

Pembesaran perut yang tidak sesuai dengan usia kehamilan, teraba dua bokong, dua punggung, dua kepala, dan terdengar denyut jantung janin pada dua titik serta pergerakan janin pada kedua sisi perut ibu menandakan janin ganda.

F. Keadaan Janin

Data Subjektif : Ibu mengatakan pergerakan janinnya sejak usia kehamilan \pm 4 bulan dan pergerakan janinnya kuat

Data Objektif : Denyut jantung janin terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 kali permenit dan kuadran kiri atas perut ibu dengan frekuensi 130 kali permenit.

Analisa dan interpretasi data

Denyut jantung janin dalam batas normal (120-160 kali permenit), pergerakan janin yang dirasakan ibu aktif menandakan janin dalam keadaan baik.

G. Keadaan Ibu

Data Subjektif : -

Data Objektif :

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis

2. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 130/90 mmHg

Nadi : 80 kali permenit

Pernapasan : 20 kali permenit

Suhu : 36,6⁰C

Analisa dan interpretasi data

Keadaan umum ibu baik ditandai dengan tand-tanda vital dalam batas normal dan ditunjang dengan kedasarn ibu komposmentsi menandakan ibu dalam keadaan baik

H. Inpartu Kala I Fase Aktif

Data Subjektif : ibu mengatakan sakit perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 02-05-2017 jam 02.00 WITA.

Data Objektif : kontraksi uterus baik, his 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 35-40 detik

VT tanggal 02-05-2017 jam 03.10 WITA

1. Keadaan vula-vagina : tidak ada kelainan
2. Porsio : melesap
3. Pembukaan : 9 cm
4. Ketuban : utuh
5. Presentasi : UUK kanan lintang
6. Penurunan : hodge III
7. Penyusupan : o
8. Penumbungan : tidak ada
9. Kesan panggul : normal
10. Pelepasan : lendir dan darah

Analisa dan interpretasi data

1. Perasaan sakit pada hsi mungkin disebabkan oleh iskemia dalam korpus uteri terhadap banyak serabut saraf, peristiwa ini meneruskan perasaan sakit melalui saraf sensori di fleksus hipogatrikus ke sistem saraf pusat.
2. Lendir yang bersemu dengan darah ini berasal dari lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka dan mendatar.
3. Tekanan pada ganglion servikalis yang tumbuh dibelakang serviks. Bila ganglion itu tertekan, kontraksi uterus dapat dibangkitkan. His yang sempurna akan membuat dinding korpus uteri yang terdiri atas otot menjadi lebih tebal dan lebih pendek sedangkan di bagian bawah uterus dan serviks hanya

mengandung jaringan kolagen akan pindah dan terbalik hingga menjadi tipis dan terbuka.

4. Ibu dikatakan in partu apabila adanya rasa sakit oleh karena his yang datang, keluarnya lendir bercampur darah, kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya, serta pada pemeriksaan dalam didapatkan serviks mendatar dan pembukaannya telah ada.
5. Kala I dibagi menjadi dua yaitu kala I fase laten pembukaan 1-3 cm dan kala I fase aktif yaitu pembukaan 4-10 cm. Sedangkan pada pemeriksaan dalam ibu didapatkan pembukaan 9 cm, jadi telah berada dalam kala I fase aktif.

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial yang mungkin terjadi adalah

1. Antisipasi terjadinya *preeklampsia* dan partus macet

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY ATAU KOLABORASI

Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi mengenai tindakan selanjutnya dan dokter menganjurkan pemasangan kateter tetap untuk persiapan *Sectio Caesarea* (SC), serta instruksi pemantauan kemajuan persalinan.

LANGKAH V : INTERVENSI

Tujuan : kala I berlangsung berlangsung normal.

Kriteria :

- a. Kontraksi uterus adekuat.
- b. Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri
- c. Fase aktif tidak lebih dari 8 jam
- d. Kondisi ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal
 1. Tekanan darah : (N : 90/70-120/90 mmHg)
 2. Nadi : (N : 78-84 kali permenit)
 3. Pernapasan : (N : 16-20 kali permenit)
 4. Suhu : (N : 36,5-37,5⁰C)
- e. Denyut jantung janin dalam batas normal (120-160 kali permenit)

Rencana tindakan

1. Melakukan pemasangan kateter tetap.

Rasional : untuk menilai jumlah eliminasi ibu dan memastikan kandung kemih kosong, serta untuk antisipasi tindakan SC.
2. Jelaskan penyebab nyeri

Rasional : agar pasien dapat mengerti dan mengetahui penyebab nyeri sehingga dapat beradaptasi dengan nyeri tersebut.
3. Ajarkan kepada ibu melakukan relaksasi dan pengaturan napas terutama saat kontraksi.

Rasional : pada saat kontraksi uterus terjadi ketegangan yang hebat ketegangan ini akan berkurang dengan adanya pengaturan napas terutama pada saat pengeluaran napas melalui mulut bukan melalui hidung.

4. Anjurkan ibu untuk berbaring dalam posisi miring ke kiri.

Rasional : miring ke kiri dapat mencegah penekanan pada vena kava inferior yang dapat menyebabkan aliran darah terhambat sehingga berbaring miring ke kiri aliran darah dan oksigenasi ke janin lancar

5. Beri hidrasi ibu dengan air putih.

Rasional : dengan pemberian hidrasi oral akan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga tidak terjadi dehidrasi dan kelelahan serta pemakaian cadangan kalori yang berlebihan.

6. Observasi tekanan darah dan suhu setiap 4 jam atau jika ada indikasi dan nadi setiap 30 menit.

Rasional : untuk menilai keadaan ibu

7. Observasi DJJ setiap 30 menit

Rasional : untuk menilai keadaan janin

8. Observasi kemajuan persalinan

Rasional : his dipantau setiap 30 menit, lakukan pemeriksaan dalam setiap 4 jam atau jika ada indikasi

9. Bersihkan vulva dengan kapas savlon/DTT sebelum melakukan pemeriksaan dalam untuk mencegah terjadinya infeksi

Rasional : membersihkan vulva dengan kapas savlon/DTT sebelum memalkukan pemeriksaan dalam untuk mencegah masuknya kuman ke jalan lahir yang dapat menyebabkan infeksi.

10. Anjurkan kepada ibu untuk mengganti sarung jika kotor

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi

11. Berikan support kepada ibu

Rasional : memberi dukungan kepada ibu agar semangat dan optimis menghadapi persalinan.

12. Dokumentasikan hasil pemanauan kala I pada partograf

Rasional : pemantauan dengan partograf merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan membantu menilai kemajuan persalinan dan pembukaan, keadaan ibu dan janin, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rancangan tindakan selanjutnya.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Implementasi tanggal 02 Mei 2017

1. Melakukan pemasangan kateter tetap.
2. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri yang dirasakan oleh ibu yaitu karena tertekannya ujung-ujung saraf sewaktu uterus (*corpus*) berkontraksi dan tegangnya segmen bawah rahim.

3. Mengajarkan pada ibu cara relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi yaitu dengan menarik napas panjang melalui hidung dan mengembuskannya melalui mulut.
4. Menganjurkan ibu untuk miring ke kiri
5. Memberikan hidrasi air putih ± 250 cc
6. Mengobservasi tekanan darah, suhu dan pembukaan setiap 4 jam atau jika ada indikasi dan observasi nadi, DJJ, dan his (selama 10 menit) setiap 30 menit

Tabel 3.2. Pemantauan Kala I Fase aktif

Jam (WITA)	TD	Nadi	Suhu	DJJ	HIS	Durasi (detik)	Hidrasi	Eliminasi
03.00	130/90	80x/i	36,6 ⁰ C	136/130x/i	3x10	35-40	± 250 cc	
03.30		86x/i		138/132x/i	4x10	40-45		
04.00	130/100	82x/i	36,8 ⁰ C	140/136x/i	5x10	50-55	± 50 cc	± 100 cc

7. Melakukan VT jam 04.06 WITA
 - a. Vulva/vagina: tidak ada kelainan
 - b. Porsio : melesap
 - c. Pembukaan : lengkap 10 cm
 - d. Ketuban : pecah jernih jam 04.04 WITA
 - e. Presentasi : UUK di bawah simfisis
 - f. Penurunan : hodge IV

- g. Penyusupan : 0
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban
8. Menganjurkan ibu mengganti sarungnya yang kotor.
 9. Memberi support kepada ibu.
 10. Melakukan pendokumentasian kala I pada partograf.

LANGKAH VII : EVALUASI

- a. Kala I berlangsung normal ditandai dengan his yang adekuat 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik detik
- b. Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri.
- c. Fase aktif aktif berlangsung selama 1 jam 40 menit.
- d. Keadaan ibu baik, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital:
 - TD : 130/ 100 mmHg, P : 20 kali permenit
 - N : 82 kali permenit S : 36,8⁰C
- e. Keadaan janin baik dengan denyut jantung janin dalam batas normal
 - F1 : 140 kali permenit
 - F2 : 136 kali permenit

KALA II

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data Subjektif :

- a. Ibu mengatakan sakit semakin kuat.
- b. Ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran.
- c. Ibu mengatakan adanya tekanan pada anus dan rasa ingin BAB
- d. Ibu mengatakan adanya pelepasan lendir dan darah

Data Objektif :

- a. His 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik.
- b. Perineum menonjol
- c. Vulva dan anus membuka.
- d. DJJ terdengar pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 kali permenit dan kuadran kiri atas dengan frekuensi 128 kali permenit.
- e. VT tanggal 02 Mei 2017, jam 04. 06 WITA

Vulva vagina : tidak ada kelainan

Porsio : melesap

Pembukaan : lengkap 10 cm

Ketuban : pecah jernih jam 04.04 WITA

Presentasi : UUK di bawah simfisis

Penurunan : hodge IV

Penyusupan : 0
 Penumbungan : tidak ada
 Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

LANGKAH III : MENETAPKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : perlangsungan kala II

Data Subjektif :

- a. Ibu mengatakan rasa sakit bertambah kuat
- b. Ibu mempunyai keinginan kuat untuk meneran
- c. Ibu mengatakan adanya tekanan kuat pada anus dan rasa ingin BAB

Data Objektif :

- a. His 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik.
- b. Perineum menonjol
- c. Vulva dan anus membuka.
- d. DJJ terdengar pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 kali permenit dan kuadran kiri atas dengan frekuensi 128 kali permenit.
- e. VT tanggal 02 Mei 2017, jam 04.06 WITA

Vulva vagina : tidak ada kelainan

Porsio : melesap

Pembukaan : lengkap 10 cm

Ketuban : pecah jernih jam 04.04 WITA

Presentasi : UUK di bawah simfisis
 Penurunan : hodge IV
 Penyusupan : 0
 Penumbungan : tidak ada
 Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

Analisa dan interpretasi data :

- a. Pada waktu bagian terendah janin sampai pada dasar panggul timbul satu refleks yang mengakibatkan otot diafragma tertekan ke bawah sehingga timbullah tekanan untuk meneran.
- b. Penekanan pada rektum memberikan tekanan dan rangsangan pada ibu untuk BAB dan rasa ingin meneran.
- c. DJJ antara 120-160 kali permenit menandakan janin dalam keadaan baik.
- d. Dengan adanya his yang adekuat mengakibatkan Segmen Atas Rahim (SAR) berkontraksi mendorong janin turun ke Segmen Bawah Rahim (SBR), segmen bawah tertarik ke atas menjadi dilatasi relaksasi sehingga membuat suatu saluran jalan lahir.

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Partus macet dan BBLR (Berat badan Lahir Rendah)

Data Subjektif : ibu mengatakan jarak kehamilan sebelumnya dengan kehamilan sekarang adalah \pm 8 bulan.

Data Objektif : Hasil pemeriksaan abdomen menunjukkan bahwa ibu sedang hamil kembar/ganda

Analisa dan interpretasi data

- a. BBLR adalah salah satu dari kebanyakan permasalahan dengan kelahiran kembar. Dengan memberikan nutrisi makanan yang cukup dan sehat dengan diet yang seimbang akan membantu menurunkan kemungkinan komplikasi. Pada kehamilan kembar diperlukan tambahan 300-500 kalori per hari. Jika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi maka resiko kejadian BBLR lebih tinggi.
- b. Salah satu faktor resiko BBLR adalah faktor ibu yaitu jarak kehamilan yang terlalu dekat dari persalinan sebelumnya

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/*EMERGENCY*

Dilakukan tindakan segera yaitu merawat bayi dalam inkubator

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa aktual : perlangsungan kala II

Tujuan : kala II berlangsung normal

Kriteria :

- a. Kala II berlangsung tidak lebih dari 1-2 jam
- b. Bayi lahir dalam waktu 30 menit, napas spontan dan langsung menangis.

- c. Keadaan umum ibu baik dan kesadaran komposmentis.
- d. Jumlah darah tidak lebih dari 500 cc
- e. Ibu langsung menyusui bayinya

Intervensi

Tanggal 02 Mei 2017

1. Lihat tanda dan gejala kala II yaitu, dorongan kuat untuk mendedan, adanya tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan anus membuka
Rasional : dapat mengetahui apakah sudah dapat memimpin persalinan
2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
Rasional : untuk mempersiapkan peralatan siap pakai saat pembukaan telah lengkap.
3. Pakai celemek
Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya dapat mencegah terjadinya infeksi silang.
4. Pastikan lengan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir lalu keringkan.
Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.
5. Pakai sarung tangan steril pada satu tangan
Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.
6. Isi spoit dengan oksitosin 10 unit dengan satu tangan
Rasional : menyiapkan peralatan siap pakai

7. Bersihkan vulva sampai ke perineum
Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi
8. Lakukan pemeriksaan dalam
Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan
9. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin 0,5% kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit
Rasional : untuk mencegah infeksi
10. Dengar denyut jantung janin setelah kontraksi uterus
Rasional : untuk mengetahui keadaan janin.
11. Beritahu ibu bahwa pembukaan telah lengkap dan keadaan ibu serta janin baik
Rasional : agar ibu tidak khawatir dengan keadaan janinnya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan.
12. Minta bantuan keluarga untuk membantu menyiapkan posisi ibu untuk meneran
Rasional : dapat membantu proses persalinan.
13. Pimpinlah ibu meneran saat ada his.
Rasional : memperlancar berlangsungnya proses persalinan.
14. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman.
Rasional : dapat membantu dalam proses persalinan.
15. Pasang handuk yang bersih di atas perut ibu saat kepala janin terlihat di vulva dengan diameter 5-6 cm.
16. Letakkan duk 1/3 bagian atau gunakan *underpad* di bawah bokong ibu
Rasional : sebagai alat untuk menyokong bayi

17. Buka bak partus

Rasional : menyiapkan alat dalam keadaan siap pakai.

18. Pakai sarung tangan pada kedua tangan.

Rasional : untuk mencegah infeksi silang.

19. Pimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala.

Rasional : dengan menyokong perineum dapat mengurangi dan mencegah ruptur perineum.

20. Periksa adanya lilitan tali pusat.

Rasional : lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin.

21. Tunggu hingga kepala melakukan putaran paksi luar

Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi dalam.

22. Letakkan tangan secara biparietal tarik secara hati-hati ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior.

Rasional : membantu pengeluaran bahu agar tidak terjadi robekan perineum.

23. Lahirkan badan bayi dengan sangah susur.

Rasional : dengan sangah susur mencegah rupture perineum dan trauma pada bayi.

24. Telusuri punggung, bokong, dan tungkai

Rasional : mengendalikan pengeluaran bayi.

25. Nilai bayi dan letakkan di atas perut ibu dengan posisi kepala lebih rendah dari tubuhnya.

Rasional : dengan posisi tersebut memudahkan bayi untuk bernapas.

26. Bersihkan dan keringkan badan bayi.

Rasional : mencegah bayi tidak hipotermi.

27. Periksa fundus uteri

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Implementasi tanggal 02 Mei 2017

1. Melihat tanda dan gejala kala II
2. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
 - a. Partus set : Klem kelly/kocher buah, 2 klem tali pusat, ½ kocher, *Handscoon* steril, 1 buah gunting tali pusat, 1 gunting episiotomi, Kateter nelaton, dan Kassa secukupnya.
 - b. *Hecting set* : Pinset anatomi dan pinset serurgi, neal pooder, jarum, benang catgut, dan gunting benang.
 - c. Alat pelindung diri (APD) : Penutup kepala/Duk, kacamata, masker, celemek plastik, sepatu boot.
 - d. Alat dan bahan lain : Spoit 1 dan 3 cc, larutan klorin dan air DTT dalam wadahnya, bengkok, *underpad*, kain dan handuk bersih, pakaian ibu dan bayi, waslap.
3. Memakai celemek yang bersih dan kering

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir.
5. Memakai sarung tangan steril.
6. Mengisi spuit 3 cc dengan oksitosin 1 ampul/10 unit dengan satu tangan.
7. Membersihkan vulva sampai perineum.
8. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 02-05-2017, jam 04.06 WITA

Hasil:

- a. Vulva-vagina : tidak ada kelainan
 - b. Porsio : melesap
 - c. Pembukaan : lengkap 10 cm
 - d. Ketuban : pecah jernih
 - e. Presentasi : uuk di bawah simfisis
 - f. Penurunan : hodge iv
 - g. Penyusupan : o
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban
9. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin 0,5% kemudian rendam selama 10 menit.
 10. Mendengar DJJ setelah kontraksi.
Hasil : 130/128 kali permenit.
 11. Memberitahu ibu bahwa pembukaan telah lengkap dan keadaan janin baik.

12. Meminta bantuan keluarga untuk membantu ibu menyiapkan posisi ibu untuk meneran.
13. Memimpin ibu meneran saat ada his.
14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman.
15. Memasang handuk yang bersih di atas perut ibu pada saat kepala janin telah terlihat di vulva dengan diameter 5-6 cm.
16. Meletakkan kain yang dilipat 1/3 bagian atau gunakan *underped* di bawah bokong ibu.
17. Membuka bak partus.
18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.
19. Memimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala.
20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat.
21. Menunggu kepala melakukan putaran paksi luar.
22. Meletakkan tangan secara biparietal, arahkan kepala ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior.
23. Melahirkan kepala, leher, dan bahu dengan sanggah susur.
24. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai ditungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk dan jari tengah diantara kedua tungkai.

Hasil : bayi lahir pertama spontan tanggal 02 Mei 2017 jam 04.15 WITA dengan jenis kelamin perempuan.

25. Melakukan penilaian pada bayi

Hasil :

Tabel 3.3. Penilaian APGAR Skor bayi pertama

Penilaian	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Skor		Total
<i>Appearance</i>	Pucat	Tubuh kemerahan ekstremitas biru	Seluruh tubuh merah	2	2	8/10
<i>Pulse</i>	Tidak ada	< 100x/i	> 100x/i	1	2	
<i>Grimace</i>	Tidak ada	Meringis lemah	Batuk bersin	1	2	
<i>Activity</i>	Tidak ada	Sedikit gerakan	Gerakan aktif	2	2	
<i>Respiration</i>	Tidak ada	Lemah tidak teratur	Menangis kuat	2	2	

26. Mengeringkan dan membungkus bayi

27. Menjepit tali pusat kira-kira 3 cm dari pusat, mendorong isi tali pusat ke arah ibu lalu klem kembali pada 2 cm setelah klem pertama, lalu lakukan pemotongan diantara kedua klem.

28. Memeriksa fundus uteri untuk memastikan bahwa ibu hamil tunggal atau ganda.

Hasil : ibu hamil ganda

29. Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bagian presentasi dan penurunan janin.

Hasil :

a. Ketuban : pecah jernih jam 04.17 WITA

- b. Presentasi : UUK depan
- c. Penurunan : hodge IV
- d. Penyusupan : o
- e. Penumbungan : tidak ada

30. Memantau DJJ untuk memastikan kondisi janin kedua baik.

Hasil : DJJ normal dengan frekuensi 132 kali permenit.

31. Melakukan pimpinan meneran saat ada kontraksi dan mengulangi langkah 19 sampai langkah 24 untuk membantu melahirkan bayi kedua.

Hasil : setelah dipimpin meneran selama 15 menit bayi kedua lahir spontan tanggal 02 Mei 2017, jam 04.30 wita dengan jenis kelamin perempuan

32. Lakukan penilaian sepintas

Hasil : penilaian APGAR *score* sesaat sesaat setelah bayi lahir dan 5 menit setelah lahir.

Tabel 3.4. Penilaian APGAR skor bayi kedua

Penilaian	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Skor		Total
<i>Appearance</i>	Pucat	Tubuh kemerahan ektremitas biru	Seluruh tubuh merah	1	2	8/10
<i>Pulse</i>	Tidak ada	< 100 kali permenit	> 100 kali permenit	2	2	
<i>Grimace</i>	Tidak ada	Meringis lemah	Batuk bersin	1	2	
<i>Activity</i>	Tidak ada	Sedikit gerakan	Gerakan aktif	2	2	
<i>Respiration</i>	Tidak ada	Lemah tidak teratur	Menangis kuat	2	2	

33. Membersihkan dan mengeringkan bayi mulai dari wajah, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks.
34. Menjepit tali pusat kira-kira 3 cm dari pusat, mendorong isi tali pusat ke arah ibu lalu klem kembali pada 2 cm setelah klem pertama, lalu lakukan pemotongan diantara kedua klem.

LANGKAH VII : EVALUASI

Diagnosa : Perlangungan kala II

Evaluasi tanggal 02 Mei 2017

1. Kala II berlangsung selama 24 menit (kelahiran bayi pertama 9 menit kelahiran bayi kedua 15 menit).
2. Bayi pertama lahir spontan tanggal 02 Mei 2017 jam 04.15 WITA dengan jenis kelamin perempuan dan langsung menangis. Bayi kedua lahir tanggal 02 Mei 2017 jam 04.30 WITA dengan jenis kelamin perempuan dan langsung menangis.
3. Keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis.
4. Perdarahan ± 150 cc
5. Ibu tidak menyusui bayinya karena bayi langsung dipindahkan ke ruang perawatan bayi.

KALA III

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data Subjektif :

- a. Ibu mengatakan merasakan nyeri perut
- b. Ibu mengatakan bahagia dengan kelahiran bayinya.

Data Objektif :

- a. Bayi pertama lahir spontan tanggal 02 Mei 2017 jam 04.15 WITA dengan jenis kelamin perempuan. Bayi kedua lahir tanggal 02 Mei 2017 jam 04.30 WITA dengan jenis kelamin perempuan.
- b. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
- c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.
- d. Perdarahan \pm 150 cc
- e. Plasenta belum terlepas.

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Perlangsungan kala III

Data Subjektif : Ibu mengatakan merasakan nyeri perut

Data Objektif :

- a. Bayi pertama lahir spontan tanggal 02 Mei 2017 jam 04.15 WITA dengan jenis kelamin perempuan. Bayi kedua lahir tanggal 02 Mei 2017 jam 04.30 WITA dengan jenis kelamin perempuan.
- b. Kontraksi uterus baik.
- c. TFU setinggi pusat.

Analisa dan interpretasi data

- a. Kala III dimulai sejak lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta.
- b. Pada kala III volume uterus sudah berkurang. TFU teraba setinggi pusat. Pada saat itu uterus berkontraksi memperkecil kavum uteri sehingga terasa sakit dan teraba keras dan bundar.

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya atonia uteri dan rest plasenta.

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada indikasi untuk dilakukannya tindakan segera/emergency

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala III

Tujuan : kala III berlangsung normal.

Kriteria :

1. Perdarahan tidak lebih dari 500 cc.
2. Lama kala III \leq 30 menit.
3. Plasenta dan selaput lahir lengkap.
4. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.

Intervensi tanggal 02 Mei 2017

35. Beritahu ibu bahwa dia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik.

Rasional : agar ibu mengetahui tindakan yang akan dilakukan.

36. Menyuntik oksitosin

Rasional : agar membantu kontraksi uterus

37. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva jika tali pusat bertambah panjang.

Rasional : proses peregang tali pusat terkendali

38. Letakkan tangan kiri di atas simfisis untuk mendeteksi lepasnya plasenta dan tangan kanan memegang klem pada tali pusat.

Rasional : proses peregang tali pusat terkendali.

39. Regangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso kranial.

Rasional : untuk memudahkan plasenta lepas dari tempat implantasinya.

40. Tetap melakukan peregangan tali pusat dan dorso kranial hingga plasenta lepas ke atas dan kebawah mengikuti poros jalan lahir.

Rasional : dengan merengangkan tali pusat ke atas dan ke bawah memudahkan plasenta keluar sesuai poros jalan lahir hingga tampak di vulva.

41. Saat plasenta terlihat di introitus vagina jemput plasenta dengan kedua tangan lalu putar dan lahirkan plasenta searah dengan jarum jam.

Rasional : agar plasenta dan selaput lahir lengkap.

42. Lakukan masase uterus.

Rasional : masase akan merangsang kontraksi uterus

43. Periksa kedua sisi plasenta dan pastikan plasenta lahir dengan kotiledon dan selaput lengkap.

Rasional : adanya sisa plasenta dapat menyebabkan perdarahan.

LANGKAH IV : IMPLEMENTASI

Tanggal 02 Mei 2017

35. Memberitahu ibu bahwa dia akan disuntik.
36. Menyuntik oksitosin 10 IU.
37. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjaran 5-10 cm dari vulva.
Meletakkan tangan kiri di atas simfisis untuk mendeteksi lepasnya plasenta dan tangan kanan meregangkan tali pusat.
38. Letakkan satu tangan di atas perut ibu, satu tangan merengangkan tali pusat.

39. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso kranial.
40. Mengarahkan tali pusat ke atas dan ke bawah.
41. Menjemput plasenta dengan kedua tangan lalu putar dan lahirkan plasenta searah jarum jam.

Hasil : plasenta lahir tanggal 02 Mei 2017, jam 04.35 WITA (1 plasenta)

42. Melakukan masase uterus secara sirkuler.
43. Memeriksa apakah plasenta dan selaput lahir lengkap.

Hasil : plasenta lahir dengan kotiledon dan selaput kesan lengkap (1 plasenta).

LANGKAH VII : EVALUASI

1. Kala II berlangsung normal.
2. Perdarahan ± 100 cc.
3. Kala III berlangsung selama 5 menit.
4. Plasenta dan selaput lahir lengkap.
5. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bulat, TFU 1 jari di bawah pusat.

KALA IV

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data Subjektif :

1. Ibu mengatakan lelah setelah persalinan.
2. Ibu merasakan nyeri perut bagian bawah.

Data Objektif :

1. Kala III berlangsung selama 5 menit.
2. Plasenta lahir tanggal 02 Mei 2017, jam 04.35 WITA.
3. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bulat.
4. TFU 1 jari di bawah pusat.
5. Perdarahan ± 100 cc.
6. Tanda-tanda vital : TD : 110/90 mmHg P : 20 kali permenit
N : 80 kali permenit S : 36,5⁰C

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : perlangsungan kala IV

Data Subjektif : ibu mengatakan lelah setelah persalinan.

Data Objektif :

1. Kala III berlangsung selama 5 menit.
2. Plasenta lahir tanggal 02 Mei 2017, jam 04.35 WITA.
3. Tanda-tanda vital : TD : 110/90 mmHg P : 20 kali permenit
N : 80 kali permenit S : 36,5⁰C

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya atonia uteri dan perdarahan.

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/*EMERGENCY*

Tidak ada indikasi untuk dilakukannya tindakan segera/*emergency*.

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa : perlangsungan kala IV

Tujuan : kala IV berlangsung normal.

Kriteria :

- a. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bulat.
- b. Tidak terjadi perdarahan abnormal.
- c. Keadaan ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal

TD : 90/60-130/90 mmHg P : 16-24 kali permenit

N : 60-88 kali permenit S : 36,5-37,5°C

- d. Keadaan janin baik ditandai dengan pernapasan dan suhu tubuh normal

P : 40-60 kali permenit

S : 36,5-37,5°C

Intervensi tanggal 02 Mei 2017

44. Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum.

Rasional : laserasi pada jalan lahir dapat menyebabkan perdarahan.

45. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik.

Rasional : uterus yang berkontraksi dengan baik menandakan kala IV berlangsung normal.

46. Biarkan bayi di atas perut ibu selama 1 jam

Rasional : menjalin kasih sayang ibu dengan bayinya.

47. Setelah 1 jam lakukan pengukuran atau pemeriksaan pada bayi, beri salf mata antibiotik profilaksis dan suntikkan vitamin K1 di paha kiri anterolateral secara IM.

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi lahir normal atau tidak

48. Setelah 1 jam pemberian Vit K1, berikan suntikan Hb 0 di paha kanan anterolateral secara IM.

Rasional : memberikan antibodi

49. Melakukan pemantauan kontraksi uterus

Rasional : untuk memastikan kontraksi uterus baik dan tidak terjadi perdarahan

50. Ajarkan ibu dan keluarga masase uterus.

Rasional : memantau kontraksi uterus

51. Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah

Rasional : untuk memastikan tidak terjadi perdarahan abnormal (lebih dari 400cc)

52. Memantau TD dan suhu setiap jam pada dua jam pertama setelah persalinan dan observasi nadi, TFU, dan kandung kemih setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua setelah persalinan.

Rasional : untuk memastikan kondisi ibu baik atau tidak.

53. Nilai pernapasan dan suhu tubuh bayi.

Rasional : untuk menilai keadaan umum bayi.

54. Rendam alat dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.

Rasional : untuk mencegah infeksi silang.

55. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi.

Rasional : mencegah infeksi silang.

56. Bersihkan ibu dari sisa lendir, darah dan air ketuban.

Rasional : memberi rasa nyaman pada ibu dan mencegah terjadinya infeksi.

57. Pastikan ibu merasa nyaman, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum.

Rasional : dengan makan dan minum dapat memulihkan tenaga ibu yang telah terkuras selama persalinan sehingga stamina ibu tetap terjaga.

58. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin

Rasional : mencegah infeksi silang.

59. Bersihkan sarung tangan dan rendam ke dalam larutan klorin secara terbalik

Rasional : mencegah infeksi silang.

60. Cuci kedua tangan dengan sabun di bawah air mengalir.

Rasional : dengan mencuci tangan merupakan dekontaminasi agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri.

61. Melengkapi partograf.

Rasional : untuk memastikan semua tindakan telah di dokumentasikan

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 02 Mei 2017

44. Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum.

Hasil : terjadi laserasi pada vagina dan perineum derajat II, dan dilakukan penjahitan dengan tekhnik jelujur dan subkutis menggunakan anastesi.

45. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik.

46. Biarkan bayi di atas perut ibu selama 1 jam.

Hasil : bayi tidak kontak kulit

47. Setelah 1 jam lakukan pengukuran atau pemeriksaan pada bayi, beri salf mata antibiotik profilaksis dan suntikkan vitamin K1 di paha kiri anterolateral secara IM.

Hasil :

a. Bayi pertama

1) Penimbangan/ pengukuran antropometri

a) Berat badan : 2085 gram

b) Panjang badan : 43 cm

c) Lingkar kepala : 28 cm

d) Lingkar dada : 29

e) Lingkar perut : 26 cm

f) LILA : 8 cm

2) TTV

- a) *Heart rate* (HR) : 128 kali permenit
- b) Pernapasan : 49 kali permenit
- c) Suhu : 36,6⁰C

b. Bayi kedua

1) Penimbangan/pengukuran antropometri

- a) Berat badan : 2.010 gram
- b) Panjang badan : 41 cm
- c) Lingkar kepala : 27 cm
- d) Lingkar dada : 29 cm
- e) Lingkar perut : 26
- f) LILA : 9 cm

2) TTV

- a) *Heart Rate* (HR) : 130 kali permenit
- b) Pernapasan : 45 kali permenit
- c) Suhu : 36,7⁰C

48. Setelah 1 jam pemberian vit K1, berikan suntikan Hb 0 di paha kanan anterolateral secara IM.

49. Melakukan pemantauan kontraksi uterus.

Hasil :

Tabel 3.5. kontraksi uterus pada dua jam pertama setelah melahirkan

Jam Ke	Jam (WITA)	Kontraksi uterus
Pertama	04. 50	Baik
	05. 05	Baik
	05. 20	Baik
	05. 35	Baik
Kedua	06. 05	Baik
	06.35	Baik

50. Ajarkan ibu dan keluarga masase uterus.

51. Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah

Hasil : jumlah kehilangan darah \pm 250 cc

52. Memantau TD dan suhu setiap jam pada 2 jam pertama pasca persalinan, observasi nadi, TFU dan kandung kemih setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Evaluasi jumlah perdarahan

Hasil :

Tabel 3.6. Pemantauan Kala IV

Jam Ke	Jam (WITA)	TD	Nadi	Suhu	TFU	VU	perdarahan
Pertama	04. 50	110/90	80x/i	36,5 ⁰ C	1 jrbpst	Kosong	± 250 cc
	05. 05	110/80	82x/i		1 jrbpst	Kosong	
	05. 20	110/90	78x/i		1 jrbpst	Kosong	
	05. 35	110/90	76x/i		1 jrbpst	Kosong	
Kedua	06. 05	110/80	80x/i	36,6 ⁰ C	1 jrbpst	Kosong	± 30 cc
	06. 35	110/90	72x/i		1 jrbpst	Kosong	

53. Menilai pernapasan dan suhu bayi

Hasil :

a. Bayi pertama : Pernapasan : 48 kali permenit

Suhu : 36,7⁰C

b. Bayi kedua : pernapasan : 50 kali permenit

Suhu : 36,6⁰C

54. Rendam alat bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.

55. Buang bahan-bahan terkontaminasi ke dalam tempat sampah sesuai.

56. Bersihkan ibu dengan air DTT.

57. Pastikan ibu merasa nyaman, minta keluarga untuk memberikan ibu makan dan minum.

58. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%.
59. Celupkan *handscoon* kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, membukanya secara terbalik dan rendam selama 10 menit.
60. Cuci kedua tangan dengan sabun di bawah air mengalir lalu keringkan.
61. Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang).

LANGKAH VII : EVALUASI

1. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bulat, TFU 1 jari di bawah pusat.
2. Jumlah perdarahan total ± 270 cc
3. Keadaan ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital normal
TD : 110/80 mmHg P : 15 kali permenit
N : 72 kali permenit S : 36,6⁰C
4. Keadaan bayi baik, pernapasan : 48x/i, suhu tubuh bayi : 36,7⁰C.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
PADA NY “S” DENGAN PERSALINAN *GEMELLI*
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 01-02 MEI 2017**

No. Register : 467xxx
 Tanggal Masuk : 01 Mei 2017, jam 22.00 WITA
 Tanggal Pengkajian : 01 Mei 2017, jam 22. 10 WITA
 Tanggal Partus : 02 Mei 2017, jam 04.15 WITA
 Nama Pengkaji : Sri Nur Fitriwati

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “ S “ / Tn “ I “
 Umur : 29 Tahun / 34 Tahun
 Nikah/Lamanya : 1 X / ± 12 Tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMA / SMP
 Pekerjaan : IRT / Supir
 Alamat : Manyampa, Pallangga

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengeluh merasakan nyeri perut tembus belakang mulai tanggal 02 Mei 2017 jam 02.00 disertai pelepasan lendir dan darah mulai tanggal 02 Mei 2017, jam 02.40 WITA.
2. Sifat nyeri hilang timbul dan semakin lama semakin terasa sakit.
3. Kehamilan ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran.
4. HPHT tanggal 28-7-2016.
5. Tidak pernah merasakan nyeri perut hebat selama hamil.
6. Ibu merasakan pergerakan janin sejak usia kehamilan ± 4 bulan sampai sekarang dan terasa pada bagian kanan dan kiri perut ibu.
7. Memeriksa kehamilan sebanyak 9 kali di RSUD Syekh Yusuf
8. Ibu mendapat suntik TT sebanyak 2 kali di RSUD Syekh Yusuf tanggal 02-04-2017
9. Ibu pernah dirawat opname di RSUD Syekh Yusuf selama 1 minggu karena demam berdarah. Tidak ada riwayat penyakit menular seksual dan alergi obat-obatan.
10. Ada riwayat keluarga menderita hipertensi, asma, kista ovarium.
11. Ada riwayat keluarga kembar.

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HTP tanggal 05-05-2017

4. Pemeriksaan tanda-tanda vital

5) Tekanan darah : 130/90 mmHg

6) Nadi : 80 kali permenit

7) Pernapasan : 20 kali permenit

8) Suhu : 36,6⁰C

5. Mata : konjungtiva tidak pucat *sclera* tidak ikterus, kelopak mata tidak oedema.

6. Wajah : tidak pucat dan tidak oedema.

7. Leher : tidak ada pembesaran *vena jugularis*, kelenjar tiroid, dan kelenjar limfe, pergerakan baik.

8. Payudara : puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada areola mammae, tidak ada massa dan nyeri tekan, ada pengeluaran ASI saat ditekan.

9. Abdomen :

a. Tampak *striae albicans* dan *linea nigra*, pembesaran perut melebihi usia kehamilan, tidak ada bekas operasi.

b. Tidak ada nyeri tekan

c. Leopold I : TFU 2 jari di bawah *Processus Xipioideus (PX)* 36 cm,
teraba dua bokong

Leopold II : PUKA-PUKI (Punggung Kanan-Punggung Kiri)

Leopold III : dua Kepala

Leopold IV : BDP, 2/5

- d. Lingkar panggul : 94 cm
- e. TBJ : 3.384 gram
- f. His : 3 kali dalam 10 menit dengan frekuensi 35-40 detik.
- g. DJJ
- FI : terdengar jelas pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136x/i teratur.
- FII : terdengar jelas pada kadran kiri atas perut ibu dengan frekuensi 130x/i teratur.
- h. Genitalia : tidak ada varises dan tidak oedema
- Hasil pemeriksaan dalam atau VT (*vaginal tousche*) tanggal 02-05 - 2017, jam 03. 10 WITA
- 11) Vulva-vagina: tidak ada kelainan
- 12) Porsio : melelap
- 13) Pembukaan : 9 cm
- 14) Ketuban : utuh
- 15) Presentasi : ubun-ubun kecil (UUK) kanan depan
- 16) Penurunan : hodge III
- 17) Penyusupan : o
- 18) Penumbungan : tidak ada
- 19) Kesan panggul : normal
- 20) Pelepasan : lendir dan darah

- i. Ekstremitas : tidak ada varises, pergerakan baik, terpasang infus pada tangan kiri (cairan RL), tidak oedema.

C. Assessment (A)

G III P I A O, gestasi 39 minggu 6 hari, situs memanjang, intra uterin, *gemelli*, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase aktif.

D. Planning (P)

Tanggal 02 Mei 2017, jam 02.15 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri yang dirasakan oleh ibu yaitu karena tertekannya ujung-ujung saraf sewaktu uterus (*corpus*) berkontraksi dan tegangnya segmen bawah rahim.

Hasil : ibu mengerti

2. Mengajarkan pada ibu cara relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi yaitu dengan menarik napas panjang melalui hidung dan mengembuskannya melalui mulut.

Hasil : ibu melakukan tehnik relaksasi yang diajarkan.

3. Menganjurkan ibu untuk miring ke kiri.

Hasil : ibu bersedia miring ke kiri.

4. Memberikan hidrasi air putih kepada ibu.

Hasil : ibu minum dibantu oleh keluarga.

5. Mengobservasi tekanan darah, suhu dan pembukaan setiap 4 jam atau jika ada indikasi dan observasi nadi, DJJ, dan his (selama 10 menit) setiap 30 menit.

Hasil :

Tabel 3.2. Pemantauan Kala I Fase aktif

Jam (WITA)	TD	Nadi	Suhu	DJJ	HIS	Durasi (detik)	Hidrasi	Eliminasi
03.00	130/90	80x/i	36,6 ⁰ C	136/130x/i	3x10	35-40	± 250 cc	
03.30		86x/i		138/132x/i	4x10	40-45		
04.00	130/100	82x/i	36,8 ⁰ C	140/136x/i	5x10	50-55	± 50 cc	± 100 cc

Melakukan VT jam 04.06 WITA

- a. Vulva/vagina : tidak ada kelainan
- b. Porsio : melesap
- c. Pembukaan : lengkap 10 cm
- d. Ketuban : pecah jernih jam 04.04 WITA
- e. Presentasi : UUK di bawah simfisis
- f. Penurunan : hodge IV
- g. Penyusupan : 0
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- k. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

6. Menganjurkan ibu mengganti sarungnya yang kotor

7. Memberi support kepada ibu agar tidak khawatir menghadapi persalinan.

Hasil : ibu tampak lebih tenang.

8. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan

- a. Partus set : Klem Kelly/Kocher buah, 2 klem tali pusat, $\frac{1}{2}$ Kocher, *Handscoon* steril, 1 buah gunting tali pusat, 1 gunting episiotomi, Kateter nelaton, dan Kassa secukupnya.
- b. *Hecting set* : Pinset anatomi dan pinset serurgi, *needle holder*, jarum, benang catgut, dan gunting benang.
- c. Alat pelindung diri (APD) : Penutup kepala/Duk, kaca mata, masker, celemek plastik, sepatu boot.
- d. Alat dan bahan lain : Spoit 1 dan 3 cc, larutan klorin dan air DTT dalam wadahnya, nearbeken, uanderped, kain dan handuk bersih, pakaian ibu dan bayi, waslap.

Mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan spoit 3 cc ke dalam bak partus.

Hasil : alat dan bahan telah disiapkan.

9. Melakukan pendokumentasian kala I pada partograf.

Hasil : telah didokumentasikan.

KALA II

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan rasa sakit perut bertambah kuat
2. Ibu merasa ada tekanan pada anus perasaan ingin BAB
3. Ibu ingin meneran

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan ibu dan janin baik.
2. His 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik.
3. Perineum menonjol
4. Vulva dan anus membuka.
5. DJJ terdengar pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 140 kali permenit dan kuadran kiri atas dengan frekuensi 136 kali permenit.
6. Ketuban pecah jam 04.04 WITA.

C. Assessment (A)

Perlangsungan kala II

D. Planning (I)

1. Melihat tanda dan gejala kala II
 - a. Adanya dorongan kuat untuk meneran
 - b. Adanya tekanan pada anus
 - c. Perineum menonjol
 - d. Vulva dan anus membuka

Hasil : tampak tanda dan gejala kala II

2. Menyiapkan alat dan bahan

Hasil : alat dan bahan telah disiapkan

3. Memakai celemek yang bersih dan kering

Hasil : celemek telah dipakai

4. Melepas semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir lalu mengeringkannya dengan handuk bersih.

Hasil : telah dilakukan

5. Memakai *handscoon* steril pada satu tangan

Hasil : *handscoon* steril telah dipakai

6. Mengisap oksitosin ke dalam spoit dengan satu tangan dan meletakkannya kembali ke bak partus.

Hasil : oksitosin telah dihisap.

7. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari atas ke bawah menggunakan kapas DTT.

Hasil : vulva-perineum telah dibersihkan.

8. Dengan tehnik aseptik, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan telah lengkap.

Hasil : VT kedua tanggal 02 Mei 2017, jam 04.06 WITA

- a. Vulva/vagina : tidak ada kelainan
- b. Porsio : melesap
- c. Pembukaan : lengkap 10 cm
- d. Ketuban : pecah jernih jam 04.04 WITA
- e. Presentasi : UUK di bawah simfisis
- f. Penurunan : hodge IV
- g. Penyusupan : 0
- h. Penumbungan : tidak ada

- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

9. Dekontaminasi *handscoon* kotor ke dalam larutan klorin secara terbalik, rendam selama 10 menit.

Hasil : *handscoon* telah didekontaminasi

10. Memeriksa DJJ setelah kontraksi dan pastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120-160 kali permenit).

Hasil : F1 : 130 kali permenit

F2 : 126 kali permenit

11. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan telah lengkap dan keadaan ibu serta janin baik.

Hasil : ibu dan keluarga mengerti.

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu meneran.

Hasil : keluarga bersedia

13. Melakukan pimpinan meneran saat ada kontraksi. Anjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi dan anjurkan untuk intake cairan

Hasil : ibu dipimpin meneran. Ibu istirahat saat tidak his dan minum air.

14. Anjurkan ibu untuk miring ke kiri jika tidak ada kontraksi.

Hasil : ibu miring ke kiri.

15. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, maka letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi.

Hasil : telah dilakukan.

16. Letakkan kain bersih yang dilipat $\frac{1}{3}$ bagian atau gunakan *underped* di bawah bokong ibu.

Hasil : *underped* telah terpasang

17. Buka kembali bak partus dan pastikan kelengkapan alat dan bahan.

Hasil : alat dan bahan dalam bak partus telah lengkap.

18. Memakai *handscoon* steril pada kedua tangan.

Hasil : telah dilakukan.

19. Jika kepala bayi telah tampak dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain, tangan lain berada di pinggir atas simfisis untuk menahan agar kepala bayi tidak melakukan defleksi secara maksimal.

Hasil : kepala telah lahir

20. Periksa adanya lilitan tali pusat

a. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan longgar, maka lepaskan melalui bagian atas kepala bayi.

b. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, maka klem di dua tempat lalu potong.

Hasil : tidak ada lilitan tali pusat

21. Tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar secara spontan.

22. Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi (*biparietal*), dengan lembut, arahkan kepala bayi ke bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah *arcus pubicus*. Lalu arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang.

Hasil : kedua bahu telah lahir.

23. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke arah perienum untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah, gunakan tangan atas untuk menelusuri lengan dan siku sebelah atas.

Hasil : badan dan lengan telah lahir

24. Setelah badan dan lengan lahir, penelusuran berlanjut ke punggung, bokong dan kaki. Pegang kedua mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya.

Hasil : setelah dipimpin meneran selama 09 menit bayi lahir spontan tanggal 02 Mei 2017, jam 04.15 wita dengan jenis kelamin perempuan.

25. Melakukan penilaian sepintas

- a. Apakah bayi menangis kuat/ bernapas tanpa kesulitan?
- b. Apakah bayi bergerak aktif?
- c. Bagaimana warna kulit bayi?

Hasil : hasil penilaian APGAR score sesaat setelah lahir dan 5 menit setelah lahir.

Tabel 3.3. Penilaian APGAR Skor bayi pertama

Penilaian	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Skor		Total
<i>Appearance</i>	Pucat	Tubuh kemerahan ektremitas biru	Seluruh tubuh merah	2	2	8/10
<i>Pulse</i>	Tidak ada	< 100x/i	> 100x/i	1	2	
<i>Grimace</i>	Tidak ada	Meringis lemah	Batuk bersin	1	2	
<i>Activity</i>	Tidak ada	Sedikit gerakan	Gerakan aktif	2	2	
<i>Respiration</i>	Tidak ada	Lemah tidak teratur	Menangis kuat	2	2	

26. Membersihkan dan mengeringkan bayi mulai dari wajah, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks.

Hasil :bayi telah dibersihkan dan dikeringkan.

27. Menjepit tali pusat kira-kira 3 cm dari pusat, mendorong isi tali pusat ke arah ibu lalu klem kembali pada 2 cm setelah klem pertama, lalu lakukan pemotongan diantara kedua klem.

Hasil : tali pusat telah diklem lalu di potong. Kemudian bayi dipindahkan ke ruang perawatan bayi untuk penanganan selanjutnya.

28. Periksa kembali uterus untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bayi dalam uterus atau hamil tunggal.

Hasil : ibu hamil kembar

29. Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bagian presentasi dan penuruan janin.

Hasil :

- a. Ketuban : pecah jernih
- b. Presentasi : UUK depan
- c. Penurunan : hodge IV
- d. Penyusupan : o
- e. Penumbangan : tidak ada

30. Memantau DJJ untuk memastikan kondisi janin kedua baik.

Hasil : DJJ normal dengan frekuensi 132 kali permenit.

31. Melakukan pimpinan meneran saat ada kontraksi dan mengulangi langkah 19 sampai langkah 24 untuk membantu melahirkan bayi kedua.

Hasil : setelah dipimpin meneran selama 15 menit bayi kedua lahir spontan tanggal 02 Mei 2017, jam 04.30 wita dengan jenis kelamin perempuan

32. lakukan penilaian sepintas

Hasil : penilaian APGAR *score* sesaat sesaat setelah bayi lahir dan 5 menit setelah lahir.

Tabel 3.4. Penilaian APGAR skor bayi kedua

Penilaian	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Skor		Total
<i>Appearance</i>	Pucat	Tubuh kemerahan ekstremitas biru	Seluruh tubuh merah	1	2	8/10
<i>Pulse</i>	Tidak ada	< 100x/i	> 100x/i	2	2	
<i>Grimace</i>	Tidak ada	Meringis lemah	Batuk bersin	1	2	
<i>Activity</i>	Tidak ada	Sedikit gerakan	Gerakan aktif	2	2	
<i>Respiration</i>	Tidak ada	Lemah tidak teratur	Menangis kuat	2	2	

33. Membersihkan dan mengeringkan bayi mulai dari wajah, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks.

Hasil :bayi telah dibersihkan dan dikeringkan

34. Menjepit tali pusat kira-kira 3 cm dari pusat, mendorong isi tali pusat ke arah ibu lalu klem kembali pada 2 cm setelah klem pertama, lalu lakukan pemotongan diantara kedua klem.

Hasil : tali pusat telah diklem lalu di potong. Kemudian bayi dipindahkan ke ruang perawatan bayi untuk penanganan selanjutnya.

KALA III

M A K A S S A R

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu merasakan nyeri perut bagian bawah.
2. Ibu bahagia dengankelahiran bayinya.

B. Data Objektif (O)

1. Bayi pertama lahir spontan tanggal 02 Mei 2017 jam 04.15 WITA dengan jenis kelamin perempuan. Bayi kedua lahir tanggal 02 Mei 2017 jam 04.30 WITA dengan jenis kelamin perempuan.
2. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.
4. Perdarahan \pm 150 cc
5. Plasenta belum terlepas.

C. Assessment (A)

Perlangsungan kala III

D. Planning (P)

35. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik.

Hasil : ibu bersedia.

36. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir suntikkan oksitosin 1 ampul pada paha kanan ibu bagian distal lateral secara IM.

Hasil : oksitosin telah disuntikkan.

37. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.

Hasil : telah dilakukan.

38. Letakkan satu tangan di atas perut ibu untuk mendeteksi lepasnya plasenta.

Tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : dilakukan Peregangan Tali Pusat Terkendali (PTT).

39. Saat uterus berkontraksi regangkan tali pusat ke arah perineum sambil tangan lain mendorong uterus secara dorso kranial.

Hasil : dilakukan dorso kranial.

40. Lakukan peregangan tali pusat dan dorso kranial hingga plasenta lepas dari tempat implantasinya. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit peregangan:

- a. Beri dosis ulang oksitosin 1 ampul/ 10 IU.
- b. Nilai kandung kemih dan lakukan kateterisasi jika penuh.
- c. Jika plasenta belum lepas setelah 30 menit peregangan lakukan manual plasenta.

Hasil : plasenta lepas kurang dari 15 menit peregangan.

41. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, jemput plasenta dengan kedua tangan lalu putar hingga selaput terpinil lalu lahirkan searah jarum jam.

Hasil : setelah dilakukan PTT dan dorso kranial, plasenta lahir tanggal 02 Mei 2017 jam 04.35 (mono korionik).

42. Segera setelah plasenta lahir lakukan masase uterus hingga uterus berkontraksi.

Hasil : kontraksi uterus baik saat dilakukan masase.

43. Periksa kedua sisi plasenta dan pastikan plasenta dan selaput lahir lengkap.

Hasil : plasenta lahir dengan dua selaput dan kotiledon kesan lengkap (1 plasenta).

KALA IV

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu merasakan nyeri perut bagian bawah.
2. Ibu merasa lelah.

B. Data Objektif (O)

1. Kala III berlangsung selama 5 menit.
2. Plasenta lahir tanggal 02 Mei 2017, jam 04.35 WITA.
3. Kontraksi uteru baik teraba keras dan bulat.
4. TFU 1 jari di bawah pusat.
5. Perdarahan ±100 cc.
6. Tanda-tanda vital : TD : 110/90 mmHg P : 20 kali permenit
N : 80 kali permenit S : 36,5⁰C

C. Assessment (A)

Perlangsungan kala IV

D. Planning (P)

Tanggal 02 Mei 2017, jam 04.35 WITA

44. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum dan lakukan penjahitan jika laserasi menyebabkan perdarahan.

Hasil : terjadi laserasi pada vagina dan perineum derajat II, dan dilakukan penjahitan dengan tehknik jelujur dan subkutis menggunakan anastesi.

45. Pastikan kontraksi uterus baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam

Hasil : kontraksi uterus baik teraba keras dan bulat.

46. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit paling tidak 1 jam.

Hasil : bayi tidak kontak kulit dengan ibu.

47. Lakukan pengukuran dan pemeriksaan pada bayi. Beri salf mata dan suntikkan

Vitamin K1 1 mg di paha kiri anterolateral secara IM.

Hasil :

c. Bayi pertama

3) Penimbangan/ pengukuran antropometri

- a) Berat badan : 2085 gram
- b) Panjang badan : 43 cm
- c) Lingkar kepala : 28 cm
- d) Lingkar dada : 29
- e) Lingkar perut : 26 cm
- f) LILA : 8 cm

4) TTV

- a) *Heart rate* (HR) : 128 kali permenit
- b) Pernapasan : 49 kali permenit
- c) Suhu : 36,6⁰C

d. Bayi kedua

3) Penimbangan/pengukuran antropometri

- a) Berat badan : 2010 gram
- b) Lingkar kepala : 27 cm

c) Lingkar dada : 29 cm

d) Lingkar perut : 26

e) LILA : 9 cm

4) TTV

a) *Heart Rate* (HR) : 130 kali permenit

b) Pernapasan : 45 kali permenit

c) Suhu : 36,7⁰C

48. Setelah pemberian Vit K1, berikan suntikan Hb 0 di paha kanan secara IM.

Hasil : bayi telah diberi Hb 0

49. Lakukan pemantauan kontraksi uterus, 2-3 kali pada 15 menit pertama pasca persalinan, setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

Hasil :

Tabel 3.6. kontraksi uterus pada dua jam pertama setelah melahirkan

Jam Ke	Jam (WITA)	Kontraksi uterus
Pertama	04. 50	Baik
	05. 05	Baik
	05. 20	Baik
	05. 35	Baik
Kedua	06. 05	Baik
	06.35	Baik

50. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus.

Hasil : ibu dan keluarga mengerti cara masase uterus

51. Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.

Hasil : jumlah kehilangan darah ± 250 cc

52. Memantau tekanan darah dan suhu setiap jam pada 2 jam pertama pasca persalinan. Observasi nadi, TFU dan kandung kemih setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

Hasil :

Tabel 3.6. Pemantauan Kala IV

Jam Ke	Jam (WITA)	TD	Nadi	Suhu	TFU	VU	perdarahan
Pertama	04. 50	110/90	80x/i	36,5 ⁰ C	1 jrbpst	Kosong	± 250 cc
	05. 05	110/80	82x/i		1 jrbpst	Kosong	
	05. 20	110/90	78x/i		1 jrbpst	Kosong	
	05. 35	110/90	76x/i		1 jrbpst	Kosong	
Kedua	06. 05	110/80	80x/i	36,6 ⁰ C	1 jrbpst	Kosong	± 30 cc
	06.35	110/90	72x/i		1 jrbpst	Kosong	

53. Periksa kembali bayi dan pastikan pernapasan dan suhu tubuhnya normal

Hasil :

a. Bayi pertama : Pernapasan : 48 kali permenit

Suhu : 36,7⁰C

b. Bayi kedua : pernapasan : 50 kali permenit

Suhu : 36,6⁰C

54. Tempatkan peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5% untuk didekontaminasi selama 10 menit.

Hasil : telah dilakukan

55. Buang bahan-bahan terkontaminasi ke dalam tempat sampah sesuai.

Hasil : telah dilakukan.

56. Bersihkan ibu dari lendir, darah, dan air ketuban dengan menggunakan air DTT, bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu telah dibersihkan dan dipakaikan baju.

57. Pastikan ibu merasa nyaman, minta keluarga untuk memberikan ibu makan dan minum.

Hasil : ibu makan dan minum dibantu oleh keluarga.

58. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%.

Hasil : telah dilakukan.

59. Celupkan *handscoon* kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, membukanya secara terbalik dan rendam selama 10 menit.

Hasil : telah dilakukan.

60. Cuci kedua tangan dengan sabun di bawah air mengalir lalu keringkan.

Hasil : telah dilakukan

61. Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang)

Hasil : partograf telah dilengkapi.



BAB IV

PEMBAHASAN

BAB ini akan menguraikan tentang ada tidaknya kesenjangan antara teori dan hasil studi kasus pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “ S ” dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tanggal 01-02 Mei 2017. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi agar tindakan direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat dianalisa secara teoritis yang dimulai dari kala I hingga kala IV yang menggunakan tehnik 7 langkah varney untuk memudahkan memahami kesenjangan dan keseuaian yang terjadi pada kasus ini.

A. KALA I

Penatalaksanaan kala I identifikasi data dasar dilakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik pada ibu segera setelah masuk. Pengkajian meliputi alasan ibu datang, keluhan yang dirasakan, riwayat keluhan yang dirasakan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan lalu, riwayat kesehatan, pola pemenuhan kebutuhan dasar. Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi penilaian keadaan ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik secara tefokus. Selama kala I berlangsung dilakukan pemantauan keadaan ibu, keadaan janin (pemantauan DJJ), dan pemantauan his.

Pada kasus ini didapatkan bahwa ibu datang ke rumah sakit dengan alasan akan mendapatkan tindakan operatif sesuai anjuran dokter dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tanggal 02 Mei 2017. Usia kehamilan ibu sekarang \pm 10 bulan, dan ibu tidak memiliki keluhan apapun, termasuk ibu tidak merasakan tanda-tanda inpartu seperti nyeri perut yang hebat tembus kebelakang disertai pengeluaran lendir dan darah. Ibu mulai merasakan tanda-tanda inpartu mulai tanggal 02 Mei 2017, jam 03.00 WITA. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas lalu berlangsung normal. Ibu pernah dirawat di RSUD Syekh Yusuf pada kehamilan sekarang usia kehamilan \pm 8 bulan selama 1 minggu, Dalam keluarga ada riwayat mengalami kehamilan kembar.

Gejala-gejala positif pada kehamilan kembar adalah pada pemeriksaan abdomen teraba 2 kepala atau bokong janin, terdengar dua denyut jantung janin yang didengarkan pada waktu bersamaan oleh dua orang pemeriksa mempunyai selisih frekuensi paling sedikit 10 per menit, dan pada pemeriksaan USG menunjukkan adanya dua atau lebih tengkorak janin (Eniyati dan Sholihah, 2013: 81).

Pada studi kasus didapatkan hasil pemeriksaan abdomen teraba 2 bokong dibagian fundus uteri, 2 kepala pada bagian bawah abdomen, terdengar DJJ pada dua sisi perut ibu dengan masing-masing frekuensi 136 kali permenit dan 130 kali permenit, dan pada hasil pemeriksaan USG didapatkan dua bagian tengkorak janin. Berdasarkan tinjauan teori serta studi kasus yang didapat, dapat disimpulkan bahwa pada kala I persalinan *gemelli* Ny "S" tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus tersebut. Pada pemeriksaan dalam didapatkan tidak ada kelainan pada vulva dan

vagina, porsio lunak tipis, pembukaan 9 cm, penurunan hodge III, presentasi UUK kanan depan, tidak ada penyusupan dan penumbungan, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah.

Kala I merupakan kala pembukaan dan pemantauan, sehingga dilakukan pemantauan baik pada ibu maupun janin, pemantauan tersebut didokumentasikan pada partograf. partograf merupakan alat untuk mencatat informasi berdasarkan observasi, anamnesis dan pemeriksaan fisik ibu dalam persalinan dan sangat penting khususnya untuk membuat keputusan klinik selama kala I persalinan (Eniyati dan Putri, 2012: 47). Penggunaan partograf dalam persalinan untuk memantau kemajuan persalinan dan menentukan apakah kala I berlangsung normal atau tidak. Adapun kriteria pasien yang dapat dipantau menggunakan partograf yaitu persalinan diperkirakan spontan, Janin tunggal, usia kehamilan 36-42 minggu, presentasi kepala, tidak ada penyulit persalinan, persalinan sudah masuk dalam kala I fase aktif (Kuswanti dan Melina, 2014: 55-57).

Menurut teori di atas, pasien tidak dipantau menggunakan partograf jika hamil kembar. Namun pada studi kasus ini pasien tetap dipantau menggunakan partograf karena telah memasuki kala I fase aktif, presentasi kedua janin kepala, usia kehamilan aterm, dan tidak ada penyulit persalinan. Penggunaan partograf pada kasus ini bertujuan untuk memantau kondisi ibu dan janin (janin pertama dan kedua) dan memastikan tidak terjadi kelainan maupun komplikasi selama persalinan berlangsung. Adapun cara pengisian partograf yaitu dengan menggunakan 2 partograf satu untuk pemantauan ibu serta janin pertama dan untuk memantau janin kedua.

Pada langkah kedua yaitu identifikasi diagnosa atau masalah potensial, maka dapat disimpulkan bahwa masalah potensial yang dapat terjadi adalah preeklampsia dan perdarahan. Preeklampsia merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada kehamilan. Preeklampsia dapat menyebabkan retardasi mental, morbiditas dan mortalitas bayi, kelahiran prematur, dan kematian ibu. Preeklampsia didefinisikan sebagai timbulnya hipertensi disertai dengan proteinuria pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu atau saat persalinan. Preeklampsia merupakan gangguan multisistem pada kehamilan yang dikarakteristikkan disfungsi endotelial, peningkatan tekanan darah karena vasokonstriksi, proteinuria akibat kegagalan glomerulus, dan edema akibat peningkatan permeabilitas vaskuler (Fauziyah, 2012).

Beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya preeklampsia diantaranya sebagai berikut:

1. Resiko yang berhubungan dengan kehamilan pertama (primigravida) 2 kali lebih besar dibandingkan multigravida, faktor umur, terlalu muda atau terlalu tua untuk kehamilan.
2. Resiko yang berhubungan dengan riwayat penyakit dahulu riwayat penyakit keluarga berupa riwayat pernah preeklampsia, hipertensi kronis, penyakit ginjal, obesitas, diabetes gestasional.
3. Resiko yang berhubungan dengan kehamilan berupa *molahidatidosa*, dan kehamilan multipel (Fauziyah, 2012: 17-18).

Pada kehamilan *gemelli*, preeklampsia terjadi 2 sampai 5 kali lebih sering pada kehamilan *gemelli*. 15%-20% wanita dengan kehamilan *gemelli* akan mengalami preeklampsia. Preeklampsia didiagnosis saat tekanan darah ibu menjadi tinggi dan protein terdeteksi dalam urin (Lazarov, Vol 14 No 1, 2016). Oleh karena itu pada studi kasus ini, diagnosa potensial yang mungkin terjadi pada pasien adalah terjadinya preeklampsia dan antisipasi terjadinya perdarahan.

Pada studi kasus, ada riwayat keluarga menderita hipertensi, dan ibu sedang mengalami kehamilan kembar. Sehingga pasien memiliki resiko terjadinya preeklampsia. Namun, pada kasus ini, tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan segera karena kondisi ibu serta janin dalam keadaan baik serta tidak terjadi komplikasi apapun, tekanan darah ibu 130/90 mmHg namun berdasarkan pemeriksaan laboratorium tidak ada proteinuria. Berdasarkan tinjauan teori dan studi kasus pada kala I dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kesesuaian antara teori dan kasus dan terdapat kesejangan teori dan kasus pada penggunaan partograf.

B. KALA II

Menurut teori pertolongan persalinan normal pada ibu dengan *gemelli* dapat dilakukan jika ini mungkin karena adanya malpresentasi, kelainan letak plasenta, ataupun penyulit ibu seperti hipertensi (Fadlun dan Feryanto, 2013). Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik terfokus termasuk pemeriksaan dalam dapat disimpulkan bahwa ibu tidak mengalami hipertensi,

presentasi janin 1 dan 2 normal, letak plasenta normal, dan tidak ditemukan kelainan lain yang dapat mempersulit persalinan sehingga dapat melahirkan secara normal.

Kala II disebut juga sebagai kala pengeluaran. Kala ini dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya janin. Dalam fase ini ibu merasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul yang dapat menimbulkan rasa mencedas. Ibu merasakan ada tekanan pada rektum sehingga hendak buang air besar, perineum tampak menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Labia mulai membuka kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada saat his hingga lahirnya kepala, badan, ekstremitas, dan anggota tubuh janin yang lain. Pada primigravida kala II berlangsung rata-rata 1,5 jam dan pada multigravida rata-rata 0,5 jam (Indrayani dan Djami, 2013: 52).

Adapun penanganan pertolongan dalam persalinan *gemelli* yaitu:

1. Bila janin pertama letaknya membujur kala I diawasi seperti biasa dan dilakukan pertolongan persalinan seperti biasa, dengan episiotomi *mediolateralis*.
2. Diagnosis yang tepat adalah penting. Apabila diperlukan digunakan pemeriksaan sinar-X.
3. Sedativa dan analgenik diberikan dengan hati-hati, oleh karena janin yang lebih kecil sangat peka terhadap obat-obatan yang menekan pusat-pusat vital.
4. Insidensi perdarahan pospartum yang tinggi memerlukan perhatian khusus, kalau perlu sampai penyediaan daraha yang cocok, terutama jika pasien anemia.
5. Dalam persalinan, prosedur pemilihan adalah menunggu dengan penuh kewaspadaan. Hasil terbaik diperoleh apabila dilakukan tindakan minimal.

6. lakukan pemasangan infus glukosa 5 % , tindakan ini dilakukan apabila terjadi atonia uteri baik sebelum maupun sesudah bayi lahir oksitosin dapat diberikan melalui infus untk memacu miometrium, dan memudahkan pemberian cairan dan darah apabila terjadi perdarahan postpartum.
7. Bayi pertama dilahirkan dengan cara biasa seperti pada kehamilan tunggal.
8. Tali pusat harus diklem di dua tempat untuk mencegah perdarahan anak kedua melalui tali pusat pada kembar satu sel telur yang mempunyai sirkulasi plasenta saling berhubungan.
9. Ergometrin intravena tidak boleh diberikan sebelum janin kedua lahir. Kontraksi kuat yang dihasilkan dapat berbahaya untuk janin yang masih berada dalam uterus terutama jika letakka tidak baik.
10. Pemeriksaan dilakukan dengan hati-hati untuk menentukan posisi turunnya bagian terendah janin kedua. Jika kepala atau bokong berada di PAP dan ada his, ketuban dipecahkan secara hati-hati agar tali pusat tidak menumbung. Jika terjadi inersia dapat diberikn oksitosin drips untuk menimbulkan kontraksi uterus, amniotomi dilakukan jika terjadi kontraksi.
11. Jika bagian terendah telah berada di perineum, maka dilahirkan dengan tindakan yang sama dengan bayi pertama.
12. Tindakan operatif dipertimbangkan apabila presentasi bnormal, terajdi gawat janin atau ibu, atau apabila janin kedua tidak lahir setelah 15 menit karena resiko janin kedua semakin besar dengan bertambahnya waktu. .
13. Plasenta dilahirkan setelah ayi kedua lahir.

Kala II dilaksanakan seperti biasa bila janin pertama letaknya memanjang. Karena sebagian besar persalinan kembar bersalina prematur, maka pemakaian *sedative* perlu dibatasi. Episotomi mediolateral dilakukan untuk memperpendek kala pengeluaran dan mengurangi tekanan pada kepala bayi. Setelah bayi pertama lahir, segera lakukan pemeriksaan luar dan vaginal untuk mengetahui letak dan keadaan janin kedua. Bila janin letak memanjang, selaput ketuban dipecahkan dan air ketuban dialirkan perlahan-lahan untuk menghindari *prolapsus funikuli*. Pasien dianjurkan meneran atau dilakukan tekanan terkendali pada fundus uteri, agar bagian bawah janin masuk ke dasar panggul. Janin kedua turun dengan cepat sampai ke dasar panggul dan lahir spontan karena jalan lahir telah dilalui janin pertama (Pudiastuti, 2012: 147).

Tenggang waktu antara lahirnya bayi pertama dengan kedua adalah antara 5 sampai 15 menit. Kelahiran bayi kedua kurang dari 5 menit setelah bayi pertama lahir, dengan tindakan yang cepat ini dapat menimbulkan traumapersalinan pada bayi. Kelahiran bayi kedua lebih dari 30 menit dapat menimbulkan *insufisiensi uteroplacental*, karena berkurangnya volume uterus dan juga dapat terjadi solusio plasenta sebelum bayi kedua dilahirkan. Bila janin kedua letak lintang, DJJ tidak teratur, terjadi *prolapsus funikuli*, solusio plasenta, atau bila persalinan spontan tidak terjadi dalam 15 menit, maka janin perlu dilahirkan dengan tindakan obstetrik karena resiko akan meningkat dengan bertambahnya waktu (Pudiastuti, 2012: 147-148).

Studi kasus didapat bahwa ibu mengalami tanda gejala kala II seperti perasaan ingin mendedan, adanya tekanan pada anus, vulva dan sfingter anal membuka. Proses

pertolongan kelahiran bayi pertama dilakukan sam seperti kehamilan tunggal, dan berlangsung selama 15 menit pada kelahiran bayi pertama. Pada pemeriksaan abdomen dan genitalia setelah ehairan bayi pertama didapatkan janin dengan letak memanjang dan kondisi janin kedua normal dengan DJJ 132 kali permenit. Bayi kedua lahir setelah 15 menit. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk persalinan kala II Ny “S” adalah 30 menit dengan kondisi bayi pertama dan kedua baik dan penilaian APGAR score 8/10 untuk bayi pertama dan 8/10 untuk bayi kedua. Pada proses persalinan ibu dipasang infus dengan cairan RL tanpa diberi obat-obatan apapun, serta tidak dilakukan tindakan episiotomi. Sehingga terjadi kesenjangan antara teori dengan kasus tersebut.

Kejadian BBLR pada kehamilan kembar lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan tunggal. Berat masing-masing lebih kecil dari rata-rata, berat totalnya lebih besar dari bayi tunggal. Salah satu anak akan lebih berat 50 sampai 1.000 gram dari lainnya. Saperuh kasus janin mempunyai berat badan cukup bulan, seperdelapan kehamilan kedua banyinya dibawah 1.500 gram. Tiga perdelapan sisanya antara 1.500 sampai 2.500 gram (Oxorn dan William, 2010 : 265).

Salah satu faktor penyebab terjadinya BBLR adalah Sindrom transfusi kembar-ke-kembar (*Twin-to-twin transfusion syndrome*/TTTS) Kembar berbagi plasenta (kehamilan *monokorionik*) juga berbagi suplai darah. Sekitar 15 dari 100 kehamilan kembar *monokorionik*, aliran darah mungkin tidak seimbang yang disebut sindrom transfusi kembar-ke-kembar (TTTS). Satu bayi (pendonor), menerima terlalu sedikit darah dan memiliki tekanan darah rendah sementara bayi lainnya (penerima),

menerima terlalu banyak darah dan memiliki tekanan darah tinggi (*Royal College of Obstetricians and Gynecologists*, 2016: 3).

Pada studi kasus, didapatkan bayi mengalami BBLR yaitu bayi pertama dengan berat 2.085 gram dan bayi kedua dengan berat 2.010 gram. Sesaat setelah bayi lahir, bayi langsung dipindahkan ke ruang perawatan perinatologi untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Bayi di letakkan dalam inkubator untuk mencegah terjadinya hipotermi. Pada kala II dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori dan kasus yang didapat.

C. KALA III

Disebut sebagai kala uri. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak diatas pusat. Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai pengeluaran darah, kira-kira 100-200 cc (Kuswanti dan Melina, 2014: 7-8). Pada kasus didapatkan tinggi fundus uteri setelah bayi lahir setinggi pusat, kontraksi uterus baik, dan plasenta lahir 5 menit setelah bayi lahir dengan jumlah perdarahan \pm 150 cc.

Salah satu jenis kehamilan kembar yaitu kembar *monozigotik* atau *monokorionik* (*uniocular/monovular/identik*). Kembar seperti ini dihasilkan jika ovum membagi ke dalam bentuk dua janin. Kembar ini dapat menjadi *dikorionik diaminitik*,

monokorionik diamiotik atau *monokorionik monoamniotik* dengan 1 plasenta dan biasanya dengan jenis kelamin yang sama (Liu, 2011: 283-284). Pada kasus didapatkan bahwa jumlah plasenta janin 1, *monokorionik, monoamniotik* dengan jenis kelamin keduanya adalah perempuan, dengan ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan janin adalah monozigotik. Berdasarkan tinjauan teori dan studi kasus dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

D. KALA IV

Kala IV adalah kala pengawasan selama 1-2 jam setelah bayi dan plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap bahaya perdarahan postpartum (Kuswanti dan Melina, 2014: 8). Bagi ibu yang mengalami persalinan untuk pertama kalinya, ibu menyadari terjadinya perubahan kehidupan yang sangat bermakna dalam hidupnya. Saat yang paling kritis pada ibu pasca persalinan adalah pada masa post partum. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah adanyakematian ibu akibat perdarahanselama kala IV pemantauan dilakukan 15 menit pada jam pertama pasca persalina dan setaip 30 menit pada jam kedua pasca persalinan (Prawirohardjo, 2014: 357).

Pemantauan kala IV meliputi keadaan ibu dengan pemantauan tanda-tanda vital, keadaan bayibayi, TFU, jumlah perdarahan Masa pasca persalinan adalah adalah fase khusus dalam kehidupan ibu serta bayi. Tanda-tanda vital merupakan tanda-tanda penting pada tubuh yang dapat berubah bila tubuh mengalami gangguan atau masalah. Tanda-tanda vital yang sering digunakan sebagai indikator bagi tubuh yang mengalami

gangguan atau masalah kesehatan adalah tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan pernapasan. Tanda-tanda vital ini biasanya saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, bila suhu tubuh meningkat, maka nadi dan pernapasan juga meningkat, dan sebaliknya. Tanda-tanda vital yang berubah setelah persalinan adalah:

1. Tekanan darah

Tekanan darah normal tubuh berkisar antara 110-140 mmHg dan untuk diastol antara 60-80 mmHg setelah melahirkan, tekanan darah dapat sedikit lebih rendah dibandingkan pada saat hamil karena terjadinya perdarahan pada proses persalinan. Bila tekanan darah mengalami peningkatan lebih dari 30 mmHg pada *systole* atau lebih 15 mmHg pada *diastole* perlu dicurigai timbulnya hipertensi atau preeklampsia post partum.

2. Nadi

Denyut nadi normal berkisar antara 60-80 kali permenit. Pada saat proses persalinan denyut nadi akan mengalami peningkatan. Setelah proses persalinan selesai frekuensi denyut nadi dapat sedikit lebih lambat.

3. Suhu

Setelah proses persalinan, suhu tubuh dapat meningkat $0,5^{\circ}\text{C}$ dari keadaan nirmal ($36,5\text{-}37,5^{\circ}\text{C}$), namun tidak lebih dari 38°C . Hal ini disebabkan karena meningkatnya metabolisme tubuh pada saat proses persalinan. Suhu tubuh akan

kembali normal saat 12 jam setelah persalinan. Jika suhu tubuh tidak kembali normal atau semakin meningkat, maka perlu dicurigai kemungkinan terjadinya infeksi.

4. Pernapasan

Frekuensi pernapasan normal berkisar antara 18-24 kali permenit. Pada saat persalinan, frekuensi pernapasan akan meningkat karena kebutuhan oksigen yang tinggi untuk tenaga ibu mengedan dan mempertahankan agar persediaan oksigen ke janin tetap terpenuhi. Setelah proses persalinan selesai, frekuensi pernapasan akan kembali normal, keadaan pernapasan biasanya berhubungan dengan suhu dan denyut nadi (Maritalia, 2012: 24-25).

Kejadian perdarahan pasca persalinan merupakan penyebab utama dari kematian ibu setiap tahun di dunia dan hampir 4 dari 5 kematian karena perdarahan pasca persalinan yang terjadi dalam waktu 4 jam setelah persalinan. Dalam waktu 2 jam setelah persalinan, penolong persalinan harus memastikan bahwa uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan dalam jumlah besar. Bila terjadi perdarahan berat, maka harus dilakukan transfusi darah. Perdarahan pasca persalinan adalah komplikasi yang terjadi pada tenggang waktu diantara persalinan dan pascapersalinan. Faktor predisposisi antara lain adalah anemia, sedangkan penyebab perdarahan paling sering adalah atonia uteri, retensio plasenta, penyebab lain adalah lacerasi, rupture uteri, dan inversio uteri. (Prawirohardjo, 2014: 357-258).

Pemantauan kandung kemih pada kala IV dengan berupaya agar kandung kemih tetap kosong dapat membantu terjadinya kontraksi uterus, terutama pada kasus yang disertai dengan peregangan berlebihan dari kandung kemih yang tidak dapat dikosongkan secara spontan. Bila perdarahan tidak segera berhenti, terdapat perdarahan segar yang menetap, atau terjadi perubahan pada keadaan umum ibu, harus segera dilakukan pemberian cairan intravena dan transportasi ke fasilitas kesehatan yang sesuai bila memungkinkan pengobatan secara efektif (Prawirohaedjo, 2012: 258).

Pada kasus didapat kondisi ibu baik dengan tanda-tanda vital normal pada setiap pemantauan di dua jam pertama pasca persalinan. Kondisi kedua bayi baik dan dirawat inkubator untuk mencegah hipotermi. TFU 1 jari di bawah pusat setelah plasenta lahir, terjadi laserasi pada vagina dan perineum derajat II dan dilakukan penjahitan dengan tehnik jelujur dan subkutis, kandung kemih kosong, dan jumlah perdarahan total \pm 300 cc. Pada kala III dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus manajemen asuhan kebidanan intranatal pada Ny "S" dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan 7 langkah Varney, dapat disimpulkan bahwa:

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisa data pada Ny "S" dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
2. Telah dilaksanakan perumusan untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosis atau masalah aktual pada Ny "S" dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
3. Telah dilaksanakan perumusan untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosis atau masalah potensial pada Ny "S" dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
4. Telah dilaksanakan identifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi pada Ny "S" dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
5. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny "S" dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa berdasarkan diagnosa atau masalah aktual dan masalah potensial.

6. Telah dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny "S" dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil semua tindakan dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya hambatan.
7. Telah dilakukan evaluasi hasil asuhan kebidanan pada Ny "S" dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil terdapat beberapa kesenjangan antara studi kasus dengan tinjauan pustaka.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua hasil temuan dan tindakan asuhan pada Ny "S" dengan persalinan *gemelli* di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam bentuk SOAP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi penulis

Lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terutama dalam memberikan asuhan kebidanan intranatal dengan persalinan *gemelli*.

2. Bagi profesi

Mengharapkan agar dapat lebih meningkatkan pelayanan baik dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat maupun dalam memberikan asuhan kebidanan secara menyeluruh khususnya bagi ibu dengan persalinan *gemelli*, sehingga dapat mengurangi resiko serta komplikasi yang dapat terjadi.

3. Bagi institusi

a. Pendidikan

Diharapkan adar dapat meningkatkan mutu pendidikan baik secara teori maupun praktik, agar mahasiswa lebih menguasai penanganan dan pertolongan persalinan patologi khususnya *gemelli*.

b. Rumah Sakit

Diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan baik dari segi penyediaan sarana dan prasarana maupun sistem pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan meminimalisir terjadinya keterlambatan pelayanan dan penanganan kasus fisiologi maupun patologi, yang dapat memberikan resiko terjadinya komplikasi dan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. Kementerian Agama RI. 2012.
- Baety, Aprilia Nurul, *Kehamilan dan Persalinan Panduan Praktik Pemeriksaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Benson, Ralph C dan Martin L. Pernoll. *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: EGC, 2013.
- Budijanto, Didik dkk. *Profil Kesehatan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia, 2015.
- Eniyati & Sholihah. *Asuhan Kebidanan pada Persalinan Patologi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013.
- Eniyati & Melisa Putri. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Fadlun & Feryanto, *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta: Salemba Medika,
- Fauziah, Yulia. *Obstetri Patologi*. Yogyakarta. Nuha Medika, 2012.
- Handayani, Desi. *Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2012.
- Harahap, Zul Anwar Aji. *Konsep Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W. 660 H)*. Tafsir Vol. 9 No. Juli-Desember 2014. Diakses tanggal 07/06/2017.
- Indrayani dan Moudy Emma Unaria Djami. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru lahir*. Jakarta:Perpustakaan Nasional, 2013.
- Kennedy, Betsy B dkk. *Modul Manajemen Intrapartum*. Jakarta : EGC, 2013
- Kuswanti, Ina & Fitri Melina. *ASKEB II Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Lazarov. *Complications Of Multiple Pregnancies. Overview. Trakia Journal of Sciences*, No 1, pp.108-111, 2016. Diakses tanggal 08/05/2017

- Liu, David T.Y. *Manual Persalinan*. Jakarta: EGC, 2011.
- Lumempow, Irmidkk. *Karakteristik Persalinan Kembar di RSUP Prof. Dr. R.D. Kondou Manado Tahun 2012-2013*. Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 3, Nomor 1, Januari-April, 2015. Diakses tanggal 03/052017.
- Maritalia, Dewi. *Asuhan kebidanan nifas dan menyusui*. Yogyakarta. Pustaka Belajar, 2012.
- NICE (National Institute for Health and Care Excellence). *Multiple Pregnancy: Antenatal Care for Multiple Pregnancy: Antenatal Care for Twin and Triplet Pregnancies*. Clinical Guideline, 2011. Diakses tanggal 08/05/2017
- Oxorn, Harry dan William R. For. *Ilmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Profil Kesehatan Sulawesi Selatan. Makassar: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015.
- Profil Kesehatan Kabupaten Gowa. Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2014.
- Pudiastuti, ratna Dewi. *Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Romauli, Suryati. *Buku Ajar ASKEB I Konsep dasar Asuhan Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Royal College of Obstetricians & Gynecologists. *Multiple pregnancy: having more than one baby*. Published in November 2016. Diakses Tanggal 08/05/2017
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohadjo, 2014.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Tando, Naomy marie. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: In Media, 2013.
- Tresnawati, Frisca. *Asuhan Kebidanan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2013.
- WHO (World Health Organization). *World Health Statistics*. 2015. Diakses tanggal 10/05/2017

Woodward, Vivien dkk. *Kedaruratan Persalinan Manajemen di Komunitas*. Jakarta: EGC, 2012.

Yulifah, Rita & Surahmindari. *Konsep Kebidanan untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: Salemba Medika, 2014.



D
A
F
T
A
R



L
A
M
P
I
R
A
N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PARTOGRAF BAYI PERTAMA

No. Register
No. Puskesmas
Ketuban pecah

4-6-7-xxx
Sejak jam _____

Nama Ibu :
Tanggal :

Ny " S"
01-05-2017

Umur :
Jam :

29 Tahun
22.10 WITA
02.00 WITA


G. III

P. II

A. 0

Alamat :


Manyampa,
Pallangga



Air ketuban
Penyusupan

U O J O

Pembukaan serviks (cm) beri tanda x
Turunnya kepala beri tanda o



Kontraksi tiap 0 Menit




Oksitosin U/L tetes/menit

Obat dan Cairan IV

RL RL

• Nadi



Suhu °C

36,6 36,6

Urin — Protein
— Aseton
— Volume

+ 100 cc

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal : 02 Mei 2017
 2. Nama bidan :
 3. Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya :
 4. Alamat tempat persalinan : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo
 5. Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
 6. Alasan merujuk :
 7. Tempat rujukan :
 8. Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y [Ⓟ]
 10. Masalah lain, sebutkan :
 11. Penatalaksanaan masalah Tsb :
 12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
 Ya, Indikasi
 Tidak
 14. Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
 15. Gawat Janin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
 16. Distosia bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
 17. Masalah lain, sebutkan :
 18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
 19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III : menit
 21. Pemberian Oksitosin 10 U im ?
 Ya, waktu : menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan
 22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan
 Tidak
 23. Penegangan tali pusat terkendali ?
 Ya,
 Tidak, alasan

24. Masase fundus uteri ?
 Ya.
 Tidak, alasan Bayi kedua belum lahir
 25. Plasenta lahir lengkap (intact) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
 26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
 27. Laserasi :
 Ya, dimana
 Tidak.
 28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
 Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan
 29. Atoni uteri :
 Ya, tindakan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
 30. Jumlah perdarahan : ml
 31. Masalah lain, sebutkan
 32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
 33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badan 2.089 gram
 35. Panjang 43 cm
 36. Jenis kelamin : L (P)
 37. Penilaian bayi baru lahir : (baik) / ada penyulit
 38. Bayi lahir :
 Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang taktil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas/, tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang taktil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan
 Cacat bawaan, sebutkan :
 Hipotermi, tindakan :
 a.
 b.
 c.
 39. Pemberian ASI
 Ya, waktu : Bayi dipindahkan ke ruang perawatan bayi
 Tidak, alasan
 40. Masalah lain,sebutkan :
 Hasilnya :


PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1							
2							


Masalah kala IV :
 Penatalaksanaan masalah tersebut :
 Hasilnya :

PARTOGRAF BAYI KEDUA


No. Register : Nama Ibu : Ny "S" Umur : 29 Tahun
 No. Puskesmas : Tanggal : 01-05-2017 Jam : 22.10 WITA G. III P. II A. 0
 Ketuban pecah Sejak jam : _____ mules sejak jam : 02.00 WITA Alamat : Manyampa, Pallangga



Air ketuban Penyusupan :



Oksitosin U/L tetes/menit :



Suhu °C :

Urin : Protein Aseton Volume

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal : 02 Mei 2017
 2. Nama bidan :
 3. Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya :
 4. Alamat tempat persalinan : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo
 5. Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
 6. Alasan merujuk :
 7. Tempat rujukan :
 8. Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y /
 10. Masalah lain, sebutkan :
 11. Penatalaksanaan masalah Tsb :
 12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
 Ya, Indikasi
 Tidak
 14. Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
 15. Gawat Janin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
 16. Distosia bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
 17. Masalah lain, sebutkan :
 18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
 19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III : 5 menit
 21. Pemberian Oksitosin 10 U/ml ?
 Ya, waktu : 1 menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan
 22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan
 Tidak
 23. Penegangan tali pusat terkendali ?
 Ya,
 Tidak, alasan

24. Masase fundus uteri ?
 Ya.
 Tidak, alasan
 25. Plasenta lahir lengkap (*intact*) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
 26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
 27. Laserasi :
 Ya, dimana Vagina dan perineum
 Tidak.
 28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 2 / 3 / 4
 Tindakan :
 Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan
 29. Atoni uteri :
 Ya, tindakan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
 30. Jumlah perdarahan : +- 150 ml
 31. Masalah lain, sebutkan
 32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
 33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badan 2.010 gram
 35. Panjang 41 cm
 36. Jenis kelamin : L / P
 37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
 38. Bayi lahir :
 Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang taktil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas/, tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang taktil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan
 Cacat bawaan, sebutkan :
 Hipotermi, tindakan :
 a.
 b.
 c.
 39. Pemberian ASI
 Ya, waktu : Bayi dipindahkan ke ruang perawatan bayi
 Tidak, alasan
 40. Masalah lain, sebutkan :
 Hasilnya :

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi		Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	04.50 WITA	110/90 mmHg	80x/i	36,5°C	1 jrpst	Baik	Kosong	+ 250 cc
	05.05 WITA	110/90 mmHg	80x/i		1 jrpst	Baik	Kosong	
	05.20 WITA	110/90 mmHg	80x/i		1 jrpst	Baik	Kosong	
	05.35 WITA	110/90 mmHg	80x/i		1 jrpst	Baik	Kosong	
2	06.05 WITA	110/90 mmHg	80x/i	36,5°C	1 jrpst	Baik	Kosong	
	06.35 WITA	110/90 mmHg	80x/i		1 jrpst	Baik	Kosong	+ 30 cc





Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :





KONSULTASI PROPOSAL


Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si, SKM, M. Keb
Pembimbing I

No.	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	Konsul dan Ace Judul	Konsul dan Ace Judul	
2.	Tata cara penulisan	31-03-2017	
3.	pendalaman BAB I	03-04-2017	
4.	Konsul BAB I dan II	10-04-2017	
5.	perbaiki BAB I dan II	28-04-2017	
6.	Konsul dan perbaikan BAB II	29-05-2017	
7.	Ace upis Proposal	31-05-2017	
8.	Konsul, ace PPT	02-06-2017	

KONSULTASI PROPOSAL

Pembimbing II (Dr. Rudy Rahmadani, M)


No.	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	Konsultasi judul	10-09-2017	
2.	Akras penulisan Daftar pustaka, Tinjauan teori, kompetensi badan dalam arahan persalinan gemeli	10 Mei 2017	
3.	Konsul BAB I, BAB II	20 Mei 2017	
4.	Ace		
5.			





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR


LEMBAR KONSULTASI HASIL

Pembimbing I

No.	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	KONSUL BAB III - penulisan - isi	04/08/2017	
2.	perbaikan BAB III dan konsul BAB IV.	05/08/2017	
3.	bab III, IV	Ace	
4.	bab V	Ace	
5.	Ace uji hasil	18-08-2017	
6.	- konsul PPT - konsul Abstrak	23-08-2017	



No.	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	KONSUL BAB III	09/08/2017	
2.	Perbaikan BAB III	07/08/2017	
3 -	ACC BAB III KONSUL BAB IV dan V	08/08/2017	
4.	ACC BAB IV dan V	09/08/2017	
5.			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)864924 Fax.(0411) 864923 Samata-Gowa
Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.(0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-16 / FKIK/PP.00.9/05/2017

Makassar, 05 Mei 2017

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth.
Direktur RSUD Syech Yusuf Gowa
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sri Nur Fitriwati
NIM : 70400114033
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny"X"
Dengan Persalinan Gemeli di RSUD Syech Yusuf Gowa.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam

An. Dekan,

[Signature] Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samat -Gowa Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : B-870/FKIK/PP.00.9/05/2017
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Kasus/Penelitian

Makassar, 05 Mei 2017

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM Pro. Sul-Sel.
di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian/Pengambilan Kasus:

Nama : Sri Nur Fitriwati
NIM : 70400114033
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny"S"
Dengan Persalinan Gemeli di RSUD Syech Yusuf Gowa.
Tempat Penelitian : RSUD Syech Yusuf Gowa
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Kes.
2. dr. Raully Rahmadhani, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

an. **Dekan,**
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

- 1.Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
- 2.Masing-masing Pembimbing
- 3.Mahasiswa yang bersangkutan.
- 4.Arsip.



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 7 6 0 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7462/S.01P/P2T/05/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.870/FKIK/PP.00.9/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SRI NUR FITRIWATI**
Nomor Pokok : 70400114033
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY "S" DENGAN PERSALINAN GEMELI DI RSUD SYECH YUSUF GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **31 Mei s/d 30 Juni 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Mei 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19610513 199002 1 002


Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 30-05-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : p2t_provusulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 2 Juni 2017

K e p a d a

Nomor : 070/ 550 /BKB.P/2017
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf
Kab.Gowa
Di-

T e m p a t

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 7462/S.01.P/P2T/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **SRI NUR FITRIWATI**
Tempat/Tanggal Lahir : Kambotta Toa, 19 juni 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Samata

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Karya Tukis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY "S" DENGAN PERSALINAN GEMELLI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA**"

Selama : 31 Mei 2017 s/d 30 Juni 2017
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,



DRS. BAHARUDDIN.T

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kadis Kesehatan Kab.Gowa;
3. Dekan Fak.Kedokteran Dan Ilmu UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal,-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :162/Diklat.RSUD-SY/ VIII /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Sri Nur Fitriwati
N i m : 70400114033
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Kamar Bersalin, Ruang Nifas (INC, PNC) dan Rekam Medik Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul “ **Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “ S “ Dengan Persalinan Gemelli Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa** “ pada tanggal 01 Mei 2017 S/D 26 Juni 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sungguminasa, 03 Agustus 2017

An. Ketua Diklat
Koordinator Bagian Penelitian

Dra. Hj. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS

Nip. 19630710 198703 2 019

Foto bayi kembar



Bersama ibu si kembar



IDENTITAS PENULIS



A. Identitas Peneliti

Nama : Sri Nur Fitriwati
Nim : 70400114033
Tempat, tanggal Lahir : Kambutta Toa, 19 Juni 1995
Suku : Makassar
Asal Daerah : Jeneponto
Agama : Islam
Alamat : Kambutta Toa Desa Ujungbulu Kec. Rumbia
Kab. Jeneponto

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 72 Kambutta Toa : 2002-2008
SMP Negeri 2 Rumbia : 2008-2011
SMA Negeri Khusus Jeneponto : 2011-2014
UIN Alauddin Makassar : 2014-2017