

**EVALUASI KEBERHASILAN INSEMINASI BUATAN DI  
KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Peternakan (S.Pt) pada Jurusan Ilmu Peternakan  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar*

**Oleh**

**RISAL ARISANDI**  
**60700112016**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Risal Arisandi**  
**607001110016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Pembimbing skripsi saudara **Risal Arisandi**, NIM: **60700112016** mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Evaluasi Keberhasilan Inseminasi Buatan ( IB ) Di Kecamatan Tombolo pao Kabupaten Gowa**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si  
NIP: 195907121986031002

  
Ir. Junardi, M.Si  
NIP: 196410021992031006

  
Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si  
NIP: 195907121986031002

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Evaluasi Kebehasilan Inseminasi Buatan Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa" yang disusun oleh RISAL ARISANDI, NIM: 60700112016, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu 8, Februari 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, Agustus, 2017  
12 Jumadil Awwal 1438 H

#### DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T. (.....)
- Sekretaris : Astati, S.Pt., M.Si (.....)
- Munaqisyi I : Dr.Ir. Andi Suarda, M.Si (.....)
- Munaqisyi II : Irmawaty, S.Pt., M.P (.....)
- Munaqisyi III : Dr.Muh. Thahir Maloko, M.HI. (.....)
- Pembimbing I : Dr.Ir. Muh. Basir Paly M.Si (.....)
- Pembimbing II : Ir. Junaedi, M.Si (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,  
**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag**  
NIP. 196912051993031002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebehasilan Inseminasi Buatan Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”** yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insya Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, perjalanan dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Musyafir Pabbabari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Bapak Dr. Ir. Muh Basir S. Paly, M.Si** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. **Bapak Dr.Ir.Muh Basir S. Paly, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan **Bapak Ir.Junaedi M.Si.** selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. **Bapak Dr.Ir.Andi Suarda, M.Si, Irmawaty S.Pt, M.P. Dan Dr. Muh. Thahir Malloko, M.HI.** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Rekan dan sahabat tercinta: **“Amar Musdar, Syamsul Alam S.Pt, Sabran S.Pt, Dan Ilyas S.Pt”** yang tidak pernah berhenti mengiringi do'a, motivasi, serta canda tawa sehingga dalam kondisi apapun tetap mampu percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar: **Hasrin, Asrul, Riswandi, Suhaebar Muhammad, Haidir Gassing, Wawan Surwantoudding, Saparuddin, Muhammad Nur.**

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis peruntukkan untuk kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta **Hafsah** dan Ayahanda Tercinta **Nasir** serta saudara tercinta (**Nuryanti Purnamasari**) yang tidak pernah lelah dan sabar memberikan dorongan moril dan materil

kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. Semoga apa yang kalian berikan mendapat Hidayah dari-Nya Amin.

Penulis berharap adanya masukan dan saran yang positif demi perbaiki skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan khususnya masalah Produktivitas Sapi Hasil Inseminasi Buatan. Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, Agustus 2017

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul .....	ii
HALAMAN Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
HALAMAN Persetujuan Pembimbing .....	iv
HALAMAN Pengesahan Skripsi .....	v
Kata Pengantar .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR Tabel .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Definisi Operasional Variabel.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Islam Tentang Ternak IB .....	9
B. Kajian Teoritis.....	13
C. Potensi Pengembangan Inseminasi Buatan.....	17
D. Inseminasi Buatan.....	20
E. Parameter Keberhasilan Inseminasi Buatan.....	33
F. Kerangka Fikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	39

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
B. Populasi Dan Sampel.....	39
C. Variabel yang Diamati.....	40
D. Jenis Dan Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Karakteristik Responden Kecamatan Tombolopao.....	45
C. Karakteristik Inseminator .....	48
D. Keberhasilan Inseminasi Buatan.....	49
E. Hasil Evaluasi Hubungan Populasi dengan Tingkat Keberhasilan.....	54
BAB V PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Karakteristik Responden Kecamatan Tombolopao.....	46
2. Keberhasilan Inseminasi Buatan Kecamatan Tombolopao.....	50
3. Hasil Evaluasi Keberhasilan Inseminasi Buatan.....	54



## ABSTRAK

**Nama : Risal Arisandi**

**NIM : 60700112016**

**Jurusan : Ilmu Peternakan**

**Judul : Evaluasi Keberhasilan Inseminasi Buatan Di Kecamatan  
Tombolo Pao Kabupaten Gowa**

---

Inseminasi Buatan adalah pemasukan atau penyimpanan semen ke dalam saluran kelamin betina dengan bantuan alat manusia, jadi bukan secara alam. Dalam praktek prosuder IB tidak hanya meliputi deposisi atau penyimpanan semen ke dalam saluran kelamin betina,.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2017. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak peningkatan hasil Inseminasi Buatan. Metode penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan para peternak, dan data yang diperoleh dianalisis dengan Rumus SPPS.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh peningkatan inseminasi sudah sangat meningkat dikalangan para peternak yang menggunakan IB dibandingkan dengan kawin alami.

Kata kunci: Inseminasi Buatan

## ABSTRACT

**Nama : Risal Arisandi**

**NIM : 60700112016**

**Jurusan : Ilmu Peternakan**

**Judul : Evaluation of Successful Artificial Insemination In District Tombolo Pao Gowa District**

---

Artificial Insemination is the introduction or storage of semen into the female genital tract with the aid of a human tool, not natural. In practice the IB prosudes not only include deposition or storage of semen into the female genital tract.

This research was conducted from March to April 2017. The research location is located in Tombolo Pao District, Gowa Regency.

This study aims to see how much improvement the results of Artificial Insemination. The research method was conducted by interviewing the farmers, and the data obtained were analyzed by SPSS Formula.

Based on the results of the analysis showed that the effect of increased insemination has greatly increased among the farmers who use IB compared with natural mating.

Keywords: Use of Artificial Insemination To Increase Cattle Productivity.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan sub-sektor peternakan di Indonesia perlu untuk ditingkatkan, hal ini mengingat permintaan akan produk peternakan di Indonesia pada umumnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan populasi ternak. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha peningkatan produksi dan populasi ternak sapi potong.

Salah satu yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi daging dan anak sapi atau pedet adalah dengan meningkatkan jumlah pemilikan sapi dan mutu genetik ternak. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan inseminasi buatan (IB) pada sapi potong, karena semen yang digunakan terhadap IB berasal dari sapi jantan yang genetiknya baik dan angka *service per conception* (S/C) yang rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan kawin alam. Inseminasi buatan (IB) atau kawin suntik adalah upaya memasukkan semen/mani ke dalam saluran reproduksi hewan betina yang sedang birahi dengan bantuan inseminator agar hewan dapat bunting. Dari definisi ini inseminator berperan sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan IB. Keahlian dan keterampilan inseminator dalam akurasi pengenalan birahi, sanitasi alat, penanganan (*handling*) semen beku, pencairan kembali (*thawing*) yang benar, serta kemampuan melakukan IB akan menentukan keberhasilan (Herawati, T. 2012).

Pengembangan usaha sapi potong seperti peningkatan kelahiran pedet melalui program IB, penekanan tingkat kematian, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pengobatan dan ketrampilan khusus harus dimiliki oleh peternak di pedesaan. Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah sumber ternak di Kecamatan Tombolopao dan sebagai daerah penyangga pangan khususnya daging sapi menyediakan jasa atau layanan antara lain penyediaan pasar hewan, pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan inseminasi buatan (IB).

Optimalisasi program IB lebih digalakkan karena program ini memberikan nilai tambah cukup besar bagi sumber pendapatan asli daerah dan bagi peternak berupa meningkatnya populasi dan produktivitas ternak, mempercepat jarak kelahiran ternak, memperoleh keturunan jenis ternak yang unggul sehingga meningkatkan kesejahteraan. Perkawinan dengan cara IB merupakan salah satu alat ampuh yang diciptakan manusia untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Toelihere, 1981).

IB adalah usaha manusia memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan peralatan khusus. IB dikatakan berhasil bila sapi induk yang dilakukan IB menjadi bunting. Masa bunting/periode kebuntingan sapi (*gestation period*) yaitu jangka waktu sejak terjadi pembuahan sperma terhadap sel telur sampai anak dilahirkan. Menurut Toelihere (1981) periode kebuntingan sapi berkisar 280 sampai dengan 285 hari. Setelah melahirkan disebut masa kosong sampai sapi yang bersangkutan bunting pada periode berikutnya. Program IB di Kabupaten Gowa mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan mutu genetik ternak yaitu meningkatnya kelahiran ternak

unggul yang mempunyai mutu genetik tinggi seperti jenis Simmental, Limousine, Brangus, Brahman dan Peranakan Ongole (PO), meningkatkan produktivitas ternak yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata pertambahan bobot badan harian, meningkatnya harga jual pedet dan meningkatnya bobot badan akhir setelah dewasa serta meningkatkan pendapatan peternak dari hasil penjualan ternak sapi hasil IB.

Pada dasarnya, kesuksesan suatu program IB tergantung kualitas semen yang digunakan, ketepatan penempatan spermatozoa pada lokasi yang tepat disaluran reproduksi betina dan pada waktu yang tepat pula, sehingga spermatozoa yang berkualitas baik dapat bertemu dengan sel telur untuk terjadinya pembuahan. Upaya yang dilakukan agar penempatan semen disaluran reproduksi betina dapat dilakukan secara tepat waktu adalah dengan melaksanakan program sinkronisasi berahi

Penerapan teknologi inseminasi buatan (IB) di Indonesia sendiri sudah semakin meningkat dan sudah menyebar di berbagai propinsi di Indonesia. Khususnya propinsi Sulawesi Selatan aplikasi penggunaan Inseminasi Buatan (IB) mengalami peningkatan yang cukup baik. Terbukti, tingkat keberhasilan IB mencapai 40% secara menyeluruh. Namun, beberapa Kabupaten Seperti Kab. Gowa, Enrekang (sapi perah), Bone, Bulukumba, dan Sidrap, keberhasilannya telah mencapai angka 50%. Namun presentase keberhasilan IB ini masih terbilang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hardjopranjoto (1995), Menyatakan bahwa tingkat keberhasilan IB pada sapi di Negara maju dianggap baik bila mencapai 60%-75%. Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi

Selatan yang menerapkan aplikasi teknologi inseminasi buatan (IB). Perkembangan sapi atau hasil Inseminasi Buatan di Kecamatan Tombolopao sudah sangat tinggi yang menunjukkan semakin meningkatnya hasil ternak tersebut maka dari itu perlu adanya pengevaluasian hasil IB, agar dapat mengetahui berapa persen jumlah sapi yang berhasil di IB dalam setahun.

Kecamatan Tombolopao merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa yang memiliki jumlah populasi ternak sapi dari tahun 2012 sebanyak 12.248, dan meningkat menjadi 12.575 pada tahun 2013, dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 12.801, pada tahun selanjutnya populasi sapi mengalami peningkatan kembali sebanyak 12.864 pada tahun 2015. Jadi jumlah keseluruhan populasi sapi yang ada di Kecamatan Tombolopao mencapai 50.488 ekor. Hal ini yang menarik peneliti ingin mengevaluasi peningkatan populasi sapi di Kecamatan Tombolopao dan ingin mengetahui berapa persen peningkatan sapi tiap tahunnya (Herawati, T. 2012).

### ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat keberhasilan inseminasi buatan pada sapi yang terdapat di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan inseminasi buatan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

### ***D. Definisi Operasional Variabel***

1. Populasi sapi Inseminasi Buatan dalam penelitian ini adalah jumlah sapi hasil IB yang berada dalam wilayah Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.
2. Tingkat keberhasilan IB merupakan parameter yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur guna mengevaluasi efisiensi reproduksi ternak betina
3. Inseminasi Buatan adalah memasukkan mani/semen kedalam organ reproduksi betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi agar ternak tersebut menjadi bunting.
4. Birahi/estrus adalah suatu kondisi dimana sapi betina siap atau bersedia dikawini oleh pejantan.
5. Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul, digunakan untuk inseminasi buatan.
6. Semen Beku sapi adalah semen yang berasal dari pejantan sapi terpilih yang diencerkan sesuai prosedur dan dibekukan pada suhu minus 196° C.
7. Akseptor adalah ternak betina produktif yang dimanfaatkan untuk inseminasi buatan.
8. Peternak adalah orang yang memelihara ternak sapi yang di IB dan diukur berdasarkan alokasi waktu peternak terhadap sapi, tingkat pendapatan peternak dari hasil ternak sapi, luas lahan yang dimiliki, dan jumlah ternak sapi yang dimiliki.

9. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan serta memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi (SIMI)
10. *Service per Conception* merupakan jumlah pelayanan inseminasi (service) yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi.
11. *Conception Rate* merupakan prosentase sapi betina yang bunting pada inseminasi pertama, dan dapat dipakai sebagai alat ukur tingkat kesuburan ternak.

#### ***E. Penelitian Terdahulu***

Angga ( 2013). *Perbandingan Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan pada Sapi Madura dan Sapi Madrasin (Madura-Limousin) di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*. Telah dilakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan pada Sapi Madura dan Sapi Madrasin (Madura-Limousin) di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat keberhasilan IB pada sapi Madura dan sapi Madrasin dengan mengetahui parameter *Service per conception* (S/C), *Conception rate* (CR), dan *Non return rate* (NRR). Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 124 ekor sapi Madura dan 124 ekor sapi Madrasin. Sampel didapat dari beberapa akseptor IB dan Inseminator di kecamatan Geger, kabupaten Bangkalan. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan Chi-Square ( $\chi^2$ ) pada kedua jenis sapi tersebut terhadap S/C, CR dan NRR(30-60).

*Koibur, J.F (2005). Evaluasi Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan pada Sapi Bali di Kabupaten Jayapura.* Telah dilakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan pada Sapi Bali di Kabupaten Jayapura” Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) pada temak sapi Bali di Kabupaten Jayapura. Obyek pada penelitian ini adalah ekor sapi di Kecamatan Nimbokrang dan 50 ekor sapi di Kecamatan Skanto. Jumlah sapi terpilih merupakan dari 10% populasi temak sapi peserta IB, pada 30 peternakan peserta program IB untuk setiap kecamatan. Penelitian ini merupakan studi kasus ternak sapi Bali beserta program IB. Data yang dihimpun dianalisis secara deskriptif tabulasi. Hasil peneliian menunjukkan berturut-turut nilai, Service per Conception (S/C), Conception Rate (CR), dan angka kelahiran temak sapi Bali di Kabupaten Jayapura sebesar 1,74;76,73% dan 73,5%. Hasil ini dapat dikatakan baik karena telah memenuhi standar nasional. Terdapat hubungan yang signifikan antara S/C, C.R, dan Calving rate

*Umam K., Kusriani N., Kurniati D (2012). Hubungan antara Karakteristik dengan Persepsi Peternak Terhadap Inseminasi Buatan pada Sapi Potong Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.* Telah dilakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Karakteristik dengan Persepsi Peternak Terhadap Inseminasi Buatan pada Sapi Potong Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi peternak sapi potong terhadap inseminasi buatan, serta menganalisis hubungan antara karakteristik dengan persepsi peternak.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan skala likert dan Korelasi Rank Spearman dari karakteristik dengan persepsi peternak. Penentuan responden dilakukan secara acak sederhana dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 33 orang peternak yang menggunakan IB. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara berdasarkan kuesioner, dan data sekunder diperoleh dari kantor desa, kantor kecamatan dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) persepsi peternak terhadap inseminasi buatan termasuk kategori baik (87,88%); (2) terdapat hubungan yang cukup erat, signifikan dan searah antara umur dengan persepsi peternak terhadap inseminasi buatan dengan  $r_s = 0,352$ . Terdapat hubungan yang sangat lemah, tidak signifikan dan searah antara pendidikan formal ( $r_s = 0,099$ ), pengalaman beternak ( $r_s = 0,098$ ) dengan persepsi peternak terhadap IB. Sedangkan anggota keluarga memiliki hubungan yang sangat lemah, tidak signifikan dan tidak searah dengan persepsi peternak terhadap IB ( $r_s = -0,157$ ).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Tinjauan Islam Tentang Ternak IB***

Inseminasi Buatan adalah pemasukan atau penyimpanan semen ke dalam saluran kelamin betina dengan bantuan alat manusia, jadi bukan secara alam. Dalam praktek prosuder IB tidak hanya meliputi deposisi atau penyimpanan semen ke dalam saluran kelamin betina, tetapi juga tidak dengan mencakup seleksi dengan memelihara pejantan, penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan atau pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan dan juga penentuan hasil inseminasi pada hewan betina, bimbingan dan penyuluhan pada ternak (Syaifullah dan Bakar, 2013).

Untuk mengetahui efisiensi reproduksi maksimal pada kelompok sapi, setiap ekor sapi harus berkembang biak menurut frekuensi sesuai dengan ukuran ekonomi dan sapi ini harus dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama selama hidupnya supaya sapi tersebut dapat menutup biaya untuk membesarkan anaknya sampai mencapai umur dapat berkembang biak, sehingga diharapkan peternak dapat menentukan dan memilih ternak yang cocok untuk dipelihara.

Inseminasi buatan merupakan suatu teknologi reproduksi yang digunakan untuk meningkatkan populasi ternak dengan cara memasukkan *sperma /mani* ke dalam organ reproduksi dengan tujuan menghasilkan individu baru. Pencitaan makhluk hidup seperti manusia dijelaskan dalam QS al Mu'minun/23:14.



karena, muncullah suatu teknologi baru yang merupakan hasil rekayasa proses reproduksi sehingga sama dengan proses alaminya. Teknologi ini merupakan teknologi inseminasi buatan yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam meningkatkan efisiensi reproduksi, meningkatkan mutu genetic dan populasi ternak secara teratur dan cepat menggunakan alat khusus.

Teknologi inseminasi buatan IB merupakan salah satu teknologi reproduksi yang mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutu genetic ternak, sehingga dalam waktu pendek dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul (Susilawati, 2011).

Inseminasi Buatan pertama kali di perkenalkan di indonesia oleh Prof. B. Seit dari Denmark di Fakultas Kedokteran Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Penggunaan teknologi IB dengan menggunakan semen beku telah dilakukan di indonesia sejak tahun 1972 dan indonesia telah memproduksi semen beku sejak 1976. Pusat produksi semen beku di Indonesia Lembang ( Jawa Barat ) dan singosari ( Jawa Timur ) ( Feradis, 2010). Dengan adanya semen beku inilah perkembangan IB mulai maju dengan pesat, sehingga hampir menjangkau seluruh Provinsi di Indonesia (Sugoro, 2009).

Program IB mempunyai peran yang sangat strategis dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas ternak, teknologi IB adalah salah satu upaya penyebaran bibit unggul yang memiliki nilai praktis dan ekonomis yang dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat. Melalui teknologi IB diharapkan secara ekonomi dapat

memberikan nilai tambah dalam pengembangan usaha peternakan ( Merthajiwa, 2011).

Sebelum melakukan inseminasi buatan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai kesehatan ternak secara umum dan kondisi alat kelamin betina. Sapi yang akan di inseminasi tidak dalam keadaan bunting, karena sapi bunting juga sering mengalami gejala birahi, sapi yang menderita gejala ( minta kawin terus menerus ) juga harus menjadi perhatian. Pemeriksaan dilakukan secara umum saja yaitu dengan melihat (*infeksi*) dan menyentuh (*palpasi*) (Faradis,2010).

Prosedur inseminasi buatan pada sapi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan prosedur insiminasi buatan (IB), semen di cairkan (*thawing*) terlebih dahulu dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkan dalam air hangat atau meletakkanya dibawah air yang mengalir. Suhu untuk *thawing* yang baik adalah 37°C selama 7-18 detik.
2. Setelah semen di *thawing*, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tissue. Kemudian straw dimasukkan dalam gun dan ujung yang mencuat di potong dengan menggunakan gunting bersih. Setelah plastic sheat dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen beku/straw
3. Sapi dipersiapkan (dimasukkan) dalam kandang jepit dengan ekor di ikat.
4. Petugas inseminasi buatan (IB) memakai sarung tangan (*glove*) pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektrum, hingga dapat menjangkau dan

memegang leher rahim (*servix*), apa bila dalam rektum banyak kotoran harus di keluarkan terlebih dahulu.

5. Semen disuntikkan/disemprotkan pada badan uterus yaitu pada daerah yang biasa di sebut posisi ke empat. Setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan maka gun dari uterus dan *servix* dapat dikeluarkan dengan perlahan lahan (Feradis,2010).

## **B. Kajian Teoritis**

*Kusdianawati (2012), Analisis Tingkat Kepuasan Peternak hasil inseminasi buatan Terhadap, peningkatan ternak di Kecamatan Ketapang Kabupaten Benua.* Sapi Inseminasi Buatan merupakan salah satu ternak penghasil daging di Indonesia, akan tetapi produksi daging sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan karena populasi dan tingkat produktivitas ternak rendah. Rendahnya populasi sapi potong antara lain disebabkan sebagian besar ternak dipelihara oleh peternak berskala kecil dengan lahan dan modal terbatas (Kariyasa, 2005)

Ternak sapi potong mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan peternakan dalam mengembangkan misi peternakan yaitu berupa, sumber pangan hewani asal ternak, sumber pendapatan masyarakat terutama petani ternak, dan menciptakan lapangan kerja (Feradis, 2010<sup>a</sup>).

Menurut Feradis (2011), bangsa sapi mempunyai klasifikasi taxonomi sebagai berikut :

Kingdom : *Animalia*

Filum : *Chordata*

Sub Filum : *Vertebrata*

Kelas : *Mamalia*

Ordo : *Artiodactyla*

Sub ordo : *Ruminantia*

Famili : *Bovidae*

Genus : *Bos (cattle)*

Spesies : *Bos taurus* (sapi Eropa), *Bos indicus* (sapi India/sapi zebu) dan  
*Bos sondaicus* (banteng/sapi Bali)

Sapi-sapi yang tergolong dalam inseminasi buatan IB adalah Sapi Brahman, Sapi Ongole, Sapi Sumba Ongole (SO), Sapi Hereford, Sapi Shorthorn, Sapi Brangus, Sapi Aberden Angus, Sapi Santa Gartudis, Sapi Droughtmaster, Sapi Australian Commercial Cross, Sapi Sahiwal Cross, Sapi Limosin, Sapi Simmental, Sapi Peranakan Ongole (Feradis, 2010).

#### 1. Sapi Ongole

Sapi Ongole memiliki ciri-ciri berwarna putih dengan warna hitam di beberapa bagian tubuh, bergelambir dan berpuncuk, dan daya adaptasinya baik. Jenis sapi ini telah disilangkan dengan sapi Madura, keturunannya disebut Peranakan Ongole (PO) cirinya sama dengan sapi Ongole tetapi kemampuan

produksinya lebih rendah (Sugeng, 2003). Menurut Hardjosubroto(1994), umur pertama kali kawin sapi ini rata-rata adalah 27,72 bulan. Sapi Peranakan Ongole nilai S/C 1,28, dan nilai Conception Rate (CR) 75,34 %.

## 2. Sapi Limousin

Sapi ini berasal dari Perancis dan merupakan tipe sapi potong ciri yang dimiliki sapi ini adalah warna bulu merah coklat, tetapi pada sekeliling mata dan kaki mulai dari lutut ke bawah berwarna agak terang ukuran tubuh besar dan panjang, pertumbuhan bagus. Tanduk pada jantan tumbuh keluar dan agak melengkung.berat badan sapi betina 650 kg, dan jantan 850 kg (Sugeng, 2003). Menurut Nuryadi dan Sri (2010) sapi Peranakan Limousin nilai S/C 1,34 dan nilai Conception Rate (CR) 66%.

## 3. Sapi Simental

Sapi Simmental adalah bangsa Bos Taurus (Siregar, 1999), berasal dari daerah Simmedi negara Switzerland tetapi sekarang berkembang lebih cepat di benua Eropa dan Amerika, merupakan tipe sapi perah dan pedaging, warna bulu coklat kemerahan (merah bata), dibagian muka dan lutut kebawah serta ujung ekor berwarna putih, sapi jantan dewasanya mampu mencapai berat badan 1150 kg sedang betina dewasanya 800 kg. Bentuk tubuhnya kekar dan berotot, sapi jenis ini sangat cocok dipelihara di tempat yang beriklim sedang. Persentase karkas sapi jenis ini tinggi, mengandung sedikit lemak. Dapat difungsikan sebagai sapi perah dan potong.

Secara genetik, sapi Simmental adalah sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim dingin, merupakan sapi tipe besar, mempunyai volume rumen

yang besar, voluntary intake (kemampuan menambah konsumsi di luar kebutuhan yang sebenarnya) yang tinggi dan metabolic rate yang cepat, sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih teratur.

#### 4. Sapi Brahman

Bangsa sapi Brahman dikembangkan di Amerika Serikat dengan mencampurkan darah 3 bangsa sapi India yaitu bangsa-bangsa Gir, Guzerat, dan Nellor. Sapi Brahman merupakan bangsa sapi ukuran medium, pedetnya juga berukuran berat medium, namun berat sapi umumnya termasuk ringan. Sapi ini bertanduk dan warnanya bervariasi mulai dari abu-abu muda, total-totol sampai hitam. Terdapat punuk pada punggung dibelakang kepala, yang merupakan kelanjutan dari otot-otot pundak, dengan telinga yang berpedulous panjang, serta adanya pendulous yang longgar sepanjang leher. Sapi Brahman mempunyai sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh beberapa bangsa sapi tertentu, yaitu ketahanannya terhadap kondisi tatalaksana yang sangat minimal, toleransi terhadap panas, kemampuan untuk mengasuh anak, dan daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang jelek. Oleh karena itu, sapi ini banyak digunakan untuk persilangan dengan sapi-sapi lainnya. Berat badan sapi betina mencapai 500 kg dan sapi jantan 600 kg (Blakely dan Bade, 1992).

#### 5. Sapi Brangus

Sapi Brangus merupakan hasil persilangan antara Brahman dan Aberdeen Angus dan merupakan tipe sapi potong. Ciri-ciri yang dimiliki sapi ini adalah bulunya halus dan pada umumnya berwarna hitam atau merah. Sapi ini juga

bertanduk, bergelambir, dan bertelinga kecil. Sapi ini juga berpunuk, tetapi kecil. Berat sapi betina mencapai 900 kg, dan jantan 1.100 kg (Sugeng, 2003).

### ***C. Potensi Pengembangan Insiminasi Buatan***

Usaha pengembangan inseminasi buatan tidak terlepas dari usaha ternak rakyat. Dirjen Peternakan (1998) melaporkan bahwa potensi dasar pengembangan peternakan Ruminansia di Indonesia hingga saat ini dan kemungkinan di masa mendatang berasal dari peternakan rakyat (skala usaha kecil). Hal ini ditegaskan lagi dengan laporan Dwi Yanto (2002) yang menyatakan bahwa 99% produksi sapi bakalan dalam negeri dilakukan oleh peternakan rakyat.

Sektor pertanian secara nasional masih merupakan faktor yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena mayoritas penduduk masih memperoleh pendapatan utamanya di sektor ini. Peternakan merupakan salah satu sub-sektor yang terkandung didalamnya, memiliki peranan cukup penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara ini.

Upaya pengembangan inseminasi buatan telah lama dilakukan oleh pemerintah. Nasoetion *dalam* Winarso dkk. (2005) menyatakan bahwa dalam upaya pengembangan inseminasi buatan, pemerintah menempuh dua kebijakan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Pengembangan inseminasi buatan secara ekstensifikasi menitikberatkan pada peningkatan populasi ternak yang didukung oleh pengadaan dan peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit, penyuluhan dan pembinaan usaha, bantuan perkreditan, pengadaan dan peningkatan mutu pakan, dan pemasaran. Menurut Isbandi (2004), penyuluhan

dan pembinaan terhadap petani-peternak dilakukan untuk mengubah cara beternak dari pola tradisional menjadi usaha ternak komersial dengan menerapkan cara-cara *zooteknik* yang baik. *Zooteknik* tersebut termasuk saptausaha beternak sapi, yang meliputi penggunaan bibit unggul, perkandangan yang sehat, penyediaan dan pemberian pakan yang cukup nutrisi, pengendalian terhadap penyakit, pengelolaan reproduksi, pengelolaan pascapanen, dan pemasaran hasil yang baik.

Berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan pengembangan usaha ternak inseminasi buatan telah diluncurkan dan diimplementasikan, baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Dalam implementasinya, program dan kebijakan tersebut masih belum mampu mengatasi kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Menurut Ilham dkk. (2001), hal ini disebabkan oleh :

- 1) Belum semua program yang dilakukan pemerintah sampai pada peternak. Seandainya sampai, peternak tidak mengaplikasikannya, Keberhasilan penerapan teknologi peternakan belum merata
- 2) Pengembangan usaha peternakan masih belum menjadi prioritas utama pemerintah, sehingga dana program untuk sub sektor peternakan masih relatif kecil dibandingkan dengan sub sektor lainnya
- 3) Kebijakan intensifikasi pada lahan sawah mengurangi penggunaan tenaga kerja ternak, sehingga banyak petani tidak lagi mengusahakan ternak sapi
- 4) Masih banyak ternak sapi yang dipelihara secara ekstensif, sehingga menyulitkan dalam pengendalian penyakit dan terjadinya penurunan genetik akibat *inbreeding*
- 5) Menyempitnya lahan padang penggembalaan akibat alih fungsi lahan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor peternakan adalah upaya untuk mencukupi kebutuhan protein hewani. Pada akhirnya, upaya ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kecerdasan bangsa (Santosa, 1997).

Dalam rangka menghadapi swasembada daging sapi diperlukan peningkatan populasi sapi, secara nasional dengan cara peningkatan jumlah kelahiran pedet dan calon induk sapi dalam jumlah besar. Untuk mendukung peningkatan populasi tersebut terutama pada usaha peternakan rakyat diperlukan suatu teknologi tepat guna spesifik lokasi sesuai dengan kondisi agroekosistem dan kebutuhan pengguna yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Affandi, dkk., 2007).

Alasan pentingnya peningkatan populasi inseminasi buatan dalam upaya mencapai swasembada daging antara lain adalah:

- 1) Subsektor peternakan berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru pada sektor pertanian
- 2) Rumah tangga yang terlibat langsung dalam usaha peternakan terus bertambah
- 3) Tersebar nya sentra produksi sapi di berbagai daerah, sedangkan sentra konsumsi terpusat di perkotaan sehingga mampu menggerakkan perekonomian regional
- 4) Mendukung upaya ketahanan pangan, baik sebagai penyedia bahan pangan maupun sebagai sumber pendapatan yang keduanya berperan meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan (Kariyasa 2005).

Dalam hal pengembangan inseminasi buatan diperlukan peningkatan populasi sapi dengan cara meningkatkan jumlah kelahiran pedet dan calon induk

sapi dalam jumlah besar. Untuk mendukung peningkatan populasi tersebut peranan teknologi harus lebih dioptimalkan (Feradis, 2010<sup>b</sup>).

#### ***D. Inseminasi Buatan***

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat besar. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan rasa, karsa dan daya cipta yang dimiliki. Salah satu bidang iptek yang berkembang pesat dewasa ini adalah teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk (keturunan). Salah satu teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari *artificial insemination* yang berarti memasukkan cairan semen (plasma semen) yang mengandung sel-sel kelamin pria (spermatozoa) yang diejakulasikan melalui penis pada waktu terjadi kopulasi atau penampungan semen (Partodiharjo, 1992).

Produktivitas ternak sapi dapat dilakukan melalui kawin suntik yang dalam bahasa ilmiahnya adalah *Artificial Insemination* atau Inseminasi Buatan (IB). Hal tersebut adalah sebagai salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak, sehingga dapat menghasilkan keturunan/pedet dari bibit pejantan unggul. Sistem perkawinan pada ternak sapi secara buatan yakni suatu cara atau teknik memasukkan sperma atau semen kedalam kelamin sapi betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi yang dilakukan oleh manusia (Inseminator) dengan tujuan agar sapi tersebut

menjadi bunting. Semen adalah mani yang berasal dari sapi pejantan unggul yang dipergunakan untuk kawin suntik atau inseminasi buatan (Partodiharjo, 1992).

Inseminasi Buatan (IB) adalah proses memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan untuk membuat betina jadi bunting tanpa perlu terjadi perkawinan alami. Konsep dasar dari teknologi ini adalah bahwa seekor pejantan secara alamiah memproduksi puluhan milyar sel kelamin jantan (spermatozoa) per hari, sedangkan untuk membuahi satu sel telur (oosit) pada hewan betina diperlukan hanya satu spermatozoa. Potensi terpendam yang dimiliki seekor pejantan sebagai sumber informasi genetik, apalagi yang unggul dapat dimanfaatkan secara efisien untuk membuahi banyak betina (Hafez, 1993).

Pelaksanaan Inseminasi Buatan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain seleksi dan pemeliharaan pejantan, cara penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan dan pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan, dan penentuan hasil inseminasi. Agar dalam pelaksanaan IB pada hewan ternak atau peternakan memperoleh hasil yang lebih efektif, maka deteksi dan pelaporan birahi harus tepat disamping pelaksanaan dan teknik inseminasi itu sendiri dilaksanakan secara cermat oleh tenaga terampil. Semen yang diinseminasikan ke dalam saluran betina pada tempat dan waktu yang terbaik dapat memungkinkan pertemuan antara spermatozoa dan ovum sehingga berlangsung proses pembuahan (Tolihere, 2005).

Namun dalam perkembangan lebih lanjut, program IB tidak hanya mencakup pemasukan semen ke dalam saluran reproduksi betina, tetapi juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan pejantan, penampungan, penilaian,

pengenceran, penyimpanan atau pengawetan (pendinginan dan pembekuan) dan pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan dan penentuan hasil inseminasi pada hewan/ternak betina, bimbingan dan penyuluhan pada peternak. Dengan demikian pengertian IB menjadi lebih luas yang mencakup aspek reproduksi dan pemuliaan, sehingga istilahnya menjadi artificial breeding (perkawinan buatan). Tujuan dari IB itu sendiri adalah sebagai satu alat ampuh yang diciptakan manusia untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif (Toelihere, 1985).

Program IB mempunyai peran yang sangat strategis dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, teknologi IB salah satu upaya penyebaran bibit unggul yang memiliki nilai praktis dan ekonomis yang dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat. Teknologi IB memberikan keunggulan antara lain; bentuk tubuh lebih baik, pertumbuhan ternak lebih cepat, tingkat kesuburan lebih tinggi, berat lahir lebih tinggi serta keunggulan lainnya. Melalui teknologi IB diharapkan secara ekonomi dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan usaha peternakan (Merthajiwa, 2011).

Keuntungan IB adalah peningkatan reproduksi yang dapat dilihat dari tercapainya selang beranak ideal, yaitu 12 sampai 14 bulan, perkawinan pasca beranak 60 sampai 80 hari, CR 60% dari inseminasi pertama dan S/C berkisar antara 1,6 sampai 2,0 (Susilawati, 2003).

Kerugian dari sistem IB adalah pemilihan pejantan yang tidak sempurna akan mengakibatkan abnormalitas genetik pada pedet yang dilahirkan, inseminator

yang kurang berpengalaman akan menyebabkan rendahnya persentase kebuntingan dan kesukaran dengan semen segar dari ternak jantan yang mempunyai satu garis keturunan akan menyebabkan terjadinya Inbreeding yang sangat merugikan (Partodiharjo, 1992).

Inseminasi Buatan pertama kali dilakukan pada kuda dan secara intensif oleh para ilmuwan Arab pada tahun 1900, seperti ilmuwan dari Rusia yang bernama Ivanoff yang menginseminasi kuda, sapi, dan domba. Tehnologi ini pertama kali dilakukan pada tahun 1936 di Denmark oleh Sorensen dan Gylling, setelah itu berkembang pesat di dunia sampai menembus Benua Amerika sekitar tahun 1937 (Partodiharjo, 1992).

Pada tahun 1677, Anthony Van Leeuwenhoek sarjana Belanda penemu mikroskop dan muridnya Johan Amm merupakan orang pertama yang melihat sel kelamin jantan dengan mikroskop buatannya sendiri. Mereka menyebut sel kelamin jantan yang tak terhitung jumlahnya tersebut *animalcules* atau *animalculae* yang berarti jasad renik yang mempunyai daya gerak maju progresif. Di kemudian hari sel kelamin jantan tersebut dikenal dengan spermatozoatozoa. Pada tahun berikutnya, 1678, seorang dokter dan anatomi Belanda, Reijnier (Regner), menemukan folikel pada ovarium kelinci (Feradis, 2010<sup>a</sup>).

Percobaan inseminasi buatan (IB) dilakukan pertama kali pada tahun 1780 oleh Lazzaro Spallanzani pada anjing. Tahun 1890 IB dilakukan di Eropa pada peternakan kuda, namun angka konsepsinya masih rendah sehingga perkembangan IB timbul tenggelam. Prof. Hoffman dari Jerman Barat menyarankan IB dilakukan setelah kawin alam dengan cara setelah betina kawin

alam lalu vaginanya dikuakkan dengan spekulum dan spermatozoanya diambil dengan spuit kemudian diencerkan dengan susu sapi dan disuntikkan kembali kepada betina tersebut. Tahun 1902, Sand dan Stribolt dari Denmark berhasil meningkatkan konsepsi dari delapan kuda betina. Begitu seterusnya sampai akhirnya IB baru digunakan secara serius di Rusia oleh prof. Elia I. Ivannoff yang menghasilkan 31 konsepsi pada 39 kuda betina di peternakan kuda di kerajaan Rusia (Feradis, 2010<sup>a</sup>).

Inseminasi buatan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1950-an oleh Prof. B. Seit dari Denmark di Fakultas Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Dalam rangka rencana kesejahteraan istimewa (RKI) didirikanlah beberapa stasiun IB di beberapa daerah di Jawa Tengah (Ungaran dan Mirit/Kedu Selatan), Jawa Timur (Pakong dan Grati), Jawa Barat (Cikole/Sukabumi) dan Bali (Baturati). Juga FKH dan LPP Bogor, difungsikan sebagai stasiun IB untuk melayani daerah Bogor dan sekitarnya, Aktivitas dan pelayanan IB waktu itu bersifat hilang, timbul sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat (Sugoro, 2009).

IB diterapkan di Indonesia sejak tahun 1953 pada ternak sapi perah, kemudian pada sapi potong dan kerbau. Walaupun hasilnya sampai saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat yang ditandai dengan tingginya harga jual dari ternak hasil IB, namun demikian pelaksanaannya di lapangan belum optimal sehingga hasilnya (tingkat kelahiran) dari tahun ke tahun berfluktuasi. Tingkat kelahiran hasil IB pada sapi potong dan kerbau berfluktuasi setiap tahunnya (Sugoro, 2009).

Kekurang berhasilan program IB antara tahun 1960-1970, banyak disebabkan karena semen yang digunakan semen cair, dengan masa simpan terbatas dan perlu adanya alat simpan sehingga sangat sulit pelaksanaannya di lapangan. Disamping itu kondisi perekonomian saat itu sangat kritis sehingga pembangunan bidang peternakan kurang dapat perhatian (Sugoro, 2009).

Dengan adanya program pemerintah yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dimulai tahun 1969, maka bidang peternakan pun ikut dibangun. Tersedianya dana dan fasilitas pemerintah akan sangat menunjang peternakan di Indonesia, termasuk program IB. Pada awal tahun 1973 pemerintah memasukan semen beku ke Indonesia. Dengan adanya semen beku inilah perkembangan IB mulai maju dengan pesat, sehingga hampir menjangkau seluruh provinsi di Indonesia (Sugoro, 2009).

Semen beku yang digunakan selama ini merupakan pemberian gratis pemerintah Inggris dan Selandia Baru. Selanjutnya pada tahun 1976 pemerintah Selandia Baru membantu mendirikan Balai Inseminasi Buatan, dengan spesialisasi memproduksi semen beku yang terletak di daerah Lembang Jawa Barat. Setahun kemudian didirikan pula pabrik semen beku kedua yakni di Wonocolo Suranaya yang perkembangannya dipindahkan ke Singosari Malang Jawa Timur (Sugoro, 2009).

Hasil evaluasi pelaksanaan IB di Jawa, tahun 1972-1974 menunjukkan angka konsepsi yang dicapai selama dua tahun tersebut sangat rendah yaitu antara 21,3 -38,92 persen. Dari survei ini disimpulkan juga bahwa titik lemah pelaksanaan IB, tidak terletak pada kualitas semen, tidak pula pada keterampilan inseminator,

melainkan sebagian besar terletak pada ketidak suburannya ternak-ternak betina itu sendiri. Ketidak suburannya ini banyak disebabkan oleh kekurangan pakan, kelainan fisiologi anatomi dan kelainan patologik alat kelamin betina serta merajalelanya penyakit kelamin menular. Dengan adanya evaluasi tersebut maka perlu pula adanya penyempurnaan bidang organisasi IB, perbaikan sarana, intensifikasi dan perhatian aspek pakan, manajemen, pengendalian penyakit (Sugoro, 2009).

Penerapan bioteknologi IB pada ternak ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu semen beku, deteksi birahi, keterampilan tenaga pelaksana (inseminator) dan kesehatan reproduksi ternak. Keempat faktor ini berhubungan satu dengan yang lain dan bila salah satu nilainya rendah akan menyebabkan hasil IB juga akan rendah, dalam pengertian efisiensi produksi dan reproduksi tidak optimal (Toelihere, 1997).

#### 1. Semen beku

Semen beku adalah semen yang diencerkan menurut prosedur tertentu, lalu dibekukan jauh di bawah titik beku air. Tantangan dalam keberhasilan IB di lapangan adalah rendahnya kualitas dan penanganan semen beku yang digunakan, kondisi reproduksi, manajemen ternak dan keterampilan inseminator. Peningkatan kualitas semen beku sangat ditentukan oleh pemrosesan spermatozoa dari saat koleksi, pengenceran sampai dengan dibekukan, sehingga dapat menaikkan angka kebuntingan (Sugoro, 2009).

Permasalahan utama dari semen beku adalah rendahnya kualitas semen setelah dithawing, yang ditandai dengan terjadinya kerusakan pada ultrastruktur, biokimia dan fungsional spermatozoa yang menyebabkan terjadi penurunan

motilitas dan daya hidup, kerusakan membran plasma dan tudung akrosom, dan kegagalan transport dan fertilisasi. Ada empat faktor yang diduga sebagai penyebab rendahnya kualitas semen beku, yaitu (1) perubahan-perubahan intraseluler akibat pengeluaran air yang bertalian dengan pembentukan kristal-kristal es; (2) *cold-shock* (kejutan dingin) terhadap sel yang dibekukan; (3) plasma semen mengandung *egg-yolk coagulating enzyme* yang diduga enzim *fosfolipase A* yang disekresikan oleh kelenjar *bulbourethralis*; dan (4) *triglycerol* lipase yang juga berasal dari kelenjar *bulbourethralis* dan disebut SBUIII. Pengaruh yang ditimbulkan akibat fenomena di atas adalah rendahnya kemampuan fertilisasi spermatozoa yang ditandai oleh penurunan kemampuan sel spermatozoa untuk mengontrol aliran  $Ca^{2+}$  (Bailey dan Buhr, 1994). Padahal ion kalsium memainkan peranan penting dalam proses kapasitasasi dan reaksi akrosom spermatozoa. Kedua proses ini harus dilewati oleh spermatozoa selama dalam saluran reproduksi betina sebelum membuahi ovum.

## 2. Deteksi birahi

Deteksi birahi adalah salah satu faktor yang sangat menentukan sukses atau tidaknya program IB pada ternak. Menurut hasil penelitian dinyatakan bahwa reproduksi yang baik ditunjukkan terdeteksi atau tidaknya sapi tersebut pada waktu birahi (Sugoro, 2009).

Menurut Feradis (2010<sup>a</sup>), beberapa tanda-tanda sapi estrus antara lain:

- a. Sapi terlihat resah dan gelisah, beberapa mencari perhatian dengan menempatkan kepalanya pada punggung sapi dewasa yang terdapat dalam kelompok ternak,

- b. Sering berteriak,
- c. Suka menaiki dan dinaiki sesamanya,
- d. Vulva: bengkak, berwarna merah, bila diraba terasa hangat, keluar lendir dari vulva yang bening dan tidak berwarna
- e. Nafsu makan menurun.

Siklus estrus pada sapi berlangsung selama 21 hari. Rata-rata estrus berlangsung selama 18 jam dan ovulasi dimulai 11 jam kemudian. Ukuran korpus luteum meningkat dari hari ke-3 sampai hari ke-12 siklus estrus. Konsentrasi progesteron dalam darah dan susu mengikuti pola yang sama yaitu konsentrasi yang sangat rendah dari hari ke-1 sampai hari ke-3 siklus, meningkat dengan cepat pada hari ke-4 sampai hari ke-12 (setelah perkembangan korpus luteum), dan tetap konstan sampai hari ke-16 sampai ke-18, kemudian turun dengan cepat 2-4 hari sebelum estrus. Menurunnya ukuran korpus luteum karena tidak adanya fertilisasi sehingga terjadi penurunan progesteron yang sangat banyak. Dari hari ke-4 setelah penurunan, timbulnya konsepsi hampir tidak ada, dan produksi progesteron akan dimulai lagi dengan siklus selanjutnya (Toelihere, 2009).

Interval antara timbulnya satu periode berahi ke permulaan periode berikutnya disebut sebagai suatu siklus berahi. Siklus berahi pada dasarnya dibagi menjadi 4 fase atau periode yaitu ; proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus (Marawali, Hine dan Belli. 2001).

### 3. Inseminator

Inseminator merupakan petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan atau kawin suntik serta memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi (SIMI). Selain inseminator dari pemerintah ada juga inseminator mandiri yang berasal dari khalayak peternak atau masyarakat yang telah memperoleh pelatihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan atau kawin suntik (Bailey dan Buhr, 1994).

Keahlian inseminator dalam melaksanakan Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu dari lima faktor penentu keberhasilan IB. Inseminator berperan sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan IB. Keahlian dan keterampilan inseminator dalam akurasi pengenalan birahi, sanitasi alat, penanganan (*handling*) semen beku, pencairan kembali (*thawing*) yang benar, serta kemampuan melakukan IB akan menentukan keberhasilan. Indikator yang paling mudah untuk menilai keterampilan inseminator adalah dengan melihat persentase atau angka tingkat kebuntingan (*Conception Rate, CR*) ketika melakukan IB dalam kurun waktu dan pada jumlah ternak tertentu (Herawati, Dkk, 2012).

### 4. Kesehatan reproduksi

Menurut Bailey dan Buhr (1994), Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan reproduksi pada induk ternak secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu:

- a. Gangguan hormon reproduksi seperti; *Corpus Luteum Persisten*, sering berkaitan dengan adanya kelainan Patologi Uterus atau produksi susu yang

tinggi pada awal Laktasi. *Ovaria sistica*, ada hubungannya dengan gangguan hormon Gonadotropin yang dihasilkan oleh Hipofisa anterior seperti LH. *Hipofungsi Ovarium*, dapat terjadi sebagai akibat menurunnya hormon Gonadotropin karena berbagai sebab, seperti manajemen pakan yang kurang baik atau lingkungan yang tidak sesuai.

- b. Manajemen seperti; manajemen pakan, lingkungan, serta manajemen reproduksi seperti, deteksi birahi yang jelek.
- c. Penyakit khususnya, penyakit kelamin menular yang disebabkan oleh berbagai penyakit, seperti: Infeksi bakteri (*Brucellosis*, *Vibriosis*, *Leptospirosis*), Infeksi virus (*Infectious Bovine Rhinotrachitis (IBR)*, *Bovine Viral Diarrhea (BVD)*, *Blue Tongue* dan *Epidermis Vaginitis*), Infeksi Protozoa (*Trichomoniasis*), Infeksi Jamur (*Aspergilosis*), dan Infeksi yang lain (*Mycoplasma*).
- d. Kelainan anatomi alat kelamin yang bersifat menurun (genetik), seperti : *Hypoplasia Ovarium*, *Hypoplasia Uterus*, *Sista*. Pada lantai Vagina, *Hymen Persisten*, *Free Martin*.
- e. Kelainan Patologis pada alat kelaminnya karena berbagai sebab, misalnya: Pada Ovarium terdapat bentukan *Ovaritis*, *Tumor*. Pada Uterus dalam bentuk *Endometritis*, *Mucometra*, *Hydrometra*, *Maserasi foetus*, *Inolusi Uterus* yang terlambat, *Tumor*. Pada Vagina dan Serviks berupa *Servicitis*, *Abses* dan *tumor Serviks Vaginitis*, *Abses Vagina*, *Haemaxon*.
- f. Lingkungan yang tidak sesuai, seperti: kandang yang terlalu panas, kandang yang terlalu berdesak-desakan, dan sanitasi kandang yang kurang baik.

Faktor terpenting dalam pelaksanaan inseminasi adalah ketepatan waktu pemasukan semen pada puncak kesuburan ternak betina. Puncak kesuburan ternak betina adalah pada waktu menjelang ovulasi. Waktu terjadinya ovulasi selalu terkait dengan periode berahi. Pada umumnya ovulasi berlangsung sesudah akhir periode berahi. Ovulasi pada ternak sapi terjadi 15-18 jam sesudah akhir berahi atau 35-45 jam sesudah munculnya gejala berahi. Sebelum dapat membuahi sel telur yang dikeluarkan sewaktu ovulasi, spermatozoa membutuhkan waktu kapasitasasi untuk menyiapkan pengeluaran enzim-enzim zona pelucida dan masuk menyatu dengan ovum menjadi embrio (Hafez, 1993). Waktu kapasitasasi pada sapi, yaitu 5-6 jam (Bearden dan Fuqual, 1997). Oleh sebab itu, peternak dan petugas lapangan harus mutlak mengetahui dan memahami kapan gejala birahi ternak terjadi sehingga tidak ada keterlambatan IB. Kegagalan IB menjadi penyebab membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan peternak (Sugoro, 2009).

Apabila semua faktor di atas diperhatikan diharapkan bahwa hasil IB akan lebih tinggi atau hasilnya lebih baik dibandingkan dengan perkawinan alam. Hal ini berarti dengan tingginya hasil IB diharapkan efisiensi produktivitas akan tinggi pula, yang ditandai dengan meningkatnya populasi ternak dan disertai dengan terjadinya perbaikan kualitas genetik ternak, karena semen yang dipakai berasal dari pejantan unggul yang terseleksi. Dengan demikian peranan bioteknologi IB terhadap pembinaan produksi peternakan akan tercapai (Sugoro, 2009).

Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan mutu genetik ternak. Melalui kegiatan IB, penyebaran bibit unggul ternak sapi

dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak (Sugoro, 2009).

Ada dua teknik inseminasi, yaitu menggunakan metode *speculum* atau *vaginoscope* dan metode *rectovaginal*.

#### 1. *Speculum* atau *vaginoscope*

Metode *speculum* atau *vaginoscope* tidak efektif pada sapi, karena membutuhkan tabung *speculum* yang banyak dan membutuhkan sterilisasi, sehingga tidak efisien. Tetapi, metode ini tidak membutuhkan keterampilan dan banyak latihan, karena lebih mudah dilakukan (Ihsan, 1997).

#### 2. Metode *Rectovaginal*

Semen yang digunakan pada metode ini adalah semen beku dengan menggunakan peralatan insemination gun untuk deposisi semen dalam bentuk straw kedalam alat kelamin betina. Alat ini terbuat dari stainless steel yang diselubungi plastic sheat. Peralatan lainnya dalam metode ini adalah container yang berisi nitrogen cair untuk menyimpan semen beku yang terbuat dari aluminium (Toelihere, 1993).

Keberhasilan IB pada ternak ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kualitas semen beku (*straw*), keadaan sapi betina sebagai akseptor IB, ketepatan IB, dan keterampilan tenaga pelaksana (inseminator). Faktor ini berhubungan satu dengan yang lain dan bila salah satu nilainya rendah akan menyebabkan hasil IB juga akan rendah, dalam pengertian efisiensi produksi dan reproduksi tidak optimal (Toelihere, M,R, 1997).

### ***E. Parameter Keberhasilan Inseminasi Buatan***

Inseminasi buatan merupakan program yang telah dikenal oleh peternak sebagai teknologi reproduksi ternak yang efektif. Parameter IB yang dapat dijadikan tolak ukur guna mengevaluasi efisiensi reproduksi sapi betina adalah *Service per Conception (S/C)*, *Conception Rate (CR)*, dan *Calving Interval (CI)* dengan menggunakan data sekunder dari recording reproduksi (Feradis, 2010<sup>a</sup>).

Untuk memperoleh informasi secepat mungkin, perlu digunakan teknik-teknik fertilitas, yang dapat memberikan gambaran umum untuk penilaian pelaksanaan IB, seperti *Conception Rate (CR)*, *Calving Interval (CI)* dan *Service Per Conception (S/C)*. Ukuran terbaik dalam penilaian hasil IB adalah prosentase sapi bunting pada inseminasi pertama, dan disebut *Conception Rate (CR)* atau angka konsepsi yang ditentukan berdasarkan hasil diagnose kebuntingan dalam waktu 40-60 hari sesudah IB (Tolihere, 2005).

#### ***1. Service per Conception (S/C)***

*Service per Conception (S/C)* adalah untuk membandingkan efisiensi relatif dari proses reproduksi diantara individu-individu sapi betina subur, juga sering dipakai untuk penilaian atau perhitungan jumlah pelayanan inseminasi yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi (Feradis, 2010<sup>a</sup>).

Menurut Toelihere (1993), *Service per Conception (S/C)* merupakan bilangan yang menunjukkan service atau inseminasi per kebuntingan. Kisaran S/C yang normal adalah 1,6 sampai 2,0. Makin rendah nilai tersebut, makin tinggi

kesuburan ternak betina dalam kelompok tersebut, sebaliknya makin tinggi nilai S/C, maka makin rendah nilai kesuburan ternak betina dalam kelompok tersebut.

*Service per Conception* dapat dihitung dengan rumus:

$$S/C = \frac{\sum \text{straw yang digunakan}}{\sum \text{ternak yang bunting}}$$

## 2. *Conception Rate (CR)*

Menurut Wiryosuhanto (1990), *Conception Rate (CR)* adalah persentase kebuntingan sapi betina pada pelaksanaan IB pertama dan dapat dipakai sebagai alat ukur tingkat kesuburan. Ternak yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi, CR bisa mencapai 60% sampai 70% dan apabila CR setelah inseminasi pertama lebih rendah dari 60% sampai 70% berarti kesuburan ternak terganggu atau tidak normal. *Conception Rate* juga dapat dihitung dengan cara :

$$CR = \frac{\sum \text{betina bunting pada IB pertama}}{\sum \text{seluruh betina yang di IB}} \times 100\%$$

## 3. *Calving Interval*

*Calving Interval*/Jarak Beranak adalah jumlah hari/bulan antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya. Panjang pendeknya selang beranak merupakan pencerminan dari fertilitas ternak, selang beranak dapat diukur dengan masa laktasi ditambah masa kering atau waktu kosong ditambah masa kebuntingan, selang beranak yang ideal pada sapi perah adalah 12 bulan termasuk selang antara beranak dengan perkawinan pertama setelah beranak (Sudono, 1983).

Jarak beranak yang panjang disebabkan oleh anestrus pasca beranak (62%), gangguan fungsi ovarium dan uterus (26%), 12 % oleh gangguan lain (Toelihere, M, R. 1981). Dalam upaya memperbaiki produktivitas dan reproduktivitas sapi perah yang mengalami keadaan seperti diatas, perlu dilakukan penerapan teknologi reproduksi secara terpadu antara induksi birahi dan ovulasi dengan Inseminasi Buatan (IB) pada waktu yang ditentukan/*Fixed Time Artificial Inseminasi* (AI) (Siregar. S.B., 1992).

Panjangnya periode waktu dari kelahiran sampai estrus pertama merupakan sebagian besar faktor yang ikut menyebabkan rendahnya efisiensi reproduksi. Jarak beranak yang lama atau panjang menyebabkan turunnya produksi susu secara keseluruhan pada sapi perah, penurunan jumlah pedet yang dihasilkan, peningkatan biaya produksi dan perkandangan untuk pemeliharaan, oleh sebab itu kerugian besar jika potensi untuk menghasilkan pedet terganggu karena kegagalan sapi menjadi bunting. Periode anestrus yang panjang pada sapi pasca beranak dan menyusui akan menurunkan jumlah pedet yang dihasilkan dan dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan sapi potong (Sudono, 1983).

Evaluasi keberhasilan pelaksanaan IB di suatu daerah dapat juga dilihat dari perkembangan jumlah akseptor (peserta IB) setiap tahunnya, di mana hal ini mencerminkan adanya perubahan pemahaman dan wawasan peternak pemilik sapi potong terhadap inovasi teknologi IB sehingga dapat dengan cepat menambah popuasi ternak potong dari hasil IB tersebut (Angga Dwi Prasetya, 2013).

## ***F. Kerangka Pikir***

### **1. *Service per Conception (S/C)***

*Service Per Conception* adalah jumlah pelayanan IB yang digunakan untuk memperoleh kebuntingan atau konsepsi pada kelompok akseptor IB (Susilawati,2011).

Dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa bangsa sapi yang memiliki nilai S/C yang tinggi yaitu sapi brahman dengan SC, sedangkan bangsa sapi yang memiliki nilai S/C yang rendah yaitu sapi bali dengan nilai S/C rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sapi brahman memiliki tingkat kesuburan lebih rendah di banding sapi bali, limosin dan simental. Hal ini sesuai dengan dilaporkan Janudeen dan Hafez (2008), bahwa S/C normal adalah 1,6-2,1 dan semakin rendah nilainya maka semakin tinggi pula nilai kesuburannya. Hasil uji statistik dengan one way anova ternyata bahwa S/C sapi brahman berpengaruh nyata terhadap S/C sapi bali. Hal ini menunjukkan rata-rata S/C sapi bali lebih baik di bandingkan S/C sapi brahman.

### **2. *Conception Rate (CR)***

Conception Rate/angka konsepsi adalah persentase akseptor yang mengalami kebuntingan (Susilawati, 2011). Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa sapi bali menunjukkan angka konsepsi yang tinggi dibandingkan dengan bangsa sapi brahman,limosin, dan simmental yaitu CR, pada IB pertama angka konsepsi sapi bali lebih tinggi karena secara genetik sapi bali memiliki efisiensi produksi yang lebih baik bila dibandingkan dengan sapi impor. Hal ini sesuai dengan Hastuti (2008), menyatakan bahwa betina keturunan bangsa sapi import

cenderung memiliki tingkat kesuburan yang rendah bila di IB. Lebih lanjut Williamson and Payne (1993), melaporkan bahwa sapi bali mempunyai tingkat kesuburan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sapi zebu. Sapi bali merupakan bangsa sapi asli Indonesia sehingga tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi.

### **3. Calving Interval/ CI**

Jarak beranak yang panjang disebabkan oleh anestrus pasca beranak (62%), gangguan fungsi ovarium dan uterus (26%), 12 % oleh gangguan lain (Toelihere, M, R. 1981). Dalam upaya memperbaiki produktivitas dan reproduktivitas sapi perah yang mengalami keadaan seperti diatas, perlu dilakukan penerapan teknologi reproduksi secara terpadu antara induksi birahi dan ovulasi dengan Inseminasi Buatan (IB) pada waktu yang ditentukan/*Fixed Time Atrificial Inseminasi* (AI) (Siregar. S.B., 1992).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, pada bulan Februari sampai Maret tahun 2017. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa telah berhasil dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan.

##### ***B. Populasi dan Sampel***

Populasi dalam penelitian ini diambil secara *sampling* yaitu peternak yang memiliki minimal satu ekor sapi betina yang pernah beranak dengan menggunakan teknologi inseminasi buatan (IB) yaitu sebanyak 289 peternak. Berhubung dengan populasi yang sifatnya menyebar diantara lokasi tersebut, maka dilakukan pengambilan sampel secara Analisis deskriptif dengan menggunakan rumus deskriptif menurut Umar (2001) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

e = Tingkat galat (10%)

Tingkat galat 10% digunakan dengan dasar jumlah populasi tidak lebih dari 2000, sehingga jumlah sampel yang didapatkan yaitu.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{289}{1 + 289(10\%)^2}$$

$$n = \frac{289}{1 + 289(0,01)}$$

$$n = \frac{289}{3,89}$$

$$n = 72,61 = 73 \text{ peternak}$$

Jumlah sampel di ambil secara *purposivesampling* yaitu peternak 73 responden yang memiliki minimal satu ekor sapi betina yang pernah beranak yang menggunakan teknologi Inseminasi Buatan (IB)

### C. Variabel yang Diamati

Variabel yang diamati dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. *Calving Interval (C/I)* Jarak Beranak adalah jumlah hari/bulan antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya.
2. *Service per Conception (S/C)* yaitu: Jumlah Pelayanan IB yang di butuhkan seekor betina sampai terjadi kebuntingan atau konsepsi
3. *Conception Rate (C/R)* yaitu: Presentase sapi betina yang bunting pada IB pertama

#### ***D. Jenis dan Pengumpulan Data***

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. yaitu data yang berbentuk angka yang meliputi, jumlah pelayanan IB, jumlah betina yang di IB, seluruh betina yang bunting hasil IB, jumlah betina yang bunting hasil IB pertama, Data Realisasi Kegiatan Inseminasi Buatan pada, dan Data Rekapitulasi Kelahiran Inseminasi Buatan (IB), Jumlah Hari/bulan antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya, jumlah peternak yang menerapkan IB.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari tanggapan peternak terhadap pelaksanaan IB, pengetahuan peternak terhadap tanda-tanda berahi serta perubahan reproduksi yang mengacu pada efisiensi reproduksi dari pelaksanaan IB. Data sekunder diperoleh dari kartu IB atau hasil recording pelaksanaan IB di Kabid Peternakan dan Inseminator Kecamatan Tombolo pao Kabupaten Gowa.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Observasi yaitu pengamatan langsung dilokasi penelitian dalam hal ini di peternak sapi yang menerapkan teknologi inseminasi buatan (IB) Kecamatan Tombolo pao Kabupaten Gowa.
2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada para peternak sapi yang menerapkan teknologi inseminasi buatan (IB) yang menjadi responden peneliti. Untuk memudahkan proses wawancara

tersebut digunakan bantuan kuisioner atau daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai kebutuhan penelitian.

#### ***F. Teknik Analisa Data***

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif, dan analisis regresi pada tingkat kepercayaan 90% untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan persamaan regresi sebagai berikut:

Dengan model pendugaan sebagai berikut::

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + c \pi$$

Dimana:

$Y_1$  = Populasi ternak hasil IB

$X_1$  = S/C, *Service per Conception*

$X_2$  = C/R *Conception Rate*

$X_3$  = *Calving Interval*

$\pi$  = variable lain yang tidak diteliti

1. Untuk Mengetahui *Service per Conception (S/C)* yaitu dengan rumus :

$$S/C = \frac{\sum \text{straw yang digunakan}}{\sum \text{ternak yang bunting}}$$

2. Untuk mengetahui *Conception Rate (C/R)* yaitu dengan rumus :

$$CR = \frac{\sum \text{betina bunting pada IB pertama}}{\sum \text{seluruh betina yang di IB}} \times 100\%$$

3. *Calving Interval* (CI) adalah jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya pada ternak betina



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kira-kira 110 km dari Kota Makassar ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Gowa terletak pada 12°38.16" BT sampai 05°33.6" BT dan 12°33.19" BT sampai 13°15.17"BT. Membentang antara Laut Jeneberang dan GunungBawakaraeng dengan ketinggian dari permukaan laut 1400 sampai ketinggian lebih dari 2830 Mdpl .Secara umum luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup>



Gambar 1. Peta Wilayah Administasi Kabupaten Gowa

##### 2. Batas-batas Wilayah

Kabupaten Gowa mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar

### **3. Wilayah Administrasi**

Secara administrasi, Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dengan 167 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Gowa terdiri dari 18Kecamatan. Kecamatan Tombolopao merupakan kecamatan terluas yaitu 251,82 km<sup>2</sup> sedangkan Kacamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa tidak semua memiliki tingkat keberhasilan inseminasi buatan.

#### **B. Karakteristik Responden di Kecamatan Tombolopao**

Karakteristik responden dilakukan untuk mengetahui identitas peternak yang terlibat dalam penelitian ini. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peternak yang dijadikan sampel. Namun demikian seorang peternak tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usahanya dalam beternak antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama beternak, dan jumlah ternak yang di pelihara.

Tabel 1. Karakteristik Responden di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No	Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Umur :		
	<20	2	2,73
	20-40	39	53,42
	>40	32	43,83
2.	Jenis Kelamin:		
	Laki-laki	71	97,26
	Perempuan	2	2,7
3.	Pendidikan Terakhir		
	SD	45	61,64
	SMP	15	20,54
	SMA	11	15,06
	Sarjana	2	2,7
4.	Jumlah ternak		
	<5	46	63,01
	5-10	25	34,24
	>10	2	2,7

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa, hampir semua umur responden berada pada rentang umur 20-40 tahun yang dapat di golongan kategori produktif. Umur 20-40 tahun dengan persentase sebanyak 53,42 %, umur > 40 tahun sebanyak 48,83 %. Sedangkan peternak yang dalam usia muda/kurang produktif < 20 tahun adalah 2 orang persentase sebanyak 2,73 %. Jadi anggota masyarakat yang berpartisipasi mengembangkan Inseminasi Buatan di Kecamatan Tombolopao tergolong dalam usia produktif atau usia kerja. Persentase yang tinggi pada tingkat umur muda diharapkan dapat menjamin tingkat produktivitas yang tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Saragih (2000) bahwa usia

mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja pada jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik.


Masyarakat Kecamatan Tombolopao yang beternak bukan hanya laki-laki saja akan tetapi perempuan juga ikut serta dalam beternak meski persentase antara laki-laki dengan perempuan sangat jauh berbeda akan tetapi semangat dalam beternak sangat tinggi. Sampel di kecamatan Tombolopao menunjukkan jumlah peternak laki-laki 71 orang sebanyak 97,2% sedangkan perempuan 2 orang sebanyak 2,7 %. Jadi anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan Inseminasi Buatan di Kecamatan Tombolopao bukan hanya laki-laki namun perempuan juga ikut serta dalam pengembangan tersebut.

Pendidikan merupakan suatu indikator mampu tidaknya individu dalam menerima inovasi atau ilmu pengetahuan. Tingkat pendidikan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan Inseminasi Buatan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa rata-rata memiliki pendidikan yang berbeda-beda.

Pendidikan SD sebanyak 45 orang atau sebanyak 61,64%, SMP sebanyak 15 orang atau sebanyak 20,54%, SMA sebanyak 11 orang atau 15,06 %, dan sarjana sebanyak 2 orang atau 2,7%. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa responden yang memelihara sapi potong taraf pendidikannya masih rendah. Tetapi rendahnya pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi atau keterlibatan responden dalam pengembangan Inseminasi Buatan.

Namun peternak atau responden yang memiliki pola pikir yang baik, dia mampu mengadopsi pengembangan informasi dan inovasi teknologi khususnya teknologi di bidang peternakan dengan cepat. Tetapi lain halnya pada peternakan

rakyat, pendidikan yang tinggi sama sekali tidak mempengaruhi masyarakat pedesaan yang terlibat dalam pemeliharaan ternak sapi . Dalam hal ini sudah terbukti bahwa keadaan masyarakat yang ada di pedesaan lebih banyak pendidikan SD yang berpartisipasi dalam pengembangan Inseminasi Buatan dibanding masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasbullah (2009) yang menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupannya yang lebih tinggi dalam arti mental

Di kecamatan Tombolopao menunjukkan bahwa pengalaman responden dalam peningkatan Inseminasi Buatan sangat bervariasi rata-rata memiliki pengalaman berkisar antara < 10 tahun sebanyak 17 orang atau 21,25%, 10-20 tahun sebanyak 43 orang atau 53,75%, dan > 20 tahun sebanyak 20 orang atau 25,%.  


### ***C. Karakteristik Inseminator***

Di kecamatan Tombolopao hanya 1 orang inseminator dan hanya menangani wilayah tersebut. Meskipun hanya berpendidikan pada sekolah umum SMA namun sebagai pendidikan formal namun sangat mahir dan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai inseminator. Keahlian sebagai inseminator diperoleh melalui pendidikan Inseminasi (kusus IB) sebagai syarat untuk menjadi inseminator. Pendidikan IB ini di peroleh melalui pelatihan di Balai Besar IB singosari dan Lembang Jawa barat dan pelatihan IB daerah. Hal ini diharapkan agar inseminator yang menjalankan tugasnya benar-benar berkualitas.

Inseminator di Kecamatan Tombolopao sudah sangat berpengalaman, sebagaimana diketahui bahwa pengalaman seorang inseminator menentukan tingkat ketepatan waktu inseminasi buatan, serta tepatnya penempatan semen dalam saluran reproduksi betina, yang semuanya merupakan factor penunjang keberhasilan suatu program IB. keberhasilan IB di kecamatan Tombolopao.

#### ***D. Keberhasilan Inseminasi Buatan***

Tingkat keberhasilan IB sangat dipengaruhi oleh empat factor yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yaitu pemilihan sapi akseptor, pengujian kualitas semen, akurasi deteksi birahi oleh para peternak dan keterampilan inseminator. Dalam hal ini inseminator dan peternak merupakan ujung tombak pelaksanaan IB sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap berhasil atau tidaknya program IB di lapangan.

kesuksesan suatu program IB tergantung kualitas semen yang digunakan, ketepatan penempatan spermatozoa pada lokasi yang tepat di saluran reproduksi betina dan pada waktu yang tepat pula, sehingga spermatozoa yang berkualitas baik dapat bertemu dengan sel telur untuk terjadinya pembuahan. Upaya yang dilakukan agar penempatan semen di saluran reproduksi betina dapat dilakukan secara tepat waktu adalah dengan melaksanakan program sinkronisasi birahi.

Tabel, Keberhasilan Inseminasi Buatan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, dilihat dari *Conception Rate CR*, *Servis per Conception S/C* dan *Calving Interpal C/I*

Kinerja Reproduksi	Nilai	Jumlah dari Sampel (ekor)	Persentase (%)	Keterangan
C/R	<60 %	10	13,69	Rendah
	60-70 %	18	24,65	Sedang

	>75 %	45	61	Tinggi
	Total	73	100	
S/C	<3	70	95,89	Tinggi
	3	3	4,1	Sedang
	>3	-	-	-
	Total	73	100	
CI	<12	-	-	-
	12	-	-	-
	>12	73	100	Tinggi
	Total	73	100	

Sumber; Data Primer yang Telah Diolah, 2016

### 1. Conception Rate C/R

Conception Rate CR Merupakan persentase kebuntingan sapi betina pada pelaksanaan IB pertama dan dapat dijadikan sebagai alat ukur kesuburan ternak. Keberhasilan IB di kecamatan tombolopao sangat baik karena di peroleh 60-70 persen Nilai ini berada pada kisaran yang dinyatakan oleh *Conception Rate* diantaranya dipengaruhi oleh Gomes (1977) waktu yang tepat dalam pelaksanaan IB yaitu 12 jam setelah timbul gejala berahi dengan CR sebesar 75% dan 72% (Partodihardjo 1992).

Hasil penelitian Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) di Kabupaten Malang bahwa nilai CR sapi PO sebesar 75,34% dan Peranakan Limousin sebesar 66%. Angka CR pada kelompok ternak hasil penelitian juga dipengaruhi oleh besarnya rata-rata nilai S/C, sehingga semakin rendah S/C maka CR akan semakin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ihsan dan Wahjuningsih (2011) yang menyatakan bahwa angka konsepsi berkisar antara 64-65% menunjukkan bahwa tingkat keterampilan inseminator di lokasi

penelitian sangat baik. Hal ini ditunjukkan pula rendahnya angka S/C dibawah 1.5

Angka konsepsi di daerah penelitian sudah sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan di kecamatan tombolopao secara umum tergolong bagus, selain itu juga menunjukkan keterampilan dan kesiapan petugas inseminator dalam melakukan IB. Dengan tingginya angka konsepsi menunjukkan kesadaran peternak untuk mendukung program IB yang sudah meningkat.

## **2. Servis per Conception S/C**

Servis per Conception merupakan jumlah pelayanan IB sampai seekor betina menjadi bunting. Dari hasil penelitian diperoleh nilai S/C 1-2. Menurut Toelihere (1981) bahwa S/C yang baik adalah 1,6 sampai 2,0 kali servis. Angka S/C rasio di kecamatan tombolopao yang rata-rata menunjukkan 1-2 kali inseminasi kemudian ternak mengalami kebuntingan. Hal ini menunjukkan bahwa S/C di daerah penelitian sudah sangat bagus. Nilai S/C menunjukkan tingkat kesuburan ternak. Semakin besar nilai S/C semakin rendah tingkat kesuburannya. Tingginya nilai S/C disebabkan karena keterlambatan peternak maupun petugas IB dalam mendeteksi birahi serta waktu yang tidak tepat untuk di IB keterlambatan IB menyebabkan kegagalan kebuntingan.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah perkawinan diantaranya adalah keterampilan petugas inseminator. Pelaksanaan IB diwilayah Kecamatan Tombolopao dilakukan oleh petugas inseminator yang

berpengalaman menginseminasi cukup lama. Selain itu, inseminator di daerah penelitian memiliki sertifikat inseminasi dan surat izin melakukan Inseminasi Buatan (SIMI), memiliki keahlian PKB (Pemeriksaan Kebuntingan), Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian (2012) yang menyatakan bahwa pelaksanaan teknis IB di lapangan memerlukan petugas yang memiliki keterampilan khusus yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Apabila pelaksanaan IB di lapangan diserahkan kepada petugas yang belum atau tidak cukup mengikuti pelatihan teknis IB maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Untuk dapat melakukan inseminasi buatan, inseminator harus memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi Buatan (SIMI) yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi setempat.

Pelaksanaan IB dilakukan setelah peternak melaporkan kepada petugas inseminator yang selanjutnya akan datang ke peternak untuk melakukan IB. Susilawati (2011) menambahkan bahwa keterampilan inseminator dalam teknis IB diantaranya adalah *thawing*, deposisi semen dan ketepatan waktu IB. Proses *thawing* dilakukan dengan air dan disarankan suhu air tersebut ditingkatkan secara perlahan untuk mengurangi tingkat kematian sel sperma karena efek pada proses *thawing* sama dengan pada saat pembekuan.

Susilawati (2000) menambahkan bahwa ketepatan waktu IB adalah saat menjelang ovulasi, yaitu jika sapi menunjukkan tanda-tanda birahi sore maka pelaksanaan IB pagi hari berikutnya. Pelaksanaan IB sebaiknya tidak dilakukan pada siang hari karena lendir servik mengental pada siang hari, sedangkan pada pagi, sore maupun malam lender serviks menjadi encer. Hal

tersebut juga berdampak pada keberhasilan IB saat siang yang lebih rendah daripada saat pagi, sore dan malam. Spermatozoa juga sangat rentan terhadap panas sinar matahari sehingga pelaksanaan IB pada siang hari kurang menguntungkan.

Selain factor manusia kesuburan ternak juga sangat berpengaruh, betina keturunan exotic cenderung kesuburannya rendah bila di IB, akan tetapi bila di kawinkan secara alam (menggunakan pejantan pemacet) maka akan lebih baik.

Untuk mendapatkan berahi yang seragam pada waktu yang dikehendaki dapat dilakukan sinkronisasi berahi. Metode sinkronisasi ada beberapa macam, mulai dari yang sangat sederhana sampai penggunaan hormon. Metode sinkronisasi yang paling sederhana adalah dengan pola perubahan ekspose ternak pada cahaya, karena berahi pada ternak dipengaruhi oleh panjangnya waktu siang hari. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan pencampuran pejantan secara tiba-tiba. Betina yang dipisahkan dari pejantan dan kemudian secara tiba-tiba dicampurkan dengan pejantan, hal ini dapat merangsang betina untuk berahi.

***E. Hasil Evaluasi Hubungan Populasi dengan Tingkat Keberhasilan IB di Kecamatan Tombolopao***

Model	Coefesien	T	Sig
(Konstant)	0,718	0.779	0,438
S/C (X1)	0.553	3.299	0,001
C/R (X2)	0.903	9.582	0,000

CI (X3)	-0.058	-.991	325
R = 821			
F = 49,101			

*Sumber: Data Primer yang telah Diolah, 2016*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hubungan populasi dengan tingkat keberhasilan IB memperlihatkan hubungan yang nyata terhadap S/C dan C/R. Nilai S/C di daerah penelitian antara 1-2 kali. Pada analisis korelasi sederhana dengan rumus person antara Servis per Conception (X1) dengan populasi (Y) pada tingkat keberhasilan IB menunjukkan angka t 3.299 dengan tingkat signifikan  $0,001 < 0,05$  maka S/C berpengaruh nyata (Signifikan) terhadap tingkat keberhasilan IB di kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Hal ini mengindikasikan bahwa S/C di kecamatan tombolopao berada pada tingkat yang bagus. Rendahnya nilai S/C memberikan dampak yang positif bagi peternak dan inseminator. Sulaksono, dkk (2010) menyatakan bahwa tinggi rendahnya nilai S/C dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keterampilan inseminator, waktu dalam melakukan inseminasi buatan dan pengetahuan peternak dalam mendeteksi birahi. Angka S/C jika berada pada angka di bawah 2 yang berarti sapi masih dapat beternak 1 tahun sekali, apabila angka S/C di atas 2 akan menyebabkan tidak tercapainya jarak beranak yang ideal dan menunjukkan reproduksi sapi tersebut kurang efisien yang membuat jarak beranak menjadi lama, sehingga dapat merugikan peternak karena harus mengeluarkan biaya IB lagi. Penyebab

tingginya angka S/C umumnya dikarenakan: (1) peternak terlambat mendeteksi saat birahi atau terlambat melaporkan birahi sapi kepada inseminator, (2) adanya kelainan pada alat reproduksi induk sapi, (3) inseminator kurang terampil, (4) fasilitas pelayanan inseminasi yang terbatas, dan (5) kurang lancarnya transportasi Iswoyo dan Widiyaningrum, 2008).

*Conseption Rate* (CR) merupakan persentase kebuntingan sapi betina pada pelaksanaan IB pertama dan dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat kesuburan. Pada hasil penelitian antara *Conseption Rate* (X2) dengan populasi (Y) pada tingkat keberhasilan IB menunjukkan angka  $t = 9.582$  dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,005$  maka *Conseption Rate* (C/R) berpengaruh nyata (signifikan) terhadap tingkat keberhasilan IB di daerah tersebut. Fanani, dkk (2013), menyatakan bahwa CR yang baik mencapai 60-70%, sedangkan dari hasil penelitian dengan ditinjau dari angka konsepsinya menunjukkan hasil yang baik.

*Conception Rate* (CR) di lokasi penelitian sudah sangat baik, karena peternak di daerah Kecamatan Tombolopao sudah cermat dalam mengamati sapi yang birahi dengan melihat tingkah laku ternak yaitu, menunjukkan tingkah laku gelisah dan kurang tenang, nafsu makan berkurang dan sering keluar lendir, bengkak, merah, basah sehingga pada waktu sapi betina birahi peternak segera menghubungi inseminator. Menurut pendapat Rasad, dkk (2008) bahwa induk sapi yang pada saat tepat (birahi) akan memudahkan pelaksanaan IB, serta akan memberikan respon perkawinan yang positif,

sehingga hanya dengan satu kali perkawinan, akan menghasilkan kebuntingan hal ini berpengaruh terhadap CR.

Fanani, dkk (2013) menyatakan bahwa nilai CR ditentukan oleh kesuburan pejantan, kesuburan betina, dan teknik inseminasi. Kesuburan pejantan salah satunya merupakan tanggung jawab Balai Inseminasi Buatan (BIB) yang memproduksi semen beku disamping manajemen penyimpanan di tingkat inseminator. Kesuburan betina merupakan tanggung jawab peternak di bantu oleh dokter hewan yang bertugas memonitor kesehatan sapi induk. Sementara itu, pelaksanaan IB merupakan tanggung jawab inseminator. Apriem, dkk (2012) menjelaskan bahwa tinggi rendahnya CR dipengaruhi oleh kondisi ternak, deteksi birahi, deteksi estrus dan pengelolaan reproduksi yang akan berpengaruh pada fertilitas ternak dan nilai konsepsi

*Calving Interval* (CI)/ jarak beranak adalah jumlah hari/bulan antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya. Pada penelitian menunjukkan bahwa *Calving Interval* ( $X_3$ ) yang berada pada Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dengan nilai  $t = -0.991$  dengan tingkat signifikan 325, tidak memiliki pengaruh yang nyata pada tingkat keberhasilan IB. diantara variable tersebut maka *Calving Interval* yang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat keberhasilan IB di kecamatan Gantarangkeke., hal ini mengindikasikan bahwa *Calving Interval* di kecamatan gantarangkeke berada pada tingkat yang kurang bagus. Menurut data dilapangan tingginya persentase *Calving Interval* disebabkan oleh beberapa hal mulai dari manajemen pemeliharaan yang kurang bagus hingga manajemen pakan karena masih tergolong dengan skala

rumah tangga atau dengan kata lain pemeliharaan secara tradisional. Iskandar dan Farizal (2011) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi lamanya CI adalah kondisi lingkungan dan manajemen pemberian pakan. Hartatik dkk., (2009) menambahkan bahwa kualitas pakan yang kurang bagus dan jumlah yang kurang dapat mengganggu proses reproduksi ternak sehingga selain penundaan umur kawin pertama.

Berdasarkan output yang tertera pada tabel di atas diperoleh angka R Square 0.812. Hal ini diketahui bahwa R Square merupakan besarnya variansi yang di jelaskan oleh prediktor yaitu variabel devenden (Y) dan variabel Independen (X) besarnya kontribusi variabel Conception Rate, Servis per Conception dan Calving Interval terhadap tingkat keberhasilan IB di Kecamatan Tomboopao Kabupaten Gowa. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat keberhasilan IB di daerah tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Service Per Conception (S/C) merupakan bilangan yang menunjukkan service atau inseminasi perkebuntingan kisaran S/C yang normal adalah 1,6 sampai 2,0. Sedangkan Conception Rate (C/R) merupakan presentase kebuntingan sapi betina pada IB pertama dan dapat diukur tingkat kesuburannya C/R bisa mencapai 60% sampai 70% dan apa bila CR setelah inseminasi pertama lebih rendah dari 60% sampai 70% maka kesuburan ternak terganggu. Dan Calving Interval jarak beranak antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya, jarak beranak yang berkepanjangan disebabkan oleh estrus pasca beranak 62% gangguan fungsi ovarium dan uterus.

#### **B. Saran**

Sapi yang telah diinseminasi, sebaiknya jangan dilepas dahulu kedalam kelompok, untuk mencegah kegagalan inseminasi buatan. Peternak diharapkan mengetahui dengan baik gejala-gejala timbulnya birahi pada sapi, dan segera melapor ke Inseminator agar tidak terjadi keterlambatan inseminasi buatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfuri. 2010. *Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Ibnu Katsir*. Hal 73-74.
- Angga Dwi Prasetya. 2013. *Perbandingan Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan Pada Sapi Madura Dan Sapi Madrasin (Madura-Limousin) Di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*. Skripsi (Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya).
- Feradis. 2010. *Bioteknologi Reproduksi Pada Ternak*. Bandung: Alfa beta.
- Hafez, E.S.E. 1993. *Artificial insemination*. In: HAFEZ, E.S.E. 1993. *Reproduction in Farm Animals*. 6th Ed. Lea & Febiger, Philadelphia. pp. 424-439.
- Hardjopranto, 1995. *Ilmu Kemajiran pada Ternak*. Airlangga University Press, hal 103-114, 139-146.
- Hardjosubroto, W. 1994. *Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapang*. Alfa Beta. Bandung
- Herawati, T. 2012. *Peran Insiminator Dalam Keberhasilan Insiminasasi Buatan Pada Sapi: Hasil Penelitian Balai Penelitian Ternak*.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kariyasa, K. 2005. *Sistem Integrasi Tanaman Ternak dalam Reorientasi Kebijakan Pupuk*. Prosiding Seminar Nasional Sistem Integrasi Tanaman Ternak. Pusat Litbang Peternakan.
- Koibur, J.F. 2005. *Evaluasi Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan pada Sapi Bali di Kabupaten Jayapura*. Buletin Peternakan Vol. 29 (3), 2005. Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA Manokwari. Manokwari.
- Marawali, A., M.T. Hine, Burhanuddin, H.L.L. Belli. 2001. *Dasar-dasar ilmu reproduksi ternak*. Jakarta: Departemen pendidikan nasional direktorat pendidikan tinggi badan kerjasama perguruan tinggi negeri Indonesia timur.
- Merthajiwa. 2011. *Inseminasi Buatan (IB) atau Kawin Suntik pada Sapi*. Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, Bandung

- Partodihardjo, S. 1992. *Ilmu reproduksi hewan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Santosa, U., 1997. *Prospek Agribisnis Penggemukan Pedet*. Penebar Swadaya, Jakarta
- Siregar, S.B. 1992. *Dampak Jarak Beranak Sapi Perah Induk Terhadap Pendapatan Peternak Sapi Perah*. (BLPP Cinagara. Deptan).
- Sudono. 1983. *Produksi Sapi Perah, Departemen ilmu produksi ternak*. (Bandung: Fakultas peternakan IPB).
- Sugeng, Y.B. 2003. *Pembiakan Ternak Sapi*. Jakarta: Gramedia.
- Sugoro, I. 2009. *Pemanfaatan Inseminasi Buatan Untuk Meningkatkan Produktifitas Sapi*. Bandung: Kajian Bioetika Institut Teknologi Bandung
- Susilawati. 2011. *Inseminasi Buatan dengan Spermatozoa Beku Hasil Sexing pada Sapi*. Makalah Dipresentasikan Pada Kongres I Perkumpulan Teknologi Reproduksi Indonesia (PATRI) Denpasar Bali
- Syaifullah, 2013, *Beternak Sapi*. Tangrang: Infra Pustaka
- Saragih, B, 2000. *Agribisnis Berbasis Peternakan*. USESE Foundation dan Pusat Studi Pembangunan IPB.
- Sulaksono, A., Suharyati, S., dan Santoso, E. P. 2010. *Penampilan Reproduksi (Service Per Conception, Lama Bunting dan Selang beranak) Kambing Boerawa Di Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Gisting*. Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Lampung
- Toelihere, M, R. 1985. *Inseminasi Buatan pada Ternak*. (Bandung: Angkasa).
- Umam K., Kusrini N., Kurniati D. 2012. *Hubungan Antara Karakteristik Dengan Persepsi Peternak Terhadap Inseminasi Buatan Pada Sapi Potong Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang*. Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN

### A. Rata rata jumlah populasi sapi inseminasi buatan selama periode penelitian 60 hari

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

E = Tingkat galat (10%)

Tingkat galat 10% digunakan dengan dasar jumlah populasi tidak lebih dari 2000, sehingga jumlah sampel yang didapatkan yaitu.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{289}{1 + 289(10\%)^2}$$

$$n = \frac{289}{1 + 289(0,01)}$$

$$n = \frac{289}{3,89}$$

$$n = 72,61 = 73 \text{ peternak}$$

Jenis pengumpulan data sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + c \pi$$

Dimana:

$Y_1$  = Populasi ternak hasil IB

$X_1$  = *S/C, Service per Conception*

$X_2$  = *C/R Conception Rate*

$X_3$  = *Calving Interval*

$\pi$  = variable lain yang tidak diteliti

3. Untuk Mengetahui *Service per Conception (S/C)* yaitu dengan rumus :

$$S/C = \frac{\sum \text{straw yang digunakan}}{\sum \text{ternak yang bunting}}$$

4. Untuk mengetahui *Conception Rate (C/R)* yaitu dengan rumus :

$$CR = \frac{\sum \text{betina bunting pada IB pertama}}{\sum \text{seluruh betina yang di IB}} \times 100\%$$

*Calving Interval (CI)* adalah jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya pada ternak betina.

**B. Jumlah responden penelitian di kecamatan tomolopao kabupaten gowa,**

Tabel 1. Karakteristik Responden di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No	Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase (%)
3.	Umur :		
	<20	2	2,73
	20-40	39	53,42
	>40	32	43,83
4.	Jenis Kelamin:		

	Laki-laki	71	97,26
	Perempuan	2	2,7
3.	Pendidikan Terakhir		
	SD	45	61,64
	SMP	15	20,54
	SMA	11	15,06
	Sarjana	2	2,7
4.	Jumlah ternak		
	<5	46	63,01
	5-10	25	34,24
	>10	2	2,7

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016

**C. Rata-Rata Jumlah Keberhasilan Inseminasi Buatan Selama Periode Penelitian (60) hari.**

Tabel Nilai keberhasilan Inseminasi Buatan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, dilihat dari *Conseption Rate CR*, *Servis per Conception S/C*.

Kinerja Reproduksi	Nilai	Jumlah dari Sampel (ekor)	Persentase (%)	Keterangan
C/R	<60 %	10	13,69	Rendah
	60-70 %	18	24,65	Sedang
	>75 %	45	61	Tinggi
	Total	73	100	
S/C	<3	70	95,89	Tinggi
	3	3	4,1	Sedang
	>3	-	-	-
	Total	73	100	
CI	<12	-	-	-
	12	-	-	-
	>12	73	100	Tinggi
	Total	73	100	

Sumber; Data Primer yang Telah Diolah, 2016

***D. Hasil Evaluasi Hubungan Populasi dengan Tingkat Keberhasilan IB di Kecamatan Tombolopao***

Model	Coefesien	T	Sig
(Konstant)	0,718	0.779	0,438
S/C (X1)	0.553	3.299	0,001
C/R (X2)	0.903	9.582	0,000
CI (X3)	-0.058	-.991	325
R = 812 F = 49,101			

*Sumber: Data Primer yang telah Diolah, 2016*

#### D. Foto Kegiatan Penelitian



Gambar 1. Pedet yang baru di lahirkan



## RIWAYAT HIDUP



**Risal Arisandi** Lahir di Tombolopao pada tanggal 22 Februari 1993 anak pertama dari 2 bersaudara pasangan dari Nasir Dg. Sikki dan Hafsah Dg. Ngai. Penulis memulai jenjang pendidikan pada tahun 2000 di sekolah dasar di SDI Negeri 1 Tombolopao dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah SMP Negeri 1 Tombolopao dan selesai pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas di SMA 1 Tombolopao dan selesai pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012 melalui jalur SNMPTN dan diterima di Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Ilmu Peternakan. Saat ini penulis sedang menunggu ajal di jemput oleh sang pencipta, karena penulis sudah bosan hidup.

Terima kasih

ALA UDDIN  
M A K A S S A R