

**GAMBARAN PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK
DIARE DI RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2014**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**UMMI KALSUM
Nim. 70300110112**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tercurah kepada Rasulullah SAW yang pembawa syariah-Nya. Atas segala nikmat, karunia, pertolongan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Gambaran Perilaku Ibu Dalam Perawatan Anak Diare Di RSUD Haji Makassar Tahun 2014”

Dalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang penulis jumpai tapi syukur Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kerja keras, usaha, kesungguhan serta bantuan dan dukungan dari segala pihak baik dalam bentuk moril maupun materil, terutama dukungan dari orang tua tercinta Abd. Haris, S.Pd dan St. Junaedah S.Pd, segala kesulitan dapat dihadapi dan diatasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Qadir Gassing, HT, MA selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Sewang, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan

dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan.

3. Dr. Nur Hidayah S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan.
4. Eny Sutria S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. H. Suradi Efendi S.Kep., Ns., M.Kes., CWCC selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.Ag selaku Penguji II yang juga telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi ini.

9. Teman-teman ANG10PATI, khususnya keperawatan C yang selalu memberikan semangat dan menjadi sahabat bagi penulis.

10. Serta semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapat pahala dari Allah SWT.

Demikian yang dapat saya upayakan, saya menyadari, banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu segala bentuk saran dan kritik yang sifatnya membangun dari seluruh kalangan pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan tugas akhir ini.

Dan akhirnya, semoga apa yang telah saya sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat bernilai pahala disisi Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya pada kita semua.

Wa'assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Samata-Gowa Agustus 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Umami Kalsum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Tinjauan Umum Tentang Diare	9
B. Perilaku Ibu Dalam Perawatan Anak Diare	18
C. Kerangka Konsep	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36

C. Populasi, Sampel dan Sampling.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Kerangka Kerja	38
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Pengolahan Data.....	39
H. Analisis Data	39
I. Etika Penelitian	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar tahun 2014	40
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Suku Bangsa Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar tahun 2014	40
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar tahun 2014	41
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar tahun 2014	41
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Pemenuhan Cairan Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar tahun 2014.....	42
Tabel 6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Pemenuhan Nutrisi Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar tahun 2014.....	42
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Pencegahan Iritasi Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar tahun 2014.....	43
Tabel 8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Pencegahan Penyebaran Infeksi Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar tahun 2014	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian.....	34
Gambar 2. Kerangka Kerja.....	38



DAFTAR SINGKATAN

UNICEF : *United Nations Childrens Fund*

WHO : *World Health Organization*

RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah

ASI : Air Susu Ibu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Permohonan Menjadi Responden
2. Lembar Persetujuan Menjadi Responden
3. Kuisisioner Penelitian
4. Lembar Observasi
5. Master Tabel
6. Hasil Penelitian
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



ABSTRAK

Nama : Ummi Kalsum

Nim : 70300110112

Jurusan : Ilmu Keperawatan

Fakultas : Ilmu Kesehatan

Judul : Gambaran Perilaku Ibu Dalam Perawatan Anak Diare Di RSUD Haji Makassar Tahun 2014

Diare ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dari biasanya (> 3 hari/hari) disertai perubahan konsistensi tinja (menjadi cair) dengan/tanpa darah dan/atau lendir. Diare masih merupakan masalah yang cukup serius karena mortalitas dan morbiditasnya masih tinggi. Dalam perawatan anak diare di rumah sakit, keluarga dalam hal ini ibu harus dilibatkan dalam membantu perawatan anak agar asuhan keperawatan dapat berjalan optimal sesuai dengan prinsip *family centre care*. Beberapa hal yang perlu dilakukan ibu dalam merawat anak diare di rumah sakit yaitu pemenuhan kebutuhan cairan, pemenuhan nutrisi, pencegahan iritasi dan pencegahan infeksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam perawatan anak diare di RSUD Haji Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif untuk menggambarkan perilaku ibu dalam perawatan anak diare di RSUD Haji Makassar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling* yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel penelitian berjumlah 30 orang dan dilakukan di ruang perawatan anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar.

Analisis data dilakukan secara univariat dengan hasil menunjukkan bahwa perilaku ibu dalam perawatan anak diare di RSUD Haji Makassar yang meliputi pemenuhan kebutuhan cairan, pemenuhan nutrisi, pencegahan iritasi dan pencegahan infeksi tergolong baik.

Perilaku ibu menjadi sangat penting karena didalam merawat anaknya, ibu seringkali berperan sebagai pelaksana dan pembuat keputusan dalam pengasuhan anak, ibu adalah orang yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan anak. Sehingga ibu harus dapat mengetahui dengan baik perilaku yang seharusnya dilakukan pada anak yang sedang diare dan dalam penelitian ini, perilaku ibu yang mencakup pemenuhan kebutuhan cairan, pemenuhan nutrisi, pencegahan iritasi dan pencegahan infeksi masuk dalam kategori baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dari biasanya (> 3 hari/hari) disertai perubahan konsistensi tinja (menjadi cair) dengan/tanpa darah dan/atau lendir (Suratmaja, 2010).

Diare adalah pengeluaran feses yang tidak normal dan cair. Bisa juga didefinisikan sebagai buang air besar yang tidak normal dan berbentuk cair dengan frekuensi lebih banyak dari biasanya. Bayi dikatakan diare bila sudah lebih dari 3 kali buang air besar, sedangkan neonatus dikatakan diare bila sudah lebih dari 4 kali buang air besar (Dewi, 2010).

Diare dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti infeksi yang terjadi dalam saluran pencernaan dan merupakan penyebab utama terjadinya diare yang meliputi infeksi bakteri, infeksi virus enterovirus dan infeksi parasit. Malabsorpsi karbohidrat, lemak dan protein. Dapat pula disebabkan oleh makanan yang basi, beracun dan alergi. Psikologis juga dapat menyebabkan diare misalnya rasa takut dan cemas (Dewi, 2010). Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman juga berkontribusi pada diare (UNICEF, 2012).

Meningkatkan pengetahuan masyarakat termasuk pengetahuan tentang hygiene kesehatan dan perilaku cuci tangan yang benar dapat mengurangi angka kesakitan diare sebesar 45%. Menurut Lee Yong Wook dengan meningkatkan suplai air bersih dapat mengurangi angka kesakitan diare 6% -

25% termasuk memperhatikan faktor-faktor terkait lainnya (Kemenkes RI, 2011).

Menurut *World Health Organization* (WHO) and UNICEF, ada sekitar 2 milyar kasus penyakit diare diseluruh dunia setiap tahun dan 1,9 juta anak-anak di bawah umur 5 tahun meninggal karena diare setiap tahun, terutama di negara berkembang. Jumlahnya mencapai 18% dari semua kematian anak-anak di bawah umur 5 tahun dan rata-rata lebih dari 5000 anak meninggal setiap hari karena penyakit diare. Hampir semua kematian anak karena diare, 78% terjadi di Afrika dan wilayah Asia Selatan-Timur. Hampir setiap anak berumur dibawah 5 tahun mengalami rata-rata 3 kali kejadian diare setiap tahun, serentak diumur ini diare adalah penyebab kematian kedua (setelah pneumonia), dan insiden serta resiko kematian dari diare ini merupakan yang terbesar pada anak dikisaran umur ini (*World Gastroenterology Organization*, 2012).

Bersama dengan pneumonia, diare menjadi penyebab dari kira-kira 40% dari semua kematian anak di dunia setiap tahun. Ini melebihi dari kematian yang disebabkan AIDS, malaria dan penyakit lain. Afrika dan Asia Selatan adalah tempat dengan kejadian 80% dari kematian anak karena diare (UNICEF & WHO, 2009).

Diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia karena morbiditas dan mortalitasnya masih tinggi. Pada tahun 2000 IR penyakit diare 310/1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374/1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423/100

penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk. Diare termasuk dalam 10 penyakit yang menimbulkan kejadian luar biasa. Berdasarkan laporan STP KLB tahun 2010 diare menempati urutan ke 6 frekuensi KLB terbanyak. Kematian KLB diare tahun 2010 terbanyak terjadi di provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Timur kemudian disusul Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Tenggara dan Bengkulu (Kemenkes RI, 2011).

Di Sulawesi Selatan, diare masih sering menimbulkan KLB yang cukup banyak bahkan menimbulkan kematian. Jumlah kasus/penderita diare yang dapat dihimpun melalui laporan dari 23 kabupaten/kota selama tahun 2003 adalah sekitar 172.742 penderita dengan kota Makassar sebesar 115,04%. Untuk tahun 2004 kasus diare dilaporkan sebanyak 177.409 kasus (cakupan 68,70%) dengan kematian sebanyak 66 orang (CFR: 0,04%). Jumlah kasus tertinggi pada kelompok umur > 5 tahun (91.379 kasus) kematian 29 orang dan kelompok umur 1-4 tahun (57.087 kasus) kematian 17 orang, kelompok umur < 1 tahun (28.946 kasus) kematian 20 orang. Untuk kasus diare selama tahun 2005 tercatat sebanyak 188.168 kasus (72,87%) dengan kematian sebanyak 57 orang (CFR: 0,03%). Jumlah kasus tertinggi pada kelompok umur > 5 tahun (100.347 kasus) dengan kematian 19 orang dan kelompok umur 1-4 tahun (60.794 kasus) kematian 13 orang, pada kelompok umur < 1 tahun (27.029 kasus) dengan kematian 25 orang. Tahun 2006 tercatat sebanyak 173.359 kasus dengan kasus di kota Makassar sebesar 142,86%, dengan jumlah kasus tertinggi berada pada kelompok umur > 5 tahun (92.241 orang) dengan kematian terbanyak pada kelompok umur 1-4 tahun sebanyak

17 orang. Pada tahun 2007 jumlah kasus tertinggi berada pada kelompok umur < 5 tahun sebanyak 93.560 kasus. Pada tahun 2008, kasus tertinggi masih di kota Makassar (45.929 kasus) dan pada tahun 2009 sebanyak 226.961 kasus dan tertinggi di kota Makassar sebanyak 45.014 kasus (Dinkes Sul-Sel, 2010).

Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2011, jumlah penderita diare sebanyak 37.940 orang atau sebesar 68,9% (Profil Kesehatan Kota Makassar, 2012).

Menurut data SDKI 2012 di Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 110 anak dibawa ke fasilitas/petugas kesehatan karena menderita diare.

Dilihat berdasarkan golongan umur, kasus pada KLB diare lebih banyak terjadi pada golongan umur 1-4 tahun kemudian golongan 20-44 tahun. Prevalensi diare tertinggi adalah pada anak berumur 12-23 bulan, diikuti umur 23-45 bulan dan 6-11 bulan (Kemenkes RI 2011).

Berdasarkan data dari RSUD Haji Makassar yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan, di ruang perawatan anak Ar-Rahim, insiden diare pada anak meningkat dari tahun ke tahun. Insiden diare pada anak di tahun 2012 sebanyak 473 insiden, dengan insiden tertinggi pada anak 1-4 tahun dengan 293 insiden, pada golongan umur < 1 tahun sebanyak 180. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan insiden diare sebanyak 503 insiden. Dan pada 2014 bulan Januari insiden diare pada anak sebanyak 53 insiden.

Praktek keluarga dalam hal pengobatan diare juga masih rendah. Padahal keluarga merupakan unsur penting dalam perawatan anak. Anak selalu

membutuhkan orang tua selama di rumah sakit seperti dalam aktivitas bermain atau program perawatan lainnya seperti pengobatan. Keterlibatan orangtua dan kemampuan keluarga dalam merawat merupakan dasar dalam pemberian asuhan keperawatan yang berfokus pada keluarga (Hidayat, 2008).

Dari data IDHS (*Indonesia Demographic Health Survey*) 2007, penderita diare yang dibawa ke sarana kesehatan, pemberian cairan selama diare, pemberian makanan selama diare, pemberian oralit masih sangat rendah bahkan masih banyak penderita yang tidak diobati yaitu bayi di bawah 6 bulan (50,1%). Masih ada pula sekitar 15%-24% balita penderita diare yang diberikan cairan lebih sedikit/tidak diberikan dan pemberian makan yang lebih sedikit/tidak diberi bahkan lebih banyak lagi (44%-48%). Data-data ini menunjukkan perilaku keluarga tentang perawatan anak diare masih sangat rendah di Indonesia (Kemenkes RI, 2011).

Dari uraian diatas, terjadi peningkatan insiden diare pada anak dan data-data yang menunjukkan perilaku keluarga tentang perawatan anak diare masih sangat rendah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti perilaku ibu dalam perawatan anak diare di rumah sakit.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti memfokuskan rumusan masalah mengenai bagaimana gambaran perilaku ibu dalam perawatan anak diare di RSUD Haji Makassar ?

C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

Batasan operasional variabel yang akan diteliti yaitu perilaku ibu dalam perawatan anak diare yang mencakup pemenuhan cairan yaitu ibu memantau masukan dan keluaran cairan, memantau rehidrasi oral pada anak diare, tidak memberikan cairan yang terlalu manis serta memantau cairan infus dan melaporkan kepada petugas kesehatan apabila infus habis atau tidak mengalir dengan baik. Pemenuhan nutrisi yaitu ibu melakukan pemenuhan nutrisi dengan cara tetap memberikan makanan pada anak diare, membujuk anak agar tetap makan serta tidak membatasi makanan jika anak ingin makan yang lebih banyak sehingga pemenuhan nutrisinya tidak terganggu. Memberikan ASI sesering mungkin dan selama yang anak mau, memberikan susu formula pada anak yang minum susu formula yang tidak berpengaruh terhadap diare anak. Pencegahan iritasi dalam hal ini yaitu ibu memantau dan merawat anak agar tidak terjadi iritasi disekitar anus akibat terlalu sering defekasi dengan cara mengganti popok sesering mungkin, menjaga kulit disekitar anus tetap bersih dan kering, mengobservasi adanya tanda-tanda iritasi dan melaporkan kepada perawat atau dokter bila terjadi iritasi. Pencegahan penyebaran infeksi yaitu ibu melakukan upaya agar tidak terjadi penularan infeksi dengan cara mencuci tangan sebelum menyentuh anak, setiap selesai buang air bersih atau setelah membersihkan tinja anak dan sebelum menyuapi anak. Serta membuang popok bekas pakai pada tempatnya.

Kriteria Objektif :

Baik : bila responden mencapai skor > 36

Cukup : bila responden mencapai skor $= 36$

Kurang: bila responden mencapai skor < 36

D. Kajian Pustaka

Neff (2003) dalam Saleba (2008) menjelaskan bahwa beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan penderitaan anak dan keluarga menjadi berkurang ketika keluarga dilibatkan dalam perawatan anaknya. Frekuensi anak menangis berkurang, rasa gelisah pada anak berkurang, kebutuhan obat menurun, dan pemulangan lebih cepat ketika konsep *family centre care* diterapkan.

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Diketuainya gambaran perilaku ibu dalam perawatan anak diare

b. Tujuan Khusus

1) Diketuainya ibu melakukan pemenuhan kebutuhan cairan anak diare di RSUD Haji Makassar

2) Diketuainya ibu melakukan pemenuhan nutrisi pada anak diare di RSUD Haji Makassar

3) Diketuainya ibu melakukan pencegahan iritasi pada anak diare di RSUD Haji Makassar

4) Diketahuinya ibu melakukan pencegahan infeksi pada anak diare di
RSUD Haji Makassar

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada institusi pendidikan agar lebih mengajarkan cara perawatan anak diare yang baik dan benar

b. Bagi Profesi Keperawatan

Sebagai informasi dan bahan masukan bagi tenaga perawat agar dapat mengajarkan kepada ibu cara merawat anak diare yang benar

c. Bagi Masyarakat

Sebagai penambah wawasan bagi masyarakat dalam melakukan perawatan yang baik dan benar pada anak yang menderita diare

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Diare

1. Definisi diare

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dari biasanya (> 3 hari/hari) disertai perubahan konsistensi tinja (menjadi cair) dengan/tanpa darah dan/atau lendir (Suratmaja, 2010).

Diare adalah perubahan frekuensi dan konsistensi tinja. WHO pada tahun 1984 mendefinisikan diare sebagai berak cair tiga kali atau lebih dalam sehari semalam (24 jam) para ibu mungkin mempunyai istilah tersendiri seperti lembek, cair, berdarah, berlendir atau dengan muntah (muntaber). Penting untuk menanyakan kepada orang tua mengenai frekuensi dan konsistensi tinja anak yang dianggap sudah tidak normal (Widoyono, 2011).

Anak-anak dengan nutrisi yang kurang, kesehatan yang buruk dan lingkungan yang buruk lebih memungkinkan terkena diare dan dehidrasi daripada anak-anak yang sehat (UNICEF & WHO, 2009).

Selama anak diare, terjadi peningkatan hilangnya cairan dan elektrolit (natrium, kalium dan bikarbonat) yang terkandung dalam tinja cair anak. Dehidrasi terjadi bila hilangnya cairan dan elektrolit ini tidak

diganti secara adekuat sehingga timbullah kekurangan cairan dan elektrolit (WHO, 2009).

2. Etiologi diare

Menurut *World Gastroenterology Organization* (2012) di negara berkembang, bakteri dan parasit lebih umum menyebabkan diare.

- a. *Enterotoksogenik E. coli* (ETEC) penyebab diare
- b. *Enteropathogenic E.coli* (EPEC) jarang menyebabkan penyakit pada orang dewasa
- c. *Enteroinvasif E.coli* (EIEC) menyebabkan disentri
- d. *Enterohemorraghi E.coli* (EHEC) menyebabkan diare berdarah, kolitis hemoragik berat dan sindrom uremik hemolitik.

Pada anak, hampir semua jenis menyebabkan penyakit pada anak-anak di negara berkembang.

- a. *Enterocoagulative E. coli* (EaggEC) menyebabkan diare encer pada anak dan diare persisten pada anak yang dengan HIV
- b. *Enterotoxigenic E. coli* (ETEC) menyebabkan diare pada bayi dan anak di negara berkembang
- c. *Enteropathogenic E. coli* (EPEC) menyebabkan penyakit yang lebih umum pada anak-anak , 2 tahun dan diare persisten pada anak-anak.

Terdapat pula faktor selain infeksi yang dapat menyebabkan diare yaitu:

- a. Alergi makanan; susu, protein
- b. Gangguan metabolik atau malabsorpsi; penyakit *celiac*, *cystic fibrosis* pada pankreas

- c. Iritasi langsung pada saluran pencernaan oleh makanan
- d. Obat-obatan; antibiotik
- e. Penyakit usus; *colitis ulcerative, crohn disease, enterocolitis*
- f. Emosional atau stress
- g. Obstruksi usus

3. Klasifikasi diare

Diare terbagi menjadi dua berdasarkan waktu serangan

a. Diare akut

Diare yang terjadi secara mendadak pada bayi dan anak yang sebelumnya sehat. Virus merupakan penyebab yang paling umum di negara-negara berkembang.

b. Diare kronik

Diare yang berlanjut sampai 2 minggu atau lebih dengan kehilangan berat badan atau berat badan tidak bertambah (*failure to thrive*) selama masa diare tersebut. Diare kronik sering juga dibagi lagi menjadi

1) Diare persisten

Diare yang disebabkan oleh infeksi

2) *Protracted* diare

Diare yang berlangsung lebih dari 2 minggu dengan tinja cair dan frekuensi 4x atau lebih per hari

3) Diare intraktabel

Diare yang timbul berulang kali dalam waktu singkat (misalnya 1-3 bulan)

4) *Prolonged* diare

Diare yang berlangsung lebih dari 7 hari

5) *Chronic non spesific diarrhea*

Diare yang berlangsung lebih dari 3 minggu tetapi tidak disertai gangguan pertumbuhan dan tidak ada tanda-tanda infeksi maupun malabsorpsi.

4. Patofisiologi diare

Menurut Hidayat (2008) proses terjadinya diare dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan faktor diantaranya :

- a. Faktor infeksi, proses ini dapat diawali adanya mikroorganisme (kuman) yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Selanjutnya terjadi perubahan kapasitas usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus dalam absorpsi cairan dan elektrolit. Atau juga dikatakan adanya toksin bakteri akan menyebabkan sistem transpor aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit akan meningkat.
- b. Faktor malabsorpsi merupakan kegagalan dalam melakukan absorpsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi

pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus yang dapat meningkatkan isi rongga usus sehingga terjadilah diare

- c. Faktor makanan, ini dapat terjadi apabila toksin yang ada tidak mampu diserap dengan baik. Sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan yang kemudian menyebabkan diare.
 - d. Faktor psikologis, mempengaruhi terjadinya peningkatan peristaltik usus yang akhirnya mempengaruhi proses penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare.
5. Gambaran klinis diare

Menurut Widoyono (2011) beberapa gejala dan tanda diare :

- a. Gejala umum
 - 1) Bayi atau anak menjadi cengeng, gelisah, nafsu makan berkurang atau tidak ada
 - 2) Berak cair atau lembek dan sering adalah gejala khas diare, tinja mungkin mengandung darah atau lendir
 - 3) Muntah, biasanya menyertai diare pada gastroenteritis akut
 - 4) Demam, dapat mendahului atau tidak mendahului gejala diare
 - 5) Karena seringnya defekasi, anus dan sekitarnya lecet karena tinja makin lama menjadi makin asam akibat banyaknya asam laktat yang terjadi dari pemecahan laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus

- 6) Gejala dehidrasi, yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis, bahkan gelisah
- 7) Berat badan turun, pada bayi, ubun-ubun besar cekung, tonus dan turgor kulit berkurang, selaput lendir mulut dan bibir terlihat kering

b. Gejala spesifik

- 1) *Vibrio cholera*: diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan berbau amis
- 2) *Disenteriform*: tinja berlendir dan berdarah

Dampak utama diare adalah kematian yang disebabkan karena tubuh banyak kehilangan cairan yang disebut dehidrasi. Apabila tidak mendapat pertolongan dengan segera akan timbul penderitaan yang lebih berat hingga meninggal (Aa Pratama dkk, 2013)

6. Pencegahan

Menurut Kemenkes RI (2011) kegiatan pencegahan penyakit diare yang benar dan efektif yang dapat dilakukan adalah:

a. Pemberian ASI

ASI adalah makanan paling baik untuk bayi. Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan sampai umur 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini.

ASI bersifat steril, berbeda dengan sumber susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan-bahan dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang dapat menyebabkan diare.

Bayi harus disusui secara penuh sampai mereka berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan dari kehidupannya, pemberian ASI harus diteruskan sambil ditambahkan dengan makanan lain.

ASI mempunyai khasiat preventif secara imunologik dengan adanya antibodi dan zat-zat lain yang dikandungnya. ASI turut memberikan perlindungan terhadap diare. Pada bayi yang baru lahir, pemberian ASI secara penuh mempunyai daya lindung 4 kali lebih besar terhadap diare daripada pemberian ASI yang disertai dengan susu botol. Flora normal usus bayi yang disusui mencegah tumbuhnya bakteri penyebab diare untuk susu formula, berisiko tinggi menyebabkan diare yang dapat mengakibatkan terjadinya gizi buruk.

b. Makanan pendamping ASI

Pemberian makanan pendamping ASI adalah saat bayi secara bertahap mulai dibiasakan dengan makanan orang dewasa. Perilaku pemberian makanan pendamping ASI yang baik meliputi perhatian

terhadap kapan, apa dan bagaimana makanan pendamping ASI diberikan.

c. Menggunakan Air Bersih yang Cukup

Penularan kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui *face-oral* kuman tersebut dapat ditularkan bila masuk ke dalam mulut melalui makanan, minuman atau benda yang tercemar dengan tinja, misalnya jari-jari tangan, makanan yang wadah atau tempat makan minum yang dicuci dengan air tercemar.

Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air yang benar-benar bersih mempunyai risiko menderita diare lebih kecil dibanding dengan masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih.

Masyarakat dapat mengurangi risiko terhadap serangan diare yaitu dengan menggunakan air yang bersih dan melindungi air tersebut dari kontaminasi mulai dari sumbernya sampai penyimpanan di rumah. Yang harus diperhatikan oleh keluarga:

- 1) Ambil air dari sumber air yang bersih
- 2) Simpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup serta gunakan gayung khusus untuk mengambil air
- 3) Jaga sumber air dari pencemaran oleh binatang dan untuk mandi anak-anak
- 4) Minum air yang sudah matang (dimasak sampai mendidih)
- 5) Cuci semua peralatan masak dan peralatan makan dengan air yang bersih dan cukup

d. Mencuci tangan

Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, mempunyai dampak dalam dalam kejadian diare (menurunkan angka kejadian diare sebesar 47%).

Tangan pun dapat menjadi sumber penyebaran penyakit ketika tidak dalam keadaan bersih dari kuman. Jika tidak dihilangkan maka kuman yang tersentuh dapat ikut ke dalam makanan yang kita makan dan terjadi transfer kuman penyakit ke dalam tubuh yang pada akhirnya berujung pada sakit yang di derita salah satunya diare.

e. Menggunakan jamban

Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa upaya penggunaan jamban mempunyai dampak yang besar dalam penurunan resiko terhadap penyakit diare. Keluarga yang tidak mempunyai jamban harus membuat jamban dan keluarga harus buang air besar dijamban.

f. Membuang tinja bayi yang benar

Banyak orang beranggapan bahwa tinja bayi itu tidak berbahaya. Hal ini tidak benar karena tinja bayi dapat pula menularkan penyakit pada anak-anak dan orang tuanya. Tinja bayi harus dibuang secara benar.

B. Perilaku Ibu Dalam Perawatan Diare Pada Anak

1. Tinjauan Umum tentang Perilaku

Menurut J.P Chaplin, perilaku adalah sekumpulan reaksi, perbuatan, aktivitas, gabungan gerakan, tanggapan ataupun jawaban yang dilakukan seseorang seperti proses berpikir, bekerja, hubungan seks, dan sebagainya. Sedangkan menurut Branca, perilaku adalah reaksi manusia akibat kegiatan kognitif, afektif dan psikomotor yang saling berkaitan. Jika salah satu aspek mengalami hambatan maka aspek perilaku juga terganggu (Pieter, 2010).

Aspek dalam perilaku terdiri dari pengetahuan, sikap dan tindakan. Pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan mempresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek (Kusrini, 2006). Penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini (*awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption*) didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*) (Notoatmodjo, 2007).

2. Tinjauan Umum tentang Perawatan Anak

Keperawatan anak telah mengalami pergeseran yang sangat mendasar. Anak sebagai klien tidak lagi dipandang sebagai individu tunggal yang merupakan replika mini orang dewasa. Akan tetapi, anak merupakan makhluk unik yang memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda dengan orang dewasa (Arbianingsih, 2011). Keluarga merupakan unsur penting

dalam perawatan anak mengingat anak bagian dari keluarga, dengan demikian dalam pemberian asuhan keperawatan diperlukan keterlibatan keluarga. Hal ini sangat penting mengingat anak selalu membutuhkan orang tua selama di rumah sakit seperti dalam aktivitas bermain atau program perawatan lainnya seperti pengobatan (Hidayat, 2008).

Terkait dengan anak Al-quran mengingatkan dengan kehadiran anak, Allah SWT mencoba menguji manusia dengan tanggung jawab untuk merawat, mengasuh dan mendidiknya sebagai generasi penerus agar mereka kelak menjadi insan yang taqwa kepada Allah, sehat jasmani rohani, cerdas dan terampil. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-quran Surat At-Taghabun ayat 15:

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ رَاجِرٌ عَظِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan disisi Allah-lah pahala yang besar”

Dalam Quran surah Ali Imran ayat 35 digambarkan harapan orang tua terhadap masa depan anaknya

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

﴿ فَتَقَبَّلَنِي مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ ﴾

Terjemahnya:

“(ingatlah), ketika isteri Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dari beberapa ayat diatas menjelaskan mempunyai anak yang beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, cerdas dan terampil serta berakhlak baik dan tanggap terhadap sekitarnya mengisyaratkan keberhasilan orangtua dalam merawat dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Bila hasilnya berlawanan (sebaliknya) maka hal ini mengisyaratkan kekeliruan dan kesalahan dalam perawatan, asuhan dan didikannya (Wasiyah, 2013).

Selain itu, orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya, antara lain:

1) Hak Untuk Hidup

Hak hidup adalah suatu fitrah. Tidak ada suatu makhluk pun yang dapat memberikan kematian kepada yang lain, sebab itu hanya milik Allah sang Maha Pencipta. Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun baik karena alasan kemiskinan maupun alasan lain. Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim (Husein, 2003).

1) Memberi nama yang baik

Nama memiliki pengaruh penting dalam membangun kepribadian, cara hidup bahkan lingkungan. Nama yang baik itu sendiri pada dasarnya menjadi sumber pengharapan yang baik. Karena itu, sudah

seharusnya kedua orang tua memilih nama yang baik, hingga menjadi penginspirasi kebaikan bagi anak (Madhi, 2012)

2) Memberi pendidikan

Anak merupakan amanah yang menjadi tanggung jawab orang tuanya. Memelihara atau menjaga keluarga dari api neraka mengharuskan seseorang melakukan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya. Dimulai dari penanaman akidah yang benar, membiasakan ketaatan, menjaga shalat, membiasakan anak-anak membaca alquran dan berakhlak mulia (Al Basyir, 2014).

3) Memberi nafkah

Islam, dengan sangat terang menegaskan bahwa kewajiban setiap ayah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Orang tua dituntut berhati-hati dalam memilihkan nafkah keluarganya yang dimana harus halal wujudnya, halal sumber atau cara memperolehnya dan tidak bercampur dengan harta atau milik orang lain (Sumedi, 2010).

Orang tua juga berkewajiban memberikan makan dan minum kepada anak-anaknya dengan makanan-makanan yang halal dan dihasilkan dari yang halal pula. Artinya barang (dzatnya makanan itu) halal dan cara mendatangkan atau menghasilkannya dengan juga dengan cara yang halal. Itulah kewajiban orang tua kepada anak-anaknya agar kelak menjadi generasi yang taqwa dan penuh tanggung jawab karena makanan yang halal akan mempengaruhi perkembangan

tubuh anak, demikian pula makanan haram akan mempengaruhi perkembangan tubuh anak.

Ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang muslim disuruh memilih makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan dan keselamatannya (Asyhari dkk, 2001).

Makanan yang diberikan pada anak juga harus bersih, karena kebersihan makanan berpengaruh terhadap kesehatan anak. Makanan yang tercemar kotoran dapat menimbulkan berbagai penyakit (IRIB World Service, 2012).

3. Penatalaksanaan Diare Pada Anak Di Rumah Sakit

Selama anak diare terjadi peningkatan hilangnya cairan dan elektrolit (natrium, kalium dan bikarbonat) yang terkandung dalam tinja cair anak. Dehidrasi terjadi bila hilangnya cairan dan elektrolit ini tidak diganti secara adekuat, sehingga timbullah kekurangan cairan dan elektrolit. Derajat dehidrasi diklasifikasikan sesuai dengan gejala dan tanda yang mencerminkan jumlah cairan yang hilang. Rejimen dehidrasi dipilih sesuai dengan derajat dehidrasi yang ada. Selama diare penurunan asupan makanan dan penyerapan nutrisi dan peningkatan kebutuhan nutrisi, sering secara bersama-sama menyebabkan penurunan berat badan dan berlanjut ke gagal tumbuh. Pada gilirannya, gangguan gizi dapat menyebabkan diare menjadi lebih parah, lebih lama dan lebih sering terjadi, dibandingkan dengan kejadian diare pada anak yang tidak menderita gangguan gizi.

Lingkaran setan ini dapat diputus dengan memberikan makanan kaya gizi selama anak diare dan ketika anak sehat (WHO, 2009).

Beberapa penelitian FKUI (2002) melaporkan sebanyak 40% berkurangnya masukan makanan/minuman pada kejadian diare disebabkan karena kebiasaan yang salah dari orang tua yaitu menghentikan semua jenis makanan/minuman selama anak diare dengan maksud mengistirahatkan usus sehingga diare akan berkurang atau berhenti. Dikutip dari Maharani (2007) menyatakan bahwa merawat balita memang tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Apalagi bagi orang tua baru yang memiliki balita anak pertama (Aa Pratama dkk, 2013).

Penatalaksanaan diare pada anak di rumah sakit mengacu pada lima pilar WHO yaitu:

a. Berikan oralit

Perbaikan status dehidrasi sangat penting untuk menghindari kematian, dengan mengganti cairan dan garam yang hilang sampai perjalanan alamiah penyakit berhenti dengan sendirinya (Sri Suparyati 2011).

Untuk mencegah terjadinya dehidrasi dapat dilakukan mulai dari rumah tangga dengan memberikan oralit osmolaritas rendah, dan bila tidak tersedia berikan cairan rumah tangga seperti air tajin, kuah sayur, air matang. Oralit merupakan campuran garam elektrolit, seperti natrium klorida (NaCl), kalium klorida (KCl) dan trisodium sitrat hidrat, serta glukosa anhidrat. Oralit saat ini yang beredar dipasaran

sudah oralit yang baru dengan osmolaritas yang rendah, yang dapat mengurangi rasa mual dan muntah hingga 30%, mengurangi volume tinja hingga 25% dan mengurangi secara bermakna pemberian cairan melalui intravena sampai 33%. Oralit merupakan cairan yang terbaik bagi penderita diare untuk mengganti cairan yang hilang, walaupun air sangat penting untuk mencegah dehidrasi, air minum tidak mengandung garam elektrolit yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga lebih diutamakan oralit. Bila penderita tidak bisa minum harus segera dibawa ke sarana kesehatan untuk mendapat pertolongan cairan melalui infus (Kemenkes RI, 2011).

Menurut Kemenkes RI (2011) derajat dehidrasi dibagi dalam 3 klasifikasi:

1) Diare tanpa dehidrasi

Tanda diare tanpa dehidrasi bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

- a) Keadaan umum : baik
- b) Mata : normal
- c) Rasa haus : normal, minum biasa
- d) Turgor kulit : kembali cepat

Dosis oralit bagi penderita diare tanpa dehidrasi sebagai berikut:

- a) Umur < 1 tahun : $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ gelas setiap kali anak mencret
- b) Umur 1 – 4 tahun : $\frac{1}{2}$ - 1 gelas setiap kali anak mencret

c) Umur di atas 5 tahun : 1 – 1 ½ gelas setiap kali anak mencret

2) Diare dehidrasi ringan/sedang

Diare dengan dehidrasi ringan/sedang, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

- a) Keadaan umum : gelisah, rewel
- b) Mata : cekung
- c) Rasa haus : haus, ingin minum banyak
- d) Turgor kulit : kembali lambat

Dosis oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama 75 ml/kg bb dan selanjutnya diteruskan dengan pemberian oralit seperti diare tanpa dehidrasi

3) Diare dehidrasi berat

Diare dehidrasi berat, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

- a) Keadaan umum : lesu, lunglai, atau tidak sadar
- b) Mata : cekung
- c) Rasa haus : tidak bisa minum atau malas minum
- d) Turgor kulit : kembali sangat lambat (lebih dari 2 detik)

Penderita diare yang tidak dapat minum harus segera dirujuk ke Puskesmas untuk diinfus.

b. Berikan obat Zink

Zink merupakan salah satu mikronutrien yang penting dalam tubuh. Kemampuan zink untuk mencegah diare terkait dengan kemampuannya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Zink dapat menghambat enzim INOS (*inducible Nitric Oxide Synthase*), dimana ekskresi enzim ini meningkat selama diare dan mengakibatkan hipersekresi epitel usus. Zink juga berperan dalam epitalisasi dinding usus yang mengalami kerusakan morfologi dan fungsi selama kejadian diare (Kemenkes RI, 2011).

Untuk mengganti zink yang hilang selama diare, anak dapat diberikan zink yang akan membantu penyembuhan diare serta menjaga anak tetap sehat. Sejak tahun 2004, WHO dan UNICEF menandatangani kebijakan bersama dalam hal pengobatan diare yaitu pemberian oralit dan zink selama 10-14 hari. Hal ini didasarkan pada penelitian selama 20 tahun (1980-2003) yang menunjukkan bahwa pengobatan diare dengan pemberian oralit disertai zink lebih efektif dan terbukti menurunkan angka kematian akibat diare pada anak-anak sampai 40% (Depkes RI, 2011).

Pemberian zink selama diare terbukti mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan kekambuhan kejadian diare pada 3 bulan berikutnya (Kemenkes RI, 2011).

Zink dapat menurunkan insiden diare untuk 2-3 bulan, membantu menurunkan angka kematian anak dengan diare persisten (*World*

Gastroenterology Organization, 2012). Menurut Kemenkes RI (2011) penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa zink mempunyai efek protektif terhadap diare sebanyak 11% dan menurut hasil pilot study menunjukkan bahwa Zink mempunyai tingkat hasil guna sebesar 67% (Hidayat 1998 dan Soenarto 2007). Berdasarkan bukti ini semua anak diare harus diberi Zink segera saat anak mengalami diare.

Dosis pemberian Zink pada balita:

- a) Umur < 6 bulan : ½ tablet (10 Mg) perhari selama 10 hari
- b) Umur > 6 bulan : 1 tablet (20 Mg) perhari selama 10 hari

Zink tetap diberikan selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti.

Cara pemberian tablet zink yaitu larutkan tablet dalam 1 sendok makan air matang atau ASI, sesudah larut berikan pada anak diare.

Untuk anak yang lebih besar, zink dapat dikunyah. Zink aman dikonsumsi bersamaan dengan oralit.

c. Pemberian ASI/makanan

Pemberian makanan selama diare bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita terutama anak agar tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan (Kemenkes RI, 2011).

Jika anak masih mendapatkan ASI maka teruskan pemberian ASI sebanyak yang dia mau. Jika anak mau lebih banyak dari biasanya itu akan lebih baik. Biarkan anak makan dan selama yang dia mau (Depkes RI, 2011). Anak yang minum susu formula juga diberikan lebih sering dari biasanya. Anak usia 6 bulan atau lebih termasuk bayi

yang telah mendapatkan makanan padat harus diberikan makanan yang mudah dicerna dan diberikan sedikit demi sedikit dan lebih sering. Setelah diare berhenti pemberian makanan ekstra diteruskan selama 2 minggu (Kemenkes RI, 2011).

Allah SWT bahkan berfirman dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai anjuran memberikan ASI

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”

Ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya. Ini berarti bahwa al-Quran sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan (Shihab, 2009).

d. Pemberian antibiotika hanya atas indikasi

Antibiotika tidak boleh digunakan secara rutin karena kecilnya kejadian diare pada balita disebabkan oleh bakteri. Antibiotika hanya bermanfaat pada penderita diare dengan darah (sebagian besar karena *shigellosis*) suspek kolera (Kemenkes RI, 2011). Apabila penyebabnya kolera maka diberikan tertrasiklin 25-5- mg/kg bb/hari atau antibiotik lainnya sesuai dengan jenis penyebabnya (Hidayat, 2008). Harus berhati-hati dalam penggunaan antibiotik karena jika antibiotik tidak dihabiskan sesuai dosis akan menimbulkan resistensi kuman terhadap antibiotik. Selain itu pemberian antibiotik yang tidak tepat bisa membunuh flora normal yang justru dibutuhkan tubuh. Efek samping dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional adalah timbulnya gangguan fungsi ginjal, hati dan diare yang disebabkan oleh antibiotik. Hal ini juga akan mengeluarkan biaya pengobatan yang seharusnya tidak diperlukan (Depkes RI, 2011).

e. Pemberian nasehat

Menurut Kemenkes RI (2011) ibu atau pengasuh yang berhubungan erat dengan balita harus diberi nasehat tentang:

- 1) Cara memberikan cairan dan obat di rumah
- 2) Kapan harus membawa kembali balita ke petugas kesehatan bila:
 - a) Diare lebih sering
 - b) Muntah berulang
 - c) Sangat haus

- c) Makan/minum sedikit
 - d) Timbul demam
 - e) Tinja berdarah
 - f) Tidak membaik dalam 3 hari
- f. Pada diare persisten

Menurut WHO (2009) diare persisten adalah diare akut dengan atau tanpa disertai darah dan berlanjut sampai 14 hari atau lebih. Jika terdapat dehidrasi sedang atau berat, diare persisten diklasifikasikan sebagai berat.

Penanganan dan perawatan pada diare persisten sebagai berikut:

1) Diare persisten berat

Larutan oralit efektif bagi kebanyakan anak dengan diare persisten. Perhatian khusus tentang pemberian makan sangat penting diberikan kepada semua anak dengan diare persisten. ASI harus terus diberikan sesering mungkin selama anak mau. Pada bayi di bawah umur 6 bulan, semangat ibu untuk memberi ASI eksklusif. Bantu ibu yang tidak memberi ASI eksklusif untuk memberi ASI eksklusif pada bayinya. Pada anak berumur 6 bulan atau lebih pemberian makan harus dimulai kembali segera setelah anak bisa makan. Makanan harus diberikan setidaknya 5 kali sehari untuk mencapai total asupan makanan setidaknya 110 kalori/kg/hari

2) Diare persisten tidak berat

Anak ini tidak memerlukan perawatan di rumah sakit tetapi memerlukan pemberian makan khusus dan cairan tambahan di rumah. Perhatian seksama pada pemberian makan sangatlah penting pada anak dengan diare persisten. Anak ini mungkin saja kesulitan dalam mencerna susu sapi dibanding ASI. Nasehati ibu untuk mengurangi susu sapi (susu formula) dalam diet anak untuk sementara. Teruskan pemberian ASI dan beri makanan pendamping ASI yang sesuai:

- a) Jika anak masih menyusu, beri ASI lebih sering, lebih lama, siang dan malam
- b) Jika anak minum susu formula, lihatlah kemungkinan untuk mengganti susu formula dengan susu formula bebas laktosa sehingga lebih mudah dicerna.

4. Perawatan Diare Pada Anak di Rumah Sakit

Menurut Sulisnadewi (2011) keluarga dapat dilibatkan dalam membantu perawatan anak sehingga asuhan keperawatan dapat berjalan optimal dan diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan. Kerjasama atau keterlibatan orangtua dengan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit selama anak masih dalam perawatan sangat diperlukan. Beberapa hal yang perlu dilakukan keluarga dalam hal ini dilakukan oleh ibu untuk mampu merawat anak yang mengalami diare di rumah sakit antara lain :

a. Cairan (membantu pemenuhan kebutuhan cairan)

Keluarga dapat dilibatkan dalam pemantauan masukan dan keluaran cairan, mengkaji tanda dehidrasi untuk menjamin hasil optimun dan memperbaiki kebutuhan terapeutik. Keluarga dapat memberikan cairan rehidrasi oral, memantau cairan infus dan melaporkan ke petugas kesehatan bila cairan habis atau tidak menetes secara baik. Cairan rehidrasi oral yang dapat diberikan antara lain oralit, larutan gula garam, air tajin, kuah sayur atau air matang (Subagyo & Santoso, 2011). Hindari pemberian cairan yang terlalu manis, seperti jus buah, atau teh yang terlalu manis dan minuman yang berkarbonat seperti *soft drink* (Wong, 2009)

b. Nutrisi (membantu memenuhi kebutuhan nutrisi)

Pemberian makanan harus diteruskan selama diare dan ditingkatkan setelah sembuh. Meneruskan pemberian makanan akan mempercepat kembalinya fungsi usus yang normal termasuk kemampuan menerima dan menyerap berbagai zat gizi. Makanan yang diberikan kepada anak diare tergantung pada umur, makanan yang disukai dan pola makan sebelum sakit serta budaya setempat. Pada umumnya makanan yang tepat untuk anak diare sama dengan yang dibutuhkan anak sehat. Bayi yang minum ASI harus disusukan sesering mungkin dan selama anak mau. Bayi yang tidak minum ASI harus diberi susu yang biasa diminum paling tidak setiap 3 jam. Apabila berdasarkan pertimbangan

medis, anak memerlukan susu rendah laktosa atau bebas laktosa, maka harus tetap diberikan sampai dua hari setelah diare berhenti kemudian dicoba lagi susu formula yang biasanya diminum secara bertahap. Pada anak yang beumur 4 bulan atau lebih dan sudah mendapat makanan lunak atau padat maka makanan ini harus diteruskan. Pada anak yang lebih besar, dapat diberikan makanan yang terdiri dari makanan pokok setempat seperti nasi kentang, gandum, roti (Subagyo & Santoso 2011).

Sering sekali balita yang terkena diare jika tidak diberikan asupan makanan yang sesuai umur dan bergizi akan menyebabkan anak kurang gizi, bila anak kurang gizi akan meningkatkan resiko anak terkena diare kembali (Kemenkes RI, 2011).

Jangan batasi makanan anak jika ia mau lebih banyak, karena lebih banyak makanan akan membantu mempercepat penyembuhan, pemulihan dan mencegah malnutrisi (Depkes RI, 2011).

c. Iritasi (mencegah dan merawat iritasi kulit akibat diare)

Menurut Wong (2009) anak yang mengalami diare, sangat berisiko mengalami iritasi kulit disekitar anus akibat seringnya defekasi. Untuk mencegah dan mengatasi iritasi kulit disekitar anus, hal-hal yang dapat dilakukan keluarga antara lain:


- 1) Mengganti popok setiap saat setelah buang air besar atau kecil

- 2) Menjaga kulit di sekitar anus tetap bersih dan kering
 - 3) Mengobservasi adanya tanda-tanda iritasi pada kulit seperti kemerahan atau lecet
 - 4) Melaporkan pada perawat atau dokter apabila terjadi kemerahan atau lecet pada kulit di sekitar anus dan memberikan salep pelindung sesuai instruksi dokter pada kulit yang teriritasi
- d. Mencegah penyebaran infeksi

Diare merupakan salah satu penyakit yang dapat menular kepada orang lain melalui fekal oral. Upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah penyebaran infeksi antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh anak, setiap selesai buang air besar atau membersihkan tinja anak sebelum menyuapi anak dan membuang popok bekas pakai pada tempatnya.

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang dibuat berdasarkan teori dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:



= variabel yang diteliti



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan perilaku ibu dalam perawatan anak diare

B. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi penelitian : RSUD Haji Makassar di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim
2. Waktu Penelitian : Penelitian dilaksanakan tanggal 5 Juni-3 Juli 2014

C. Populasi, Sampel dan Sampling

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki anak yang menderita diare yang dibawa dan dirawat di RSUD Haji Makassar periode Juni-Juli 2014.

Berdasarkan kunjungan di RSUD Haji Makassar jumlah pasien anak diare pada bulan Januari 2014 sebanyak 53 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak yang menderita diare yang dirawat di RSUD Haji Sul-Sel sebanyak 30 orang yang memenuhi kriteria inklusi.

Kriteria inklusi sebagai berikut:

a. Anak yang mengalami diare usia 0-3 tahun yang dirawat ke RSUD Haji Makassar

b. Orang tua anak bersedia menjadi responden

Kriteria eksklusi:

a. Anak yang tidak dirawat di RSUD Haji Makassar

b. Orang tua anak tidak bersedia menjadi responden


3. Sampling

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode aksidental sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan kebetulan bertemu.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan dan observasi untuk mengetahui perilaku ibu. Jenis yang digunakan adalah kuesioner tertutup dan terpimpin yang dimana responden hanya tinggal memilih dan menjawab pada jawaban yang sudah ada dan dengan menggunakan skala ordinal dengan interpretasi penelitian, apabila skor benar nilainya 1 dan apabila salah nilainya 0. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak RSUD Haji Makassar

E. Kerangka Kerja



Gambar 2. Kerangka Kerja

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrument yang digunakan adalah kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku ibu dalam perawatan anak diare dan lembar observasi untuk mengamati langsung perilaku ibu dalam perawatan anak diare

G. Pengolahan Data

Data diolah menggunakan komputer program SPSS 11,5 dengan tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:

1. Editing

Yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk diteliti kelengkapan, kejelasan makna jawaban, konsistensi maupun kesalahan antar jawaban pada kuisisioner

2. Coding

Yaitu memberikan kode-kode untuk memudahkan proses pengolahan data

3. Entry

Yaitu memasukkan data untuk diolah menggunakan komputer

4. Tabulating

Yaitu mengelompokkan data sesuai variabel yang akan diteliti agar mudah dijumlah, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisis

H. Analisis Data

Analisis data hasil dalam bentuk deskriptif kuantitatif dengan analisa univariat untuk menggambarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel.

I. Etika Penelitian

1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

Diberikan kepada responden sebelum dilakukan penelitian. Informed consent diberikan agar responden mengerti maksud dan tujuan peneliti. Jika responden bersedia maka responden harus menandatangani lembar persetujuan. Tetapi jika tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak responden

2. Tanpa Nama (*Anonimity*)

Yaitu tidak mencantumkan nama responden pada lembar data tetapi hanya menggunakan kode pada lembar data tersebut

3. Kerahasiaaan (*Confidentiality*)

Informasi responden dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil riset

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran secara umum responden (umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan) dan data khusus yang berkaitan dengan perilaku ibu dalam perawatan anak diare. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan responden yang memenuhi kriteria dan membacakan kuisioner setelah responden bersedia menjadi sampel penelitian.

Penelitian ini dilakukan di RSUD Haji Makassar pada tanggal 5 Juni sampai dengan 3 Juli 2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 sampel.

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan disajikan sebagai berikut:

1. Deskriptif Karakteristik Umum Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan. Adapun hasil tabulasi yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur
Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim
RSUD Haji Makassar tahun 2014

Umur	f	(%)
<20 tahun	4	13,3
20-30 tahun	16	53,4
31-40 tahun	9	30,0
>40 tahun	1	3,3
Jumlah	30	100,0

Sumber data : Data primer 2014

Tabel 4.1 menunjukkan kebanyakan responden berada pada rentang umur 20-30 tahun sebanyak 53,3%, dan yang paling sedikit responden dengan umur >40 tahun sebanyak 3,3%

b. Distribusi Responden Berdasarkan Suku Bangsa

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Suku Bangsa
Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim
RSUD Haji Makassar tahun 2014

Suku Bangsa	f	(%)
Bugis	1	3,3
Makassar	27	90,0
Mandar	1	3,3
Toraja	1	3,3
Jumlah	30	100,0

Sumber data : Data primer 2014

Tabel 4.2 menunjukkan kebanyakan responden dengan suku Makassar sebanyak 90,0% diikuti dengan suku Bugis, Mandar, Toraja masing-masing sebanyak 3,3%.

c. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan
Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim
RSUD Haji Makassar tahun 2014

Pendidikan	f	(%)
SD	13	43,4
SLTP	10	33,3
SMA	4	13,3
Diploma/PT	3	10,0
Jumlah	30	100,0

Sumber data : Data primer 2014

Tabel 4.3 menunjukkan kebanyakan responden dengan pendidikan SD sebanyak 43,3%, dan yang berpendidikan diploma atau perguruan tinggi sebanyak 3%

d. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim
RSUD Haji Makassar tahun 2014

Pekerjaan	f	(%)
Petani	0	0
PNS	0	0
IRT	30	100,0
Karyawati	0	0
Wiraswasta	0	0
Jumlah	30	100

Sumber data : Data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan semua responden berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

2. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yaitu pemenuhan cairan, pemenuhan nutrisi, pencegahan iritasi, pencegahan penyebaran infeksi di ruang perawatan anak Ar-Rahim RSUD Haji Makassar tahun 2014.

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Pemenuhan Cairan
Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim
RSUD Haji Makassar tahun 2014

Pemenuhan Cairan	f	(%)
Baik	30	100,0
Cukup	0	0
Kurang	0	0
Jumlah	30	100,0

Sumber data : Data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.5, didapatkan dalam pemenuhan cairan anak semua responden yang berjumlah 30 orang berperilaku baik (100,0%)

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Pemenuhan Nutrisi
Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim
RSUD Haji Makassar tahun 2014

Pemenuhan Nutrisi	f	(%)
Baik	30	100,0
Cukup	0	0
Kurang	0	0
Jumlah	30	100,0

Sumber data : Data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.6, didapatkan dalam pemenuhan nutrisi anak semua responden yang berjumlah 30 orang berperilaku baik (100,0%)

Tabel 4.7
 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Pencegahan Iritasi
 Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim
 RSUD Haji Makassar tahun 2014

Pencegahan Iritasi	F	(%)
Baik	30	100,0
Cukup	0	0
Kurang	0	0
Jumlah	30	100,0

Sumber data : Data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.7, didapatkan dalam pencegahan iritasi anak semua responden yang berjumlah 30 orang berperilaku baik (100,0%)

Tabel 4.8
 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Pencegahan
 Penyebaran Infeksi Di Ruang Perawatan Anak Ar-Rahim
 RSUD Haji Makassar tahun 2014

Pencegahan Penyebaran Infeksi	F	(%)
Baik	30	100,0
Cukup	0	0
Kurang	0	0
Jumlah	30	100,0

Sumber data : Data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.8, didapatkan dalam pencegahan penyebaran infeksi semua responden yang berjumlah 30 orang berperilaku baik (100,0%)

A. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Tingkat umur responden terbanyak yaitu berada pada kisaran umur 20-30 tahun sebanyak 16 orang (53,3%). Menurut Rahmawati (2011) menyatakan bahwa umur individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Gunarsa (2008) juga mengatakan bahwa tingkat kematangan, umur seseorang akan mempengaruhi dan menentukan sikap/perilaku orang tersebut. Dengan demikian, dengan bertambah matangnya umur seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dalam merawat anak diare.

Peneliti berpendapat bahwa semakin dewasa umur seorang ibu, maka semakin banyak pengetahuan terkait cara merawat anak diare sehingga semakin baik pula perilaku ibu dalam merawat anak diare.

b. Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi proses belajar. Makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi dari orang lain maupun media massa. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan seseorang. Dengan pendidikan yang tinggi, maka biasanya akan mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi dan perilaku yang lebih baik

dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan rendah. Namun perlu ditekankan bahwa, seseorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula (Widayatun, 2004).

Pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi perilaku ibu dalam merawat anak diare. Ibu yang mempunyai pendidikan yang tinggi diharapkan mempunyai daya terima yang lebih baik terhadap ilmu yang diterima sehingga diharapkan dapat dipraktikkan pada keluarga. Namun pendidikan yang rendah, tidak juga menjamin seorang ibu tidak mempunyai cukup pengetahuan mengenai perawatan anak diare. Adanya rasa ingin tahu yang tinggi dapat mempengaruhi ibu dalam mendapatkan informasi mengenai perawatan anak diare

Dalam penelitian ini, sebagian besar ibu berpendidikan SD yaitu sebanyak 13 orang (43,3%) tetapi perilaku dalam merawat anak diare tergolong baik. Hal ini dipengaruhi banyaknya informasi dari berbagai sumber yang telah diterima ibu terkait cara merawat anak diare yang benar, sehingga pengetahuan ibu tentang cara merawat anak yang diare juga semakin baik.

c. Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden dalam penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai IRT yaitu sebanyak 30 orang (100%). Walaupun dengan pekerjaan sebagai IRT, responden dalam penelitian ini memiliki perilaku yang baik dalam perawatan anak diare.

Menurut Istiari (2000) pengetahuan seseorang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti media massa maupun elektronik dan semakin banyak orang berinteraksi dengan orang lain, maka semakin banyak pula informasi yang didapat. Sehingga dalam hal ini, walaupun dengan pekerjaan sebagai IRT, responden tetap mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan perilaku ibu terkait cara merawat anak diare.

Terkait dengan pengetahuan, Allah SWT menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang berpengetahuan sebagaimana yang dalam Q.S Al-Mujadilah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فٱنشُرُواْ فٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ
وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang beriman yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ayat diatas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat oran berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat, yaitu yang lebih tinggi daripada yang sekedar beriman (Shihab, 2009).

2. Analisis univariat

Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang diteliti yaitu perilaku ibu dalam perawatan anak diare yang mencakup ibu memantau masukan dan keluaran cairan, memantau rehidrasi oral pada anak diare, tidak memberikan cairan yang terlalu manis serta memantau cairan infus dan melaporkan kepada petugas kesehatan apabila infus habis atau tidak mengalir dengan baik. Pemenuhan nutrisi yaitu ibu melakukan pemenuhan nutrisi dengan cara tetap memberikan makanan pada anak diare, membujuk anak agar tetap makan serta tidak membatasi makanan jika anak ingin makan yang lebih banyak sehingga pemenuhan nutrisinya tidak terganggu. Memberikan ASI sesering mungkin dan selama yang anak mau, memberikan susu formula pada anak yang minum susu formula yang tidak berpengaruh terhadap diare anak. Pencegahan iritasi dalam hal ini yaitu ibu memantau dan merawat anak agar tidak terjadi iritasi disekitar anus akibat terlalu sering defekasi dengan cara mengganti popok sesering mungkin, menjaga kulit disekitar anus tetap bersih dan kering, mengobservasi adanya tanda-tanda iritasi dan melaporkan kepada perawat atau dokter bila terjadi iritasi. Pencegahan penyebaran infeksi yaitu ibu melakukan upaya agar tidak terjadi penularan infeksi dengan cara mencuci tangan sebelum menyentuh anak, setiap selesai buang air bersih atau setelah membersihkan tinja anak dan sebelum menyuapi anak. Serta membuang popok bekas pakai pada tempatnya.

a. Pemenuhan Kebutuhan Cairan

Pemenuhan cairan dilakukan agar anak yang menderita diare tidak mengalami dehidrasi. Agar anak tidak mengalami dehidrasi, dapat diberikan ASI, susu formula, atau dapat diberikan cairan/minuman yang cocok dengan anak contoh kuah sayur, air tajin, kuah sup dan air minum (KEMENKES RI, 2013)

Pemantauan rehidrasi oral pada anak diare sangat penting dilakukan oleh ibu, agar kebutuhan cairan pada anak yang sedang mengalami diare dapat terpenuhi. Ibu dapat memberikan cairan lebih banyak dari biasanya, memberikan oralit, serta memantau kelancaran infus. Pengetahuan dan sikap tentang hal ini sangat penting bagi ibu, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Askrening (2007) yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dalam pemberian rehidrasi oral pada balita diare di Kabupaten Purworejo, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap tentang rehidrasi oral berhubungan dengan perilaku pemberian rehidrasi oral pada balita diare. Apabila ibu tidak mengetahui, tidak mengerti, ataupun memiliki persepsi yang salah mengenai rehidrasi pada anak diare, maka rehidrasi pada anak akan buruk. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosjidi dan Vrawati (2006) yang bertujuan mengevaluasi perilaku ibu dalam perawatan balita diare di Kabupaten Ponorogo, didapatkan hasil bahwa persepsi tentang penyakit diare dan oralit berhubungan dengan perilaku perawatan

balita diare, dimana persepsi negatif berpeluang melakukan perilaku yang salah dalam perawatan diare.

Dalam penelitian ini, dari 30 responden, semua dapat digolongkan baik dalam hal perawatan anak diare. Melalui hasil kuisioner dan hasil observasi, semua responden tahu dan mengerti dalam hal melakukan pemenuhan cairan. Diantaranya memberi minum yang lebih banyak pada anak yang mengalami dehidrasi, memantau infus anak dan melaporkannya dengan segera pada perawat jika infus habis serta tetap memberikan ASI pada anak yang masih menyusui dan memberikan susu formula pada anak yang minum susu formula. Pada penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwa perilaku ibu dalam pemberian cairan dalam hal ini ASI, susu formula dan air minum pada anak yang menderita diare tergolong baik. Ibu tetap membeikan cairan yang biasa diminum oleh anak tanpa membatasinya. Bagi ibu yang masih menyusui anaknya, ibu tetap memberikan ASI seperti sebelum anaknya sakit. Ibu tidak membatasi ataupun menghentikan asupan ASI pada anaknya.

Tetap memberikan ASI pada anak yang diare merupakan tindakan yang tepat. ASI mempunyai khasiat preventif secara imunologik dengan adanya antibodi dan zat-zat lain yang dikandungnya. ASI turut memberikan perlindungan terhadap diare. Pemberian ASI kepada bayi mempunyai daya lindung empat kali lebih besar dibanding bayi yang diberi susu botol (Depkes, 2002). Pemberian ASI eksklusif pada bayi

akan memberikan kekebalan terhadap berbagai ancaman penyakit karena ASI adalah cairan yang mengandung zat kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari bakteri, virus, jamur dan parasit, sehingga bayi yang mendapatkan cukup ASI dapat terlindung dari penyakit diare (Roesli, 2001). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamila (2005), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif lebih berisiko terhadap penyakit diare dibandingkan bayi yang mendapat ASI eksklusif.

b. Pemenuhan Nutrisi

Pemenuhan nutrisi pada anak yang mengalami diare dilakukan agar dapat membantu mempercepat penyembuhan, pemulihan dan mencegah malnutrisi. Anak yang mengalami diare tetap harus diberikan makanan seperti biasa dengan frekuensi lebih sering dan jangan membatasi makanan anak apabila anak mau makan lebih banyak. Bagi bayi yang masih menyusui dan belum mendapatkan makanan tambahan, ASI tetap diberikan seperti biasa (DEPKES RI, 2011). Jenis makanan yang dapat diberikan pada anak diare adalah ASI dan susu formula serta makanan lunak atau setengah padat (bubur atau nasi tim) serta memberikan bahan makanan yang mengandung kalori, protein, vitamin, mineral, dan makanan yang diberikan harus dalam keadaan bersih (Suratmaja, 2007)

Pada penelitian ini, semua responden dalam hal ini ibu, memahami cara memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak yang mengalami diare di

rumah sakit. Ibu memberikan asupan makanan pada anaknya dengan jumlah sedikit tetapi sering dan ibu memberikan makanan yang lunak. Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa ibu membujuk anaknya apabila anaknya tidak mau makan, karena kebiasaan pada anak ketika sakit, anak cenderung malas untuk makan. Sehingga diperlukan peran ibu untuk membujuk anaknya agar mau makan. Ibu juga tidak membatasi makanan yang diberikan pada anaknya. Apabila anaknya ingin makan lebih, ibu tetap memberikannya.

Hal ini disebabkan faktor pengalaman pribadi seorang ibu mempengaruhi pengetahuannya mengenai pemenuhan nutrisi. Ibu yang telah mempunyai pengalaman sebelumnya tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak lebih cenderung memiliki perilaku yang baik dalam hal ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (2010) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah pengalaman.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Anisa Dewati (2010) dengan tujuan penelitian mengetahui hubungan antara pengetahuan dan perilaku ibu dalam pemenuhan nutrisi. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan ibu akan diikuti oleh perilaku ibu dalam pemenuhan nutrisi yang setara.

Pemenuhan nutrisi pada anak diare sangat penting dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan status gizi pada anak. Karena status gizi berpengaruh terhadap kejadian penyakit diare. Pada anak

yang mengalami gizi buruk atau gizi kurang, dan mendapatkan asupan gizi yang kurang, maka akan mengakibatkan episode diare menjadi lebih lama dan sering. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisasmito (2007) yaitu penelitian faktor resiko diare di Indonesia, didapatkan hasil bahwa status gizi yang buruk merupakan faktor resiko terjadinya diare. Serta penelitian yang dilakukan oleh Shintamurniwaty (2005) yang menyatakan bahwa balita dengan status gizi rendah mempunyai resiko 4,21 kali lebih terkena diare dibanding balita dengan status gizi baik. Penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2007) juga menyatakan adanya hubungan antara status gizi yang buruk terhadap lamanya diare pada anak. Hubungan status gizi dengan lamanya diare bermakna secara statistik dimana semakin buruk gizi maka semakin lama diare yang diderita.

c. Pencegahan Iritasi

Anak yang mengalami diare sangat berisiko mengalami iritasi kulit disekitar anus akibat seringnya defekasi (Wong, 2009). Iritasi kulit anus pada anak diare disebabkan kontak iritan karena bahan kimia yang terkandung dalam urin dan feses. Penyebab utama terjadinya iritasi diantaranya lingkungan yang kurang bersih, kontak yang terlalu lama dan berulang dengan bahan iritan terutama feses atau urin, basah dan gesekan. Iritasi juga dapat terjadi karena pemakaian popok yang terlalu lama pada anak diare.

Pada penelitian ini, perilaku ibu dalam pencegahan iritasi termasuk dalam kategori baik. Sebanyak 30 responden melalui hasil kuisioner dan hasil observasi melakukan pencegahan iritasi dengan benar yaitu memperhatikan tanda-tanda iritasi disekitar anus anak, ibu juga mengganti popok sesering mungkin atau setelah anak buang air besar dan air kecil, membersihkan dan mengeringkan kulit anus anak setiap selesai BAB dan mengetahui tanda-tanda apabila terjadi iritasi yaitu terdapat kemerahan atau lecet pada kulit anus anak. Melalui hasil kuisioner dan observasi juga didapatkan bahwa ibu akan memberitahu perawat apabila terdapat tanda-tanda iritasi pada anak.

Iritasi pada kulit anus anak pada penelitian ini sebagian besar disebabkan penggunaan popok yang terlalu lama. Menurut Sugito (2002) menggunakan popok terutama popok sekali pakai yang melebihi daya tampungnya akan menyebabkan kulit menjadi lembab. Kulit yang lembab cenderung rentan terhadap gesekan dan lebih mudah mengalami iritasi. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karmi (2011) yang bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan popok terhadap kejadian ruam pada bayi usia 0-12 bulan yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan penggunaan popok dan frekuensi mengganti popok terhadap kejadian ruam pada bayi.

d. Pencegahan Penyebaran Infeksi

Diare merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebar melalui fekal oral. Upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah

penyebaran infeksi antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh anak, setiap selesai buang air besar atau setelah membersihkan tinja anak, sebelum menyiapkan makanan anak, sebelum menyuapi anak dan membuang popok bekas pakai pada tempatnya.

Perilaku mencuci tangan dapat mengurangi resiko penularan penyakit pada saluran cerna, karena banyak penyakit yang mudah ditularkan melalui makanan terkontaminasi atau dari tangan ke mulut (DEPKES, 2009). Kuman-kuman penyebab penyakit ditularkan melalui perantara air atau bahan yang tercemar tinja. Pada penularan seperti ini, tangan memegang peranan penting, karena lewat tangan yang tidak bersih makanan atau minuman yang tercemar kuman penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Pemutusan rantai penularan penyakit seperti ini sangat berhubungan dengan penyediaan fasilitas yang dapat menghalangi masuknya sumber perantara tersebut kedalam tubuh melalui mulut. Kebiasaan mencuci tangan memakai sabun adalah perilaku yang amat penting bagi upaya mencegah diare terutama setelah membersihkan tinja anak, sebelum menyiapkan makanan anak dan sebelum member makan anak (Iswari,2011). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sintamurniwaty (2006) yang menjelaskan bahwa orang tua yang tidak mempunyai kebiasaan mencuci tangan sebelum memberikan makan pada anak mempunyai resiko lebih besar terkena diare.

Pada penelitian ini, melalui hasil kuisioner didapatkan bahwa seluruh responden berperilaku baik dalam hal pencegahan infeksi. Namun dari hasil observasi, didapatkan hal yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, beberapa responden masih belum baik dalam melakukan pencegahan infeksi. Beberapa ibu tidak mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum menyiapkan makanan dan sebelum menyuapi anaknya. Hal ini disebabkan karena responden belum mengetahui bahwa sebelum menyiapkan makanan dan menyuapi anak, seharusnya tangan dicuci dengan air bersih dan sabun terlebih saat anak sedang dirawat di rumah sakit. Sebagian besar ibu dalam penelitian ini belum mengetahui bahwa penyebaran kuman diare dapat terjadi apabila tangan tidak dicuci dengan air bersih dan sabun sehingga tidak melakukan hal tersebut.

Dalam pandangan Islam, orang-orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah SWT, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan/membersihkan diri”

Pada prinsip dasar Islam yang wajib kita pegang teguh, yaitu Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang bersih. Kebersihan merupakan suatu sistem yang kokoh yang dijadikan sebagai aqidah

bagi orang muslim muslimah sehingga dapat terhindar dari penyakit. Bersih merupakan sifat yang harus melekat pada diri manusia sebagai perilaku kebersihan, manusia tidak hanya melakukan sekali atau sementara waktu, tetapi terus menerus perilaku itu menjadi kebiasaan pada diri setiap muslim (Gassing, 2005).

Terkait dengan perilaku ibu dalam perawatan anak diare di rumah sakit, menurut Supartini (2005) orang tua diharapkan mempunyai kesempatan untuk meneruskan peran dan tugasnya merawat anak selama di rumah sakit. Karena keluarga, khususnya ibu adalah orang yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan anak. Konsep yang mendasari asuhan yang berpusat pada keluarga adalah memfasilitasi keterlibatan orang tua dalam perawatan dan peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat anak.

Perilaku ibu menjadi sangat penting karena didalam merawat anaknya, ibu seringkali berperan sebagai pelaksana dan pembuat keputusan dalam pengasuhan anak, yaitu dalam hal memberi makan, memberi perawatan kesehatan dan penyakit, memberi stimulasi mental (Titi Sularyo, dkk, 2002) dengan demikian, dengan bila ibu berperilaku baik dalam hal melakukan perawatan pada anak diare, diharapkan agar proses penyembuhan pada anak diare dapat lebih cepat serta dapat mengurangi kecemasan pada anak yang sedang dirawat di rumah sakit.

Neff (2003) dalam Saleba (2008) menjelaskan bahwa beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan penderitaan anak dan keluarga menjadi berkurang ketika keluarga dilibatkan dalam perawatan anaknya. Frekuensi anak menangis berkurang, rasa gelisah pada anak berkurang, kebutuhan obat menurun, dan pemulangan lebih cepat ketika konsep family centre care diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Corlett dan Twycross (2006) juga menggambarkan bahwa orang tua ingin terlibat dalam perawatan mereka, namun kurangnya komunikasi yang efektif sering menghambat komunikasi terbuka dan hubungan timbal balik antar keluarga dan perawat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perilaku ibu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan cairan pada anak diare tergolong baik
2. Perilaku ibu dalam melakukan pemenuhan nutrisi pada anak diare tergolong baik
3. Perilaku ibu dalam melakukan pencegahan iritasi pada anak diare tergolong baik
4. Perilaku ibu dalam melakukan pencegahan penyebaran infeksi pada anak diare melalui hasil kuisioner tergolong baik, tetapi melalui hasil observasi beberapa ibu belum melakukan pencegahan penyebaran infeksi dengan baik

B. Saran

1. Bagi Institusi
Diharapkan agar dapat menjadi bahan informasi mengenai perawatan anak diare di rumah sakit
2. Bagi Petugas Kesehatan
Diharapkan agar dapat mengajarkan pada ibu cara melakukan perawatan anak diare di rumah sakit dengan benar
3. Bagi masyarakat
Diharapkan agar masyarakat dalam hal ini ibu dapat mengetahui cara melakukan perawatan anak diare di rumah sakit dengan benar

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Basyir, Abdurrahim 2014, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak*, al-wildan.com, diakses tanggal 1 Juni 2014
- Arbianingsih, 2011, *Keperawatan Anak Konsep dan Prosedur Tindakan*, Alauddin Press: Makassar
- Adisasmito, W, 2007, *Faktor Resiko Diare Pada Bayi dan Balita di Indonesia: Systematic Review Penelitian Akademik di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Makara Kesehatan Vol 11 No 1 Juni 2007, <http://www.jurnal.ui.ac.id>, diakses tanggal 3 Agustus 2014
- Asyhari, M.A, dkk, 2001, *Kupinang Engkau Secara Islam*, Putra Pelajar: Surabaya
- Askrening, 2007, *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Dalam Pemberian Rehidrasi Oral Pada Balita Diare di Kabupaten Purworejo*, library.ump.org, diakses tanggal 3 Agustus 2014
- BPS, 2012, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*, <http://www.bkkbn.go.id> diakses tanggal 10 Februari 2014
- Corlett J, Twycross, A, 2006, *Negotiation of Parental Roles Within Family Centred Care: A Review Of The Research*. J clin nurse 2006
- DEPKES RI, 2011, *Buku Saku Petugas Kesehatan*, www.dinkes-tts.web.id, diakses tanggal 3 Desember 2013
- DEPKES RI, 2009, *Buku Pedoman Pengendalian Penyakit Diare*, www.depkes.go.id, diakses tanggal 19 Februari 2014
- DEPKES RI, 2002, *Profil Kesehatan Indonesia*, www.depkes.go.id, diakses tanggal 3 Agustus 2014
- Dewi, Vivian Nanny Lia, 2010, *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*, Salemba Medika: Jakarta
- Dewati, Anisa, 2010, *Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Perilaku Ibu Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Anak Batita Malnutrisi di Posyandu Desa Sembungan Boyolali*, www.publikasiilmiah.ums.ac.id, diakses tanggal 21 Juli 2014
- Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2012, *Profil Kesehatan Kota Makassar 2011*, <http://dinkeskotamakassar.net> diakses tanggal 26 Januari 2013

- Gassing, Qadir, 2005, *Fiqhi Lingkungan Telaah Krisis Tentang Penerapan Hukum Taklif Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UIN Alauddin Makassar: Makassar
- Gunarsa, S,D, 2008, *Psikologi Perawatan*, BPK Gunung Mulia: Jakarta
- Hidayat, Alimul Aziz, 2008, *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak Buku 1*, Salemba Medika: Jakarta
- Hidayat, Alimul, Aziz, 2008, *Pengantar Ilmu keperawatan anak Buku 2*, Salemba Medika: Jakarta
- Hidayat, Alimul Aziz, 2008, *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*, Salemba Medika: Jakarta
- Husein, Abburazaraq, 2001, *Hak Anak Di Dalam Islam*, Pustaka: Bandung
- Istiari, Tinuk, 2000, *Menanti Buah Hati*, Media Persindo: Yogyakarta
- Iswari, Yeni, 2011, *Analisis Faktor Resiko Kejadian Diare Pada Anak Usia Dibawah 2 Tahun di RSUD Koja Jakarta*, <http://www.lontar.ui.ac.id>, diakses tanggal 4 Agustus 2014
- IRIB World Service, 2012, *Islam, Gizi dan Kesehatan: Pentingnya Kebersihan Dalam Makanan*, <http://indonesian.irib.ir>, diakses tanggal 3 Agustus 2014
- Kamila, D, 2005, *Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Diare Pada Bayi Usia 1-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungwuni Tahun 2004/2005*, <http://www.scrib.com>, diakses tanggal 3 Agustus 2014
- Karmi, B, 2011, *Pengaruh Penggunaan Popok Terhadap Kejadian Ruam Pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, http://www.180.241.122.205/dockti/KARMI_B-08010035.pdf, diakses tanggal 4 Agustus 2014
- KEMENKES RI, 2011, *Situasi Diare di Indonesia*, www.depkes.go.id, diakses tanggal 2 Desember 2013
- KEMENKES RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2011, *Panduan Sosialisasi Tatalaksana Diare Balita*, <http://www.dinkes-tts.web.id>, diakses tanggal 17 Desember 2013

- Madhi, Salim Sholih Ahmad Ibn, 2012, *Kewajiban Orang Tua Memberi Nama Anak Yang Memiliki Arti Baik*, www.mozaikislam.com, diakses tanggal 1 Juni 2014
- Nasution, 2010, *Perilaku Manusia*, ECG: Jakarta
- Notoatmodjo, S, 2007, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Rineka Cipta: Jakarta
- Palupi, A, 2005, *Status Gizi dan Hubungannya Dengan Kejadian Diare Pada Anak di Ruang Rawat Inap RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta*, Jurnal Klinik Gizi Indonesia Vol 6 No. 1 Juli 2009, <http://www.digilib.unimus.ac.id> diakses tanggal 3 Agustus 2014
- Pratama, Aa Wk dkk, 2011, *Perbedaan Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Diare Pada Balita di Rumah Sebelum dan Sesudah di Lakukan Pendidikan Kesehatan*, Jurnal Kesehatan Poltekkes Provinsi Bengkulu Volume 1, <http://poltekkes-provinsi-bengkulu.ac.id>, diakses tanggal 26 Desember 2013
- Pieter, Herri Zan & Lumongga, Namora. 2010. *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*. Kharisma Putra Utama: Jakarta
- Roesli, Utami, 2001, *Bayi Sehat Berkat Asi Eksklusif*, PT Elex Komputindo: Jakarta
- Rosjidi, C, H, Verawati, M 2008, *Evaluasi Perilaku Ibu Dalam Perawatan Balita Diare di Kabupaten Ponorogo*, library.ump.org, diakses tanggal 3 Agustus 2014
- Sinthamurniwaty, 2005, *Faktor-Faktor Resiko Kejadian Diare Akut Pada Balita: Studi Kasus di Semarang*, <http://www.pdfactory.com>, diakses tanggal 3 Agustus 2014
- Sugito, Titi Lestari, 2002, *Perawatan Kulit Pada Bayi dan Balita*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta
- Sumedi, 2010, *Kemuliaan dan Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak*, www.voa-islam.com, diakses tanggal 1 Juni 2014
- Supartini, Y, 2004, *Konsep Dasar Keperawatan Anak*, EGC: Jakarta
- Suratmaja, Sudaryat, 2010, *Kapita Selekta Gastroenterologi*, Sagung Seto: Jakarta
- Suratmaja, Sudaryat, 2007, *Gastroenterologi Anak*, Sagung Seto: Jakarta

- Sulisnadewi, Ni Luh Kompyang, 2011, *Efektivitas Pendidikan Kesehatan Keluarga Terhadap Peningkatan Kemampuan Ibu Dalam merawat Anak Diare Di RSUP Sanglah Dan RSUD Wangaya Denpasar*, digilib.unimus.ac.id, diakses tanggal 10 Februari 2014
- Sularyo, Titi, dkk, 2002, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, Sagung Seto: Jakarta
- Soedarto, 2009, *Penyakit Menular di Indonesia*, Sagung Seto: Jakarta
- Soenarto, Sri Suparyati, 2012, *Vaksin Rotavirus untuk Pencegahan Diare*, Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan volume 2, www.depkes.go.id, diakses tanggal 2 Desember 2013
- Shihab, M Quraish, 2009, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati: Jakarta
- UNICEF & WHO, 2009, *Diarrhoe: Why Children are still dying and what can be done*, www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241598415/e/ diakses tanggal 16 Desember 2013
- UNICEF INDONESIA, 2012, *Ringkasan Kajian Air Bersih, Sanitasi & Kebersihan*, www.unicef.org, diakses tanggal 17 Desember 2013
- Wasiah, Nadiyah, 2013, *Hakikat Anak Dalam Al-quran*, www.quranlearningcentre.com, diakses tanggal 5 Februari 2014
- Widayatun, TS, 2004, *Ilmu Perilaku*, CV Sagung Seto: Jakarta
- Widoyono, 2011, *Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan Pemberantasannya Edisi ke 2*, Erlangga: Jakarta
- William, Judith, Myron, Robin, 2009, *Current Diagnosis and Treatment Pediatrics*, McGraw-Hill: USA
- WHO, 2009, *Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit*, <http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-content/upl> diakses tanggal 7 Desember 2013
- Wong, D.L, Hockenberry, M, Wilson, D, Winkelstain, M.L, Schwartz, 2009, *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Volume 2*, EGC: Jakarta
- World Gastroenterology Organisation Global Guidelines, 2012, *Accute Diarrhea in Adults and Children: a Global Perspective*, <http://www.worldgastroenterology.org>, diakses tanggal 26 Desember 2013

**L
A
M
P
I
R
A
N**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

**LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
GAMBARAN PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE
DI RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2014**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ummi Kalsum

Nim : 70300110112

Judul : Gambaran Perilaku Ibu Dalam Perawatan Anak Diare di RSUD Haji
Makassar Tahun 2014

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam perawatan anak diare di RSUD Haji Makassar. Agar terlaksananya penelitian ini saya mengharapkan kepada anda bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dan mengisi pertanyaan pada kuisisioner dengan jujur. Informasi yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya, dan penelitian ini akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini namun apabila anda tidak bersedia maka saya akan tetap menghargainya.

Demikianlah surat pernyataan permohonan ini saya perbuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan siapapun. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Makassar, Juni 2014

Peneliti

(Ummi Kalsum)

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
GAMBARAN PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE DI
RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2014**

Oleh :

Ummi Kalsum

70300110112

Setelah saya membaca maksud dan tujuan penelitian, maka saya dengan sadar menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Tanda Tangan :

Tanggal :

No. Responden :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KUESIONER PENELITIAN
GAMBARAN PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE
DI RS HAJI SUL-SEL

Petunjuk Pengisian :

1. Semua pertanyaan dalam kuesioner ini harus dijawab
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan
3. Setiap pertanyaan dijawab hanya dengan satu jawaban yang sesuai menurut keadaan ibu

1. Nama Responden :
2. Umur :tahun
3. Agama : Islam Hindu
 Kristen Protestan Budha
 Kristen Katolik
4. Suku Bangsa : Bugis Mandar
 Makssar Toraja
 Lainnya.....
5. Pendidikan : SD SMA
 SLTP Diploma/Perguruan
Tinggi
6. Pekerjaan : Petani Karyawati
 PNS Wiraswasta
 IRT

KUESIONER PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah baik-baik pertanyaan pada setiap soal
 2. Jawablah setiap pertanyaan sesuai dengan yang ibu lakukan dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar
-
1. Apa yang ibu ketahui tentang diare....
 - a. Buang air besar dalam bentuk cair, lebih dari 3 kali dalam satu hari dan berlangsung lebih dari 2 hari
 - b. Buang air besar dalam bentuk cair
 - c. Buang air besar lebih sering
 2. Jika anak diare tidak segera ditangani maka akan terjadi.....
 - a. Anak rewel
 - b. Dehidrasi
 - c. Kelaparan
 3. Ciri-ciri anak yang mengalami dehidrasi....
 - a. Anak gelisah (rewel), mata cekung, mulut kering, tampak kehausan
 - b. Anak menangis
 - c. Anak tampak lemas
 4. Agar anak tidak mengalami kekurangan cairan maka.....
 - a. Diberi makanan yang anak sukai
 - b. Diberi minuman bersoda
 - c. Diberi minum lebih banyak
 5. Pengganti cairan yang sebaiknya diberikan kepada anak yang mengalami diare.....
 - a. Kopi
 - b. Oralit
 - c. Nasi

6. Oralit dapat dibuat sendiri dengan bahan.....
 - a. Air putih masak, garam
 - b. Air putih masak, gula
 - c. Air putih masak, gula, garam
7. Dalam memenuhi kebutuhan cairan anak, hal-hal yang dapat ibu lakukan selama anak dirawat di rumah sakit
 - a. Memantau jumlah cairan yang diminum anak
 - b. Mengatur tetesan infus
 - c. Memberi anak minuman apa saja
8. Bila infus anak habis, maka yang harus dilakukan ibu.....
 - a. Memanggil perawat
 - b. Menunggu perawat datang sendiri
 - c. Tidak melakukan apapun
9. Minuman yang boleh diberikan pada anak ketika diare adalah....
 - a. Minuman yang bersoda
 - b. Teh yang sangat manis
 - c. Kuah sayur
10. Asupan makanan yang diberikan selama anak diare.....
 - a. Dihentikan sementara sampai diarenya berhenti
 - b. Dilanjutkan seperti sebelum sakit
 - c. Hanya boleh diberikan makanan yang disediakan rumah sakit
11. Pola makan yang benar pada anak diare.....
 - a. Diberi makan dalam jumlah sedikit tetapi sering
 - b. Diberi makan banyak tetapi jarang
 - c. Di beri makan sesuai waktu makan
12. Jika anak masih menyusui dan terkena diare.....
 - a. ASI tetap diberikan seperti biasanya
 - b. ASI tetap diberikan tetapi dibatasi
 - c. Pemberian ASI dihentikan untuk sementara

Jika anak yang sedang minum susu formula dan terkena diare maka.....

- d. Susu formula tetap diberikan seperti biasanya
 - e. Susu formula tetap diberikan tetapi dibatasi
 - f. Pemberian susu formula dihentikan untuk sementara
13. Makanan yang dapat diberikan pada anak diare.....
- a. Makanan yang masam
 - b. Makanan yang instan
 - c. Makanan yang lunak
14. Apabila anak tidak mau makan maka.....
- a. Menunggu sampai anak mau makan dengan sendirinya
 - b. Diberi makanan yang anak sukai
 - c. Membujuk anak agar mau makan
15. Saat anak diare, kulit disekitar anus anak dapat terjadi.....
- a. Gatal-gatal
 - b. Kering
 - c. iritasi
16. Tanda-tanda iritasi pada kulit anak akibat diare.....
- a. Kulit disekitar anus kemerahan
 - b. Kulit disekitar anus lembab
 - c. Kulit disekitar anus kering dan bersisik
17. Apabila kulit disekitar anus anak terlihat tanda kemerahan, yang sebaiknya dilakukan..
- a. Membersihkan kulit sekitar anus menggunakan sabun
 - b. Melaporkan kepada perawat
 - c. Tidak melakukan apa-apa karena tanda kemerahan itu akan hilang sendiri
18. Untuk mencegah terjadinya iritasi kulit disekitar anus anak maka hal-hal yang dapat ibu lakukan....
- a. Mengganti popok sekali sehari

- b. Membersihkan kulit anak setiap kali habis buang air besar, mengeringkannya dengan kain yang lembut dan memakaikan pakaian yang bersih
 - c. Menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol untuk membersihkan kulit disekitar anus
19. Ibu dapat mengamati tanda-tanda iritasi pada kulit anak setiap....
- a. Sehari sekali
 - b. Setiap jam
 - c. Setiap kali sehabis membersihkan tinja anak
20. Penyebaran kuman penyebab diare dapat terjadi lewat perantara...
- a. Makanan yang bersih
 - b. Air yang bersih
 - c. Tangan yang tidak dicuci dengan sabun
21. Agar tidak terjadi penyebaran infeksi di rumah sakit, maka....
- a. Membuang popok bekas pakai pada tempat sampah
 - b. Melarang anak bergaul dengan pasien lain
 - c. Melarang anak bermain
22. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan....
- a. Sebelum mengambil makanan dan menyuapi anak
 - b. Di air yang tidak mengalir
 - c. Tidak dengan menggunakan sabun
23. Setelah membersihkan tinja anak, sebaiknya....
- a. Mencuci tangan pada air yang mengalir menggunakan sabun
 - b. Menyiapkan makanan anak
 - c. Menyuyapi anak
24. Apabila setelah membersihkan tinja, tidak mencuci tangan maka.....
- a. Tidak terjadi apa-apa
 - b. Diare anak dapat semakin parah
 - c. Kuman dapat menyebar

**LEMBAR OBSERVASI
PERILAKU IBU DALAM MERAWAT ANAK DIARE**

No	INDIKATOR	PENGAMATAN	
		Ya	Tidak
1	Mengamati tanda-tanda dehidrasi anak -gelisah -mata cekung -sering haus -turgor kulit kembali lambat		
2	Memberi anak oralit		
3	Memberi anak minum lebih banyak		
4	Memantau kelancaran infus dan memberi tahu perawat saat infus habis		
5	Memberi anak makan dengan sering		
6	Membujuk anak agar mau makan		
7	Memberi anak ASI/susu formula		
8	Membersihkan kulit sekitar anus setiap anak selesai BAB		
9	Mengeringkan kulit sekitar anus setiap anak selesai BAB		
10	Memeriksa keadaan kulit sekitar anus setiap anak selesai BAB atau BAK		
11	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum menyiapkan makanan		
12	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum menyuapi anak		
13	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah membersihkan tinja anak		
14	Membuang popok bekas pakai pada tempatnya		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Karakteristik Responden

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <20 tahun	4	13,3	13,3	13,3
20-30 tahun	16	53,3	53,3	66,7
31-40 tahun	9	30,0	30,0	96,7
>40 tahun	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

agama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid islam	29	96,7	96,7	96,7
kristen katolik	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

suku_bangsa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bugis	1	3,3	3,3	3,3
makassar	27	90,0	90,0	93,3
mandar	1	3,3	3,3	96,7
toraja	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sd	13	43,3	43,3	43,3
sntp	10	33,3	33,3	76,7
sma	4	13,3	13,3	90,0
diploma/pt	3	10,0	10,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid irt	30	100,0	100,0	100,0

Tanda-tanda dehidrasi

gelisah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	22	73,3	73,3	73,3
tidak	8	26,7	26,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

mata cekung

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100,0	100,0	100,0

sering haus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100,0	100,0	100,0

turgor_kulit_lambat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100,0	100,0	100,0

memberi_oralit

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	16	53,3	53,3	53,3
tidak	14	46,7	46,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

memberi_makan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	19	63,3	63,3	63,3
tidak	11	36,7	36,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

membujuk_anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	13	43,3	43,3	43,3
tidak	17	56,7	56,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

memberi_asi_susu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	25	83,3	83,3	83,3
tidak	5	16,7	16,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

membersihkan_anus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100,0	100,0	100,0

mengeringkan kulit anus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	26	86,7	86,7	86,7
tidak	4	13,3	13,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

memeriksa keadaan anus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	6	20,0	20,0	20,0
tidak	24	80,0	80,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

mencuci tangan sblm menyiapkan mknan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	3	10,0	10,0	10,0
tidak	27	90,0	90,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

mencuci tangan sblm menyuapi anak


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	4	13,3	13,3	13,3
tidak	26	86,7	86,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

mencuci tangan_stlh_mmbershkn_tinja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	24	80,0	80,0	80,0
tidak	6	20,0	20,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

membuang_popok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100,0	100,0	100,0



KUESIONER PENELITIAN
GAMBARAN PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE
DI RS HAJI SUL-SEL

Petunjuk Pengisian :

1. Semua pertanyaan dalam kuesioner ini harus dijawab
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan
3. Setiap pertanyaan dijawab hanya dengan satu jawaban yang sesuai menurut keadaan ibu

1. Nama Responden :
2. Umur :tahun
3. Agama : Islam Hindu
 Kristen Protestan Budha
 Kristen Katolik
4. Suku Bangsa : Bugis Mandar
 Makssar Toraja
 Lainnya.....
5. Pendidikan : SD SMA
 SLTP Diploma/Perguruan Tinggi
6. Pekerjaan : Petani Karyawati
 PNS Wiraswasta
 IRT

KUESIONER PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah baik-baik pertanyaan pada setiap soal
 2. Jawablah setiap pertanyaan sesuai dengan yang ibu lakukan dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar
-
1. Apa yang ibu ketahui tentang diare....
 - a. Buang air besar dalam bentuk cair, lebih dari 3 kali dalam satu hari dan berlangsung lebih dari 2 hari
 - b. Buang air besar dalam bentuk cair
 - c. Buang air besar lebih sering
 2. Jika anak diare tidak segera ditangani maka akan terjadi.....
 - a. Anak rewel
 - b. Dehidrasi
 - c. Kelaparan
 3. Ciri-ciri anak yang mengalami dehidrasi....
 - a. Anak gelisah (rewel), mata cekung, mulut kering, tampak kehausan
 - b. Anak menangis
 - c. Anak tampak lemas
 4. Agar anak tidak mengalami kekurangan cairan maka.....
 - a. Diberi makanan yang anak sukai
 - b. Diberi minuman bersoda
 - c. Diberi minum lebih banyak
 5. Pengganti cairan yang sebaiknya diberikan kepada anak yang mengalami diare.....
 - a. Kopi
 - b. Oralit
 - c. Nasi

6. Oralit dapat dibuat sendiri dengan bahan.....
 - a. Air putih masak, garam
 - b. Air putih masak, gula
 - c. Air putih masak, gula, garam
7. Dalam memenuhi kebutuhan cairan anak, hal-hal yang dapat ibu lakukan selama anak dirawat di rumah sakit

 - a. Memantau jumlah cairan yang diminum anak
 - b. Mengatur tetesan infus
 - c. Memberi anak minuman apa saja

8. Bila infus anak habis, maka yang harus dilakukan ibu.....
 - a. Memanggil perawat
 - b. Menunggu perawat datang sendiri
 - c. Tidak melakukan apapun
9. Minuman yang boleh diberikan pada anak ketika diare adalah....
 - a. Minuman yang bersoda
 - b. Teh yang sangat manis
 - c. Kuah sayur
10. Asupan makanan yang diberikan selama anak diare.....
 - a. Dihentikan sementara sampai diarenya berhenti
 - b. Dilanjutkan seperti sebelum sakit
 - c. Hanya boleh diberikan makanan yang disediakan rumah sakit
11. Pola makan yang benar pada anak diare.....
 - a. Diberi makan dalam jumlah sedikit tetapi sering
 - b. Diberi makan banyak tetapi jarang
 - c. Di beri makan sesuai waktu makan
12. Jika anak masih menyusui dan terkena diare.....
 - a. ASI tetap diberikan seperti biasanya
 - b. ASI tetap diberikan tetapi dibatasi
 - c. Pemberian ASI dihentikan untuk sementara

Jika anak yang sedang minum susu formula dan terkena diare maka.....

- d. Susu formula tetap diberikan seperti biasanya
 - e. Susu formula tetap diberikan tetapi dibatasi
 - f. Pemberian susu formula dihentikan untuk sementara
13. Makanan yang dapat diberikan pada anak diare.....
- a. Makanan yang masam
 - b. Makanan yang instan
 - c. Makanan yang lunak
14. Apabila anak tidak mau makan maka.....
- a. Menunggu sampai anak mau makan dengan sendirinya
 - b. Diberi makanan yang anak sukai
 - c. Membujuk anak agar mau makan
15. Saat anak diare, kulit disekitar anus anak dapat terjadi.....
- a. Gatal-gatal
 - b. Kering
 - c. iritasi
16. Tanda-tanda iritasi pada kulit anak akibat diare.....
- a. Kulit disekitar anus kemerahan
 - b. Kulit disekitar anus lembab
 - c. Kulit disekitar anus kering dan bersisik
17. Apabila kulit disekitar anus anak terlihat tanda kemerahan, yang sebaiknya dilakukan..
- a. Membersihkan kulit sekitar anus menggunakan sabun
 - b. Melaporkan kepada perawat
 - c. Tidak melakukan apa-apa karena tanda kemerahan itu akan hilang sendiri
18. Untuk mencegah terjadinya iritasi kulit disekitar anus anak maka hal-hal yang dapat ibu lakukan....
- a. Mengganti popok sekali sehari
 - b. Membersihkan kulit anak setiap kali habis buang air besar, mengeringkannya dengan kain yang lembut dan memakaikan pakaian yang bersih

- c. Menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol untuk membersihkan kulit disekitar anus
19. Ibu dapat mengamati tanda-tanda iritasi pada kulit anak setiap....
- Sehari sekali
 - Setiap jam
 - Setiap kali sehabis membersihkan tinja anak
20. Penyebaran kuman penyebab diare dapat terjadi lewat perantara...
- Makanan yang bersih
 - Air yang bersih
 - Tangan yang tidak dicuci dengan sabun
21. Agar tidak terjadi penyebaran infeksi di rumah sakit, maka....
- Membuang popok bekas pakai pada tempat sampah
 - Melarang anak bergaul dengan pasien lain
 - Melarang anak bermain
22. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan....
- Sebelum mengambil makanan dan menyuapi anak
 - Di air yang tidak mengalir
 - Tidak dengan menggunakan sabun
23. Setelah membersihkan tinja anak, sebaiknya....
- Mencuci tangan pada air yang mengalir menggunakan sabun
 - Menyiapkan makanan anak
 - Menyuapi anak
24. Apabila setelah membersihkan tinja, tidak mencuci tangan maka.....
- Tidak terjadi apa-apa
 - Diare anak dapat semakin parah
 - Kuman dapat menyebar

LEMBAR OBSERVASI
PERILAKU IBU DALAM MERAWAT ANAK DIARE

No	INDIKATOR	PENGAMATAN	
		Ya	Tidak
1	Mengamati tanda-tanda dehidrasi anak -gelisah -mata cekung -sering haus -turgor kulit kembali lambat		
2	Memberi anak oralit		
3	Memberi anak minum lebih banyak		
4	Memantau kelancaran infus dan memberi tahu perawat saat infus habis		
5	Memberi anak makan dengan sering		
6	Membujuk anak agar mau makan		
7	Memberi anak ASI/susu formula		
8	Membersihkan kulit sekitar anus setiap anak selesai BAB		
9	Mengeringkan kulit sekitar anus setiap anak selesai BAB		
10	Memeriksa keadaan kulit sekitar anus setiap anak selesai BAB atau BAK		
11	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum menyiapkan makanan		
12	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum menyuapi anak		
13	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah membersihkan tinja anak		
14	Membuang popok bekas pakai pada tempatnya		

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
GAMBARAN PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE DI
RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2014**

Oleh :

Ummi Kalsum

70300110112

Setelah saya membaca maksud dan tujuan penelitian, maka saya dengan sadar menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tanda Tangan :

Tanggal :

No. Responden :

**LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
GAMBARAN PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE
DI RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2014**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ummi Kalsum

Nim : 70300110112

Judul : Gambaran Perilaku Ibu Dalam Perawatan Anak Diare di RSUD Haji
Makassar Tahun 2014

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam perawatan anak diare di RSUD Haji Makassar. Agar terlaksananya penelitian ini saya mengharapkan kepada anda bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dan mengisi pertanyaan pada kuisisioner dengan jujur. Informasi yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya, dan penelitian ini akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini namun apabila anda tidak bersedia maka saya akan tetap menghargainya.

Demikianlah surat pernyataan permohonan ini saya perbuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan siapapun. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Makassar, Juni 2014

Peneliti

(Ummi Kalsum)

KUISIONER PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE

inisial	PERTANYAAN																								jumlah	Kategori	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12a	12b	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24
Ny. R	1	2	1	1	2	3	1	1	3	2	1	1		3	1	3	1	1	3	3	1	1	1	1	2	40	baik
Ny. I	1	1	3	3	2	3	1	1	3	2	1	1		3	3	3	1	1	2	3	3	1	1	1	3	47	baik
Ny. I	1	2	1	3	2	3	1	1	3	2	3		2	3	1	3	1	1	2	3	3	1	1	1	3	47	baik
Ny. N	1	2	3	3	2	3	1	1	3	3	1		1	3	3	3	1	3	3	1	3	1	1	1	2	49	baik
Ny. R	1	2	3	3	2	3	1	1	3	2	3		1	3	3	3	2	1	2	3	3	1	1	1	3	51	baik
Ny. D	1	1	2	3	2	3	1	1	3	3	1	1		3	3	1	1	1	2	3	3	1	1	1	2	44	baik
Ny. Y	1	1	1	1	2	3	3	1	3	2	3	2		3	2	3	1	3	3	3	3	1	1	1	3	50	baik
Ny. K	2	2	2	3	2	3	1	1	3	3	3	2		3	3	1	1	3	2	3	3	3	1	1	3	54	baik
Ny. D	1	1	3	3	2	3	3	1	3	3	1	1		3	1	1	2	1	2	1	3	1	1	2	3	46	baik
Ny. R	1	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1		3	3	3	3	1	2	2	3	1	1	1	2	43	baik
Ny. S	1	1	2	1	2	3	3	1	3	3	1	1		3	2	1	1	3	2	1	3	1	1	1	2	43	baik
Ny. R	1	1	3	3	2	1	1	1	3	3	3	1		3	3	3	3	1	2	3	3	1	1	3	2	51	baik
Ny. M	1	1	1	1	2	1	3	1	3	3	1	1		1	1	1	3	3	2	3	3	1	1	1	2	41	baik
Ny. K	3	2	1	3	2	3	1	1	3	2	3	1		3	1	3	1	1	3	1	3	1	1	1	3	47	baik
Ny. W	2	2	3	3	2	3	3	1	3	3	3	2		3	1	3	2	1	3	1	3	3	1	2	2	55	baik
Ny. S	2	1	2	3	2	1	3	1	3	3	1	1		3	3	2	1	1	3	1	3	3	1	1	2	47	baik
Ny. J	3	3	3	1	2	3	3	1	3	2	1		1	3	2	1	1	3	2	3	3	1	1	2	2	50	baik
Ny. H	3	1	2	3	2	3	1	1	3	2	1	2		3	2	1	1	3	3	3	3	1	1	2	3	50	baik
Ny. F	3	1	1	3	2	2	3	1	3	3	3	1		3	3	3	1	1	1	3	3	3	1	2	3	53	baik
Ny. L	2	1	3	3	2	2	3	1	3	2	3	1		3	1	1	1	3	3	1	3	2	1	2	2	49	baik
Ny. K	2	3	2	3	2	2	1	1	3	2	1		1	3	2	1	2	1	3	1	3	2	1	3	3	48	baik
Ny. K	3	1	2	3	2	2	3	1	3	2	1		1	3	1	2	3	3	3	1	3	1	1	2	1	48	baik
Ny. K	2	1	2	3	2	1	3	1	3	3	3		2	3	1	1	1	3	3	1	3	3	1	2	1	49	baik
Ny. N	3	1	3	3	2	2	3	1	3	2	1		3	3	3	2	2	3	3	3	3	1	1	2	2	55	baik
Ny. A	3	3	3	3	2	1	3	1	3	1	3	3		3	1	3	1	3	3	1	3	1	2	3	2	55	baik
Ny. M	3	1	3	3	2	2	3	1	3	2	3	1		3	1	1	1	3	3	1	3	1	1	1	2	48	baik
Ny. H	3	1	1	3	2	3	3	1	3	2	3	1		3	3	1	1	3	3	1	3	1	1	1	2	49	baik
Ny. R	1	2	1	3	2	3	1	1	3	3	3	1		3	1	3	1	1	3	3	3	1	1	1	2	47	baik
Ny. H	2	2	1	3	2	3	1	1	3	2	1	1		3	1	3	1	3	3	3	3	1	1	1	2	47	baik
Ny. A	1	2	1	3	2	3	1	1	3	3	3	1		3	1	3	1	1	3	3	3	1	1	1	2	47	baik

PERILAKU IBU DALAM MERAWAT ANAK DIARE

Inisial	INDIKATOR																		
	1a	1b	1c	1d	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Ny. R	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1
Ny. I	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1	1
Ny. I	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. N	tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. R	tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. D	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1
Ny. Y	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. K	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1	1
Ny. D	tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1	1
Ny. R	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. S	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. R	tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. M	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1	1
Ny. K	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	2 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. W	tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	2 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. S	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 tida	2 ya	1	1
Ny. J	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	2 tidak	2 tidak	2 tidak	2 tida	2 ya	1	1
Ny. H	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tida	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. F	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. L	tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	2 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. K	tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 tida	2 ya	1	1
Ny. K	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	2 tidak	2 tidak	2 tidak	2 tida	2 ya	1	1
Ny. K	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tida	2 ya	1 ya	2 tidak	2 tidak	2 tidak	2 tida	2 ya	1	1
Ny. N	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tida	2 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. A	tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tida	2 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 tidak	2 tida	2 ya	1	1
Ny. M	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tida	2 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. H	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. R	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. H	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1
Ny. A	ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 ya	1 tidak	2 tidak	2 tidak	2 ya	1 ya	1	1

KET

1: YA

2: TIDAK

INDIKATOR PERILAKU IBU

1a: gelisah

1b: mata cekung

1c: sering haus

1d; turgor kulit kembali lambat

2: memberi oralit

3: memberi anak minum lebih banyak

4: memantau kelancaran infus

5: memberi makan dengan sering

6: membujuk anak

7; memberi ASI

8: Membersihkan kulit anus

9: mengeringkan kulit sekitar anus

10: memeriksa keadaan kulit sekitar anus

11: mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan

12: mencuci tangan sebelum menyuapi anak

13: mencuci tangan setelah membersihkan tinja

14: membuang popok



Karakteristik responden

INISAL	UMUR		AGAMA		SUKU BANGSA		PENDIDIKAN		PEKERJAAN	
	kategori	kode	kategori	kode	kategori	kode	kategori	kode	kategori	kode
Ny. R	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. I	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. I	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	Diploma	4	IRT	3
Ny. N	31-40th	3	Islam	1	Makassar	2	SMA	3	IRT	3
Ny. R	<20th	1	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. D	31-40th	3	Islam	1	Mandar	3	SLTP	2	IRT	3
Ny. Y	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. K	31-40th	3	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. D	<20th	1	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. R	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. S	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. R	31-40th	3	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. M	20-30th	2	kristen katolik	3	Toraja	4	SD	1	IRT	3
Ny. K	31-40th	3	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. W	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	Diploma	4	IRT	3
Ny. S	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. J	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. H	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. F	31-40th	3	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. L	31-40th	3	Islam	1	Makassar	2	SMA	3	IRT	3
Ny. K	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SMA	3	IRT	3
Ny. K	<20th	1	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. K	<20th	1	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. N	31-40th	3	Islam	1	Makassar	2	SMA	3	IRT	3
Ny. A	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. M	20-30th	2	Islam	1	Bugis	1	Diploma	4	IRT	3
Ny. H	>40th	4	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. R	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. H	20-30th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. A	31-40th	3	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Karakteristik responden

INISAL	UMUR		AGAMA		SUKU BANGSA		PENDIDIKAN		PEKERJAAN	
	kategori	kode	kategori	kode	kategori	kode	kategori	kode	kategori	kode
Ny. R	24th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. I	20th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. I	23th	2	Islam	1	Makassar	2	Diploma	4	IRT	3
Ny. N	32th	3	Islam	1	Makassar	2	SMA	3	IRT	3
Ny. R	18th	1	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. D	34th	3	Islam	1	Mandar	3	SLTP	2	IRT	3
Ny. Y	20th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. K	31th	3	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. D	19th	1	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. R	25th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. S	22th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. R	32th	3	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. M	21th	2	kristen katolik	3	Toraja	4	SD	1	IRT	3
Ny. K	34th	3	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. W	20th	2	Islam	1	Makassar	2	Diploma	4	IRT	3
Ny. S	24th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. J	27th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. H	21th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. F	33th	3	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. L	30th	3	Islam	1	Makassar	2	SMA	3	IRT	3
Ny. K	21th	2	Islam	1	Makassar	2	SMA	3	IRT	3
Ny. K	18th	1	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. K	19th	1	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. N	32th	3	Islam	1	Makassar	2	SMA	3	IRT	3
Ny. A	21th	2	Islam	1	Makassar	2	SLTP	2	IRT	3
Ny. M	26th	2	Islam	1	Bugis	1	Diploma	4	IRT	3
Ny. H	41th	4	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. R	27th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. H	25th	2	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3
Ny. A	34th	3	Islam	1	Makassar	2	SD	1	IRT	3



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R