

**UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL HERBA KACA-KACA (*Peperomia pellucida*
(*L. Khunt*) TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM URAT DALAM DARAH
PADA MENCIT (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MARDIA
NIM. 70100111042

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mardia
NIM : 70100111042
Tempat/TanggalLahir : Sungguminasa, 06 Juli 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jl. Mustafa Dg Bunga Romang-Polong, No. 37
Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Herba Kaca-kaca (*Peperomia
pellucida* (L) Khunt) Terhadap Penurunan Kadar Asam
Urat Dalam Darah Pada Mencit (*Mus musculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juni 2015

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

M A K A S S A R A
MARDIA
NIM. 70100111042

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Herba Kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) terhadap Penurunan Kadar Asam Urat dalam Darah” yang disusun oleh **Mardia**, NIM : 70100111042, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari tanggal 15 Juni 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, **15 Juni 2015 M**
29 Sya’ban 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.dr.Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes (.....)

Pembimbing I : Hj.Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt.(.....)

Penguji I : Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurlaelah Abbas., Lc., M.A (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Abd samad Dg siama dan Ibunda Nursidah Dg sida serta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu mendukung baik dari segi materi maupun non materi, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Thip Raya M.A selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakulas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakulas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

6. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar
7. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt., selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Dr. Hj. Nurlaelah Abbas., Lc., MA., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi.
11. Dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011, kakak-kakak angkatan 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005, serta adik-adik angkatan 2012, 2013 dan 2014 mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah *subhānahu wata'āla*. Amin.

Wassalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Gowa, Juni 2015

Penyusun,

MARDIA

NIM. 70100111042



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tanaman Kaca-kaca.....	14
1. Klasifikasi Tanaman	14
2. Nama Daerah	14
3. Morfologi Tumbuhan	14
4. Kandungan Kimia	15
5. Kegunaan Tanaman	16
B. Asam Urat	16
C. Karakteristik Mencit	31
D. Metode Penyarian.....	33
E. Tinjauan Islam mengenai Kesehatan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	42

A. Jenis dan lokasi penelitian	42
1. Jenis penelitian	42
2. Lokasi penelitian	42
B. Pendekatan penelitian	42
C. Metode pengumpulan data	42
1. Pengambilan sampel	42
2. Pengolahan sampel	43
3. Ekstraksi sampel	43
4. Penyiapan hewan coba	43
5. Penentuan dosis	44
6. Peningkatan kadar asam urat tinggi	44
7. Perlakuan pada hewan coba	44
D. Instrumen penelitian	45
1. Alat yang digunakan	45
2. Bahan yang digunakan	45
E. Validasi dan Rehabilitasi Penelitian	45
F. Teknik pengolahan dan Analisis data	46
1. Teknik pengolahan sampel	46
2. Analisis data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60
RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data biologik normal pada mencit.....	31
2. Volume sediaan dan ukuran jarum untuk injeksi.....	32
3. Hasil pengukuran rata-rata kadar asam urat darah hewan uji selama percobaan (mg/dL).....	47
4. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi Na CMC	62
5. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi ekstrak 20 mg/kg BB.....	62
6. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi ekstrak 40 mg/kg BB.....	63
7. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi ekstrak 80 mg/kg BB.....	63
8. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi allopurinol	64
9. Perhitungan statistik dan RAL (rancangan acak lengkap).....	65
10. Tabel anava data kadar asam urat.....	69
11. Table analisis Beda Nyata Terkecil (BNT)	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pembentukan asam urat	19
2. Patofisiologi Gout dan cara kerjanya	22
3. Kaca-kaca.....	76
4. Alat dan strip.....	77
5. Kanula dan spoit	77
6. Timbangan analitik	77
7. Gelas ukur dan batang pengaduk.....	77
8. Timbangan hewan.....	77
9. Magnetik stirer.....	77
10. Mencit jantan	78
11. Pengelompokkan	78
12. Pemberian sediaan oral	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ekstraksi herba kaca-kaca.....	57
2. Skema uji penurunan kadar asam urat darah	58
3. Data kadar asam urat.....	59
4. Persen penurunan kadar asam uarta darah	62
5. Perhitungan statistic dengan rancangan acak lengkap	65
6. Perhitungan Anava.....	67
7. Analisis beda nyata terkecil	70
8. Perhitungan dosis	72
9. Gambar tanaman kaca-kaca	76
10. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian.....	77
11. Hewan uji	78

ABSTRAK

Nama Penulis : Mardia
NIM : 70100111042
Judul Skripsi : Uji aktivitas ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt.) Terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah mencit (*Mus musculus*)

Telah dilakukan penelitian mengenai uji aktifitas ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt.) terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah pada mencit (*Mus musculus*). Tujuan penelitian ini mengetahui apakah ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah mencit (*Mus musculus*) serta konsentrasi berapa ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) dapat berefek terhadap penurunan kadar asam urat. Pemberian ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt.) diberikan dengan berbagai dosis yaitu 20 mg/Kg BB, 40 mg/Kg BB dan 80 mg/Kg BB serta allopurinol 39 mg/20 g BB mencit sebagai kontrol positif dan larutan koloidal Na-CMC 1 % sebagai kontrol negatif dengan volume pemberian 1 ml/30g BB mencit. Parameter yang digunakan yaitu penurunan kadar asam urat darah yang ditimbulkan setelah perlakuan diukur dengan menggunakan alat tes strip Asam urat. Data yang diperoleh diolah secara statistik menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk mengetahui perbedaan antara dosis. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga dosis ekstrak etanol herba kaca-kaca memberikan efek penurunan kadar asam urat. Pemberian ekstrak etanol herba kaca-kaca dosis 20 mg/kg BB, 40 mg/kg BB, 80 mg/kg BB memberikan hasil yang tidak berbeda signifikan dengan pemberian allopurinol dan memberikan perbedaan yang sangat signifikan dengan Na CMC. Semua dosis ekstrak etanol herba kaca-kaca dapat mrnurunkan kadar asam urat dalam darah dengan dosis terbaik 80 mg/kg BB.

Kata kunci: Herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt), Asam Urat, mencit (*Mus musculus*)

ABSTRACT

Author Name : Mardia
NIM : 70100111042
Thesis title : Activities test of ethanol extract of kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) of decrease blood uric acid levels in mice (*Mus musculus*).

A research had been done about activities test of ethanol extract of kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) of decrease blood uric acid levels in mice (*Mus musculus*). The purpose of this study was to determine whether the ethanol extract of kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) can reduce blood uric acid levels in mice (*Mus musculus*) as well as how the concentration of ethanol extract of kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) can have an effect on the reduction in uric acid levels. Giving ethanol extract of kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) is given by varying doses of the 20 mg/Kg BB, 40 mg/Kg BB and 80 mg/Kg BB and allopurinol 39 mg / 20 gBB mice as a positive control and colloidal solution of Na-CMC 1% as a negative control with volume administration of 1 ml / 30gBB mice. The parameters used are of decrease blood uric acid levels induced after treatment was measured using test strips uric acid. From the data obtained were processed statistical using the method of Completely Randomized Block Design (CRD) and the Smallest Real Differences Test (LSD) to determine the difference between doses. The result of examination showed that all doses of kaca-kaca decreased of uric acid in blood. Administration of ethanol extract kaca-kaca dose 20 mg/kg BB, 40 mg/kg BB, 80 mg/kg BB showed that extract did not give a significant differences with administration of allopurinol and give a significant differences with administration Na CMC. All ethanol extract of kaca-kaca could lower uric acid with the best dose is 80 mg/kg BB.

Keywords: ethanol extract of kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt), uric acid, mice (*Mus musculus*)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Tanaman kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) dapat ditemukan ditempat lembab di Asia dan Amerika. Secara empiris kaca-kaca banyak digunakan untuk mengobati pusing, sakit kepala, demam. Perasan daunnya dapat digunakan untuk pengobatan sakit perut, meredakan nyeri, rematik, menurunkan kadar asam urat dalam darah yang tinggi. Tanaman ini juga dilaporkan memiliki aktifitas antiinflamasi (Wijaya dan Monica, 2004: 115), antibakteri, antikanker, obat demam dan setelah diteliti ternyata dilaporkan memiliki aktifitas antipiretik (Khan et al., 2008), serta digunakan sebagai obat antihipertensi (Nwokocha et al., 2012: 1-5).

Secara empiris herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) digunakan sebagai obat penurun kadar asam urat terutama di daerah Makassar. Herba kaca-kaca umumnya dikonsumsi dengan cara direbus (15-30 g) untuk pemakaian dalam (diminum), untuk pemakaian luar giling herba segar secukupnya sampai halus dan ada juga yang mengkonsumsinya sebagai lalapan segar (Dalimartha,2006: 91).

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa dalam ekstrak kaca-kaca mengandung senyawa kimia golongan glikosida, flavonoid, tannin dan steroid/triterpenoid. Diduga flavonoid yang terkandung pada tumbuhan inilah yang memberikan efek penurunan kadar asam urat. Kemampuan senyawa tersebut dalam

menurunkan kadar asam urat adalah dengan mekanisme hambatan terhadap aktivitas xantin oksida pada basa purin sehingga akan menurunkan produksi asam urat (Kristiani,R,D,2013: 175).

Tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tersebut.

Dapat dipahami bahwa Allah Swt senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk meneliti, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan didalam Al-Qur'an mengandung suatu zat / obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Berdasarkan latar belakang ayat tersebut maka peneliti akan mengembangkan dan meneliti tentang tumbuhan herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah pada mencit, sebagaimana ayat tersebut mengisyaratkan kepada manusia untuk meneliti dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang obat yang berasal dari alam yang digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit.

Penyakit asam urat merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat. Asam urat merupakan produk akhir dari katabolisme atau pemecahan purin di dalam tubuh. Katabolisme termasuk proses metabolisme tubuh yang merombak suatu substrat kompleks menjadi molekul yang lebih kecil. Katabolisme

purin ini membutuhkan enzim xantin oksidase yang terdapat di hati dan usus (Ersi, 2013: 1-2).

Asam urat merupakan bagian yang normal dari darah dan urin. Asam urat dihasilkan dari pemecahan dan sisa-sisa pembuangan dari bahan makanan tertentu yang mengandung nukleotida purin atau berasal dari nukleotida purin yang diproduksi oleh tubuh. Tingginya kadar asam urat didalam darah penderita gout disebabkan banyaknya sisa-sisa pembuangan hasil metabolisme purin, sedangkan ekskresi asam urat melalui urin terlalu sedikit (Kristiani, R, D. 2013: 174).

Sekitar 20-30% penderita gout terjadi akibat kelainan sintesa purin dalam jumlah besar yang menyebabkan kelebihan kadar asam urat dalam darah. Kurang lebih 75% penderita gout terjadi akibat kelebihan produksi asam urat, tetapi pengeluarannya tidak sempurna. Dengan peningkatan produksi asam urat kadar asam urat dalam darah menjadi meningkat. Biasanya kadar asam urat pada penderita gout melebihi 7,0 mg/dL (Kristiani, R, D, 2013: 175).

Tingginya kadar asam urat didalam darah penderita gout disebabkan banyaknya sisa-sisa pembuangan hasil metabolisme purin, sedangkan ekskresi asam urat melalui urin terlalu sedikit (Karisnatuti, 1997: 3).

Ada dua kelompok obat untuk terapi penyakit gout yaitu obat yang menghentikan proses inflamasi (urikosurik) akut dan obat yang mempengaruhi kadar asam urat (urikostatik). Obat yang menghentikan proses inflamasi (urikosurik) akut yaitu Obat yang berfungsi untuk meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin, artinya urin yang dibuang akan memiliki kandungan asam urat yang

tinggi. Sedangkan obat yang mempengaruhi kadar asam urat (urikostatik) yaitu obat yang menghambat kerja enzim xantin oksidase yang mengubah hipoxantin menjadi xantin dan xantin menjadi asam urat. Contoh obatnya adalah Allopurinol. Allopurinol dapat menurunkan kadar asam urat darah secara drastis dalam beberapa hari atau minggu (Mutschler, 1991: 217).

Pengobatan penyakit gout dapat dilakukan dengan mengkonsumsi atau menggunakan obat tradisional. Dimana senyawa flavanoid dan alkaloid pada tanaman dapat berperan sebagai obat untuk penyakit gout dengan menghambat kerja xantin oksidase. Pada tanaman yang digunakan adalah herba kaca-kaca, berdasarkan penelitian herba kaca-kaca mengandung senyawa flavanoid, alkaloid, tanin, dan minyak atsiri. Sehingga peneliti menggunakan ekstrak herba kaca-kaca untuk penurunan kadar asam urat (Kristiani,R,D,2013: 175).

Mencit merupakan hewan yang paling umum digunakan pada penelitian laboratorium sebagai hewan percobaan, yaitu sekitar 40-80%. Mencit memiliki banyak keunggulan sebagai hewan percobaan, yaitu siklus hidup yang relatif pendek, jumlah anak per kelahiran banyak, variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam penanganannya (Moriwaki, 1994: 145).

Secara empiris ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) digunakan sebagai obat gout. Di masyarakat mengkonsumsi dengan cara dibuat infusa sebanyak 10 g. Kandungan senyawa herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) adalah glikosida, alkaloid, flavonoid, tannin dan steroid/triterpenoid. Diduga flavonoid yang terkandung pada tumbuhan inilah yang memberikan efek penurunan

kadar asam urat. Kemampuan senyawa tersebut dalam menurunkan kadar asam urat adalah dengan mekanisme hambatan terhadap aktivitas xantin oksida pada basa purin sehingga akan menurunkan produksi asam urat. Pengukuran kadar asam urat ini dilakukan pada mencit. Dimana mencit yang digunakan adalah mencit jantan karena memiliki sistem hormonal yang lebih stabil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang “Uji Aktivitas Ekstrak Etanol herba Kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Dalam Darah Pada Mencit (*Mus musculus*)” dari berbagai konsentrasi ekstrak metanol daun kaca-kaca.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah ada aktivitas penurunan kadar asam urat dari ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) pada mencit (*Mus musculus*) ?
2. Pada konsentrasi berapa ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khant) dapat memberikan efek optimum terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah pada mencit (*Mus musculus*) ?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai obat ?

C. Defenisi Operasional

1. Kadar adalah ukuran konsentrasi untuk menentukan banyaknya zat dalam suatu bahan, larutan atau sejenisnya.
2. Asam urat merupakan bagian yang normal dari darah dan urin. Asam urat dihasilkan dari pemecahan dan sisa-sisa pembuangan dari bahan makanan tertentu yang mengandung nukleotida purin atau berasal dari nukleotida purin yang diproduksi oleh tubuh. Tingginya kadar asam urat didalam darah penderita gout disebabkan banyaknya sisa-sisa pembuangan hasil metabolisme purin, sedangkan ekskresi asam urat melalui urin terlalu sedikit (Karisnatuti, 1997: 3)
3. Kadar asam urat normal pada pria berkisar 3,5-7 mg/dl dan perempuan 2,6-6 mg/dl (Apriyanti, 2010: 13).
4. Hiperurisemia adalah kondisi asam urat tinggi dengan kadar lebih dari 7 mg/dL.
5. Diet purin adalah konsumsi makanan dan minuman yang dapat menyebabkan kondisi asam urat tinggi, kadar asam urat lebih dari 7 mg/dL (Mayes, 1992: 397).
6. Parameter adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan atau patokan yang digunakan.
7. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau di amati.
8. Variabel tergantung adalah faktor-faktor yang diobsevasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah.

9. Variabel kendali adalah variabel yang dikendalikan atau di buat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar yang diteliti.

D. Kajian pustaka

Peter I. Aziba, melakukan penelitian berjudul “*Analgesic activity of Peperomia pellucida aerial parts in mice*”. 2011. Fitoterapia. Dalam penelitiannya menggunakan ekstrak metanol daun kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) yang dibagi dalam beberapa kelompok yaitu parasetamol 150 mg/kg BB, asam asetil salisilat 150 mg/kg BB dan kelompok ekstrak *Peperomia pellucida* yaitu 70 mg/kg BB, 140 mg/kg BB, dan 210 mg/kg BB. Hasilnya ekstrak metanol *Peperomia pellucida* menunjukkan efek analgesik yang signifikan pada dosis 210 mg/kg BB. Kesimpulannya menunjukkan bahwa ekstrak metanol *Peperomia pellucida* memberikan efek analgesik.

Fabiat U. Hamzah, melakukan penelitian berjudul “*Peperomia pellucida in diets modulates hyperglycemia, oxidative stress and dyslipidemia in diabetic rats*”. 2012. Journal of acute disease. Melakukan penelitian tentang pengujian efek antidiabetik dan antioksidan dari suplemen *Peperomia pellucida* yang diinduksi aloksan pada tikus. Dibagi dalam 4 kelompok yaitu kelompok positif, kelompok negatif, dan 2 kelompok ekstrak yakni 10% w/w dan 20% w/w *Peperomia pellucida*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Peperomia pellucida* memiliki efek antidiabetik dan antioksidan yang ditandai dengan penurunan glukosa darah dan

kolesterol total, kolesterol trigliserida dan LDL. Kesimpulannya yaitu *Peperomia pellucida* mempunyai efek antiabetik dan antioksidan pada tikus.

Florence Tsofack Ngueguim, melakukan penelitian berjudul “*Ethanol extract of Peperomia pellucida promotes fracture healing by an anabolic effect on osteoblasts*”. 2013. Journal of ethnopharmacology. Melakukan penelitian evaluasi ekstrak etanol *Peperomia pellucida* yang dibagi dalam beberapa kelompok tikus yaitu kelompok kontrol dan kelompok ekstrak yakni 100 mg/kg BB, dan 200 mg/kg BB. Hasilnya ekstrak etanol *Peperomia pellucida* dapat mempercepat perbaikan patah tulang pada tikus melalui efek stimulasi pada diferensiasi osteoblas dan mineralisasi pada dosis 200 mg/kg BB. Kesimpulannya ekstrak etanol *Peperomia pellucida* dapat menstimulasi osteoblas pada tikus.

Salam Nafila, melakukan penelitian berjudul “ Antihiperlikemik ekstrak tumbuhan kaca-kaca (*Peperomia pellucida*) yang diinduksi sukrosa”. 2013. Jurnal ilmiah sains. Telah dilakukan penelitian untuk menentukan dosis optimum dari ekstrak tumbuhan kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) sebagai antihiperlikemik tikus wistar yang diinduksi sukrosa. Penelitian ini menggunakan metode uji toleransi glukosa. Digunakan tikus putih jantan wistar berjumlah 20 ekor tikus yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan yaitu kelompok perlakuan kontrol negatif diberi CMC 0,5 %, kelompok perlakuan kontrol positif diberi glibenklamid dosis 0,45 mg/kg BB, kelompok perlakuan ekstrak tumbuhan kaca-kaca dosis 20,40,80 mg/kg BB. Data diperoleh dari pemeriksaan kadar gula darah puasa, 30 menit setelah diinduksi sukrosa dan pada menit ke 30, 60, dan 120 setelah diinduksi sediaan per oral. Data

diolah dengan uji ANOVA dan Duncan untuk membandingkan antara kelompok kontrol negatif, ekstrak dan kontrol positif. Data hasil pengujian kadar glukosa darah dengan dosis 20,40,80 mg/kg BB memberikan penurunan kadar glukosa darah. Pemberian ekstrak kaca-kaca pada dosis 40 mg/kg BB pada menit ke 120 memberikan hasil yang signifikan dan beda nyata dibandingkan kelompok kontrol negatif (CMC 0,5%) dan tidak berbeda nyata dengan glibenklamid dosis 0,45 mg/kg BB.

Wijaya, melakukan penelitian berjudul “Uji efek antiinflamasi ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) pada tikus putih jantan”. 2010. Farmakology. *Peperomia pellucida* adalah salah satu alternatif untuk terapi inflamasi. Ekstrak herba kaca-kaca diberikan pada beberapa kelompok tikus dengan dosis 1500 mg/kg BB, 2000 mg/kg BB, 2500 mg/kg BB secara peroral. Hasilnya ekstrak herba kaca-kaca 2500 mg/kg BB menunjukkan potensi efek yang paling besar dibandingkan dengan kelompok dosis lainnya. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan ekstrak metanol daun kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) dan menggunakan hewan coba mencit.

Pinheiro B.G. melakukan penelitian berjudul “*chemical composition, antinociceptive and anti-inflammatory effects in rodents of the essential oil of Peperomia pellucida*”.2013. *journal of ethnopharmacology*. *Peperomia pellucida* dikenal sebagai carrapatinho adalah sebuah tumbuhan herba liar. Daunnya sebagian besar digunakan oleh masyarakat brazil untuk mengobati peradangan, nyeri dan asma. Tujuan penelitian ini untuk meneliti efek minyak esensial *Peperomia pellucida*

pada tikus dari rasa sakit dan peradangan. Aktivitas antiinflamasi dievaluasi oleh test kaki edema yang diinduksi dekstran pada kaki tikus. Hasilnya komposisi kimia dari ekstrak etanol peperomia dianalisis dengan kromatografi gas dan spektrometri massa (GC/MS) 24 senyawa yang mewakili 89,6% dari minyak total. Pretreatment oral dengan ekstrak etanol *Peperomia pellucida* (62,5-500 mg/kg) secara signifikan mengurangi geliat yang ditimbulkan oleh injeksi asam asetat. Efek yang signifikan 0,4 mg/kg ekstrak etanol *Peperomia pellucida* menghambat pembentukan edema pada tikus. Kesimpulannya bahwa data tersebut menunjukkan untuk pertama kalinya ekstrak etanol *Peperomia pellucida* memiliki efek yang signifikan antinociceptif dan antiinflamasi dalam model peradangan akut. Hasil tersebut mendukung penggunaan luas *Peperomia pellucida* dalam pengobatan populer untuk mengobati peradangan dan nyeri.

Elsha Ukieyanna, dengan judul skripsi “Aktivitas antioksidan, kadar fenolik, dan flavanoid total tumbuhan suruhan (*Peperomia pellucida* (L) Khunt)”. 2012. Institut pertanian bogor. Suruhan (*Peperomia pellucida* L. Kunth) merupakan tumbuhan semak yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki khasiat untuk meredakan nyeri rematik, sebagai antikanker, dan antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas ekstrak herba suruhan sebagai antioksidan alami dan mengukur kadar fenolik dan flavonoid total dalam suruhan. Sampel yang digunakan berupa ekstrak etanol 70% dan ekstrak air dari herba suruhan. Ekstrak didapat dengan metode maserasi dan dilakukan uji antioksidan dengan metode DPPH kemudian dilakukan uji kandungan fenolik dan flavonoid total

ekstrak serta dianalisis korelasi kedua senyawa ini terhadap aktivitas antioksidannya. Rendemen yang dihasilkan oleh ekstrak etanol 70% sebesar $20.43 \pm 3.33\%$ sedangkan rendemen ekstrak air sebesar $10.03 \pm 2.85\%$. Kedua ekstrak menunjukkan aktivitas antioksidan dalam penangkapan radikal bebas DPPH. Nilai IC50 ekstrak air sebesar 256.67 ± 21.65 ppm yang diikuti oleh ekstrak etanol sebesar 297.79 ± 17.75 ppm. Kandungan fenolik ekstrak air sebesar 755.79 ± 65.87 mg TAE/g dan ekstrak etanol sebesar 622.46 ± 179.43 mg TAE/g. Kandungan flavonoid total ekstrak etanol sebesar 4.058 ± 0.352 mg QE/g dan ekstrak air sebesar 0.67 ± 0.352 mg QE/g. Kandungan total fenol berkorelasi linier dengan aktivitas antioksidan tetapi aktivitas antioksidan tidak memiliki korelasi dengan flavonoid.

Elizabeth N, dengan judul skripsi “Uji efektivitas antiinflamasi infus herba suruhan (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) pada tikus putih (*Rattus norvegicus*)”. 2012. Politeknik kesehatan manado. Telah dilakukan penelitian uji efektivitas antiinflamasi infus herba Suruhan (*Peperomi pellucida* L.) pada tikus putih (*Rattus norvegicus*). Inflamasi merupakan gangguan yang sering terjadi pada manusia dan hewan. Herba Suruhan mengandung kalsium oksalat yang berkhasiat mengobati bengkak dan nyeri pada rematik gout. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiinflamasi infus herba Suruhan pada tikus putih. Jenis penelitian ini adalah eksperimen laboratorium dengan rancangan *Pretest and Posttest with Control Group Design*. Subyek penelitian adalah tikus putih (*Rattus norvegicus*) sebanyak 25 ekor dan dibagi 5 kelompok dengan perlakuan kelompok I sebagai kontrol negatif diberi aquadest, kelompok II diberi fenilbutason sebagai kontrol positif dan kelompok III,

IV dan V diberi infus herba Suruhan dengan konsentrasi 15%, 30% dan 60%. Pengujian antiinflamasi dilakukan pada telapak kaki tikus putih yang diinduksi 0,5 mL larutan putih telur 10% dan pemberian perlakuan 3 x sehari selama 3 hari. Pengukuran volume telapak kaki tikus dilakukan sebelum perlakuan dan sesudah 1 hari, 2 hari dan 3 hari perlakuan. Data dianalisis menggunakan uji *Anova*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infus herba Suruhan memiliki efek antiinflamasi pada tikus putih ($p < 0,05$).

Erwin Sitorus, dengan judul skripsi “Aktivitas antioksidan tumbuhan Kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt). 2012. Universitas syam ratulangi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aktivitas antioksidan dari tumbuhan kaca-kaca, dengan mengukur total antioksidan tumbuhan pada keadaan segar dan kering. Serta tanpa dan dengan pemanasan. Total antioksidan diukur menggunakan metode FRAP (*Ferric Reducing Antiooxidant Powe*) dan absorbansinya dibaca pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 593 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total antioksidan ekstrak kaca-kaca kering sebesar 3,25mmol/100g dan ekstrak kaca-kaca segar 0,21 mmol/100g. Total antioksidan tertinggi pada ekstran kaca-kaca kering dengan pemanasan 4.05 mmol/100g. Diikuti oleh ekstrak kaca-kaca kering tanpa pemanasan 2,44 mmol/100g. Ekstrak kaca-kaca segar dengan pemanasan 0,35 mmol/100g dan ekstrak kaca-kaca segar tanpa pemanasan 0,08 mmol/100g. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kandungan total antioksidan ekstrak kaca-kaca kering lebih tinggi daripada ekstrak kaca-kaca segar

dan pemanasan pada suhu 100°C selama 15 menit meningkatkan total antioksidan dalam ekstrak tumbuhan kaca-kaca.

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah mencit (*Mus musculus*).
- b. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapa ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) berefek terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah mencit (*Mus musculus*).
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai obat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan tentang pengaruh herba kaca-kaca (*Peperomia Pellucida* (L) Khunt) terhadap penurunan kadar asam urat.
- b. Penelitian ini akan memberikan informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tanaman kaca-kaca*

1. **Klasifikasi tanaman** (Ersi, 2013: 25)

Klasifikasi tanaman kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt.) adalah sebagai berikut :

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledoneae
Bangsa	: Piperales
Suku	: Piperaceae
Marga	: Peperomia
Jenis	: <i>Peperomia pellucida</i> (L) Khunt.

2. **Nama Daerah**

Nama daerah dari tanaman kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt.) adalah sebagai berikut: Ketumpangan ayer (Melayu), Saladaan (Sunda), Suruhan (Jawa), Gofu Guroho (Ternate), Kaca-kaca (Palu, Gorontalo, Manado, Makassar, Gowa).

3. **Morfologi tumbuhan**

Tanaman kaca-kaca (*Peperomia Pellucida* (L) Khunt) dapat ditemukan ditempat lembab di asia dan amerika. Tanaman kaca-kaca berbentuk herba, tegak,

tinggi 20–40 cm, bercabang. Daun tunggal berseling, panjang 1-3 cm, bulat telur melebar ujung meruncing, bagian pangkal membentuk jantung, tepi daun rata, permukaan atas daun hijau pucat mengkilap, permukaan bawah lebih muda dan agak kelabu. Batang sukulen, agak transparan. Bunga bentuk buliran, panjang 1-6 cm, berwarna hijau terletak di ujung tangkai dan ketiak daun. Buah bulat, ujung runcing, diameter kurang dari 1 mm, berbentuk bujur dan berwarna hijau ketika muda dan coklat apabila matang. (Marthin, 2011 : 17).

4. Kandungan kimia

Kandunga senyawa yang ada dalam kaca-kaca (*Peperomia Pellucida* (L) Khunt) adalah alkaloid. Kaca-kaca (*Peperomia Pellucida* (L) Khunt) juga mengandung beberapa minyak esensial, terutama dillapiole, β -caryophyllene dan carotol yang memiliki aktivitas larvisida tinggi (Xu et al., 2005). Senyawa lainnya adalah flavonoid seperti acacetin, apigenin, isovitexin dan pellucidatin, pitosterol, yaitu, campesterol, stigmasterol, dan arylpropanoids. Glikosida jantung, tanin dan antrakuinon juga telah diisolasi dari tanaman (Salma, 2013: 117).

Tanaman ini mengandung minyak asiri yang terdiri dari apirole, kariofilen, akasetin, apigenin, pellusidatin, isoviteksin, pellusidatin-8-neokesperidosida, dan 2-4-5 trimeteksi stiren. Digunakan sebagai pestisida – anti bakteri (Marthin,2011:17). Secara tradisional herba suruhan (*Peperomia pellucida*, (L) Kunth) digunakan sebagai obat abses, bisul jerawat, gout, sakit kepala, mengurangi nyeri pada rematik dan rematik gout. Hasil analisis proksimat menunjukkan kadar abu yang

tinggi, kandungan serat kasar lebih tinggi, sementara kandungan karbohidrat diamati menjadi yang tertinggi. Analisis mineral menunjukkan kandungan mangan sangat rendah, seng, besi, dan tembaga menjadi rendah, namun kadar natrium tinggi. Skrining fitokimia mengungkapkan adanya alka-loid, kardenolid, saponin dan tanin (Togobu,2013:110).

5. Kegunaan Tanaman

Salah satu spesies tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional adalah tumbuhan kaca-kaca (*Peperomia Pellucida* (L) Khunt). Tanaman ini secara tradisional digunakan untuk mengobati pusing, sakit kepala, demam. Perasan daunnya dapat digunakan untuk pengobatan sakit perut, meredakan nyeri, rematik, menurunkan kadar asam urat dalam darah yang tinggi. Tanaman ini juga dilaporkan memiliki aktifitas antiinflamasi (Wijaya dan Monica, 2004), antibakteri, antikanker, obat demam dan setelah diteliti ternyata dilaporkan memiliki aktifitas antipiretik (Khan et al., 2008), serta digunakan sebagai obat antihipertensi (salma, 2013: 117).

B. Asam Urat

1. Pengertian Asam Urat

Asam urat merupakan produk akhir dari katabolisme atau pemecahan purin di dalam tubuh. Katabolisme termasuk proses metabolisme tubuh yang merombak suatu substrat kompleks menjadi molekul yang lebih kecil. Katabolisme purin ini membutuhkan enzim xantin oksidase yang terdapat di hati dan usus. Purin merupakan salah satu komponen asam nukleat yang terdapat di dalam inti sel tubuh semua

mahluk hidup. Purin diproduksi oleh ginjal dan pasti terdapat di dalam tubuh manusia. Purin di dalam tubuh yang telah dikatabolisme akan menjadi asam urat. Asam urat biasanya terjadi pada persendiaan atau ginjal. Penyakit ini menimbulkan peradangan dan rasa nyeri pada bagian sendi tempat menumpuknya kristal asam urat yang saling bergesekkan pada saat sendi bergerak (Ersi, 2013: 2).

Kadar asam urat berkaitan erat dengan produksi purin dan asupan purin yang dikonsumsi. Purin di dalam tubuh yang telah dikatabolisme akan menjadi asam urat. Asam urat yang merupakan hasil buangan ini harus dikeluarkan oleh ginjal dari dalam tubuh melalui urin dan sebagian kecil melalui feses. Kadar asam urat yang normal tergantung dari usia dan jenis kelamin, kadar asam urat wanita dewasa 2,4 – 5,7 mg/dl, pria dewasa 3,4 – 7,0 mg/dl, dan anak-anak 2,8 – 4,0 mg/dl (Ersi, 2013: 2)

Mencit normal memiliki kadar asam urat 0,5 – 1,4 mg/dl dan mencit dikatakan hiperurisemia bila kadar asam uratnya 1,7 – 3,0 mg/dl. Kelebihan kadar asam urat di darah yang melewati batas normal dinamakan hiperurisemia (Mahardian, 2014: 1).

2. Penyebab penyakit asam Urat

Penyakit asam urat disebabkan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Normalnya, asam urat sebagai hasil samping dari hasil pemecahan sel yang terdapat dalam darah karena tubuh secara berkesinambungan memecahkan dan membentuk sel yang baru. Kadar asam urat meningkat atau abnormal ketika ginjal tidak sanggup mengeluarkannya melalui air kemih. Tubuh juga dapat membuat kadar asam urat dalam jumlah sangat tinggi karena adanya abnormalitas suatu enzim atau serangan suatu penyakit serta ketidakseimbangan hormonal tubuh (Ersi, 2013: 2).

Peningkatan kadar asam urat dalam darah disebut dengan hiperurisemia.

Berdasarkan penyebabnya, hiperurisemia digolongkan menjadi 2, yaitu:

a. Hiperurisemia primer

Hiperurisemia primer biasanya tidak diketahui penyebabnya, tetapi sebagian disebabkan defisiensi enzim hipoxantin guanine fosforibosil transferase (HGPRT) dan peningkatan aktifitas enzim fosforibosil pirofosfatase (PRPP).

b. Hiperurisemia sekunder

Hiperurisemia sekunder disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

Intoleransi fruktosa atau ketidakmampuan tubuh untuk memproses fruktosa secara normal.

- 1) Kelainan glikogen.
- 2) Penyakit mieloproliferatif akibat terbentuknya sel mieloid secara berlebihan.
- 3) Penyakit limfoproliferatif akibat terbentuknya limfosit yang berlebihan.
- 4) Anemia hemolitik dan kegemukan (obesitas).
- 5) Psoriasis atau penyakit kulit yang mengering, kering, bisa terjadi diseluruh tubuh. Namun, kebanyakan terjadi di lengan dan tungkai, terutama siku dan lutut.
- 6) Kelainan ginjal.
- 7) Intoksikasi (keracunan) timbal.
- 8) Obat-obatan tertentu (diuretika, dosis rendah asam salisilat) (Ersi. 2013: 3-7).

3. Peningkatan kadar asam urat

Peningkatan kadar asam urat (hiperurisemia) merupakan suatu sindrom klinis yang mempunyai gambaran khusus sebelum artritis akut karena produksi asam urat melebihi batas normal, melebihi 7 md/dL. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit rematik yang penatalaksanaannya mudah, sebaliknya pada pengobatan yang tidak memadai hiperurisemia dapat menyebabkan artritis gout (Tehupeiory, 1996: 85)

4. Metabolisme asam urat

Pembentukan asam urat dalam darah juga dapat meningkat yang disebabkan oleh faktor dari luar terutama makanan dan minuman yang merangsang pembentukan asam urat. Adanya gangguan dalam proses sekresi dalam tubuh akan menyebabkan penumpukan asam urat di dalam ginjal dan persendian. Jalur kompleks pembentukan asam urat dimulai dari ribose 5-phosphate, suatu pentose yang berasal dari *glycolic metabolism*, diubah menjadi *PRPP* (*phosphoribosyl pyrophosphate*) dan kemudian phospho ribosilamine, lalu ditransformasi menjadi *inosine monophosphate (IMP)*. Dari senyawa perantara yang berasal dari *adenosinemonophosphate (AMP)* dan *guanosine monophosphate (GMP)*, *purinic nucleotides* digunakan untuk sintesis DNA dan RNA, serta *inosine* yang kemudian akan mengalami degradasi menjadi *hypoxanthine*, *xanthine* dan akhirnya menjadi *uric acid*.



Gambar 1. Pembentukan asam urat

5. Patofisiologi peningkatan kadar asam urat

Penyebab primer dari peningkatan kadar asam urat adalah gangguan pada metabolisme purin yang berakibat terganggunya keseimbangan antara sintesa asam urat dan sekresinya oleh ginjal, sehingga kadar asam urat tinggi. Berdasarkan faktor penyebabnya hiperurisemia dan gout dapat diklasifikasikan sebagai kelainan metabolik dan kelainan ginjal. Pada penderita hiperurisemia karena kelainan metabolik, terjadi peningkatan produksi asam urat, sedangkan hiperurisemia karena kelainan pada ginjal, terjadi peningkatan asam urat yang disebabkan penurunan sekresi tubulus ginjal. Perbedaan antara hiperurisemia yang berasal dari kelainan metabolik dan dari kelainan ginjal tidak jelas, karena kedua metabolisme tersebut saling berkaitan (Kelley, 1991:1835).

Dalam keadaan normal, kadar asam urat di dalam darah pada pria dewasa kurang dari 7 mg/dL dan pada wanita kurang dari 6 mg/dL. Dan apabila konsentrasi asam urat dalam serum lebih besar dari 7,0 mg/dL dapat menyebabkan penumpukan kristal monosodium urat. Serangan gout tampaknya berhubungan dengan peningkatan atau penurunan secara mendadak kadar asam urat dalam serum. Jika kadar asam urat mengendap dalam sendi, akan terjadi respon inflamasi dan diteruskan dengan terjadinya serangan gout. Dengan adanya serangan yang berulang-ulang, penumpukan kristal monosodium urat yang dinamakan thopi akan mengendap dibagian perifer tubuh seperti ibu jari kaki, tangan dan telinga. Akibat penumpukan *Nefrolitiasis* urat (batu ginjal) dengan disertai dengan penyakit kronis.

Gambaran kristal urat dalam cairan sinovial sendi yang asimtomatik menunjukkan bahwa faktor-faktor non-kristal mungkin berhubungan dengan reaksi inflamasi. Kristal monosodium urat yang ditemukan tersalut dengan immunoglobulin yang terutama berupa IgG. Dimana IgG akan meningkatkan fagositosis Kristal dan dengan demikian dapat memperlihatkan aktifitas imunologi.


6. Gambaran klinis meningkatnya kadar asam urat


Keadaan Hiperurisemia tidak sama dengan gout, sehingga tidak selalu hiperurisemia disebut sebagai gout. Hiperurisemia terjadi ketika asam urat melebihi batas normal dan tidak menimbulkan pembengkakan atau inflamasi persendian (Tehupeiory, 1996: 86).

Serangan gout biasanya bersifat monoartekuler, disertai gejala lengkap inflamasi, yaitu merah, bengkak, panas, terasa sakit. Lokasi yang paling sering terkena

pada serangan pertama adalah metatarsophalangeal pertama. Hampir pada semua kasus arthritis terutama pada sendi perifer dan jarang pada sendi sentral (Tehupeiory. 1996: 87).

Tophi adalah penimbunan kristal asam urat pada jaringan yang mempunyai karakteristik sebagai benjolan dibawah kulit yang bening. Tophi paling sering timbul pada penderita arthritis gout yang lebih dari 10 tahun. Nilai diagnostiknya hampir tidak ada, karena biasanya diagnosis hiperurisemia dan gout sudah terjadi sebelum timbulnya tophi. Tophi dapat timbul tanpa gejala, misalnya pada jaringan kartilago telinga. Pada arthritis gout akut yang berat, tophi dapat timbul pada serangan pertama. Tophi dengan *hiperurisemia* yang tidak terkontrol akan bertambah besar dan mengakibatkan disfungsi persendian (Tehupeiory. 1996: 89).





Gambar 2. Patofisiologi gout dan cara kerja obatnya

7. Prevalensi peningkatan asam urat

Peningkatan asam urat (hiperurisemia) merupakan awal penyakit gout atau artritis pirai, yang digolongkan atas gout primer dan gout sekunder. 99% penyebab penyakit gout primer belum diketahui (idiopatik), yang diduga dengan berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor humoral. Penyebab primer menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan peningkatan produksi asam urat. Sedangkan penyakit gout sekunder disebabkan peningkatan produksi asam urat. Produksi asam urat meningkat akibat mengkonsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi seperti jeroan dan juga bisa disebabkan penyakit darah (penyakit sumsum tulang, polisitemia), obat-obatan (alkohol, obat-obat kanker dan vitamin B₁₂)(Wibowo. 2004).

Makanan yang memicu terbentuknya asam urat melebihi kadar normal dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *pertama*, makanan yang mengandung purin tinggi (150-180 mg/100 gram makanan) adalah diantaranya hati, ginjal, otak, jantung, udang, remis, kerang, sarden, ekstrak daging (abon, dendeng), tape, alkohol. *Kedua*, makanan yang mengandung purin sedang (50-150 mg/100 gram makanan) yaitu daging sapi, kerang, kacang-kacangan kering, kembang kol, bayam, asparagus, buncis, jamur, daun singkong, daun papaya dan kangkung. *Ketiga*, makanan yang mengandung purin lebih ringan (0-50 mg/ 100 gram makanan) adalah keju, susu dan telur (Wibowo. 2004).

Hiperurisemia dan gout umumnya menyerang kaum laki-laki, dan laki-laki gemuk mempunyai kecenderungan lebih tinggi terserang penyakit tersebut. Kaum laki-laki persentase terserang penyakit hiperurisemia dan gout sangat tinggi dibandingkan dengan kaum perempuan yang baru muncul setelah menopause. Hal ini disebabkan pada perempuan disekresikan hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat lewat urin, sementara pada pria tidak disekresikan hormon esterogen, sehingga asam uratnya cenderung lebih tinggi (Wibowo. 2004).

8. Pengobatan hiperurisemia

Penemuan-penemuan Laboratorium tentang analisis diagnosa asam urat sangat membantu pengobatan hiperurisemia. Tujuan yang diinginkan adanya pengobatan hiperurisemia adalah mengobati serangan akut; mencegah serangan ulang penyakit hiperurisemia; mencegah kelainan sendi yang berakibat penimbunan kristal urat; mencegah komplikasi yang dapat terjadi akibat peninggian asam urat pada

jantung, ginjal dan pembuluh darah, mencegah pembentukan batu kristal pada saluran kemih. Untuk tujuan tersebut pengobatan yang dilaksanakan diantaranya: (Tehupeiory. 1996: 87).

a. Pencegahan inflamasi sendi (SIS)

Semua jenis AINS (anti inflamasi dan analgetik) dapat diberikan pada serangan hiperurisemia, namun hasilnya akan berbeda (Ganiswara. 1995: 225). Sampai sekarang *kholkisin* masih merupakan obat pilihan dalam pengobatan serangan hiperurisemia sampai arthritis gout akut ataupun pencegahannya dengan dosis yang lebih rendah (Raharjo dan Tan. 1991: 512). *Kholkisin* merupakan *alkaloid* yang diperoleh dari tumbuhan. Obat ini sudah digunakan sebagai obat encok di abad ke-enam oleh dokter-dokter di Arab. *Kholkisin* bersifat anti inflamasi dan analgesik yang spesifik untuk encok dengan efek cepat yaitu 0,5-2 jam setelah serangan akut. Daya kerjanya diperkirakan berdasarkan hambatan phagositosis dari leukosit sehingga siklus peradangan diputuskan (Ganiswara. 1995: 227).

b. Penanggulangan hiperurisemia

Pengobatan yang dilakukan terhadap penyakit hiperurisemia sementara ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pencegahan yang dapat menurunkan kadar asam urat, dikenal dengan obat urikosurik yang memperlancar ekskresi asam urat oleh tubuli ginjal dan pencegahan dengan penghambatan xanthin oxidase atau xanthin dehydrogenase (Tehupeiory. 1996: 88).

1) Urikosurik

Mekanisme kerja urikosurik dalam pengobatan hiperurisemia adalah menghambat reabsorpsi asam urat oleh tubuli ginjal, sehingga banyak asam urat dikeluarkan bersama air seni. Untuk mencegah mengendapnya asam urat pada saluran kemih akibat konsentrasinya yang tinggi dalam air seni, dianjurkan sesering minum air putih kurang lebih tiga liter perhari (Raharjo dan Tan, 1979: 513).

2) Penghambat Xantin Oksidase

Obat yang sering digunakan sebagai penghambat xantin oksidase adalah allopurinol. Mekanisme kerja allopurinol dengan cara menghambat enzim xantin oksidase yaitu enzim yang bertanggung jawab untuk merombak senyawa purin (hipoxantin dan xantin) menjadi asam urat. Struktur kimia allopurinol sangat mirip dengan xantin sehingga enzim xantin oksidase bekerja pada zat tersebut, akibatnya perombakan xantin menjadi asam urat juga menurun (Raharjo dan Tan, 1979: 514).

9. Gejala

Kadar asam urat darah yang tinggi dapat menyebabkan kesemutan, pegal-pegal, persendian terasa kaku, nyeri sendi, rematik asam urat, sampai pada penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Rasa ngilu biasanya dirasakan di kaki kanan dan tangan kiri. Jika sudah menyerang tangan kiri, rasa ngilu itu akan terus merambat ke bahu dan leher (Nyoman Kertia, 2009: 76).

10. Macam – macam pemeriksaan Asam Urat (Uric Acid)

a. Pemeriksaan Holistik

Pemeriksaan holistik adalah pemeriksaan yang menyeluruh dimana pemeriksaan dilakukan dari kapan terjadinya nyeri, bagaimana dapat terjadinya nyeri. Setelah itu dilihat riwayat kesehatan, baru ditegakkan diagnosis.

b. Pemeriksaan Enzimatis

Pemeriksaan enzimatis adalah pemeriksaan asam urat dengan prinsip uric – acid yang bereaksi dengan *urease* membentuk reaksi H_2O_2 di bawah katalisis peroksidase dengan 3,5 didorohidroksi bensensulfuric acid dan 4 aminophenazone memberikan reaksi warna violet dengan indikator Quinollmine .

Obat sintetis yang biasa dikonsumsi untuk mengobati asam urat adalah allopurinol. Allopurinol merupakan obat medis yang digunakan untuk menghambat enzim xantin oksidase (XO), tetapi obat ini memberikan banyak efek samping seperti radang hati dan reaksi alergi. Dengan demikian, perlu obat alternatif yang memiliki aktivitas pengobatan lebih baik dan efek samping yang rendah. Senyawa flavonoid dan alkaloid pada tanaman dapat berperan sebagai obat untuk penyakit gout dengan menghambat kerja XO. Penggunaan bahan alam sebagai obat memiliki kelebihan, yaitu meskipun penggunaannya dalam waktu lama tetapi efek samping yang ditimbulkan relatif kecil sehingga dianggap lebih aman (Katno & Pramono 2002: 123).

Ekstrak suruhan mengandung senyawa kimia golongan glikosida, flavanoid, tanin dan steroid/triterpenoid. Diduga flavanoid yang terkandung pada tumbuhan ini

yang memberikan efek penurunan kadar asam urat. Kemampuan senyawa tersebut dalam menurunkan kadar asam urat adalah dengan mekanisme hambatan terhadap aktivitas xantin oksida pada basa purin sehingga akan menurunkan produksi asam urat (Kristiani,R,D,2013).

Mekanisme kerja allopurinol dengan menghambat xantin oksidase yaitu enzim yang dapat mengubah hipoxantin menjadi xantin, selanjutnya mengubah xantin menjadi asam urat. Dalam tubuh allopurinol mengalami metabolisme menjadi oksipurinol (alozantin) yang juga bekerja sebagai penghambat enzim xantin oksidase. Mekanisme kerja senyawa ini berdasarkan katabolisme purin dan mengurangi produksi asam urat, tanpa mengganggu biosintesa purin (Katzung et al,2012).

Xantin oksidase (XO) berperan penting dalam katabolisme purin. XO mempunyai 2 bentuk, yaitu XO dan xantin dehidrogenase (XDH). XDH dapat dikonversi menjadi XO pada mamalia, baik dalam reaksi reversibel maupun irreversibel. XO merupakan enzim yang tersebar luas dalam beberapa spesies dari bakteri hingga manusia. Di dalam tubuh, XO ditemukan di sel hati dan otot, tetapi tidak ditemukan di dalam darah. XO merupakan suatu kompleks enzim yang terdiri atas 1332 residu asam amino, molibdenum (HO_2SMo), FAD, dan Fe_2S_2 sebagai pusat reaksi redoks, dengan bobot molekul sebesar 275.000 Dalton membentuk 2 sub unit. Menurut Westerfeld et al (1959), senyawa yang dapat berfungsi sebagai penstabilisasi XO diantaranya adalah salisilat, sistein, histamin, dan versenat. Sementara senyawa yang dapat menghambat XO berupa ion logam,

urea, purin-6-aldehida, dan 2-amino-4-hidroksipteridin-6 aldehida (Raharjo dan Tan. 1979: 520).


XO mengkatalis oksidasi hipoxantin menjadi xantin lalu menjadi asam urat yang berperan penting pada penyakit gout. Pada saat bereaksi dengan xantin untuk membentuk asam urat, atom oksigen ditransfer dari molibdenum ke xantin. Perombakan pusat molibdenum yang aktif terjadi dengan penambahan air (Raharjo dan Tan, 1979: 529).

11. Kafeina

Kafein adalah komponen alkaloid derivat xantin yang mengandung gugus metil yang akan dioksidasi oleh xantin oksidase membentuk asam urat sehingga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh (Azizahwati *et al*, 2008).

Kafein cepat diabsorpsi setelah pemberian oral, parenteral, atau rektal. Sediaan bentuk cair atau tablet tidak bersalut akan diabsorpsi secara cepat. Kadar puncak plasma dapat dihasilkan dalam waktu 1 jam, sedangkan eliminasi metilxantin terutama melalui metabolisme hati sebagian besar diekskresi bersama urin dalam bentuk asam urat. Kurang dari 15% kafeina akan ditemukan di urin dalam bentuk utuh, waktu paruh plasma kafeina antara 3-7 jam (Wade A, 1982:340).

Kafein dapat meningkatkan kadar asam urat. Kafein (1,3,7 trimethylxanthin) akan mengalami degradasi menjadi 1,3 dimethylxanthin, 3,7 dimethylxanthin, 1,7 dimethylxanthin yang kemudian membentuk methylxanthin. Xantin dengan bantuan enzim xanthin oksidase akan membentuk asam urat.



Gambar 3. Jalur Degradasi kafein dalam membentuk asam urat dengan

bantuan xanthin oxidase

C. *Karakteristik Mencit*

Mencit memiliki taksonomi sebagai berikut (Arrington, 1972: 7):

Kerajaan	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub Filum	: Vertebrata
Kelas	: Mamalia
Bangsa	: Rodentia
Suku	: Muridae
Marga	: Mus
Jenis	: <i>Mus musculus</i> . Linn

Mencit merupakan hewan yang paling umum digunakan pada penelitian laboratorium sebagai hewan percobaan, yaitu sekitar 40-80%. Mencit memiliki banyak keunggulan sebagai hewan percobaan, yaitu siklus hidup yang relatif pendek, jumlah anak perlahiran banyak, variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam penanganannya (Moriwaki, 1994: 145).

Mencit (*Mus musculus*) dan tikus (*Ratus norvegicus*) merupakan omnivora alami, sehat, dan kuat, profilik, kecil, dan jinak. Selain itu, hewan ini juga mudah didapat dengan harga yang relatif murah dan biaya ransum yang rendah (Peter, 1976: 1765).

Mencit putih memiliki bulu yang pendek halus berwarna putih serta ekor berwarna kemerahan dengan ukuran lebih panjang dari pada badan dan kepala. Mencit memiliki warna bulu yang berbeda disebabkan perbedaan dalam proporsi

darah mencit liar dan memiliki kelenturan pada sifat-sifat produksi dan reproduksinya (Nafiu, 1996: 93).

Data biologik normal pada mencit (Diah, 2004)

Berat badan (gram)	Keterangan
Jantan (gram)	20-40
Betina (gram)	18-35
Lama hidup (tahun)	1-3
Temperature tubuh ($^{\circ}$ C)	36,5
Kebutuhan air	Ad libitum
Kebutuhan makanan (g/hari)	4-5
Pubertas (hari)	28-49
Lama kebuntingan (hari)	17-21
Mata membuka (hari)	12-13
Tekanan darah	
Sistolik (mmHg)	133-160
Diastolik (mmHg)	102-110
Kolesterol (mg/dl)	26,0-82,4
Asam urat (mg/dl)	0,5-1,4

Volume sediaan dan ukuran jarum untuk injeksi adalah sebagai berikut:

	I.V	I.P	I.M	S.C	Oral
Lokasi	Lateral ekor		Tidak direkomendasi	Belakang leher	
Volume	0,2 ml	1-3 ml		2-3 ml	5-10l/Kg

D. Metode penyarian

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995: 7).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel, mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Dirjen POM, 2000 dan Harborne 1987: 6-8).

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan secara dingin yaitu maserasi dan perkolasi, dan secara panas yaitu refluks, soxhlet, digesti, infus, dan dekok (Dirjen POM, 2000: 82).

Ada beberapa metode ekstraksi yang digunakan yaitu :

1. Cara dingin (Depkes RI, 2000: 82-84)

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserat pertama, dan seterusnya.

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstrak dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahapan perkolasi pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

E. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan Yang Diolah Menjadi Obat

Sebagaimana Islam memperhatikan kesehatan, Islam juga memperhatikan pengobatan baik, yang bersifat kuratif maupun preventif. Dan Islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir. Sebaliknya Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen ilmiah dan hukum sebab-akibat.

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan.

Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan, salah satu contoh tanaman yang dapat berkhasiat dalam pengobatan yaitu kaca-kaca

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. asy-Syu'ara : 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi berbagai macam pasang (tetumbuhan) yang baik?

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah Swt senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk meneliti, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengandung suatu zat / obat yang dapat digunakan

untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan, salah satu contoh tanaman yang dapat berkhasiat dalam pengobatan yaitu Kaca-kaca.

Firman Allah Swt dalam Q.S *al-Thaahā'*/ 20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya :

Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. (Departemen Agama RI 2013, 53).

Ayat di atas menyatakan bahwa *Dia yang telah menjadikan bagi kamu sebagai hamparan* adalah isyarat bahwa keberadaan manusia dipentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah. Firman-Nya : *menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan*, adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya firman-Nya bahwa : *Dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga*

bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2002: 317).

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah Swt menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satunya sampel ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) sebagai sampel yang dapat digunakan sebagai bahan dalam bidang pengobatan yang bermanfaat sebagai penurun kadar asam urat.

Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang potensi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS.Al-An'am/06: 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا
قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَبِهٍ^ط انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ^ج إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Departemen Agama RI 2013, 66).

Adapun karakteristik ayat di atas yang cukup menarik adalah pada bagian akhir yaitu: *inna fi zalika la aya til li qaumiy yu'minun(a)*. Dalam ayat ini Allah telah bercerita tentang sebuah permasalahan penting seputar sel tumbuhan, yakni kloroplas yang mengandung zat klorofil-pigmen hijau-pada tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Kata klorofil atau zat hijau daun sebenarnya diambil dari kata pigmen "hijau" yang membuat tumbuhan berwarna hijau. Hal ini sebagaimana terjadi proses inti dalam fotosintesis yang merupakan proses terpenting dalam kehidupan di dunia ini. Kata klorofil berasal dari bahasa Yunani *chloros* yang berarti "hijau" dan *phullon* yang berarti "daun". Fungsi klorofil tidak hanya terbatas sebagai zat pewarna hijau pada daun. Akan tetapi, lebih dari itu, klorofil juga memainkan peranan penting dalam proses fotosintesis. Sekarang perhatikan keakuratan Al-Qur'an dari ayat di atas yaitu *fa akhrajna bihi nabata kulli syai in fa akhrajna minhu khadiran*, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa pigmen hijau-yang merupakan bagian dari struktur tumbuhan. "Kami tumbuhkan dengannya segala macam tumbuh-tumbuhan"-merupakan zat hijau daun yang biasa dikenal dengan sebutan klorofil yang terdapat pada salah satu sel tumbuhan kloroplas. Ayat itu disempurnakan dengan menyebut

nama-nama tumbuhan lain seperti kurma, zaitun, delima. Disebutkan pula bahwa unsur-unsur pembentuk tumbuhan ini diantaranya yang dimaksud adalah zat hijau daun tersebut (Thalbah, 2009: 64).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt menciptakan klorofil untuk proses pertumbuhan dari tumbuhan agar bermanfaat bagi manusia, dimana pada penelitian ini menggunakan herba kaca-kaca yang memanfaatkan hasil dari proses fotosintesis dengan bahan baku klorofil tersebut untuk tumbuh dan memiliki zat yang bermanfaat.

Dalam surat Al- Nahl/16: 114 Allah Swt menjelaskan mengenai halal dan thayyib.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya :

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah. (Departemen Agama RI 2013, 114).

Dari ayat di atas bermakna, pilihlah wahai orang-orang yang beriman, jalan kesyukuran dan *makanlah* sebagian *dari apa yang direzekikan*, yakni dianugerahkan, *oleh Allah kepada kamu*. *Makanlah itu dalam keadaan halal lagi baik*, lezat dan bergizi serta berdampak positif bagi kesehatan; *dan syukurilah nikmat Allah* agar

kamu tidak ditimpa apa yang menimpa negeri-negeri dahulu *jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah* (Shihab, 2002: 757).

Dimana dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt menyeruhkan kepada umatnya untuk mengkomsumsi zat-zat yang halal dan baik. Dimana halal merupakan sesuatu yang hukumnya boleh dan tidak terdapat larangan serta tayyib yang berarti baik, bermanfaat dan tidak menimbulkan keburukan (mudharat). Maka diharapkan manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai media pengobatan yang bersifat halal dan tayyib dimana dalam penelitian ini memanfaatkan herba kaca-kaca untuk pengobatan.

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (صحیح رواہ مسلم)

Artinya :

Setiap penyakit ada obatnya dan jika suatu obat mengenai tepat pada penyakitnya, ia akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. (Al-Ju'aisin, 2001).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Swt ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah Swt yang menyembuhkannya, akan tetapi Allah Swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari (meneliti) oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

Dari beberapa ayat dan hadist di atas dapat kita ketahui bersama bahwa Allah Swt telah memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta, sebab Allah Swt yang mengetahui manusia dan apa yang ada di langit dan di bumi secara mendetail, sehingga dengan ayat dan hadist ini sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur dan tidak mengkufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biofarmasi dan Biologi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah berupa pendekatan eksperimentatif yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil dari eksperimen yang dilakukan.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Pengambilan sampel

a. Populasi

Tanaman kaca-kaca terdapat di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu

b. Sampel

Sampel herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) diperoleh dari Jl. Mustafa Dg Bunga Romang-Polong.

2. Pengolahan Sampel

Sampel herba kaca-kaca (*Peperomia Pellucida* (L) Kunth) yang telah diambil dicuci bersih menggunakan air mengalir kemudian ditiriskan lalu dirajang dan dikeringkan dalam lemari pengering. Setelah kering disimpan dalam wadah tertutup.

3. Ekstraksi Sampel

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Sampel herba kaca-kaca (*Peperomia Pellucida* (L) Khunt) ditimbang sebanyak 500 gram kemudian dimasukkan kedalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan cairan penyari etanol, ditutup dan dibiarkan selama 1x24 jam terlindung dari cahaya, sambil sekali-sekali diaduk. Selanjutnya disaring lalu dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan sampai 3x24 jam. Larutan ekstrak etanol di rotary evaporator kemudian dikeringkan hingga diperoleh ekstrak kental.

4. Penyiapan Hewan Coba

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan dengan berat badan 20-30 g. Sebelum digunakan sebagai hewan percobaan, semua mencit dipelihara terlebih dahulu selama kurang lebih satu minggu untuk penyesuaian lingkungan, mengontrol kesehatan dan berat badan serta menyeragamkan makanannya. Makanan yang digunakan dalah pakan standar.

5. Penentuan dosis

- a. Dosis allopurinol yang digunakan adalah 100 mg/kg BB untuk manusia
- b. Dosis daun kaca-kaca yang diberikan pada hewan uji dalam penelitian adalah konsentrasi 20 mg/Kg BB, 40 mg/Kg BB dan 80 mg/Kg BB.

6. Peningkatan kadar asam urat tinggi

Pada uji ini dilakukan upaya peningkatan kadar asam urat darah dengan menginduksi mencit dengan kafein dosis 37,8 mg/kg BB secara oral.

7. Perlakuan Pada Hewan Coba

Setelah diukur kadar asam uratnya dengan menggunakan alat glukometer, masing-masing mencit di induksikan dengan menggunakan kafeina dosis 37,8 mg/kg BB kesemua kelompok perlakuan.

Mencit masing-masing di beri perlakuan sebagai berikut :

1. Kelompok I : kontrol negatif, yang diberi Na CMC 1 % secara Peroral.
2. Kelompok II : kontrol positif, yang diberi allopurinol dosis 0,39 mg/30 g BB secara peroral.
3. Kelompok III : diberi ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) 20 mg/kg BB secara peroral.
4. Kelompok IV : diberi ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) 40 mg/kg BB secara peroral.
5. Kelompok V : diberi ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) 80 mg/kg BB secara peroral.

Setelah itu diukur kembali 1 jam, 2 jam, dan 3 jam dengan cara yang sama.

D. Instrument penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat - alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pengaduk, bejana maserasi, cawan porselin, gelas erlenmeyer (*Pyrex*[®]), gelas kimia (*Pyrex*[®]), gelas ukur (*Pyrex*[®]), glucometer (*Easy Touch*[®]), timbangan analitik (*Presica*).

2. Bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah allopurinol (kontrol positif), Na CMC (kontrol negatif), ekstrak etanol herba kaca-kaca, mencit jantan berat badan 20-30 gram dan berumur 2-3 bulan, kafein (penginduksi).

E. Validasi dan Rehabilitasi Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian perlakuan berupa ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt).

2. Variabel tergantung

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kadar asam urat dalam darah mencit (*Mus musculus*).

3. Variabel kendali

Variabel kendali dalam penelitian ini adalah jenis mencit, berat badan, jenis kelamin, tempat (kandang), makanan dan minuman.


F. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Teknik pengolahan sampel

Sasaran dilihat dari perubahan yang terjadi pada mencit setelah diukur kadar asam uratnya.

2. Analisis Data

Analisis data ditentukan dengan metode statistika.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil pengukuran kadar asam urat

Mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian sediaan uji ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt.) secara oral menunjukkan perubahan kadar yang berbeda-beda dan dibandingkan dengan kontrol positif dan kontrol negatif

Tabel 3. Hasil pengukuran kadar asam urat hewan uji selama percobaan

Perlakuan	Replikasi	Kadar Asam Urat Darah Mencit (mg/dl)						Jumlah	Rata-rata
		0	K0	K1	K2	K3	K4		
Na CMC	I	1,3	1,1	3,5	3,5	3,5	3,4	16,3	2,71
	II	1,4	1,2	3,6	3,6	3,5	3,4	16,7	2,78
	III	1,3	1,2	3,4	3,4	3,4	3,3	16,0	2,66
	Jumlah	4,0	3,5	10,5	10,5	10,4	10,1	49,0	
	Rata-rata	1,33	1,16	3,5	3,5	3,46	3,36		8,15
Ekstrak Herba Kaca-kaca 20 mg/kg BB	I	1,4	1,3	3,6	3,0	2,4	2,0	13,7	2,28
	II	1,3	1,2	3,5	3,0	2,5	2,1	13,6	2,26
	III	1,4	1,2	3,6	2,9	2,4	1,9	13,4	2,23
	Jumlah	4,1	3,7	10,7	8,9	7,3	6,0	40,7	
	Rata-rata	1,36	1,23	3,56	2,96	2,43	2,0		6,77
	I	1,3	1,2	3,5	2,9	2,3	1,8	13,0	2,16

Ekstrak Herba Kaca-kaca 40 mg/kg BB	II	1,2	1,1	3,6	3,0	2,5	1,9	13,3	2,21
	III	1,4	1,3	3,5	2,8	2,1	1,6	12,7	2,11
	Jumlah	3,9	3,6	10,6	8,7	6,9	5,3	39,0	
	Rata-rata	1,3	1,2	3,53	2,9	2,3	1,76		6,48
Ekstrak Herba Kaca-kaca 80 mg/kg BB	I	1,4	1,3	3,6	2,8	2,1	1,3	12,5	2,08
	II	1,4	1,2	3,6	2,8	2,0	1,2	12,2	2,03
	III	1,3	1,2	3,5	2,9	2,1	1,3	12,3	2,05
	Jumlah	4,1	3,7	10,7	8,5	6,2	3,8	37,0	
	Rata-rata	1,36	1,23	3,56	2,83	2,06	1,26		6,16
Allopurinol	I	1,4	1,2	3,6	2,7	1,9	1,0	11,8	1,96
	II	1,3	1,2	3,5	2,8	2,0	1,2	12,0	2,0
	III	1,3	1,1	3,5	2,8	1,9	1,0	11,6	1,93
	Jumlah	4,0	3,5	10,6	8,3	5,8	3,2	35,4	
	Rata-rata	1,33	1,16	3,53	2,76	1,93	1,06		5,89
Total		20,1	18,0	53,1	44,9	36,6	28,4	201,1	
Rata-rata									6,69

Keterangan :

0 : kadar sebelum puasa

K0 : kadar setelah puasa

K1 : kadar setelah induksi

K2 : kadar 1 jam setelah perlakuan

K3 : kadar 2 jam setelah perlakuan

K4 : kadar 3 jam setelah perlakuan

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode induksi kafeina yang merupakan uji praklinik yang lebih mendekati keadaan penderita asam urat yang sebenarnya. Pada metode ini, kafeina yang merupakan golongan xantin akan dimetabolisme oleh xanthin oksidase menjadi asam urat sehingga asam urat pada hewan uji akan meningkat kadarnya. Herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) diuji kemampuannya untuk menghambat pembentukan enzim xanthin oksidase dari hewan uji karena dalam herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) terdapat kandungan senyawa flavanoid, dimana pada penelitian sebelumnya senyawa flavanoid dapat menghambat pembentukan enzim xanthin oksidase (Immaculata, 2011).

Sediaan uji dibuat dengan menggunakan metode ekstraksi karena metode ini merupakan cara untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Penelitian ini hanya meneliti pada hasil ekstraksi herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) yang berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah mencit yang diinduksi dengan kafeina 37,8 mg/kg BB.

Hewan uji yang digunakan adalah mencit putih jantan (*Mus musculus*) yang memiliki enzim urikase yang dapat memecah asam urat dengan membentuk produk akhir allantoin yang bersifat larut dalam air (Martin, 2009). Untuk memperkecil variasi biologis, maka peneliti melakukan pengendalian terhadap beberapa variabel

kendali. Pengendalian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan hewan uji yang kurang lebih sama variasi biologisnya yaitu diantaranya dengan berat badan sekitar 25-35 gram, jenis kelamin jantan dan diperlakukan sama yaitu ditempatkan dalam kandang dengan jumlah tiap kandangnya sama dan diberi makanan yang sama, sebelum diberi perlakuan hewan uji dipuaskan terlebih dahulu selama 8 jam dan tetap diberi minum. Hal ini dilakukan agar kondisi hewan uji sama dan untuk mengurangi pengaruh makanan yang dikonsumsi terhadap sediaan uji yang diberikan dalam penelitian. Dimana waktu pengosongan lambung berkisar 4-6 jam jadi diperkirakan pada jam ke 8 makanan didalam lambung sudah dikosongkan. Untuk mengurangi tingkat kestresan, hewan uji diadaptasikan dengan kondisi laboratorium selama 7 hari.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat efek penurunan kadar asam urat ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt.) pada hewan coba yang digunakan yaitu mencit. Adapun dosis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 mg/kg BB, 40 mg/kg BB, dan 80 mg/kg BB. Selain itu digunakan juga 2 kelompok hewan coba untuk kontrol, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positif yaitu allopurinol 0,39 mg/30g BB mencit dan kontrol negatif yaitu Na.CMC 1%.

Sebagai kontrol positif digunakan allopurinol karena allopurinol adalah obat modern yang umum digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dan allopurinol merupakan derivat asam nukleat yang diduga mampu menghambat sintesis asam urat. Kontrol positif ini digunakan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penurunan kadar asam urat.

Pada penelitian ini terjadi aktivitas penurunan kadar asam urat dalam darah dari ekstrak etanol daun kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) pada mencit (*Mus musculus*). Hal ini dapat dilihat dari kandungan herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) yaitu flavanoid, tanin, glikosida, steroid/triterpenoid. Diduga flavanoid yang terkandung pada tumbuhan inilah yang memberikan efek penurunan kadar asam urat. Kemampuan senyawa tersebut dalam menurunkan kadar asam urat adalah dengan mekanisme hambatan terhadap aktivitas xantin oksida pada basa purin sehingga akan menurunkan produksi asam urat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil rata-rata kadar asam urat darah mencit untuk tiap perlakuan yang diukur kadar sebelum puasa, kadar setelah puasa, kadar setelah induksi serta setiap jam ke-1, 2, dan 3 yaitu untuk kontrol negatif yang diinduksi Na.CMC masing-masing 1,33 mg/dl, 1,16 mg/dl, 3,5 mg/dl, 3,5 mg/dl, 3,46 mg/dl dan 3,36 mg/dl. Untuk kelompok hewan coba yang diinduksi ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) sebanyak 20 mg/kg BB masing-masing 1,36 mg/dl, 1,23 mg/dl, 3,56 mg/dl, 2,96 mg/dl, 2,43 mg/dl serta 2,0 mg/dl. Untuk kelompok hewan coba yang diinduksi ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) sebanyak 40 mg/kg BB masing-masing sebesar 1,3 mg/dl, 1,2 mg/dl, 3,35 mg/dl, 2,9 mg/dl, 2,3 mg/dl serta 1,76 mg/dl. Untuk kelompok hewan yang diinduksi dengan ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) sebanyak 80 mg/kg BB masing-masing 1,36 mg/dl, 1,23 mg/dl 3,56 mg/dl, 2,83 mg/dl, 2,06 mg/dl, dan 1,26 mg/dl. Untuk kelompok kontrol positif yang diberi allopurinol masing-masing 1,33 mg/dl, 1,16

mg/dl, 3,53 mg/dl, 2,76 mg/dl, 1,93 mg/dl, serta 1,06 mg/dl. Dengan melihat penurunan rata-rata kadar asam urat darah mencit tersebut maka diperoleh data bahwa ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) memberikan efek penurunan kadar asam urat darah pada mencit yang diujikan dengan interval waktu 1 jam selama 3 jam. Dan menunjukkan penurunan yang hampir sama dengan allopurinol sebagai kontrol positif namun berbanding terbalik dengan Na. CMC sebagai kontrol negatif, sehingga disimpulkan bahwa ekstrak etanol herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) dapat digunakan pada penderita hiperurisemia.

Dari hasil yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa semua dosis ekstrak yang diinduksikan pada hewan coba ternyata memberi efek mampu menurunkan kadar asam urat darah. Hal ini dapat dilihat penggambarannya pada tabel perubahan kadar asam urat darah. Jika ketiga kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol positif, akan terlihat kemiripan pergerakan perubahan kadar asam urat darah menjadi turun.

Berdasarkan analisa data menggunakan metode RAL (Rancangan Acak Lengkap) untuk kadar asam urat rata-rata diperoleh hasil sangat berbeda nyata (sangat signifikan) antara ekstrak 20 mg/kg BB dengan kontrol positif dimana nilainya $>$ dari BNT/LSD 0,05 dan BNT/LSD 0,01 artinya nilai aktifitas ekstrak 20 mg/kg BB lebih tinggi dari kontrol positif, hasil sangat berbeda nyata (sangat signifikan) antara kontrol negatif dengan kontrol positif dimana nilainya $>$ dari BNT/LSD 0,05 dan BNT/LSD 0,01 artinya nilai aktifitas kontrol positif lebih tinggi dari kontrol negatif, hasil berbeda nyata (signifikan) antara ekstrak 20 mg/kg BB dengan 80 mg/kg BB

dimana nilainya $>$ dari BNT/LSD 0,05 dan $<$ BNT/LSD 0,01 artinya nilai aktifitas ekstrak 20 mg/kg BB dan ekstrak 80 mg/kg BB berbeda nyata, nilai berbeda nyata (signifikan) antara ekstrak 40 mg/kg BB dengan kontrol positif dimana nilainya $>$ dari BNT/LSD 0,05 dan BNT/LSD 0,01 artinya nilai aktifitas ekstrak 40 mg/kg BB lebih tinggi dari kontrol positif, dan nilai tidak jauh berbeda (non signifikan) antara ekstrak 20 mg/kg BB dengan ekstrak 40 mg/kg BB dimana nilainya dari $<$ BNT/LSD 0,05 dan BNT/LSD 0,01 artinya aktivitasnya hampir sama dengan ekstrak 40 mg/kg BB, nilai tidak jauh berbeda (non signifikan) antara ekstrak 40 mg/kg BB dengan ekstrak 80 mg/kg BB dimana nilainya $<$ dari BNT/LSD 0,05 dan BNT/LSD 0,01 artinya aktivitasnya hampir sama antara ekstrak 40 mg/kg BB dengan ekstrak 80 mg/kg BB dan nilai tidak jauh berbeda (non signifikan) antara ekstrak 80 mg/kg BB dengan kontrol positif dimana nilainya $<$ dari BNT/LSD 0,05 dan BNT/LSD 0,01 artinya aktivitasnya hampir sama antara ekstrak 80 mg/kg BB dengan kontrol positif.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa control negative sangat berbeda nyata dengan control positif, ekstrak 20 mg/kg BB sangat berbeda nyata dengan control positif, ekstrak 40 mg/kg BB beda nyata dengan control positif, ekstrak 80 mg/kg BB tidak berbeda nyata dengan control positif.

Berdasarkan hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil), dosis III (80 mg/kg BB) adalah konsentrasi optimum untuk penurunan kadar asam urat pada mencit. Penurunan kadar asam urat herba kaca-kaca ((*Peperomia pellucida* (L) Khunt)), menunjukkan bahwa kemampuan penurunan kadar asam urat dari senyawa yang dikandungnya. Herba kaca-kaca mengandung senyawa flavanoid, tanin, glikosida,

steroid. Diduga flavanoid yang terkandung pada tumbuhan inilah yang memberikan efek penurunan kadar asam urat. Mekanisme senyawa flavanoid dalam menurunkan kadar asam urat dalam darah adalah dengan menghambat aktivitas xantin oksidase pada basa purin sehingga akan menurunkan kadar asam urat.

Umat manusia sebagai khalifah diperintahkan oleh Allah Swt untuk memperhatikan bumi dan seisinya serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, tidak terkecuali tumbuhan. Tumbuhan atau herba mempunyai banyak manfaat karena dapat digunakan sebagai penunjang bagi kehidupan manusia. Tumbuhan bahkan merupakan bahan pangan, sandang dan papan. Karenanya, manusia diperintahkan untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari berbagai macam tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang berbagai macam jenisnya juga digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit.

Seperti halnya dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Pemanfaatan herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) yang sebagaimana mestinya, salah satunya sebagai obat penurun kadar asam urat adalah tidak lain sebagai bentuk kesyukuran terhadap ciptaan Allah Swt itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi dengan kafein.
2. Dosis Ekstrak herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) yang efektif berpengaruh terhadap kadar asam urat dalam darah mencit (*Mus musculus*) hiperurisemia adalah dosis 80 mg/kg BB
3. Agama Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui zat atau senyawa aktif yang terdapat dalam herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt) yang mampu beraktivitas sebagai penurun kadar asam urat dalam darah.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kadar yang terdapat dalam herba kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt).

KEPUSTAKAAN

- Apriyanti Maya. *Meracik Sendiri Obat Dan Menu Sehat Bagi Penderita Asam Urat*. Yogyakarta : pustaka baru press. 2010.
- Arrington, L., *Introductory Laboratory Animal. The Breeding, Care, and Management of Experimental Animal Science*. New York: The Interstate Printers and Publishing, Inc. 1972.
- Aziba, Peter I,dkk.”*Analgesic activity of Peperomia pellucida aerial parts in mice*”. *Fitoterapia* 72 (2011) : h. 57.
- Azizahwati, W., Sumali, Prihandini, K. *Efek Penurunan Kadar Asam Urat Dalam Darah Tikus Putih Jantan Dari Rebusan Akar Tanaman Akar Kacing (Acalypha Indica L)*. Depok Departemen Farmasi FMIPA-UI 2010.
- Dalimartha, S.,*Atlas Tumbuhan Obat Indonesia jilid III*. Jakarta: Trumbus Agriwidya. 2003.
- Departemen Kesehatan RI., *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta. 1979.
- Departemen Agama RI. *Al Quranul Karim (Al Hadi Mushaf Latin)*. Jakarta: Satu Warna. 2013.
- Elizabeth N. *Uji efektivitas antiinflamasi infus herba suruhan (Peperomia pellucida (L) Khunt) pada tikus putih (Rattus novergicus)*. Politekhnik kesehatan manado(2012) : h.1.
- Ersi, Herlina. *Penyakit asam urat kandas berkat herbal*. Jakarta: F media, 2013.
- Ganiswara, SG. Rianto, S. Frans, Ds.,*Farmakologidan therapy: Xantine Edisi IV*. Jakarta: Balai penerbit FK UI. 1995.
- Hamzah, Rabiati U, dkk. “*Peperomia pellucida in diets modulates hyperglyceamia, oxidative stress and diyslipidemia in diabetic rats*”. *Journal of acute disease* (2012) : h. 135.

- Immaniculata, maria, Sukrasno, Olivia P. *Telaah Fitokimia dan Aktivitas Pengambatan Xantin Oksidase*. Bandung. Sekolah Farmasi ITB. 2011.
- Katno, Pramono S. *Tingkat manfaat dan keamanan tanaman obat tradisional*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2002.
- Katzung, B. G. *Farmakologi Dasar dan Terapi*. Edisi Keenam. Jakarta: EGC. 1997.
- Kelley, WN. And Thomas, DP. *Gout and other Disorder of purin metabolism*. In *Harrison's, TR. Principle of internal medicine*. New york: John Wiley & Sons, Inc., Publication. 1991.
- Khan, A., M. Rahman. *Neuro pharmacological effects of peperomia pellucida leaves in mice*. DARU.2008.
- Krisnatuti, D., *Perencanaan menu untuk penderita gangguan asam urat*. Jakarta: Niaga swadaya. 1997.
- Kristiani, R, D., *Aktivitas antihiperurisemia ekstrak etanol akar pakis tangkur pada mencit jantan*. Sumedang: bionatural jurnal.2013.
- Kusumawati, Diah. *Bersahabat dengan Hewan Coba*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Mahardian, Anjar., *Aktivitas antihiperurisemia ekstrak etanol herba pegagan pada mencit jantan dengan induksi kafein*. Purwokerto : pharmacy jurnal.2014.
- Moriwaki, K. *Genetic in Wild Mice*. Its Application to Biomedical. 1994.
- Mutschler . E. *Dinamika Obat Edisi 5*. Bandung : ITB. 1991.
- Nafiu, L. O. *Kerenturan Fenotipik Mencit Terhadap Ransum Berprotein Rendah*. Bogor: IPB. 1996.
- Ngueguim, Florence Trofack, dkk. *"Ethanol extract of Peperomia pellucida (Piperaceae) promotes fracture healing by an anabolic effect on osteoblasts"*. Journal of ethnopharmacology 148 (2013) : h. 62.

- Nwokocha, C.R., *Possible mechanism of action of the hypotensive effect of peperomia pellucida and interactions between human cytochrome P450 enzymes*. Medicinal and aromatic.2012.
- Peter, W. L., *The Laboratory Mouse*. New York: Edinburg. 1976.
- Pinheiro B.G,dkk. “*chemical composition, antinociceptive and anti-inflammatory effects in rodents of the essential oil of Peperomia pellucida*”. *journal of ethnopharmacology* 138 (2011) : h. 479.
- Raharjo, K dan Tan. *Obat-Obat Penting Khasiat Dan Penggunaannya: obat-obat Rheumatik dan encok*. Jakarta: Departemen kesehatan RI. 1979.
- Rina Aryati. *Pengaruh pemberian infusa daun salam terhadap penurunan kadar asam urat darah mencit putih jantan yang diinduksi dengan potasium oksonat*. Surakarta: Pharmacon.2007.
- Salma Nafila. *Antihiperlikemik ekstrak tumbuhan kaca-kaca terhadap tikus wistar yang diinduksi sukrosa*. Mando: jurnal ilmiah sains Vol.13 No.2. 2013.
- Shihab, Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 10*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2002.
- Sitorus Erwin. *Aktivitas antioksidan tumbuhan kaca-kaca (Peperomia pellucida (L) Khunt)*. Unuversitas syam ratulangi manado (2012) : h.1.
- Sutrisna, EM., *Efek Infusa Daging Buah Mahkota Dewa Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Darah Mencit Putih Jantan Yang Diinduksi Dengan Potassium Oxonate*. Jakarta: Pharmacon.2010.
- Tehupeiory, E., Arthritis gout. Dalam Syaiyakitdafullah, N.,. *Buku ajar ilmu penyakit dalam* .jilid I Edisi III. Jakarta: Balaipenerbit FK UI. 1996.
- Thalbah, Hisham, dkk. *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis, Kemukjizatan Tumbuhan dan Buah-Buahan*. Jakarta: PT. Sapta Sentosa. 2009.


Togohu, Seriyana. *Aktivitas antihiperglikemid dari ekstrak etanol dan heksan tumbuhan kaca-kaca pada tikus wistar yang hiperglikemid*. Manado: jurnal mipa. 2013..


Ukheyanna Elsha. *Aktivitas antioksidan, kadar fenolik, dan flavanoid total tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L) khunt)*. Institut pertanian bogor (2012) : h.1.

Wade A, Waller PJ. *Handbook of pharmaceutical excipient second sediton*. London The Pharmaceutical Press. 1994.

Wijaya dan Monica. *Uji efek antiinflamasi ekstrak herba kaca-kaca pada tikus putih jantan*. Surabaya: penel hayati. 2010.

Yettrie B. C., *Efek Hipourikemia Ekstrak Daun Sidaguri Pada Mencit Jantan*. Medan: Journal of farmaceutics and pharmacology. 2012

Lampiran 1. Ekstraksi Herba Kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt)

Lampiran 2. Skema uji penurunan kadar asam urat darah

Lampiran 3

Tabel 4. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi Na.CMC

Mencit	Kadar Asam Urat Darah (mg/dl)					
	Sebelum Puasa	Setelah Puasa	Setelah Induksi	Setelah Jam ke		
				1	2	3
I	1,3	1,1	3,5	3,5	3,5	3,4
II	1,4	1,2	3,6	3,6	3,5	3,4
III	1,3	1,2	3,4	3,4	3,4	3,3
Jumlah	4,0	3,5	10,5	10,5	10,4	10,1
Rata-rata	1,33	1,16	3,5	3,5	3,46	3,36

Tabel 5. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi ekstrak etanol herba kaca-kaca 20 mg/kg BB

Mencit	Kadar Asam Urat Darah (mg/dl)					
	Sebelum Puasa	Setelah Puasa	Setelah Induksi	Setelah Jam ke		
				1	2	3
I	1,4	1,3	3,6	3,0	2,4	2,0
II	1,3	1,2	3,5	3,0	2,5	2,1
III	1,4	1,2	3,6	2,9	2,4	1,9
Jumlah	4,1	3,7	10,7	8,9	7,3	6,0
Rata-rata	1,36	1,23	3,56	2,96	2,43	2,0

Tabel 6. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi ekstrak etanol herba kaca-kaca 40 mg/kg BB

Mencit	Kadar Asam Urat Darah (mg/dl)					
	Sebelum Puasa	Setelah Puasa	Setelah Induksi	Setelah Jam ke		
				1	2	3
I	1,3	1,2	3,5	2,9	2,3	1,8
II	1,2	1,1	3,6	3,0	2,5	1,9
III	1,4	1,3	3,5	2,8	2,1	1,6
Jumlah	3,9	3,6	10,6	8,7	6,9	5,3
Rata-rata	1,3	1,2	3,53	2,9	2,3	1,76

Tabel 7. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi ekstrak etanol herba kaca-kaca 80 mg/kg BB

Mencit	Kadar Asam Urat Darah (mg/dl)					
	Sebelum Puasa	Setelah Puasa	Setelah Induksi	Setelah Jam ke		
				1	2	3
I	1,4	1,3	3,6	2,8	2,1	1,3
II	1,4	1,2	3,6	2,8	2,0	1,2
III	1,3	1,2	3,5	2,9	2,1	1,3
Jumlah	4,1	3,7	10,7	8,5	6,2	3,8
Rata-rata	1,36	1,23	3,56	2,83	2,06	1,26

Tabel 8. Data kadar asam urat darah mencit yang diberi allopurinol 0,39 mg/30 g BB mencit

Mencit	Kadar Asam Urat Darah (mg/dl)					
	Sebelum Puasa	Setelah Puasa	Setelah Induksi	Setelah Jam ke		
				1	2	3
I	1,4	1,2	3,6	2,7	1,9	1,0
II	1,3	1,2	3,5	2,8	2,0	1,2
III	1,3	1,1	3,5	2,8	1,9	1,0
Jumlah	4,0	3,5	10,6	8,3	5,8	3,2
Rata-rata	1,33	1,16	3,53	2,76	1,93	1,06

Lampiran 4. Perhitungan Statistik dengan Rancangan Acak Lengkap

Tabel 9. Perhitungan RAL antara Na.CMC 1%, ekstrak etanol herba kaca-kaca 20 mg/kg BB, 40 mg/kg BB, 80 mg/kg BB, dan allopurinol 0,39 mg/30 g BB terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah pada mencit jantan

Perlakuan	Replikasi	Kadar Asam Urat Darah Mencit (mg/dl)						Jumlah	Rata-rata
		0	K0	K1	K2	K3	K4		
A1	I	1,3	1,1	3,5	3,5	3,5	3,4	16,3	2,71
	II	1,4	1,2	3,6	3,6	3,5	3,4	16,7	2,78
	II	1,3	1,2	3,4	3,4	3,4	3,3	16,0	2,66
	Jumlah	4,0	3,5	10,5	10,5	10,4	10,1	49,0	
	Rata-rata	1,33	1,16	3,5	3,5	3,46	3,36		8,15
A2	I	1,4	1,3	3,6	3,0	2,4	2,0	13,7	2,28
	II	1,3	1,2	3,5	3,0	2,5	2,1	13,6	2,26
	III	1,4	1,2	3,6	2,9	2,4	1,9	13,4	2,23
	Jumlah	4,1	3,7	10,7	8,9	7,3	6,0	40,7	
	Rata-rata	1,36	1,23	3,56	2,96	2,43	2,0		6,77
A3	I	1,3	1,2	3,5	2,9	2,3	1,8	13,0	2,16
	II	1,2	1,1	3,6	3,0	2,5	1,9	13,3	2,21
	III	1,4	1,3	3,5	2,8	2,1	1,6	12,7	2,11
	Jumlah	3,9	3,6	10,6	8,7	6,9	5,3	39,0	
	Rata-rata	1,3	1,2	3,53	2,9	2,3	1,76		6,48
A4	I	1,4	1,3	3,6	2,8	2,1	1,3	12,5	2,08
	II	1,4	1,2	3,6	2,8	2,0	1,2	12,2	2,03
	III	1,3	1,2	3,5	2,9	2,1	1,3	12,3	2,05
	Jumlah	4,1	3,7	10,7	8,5	6,2	3,8	37,0	

	Rata-rata	1,36	1,23	3,56	2,83	2,06	1,26		6,16
A5	I	1,4	1,2	3,6	2,7	1,9	1,0	11,8	1,96
	II	1,3	1,2	3,5	2,8	2,0	1,2	12,0	2,0
	III	1,3	1,1	3,5	2,8	1,9	1,0	11,6	1,93
	Jumlah	4,0	3,5	10,6	8,3	5,8	3,2	35,4	
	Rata-rata	1,33	1,16	3,53	2,76	1,93	1,06		5,89
Total		20,1	18,0	53,1	44,9	36,6	28,4	201,1	
Rata-rata									6,69

Keterangan :

0 : kadar sebelum puasa

K0 : kadar setelah puasa

K1 : kadar setelah induksi

K2 : 1 jam setelah perlakuan

K3 : 2 jam setelah perlakuan

K4 : 3 jam setelah perlakuan

A1 : Na CMC 1%

A2 : ekstrak etanol herba kaca-kaca 20 mg/kg BB

A3 : ekstrak etanol herba kaca-kaca 40 mg/kg BB

A4 : ekstrak etanol herba kaca-kaca 80 mg/kg BB

A5 : allopurinol 0,39 mg/30 g BB

Lampiran 5.

1. Perhitungan Anava

$$\text{Faktor Koreksi (FK)} = \frac{T_{ij}^2}{A \times B \times R} = \frac{(201,1)^2}{90} = 449,34$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total} &= T(Y_{ij}^2) - \text{FK} \\ &= (1,3^2 + 1,1^2 + 3,5^2 + \dots + 1,0^2) - 449,34 \\ &= 529,69 - 449,34 \\ &= 80,35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Perlakuan} &= \frac{\sum(\sum y_j^2)}{R} - \text{FK} \\ &= \frac{(4,0^2 + 3,5^2 + 10,5^2 + \dots + 3,2^2)}{3} - \text{FK} \\ &= 529,27 - 449,34 \\ &= 79,93 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK A (Perlakuan)} &= \frac{\sum(\sum y_j^2)}{R_B} - \text{FK} \\ &= \frac{(49,0^2 + 40,7^2 + \dots + 35,4^2)}{18} - \text{FK} \\ &= 455,59 - 449,34 \\ &= 6,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK B (Perlakuan)} &= \frac{\sum(\sum y_j^2)}{R_A} - \text{FK} \\ &= \frac{(20,1^2 + 18,0^2 + \dots + 28,4^2)}{15} - 449,34 \\ &= 513,98 - 449,34 \\ &= 64,64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Kuadrat Galat} &= \text{JK Total} - \text{JK A} - \text{JK B} \\
 &= 80,35 - 6,25 - 64,64 \\
 &= 9,46
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat Bebas Total (dbt)} &= (a \times b \times r) - 1 \\
 &= (5 \times 6 \times 3) - 1 = 89
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat Bebas Perlakuan (dbp)} &= a - 1 \\
 &= 5 - 1 = 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat Bebas Galat (dbg)} &= \text{dbt} - \text{dbp} \\
 &= 89 - 4 = 85
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kuadrat Tengah Perlakuan} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{dbp}} \\
 &= \frac{79,93}{4} = 19,98
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kuadrat Tengah Galat (KTG)} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{dbg}} \\
 &= \frac{9,46}{85} = 0,11
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Koefisien Keseragaman (KK)} &= \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{\text{rata-rata total}} \times 100\% \\
 &= \frac{\sqrt{0,11}}{6,69} \times 100\% \\
 &= 4,95\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{F Hitung Perlakuan} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\
 &= \frac{19,98}{0,11} = 181,63
 \end{aligned}$$

Tabel 10. Tabel Anava

Sumber keseragaman	Derajat bebas	Jumlah kuadrat	Kuadrat tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	79,93	19,98	181,63**	2,45	3,55
Galat	85	9,46	0,11			
Total	89	80,35				

Keterangan:

** = Sangat Signifikan ($F_{hitung} > F_{1\%}$)

$F_{hitung} > F_{Tabel}$ pada taraf kepercayaan 5% dan 1%, artinya ada perbedaan sangat nyata dengan yang lainnya (sangat signifikan).

Lampiran 6.

Analisis Beda Nyata Terkecil (BNT)

Dik : $t_{0,05}(\alpha,85) = 1,66$ $t_{0,01}(\alpha,85) = 2,37$

a. Nilai BNT

$$\begin{aligned} \text{BNT (0.05)} &= t(\alpha,85) \cdot \sqrt{\frac{2 \times \text{KTG}}{r}} \\ &= 1,66 \cdot \sqrt{\frac{0,22}{3}} \\ &= 0,44 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BNT (0.01)} &= t(\alpha,85) \cdot \sqrt{\frac{2 \times \text{KTG}}{r}} \\ &= 2,37 \cdot \sqrt{\frac{0,22}{3}} \\ &= 0,64 \end{aligned}$$

Tabel 11. Tabel Analisis Beda Nyata Terkecil (BNT) efektivitas penurunan kadar asam urat darah terhadap mencit (*Mus musculus*) jantan.

Perlakuan	Rata-rata	Perlakuan				
		Allopurinol	Ekstrak 80 mg/kg BB	Ekstrak 40 mg/kg BB	Ekstrak 20 mg/kg BB	Na CMC
		5,89	6,16	6,48	6,77	8,15
Allopurinol	5,89	-				
Ekstrak 80 mg/kg BB	6,16	0,27 ^{ns}	-			
Ekstrak 40 mg/kg BB	6,48	0,59 [*]	0,32 ^{ns}	-		
Ekstrak 20 mg/kg BB	6,77	0,88 ^{**}	0,61 [*]	0,29 ^{ns}	-	
Na.CMC	8,15	2,26 ^{**}	1,99 ^{**}	1,67 ^{**}	1,38 ^{**}	-

Keterangan

** = sangat signifikan, $F_h > F_t$ (0,05 dan 0,01)

* = signifikan, $F_h > F_t$ (0,05 dan 0,01)

ns = Non signifikan, $F_h < F_t$

BNT (0,05) = 0,44

BNT (0,01) = 0,64

Lampiran 7. Perhitungan Dosis

1. Kontrol Positif (Allopurinol)

a. Konversi dosis mencit dan manusia

- Dosis lazim untuk manusia : 100 mg
- Faktor konversi untuk mencit : 0,0026 dengan bobot 20 g
- Dosis untuk mencit 20 g : 100 mg x 0,0026
= 0,26 mg/20g BB mencit

b. Penyediaan sediaan Allopurinol

- Volume pemberian untuk Mencit : 1 ml untuk 30 g BB mencit
- Dosis untuk mencit 30 g : $\frac{30 \text{ g}}{20 \text{ g}} \times 0,26 = 0,39 \text{ mg/ 30 g BB}$
Mencit
- Dibuat stok sebanyak 50 ml : 50 ml
- Jumlah Allopurinol yang dibuat : 0,39 mg x 50 ml : 39 mg

Jadi, stok allopurinol yang dibuat 39 mg dalam 50 ml

c. Perhitungan tablet allopurinol

- Berat rata-rata 10 tablet : 201,15 mg
- Berat yang ditimbang : $\frac{39 \text{ mg}}{100 \text{ mg}} \times 201,15 \text{ mg} = 78,44 \text{ mg}$

Jadi untuk mendapatkan Allopurinol 39 mg ditimbang bobot tablet sebanyak 78,44 yang disuspensikan hingga 50 ml menggunakan Na-CMC.

Pemberian dosis maksimal 1 ml:

$$\text{Mencit I} = \frac{25 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,83 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit II} = \frac{26 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,87 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit III} = \frac{24 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,8 \text{ ml}$$

2. Kontrol Negatif (Na CMC)

Pada kontrol negatif, diberikan Na-CMC 1%

$$1\% \text{ Na-CMC} = \frac{1 \text{ g Na-CMC}}{100 \text{ ml air}}$$

Pembuatan sediaan suspensi Na-CMC: ditimbang 1 g Na-CMC, kemudian dilarutkan dalam 100 ml air.

Pemberian dosis maksimal 1 ml:

$$\text{Mencit I} = \frac{27 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit II} = \frac{26 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,87 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit III} = \frac{26 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,87 \text{ ml}$$

3. Ekstrak herba kaca-kaca 20 mg/kg BB

Konversi dosis manusia dan mencit

- Dosis lazim untuk manusia : 20 mg
- Faktor konversi untuk mencit : 0,0026 dengan bobot 20 g
- Dosis untuk mencit 20 g : 20 mg x 0,0026
= 0,052mg/20g BB mencit
- Dosis untuk 30 g : $\frac{30 \text{ g}}{20 \text{ g}} \times 0,052 \text{ mg}$
= 0,078 mg

Pemberian dosis maksimal 1 ml:

$$\text{Mencit I} = \frac{27 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit II} = \frac{28 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,93 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit III} = \frac{28 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,93 \text{ ml}$$

4. Ekstrak herba kaca-kaca 40 mg/kg BB

Konversi dosis manusia dan mencit

- Dosis lazim untuk manusia : 40 mg
- Faktor konversi untuk mencit : 0,0026 dengan bobot 20 g
- Dosis untuk mencit 20 g : 40 mg x 0,0026
= 0,104 mg/20g BB mencit
- Dosis untuk 30 g : $\frac{30 \text{ g}}{20 \text{ g}} \times 0,104 \text{ mg}$
= 0,156 mg

Pemberian dosis maksimal 1 ml:

$$\text{Mencit I} = \frac{25 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,83 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit II} = \frac{24 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,8 \text{ ml}$$

$$\text{Mencit III} = \frac{27 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

5. Ekstrak herba kaca-kaca 80 mg/kg BB

Konversi dosis manusia dan mencit

- Dosis lazim untuk manusia : 80 mg
- Faktor konversi untuk mencit : 0,0026 dengan bobot 20 g
- Dosis untuk mencit 20 g : 80 mg x 0,0026
= 0,208 mg/20g BB mencit

- Dosis untuk 30 g : $\frac{30\text{ g}}{20\text{ g}} \times 0,208\text{ mg}$
= 0,312 mg

Pemberian dosis maksimal 1 ml:

$$\text{Mencit I} = \frac{28\text{ g}}{30\text{ g}} \times 1\text{ ml} = 0,93\text{ ml}$$

$$\text{Mencit II} = \frac{27\text{ g}}{30\text{ g}} \times 1\text{ ml} = 0,9\text{ ml}$$

$$\text{Mencit III} = \frac{27\text{ g}}{30\text{ g}} \times 1\text{ ml} = 0,9\text{ ml}$$

6. Penginduksi (Kafein)

Konversi dosis manusia dan mencit

- Dosis kafein yang digunakan : 37,8 mg/kg BB
- Faktor konversi untuk mencit : 0,0026 dengan bobot 20 g
- Dosis untuk mencit 20 g : 37,8 mg x 0,0026
= 0,098 mg/20g BB mencit
- Dosis untuk 30 g : $\frac{30\text{ g}}{20\text{ g}} \times 0,098\text{ mg}$
= 0,147 mg



Keterangan:

D_M = Dosis menit

D_o = Dosis Obat

F_k = Faktor Konversi

Lampiran 8. Gambar Tanaman Kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt)



Gambar 8. Kaca-kaca (*Peperomia pellucida* (L) Khunt)

Lampiran 9. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian



Gambar 9. Alat dan Strip



Gambar 10. Spoit dan Kanula



Gambar 11. Timbangan Analitik



Gambar 12. Gelas ukur & batang pengaduk



Gambar 13. Timbangan hewan



Gambar 14. Magnetik Stirer

Lampiran 10. Hewan Uji

Gambar 15. Mencit Jantan



Gambar 16. Pengelompokkan



Gambar 17. Pemberian sediaan oral



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R