


**DAYA HAMBAT BAKTERI ASAM LAKTAT ASAL DANGKE
TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI PATOGEN GRAM POSITIF
SEBAGAI KANDIDAT PROBIOTIK**



OLEH

SYLVIA INDRIANI


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

NIM: 60300110056

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

**DAYA HAMBAT BAKTERI ASAM LAKTAT ASAL DANGKE
TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI GRAM POSITIF
SEBAGAI KANDIDAT PROBIOTIK**



OLEH

SYLVIA INDRIANI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

NIM: 60300110056

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Sylvia Indriani**, NIM: 60300110056, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Daya Hambat Bakteri Asam Laktat Asal Dangke Terhadap Pertumbuhan Bakteri Gram Positif Sebagai Kandidat Probiotik”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Juni 2014

Fatmawati Nur, S.Si., M.Si

NIP. 19720203 200604 2 001

Pembimbing I

Hafsan, S.Si., M.Pd

NIP. 19820912 200912 2 008

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,

Penyusun,

Sylvia Indriani

NIM: 60300110056



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Daya Hambat Bakteri Asam Laktat Asal Dangka Terhadap Pertumbuhan Bakteri Gram Positif Sebagai Kandidat Probiotik" yang disusun oleh Sylvia Indriani, NIM: 60300110056, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari bertepatan dengan tanggal H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sains dalam ilmu Biologi Jurusan Biologi, tanpa (dengan beberapa perbaikan).

Makassar,

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd	(.....)
Munaqisy II	: Cut Muthiadin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dra. Zohra, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Hafsan, S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd
Nip: 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Shalawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Sembah sujud kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suroto dan Ibunda Tarmayani yang telah melahirkan, merawat, mendidik, membesarkan dan memberikan dukungan moril kepada penyusun dengan penuh pengorbanan dan penuh kesabaran serta berdoa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penyusun.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan petunjuk serta saran yang sangat berguna dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, HT., MS., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya.
2. Dr. Muhammad Kalifah Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya, sekaligus sebagai dosen penguji I.
3. Ibu Fatmawati Nur, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus sebagai dosen pembimbing 1, terima kasih telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing serta memberikan motivasi penyusun dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Cut Muthiadin, S.Si., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus sebagai dosen penguji II.
5. Ibu Hafsan S.Si., M.Pd., selaku pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing serta memberikan motivasi penyusun dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra Sohra, M.Ag., selaku penguji III yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini.

7. Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak/ Ibu Dosen pengajar, beserta staf Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selama ini telah memberikan limpahan ilmu kepada penyusun selama menjadi mahasiswa.
9. Ibu Eka Sukmawati (Echa), S.Si., M.Si., selaku dosen, kakak dan sahabat yang selama ini telah setia menemani, membimbing dan membantu selama proses penelitian hingga proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Para Keluarga terutama adikku Muh. Dwi Setyo Pangestu dan Kakakku Nirhamullah yang senantiasa mengiringi langkah penyusun dengan doa dan motivasinya.
11. Saudara-saudara seperjuanganku **TEAM DANGKE** (Wiwi, Hikmah, Aqsa dan dila) yang sudah menjadi teman, sahabat, saudara, sekaligus partner kerja dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara-saudara seperjuanganku **OSMOSIS** yang sudah menjadi teman, sahabat dan saudara. Serta Keluarga besar Biologi yang banyak memberikan inspirasi, doa dan motivasi.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan segala keterbatasan, penyusun hanya bisa berdo'a kepada Allah SWT agar rahmat dan hidayah-Nya senantiasa terlimpah atas mereka. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun serahkan segalanya, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penyusun baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amien.

Penyusun,

Sylvia Indriani

NIM: 60300110056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ILUSTRASI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6-36
A. Tinjauan Umum Dangka	6
B. Tinjauan Umum Probiotik	8
C. Tinjauan Umum Bakteri Asam Laktat	12
D. Tinjauan Umum Bakteri Patogen	22
E. Pandangan Islam tentang Bakteri Penghasil Probiotik	32
F. Hipotesis	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37-42
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	37
B. Variabel Penelitian	38
C. Defenisi Operasional Variabel	38
D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	39
E. Prosedur Penelitian	39
F. Prosedur Kerja	40
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43-52

	A. Hasil Penelitian.....	43
	B. Pembahasan	46
BAB V	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN-LAMPIRAN		61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1. Zona hambat bakteri *L. acidophilus* dan *L. fermentum* terhadap pertumbuhan bakteri *S. aureus* dan *B. cereus* pada variasi waktu inkubasi..... 43
- Tabel 4.2. Hasil sidik ragam zona hambat bakteri *L. acidophilus* dan *L. fermentum* terhadap pertumbuhan bakteri *S. aureus* dan *B. cereus* pada variasi waktu inkubasi..... 45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Metabolisme homofermentatif	16
Gambar 2.2. Metabolisme heterofermentatif	17
Gambar 2.3. Bentuk <i>Lactobacillus acidophilus</i>	19
Gambar 2.4. Bentuk <i>Lactobacillus fermentum</i>	21
Gambar 2.5. Bentuk <i>Staphylococcus aureus</i>	24
Gambar 2.6. Bentuk <i>Bacillus cereus</i>	29
Gambar 4.1. Grafik Perbandingan rata-rata diameter zona hambat bakteri <i>L. acidophilus</i> terhadap pertumbuhan bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Bacillus cereus</i> pada variasi waktu inkubasi	44
Gambar 4.2. Grafik Perbandingan rata-rata diameter zona hambat bakteri <i>L. fermentum</i> terhadap pertumbuhan bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Bacillus cereus</i> pada variasi waktu inkubasi	44

ABSTRAK

Nama Penyusun : Sylvia Indriani
NIM : 60300110056
Judul Skripsi : “Daya Hambat Bakteri Asam Laktat Asal Dangke Terhadap Pertumbuhan Bakteri Gram Positif Sebagai Kandidat Probiotik”

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri yang telah digunakan sebagai probiotik. Salah satu syarat menjadi probiotik adalah mampu menghambat bakteri patogen. Penelitian ini menggunakan BAL *Lactobacillus acidophilus* dan *Lactobacillus fermentum* yang merupakan hasil isolasi dari dangke. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kemampuan *L. acidophilus* dan *L. fermentum* dalam menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif sebagai agen probiotik. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis bakteri patogen uji menunjukkan perbedaan daya hambat BAL yang tidak nyata baik terhadap *S. aureus* maupun terhadap *B. cereus*. Jenis BAL dan masa inkubasi menunjukkan perbedaan daya hambat yang nyata (signifikan), dimana jenis BAL *L. acidophilus* menunjukkan daya hambat yang lebih tinggi dibandingkan *L. fermentum* dan kontrol negatif. Sedangkan masa inkubasi yang menunjukkan daya hambat tertinggi adalah perlakuan masa inkubasi 3 x 24 jam, kemudian disusul oleh perlakuan masa inkubasi 2 x 24 jam, dan masa inkubasi 1 x 24 jam). Uji lanjut Duncan yang memperlihatkan perlakuan mana yang memberikan pengaruh yang paling besar dari kedua BAL yang digunakan *L. acidophilus* dengan masa inkubasi 72 jam. Hal tersebut membuktikan bahwa *L. acidophilus* dan *L. fermentum* mempunyai potensi untuk digunakan sebagai kandidat probiotik.

Kata kunci: Bakteri asam laktat, uji daya hambat, bakteri patogen.

ABSTRAC

Compiler Name : Sylvia Indriani
NIM : 60300110056
Title Skripsi : “Inhibition of Lactic Acid Bacteria Origin Dangke on
Growth of Gram Positive Bacteria as a Candidate Probiotic”

Lactic acid bacteria (LAB) is a bacterium that has been used as probiotic. One of the requirements became a probiotic is able to inhibit pathogenic bacteria. This study uses LAB *Lactobacillus fermentum* and *Lactobacillus acidophilus* which is isolated from dangke. The purpose of this study is to determine the ability of *L. acidophilus* and *L. fermentum* in inhibiting the growth of Gram positive bacteria as probiotic agents. The results of variance showed that the type of pathogenic bacteria inhibition test showed differences in LAB were not real good against *S. aureus* and *B. cereus* against. LAB type and the incubation period showed significant differences in inhibition (significant), where the species *L. acidophilus* LAB showed a higher inhibition compared to *L. fermentum* and negative controls. While the incubation period showed the highest inhibitory treatment incubation period is 3 x 24 hours, followed by a treatment period of 2 x 24-hour incubation, and the incubation period of 1 x 24 hours). Duncan further test showing which treatments provide the greatest influence of both LAB used *L. acidophilus* with an incubation period of 72 hours. It is proved that *L. acidophilus* and *L. fermentum* has the potential to be used as probiotic candidates.

Keywords: Lactic acid bacteria, the inhibition test, pathogenic bacteria.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dangke adalah produk olahan susu kerbau secara tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Enrekang. Dangke diolah dari susu sapi atau susu kerbau yang dipanaskan dengan api kecil sampai mendidih, kemudian ditambah koagulan berupa getah pepaya (papain) sehingga terjadi penggumpalan (Marzoeki. 1978). Dangke sebagai produk olahan berbahan dasar susu yang memiliki kandungan mirip dengan susu, memiliki potensi sebagai substrat pertumbuhan yang baik bagi bakteri asam laktat (BAL). Sebagaimana beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh sebagian ilmuwan yang telah berhasil mengisolasi bakteri asam laktat yang berbahan dasar susu seperti contoh susu skim kering, Mentega, Keju, *Buttermilk*, *Yoghurt* (Blakely dan Bade, 1991, 37).

Bakteri yang paling banyak digunakan sebagai probiotik adalah bakteri dari golongan *Lactobacillus* karena golongan bakteri ini memiliki hampir semua karakteristik yang diperlukan suatu bakteri untuk digunakan sebagai probiotik. *Lactobacillus* dapat menurunkan pH lingkungan usus dengan mengubah glukosa menjadi asam laktat. Kondisi seperti ini dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri patogen (Gotcheva, 2002).

Bakteri asam laktat (BAL) telah digunakan secara luas dan diteliti sebagai probiotik untuk manusia, hewan ternak daratan dan akuatik. Hal ini

berdasarkan pada kenyataan bahwa BAL adalah penghuni alami saluran pencernaan manusia dengan kemampuan toleransi terhadap lingkungan asam dan empedu (*bile*) dari saluran pencernaan. Bakteri asam laktat juga berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi asam asetat, sehingga menurunkan pH saluran pencernaan dan secara alami mencegah kolonisasi banyak bakteri (Watson *et al.*, 2008, 4).

Beragamnya bakteri asam laktat yang telah berhasil diisolasi dari susu, maupun produk olahan lainnya memungkinkan bertambahnya bakteri yang berpotensi sebagai probiotik mengingat bakteri probiotik umumnya merupakan kelompok BAL (Fatmawati, 2013). Probiotik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain/inangnya. Beberapa contoh probiotik dapat dijumpai pada makanan suplemen yang mengandung bakteri berguna, karena mengandung asam laktat bakteri (*lactic acid bacteria/LAB*) sebagai mikroba yang membantu menjaga keseimbangan flora usus (Denny Indra, 2011, 25).

Seleksi probiotik sangat penting karena mikroorganisme yang tidak tepat dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada inang (Sun *et al.*, 2010). Untuk menyeleksi probiotik secara umum adalah melakukan uji antagonis secara *in vitro*. Hal ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu BAL sebagai kandidat probiotik. Hal ini dikemukakan oleh Gildberg *et al.* (1997), bahwa salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh BAL yang berpotensi sebagai probiotik adalah kemampuannya untuk menghambat bakteri patogen dan mampu berkompetisi dengan bakteri patogen untuk mempertahankan keseimbangan

mikroflora usus. Selain itu, probiotik harus mampu hidup pada saluran pencernaan inang dan mampu berkolonisasi pada sel epitel intestin untuk mengurangi dan mencegah kolonisasi patogen (Vine *et al.*, 2004, 803; Balcazar *et al.*, 2006, 175).

Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 13 yang berbunyi :

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran (Kementerian Agama RI, 2002).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dibumi ini untuk kesejahteraan manusia. Dalam hal ini mikroorganisme yang ada juga diciptakan Allah untuk kepentingan hidup manusia. Allah juga mengendalikan segala macam benda yang diciptakannya, baik benda-benda itu terdapat dipermukaan bumi seperti binatang ternak ataupun mikroorganisme. kesemuannya itu diciptakan oleh Allah beraneka ragam bentuknya dan manfaatnya bermacam-macam pula. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan tidak semata-mata hanya untuk melengkapi isi langit dan bumi. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu untuk memberikan manfaat bagi semua makhluk-Nya. Diakhir ayat Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya pada nikmat-nikmat yang telah diciptakan oleh Allah SWT yang beraneka ragam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. yaitu

mereka yang memahami betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka dan mensyukuri nikmat-nikmat itu sebagaimana mestinya, serta memanfaatkan sesuai dengan keperluan mereka menurut keridhaan Allah (Muhammad Ihsan, 2014).

Isolasi bakteri asam laktat dari dangke telah dilakukan berdasarkan bahan baku pembuatannya. Pada dangke susu sapi berhasil dioisolasi *Lactobacillus fermentum* dan *Lactobacillus acidophilus* (Wahdiniar, 2013), sedangkan pada dangke susu kerbau diisolasi *Lactobacillus fermentum* dan *Lactobacillus plantarum* (Paramitasari, 2013).

Kemampuan BAL menghambat bakteri patogen telah dilakukan dengan menguji daya hambatnya terhadap beberapa bakteri uji diantaranya *Staphylococcus aureus* dan *Bacillus cereus* (Sarkono et al, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut penting dilakukan penelitian tentang daya hambat Bakteri Asam Laktat (BAL) asal dangke terhadap pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Bacillus cereus* untuk memenuhi salah satu syarat BAL menjadi kandidat probiotik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan daya hambat Bakteri Asam Laktat (BAL) asal dangke terhadap pertumbuhan bakteri Gram positif.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat Bakteri Asam Laktat (BAL) asal dangke terhadap pertumbuhan bakteri Gram positif.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat, dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis-jenis bakteri asam laktat dari dangke yang berpotensi sebagai kandidat probiotik.
2. Untuk pengembangan bidang industri probiotik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk produksi probiotik secara komersial serta aplikasinya diberbagai bidang.
3. Bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dangke

Dangke adalah salah satu produk olahan susu khas Indonesia yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat di kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Produk ini dihasilkan melalui pemanasan susu segar yang ditambahkan larutan getah pepaya sehingga susu membentuk gumpalan (*curd*) dan cairan (*whey*). *Curd* dan *whey* kemudian dipisahkan dengan tempurung kelapa sebagai alat penyaring sekaligus pencetak dangke, setelah memadat dangke lalu dibungkus dengan daun pisang dan siap dikonsumsi. Jika dilihat sekilas dangke menyerupai tahu karena warnanya yang putih, akan tetapi tekstur dangke lebih kenyal dan rasanya lebih gurih. Masyarakat di Kabupaten Enrekang umumnya mengonsumsi dangke sebagai lauk pendamping nasi sehari-hari dan juga sebagai pangan selingan yang disantap dengan campuran gula aren atau sambal jeruk nipis (Wahniyathi, 2013).

Dangke adalah sejenis makanan bergizi yang dibuat dari susu kerbau. Kadang-kadang dangke juga dibuat dari susu sapi. Dangke dibuat di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Marzoeki, 1978). Dangke telah dikenal sejak sebelum tahun 1905. Adapun nama dangke berasal dari bahasa Belanda, sewaktu orang Belanda melihat jenis makanan yang terbuat dari susu tersebut, mereka mengatakan “DANK WELL” yang artinya terima kasih. Rakyat yang mendengar kata dangke mengira itulah nama makanan tersebut (Insyana, 2012).

Dangke adalah produk semacam keju tanpa pemeraman, dan tidak dikoagulasi dengan rennet melainkan dengan papain (getah buah pepaya). Dangke yang diproduksi di Enrekang, Sulawesi Selatan umumnya dikonsumsi sebagai lauk pauk. Dangke asli berwarna putih dan bersifat elastis sedangkan dangke campuran (palsu) warnanya agak kuning kusam dan tidak elastis. Dangke merupakan bahan pangan dengan nilai gizi yang tinggi (Marzoeki, 1978).

Dangke diolah dari susu sapi atau susu kerbau yang dipanaskan dengan api kecil sampai hampir mendidih, kemudian ditambahkan koagulan berupa getah buah pepaya (papain) sehingga terjadi penggumpalan, dan terkadang juga ditambahkan garam. Setelah terjadi pemisahan antara gumpalan dan cairan berwarna kuning, gumpalan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang terbuat dari tempurung kelapa (bagian ujungnya dilubangi untuk jalan ke luar cairan) sambil ditekan-tekan supaya cairannya terpisah (Marzoeki, 1978).

Aroma dangke memiliki kekhasan yang mengingatkan kita pada aroma keju parmesan. Dari segi tekstur, makanan tradisional dangke memiliki tekstur seperti tahu dan dari segi cita rasa, makanan ini memiliki rasa yang mirip dengan keju (cheese). Makanan dangke juga dikenal memiliki kandungan protein betakaroten yang cukup tinggi karena gumpalan yang menjadi dangke itu sendiri merupakan protein asli dari susu kerbau (Munsir, 2012).

Dangke memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, karena dangke mengandung protein dari susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mammae pada binatang mamalia betina, untuk bahan makanan dan sumber bagi anaknya. Susu merupakan minuman yang mengandung semua zat

makanan, terutama zat protein bergizi tinggi dan mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang seimbang. (Winarno, 1993).

Bahan makanan yang berasal dari ternak mempunyai peran yang cukup besar bagi perbaikan gizi masyarakat karena mutunya yang tinggi yaitu yang mengandung protein dengan susunan asam amino yang lengkap, vitamin dan mineral dengan daya cerna yang tinggi (Lampert, 1975).

B. Tinjauan Umum Probiotik

Menurut Fuller (1989) probiotik adalah suplemen pakan yang berisi mikrobial hidup (directfed microbials). Menurut Denny (2011, 29) probiotik merupakan suatu produk yang berisi turunan utama dari mikroorganisme dengan angka yang cukup. Sumbernya berasal dari kultur bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Bakteri ini juga dapat mencegah bakteri berbahaya penyebab penyakit. Hal ini membuat organisme baik tersebut mempunyai kemampuan untuk mengubah angka dari pertumbuhan (formasi dari koloni) di dalam induknya, yang menyebabkan saluran utamanya menjadi higienis.

Dalam istilah biologi, probiotik bisa disebut sebagai makanan suplemen yang memberikan manfaat bagi induk semangnya (tubuh manusia) untuk meningkatkan hubungan keseimbangan mikrobial di dalam usus. Bakteri probiotik ini dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh melalui beberapa mekanisme molekuler yang kompleks, sekompleks ekosistem bakteri pada saluran gastrointestinal (Denny, 2011, 27).

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, saat ini telah dikembangkan pangan fungsional yang menggunakan mikroorganisme dalam

proses pengolahan maupun pembuatannya. Makanan inilah yang kini populer sebagai makanan probiotik dan prebiotik. Makanan probiotik merupakan jenis pangan dengan kandungan bakteri hidup yang tahan melewati rintangan fisik dan kimia dalam saluran pencernaan (Denny Indra, 2011, 5).

Probiotik komersial saat ini memang telah banyak dipasarkan, namun demikian potensinya perlu diuji terlebih dahulu untuk dikembangkan di Indonesia (Harimurti et al., 2007, 83). Probiotik sering direkomendasikan oleh dokter dan juga ahli nutrisi, sebagai asupan setelah konsumsi antibiotik atau sebagai bagian dari pengobatan *candidiasis*. Banyak probiotik yang dapat langsung dimakan dalam sumber alaminya, seperti *Lactobacillus* pada yogurt. Beberapa pihak bahkan mengklaim bahwa probiotik mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Denny, 2011, 27).

Menurut *Food and Agriculture Organization/World Health Organization* (FAO/WHO) (2001), idealnya strain probiotik seharusnya tidak hanya mampu bertahan melewati saluran pencernaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan cairan empedu dalam jalur makanan yang memungkinkan untuk bertahan hidup melintasi saluran pencernaan dan terkena paparan empedu. Selain itu probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus manusia, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti mikroba (bakteriosin), dan memberikan pengaruh yang menguntungkan kesehatan manusia. Syarat lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses

pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap proses psikokimia pada makanan (Prado *et al.*, 2008).

Menurut Denny (2011, 32-33) sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan dari penggunaan bakteri probiotik dalam makanan antara lain :

1. Meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit menular.
2. Mengurangi kejadian intoleransi laktosa atau alergi pada susu dan produk turunannya.
3. Mencegah penyakit usus, diare, radang lambung, infeksi vaginal dan infeksi *urogenital*.
4. Menurunkan tekanan darah, mengendalikan hipertensi serta konsentrasi serum kolesterol.
5. Mengurangi alergi dan infeksi pernapasan.
6. Menambah ketahanan tubuh pada pasien yang menjalani kemoterapi kanker serta mengurangi kerusakan akibat kanker kolon.
7. Menghalangi bakteri yang secara langsung ataupun tidak langsung menghasilkan zat-zat karsinogen penyebab kanker.
8. Mengubah motilitas koloni dan waktu perpindahannya.

Menurut Shortt (1999), ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan produk probiotik dengan pengaruh positif optimal bagi inangnya, diantaranya adalah :

1. Spesies probiotik sebaiknya merupakan flora normal usus dengan demikian bakteri lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan usus.
2. Tidak bersifat patogen.
3. Toleran terhadap asam dan garam empedu.
4. Memiliki kemampuan menempel dan mengkolonisasi sel usus.
5. Memiliki kemampuan untuk bertahan selama proses pengolahan dan selama waktu penyimpanan.
6. Memiliki sifat antagonistik terhadap mikroba patogen enterik.
7. Terbukti memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kesehatan.
8. Produk probiotik diharapkan memiliki jumlah sel hidup yang besar (10^7 - 10^9 CFU/g).
9. Total konsumsi produk probiotik sekitar 300-400 gram per minggu. Dua alasan terakhir diperlukan untuk memperkirakan bahwa tersedia cukup bakteri probiotik dalam tubuh untuk memberi pengaruh positif.

Beberapa jenis bakteri probiotik yang sering digunakan dalam industri makanan seperti : *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus johnsonii*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus thermophilus*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium brevis*, *Bifidobacterium infantis*, *Bifidobacterium animalis* (Granato *et al.*, 2010), *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Sporolactobacillus inulinus* (Holzapfel dan Schillinger,

2002), *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *bulgaricus*, dan *Streptococcus thermophilus* (Senok, 2009).

C. Tinjauan Umum Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang mampu mengubah karbohidrat (glukosa) menjadi asam laktat (Amin et al., 2001). Sifat yang terpenting dari bakteri asam laktat adalah kemampuannya untuk merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dihasilkan asam laktat. Produk asam oleh bakteri asam laktat berjalan secara cepat, hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba lain yang tidak diinginkan dapat terhambat. Bakteri patogen seperti Salmonella dan *Staphylococcus aureus* yang terdapat pada suatu bahan pangan akan dihambat pertumbuhannya jika di dalam bahan pangan tersebut terdapat kelompok bakteri lainnya yang tergolong bakteri asam laktat yaitu golongan Lactobacillaceae (Fardiaz, 1992).

Bakteri asam laktat merupakan bakteri anaerob fakultatif yang mampu hidup pada berbagai habitat yang cukup luas di alam seperti pada tanaman, saluran pencernaan baik hewan maupun manusia, berbagai produk makanan fermentasi seperti yogurt, minuman fermentasi, keju, saos, kedelai dan sake. Bakteri asam laktat dapat mengendalikan pertumbuhan bakteri patogen dengan memproduksi asam organik, hidrogen peroksida, diasetil dan bakteriosin (Januarsyah, 2007).

BAL merupakan kelompok bakteri yang mampu menghasilkan asam laktat baik sebagai satu-satunya produk maupun sebagai produk utama disamping produk lain pada metabolisme karbohidrat (Frazier dan Westhoff, 1988). BAL

bersifat kemoautotrof dan tumbuh hanya pada media kompleks dengan sumber energi utama berupa karbohidrat. Bakteri asam laktat termasuk kelompok bakteri Gram positif, pada umumnya tidak membentuk spora (Kim *et al.*, 2000) kecuali *Sporolactobacillus*, berbentuk bulat atau batang, pada umumnya tidak menghasilkan katalase (Ko dan Ahn, 2000), tetapi ada yang bersifat katalase semu (Neth *et al.*, 1986).


BAL memproduksi asam laktat sebagai produk utama metabolisme yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki dalam makanan. Diasetil memiliki sifat antimikroba hanya dalam konsentrasi tinggi, sedangkan konsentrasi rendah tidak efektif dan bahkan dapat dihancurkan oleh beberapa mikroorganisme. Selain asam organik (terutama asam laktat), BAL juga memproduksi hidrogen peroksida, diasetil, aldehyd dan bakteriosin (Ko dan Ahn, 2000; Jung dan Faik, 2000; Delgado *et al.*, 2001).

Bakteri asam laktat juga disebut sebagai biopreservatif karena berkontribusi dalam menghambat pertumbuhan bakteri lain khususnya patogen dan mampu membawa dampak positif bagi kesehatan manusia (Smid dan Gorris, 2007). Efek preservatif yang ditimbulkan oleh bakteri asam laktat pada pangan fermentasi disebabkan oleh kondisi asam yang terbentuk selama pemrosesan dan selanjutnya selama penyimpanan. Efek asam tersebut diakibatkan adanya konversi karbohidrat menjadi asam organik (asam laktat dan asam asetat) dan menurunkan pH produk selama fermentasi. Hal tersebut merupakan karakteristik penting guna memperpanjang masa simpan dan keamanan produk (Vuyst dan Vandamme, 1994).


Bakteri asam laktat mempunyai karakteristik morfologi, fisiologi dan metabolit tertentu. Deskripsi secara umum dari bakteri ini adalah termasuk dalam bakteri Gram positif, tidak berspora, berbentuk bulat maupun batang, dan menghasilkan asam laktat sebagai mayoritas produk akhir selama memfermentasi karbohidrat (Axelsson, 2004). Bakteri asam laktat terbagi menjadi 8 genus antara lain *Lactobacillus*, *Streptococcus*, *Lactococcus*, *Pediococcus*, *Enterococcus*, *Leuconostoc*, *Bifidobacterium*, dan *Corinebacterium*. Berdasarkan tipe fermentasinya, bakteri asam laktat terbagi menjadi homofermentatif dan heterofermentatif. Kelompok homofermentatif menghasilkan asam laktat sebagai produk utama dari fermentasi gula sedangkan kelompok heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan senyawa lain yaitu CO₂, etanol, asetaldehid, diasetil serta senyawa lainnya (Fardiaz, 1992).

Bakteri asam laktat memproduksi berbagai komponen bermassa molekul rendah termasuk asam, alkohol, karbon dioksida, diasetil, hidrogen peroksida dan metabolit lainnya. Banyak metabolit mempunyai spektrum aktivitas yang luas melawan spesies lain dan produksi tersebut dipengaruhi secara luas oleh matriks makanan itu sendiri (Helander *et al.*, 1997). Satu atribut penting dari bakteri asam laktat adalah kemampuannya memproduksi komponen antimikroba, khususnya bakteriosin yang potensial menjadi biopreservatif menggantikan pengawet kimiawi pada bahan makanan guna memperpanjang umur simpan produk. Kemampuan bakteriosin dalam melakukan aktivitasnya sebagai biopresevatif dicapai oleh efek penghambatannya terhadap mikroorganisme patogen yang berbahaya (Savadogo *et al.*, 2006).

Berdasarkan metabolismenya, BAL dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Kelompok homofermentatif adalah kelompok BAL yang mampu mengubah glukosa menjadi asam laktat dan kelompok heterofermentatif adalah yang mampu memfermentasi glukosa menjadi asam laktat, etanol/asam asetat dan CO₂. BAL yang termasuk homofermentatif dapat mengubah 95% dari glukosa atau heksosa lainnya menjadi asam laktat. Karbondioksida dan asam-asam volatil lainnya juga dihasilkan, tetapi dalam jumlah sedikit. BAL yang termasuk heterofermentatif merupakan bakteri yang tidak mempunyai enzim fruktosadifosfat aldolase, transadolase dan transketolase yang berperan dalam tahap glikolisis. Bakteri homofermentatif dapat menghasilkan energi sebesar dua kali energi yang dihasilkan oleh bakteri heterofermentatif dari jumlah substrat yang sama (Ferdiaz, 1989).



Gambar 2.1. Metabolisme homofermentatif (Axellson dalam Salminen (2004))



Gambar 2.2. Metabolisme heterofermentatif (Axellson dalam Salminen (2004)).

BAL tidak memiliki mekanisme transpor elektron dan sitokrom sehingga tidak dapat melakukan respirasi dan metabolismenya bergantung pada fosforilasi substrat untuk menghasilkan energi (Salminen *et al.*, 2004). Metabolisme homofermentatif menggunakan jalur Glikolisis (Embden-Meyerhof-Parnas *pathway*) dan digunakan oleh seluruh BAL kecuali *Leuconostoc*, *Lactobacilli*

kelompok 3, *Oenococci*, dan *Weisellas*. Jalur ini merupakan sistem metabolisme yang dicirikan dengan pembentukan fruktosa-1,6-diphospat (FDP) yang kemudian diubah FDP aldolase menjadi dihidroksiaseton phospat (DHAP) dan gliseraldehid-3- phospat (GAP). GAP kemudian diubah menjadi piruvat melalui sekuen metabolik termasuk fosforilasi substrat. Pada kondisi normal yaitu keberadaan gula dan oksigen yang terbatas, piruvat direduksi menjadi asam laktat dan dihasilkan NADH dan ATP (Salminen *et al.*, 2004). Metabolisme homofermentatif dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Metabolisme heterofermentatif (Gambar 2.4) dicirikan dengan tahap oksidasi awal berupa 6-phosphoglukonat diikuti dengan dekarboksilasipentosa-5-phospat yang tersisa diubah oleh phosphoketolase menjadi GAP dan asetil phospat. GAP dimetabolisme pada jalur yang sama dengan jalur glikolisis menghasilkan pembentukan asam laktat. Saat tidak ada *electron acceptor* tambahan yang tersedia, asetil phospat direduksi menjadi etanol via acetyl coA dan asetaldehid. Pada metabolisme ini dihasilkan juga produk akhir lain seperti CO₂, etanol (Axellson dalam Salminen (2004)).

Pemanfaatan BAL oleh manusia telah dilakukan sejak lama, yaitu untuk proses fermentasi makanan. BAL merupakan kelompok besar bakteri menguntungkan yang memiliki sifat relatif sama. Saat ini BAL digunakan untuk pengawetan dan memperbaiki tekstur dan cita rasa bahan pangan (Chabela, dkk., 2001). BAL mampu memproduksi asam laktat sebagai produk akhir perombakan karbohidrat, hidrogen peroksida dan bakteriosin (Afrianto, dkk., 2006). Dengan

terbentuknya zat antibakteri dan asam maka pertumbuhan bakteri patogen seperti *Salmonella* dan *E. Coli* akan dihambat (Silalahi, 2000).

Bakteri asam laktat termasuk mikroorganisme yang aman jika ditambahkan dalam pangan karena sifatnya tidak toksik dan tidak menghasilkan toksin, maka disebut *food grade microorganism* atau dikenal sebagai mikroorganisme yang *Generally Recognized As Safe (GRAS)* yaitu mikroorganisme yang tidak beresiko terhadap kesehatan, bahkan beberapa jenis bakteri tersebut berguna bagi kesehatan. BAL bermanfaat untuk peningkatan kualitas *higiene* dan keamanan pangan melalui penghambatan secara alami terhadap flora berbahaya yang bersifat patogen.

1. *Lactobacillus acidophilus*



Gambar 2.3 : Bentuk *L. acidophilus* (www.visualphotos.com).

Adapun klasifikasi dari *L. acidophilus* adalah sebagai berikut :

Kingdom : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli

Ordo : Lactobacillales
Famili : Lactobacillaceae
Genus : Lactobacillus
Species : *L. acidophilus*

(Sumber : Buchanan *et al*, 1993).


L. acidophilus berasal dari kata *lacto* yang berarti susu, *bacillus* yang berarti berbentuk seperti batang (Anggraeni, 2011). Bakteri *L. acidophilus* termasuk ke dalam golongan bakteri asam laktat. *L. acidophilus* adalah salah satu dari delapan generasi dari bakteri asam laktat. Tiap genus dari spesiesnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Namun, secara umum mereka merupakan bakteri gram positif yang berbentuk coccus atau batang, bersifat non-motil dan non spora. *L. acidophilus* mempunyai kemampuan bertahan hidup, melakukan proses metabolisme dan tumbuh pada tingkat keasaman (pH) yang sangat rendah, bahkan dibawah pH 4 (Hardiningsih *et al*, 2004). Bakteri ini dapat tumbuh dengan baik pada suhu udara 30°C. *L. acidophilus* tumbuh optimal pada lingkungan anaerob, namun dapat hidup pada lingkungan dengan kadar oksigen yang sangat rendah yaitu 5-10% karbondioksida (Hemmes *et al*, 2006; Anggreini, 2011). Umumnya bakteri ini ditemukan di dalam gastro intestinal manusia, hewan, mulut dan vagina. *L. acidophilus* termasuk golongan homofermentatif, yaitu bakteri yang sebagian besar hasil metabolismenya terhadap karbohidrat adalah asam laktat (Slotts dan Taubman, 1992; Hardiningsih *et al*, 2004).

Pada umumnya *L. acidophilus* merupakan flora normal rongga mulut dan tidak bersifat patogen, tetapi keberadaan bakteri ini di dalam mulut dikaitkan

dengan etiologi karies gigi. *L. acidophilus* merupakan Gram positif yang memiliki dinding sel sebagian besar (90%) terdiri dari lapisan peptidoglikan serta lipopolisakarida dan lipoprotein, sedangkan lapisan tipis lainnya adalah asam teikoat yang mengandung unit-unit gliserol atau ribitol (Lestari, 2008).

Media yang digunakan untuk menumbuhkan *L. acidophilus* harus memenuhi kebutuhan nutrisinya. Media terbaik untuk pertumbuhan *L. acidophilus* adalah rogosa agar yang memiliki pH 5,4 karena untuk menumbuhkan *L. acidophilus* memerlukan keadaan asam (Slots dan Taubman, 1992).

2. *Lactobacillus fermentum*



Gambar 2.4 : Bentuk *L. fermentum* (www.corbisimages.com)

Adapun klasifikasi dari *L. fermentum* adalah sebagai berikut :

Kingdom	: Bacteria
Division	: Firmicutes
Class	: Bacilli
Ordo	: Lactobacillales
Family	: Lactobacillaceae

Genus : Lactobacillus

Species : *L. fermentum*

(Sumber : Buchanan *et al*, 1993).

L. fermentum merupakan bakteri asam laktat yang tergolong dalam gram positif yang berbentuk batang dengan susunan tunggal atau rantai (Widiasih, 2008). *L. fermentum* merupakan bakteri asam laktat yang bersifat heterofermentatif yaitu bakteri yang menghasilkan asam laktat sekitar 50% dari fermentasi glukosa. Selain itu, *L. fermentum* juga menghasilkan senyawa etanol, CO₂CO₂, senyawa citarasa dan manitol (Surono, 2004)., Goktepe *et al.* (2006) menyatakan bahwa bakteri Lactobacillus merupakan bakteri anaerobik fakultatif yang mampu bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang mengandung oksigen. Bakteri ini tidak mempunyai enzim katalase atau katalase negatif tetapi bakteri ini mempunyai enzim peroksidase yang mampu menginaktifkan H₂O₂.

L. fermentum merupakan bakteri mesofilik (mampu tumbuh pada kisaran suhu 15-45°C) (Firmansyah, 2009). Nilai pH substrat yang dihasilkan *L. fermentum* adalah 4,3 (Komariah, 2008) dengan total asam tertitiasi 0,27%. *L. fermentum* mampu bertahan pada kondisi pH 2 dan pH 7,2 serta toleran terhadap garam empedu (oxgall 0,3%) (Wijayanto, 2009). *L. fermentum* mempunyai aktivitas antimikroba terhadap bakteri patogen diantaranya bakteri *E. coli*, *S. typhi* dan *S. aureus* (permanasari, 2008).

D. Tinjauan Umum Bakteri Gram Positif

Bakteri secara umum dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan sifat pewarnaan Gram yaitu Gram positif dan Gram negatif. Bakteri Gram positif

adalah bakteri yang memberi respon berwarna biru keunguan jika dilakukan uji pewarnaan Gram, sedangkan Gram negatif memberi respon warna merah (Tortora *et al.*, 2006). Kelompok bakteri patogen yang bersifat Gram positif diantaranya *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes* dan *Clostridium perfringens*, sedangkan bakteri patogen yang bersifat Gram negatif diantaranya *Escherichia coli*, *Enteropatogenik* dan *Salmonella typhimurium*.

Bakteri Gram positif memiliki dinding sel yang terdiri atas membran sel dan berlapis-lapis peptidoglikan. Pada pengecatan Gram, bakteri Gram positif tetap mengikat warna cat pertama (Gram A) karena tahan terhadap alkohol dan tidak mengikat warna cat yang kedua (warna kontras) sehingga bakteri berwarna ungu. Warna tersebut adalah warna kristal violet yang mewarnai peptidoglikan (Pelczar, 2007; Purwoko, 2007).

1. *Staphylococcus aureus*

a. Klasifikasi

Kingdom : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Ordo : Bacillales


Famili : Staphylococcaceae

Genus : *Staphylococcus*

Species : *S. aureus*

(Sumber : Buchanan *et al.*, 1993).

b. Morfologi



Gambar 2.5 : Bentuk *Staphylococcus aureus* (Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library, 2001).

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat berdiameter 0,7-1,2 μm , tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anerob, tidak membentuk spora dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37°C, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20 - 25°C). Bentuk koloni pada medium padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol dan berkilau (Jawetz *et al.*, 1995 ; Novick *et al.*, 2000).

C. Habitat

S.aureus merupakan flora normal pada manusia, habitatnya ada pada hidung, mulut dan tenggorokan yang dapat dikeluarkan pada waktu batuk atau bersin. Selain itu terdapat pula pada pori-pori dan permukaan kulit, kelenjar keringat dan saluran usus (Schenectady Country Community College, 2014).

d. Patogenisitas

Infeksi oleh *S.aureus* ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai abses bernanah. Beberapa infeksi yang disebabkan oleh *S. aureus* adalah bisul. Jerawat, impetigo dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis dan endokarditis. *S. aureus* juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan dan sindroma syok toksik (Ryan *et al.*, 1994; Warsa, 1994).

Bisul seperti jerawat dan borok merupakan infeksi kulit di daerah folikel rambut, kelenjar sebacea atau kelenjar keringat. Mula-mula terjadi nekrosis jaringan setempat, lalu terjadi koagulasi fibrin disekitar lesi dan pembuluh getah bening, sehingga terbentuk dinding yang membatasi proses nekrosis. Infeksi dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui pembuluh getah bening dan pembuluh darah sehingga terjadi peradangan vena, trombosis bahkan bakterimia. Bakterimia dapat menyebabkan terjadinya endokarditis, osteomielitis akut hematogen, meningitis dan infeksi paru-paru (Warsa, 1994; Jawetz *et al.*, 1995).

Keracunan makanan dapat disebabkan kontaminasi enterotoksin dari *S. aureus*. waktu gejala keracunan biasanya cepat dan akut, tergantung pada daya tahan tubuh dan banyaknya toksin yang termakan. Jumlah toksin yang dapat menyebabkan keracunan adalah 1,0 μ g/gr makanan. Gejala keracunan ditandai dengan rasa mual, muntah-muntah, dan diare yang hebat tanpa disertai demam (Ryan, 1994; Jawetz *et al.*, 1995).

Sindroma syok toksik (SST) pada infeksi *S. aureus* timbul secara tiba-tiba dengan gejala demam tinggi, muntah, diare, miaglia, ruam, dan hipotensi, dengan

gagal jantung dan ginjal dalam kasus yang berat. SST sering terjadi dalam lima hari permulaan haid pada wanita muda tampon atau anak dan pria dengan luka yang terinfeksi Staphylococcus. *S. aureus* tidak ditemukan dalam aliran darah (Jawetz *et al.*, 1995).

e. Faktor Virulensi

S. aureus dapat menimbulkan penyakit melalui kemampuannya tersebar luas dalam jaringan dan melalui pembentukan berbagai ekstraseluler. Berbagai zat yang berperan sebagai faktor virulensi dapat berupa protein, termasuk enzim dan toksik, contohnya :

1. Katalase, merupakan enzim yang berperan pada daya tahan bakteri terhadap proses fagositosis (Brooks *et al.*, 1995).
2. Koagulase, merupakan enzim yang dapat mengumpulkan plasma oksalat atau plasma sitrat, karena adanya faktor koagulase reaktif dalam serum yang bereaksi dengan enzim tersebut. Esterase yang dihasilkan dapat meningkatkan aktivitas penggumpalan sehingga terbentuk deposit fibrin pada permukaan sel bakteri yang dapat menghambat fagositosis (Warsa, 1994).
3. Hemolisin, merupakan toksik yang dapat membentuk suatu zona hemolisis di sekitar koloni bakteri. Hemolisis pada *S. aureus* terdiri dari alfa hemolisin, beta hemolisin dan delta hemolisin. Alfa hemolisin adalah toksik yang bertanggung jawab terhadap pembentukan zona hemolisis di sekitar koloni *S. aureus* pada medium agar darah, toksik ini dapat menyebabkan neurosis pada kulit hewan dan manusia. Beta hemolisin adalah toksik yang terutama dihasilkan staphylococcus yang diisolasi dari hewan yang menyebabkan lisis

pada sel darah merah domba dan sapi. Sedangkan delta hemolisis adalah toksik yang dapat melisis sel darah merah pada manusia dan kelinci, tetapi efek lisisnya kurang terhadap sel darah merah domba (Warsa, 1994).

4. Leukosidin, merupakan toksik yang dapat mematikan sel darah putih pada beberapa hewan. Akan tetapi perannya dalam patogenesis pada manusia tidak jelas karena staphylococcus patogen tidak dapat mematikan sel-sel darah putih manusia dan dapat difagositosis (Jawetz *et al.*, 1995).
5. Toksik eksfoliatif, merupakan toksik yang mempunyai aktivitas proteolitik dan dapat melarutkan matriks mukopolisakarida epidermis, sehingga menyebabkan pemisahan intrapiteal pada ikatan sel di stratum granulosum. Toksik ini merupakan *Staphylococcal Scalded Skin Syndrom* yang ditandai dengan melepuhnya kulit (Warsa, 1994).
6. Toksik Syndrom Syok Toksik (SST), merupakan toksik yang menghasilkan eksotoksik pirogenik. Pada manusia toksik ini menyebabkan demam, syok, ruam kulit dan gangguan multisistem organ dalam tubuh (Ryan, 1994; Jawetz *et al.*, 1995).
7. Enterotoksin, merupakan enzim yang tahan panas dan tahan terhadap suasana basa di dalam usus. Enzim ini merupakan penyebab utama dalam keracunan makanan, terutama pada makanan yang mengandung karbohidrat dan protein (Jawetz *et al.*, 1995).


2. *Bacillus cereus*

a. Klasifikasi

kingdom : Bacteria
 filum : Firmicutes
 kelas : Bacilli
 order : Bacillales
 famili : Bacillaceae
 genus : *Bacillus*
 species : *B. cereus*

(Sumber : Buchanan *et al*, 1993).

b. Morfologi



Gambar 2.6 : Bentuk *Bacillus cereus* (ASMCUE, 2005).

B. cereus merupakan salah satu anggota genus *Bacillus* yang pertama kali diisolasi pada tahun 1969 dari darah dan cairan pleura pasien pneumonia. *B. cereus* merupakan bakteri yang berbentuk batang dan merupakan bakteri yang tergolong bakteri Gram positif (Hough *et al*, 1989). *B. cereus* dapat membentuk endospora, bersifat aerobik dan fakultatif aerobik. Struktur selnya terdiri dari

membran dalam dan peptidoglikan tebal yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk. *B. cereus* memiliki ukuran sel dengan lebar 0,9 – 1,2 μm dan panjang 3 – 5 μm . Motilitas positif, spora elipsoidal, sentral atau parasentral, spora jarang keluar dari sporangia. Tidak membentuk kapsul, biasanya muncul dalam rantai panjang tipe R. Bentuk koloni irregular, opaque terkadang waxy (Holbrook *et al*, 1980).

B. cereus membentuk spora ketika nutrisi yang ada dalam lingkungan kurang dan berkecambah menjadi sel vegetatif ketika nutrisi tersedia dalam lingkungan. Oleh karena itu, struktur spora penting untuk kelangsungan hidup bakteri ini. *B. cereus* memiliki spora yang intinya dikelilingi oleh membran dalam, dan korteks luar dikelilingi oleh membran luar dengan mantel eksterior tambahan. Lapisan spora terbuat dari protein dan sejumlah kecil lipid dan karbohidrat yang berkontribusi terhadap ketahanan terhadap oksidasi agen dan bahan kimia dengan menghalangi molekul beracun. Selain itu, struktur spora luar memungkinkan mereka untuk menjadi panas dan tahan radiasi (Kenneth, 2012).

B. cereus adalah aerob fakultatif sehingga dapat memanfaatkan oksigen sebagai penerima elektron terminal, tetapi juga memiliki metode respirasi anaerob sebagai mekanisme pelepasan energi. Dalam respirasi aerob, *B. cereus* menggunakan fermentasi untuk menghasilkan energi. *B. cereus* dapat memetabolisme berbagai senyawa termasuk karbohidrat, protein, peptida dan asam amino untuk pertumbuhan dan energi (BPOM, 2008).

c. Habitat

B. cereus berinteraksi dengan mikroorganisme lain dalam rhizofe, daerah sekitar akar tanaman. Keberadaan *B. cereus* bermanfaat bagi tanaman karena mampu menghambat penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen protista dan juga meningkatkan pertumbuhan tanaman. *B. cereus* juga ditemukan dalam mikroflora usus dari invertebrata, dan merupakan simbiosis usus arthropoda (Kenneth, 2012).

Sebagai bakteri dimana-mana, sejumlah kecil dikonsumsi oleh manusia dari makanan. Oleh karena itu, merupakan kontributor untuk mikroflora usus manusia. *B. cereus* secara luas diketahui mempengaruhi manusia dengan menyebabkan keracunan makanan dan infeksi sebagai patogen oportunistik (BPOM, 2008).

d. Patogenisitas

B. cereus menyebabkan dua jenis keracunan makanan pada manusia termasuk sindrom diare dan sindrom emetik. Keracunan makanan hasil dari enterotoksin dalam saluran pencernaan. Dosis spora *B. cereus* yang tertelan yang dapat menyebabkan sindrom diare adalah 10^5 - 10^7 g 1 makanan tertelan dan 10^5 - 10^8 g 1 makanan tertelan untuk sindrom emetik. Enterotoksin yang dikaitkan dengan gejala diare adalah unresistant dengan kondisi asam lambung (Kenneth, 2012).

Bila seseorang mengalami keracunan yang disebabkan oleh toksin penyebab diare, maka gejala yang timbul berhubungan dengan saluran pencernaan bagian bawah berupa mual, nyeri perut seperti kram, dan diare berair yang terjadi

8-16 jam setelah mengonsumsi pangan. Bila seseorang mengalami keracunan yang disebabkan oleh toksin penyebab muntah, gejala yang timbul akan bersifat lebih parah dan akut serta berhubungan dengan saluran pencernaan bagian atas berupa mual dan muntah yang dimulai 1-6 jam setelah mengonsumsi pangan yang tercemar (BPOM).

B. cereus juga dapat menyebabkan kulit lokal dan infeksi luka, infeksi mata, gagal hati fulminan dan invasif penyakit, termasuk bakteremia, endokarditis, osteomielitis, pneumonia, abses otak dan meningitis (OPH, 2012).

e. Faktor Virulensi

B. cereus menghasilkan beberapa enterotoksin dalam makanan atau dibentuk dalam usus penyebab penting dari infeksi mata, keratitis berat, endoftalmitis dan panofalmitis (khususnya bakteri masuk ke dalam mata melalui benda asing yang berkaitan dengan trauma). Enterotoksin penyebab diare bersifat keracunan lewat makanan (diarrheal type). Enterotoksin penyebab muntah berkaitan pada nasi panas tercemar (metic type) dengan gejala mual, kejang otot perut. Dalam pertumbuhan *B. cereus* menghasilkan toksin selama pertumbuhan atau selama sponulasi (Soemarno, 2000).

Beberapa strain dari *B. cereus* bersifat patogen dan berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan *Footborne illness*, namun beberapa diantaranya yang bersifat saprofitik dapat bermanfaat sebagai probiotik dan juga penghasil antibiotik yang potensial. *B. cereus* kebanyakan ditemukan terkandung dalam bahan pangan menyebabkan 2 tipe keracunan makanan : 1) emetic yang merupakan keracunan yang dimediasi oleh toksin yang sangat stabil yang dapat

bertahan pada temperatur tinggi, pH ekstrim serta tahan terhadap enzim pencernaan seperti : trypsin dan pepsin. 2) diarrhoeal yang dimediasi oleh enterotoksin yang labil terhadap panas dan asam. *B. cereus* merupakan mikroorganisme yang dapat tumbuh pada kisaran temperatur yang luas dan terdapat strain yang tergolong *psychrophilic* hingga *thermophilic*. Karena kebanyakan strain *B. cereus* hidup dalam gastro-intestinal dan menyebabkan infeksi diarrhoeal, maka temperatur 37°C merupakan temperatur pertumbuhan yang optimal (Abdul, 1994).

E. Pandangan Islam Tentang Bakteri Penghasil Probiotik

Islam adalah agama yang sempurna (*kamil*) dan menyeluruh (*syamil*). Islam mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek termasuk dalam dunia perawatan dan pengobatan. Allah swt yang maha pengasih dan penyayang kepada umat manusia, melalui kekasih-Nya Rasulullah, Allah mengajarkan kepada manusia cara merawat dan memelihara kesehatan (Annisa, 2013).

Seperti dalam Q.S Al-furqan ayat 2 yang berbunyi :

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan (Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya (Kementerian Agama RI, 2002).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menguasai segala sesuatu yang ada diseluruh alam ini, dan Allah juga menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran dan memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Pada ayat ini Allah memuji diri-Nya dengan menurunkan Al-qur'an kepada Nabi Muhammad saw yang disebutnya hamba-Nya untuk menjadi peringatan bagi alam semesta (manusia dan jin). Dengan pujian terhadap diri-Nya karena Dia menurunkan Al-qur'an kepada Nabi Muhammad saw dapatlah dipahami bahwa Al-qur'an itu adalah suatu kitab yang amat penting dan amat tinggi nilainya disisi Allah, karena Al-qur'an itu adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi makhluk-Nya yang dimuliakan-Nya yaitu manusia, sedangkan ciptaan-ciptaan lainnya baik di langit maupun di bumi adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Allah tidak menyebut Al-qur'an tetapi Al-furqan pada ayat ini karena Al-qur'an itu adalah pembeda yang hak dan yang bathil antara petunjuk dan kesesatan dan berbeda dengan kitab-kitab yang lainyang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya hanya untuk suatu umat di masa itu tetapi Al-qur'an diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad dan seterusnya di masa sesudahnya sampai hari kiamat, karena nabi-nabi sebelum Muhammad hanya diutus untuk kaumnya sedangkan Muhammad diutus untuk manusia di segala masa dan di semua tempat. Manusia yang benar-benar memperhambakan dirinya kepada Allah mengaku ke-Esaan dan kekuasaan-Nya, taat dan patuh menjalankan perintah-Nya selalu menjadikan petunjuk-Nya sebagai pedoman hidupnya, mencintai Allah secara hakiki lebih dari apapun di dunia ini, itulah hamn allah yang hakiki (Muhammad Ihsan, 2014).

Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang sangat empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan Al-Qur'an sumber ilmu dan sumber inspirasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan sains. Al-qur'an mengandung banyak konsep-konsep sains serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Seperti dalam Q.S Al-mujadilah ayat 11 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah pada majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan bagi kamu. Dan jika dikatakan kepada kamu ; Berdirilah ! ", maka berdirilah Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang~rang yang diberi ilmu beberapa derajat ; Dan Allah dengan apapun yang kamu kerjakan adalah Maha Mengetahui (Kementerian Agama RI, 2002).

Dengan ayat tersebut sehingga memberikan dorongan kepada kaum muslim untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum sepanjang hayatnya tanpa dibatsi usia, ruang, waktu dan tempat. Allah SWT telah menganugrahkan akal kepada manusia, suatu naugrah yang sangat berharga, yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berfikir kritis dan logis (Fahrizal, 2012).

Dunia mikroorganisme tentu sama sekali belum dikenal pada masa kenabian dan sesudahnya hingga abad lalu. Akan tetapi islam telah memberikan tuntunan mengenai masalah wudhu, mandi, kebersihan rumah, pakaian, makanan

dan minuman, tempat-tempat yang bisa dilalui orang, serta perilaku moral individu maupun kelompok. Semua ini menandakan kepada dunia bahwa mikroorganisme dapat menjadi penyebab berbagai penyakit yang melemahkan tubuh dan menurunkan kondisi kesehatan, bahkan mengakibatkan kematian (Yusuf Al-Hajj Ahmad, 2010)

Ilmu pengetahuan telah membuktikan kebenaran Al-qur'an dan sunah dalam memberikan petunjuk mengenai dunia mikroorganisme. Syariat islam telah mempersembahkan cara dan langkah yang paling efektif dalam membasmi mikroorganisme guna menjaga dan melindungi manusia dari ancaman bahayanya. Para ilmuan telah menyaksikan sendiri kebenaran wahyu Allah SWT ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman :

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ
وَيَهْدِي إِلَى الْعَزِيزِ صِرَاطِ الْحَمِيدِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang diberi ilmu (ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji (Kementerian Agama RI, 2002).

Setiap orang harus menjaga kesehatan sistem pencernaan mereka sebab sumber segala penyakit adalah pencernaan yang kurang baik. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang kemudian dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern. Hal ini dapat menyebabkan radang perut yang parah dan kronis akibat bakteri yang berdiam di dalam usus menyebarkan racun ke seluruh peredaran darah. Kondisi ini berdampak pada sistem pencernaan, sistem

pernapasan, sstem urinari ginjal dan sistem vital lainnya pada tubuh manusia. Akibatnya terjadi ketidaknormalan fungsi sistem organ tubuh (Yusuf Al-Hajj Ahmad, 2010).

F. Hipotesis

Bakteri Asam Laktat (BAL) asal dangke memiliki daya hambat yang berbeda terhadap bakteri patogen *Staphylococcus aureus* dan *Bacillus cereus*.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan daya hambat Bakteri Asam Laktat (BAL) asal dangke yaitu *Lactobacillus acidophilus* dan *Lactobacillus fermentum* terhadap pertumbuhan bakteri Gram positif sebagai kandidat probiotik. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan dengan rincian perlakuan sebagai berikut:

A0, B1, C1 = Aquadest, *Staphylococcus aureus*, 24 jam

A0, B1, C2 = Aquadest, *Staphylococcus aureus*, 48 jam

A0, B1, C3 = Aquadest, *Staphylococcus aureus*, 72 jam

A0, B2, C1 = Aquadest, *Bacillus cereus*, 24 jam

A0, B2, C2 = Aquadest, *Bacillus cereus*, 48 jam

A0, B2, C3 = Aquadest, *Bacillus cereus*, 72 jam

A1, B1, C1 = *Lactobacillus acidophilus*, *Staphylococcus aureus*, 24 jam

A1, B1, C2 = *Lactobacillus acidophilus*, *Staphylococcus aureus*, 48 jam

A1, B1, C3 = *Lactobacillus acidophilus*, *Staphylococcus aureus*, 72 jam

A1, B2, C1 = *Lactobacillus acidophilus*, *Bacillus cereus*, 24 jam

A1, B2, C2 = *Lactobacillus acidophilus*, *Bacillus cereus*, 48 jam

A1, B2, C3 = *Lactobacillus acidophilus*, *Bacillus cereus*, 72 jam

- A2, B1, C1 = *Lactobacillus fermentum*, *Staphylococcus aureus*, 24 jam
- A2, B1, C2 = *Lactobacillus fermentum*, *Staphylococcus aureus*, 48 jam
- A2, B1, C3 = *Lactobacillus fermentum*, *Staphylococcus aureus*, 72 jam
- A2, B2, C1 = *Lactobacillus fermentum*, *Bacillus cereus*, 24 jam
- A2, B2, C2 = *Lactobacillus fermentum*, *Bacillus cereus*, 48 jam
- A2, B2, C3 = *Lactobacillus fermentum*, *Bacillus cereus*, 72 jam

B. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas berupa daya hambat jenis BAL asal dangke yakni *L. acidophilus* dan *L. fermentum* sedangkan variabel terikatnya adalah zona hambat pertumbuhan bakteri Gram positif.

C. Defenisi Operasional Variabel

1. Daya hambat jenis BAL adalah kemampuan jenis BAL asal dangke yakni *L. acidophilus* dan *L. fermentum* menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif yaitu *S. aureus* dan *B. cereus*.
2. Zona hambat jenis BAL asal dangke adalah zona jernih yang terbentuk akibat kemampuan jenis BAL yaitu *L. acidophilus* dan *L. fermentum* menghambat pertumbuhan *S. aureus* dan *B. cereus* pada medium MRSA dengan menggunakan metode *well-diffusion* setelah dilakukan inkubasi pada suhu 37⁰ C selama 24 jam.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. BAL (*L. Acidophilus* dan *L. fermentum*) yang digunakan merupakan biakan koleksi laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, merupakan isolat dari dangke susu sapi dan susu kerbau.
2. Bakteri patogen uji (*S. aureus* dan *B. cereus*) yang digunakan diperoleh dari koleksi laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.
3. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2013 hingga Februari 2014 di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

E. Prosedur penelitian

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, inkubator, outoklaf, *Lamina air flow*, *hot plate stirrer*, ose bulat, neraca analitik, gelas ukur 100 ml dan 500 ml, tabung reaksi, rak tabung, batang pengaduk, oven, bunsen, jangka sorong, pelubang kertas, labu Erlenmeyer, pipet mikro, pinset, labu semprot, vortex, corong, gelas kimia dan kulkas.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biakan murni bakteri *L. Acidophilus* dan *L. fermentum*, *S. aureus* dan *B. cereus*, aquadest, aluminium foil, kertas saring, medium Nutrien Agar (NA), medium *de Mann, Rogosa and Sharpe* (MRS), spritus, kapas penutup, *wrapper*, tissue, dan alkohol 70%.

F. Prosedur Kerja

a. Sterilisasi Alat dan Bahan

Alat-alat yang akan digunakan dicuci bersih lalu dibilas dengan air suling, kemudian alat-alat gelas disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan menggunakan lampu spiritus. Bahan-bahan seperti aquades dan medium disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada suhunya 121° C, tekanan 2 atm selama 15 menit. Sebelum disterilkan, bahan-bahan tersebut disaring terlebih dahulu.

b. Pembuatan media

Pembuatan media diawali dengan menimbang semua bahan secara teliti kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml, ditambahkan dengan aquades sebanyak 500 ml. Selanjutnya dilarutkan dengan *hot plate magnetic stirrer*. Setelah semua bahan homogen kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 ml lalu ditutup dengan menggunakan kapas sebelum sterilisasi lalu dimiringkan hingga memadat (untuk membuat agar miring). Selebihnya disimpan di lemari pendingin.

c. Uji Daya Hambat BAL terhadap *S. Aureus* dan *B. cereus*

1. Penyiapan bakteri patogen uji

Cara kerja penanaman isolat *E. coli* pada Mueller Hinton Agar dilakukan sesuai dengan Metode Kirby-Bauer yang telah dimodifikasi (Panagan, 2009). Beberapa koloni bakteri isolat *S. aureus* dan *B. cereus* dikultur ke dalam 10 ml larutan pepton 10%, kemudian inkubasikan pada suhu 37°C selama 1 jam hingga

didapatkan kekeruhan setara dengan Mc Farland 0,5 (kandungan 10⁸ sel/ml). Sebanyak 1 ml kultur *S. aureus* dituang pada media NA. Media digoyang-goyangkan agar bakteri merata pada permukaan media. Media didiamkan selama 15-30 menit di dalam *Laminar Flow* agar bakteri terserap seluruhnya ke dalam agar dan memadat. Begitu pula perlakuan pada kultur *B. cereus* sebanyak 1 ml dituang pada media NA. Media digoyang-goyangkan agar bakteri merata pada permukaan media. Media didiamkan selama 15-30 menit di dalam *Laminar Flow* agar bakteri terserap seluruhnya ke dalam agar dan memadat.

2. Inokulasi BAL

Uji daya hambat masing-masing bakteri asam laktat terhadap bakteri *S. aureus* dan *B. cereus* dilakukan dengan metode uji Kirby-Bauer menggunakan kertas cakram. Kertas cakram dibuat dari kertas saring Whatman dengan cara mengguntingnya dengan alat pembolong kertas sehingga didapatkan kertas cakram dengan diameter 6 mm. Secara aseptik, kertas cakram yang sudah disterilkan direndam di dalam suspensi kultur bakteri selama 30 menit. Kertas cakram diambil dengan menggunakan pinset steril dan diletakkan di tengah permukaan medium uji aktivitas antibakteri (medium NA+bakteri uji yang telah disiapkan sebelumnya). Kemudian diinkubasi selama 1 x 24 jam, 2 x 24 jam dan 3 x 24 jam pada suhu 37°C. masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Setelah masa inkubasi selesai, dilakukan pengamatan terhadap zona jernih yang terbentuk dan diukur diameternya. BAL yang mempunyai potensi menghasilkan zat antibakteri ditunjukkan dengan adanya zona jernih.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik inferensial dengan menggunakan uji *One – Way ANOVA* dan di lanjutkan dengan Duncan untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan yang terjadi antar perlakuan dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Microsoft Windows release 21* dan $p < 0,05$ dipilih sebagai tingkat minimal signifikasinya.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Pengamatan

Penentuan besarnya rata-rata diameter zona hambat bakteri asam laktat (BAL) asal dangke yaitu *Lactobacillus acidophilus* dan *Lactobacillus fermentum* terhadap pertumbuhan bakteri patogen yang bersifat Gram positif yaitu *Staphylococcus aureus* dan *Bacillus cereus* dilakukan dengan mengukur zona bening yang terbentuk. Adapun hasil pengukuran zona bening dapat dilihat pada tabel 4.1.


Tabel 4.1 Zona hambat bakteri *L. acidophilus* dan *L. fermentum* terhadap pertumbuhan bakteri *S. aureus* dan *B. cereus* pada variasi waktu inkubasi.

Perlakuan	Ulangan			Rerata (mm)
	1	2	3	
A0B1C1	0	0	0	0
A0B1C2	0	0	0	0
A0B1C3	0	0	0	0
A0B2C1	0	0	0	0
A0B2C2	0	0	0	0
A0B2C3	0	0	0	0
A1B1C1	7	7	7	7
A1B1C2	8	8	7	7,66
A1B1C3	8	9	8	8,33
A1B2C1	7	7	7	7
A1B2C2	8	8	8	8
A1B2C3	9	9	8	8,66
A2B1C1	8	7	7	7,33
A2B1C2	8	7	7	7,33
A2B1C3	9	7	8	8
A2B2C1	7	8	7	7,33
A2B2C2	7	8	7	7,33
A2B2C3	7	8	7	7,33

Perbandingan rata-rata diameter zona hambat bakteri *L. acidophilus* terhadap pertumbuhan bakteri *S. aureus* dan *B. cereus* pada variasi waktu inkubasi dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2.



Gambar 4.1. Grafik Perbandingan rata-rata diameter zona hambat bakteri *L. acidophilus* terhadap pertumbuhan bakteri *S. aureus* dan *B. cereus* pada variasi waktu inkubasi.



Gambar 4.2. Grafik Perbandingan rata-rata diameter zona hambat bakteri *L. fermentum* terhadap pertumbuhan bakteri *S. aureus* dan *B. cereus* pada variasi waktu inkubasi.

Hasil sidik ragam data yang diperoleh dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Microsoft Windows release 21* dan $p < 0,05$ sebagai tingkat minimal signifikannya sebagaimana tabel 4.2 menunjukkan bahwa faktor B (jenis bakteri patogen uji) menunjukkan perbedaan daya hambat BAL yang tidak nyata baik terhadap *S. aureus* maupun terhadap *B. cereus*. Lain halnya untuk faktor A (jenis BAL) dan faktor C (masa inkubasi) menunjukkan perbedaan daya hambat yang nyata (signifikan), dimana jenis BAL *L. acidophilus* (A1) menunjukkan daya hambat yang lebih tinggi dibandingkan *L. fermentum* (A2) dan kontrol negatif (aquades = A0). Sedangkan masa inkubasi yang menunjukkan daya hambat tertinggi adalah perlakuan C3 (masa inkubasi 3 x 24 jam), kemudian disusul oleh perlakuan C2 (masa inkubasi 2 x 24 jam), dan C1 (masa inkubasi 1 x 24 jam). Hal ini juga memberi makna bahwa jenis BAL dan masa inkubasi memiliki interaksi yang nyata dalam mempengaruhi daya hambat yang dihasilkan.

Tabel 4.2 Hasil sidik ragam zona hambat bakteri *L. acidophilus* dan *L. fermentum* terhadap pertumbuhan bakteri *S. aureus* dan *B. cereus* pada variasi waktu inkubasi.

Sumber Keragaman	Jumlah Kuadrat	db	Kuadrat Tengah	F	Sig.
A	696.148	2	348.074	1.709E3	.000
B	.000	1	.000	.000	1.000
C	3.370	2	1.685	8.273	.001
A * B	.444	2	.222	1.091	.347
A * C	3.852	4	.963	4.727	.004
B * C	.111	2	.056	.273	.763
A * B * C	.444	4	.111	.545	.703
Galat	7.333	36	.204		
Total	2102.000	54			

B. Pembahasan

Salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh BAL sebagai kandidat probiotik adalah kemampuannya untuk menghambat bakteri patogen dan mampu berkompetisi dengan bakteri patogen untuk mempertahankan keseimbangan mikroflora usus (Gildberg *et al.*, 1997). Pengujian pada penelitian ini menggunakan 2 spesies bakteri asam laktat yaitu *L. acidophilus* dan *L. fermentum* yang diisolasi dari dangke dan terhadap dua spesies bakteri patogen yang merupakan bakteri Gram positif yaitu *S. aureus* dan *B. cereus*. Bakteri patogen yang digunakan ini merupakan bakteri yang sering ditemukan pada saluran pencernaan.

Penggunaan BAL sebagai probiotik telah banyak diteliti. BAL mampu memproduksi asam laktat dan menghasilkan komponen antimikroba seperti bakteriosin, hidrogen peroksida, *nisin*, *lecitin*, *diplococcin* dan *lactococcin* yang mempunyai sifat antagonistik terhadap bakteri patogen (Janson, 2005). Sifat antimikroba adalah suatu kemampuan antagonistik suatu senyawa kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Menurut Fraizer dan Westhoff (1998), efektivitas antimikroba dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu : (1) jenis, jumlah, umur dan latar belakang kehidupan mikroba; (2) konsentrasi zat antimikroba; (3) suhu dan waktu kontak; (4) sifat fisika-kimia substrat (pH, kadar asin, tegangan permukaan, jenis dan jumlah zat terlarut dan senyawa lainnya).

Hasil uji daya hambat bakteri menunjukkan bahwa kedua bakteri asam laktat memiliki daya penghambatan yang relatif sama terhadap pertumbuhan bakteri patogen *S. aureus* dan *B. cereus*. Hal ini disebabkan karena kedua bakteri

patogen uji yang digunakan merupakan bakteri yang berasal dari kelompok yang sama yaitu Gram positif (Fardiaz, 1992). Relatif rendahnya daya hambat yang ditunjukkan oleh masing-masing perlakuan senada dengan yang dilaporkan oleh Wirawati (2002), Elida 2002, Kusumawati (2002) dan Evanikastri (2003) yang melaporkan beberapa isolat BAL yang mempunyai aktivitas penghambatan yang rendah terhadap *S. aureus*. Sedangkan pada *L. fermentum* memperlihatkan penghambatan yang relatif sama dengan *L. acidophilus*.

Bakteri patogen uji yang digunakan memiliki satu lapisan tebal peptidoglikan pada dinding selnya. Substansi antimikroba dari BAL yang dapat menghambat pertumbuhan *S. aureus* adalah asam organik dan bakteriosin yang disertai dengan penurunan pH. Mekanisme penghambatan yang berhubungan dengan penurunan pH menunjukkan bahwa bentuk asam tak terdisosiasi semakin efektif. Mekanisme penghambatan bakteri oleh asam - asam organik berhubungan dengan keseimbangan asam-basa, penambahan proton dan produksi energi oleh sel. Penambahan proton akibat dari bentuk tidak terdisosiasi dari asam organik.

Menurut Mc. Kane dan Kandel (1985), bakteri Gram positif memiliki satu lapisan tebal peptidoglikan, dan asam teikoat. Sensitivitas suatu bakteri terhadap substrat dipengaruhi oleh lapisan yang menyusun dinding sel. Lapisan peptidoglikan pada bakteri Gram negatif lebih tipis dibandingkan dengan bakteri Gram positif. Pratiwi (2008) menyatakan bahwa bakteri Gram positif memiliki 2 asam teikoat yaitu asam lipoteikoat dan asam teikoat (dinding) dan hanya mengandung sejumlah kecil peptidoglikan. Sehingga dari hasil pengamatan

menunjukkan bahwa *Staphylococcus aureus* dan *Bacillus cereus* dapat dengan mudah dihambat oleh BAL.

Pada umumnya bakteri patogen Gram negatif mempunyai ketahanan lebih baik terhadap senyawa anti mikroba dibandingkan bakteri Gram positif. Pelczar dan Chang (1982) menjelaskan bahwa struktur dinding sel bakteri Gram positif lebih sederhana sehingga memudahkan senyawa antimikroba untuk dapat masuk ke dalam sel. Sedangkan bakteri Gram negatif mempunyai struktur yang lebih kompleks, yaitu lapisan luar berupa lipoprotein, lapisan tengah berupa polisakarida dan lapisan paling dalam adalah peptidoglikan.

Aktivitas penghambatan oleh senyawa antimikroba ditunjukkan dengan adanya zona bening di sekeliling kertas cakram. Zona bening tersebut terdiri atas dua macam, yaitu zona bening dengan batas tepi lingkaran yang tegas dan jelas, serta zona bening dengan tepi lingkaran yang keruh. Pada kasus senyawa antibakteri dari BAL, zona bening dengan batas tepi lingkaran yang jelas dan tegas disebabkan oleh adanya aktivitas bakteriosin, karena bakteriosin memiliki sifat *single hit inactivation* yang artinya satu molekul bakteriosin akan membunuh satu sel bakteri indikator. Zona bening dengan tepi lingkaran yang keruh disebabkan oleh adanya aktivitas asam. Keruhnya zona bening tersebut disebabkan semakin rendahnya konsentrasi asam yang terdapat dalam supernatan yang mengakibatkan turunnya aktivitas penghambatan terhadap bakteri uji (Ray 1996 dalam Nurmali 2008).

Jenis BAL yang berbeda yaitu *L. acidophilus* dan *L. fermentum* dan variasi waktu yaitu 1 – 3 x 24 jam memberikan pengaruh yang nyata terhadap

aktivitas hambatan bakteri patogen. Hal ini dapat dilihat dari data diameter zona hambat yang didapatkan dari kedua BAL terhadap patogen yang digunakan jauh berbeda dibandingkan dengan kontrol negatif (aquades). Uji lanjut Duncan yang memperlihatkan perlakuan mana yang memberikan pengaruh yang paling besar dari kedua BAL yang digunakan *L. acidophilus* dengan masa inkubasi 72 jam.

Bakteri *L. acidophilus* merupakan salah satu spesies penyusun mikroba alami usus yang mampu melewati hambatan-hambatan di dalam saluran pencernaan. *L. acidophilus* mensekresikan senyawa metabolit, bakteriosin, asam organik dan H_2O_2 yang dapat menghambat penyebaran bakteri patogen. *L. acidophilus* menghasilkan D9-) asam laktat yang berfungsi memperbaiki ketersediaan biologis mineral, sehingga memperbaiki penyerapan mineral, terutama kalsium, sebab kalsium lebih mudah diserap dalam kondisi asam (Surono, 2004).

Kemampuan BAL dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen dapat terjadi karena BAL dapat menghasilkan senyawa yang bersifat antimikroba. Beberapa senyawa yang dihasilkan oleh BAL yang bersifat antimikroba antara lain asam-asam organik, hidrogen peroksida dan senyawa protein atau kompleks protein spesifik yang disebut bakteriosin.

Asam laktat adalah asam 2-hidroksi propanoat dan dikenal juga sebagai asam susu atau *lactic acid* (Hart *et al.*, 2003). Secara struktur, asam laktat adalah asam karboksilat dengan satu gugus (hidroksil) yang menempel pada gugus karboksil. Asam-asam organik dalam hidrolisis asam lemak dan juga sebagai hasil aktivitas pertumbuhan bakteri. Asam organik tersebut umumnya berupa asam

organik lemah seperti asam laktat, asam asetat, dan asam propionat. Asam-asam organik juga sering digunakan sebagai asidulan (bahan pengasaman) yang dapat menurunkan pH sehingga pertumbuhan mikroba berbahaya pada produk fermentasi akan terhambat (Winarno, 1997).

Menurut Salminen dan Wright (2004), asam laktat dan asetat adalah salah satu senyawa antimikroba yang dihasilkan BAL. BAL juga menghasilkan hidrogen peroksida yang cukup besar. Akumulasi senyawa tersebut di dalam sel terjadi karena BAL tidak menghasilkan enzim katalase. Pelczar *et al.* (1993) mengemukakan bahwa senyawa antimikroba dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau membunuh mikroba dengan mekanisme berupa merusak dinding sel yang dapat mengakibatkan lisis, atau penghambatan sintesis komponennya. Adanya perubahan permeabilitas membran sitoplasma menyebabkan terjadi kebocoran nutrisi dari dalam sel dengan cara menghambat kerja enzim intraseluler.

Bakteri asam laktat menghasilkan asam organik, hidrogen peroksida, diasetil, dan bakteriosin sebagai inhibitor yang potensial dalam menghambat organisme lain (Davidson dan Hoover dalam Salminen *et al.*, 2004). Mekanisme reaksi antimikroba terhadap bakteri lain dalam menghambat atau mematikan bakteri berbeda-beda, antara lain: hambatan terhadap pembentukan dinding sel, gangguan membran sel, menghambat pembentukan protein dan menghambat pembentukan asam nukleat (Williams *et al.*, 1996). Selain itu Pelczar dan Chan (1988) juga menyatakan bahwa senyawa antimikroba juga dapat mencegah sintesis DNA serta menghentikan sintesis folat pada mikroorganisme. Aktivitas

senyawa antimikroba akan meningkatkan permeabilitas membran sel yang dapat menyebabkan sel kehilangan materi seluler, inaktivasi enzim esensial dan merusak atau inaktivasi fungsional materi genetik.

Di antara asam organik yang umum dihasilkan oleh BAL, asam asetat diketahui merupakan inhibitor utama dengan spektrum penghambatan yang luas baik terhadap bakteri, khamir, maupun kapang diikuti oleh asam propionat yang memiliki spektrum penghambatan terhadap jenis kapang dan khamir tertentu. Asam asetat merupakan nama umum dari asam etanoat dan dikenal juga dengan asam cuka sedangkan asam propionat merupakan nama umum dari asam propanoat (Hart *et al.*, 2003). Asam laktat diketahui berperan sebagai agen pereduksi pH sedangkan asam asetat dan asam propionat adalah agen antimikroba yang sesungguhnya (Ouweland dan Vesterlund dalam Salminen, 2004).

Salminen *et al.*, (2004) menyatakan keberadaan hidrogen peroksida (H_2O_2) dalam BAL diawali dari kondisi aerob yang memungkinkan enzim-enzim seperti aoksidas yang mengandung flavoprotein, NADH oksidase, dan superoksida dismutase untuk bekerja dan menghasilkan hidrogen peroksida. Meski begitu, BAL diketahui dapat menekan akumulasi zat tersebut dikarenakan memiliki enzim peroksidase, flavoprotein, dan pseudokatalase yang dapat bertindak seperti katalase.

Efek bakterisidal dari hidrogen peroksida dikarenakan kemampuannya sebagai *oxidizing agent* terhadap sel bakteri. Bagian dari dinding sel seperti gugus sulfidryl dan lipid membran sel dapat dengan mudah teroksidasi (Salminen *et al.*, 2004). Akibatnya proses metabolisme seperti glikolisis terhambat dan kerja enzim

seperti hexokinase dan aldehyd- 3-phospat juga terganggu. Selain itu, hidrogen peroksida juga diketahui dapat mengikat oksigen (*oxygen scavenger*) sehingga dapat membuat lingkungan menjadi anaerob yang menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Umumnya hidrogen peroksida bersifat bakteriostatik terhadap bakteri Gram positif dan bersifat bakterisidal untuk bakteri Gram negatif.

Adetunji (2007) menyatakan bahwa bakteri asam laktat dan sifat fisiknya termasuk ke dalam kelompok Gram positif yang memproduksi berbagai macam kandungan yang memiliki sifat antimikroba salah satunya adalah bakteriosin. Bakteriosin secara umum merupakan ekstraseluler yang dilepaskan oleh peptida atau protein yang menunjukkan aktivitas bakteriosidalnya melawan patogen. Kusmiati, (2002) menyatakan bahwa bakteriosin merupakan senyawa protein yang dieksresikan oleh bakteri yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri lain terutama yang memiliki kekerabatan erat secara filogenik. Senyawa ini mudah terdegradasi oleh enzim proteolitik dalam pencernaan manusia dan hewan.

Bernett *et al* pada tahun 1997 menyatakan bahwa terdapat dua hipotesa mengenai penurunan jumlah bakteri patogen dalam usus manusia. Dua hipotesa tersebut adalah (1) sel BAL mampu mengganti posisi penempelan bakteri patogen dan (2) komponen anti mikroba yang dimiliki BAL menghambat bakteri patogen . Hipotesa ini didukung oleh banyak penelitian yang menunjukkan aktivitas antimikroba yang dimiliki galur-galur BAL dan terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri patogen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis bakteri patogen uji menunjukkan perbedaan daya hambat BAL yang tidak nyata baik terhadap *S. aureus* maupun terhadap *B. cereus*. Uji lanjut Duncan memperlihatkan perlakuan yang memberikan pengaruh yang paling besar dari kedua BAL yang digunakan adalah *L. acidophilus* dengan masa inkubasi 3 x 24 jam senilai 8,66 mm.

B. Saran

Pada penelitian ini daya hambat yang dihasilkan relatif kecil, sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan bakteri patogen lainnya ataupun dengan metode lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams MR and Moss MO. 2008. *Food Microbiology. Third Edition. University of Surrey, Guildford, UK. The Royal Society of Chemistry.*
- Adetunji, dkk. 2007. *Bacteriocin and Cellulose Production by Lactic Acid Bacteria Isolated.* African Journal of Biotechnology, Vol. 6 (22), pp. 2616-2619.
- Afrianto, E., dkk. 1989. *Pengawetan dan Pengolahan Ikan.* Kanisius. Yogyakarta.
- Ahmad, Yusuf Al-Hajj. 2010. *Ensiklopedia Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-qur'an dan Sunah.* PT Kharisma Ilmu. Jakarta.
- ASMCUE. 2005. *Gram Stain: Gram-Positive Rods.* <http://www.microbelibrary.org/whatsnew/index.asp> (05 Februari 2014).
- Axelsson, L. 2004. *Lactic acid bacteria: classification and physiology.* In: Salminen, S., A. V. Wright and A. Ouwehand (editors). *Lactic Acid Bacteria Microbiological and Functional Aspects. 3rd Edition, Revised and Expanded.* Marcel Dekker, Inc., New York.
- Bernett M-F, Brassart D, Neeser J-R, and Servin AL. 1997. *Adhesion of Human Bifidobacterial Strains to Cultured Human Intestinal Epithelial Cells and Inhibition of Enteropathogen-cell Interactions.* Appl. Environ. Microbiol. 59(12) : 2124-2128.
- Blakely, J and D. H. Blade. 1991. *Ilmu Peternakan, Edisi ke-4.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Brooks, G. F., J.S. Butel, and L.N Ornston. 1995. *Medical Microbiology. 4th ed.* Connecticut: appleton & Lange Simon & Schuster Company, p. 197-202.
- Buchanan & N. E. Gibbons. 1993. *Bergey's Manual Of Determinative Bacteriology Eighth Edition.* The Williams & Wilkins Company / Baltimore. Philadelphia.
- Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library. 2001. *Staphylococcus aureus.* <http://en.wikipedia.org/wiki/CentersforDiseaseControlandPrevention> (05 Februari 2014).
- Corbis Corporation. 2014. *Beneficial Intestinal Bacteria Lactobacillus fermentum.* <http://www.corbisimage.com/stock-photo/rights-managed/42-15331707/beneficial-intestine-bacteria-lactobacillus-fermentum> (05 Februari 2014).

- Delgado, A., D. Brito., P. Fevereiro., C. Peres dan J. F. Marques. 2001. *Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum isolated from a traditional lactic acid fermentation of table olive*. EDP. Sciences. 81: 203215.
- Elida, M. 2002. Profil Bakteri Asam Laktat dari Dadih yang Difermentasi dalam Berbagai Jenis Bambu dan Potensinya Sebagai Probiotik. *Thesis*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Evanikastri. 2003. Isolasi dan karakterisasi Bakteri Asam Laktat dari Sampel Klinis yang Berpotensi Sebagai Probiotik. *Thesis*. Program Studi Ilmu Pangan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Fardiaz, S. 1992. *Mikrobiologi Pangan 1*. P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fatmawati. 2013. Potensi Isolat Bakteri Asam Laktat Yang Diisolasi Dari Dangke Sebagai Probiotik Berdasarkan Toleransi Ph Rendah. *Skripsi*. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Tekhnologi UIN Alauddin. Makassar.
- Fahrizal. 2012. Alqur'an Sains dan Ilmu Pengetahuan. <http://fahrismarter.blogspot.com/2012/03/al-quran-sains-dan-ilmu-pengetahuan.html>. (20 November 2013).
- Frazier, W. C dan D. C. Westhoff. 1988. *Food Microbiology. 4th Edition*. Mc Graw-Hill International Edition.
- FAO/WHO. 2002. *Joint FAO/WHO Working Group Report on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food*. London.
- Fuller, R. 1992. *History and Development of Probiotik*. In *Probiotik The scientific Basic*. New york: Chapman and Hall.
- Gildberg A, Mikkelsen H, Sandaker E, Ringø E. 1997. *Probiotic effect of lactic acid bacteria in the feed on growth and survival of fry of Atlantic cod (Gadus morhua)* *Hydrobiologia*. 352:279-285.
- Gotcheva V, Hristozova E, Hristozova T, Guo M, Roshkova Z, Angelov A. 2002. *Assessment of potential probiotic properties of lactic acid bacteria and yeast strains*. *Food Biotechnol*. 16:211-225.
- Goktepe, I., Juneja, V. K. & Ahmeda, M. 2006. *Probiotics in Food Safety and Human Health*. CRC Press Taylor and Francis Group, London.
- Granato, D., G. F. Branco, A. G. Cruz, J. D. A. F. Faria, and N. P. Shah. 2010. *Probiotic Dairy Products as Functional Foods*. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* 9: 455–470.

- Hardiningsih, Napitupulu. N., T. Yulinery. 2004. *Pengaruh Lama Penyimpanan Suhu dan Media Terhadap Kemampuan Antibakteri yang Dihasilkan Lactobacillus dalam Menghambat Pertumbuhan Beberapa Patogen*. Pusat Penelitian Biologi LIPI. Bogor.
- Harimurti, Sri. 2007. *Bakteri Asam Laktat dari Intestine Ayam Sebagai Agenia Probiotik*. Fakultas Peternakan Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.
- Hart, H., Craine, L. E., dan Hart, D. J. 2003. *Kimia Organik : Suatu Kuliah Singkat*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hatta, Wahniyathi. 2013. Survei Potensi Pengembangan Dangke Susu Sapi Sebagai Alternatif Dangke Susu Kerbau di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Helander, I. M., A. von Wright and T. M. Mattila-Sandholm. 1997. *Potential of lactic acid bacteria and novel antimicrobial against Gram negative bacteria*. Trends in Food Sci. and Technol. 8.
- Hemmes, D., Galer. W., Winters. D.A., Foucand. C & Vogel R. F. 2006. *Expression of Lactobacillus casei ATCC 393 β -galactosidase endoded by Plasmid PLZ15 in Lactococcus lactis CNRZ1123*. Lett Appl Microbiol. Medline.
- Holbrook, R., Judith M. Anderson. 1980. *An Improved Selective and Diagnostic Medium for the Isolation and Enumeration of Bacillus cereus in Foods*.
- Holzapfel, W. H. and U. Schillinger. 2002. *Introduction to pre- and probiotics*. Food Res. Int. 35: 109-116.
- Hough, Edward, dkk. 1989. *High-Rsolution (1,5 A) Crystal Structure of Phospolipase C from Bacillus cereus*.
- Ihsan, Muhammad. Al-qur'an Tafsir. [http://user6.nofeehost.com//al-quran online /Alquran.Tafsir.asp](http://user6.nofeehost.com//al-quran%20online/Alquran.Tafsir.asp). (10 Juli 2014).
- Infectious Disease Epidemiology Section Office of Public Health. 2012. Louisiana Dept of Health & Hospital. www.oph.dhh.state.la.us (05 Februari 2014)
- Isyana, Fitrah. 2012. Studi Tingkat Higiene dan Cemaran Bakteri Salmonella sp pada Pembuatan Dangke Susu Sapi di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. *Skripsi* Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Janson S. 2005. Lactic Acid Bacteria in Silage-Growth, Antibacterial Activity and Antibiotic Resistance. *Thesis*. Departement of Microbiology Swedish Univercity of Agricultural Sciences. Swedia.
- Januarsyah, T. 2007. *Kajian Aktivitas Hambat Bakteriosin Dari Bakteri Asam Laktat Galur SCG 1223*. Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Jawetz, E., J.L. Melnick., E.A Adelberg., G.F. Brooks., J.S. Butel., dan L.N. Ornston. 1995. *Mikrobiologi Kedokteran Edisi Ke 20* (Alih bahasa : Nugroho & R.F. Maulany). Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. Hal. 211, 213, 125.
- Jung, M. Y dan H. D. Faik. 2000. *Identification and partial charateristization of lacticin JW3, a bacteriocin produced by Lactococcus lactis JW3 isolate from commercial Swiss cheese produce*. Food Sci. Biotechnol. 9 : 116-123.
- Kementerian Agama Republik Indonesia *Alqur'an dan Terjemahnya*. 2006. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kim, C. H., G. E. Ji dan C. Ahn. 2000. *Purification and molecular characterization of a bacteriocin from Pediococcus sp. KCA 2386 isolated from white khimchi*. Food Sci. Biotechnol. 9 : 270-276.
- Ko, S. H dan C. Ahn. 2000. *Bacteriocin produced by Lactococcus lactis KCA 2386 isolated from white khimchi*. Food Sci. Biotechnol. 9 : 263-269.
- Komariah, Siti. 2008. *Aplikasi Substrat Anti Mikroba dari Lactobacillus fermentum 2B4 Sebagai Biopreservatif pada Daging Sapi Iris Selama Penyimpanan Dingin. Skripsi*. Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kusmiati, Malik Amarila. 2002. *Aktivitas Bakteriosin dari Bakteri *Leocoenococcus mesenteroides pbac1* pada Berbagai Media*. Makara kesehatan, Vol. 6, No.1.
- Kusumawati, N. 2002. *Seleksi Bakteri asam Laktat Indigenous Sebagai Galur Probiotik dengan Kemampuan Mempertahankan Keseimbangan Mikroflora Usus Fese dan Mereduksi Kolesterol Serum darah Tikus*. *Thesis*. Program Studi Ilmu Pangan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Lampert, L.M. 1975. *Modern Dairy Product*. Chemical Publishing Company, Inc., New York.

- Lestari, D. 2008. Pengaruh Penambahan Bakteri Asam Laktat (*Lactobacillus casei* fucc 0090) pada Proses Vinifikasi dari Substrat Sari Buah Salak (*Salacca zalacca*). *Undergraduate Thesis*. Duta Wacana Christian University. Retrived from <http://sinta.ukdw.ac.id>.
- Marzoeki, A. 1978. *Penulisan Peningkatan Mutu Dangke*. Departemen Perindustrian. Balai Penulisan Kimia, Ujung Pandang.
- McKane, L and J. Kandel. 1985. *Microbioly : Esensial and Aplication*. Ney York : McGraw-Hill Book Company.
- Muhammad, Munsir. 2012. *Dangke, Bioteknologi dari Tanah Enrekang*. <http://biologi-news.blogspot.com/2012/01/dangke-bioteknologi-dari-tanah.html>. (05 Februari 2014).
- Paramita Sari, Dewi. 2013. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri pada Dangke Susu Sapi dari Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin. Makassar.
- Pelczar, M. J. 2007. *Microbiology*. Mc Graww-Hill Book Company. Inc. New York.
- Permanasari, Ratih. 2008. Karakterisasi Substrat Antimikroba Bakteri asam Laktat Hasil Isolasi dari Daging Sapi dan Aktivitas Antagonistiknya Terhadap Bakteri Patogen. *Skripsi*. Pertanian Bogor. Bogor.
- PR Science. 2014. *Lactobacillus acidophilus*. <http://www.visualphotos.com /image/1x3745780/lactobacillusacidophilus>. (05 Februari 2014).
- Prado, F. C., J. L. Parada, A. Pandey, and C. R. Soccol. 2008. *Trends in non-dairy probiotic beverages*. Food Res. Int. 41: 111-123.
- Praja, Denny Indra. 2011. *The Miracle of Probiotics*. Diva Jakarta.
- Pratiwi, Sylvia T. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta. Erlangga.
- Rahim, Abdul dkk. 1994. *Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran Edisi Revisi*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Ray B. 2004. *Fundamental Food Microbiology. Third Edition*. published in the Taylor & Francis e-Library.
- Ryan, K.J. J.J. Champoux, S. Falkow, J.J. Plonde, W.L. Drew, F.C. Neidhardt, and C.G. Roy. 1994. *Medical Microbiology An Introduction to Infectious Disease 3rded*. Connecticut: Appleton & larga. P. 254.
- Salminen, S., Wright, A.V., Ouwehand, A. 2004. *Lactic Acid Bacteria: Microbiology and Functional Aspects*.

- Sarkono., Fatturahman., & Yayan Sofyan. 2010. *Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Abalone (*Halictis asamina*) as a Potential Candidate of Probiotic*. Bio Science. Nusa Tenggara Indonesia.
- Savadogo, A., A. T. Q. Cheik, H. N. B. Imael and S. A. Traore. 2006. *Bacteriocins and lactic acid bacteria – a minireview*. *Afric. J. Biotechnol.* 5 (9): 678-683.
- Schenectady County Community College. *Staphylococcus aureus dan S. epidermis*. <http://www.sunysccc.edu/academic/mst/microbes/13saure.htm>. (6 Februari 2014).
- Senok, A. C. 2009. *Probiotics in the Arabian Gulf Region. Food & Nutrition Research*. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2651754/pdf/FNR-53-1842.pdf>. (2 Juni 2014).
- Sentra Informasi Keracunan Nasional. 2008. Badan POM.
- Shortt C. 1999. *The Probiotics century: historical and current perspective*. *Trends Food Science Food Technology* 10:441-417.
- Smid, E. J. and L. G. M. Gorris. 2007. *Natural antimicrobials for food preservation*. In: Rahman, M. S. (editor). *Handbook of Food Preservation. 2nd Edition*. CRC Press, New York.
- Soemarno. 2000. *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Klinik*. Akademi Analisis Kesehatan. Yogyakarta.
- Sun, YZ., H. L. Yang, R. L. Ma & M. Y. Lin. 2010. *Probiotic Application of Two Dominant gut Bacillus Strains with Antagonistic Activity Improved the Growth Performance and Immune Responses of Grouper *Epinephelus coloides**. *Fish & Shellfish Immunology*.
- Surono, I. 2004. *Probiotik, Susu Fermentasi dan Kesehatan*. Tri Cipta Karya, Jakarta.
- Todar, Kenneth. 2012. *Basillus cereus Food Poisoning*. <http://translate.google.co.id/http://textbookbacteriology.net/B.cereus.htm>. (10 Juli 2014).
- Ulfah, Annaisa. 2013. <http://keperawatanreligionannisaulfah.wordpress.com/> (28 November 2013).
- Vine, Niall G., Winston D. Leukes., Horst Kaiser. 2004. *In vitro Growth Characteristic of Five Candidate Aquaculture Probiotics and Two Fish*

Pathogens Grown in Fish Intestinal Mucus. FEMS Microbiology Letters. www.fems-microbiology.org.

- Vuyst, L. D. and E. J. Vandamme. 1994. *Lactic acid bacteria and bacteriocins: their practical importance*. In: Vuyst, L. D. and E. J. Vandamme (editors). *Bacteriocins of Lactic Acid Bacteria*. Microbiology, Genetic and Application. Blakie Academic and Profesional, London.
- Wahdiniar, Andi. 2013. *Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Dangka Susu Kerbau Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin. Makassar.
- Warsa, dkk. 1994. *Kokus Positif Gram dalam Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran Edisi Revisi*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Watson, A. K., H. Kaspar, M. J. Lategan & L. Gibson. 2008. *Probiotic in aquaculture : The Need Principles and Mechanisms of Action and Screaning Processes*. Aquaculture. 274.
- Widiasih, T. 2008. *Aktivitas substrat antimikroba bakteri asam laktat yang diisolasi dari daging terhadap bakteri patogen*. Skripsi. Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Wijayanto, Umar. 2009. *Analisi in vitro Toleransi Isolat Bakteri Asam Laktat Asal Daging Sapi Terhadap pH Lambung, pH Usus dan Garam Empedu Sebagai kandidat Probiotik*. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Winarno. 1993. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gramedia. Jakarta.
- Wirawati, C. U. 2002. *Potensi Bakteri Asam Laktat yang Diisolasi dari Tempoyak Sebagai Probiotik*. Thesis. Program Studi Ilmu Pangan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sylvia Indriani, lahir di Mamuju tepatnya di Tobadak II pada tanggal 05 April 1993, anak pertama dari 2 bersaudara, buah cinta dari pasangan Suroto dan Tarmayani. Penyusun menempuh pendidikan formal pada tahun 1998-2004 di SD. Inpres Mahahe. Pada tahun 2004-2007 penyusun melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SMP

Pesantren Pondok Madinah Makassar, kemudian dilanjutkan ke tingkat pendidikan menengah atas pada tahun 2007-2008 di SMA. Negeri 21 Makassar kemudian dilanjutkan di SMA. Negeri 01 Mamuju. Pada tahun 2010 penyusun melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN dan akhirnya lulus di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Berkat rahmat Allah SWT dan diiringi do'a dari kedua orang tua, perjuangan panjang penyusun dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat berhasil dan dalam waktu kurang dari 4 tahun dan akhirnya memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Semoga segala ilmu yang telah diperoleh dan dimiliki dapat bermanfaat bagi bangsa dan agama serta dapat dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Amin.....