

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “R”
GESTASI 37-38 MINGGU DENGAN KETUBAN PECAH DINI (KPD)
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

OLEH :

SUNARTI

NIM: 70400114054

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarti
NIM : 70400114054
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 07 April 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Graha Cipta Hertasning Blok B No.1
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "R"
Gestasi 37-38 minggu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di
RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2017



Sunarti
NIM: 70400114054

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Sunarti
Nim : 70400114054
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "R" Gestasi 37-38 minggu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.Si.T., M.Keb


dr. Miswani Mukani., M.Kes

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "R" Gestasi 37-38 minggu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017", yang disusun oleh **Sunarti** NIM: 70400114054, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 18 Agustus 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 18 Agustus 2017 M
25 Dzul Qaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT, M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Anieq Mumthiah Alkautsar, S.SiT, M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes** (.....)

Penguji I : **dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH** (.....)

Penguji II : **Dr. Wahyuddin G, M.Ag** (.....)

Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat Meneyelesaikan proposal KTI ini yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “R” gestasi 37-38 minggu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa” dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Sembah sujudku kepada kedua orang tuaku tercinta yang tiada hentinya selalu memberi do’a dan dukungan kepada saya, ayahanda H. Basir dan ibunda Fatmawati.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
4. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan

5. Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb selaku pembimbing I yang senangtiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas.
6. Ibu dr Miswani Mukani Syuaib M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbingku dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibu dr Nurhira Abdul Kadir MPH, selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, member kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Bapak ustadz Dr. Wahyuddin G. M.Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
9. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar
10. Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
11. Kakanda Tri TiasTari Nur S.Kom yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
12. Kepada sahabatku tercinta Geni Liskantari, Ratika, Nirwana, Nurhikma, Nurhaeratih, Hasrianah dan Nurjannah A.

13. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2014.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Innamal a’maalu bin niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakillah khair semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Sunarti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang.....	1
B. Ruanglingkup.....	6
C. Tujuanpenulisan.....	6
D. Manfaatpenulisan.....	7
E. Metodepenelitian.....	8
F. Sistematikapenulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauanumumtentangpersalinan.....	11
1. Asuhankebidananpadapersalinan	11
2. Sebab-sebabmulainyapersalinan.....	14
3. Tahap-tahappersalinan.....	15
4. Tanda-tandapersalinan.....	17
5. Faktor-faktor yang mempengaruhipersalinan.....	18

B. Tinjauankhusustentang KPD.....	21
1. Pengertian KPD.....	21
2. Insiden KPD.....	22
3. Etiologi KPD.....	22
4. Mekanismepecahnyaselaputketuban.....	24
5. Tandadangejala KPD.....	25
6. Penilaianklinis KPD.....	26
7. Diagnosis KPD.....	27
8. Pemeriksaanpenunjang KPD.....	28
9. Prognosis/ komplikasi KPD.....	28
10. Penatalaksanaan KPD.....	29
C. Tinjauanumum KPD menurutpandanganislam.....	33
D. Teorimanajemenkebidanan.....	36

BAB III STUDI KASUS

KALA I	43
Langkah I. Identifikasi data dasar.....	43
Langkah II. Identifikasidiagnosa/ masalahaktual.....	54
Langkah III. Identifikasidiagnosa/ masalahpotensial.....	60
Langkah IV. Tindakansegera/ kolaborasi.....	62
Langkah V. Rencanatindakan.....	62
Langkah VI. Tindakanasuhankebidanan.....	66
Langkah VII. Evaluasiasuhankebidanan.....	69


KALA II	70
Langkah I. Identifikasi data dasar.....	70
Langkah II. Identifikasidiagnosa/ masalahaktual.....	71
Langkah III. Identifikasidiagnosa/ masalahpotensial.....	72
Langkah IV. Tindakansegera/ kolaborasi.....	72
Langkah V. Rencanatindakan	72
Langkah VI. Tindakanasuhankebidanan.....	77
Langkah VII. Evaluasiasuhankebidanan.....	82
KALA III	82
Langkah I. Identifikasi data dasar.....	82
Langkah II. Identifikasidiagnosa/ masalahaktual.....	83
Langkah III. Identifikasidiagnosa/ masalahpotensial.....	83
Langkah IV. Tindakansegera/ kolaborasi.....	83
Langkah V. Rencanatindakan	84
Langkah VI. Tindakanasuhankebidanan.....	88
Langkah VII. Evaluasiasuhankebidanan.....	90
KALA IV	91
Langkah I. Identifikasi data dasar.....	91
Langkah II. Identifikasidiagnosa/ masalahaktual.....	91
Langkah III. Identifikasidiagnosa/ masalahpotensial.....	91
Langkah IV. Tindakansegera/ kolaborasi.....	92
Langkah V. Rencanatindakan	92
Langkah VI. Tindakanasuhankebidanan.....	94

Langkah VII. Evaluasi suhankebidanan.....	97
BAB IV PEMBAHASAN.....	128
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel1 :	Riwayatkehamilandanpersalinan yang lalu.....	45
Tabel2:	Observasitanda-tanda vital, denyutjantungjaningan his.....	64
Tabel3:	Evaluasidanestimasijumlahkehilangandarah.....	92
Table 4:	Tanda-tanda vital pascapersalinan.....	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Perubahankeadaanserviks.....	23
Gambar2 :	Penatalaksanaan KPD.....	32



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2017

SUNARTI, 70400114054

Pembimbing I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Pembimbing II : Miswani Mukani Syuaib

“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “R” Gestasi 37-38 Minggu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017”

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm. Bila terjadi KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu, disebut KPD pada kehamilan prematur. Dalam keadaan normal, 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami KPD.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny “R” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “R” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) yakni tidak ditemukannya kendala dalam menangani masalah dengan Ketuban Pecah Dini (KPD). Dalam penatalaksanaan masalah Ketuban Pecah Dini pada Ny “R” dilakukan pemasangan infus Ringer Laktat per IV 28 tetes permenit untuk mengganti cairan yang hilang selama persalinan, pemasangan misoprostol pervaginam 1/8 tablet untuk membantu pematangan serviks dan pemberian injeksi cefotaxime 1 gram untuk mencegah terjadinya infeksi, serta dilakukannya pemantauan dan asuhan dari kala I sampai kala IV.

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yakni dari kala I hingga kala IV semuanya berlangsung normal tanpa ada penyulit, tidak ditemukannya komplikasi atau masalah pada janin dan ibu, serta keadaan ibu dan bayi baik yang ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.

KATA KUNCI : Ketuban Pecah Dini (KPD), 7 langkah varney.

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, JULY 2017

SUNARTI, 70400114054

Supervisor I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Supervisor II : Miswani Mukani Syuaib

"Intranatal Midwifery Care Management on Mrs. "R" Gestation 37-38 Weeks with Early Rupture of Membranes (KPD) at Syekh Yusuf Regional Hospital of Gowa in 2017"

Early Rupture of Membranes (KPD) is a rupture of membranes before *inpartu* that is when the opening of the cervix in *primipara* less than 3 cm and in *multipara* less than 5 cm. When a KPD occurs before 37 weeks' pregnancy, it is called KPD in premature pregnancy. Under normal circumstances, 8-10% of pregnant women will experience KPD.

This scientific paper is aimed at implementing the Midwifery Care Management on Mrs. "R" with Early Rupture of Membranes (KPD) at Syekh Yusuf Regional Hospital of Gowa in 2017 using a 7-step midwifery care management approach according to Helen Varney and documentation in the form of SOAP.

The results of the case study applied to Mrs. "R" with Early Rupture of Membranes (KPD) i.e. no obstacles in dealing with problems with Early Rupture of Membranes (KPD). In the management of the premature rupture problem on Mrs. "R" an infusion of Ringer Lactate per IV 28 drops per minute to replace the lost fluid during labor, venous misoprostol insertion of 1/8 tablet to assist cervical ripening and cefotaxime injection of 1 gram to prevent infection, as well as monitoring and upbringing from stage I to IV.

The conclusions of the case study with the management of 7 Varney steps and documentation in the form of SOAP i.e. from stage I to IV are all normal with no complications, no complications or problems to the fetus and mother, and the state of the mother and baby both marked with signs, vital signs within normal limits.

KEY WORDS: Early Rupture of Membranes (KPD), 7 Varney steps



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan masalah penting dalam obstetrik berkaitan dengan penyulit kelahiran prematur dan komplikasi infeksi korioamnionitis hingga sepsis yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal dan menyebabkan infeksi ibu (Yaze dan Dewi, 2016 :76). Pecahnya selaput janin bisa terjadi bila leher rahim tertutup atau melebar. Terkadang hal itu bisa terjadi pada kehamilan yang sangat awal (sebelum 28 minggu) atau pada trimester ketiga (antara 28 minggu dan 34 minggu). Faktor risiko yang sangat terkait dengan PROM yaitu infeksi, *malpresentation* dari *fetus*, *multiple pregnancy and excess amniotic fluid*, *servical incompetence*, trauma Abdomen (Gahwagi, 2015 :495).

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012), memperlihatkan bahwa 54% dari kelahiran tidak mengalami komplikasi selama persalinan. Wanita yang mengalami persalinan lama dilaporkan sebesar 35% kelahiran, KPD lebih dari 6 jam sebelum kelahiran dialami oleh 15% kelahiran, perdarahan berlebihan sebesar 8% persen, dan demam sebesar 8%. Komplikasi lainnya dan kejang dialami juga pada saat persalinan (masing-masing 5 dan 2%). Sementara itu, partus lama dan perdarahan merupakan dampak yang bisa ditimbulkan oleh KPD (SDKI, 2012 : 131-132).

Sementara itu, menurut penelitian Yaze dan Dewi (2016), insidensi KPD terjadi 10% pada semua kehamilan. Pada kehamilan aterm insidensinya bervariasi 6-19%, sedangkan pada kehamilan preterm insidensinya 2% dari semua kehamilan. Hampir semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput ketuban pecah. 70% KPD terjadi pada kehamilan cukup bulan.

Sekitar 85% morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan oleh prematuritas. KPD berhubungan dengan penyebab kejadian prematuritas dengan insidensi 30-40% (Yaze dan Dewi, 2016 :76).

Pada umumnya kehamilan dan persalinan memiliki resiko bagi ibu maupun janin. Pada kasus KPD komplikasi yang dapat terjadi yaitu infeksi dalam persalinan, infeksi masa nifas, partus lama, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* atau *secsio sesarea* (SC), atau akan mengarah ke morbiditas dan mortalitas ibu, selain KPD dapat memberi dampak buruk bagi ibu, KPD juga dapat memberi resiko pada janin yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematur, perdarahan intraventrikular, *enterocolitis necrotizing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, *prolaps funiculli* / penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, prolaps uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan sebagaimana tercantum dalam program pemerintah nasional serta strategi *Making Pregnancy Safer* (MPS) atau kehamilan yang aman sebagai kelanjutan dari program *Safe Motherhood* dengan tujuan untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir (Arifin, 2015 :1).

Kematian ibu pada saat ini masih menjadi masalah kesehatan reproduksi yang sangat penting di Indonesia. Indikator kesehatan yang menggambarkan tingkat kesehatan ibu dan anak adalah AKI dan AKB. Disamping itu AKI merupakan tolak ukur untuk menilai keadaan pelayanan obstetrik di suatu negara. Bila AKI masih tinggi, berarti system pelayanan obstetrik belum sempurna, sehingga memerlukan perbaikan (KEMENKES, 2015)

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO), AKI di dunia masih tinggi, dan Indonesia berada di posisi teratas dengan jumlah kematian ibu tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. AKI di dunia tahun 2014 yaitu 289.000 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa negara memiliki AKI cukup tinggi seperti Afrika Sub-Saharan 179.000 jiwa, Asia Selatan 69.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. AKI di negara-negara Asia Tenggara dimana Indonesia yaitu 190 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 49 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 26 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, AKI di Indonesia pada tahun 2012 meningkat tajam menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan milenium dalam target MDGs pada 2015 adalah AKI dapat diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Namun berdasarkan data yang didapat, AKI pada tahun 2015 sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini sangat jauh dari target MDGs. (KEMENKES, 2015: 104).

Di Sulawesi Selatan jumlah kematian ibu yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2012 jumlah kematian ibu sebanyak 160 orang atau 110,26 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 115 orang atau 78.38 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 138 orang atau 93.20 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2011 sebanyak 868 bayi atau 5.90 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.056 bayi atau 7.23 per 1000 kelahiran hidup, dengan penyebab utama kematian adalah perdarahan, infeksi, hipertensi, *preeklampsi-eklampsi*, abortus, dan partus lama (Profil Kesehatan Sulsel, 2014: 19-27).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, AKI dan AKB mengalami penurunan, yaitu AKI pada tahun 2012 sebanyak 12 orang atau 106,53 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 menurun menjadi 10 orang atau 80 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 sebanyak 3 orang atau 24 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2012 sebanyak 57 bayi atau 4,5 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 menurun

menjadi 17 bayi atau 1 per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 sebanyak 10 bayi atau 1 per 1.000 kelahiran hidup (Dinkes Kabupaten Gowa, 2014: 25-29).

Peran bidan dalam penanganan KPD dengan memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin secara tepat, cepat dan komprehensif, karena jika ibu bersalin dengan KPD tidak mendapat asuhan yang sesuai, maka resikonya akan berakibat pada ibu maupun janin. Dengan harapan setelah dilakukannya asuhan kebidanan yang cepat dan tepat, maka kasus ibu bersalin dengan KPD dapat di tangani dengan baik, sehingga AKI di Indonesia dapat dikurangi.

Berdasarkan data rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, pada tahun 2012 angka kejadian KPD di ruangan bersalin sebanyak 26 kasus dari 1973 ibu yang melahirkan, pada tahun 2013 sebanyak 40 kasus dari 1928 ibu yang melahirkan, pada tahun 2014 sebanyak 25 kasus dari 1956 ibu yang melahirkan, pada tahun 2015 sebanyak 27 kasus dari 1804 ibu yang melahirkan dan pada tahun 2016 sebanyak 3 kasus dari 1578 ibu yang melahirkan. Selain itu, angka kejadian KPD di RSUD Syekh Yusuf Gowa merupakan peringkat kelima dari kasus patologi yang ada di kamar bersalin RSUD Syekh Yusuf Gowa. Urutan peringkat tersebut yaitu: perdarahan, abortus, *preeklamsi*, *serotinus*, KPD, plasenta *previa*, persalinan *preterm*, dan *molahidatidosa*.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa” pada tahun 2017”.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini adalah manajemen asuhan kebidanan dengan KPD di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan manajemen asuhan kebidanan dengan KPD di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017 dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi atau wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukannya pengumpulan data pada ibu bersalin dengan KPD di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017.
- b. Dirumuskannya interpretasi data pada ibu bersalin dengan KPD di RSUD Kabupaten Gowa tahun 2017.
- c. Diidentifikasikannya diagnosis potensial pada ibu bersalin dengan KPD di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017.
- d. Dilakukannya antisipasi penanganan segera pada ibu bersalin dengan KPD di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017.
- e. Disusun rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017.
- f. Dilaksanakannya asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan pada ibu bersalin dengan KPD di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017.

- g. Dievaluasikannya asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu bersalin dengan KPD di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017.
- h. Dilakukannya pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada kasus KPD di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2017.
- i. Didiskusikannya kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan dilahan
- j. Diintegrasikannya nilai-nilai keislaman kepada pasien dengan kasus KPD

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir di jenjang pendidikan Program Diploma tiga Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

2. Manfaat Instansi

Memberikan informasi dan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang faktor yang berhubungan dengan KPD.

4. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan ilmiah atau bahan bacaan untuk penulisan berikutnya.

E. Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode :

1. Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku literatur dan mengambil data-data dari internet, antara lain: membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan dengan KPD, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah Varney yaitu: identifikasi dan analisa data dasar, identifikasi diagnosis/ masalah aktual, antisipasi diagnosa/ masalah potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan tehnik:

a. Anamnesa/ wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien dan suami maupun keluarganya, bidan, dokter di kamar bersalin yang dapat membantu dan memberikan keterangan atau info yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan kebidanan

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah, sedangkan lenek digunakan untuk mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial dilakukan meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami, serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing, baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk melancarkan penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari bab 1 sampai bab IV, yaitu: pada bab I terdiri dari pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Pada bab II terdiri dari tinjauan teori, akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang asuhan kebidanan dan persalinan, tinjauan khusus tentang KPD, tinjauan umum KPD menurut pandangan Islam, proses manajemen asuhan kebidanan, serta pendokumentasian asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP.

Selanjutnya, pada bab III yaitu studi kasus yang akan menguraikan tentang 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosis/ masalah aktual, identifikasi diagnosis/ masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/ intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Pada bab IV terdiri dari pembahasan yang akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan ibu dengan KPD.

Terakhir yaitu bab V, yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, yang memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Asuhan Kebidanan pada Persalinan

a. Pengertian Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan (Yulifah, 2014 : 56). Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi, kegiatan, dan tanggung jawab bidan dalam pelayanan yang diberikan kepada klien/ atau masalah kebidanan (kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi wanita, dan pelayanan kesehatan (Soepardan, 2008 : 5).

Tujuan asuhan kebidanan adalah menjamin kepuasan dan keselamatan ibu dan bayinya sepanjang siklus reproduksi, mewujudkan keluarga bahagia dan berkualitas melalui pemberdayaan perempuan dan keluarganya dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Keberhasilan tujuan asuhan kebidanan antara lain dipengaruhi oleh adanya keterkaitan penerapan masing-masing komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan asuhan, baik dari pemberi asuhan, maupun penerima asuhan (Soepardan, 2008 : 5-6).

b. Persalinan

1) Pengertian

Ada beberapa pengertian persalinan, yaitu persalinan dapat didefinisikan secara medis sebagai kontraksi uterus yang teratur dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi serviks di sepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir melawan resistansi jaringan lunak, otot, dan struktur tulang panggul (Kennedy dkk, 2013:2). Sumber lain mengemukakan bahwa persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Kuswanti dan Melina, 2014:1). Kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial bagi ibu dan keluarga (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 3).

Firman Allah dalam Q.S Fatir/35 : 11.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
 وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

“ Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (*lawh Mahfuz*). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013).

Ayat tersebut merupakan lanjutan dari pembuktian tentang kuasa Allah yang membangkitkan manusia. Di sini dinyatakan, setelah sebelumnya menegaskan kuasa Allah mengirimkan angin, lalu ia menggerakkan bahwa: *Dan*, disamping hal tersebut menjadi bukti kuasa-Nya. *Allah menciptakan* asal usul kamu, yakni Adam as, *dari tanah kemudian* menciptakan kamu semua *dari sperma* yang asal usulnya pun bersumber antara lain dari makanan yang dihasilkan oleh tanah, *kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan* laki-laki dan perempuan *dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung janin dan tidak pula melahirkan anak melainkan dengan seizin dan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan tercatat dalam Kitab Lauh Mahfuz atau pengetahuan Allah. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah* (Shihab, 2002 : 30).

Selain itu Allah juga menegaskan di dalam Q.S An-Nahl/16 : 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

Terjemahnya :

“Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013).

Ayat ini menyatakan: *Dan sebagaimana Allah mengeluarkan kamu* berdasar kuasa dan ilmu-Nya *dari perut ibu-ibu kamu* sedang tadinya kamu tidak wujud, demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan

menghidupkan kamu kembali. Ketika Dia mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu, kamu semua *dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun* yang ada disekelilingmu dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan-penglihatan, dan aneka hati, sebagai bekal dan alat-alat untuk untuk meraih pengetahuan *agar kamu bersyukur* dengan menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada kamu (Shihab, 2002 : 672).

2) Sebab-sebab mulainya persalinan

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti, sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulainya kekuatan his atau kontraksi yang merupakan awal dari mulai terjadinya persalinan.

Teori tersebut antara lain:

a) Teori penurunan hormon

Satu sampai dua minggu sebelum persalinan terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron. Progesteron mengakibatkan relaksasi otot-otot rahim, sedangkan estrogen meningkatkan kerentanan otot-otot rahim. Selama kehamilan terjadi keseimbangan antara kadar estrogen dan progesteron, tetapi akhir kehamilan terjadi penurunan kadar progesteron sehingga timbul his.

b) Teori distensi rahim

Rahim yang menjadi besar dan meregang akan menyebabkan iskemik otot-otot rahim sehingga timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya.

c) Teori iritasi mekanik

Di belakang serviks terletak ganglion servikalis, bila ganglion ini ditekan oleh kepala janin, maka akan timbul kontraksi uterus.

d) Teori plasenta menjadi tua

Akibat plasenta tua, menyebabkan turunnya kadar progesteron yang menyebabkan ketegangan pada pembuluh darah, hal ini menimbulkan kontraksi rahim.

e) Teori prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua menjadi sebab permulaan persalinan karena menyebabkan kontraksi pada miometrium pada setiap umur kehamilan.

f) Teori *oxytocin*

Pada akhir kehamilan kadar *oxytocin* bertambah, oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot rahim (Kuswanti dan Melina, 2014 :3-4).

3) Tahap-tahap persalinan

Tahap-tahap pada persalinan dibagi menjadi 4 kala yaitu:

a) Kala 1 (kala pembukaan)

Inpartu ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah atau *blood show*, karena serviks mulai membuka atau dilatasi dan menipis (*effacement*). Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler kanalis servikalis karena pergeseran ketika serviks mendatar dan membuka.

Kala pembukaan dibagi atas 2 fase yaitu :

(1) Fase laten

Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Fase laten berlangsung lambat dari pembukaan 1-3 cm, lamanya 7-8 jam.

(2) Fase aktif

Fase ini berlangsung selama 6 jam, dan dibagi atas 3 sub fase :

- (a) Periode akselerasi : berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.
 - (b) Periode dilatasi maksimal atau *steady* : selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.
 - (c) Periode deselerasi : berlangsung lambat, waktu 2 jam, pembukaan jadi 10 cm atau lengkap.
- b) Kala II atau kala pengeluaran janin

Pada pengeluaran janin, his terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan otot dasar panggul yang secara reflekstoris menimbulkan mendedan. Karena tekanan pada rektum, ibu merasa seperti mau buang air besar, dengan tanda anus terbuka pada waktu his, kepala janin mulai kelihatan. Vulva membuka dan perineum menegang dengan his, mendedan yang terpimpin akan lahirlah kepala, diikuti oleh seluruh badan janin. Kala II pada primi $1\frac{1}{2}$ -2 jam dan pada multi $\frac{1}{2}$ -1 jam (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 4).

- c) Kala III atau kala pengeluaran uri

Setelah bayi lahir, kontraksi rahim istirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat dan berisi plasenta yang tebal 2 kali sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit seluruh plasenta terlepas, terdorong kedalam vagina dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri seluruh proses biasanya berlangsung 5-10 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 4).

d) Kala IV atau kala pengawasan

Kala selama 1 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap bahaya perdarahan post partum (Mochtar, 2002). Pada saat proses persalinan berlangsung, ada beberapa faktor yang harus diamati, diawasi oleh tenaga kesehatan (bidan dan dokter) yaitu nyeri, lama pembukaan, lama meneran, robekan perineum, lama pelepasan plasenta dan volume perdarahan (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 5)

4) Tanda-tanda persalinan

Memasuki proses persalinan terdapat beberapa tanda-tanda yang dirasakan oleh ibu dan dilihat oleh bidan melalui pemeriksaan. Tanda-tanda persalinan tersebut antara lain:

- a) Rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering dan teratur
- b) Keluar lendir bercampur darah (*show*) yang lebih banyak karena robekan-robekan kecil pada serviks
- c) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya

d) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan pembukaan sudah ada (Kuswanti dan Melina, 2014 :9).

5) Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses terjadinya persalinan:

a) *Power*

Power adalah tenaga atau kekuatan yang mendorong janin keluar. Kekuatan tersebut meliputi his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma dan aksi dari ligamen, dengan kerjasama yang baik dan sempurna.

(1) His

His adalah kekuatan kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Sifat his yang baik adalah kontraksi simetris, fundus dominan, terkoordinasi dan relaksasi.

(2) Tenaga mengejan

b) Faktor janin (*passanger*)

Faktor lain yang berpengaruh terhadap persalinan adalah faktor janin, yang meliputi sikap janin, letak, presentasi, bagian terbawah, dan posisi janin.

(1) Sikap (*Habitus*)

Menunjukkan hubungan bagian-bagian janin dengan sumbu janin, biasanya terhadap tulang punggungnya. Janin umumnya berada dalam sikap fleksi.

(2) Letak (*Situs*)

Bagaimana sumbu janin berhadapan terhadap sumbu ibu, misalnya letak lintang, yaitu sumbu janin tegak lurus pada sumbu ibu, letak membujur atau sumbu janin sejajar dengan sumbu ibu, ini bisa berupa letak kepala atau letak sungsang.

(3) Presentasi

Dipakai untuk menentukan bagian janin yang ada dibagian bawah rahim, yang dijumpai ketika palpasi atau pemeriksaan dalam. Misalnya presentasi kepala, presentasi bokong, presentasi bahu.

(4) Posisi janin

Menetapkan arah bagian terbawah janin apakah sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang terhadap sumbu ibu (*materal-pelvis*). Misalnya pada letak belakang kepala (LBK), ubun-ubun kecil (UUK) kiri depan, ubun-ubun kecil (UUK) kanan belakang.

c) Faktor jalan lahir (*Passage*)

Jalan lahir terdiri atas tulang-tulang panggul (rangka panggul) dan bagian lunak (otot-otot, jaringan-jaringan dan ligamen-ligamen).

d) Faktor psikologi ibu

Keadaan psikologi ibu mempengaruhi proses persalinan. Ibu bersalin yang didampingi oleh suami dan orang-orang yang dicintainya cenderung mengalami proses persalinan yang lebih lancar dibandingkan dengan ibu bersalin yang tanpa didampingi suami atau orang-orang yang dicintainya.

e) Faktor penolong

Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk memperlancar proses persalinan dan mencegah kematian maternal dan neonatal (Asrinah dkk, 2010 : 9-21).

c. Air ketuban

1. Pengertian air Ketuban

Air ketuban (AK) adalah cairan jernih dengan warna agak kekuningan yang menyelimuti janin di dalam rahim selama masa kehamilan, berada di dalam kantong ketuban, dan mempunyai banyak fungsi. Air ketuban yang berubah menjadi berwarna kehijauan atau kecoklatan, menunjukkan bahwa neonatus telah mengeluarkan mekonium, menjadi petanda bahwa neonatus dalam keadaan stress dan hipoksia (Kosim, 2010 : 1-2).

2. Fisiologi Air Ketuban

Janin bergerak bebas dalam AK sehingga membantu perkembangan otot dan tulang. Kantong ketuban terbentuk saat 12 hari setelah pembuahan, kemudian segera terisi oleh AK. Saat minggu-minggu awal kehamilan, AK terutama mengandung air yang berasal dari ibu, setelah sekitar 20 minggu urin janin membentuk sebagian besar AK yang mengandung nutrien, hormon dan antibodi yang melindungi janin dari penyakit. Air ketuban berkembang dan mengisi kantong ketuban mulai 2 minggu sesudah pembuahan. Setelah 10 minggu, kemudian AK mengandung protein, karbohidrat, lemak, fosfolipid, urea, dan elektrolit, untuk membantu pertumbuhan janin. Pada saat akhir kehamilan sebagian besar AK terdiri

dari urin janin.

Air ketuban secara terus menerus ditelan/ dihirup dan diganti lewat proses ekskresi seperti juga dikeluarkan sebagai urin. Hal yang demikian merupakan hal yang penting bahwa AK dihirup ke dalam paru janin untuk membantu paru mengembang sempurna. AK yang tertelan membantu pembentukan mekonium keluar saat ketuban pecah. Apabila ketuban pecah terjadi selama proses persalinan disebut ketuban pecah spontan, apabila terjadi sebelum proses persalinan disebut sebagai KPD. Sebagian besar AK tetap berada dalam rahim sampai neonatus lahir (Kosim, 2010 : 1-2).

B. Tinjauan Khusus tentang KPD

1. Pengertian

Terdapat beberapa pengertian tentang KPD, jika dilihat dari pembukaan serviks, maka KPD diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana, 2011 : 144). Sedangkan jika dilihat dari kapan pecahnya ketuban, maka KPD dapat diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan dan ditunggu satu jam belum dimulainya tanda persalinan (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 1).

Prawirohardjo (2014 : 677) mengatakan bahwa KPD merupakan keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila terjadi KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu, disebut KPD pada kehamilan prematur. Dalam keadaan normal 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami KPD. Sementara itu,

American college of Obstricans and gynecologist (2007) mengatakan *Premature Ruptured of Membranes (PROM)* adalah pecahnya membran ketuban janin secara spontan sebelum usia 37 minggu atau sebelum persalinan dimulai. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, tetapi banyak yang percaya bahwa infeksi *intra uterine* adalah faktor predisposisi utama (Iriyanti dkk, 2013 :150).

KPD adalah komplikasi yang terlihat pada kehamilan. Sebagian penyebabnya tidak diketahui dan diikuti oleh PROM sebelumnya. Hal ini terlihat kebanyakan pada ibu rumah tangga. Kelompok usia 20-30 adalah kelompok yang paling sering terjadi KPD (Mishra dan joshy, 2015 : 147).

a. Insiden


Insidensi KPD berkisar antara 8-10% dari semua kehamilan. Pada kehamilan aterm, insidensinya bervariasi antara 6-19%. Sedangkan pada kehamilan preterm, insidensinya 2% dari semua kehamilan. Hampir semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput ketuban pecah. Sekitar 85% morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan oleh prematuritas. KPD berhubungan dengan penyebab kejadian prematuritas dengan insidensi 30-40% (Marmi dkk, 2016 : 103).

b. Etiologi

Penyebab KPD masih belum diketahui dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Beberapa laporan menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan erat dengan KPD, namun faktor-faktor mana yang lebih berperan sulit diketahui.

Yang menjadi faktor predisposisinya adalah:

- 1) Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban maupun asenderen dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban biasa menyebabkan terjadinya KPD.
- 2) Serviks yang inkompetensia, kanalis servikalis yang selalu terbuka oleh karena kelainan pada serviks uteri (akibat persalinan dan kuretase)



sumber: Google Image

- 3) Tekanan *intra uterin* yang meninggi atau meningkat secara berlebihan (*overdistensi uterus*) misalnya trauma, *hidromnion*, *gemelli*.
- 4) Trauma yang didapat misalnya hubungan seksual, pemeriksaan dalam, maupun *amniosintesis* menyebabkan terjadinya KPD karena biasanya disertai infeksi.

- 5) Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada bagian terendah yang menutupi pintu atas panggul (PAP) yang dapat menghalangi tekanan terhadap membran bagian bawah.
 - 6) Keadaan sosial ekonomi
 - 7) Faktor lain:
 - a) Faktor golongan darah, akibat golongan darah ibu dan anak yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelemahan bawaan
 - b) Termasuk kelemahan jaringan kulit ketuban.
 - c) Faktor *disproporsi* antar kepala janin dan panggul ibu (CPD).
 - d) Faktor *multi graviditas*, merokok dan perdarahan antepartum.
 - e) Defisiensi gizi dari tembaga atau *asam askorbat*/ vitamin C (Nugroho, 2011 :2).
- c. Mekanisme pecahnya selaput ketuban**

Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan kontraks uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena seluruh selaput ketuban rapuh. Terdapat keseimbangan antara sintesis dan degradasi *ekstraselular matriks*. Perubahan struktur, jumlah sel, dan katabolisme kolagen menyebabkan aktivitas kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah.

Faktor risiko untuk terjadinya KPD adalah:

- 1) Berkurangnya *asam askorbik* sebagai komponen kolagen

- 2) Kekurangan tembaga dan asam akrobik yang berakibat pertumbuhan struktur abnormal karena antara lain merokok.

Degradasi kolagen dimediasi oleh matriks metaloproteinase (MMP) yang dihambat oleh inhibitor jaringan spesifik dan inhibitor protease. Mendekati waktu persalinan, keseimbangan antara MMP dan TIMP-1 mengarah pada degradasi proteolitik dari matriks ekstra seluler dan membran janin. Aktivitas degradasi proteolitik ini meningkat menjelang persalinan. Pada penyakit *periodontitis* dimana terdapat peningkatan MMP, cenderung terjadi KPD. Selaput ketuban sangat kuat pada kehamilan muda, dan pada trimester ketiga selaput ketuban mudah pecah. Melemahnya kekuatan selaput ketuban ada hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi rahim, dan gerakan janin. Pada trimester akhir terjadi perubahan biokimia pada selaput ketuban. Pecahnya selaput ketuban pada kehamilan *aterm* merupakan hal yang fisiologis. KPD pada prematur disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal, misalnya infeksi yang menjalar dari vagina. KPD prematur sering terjadi pada *polihidromnion*, *inkompeten serviks*, *solusio plasenta* (Prawirohardjo, 2014 : 678).

d. Tanda dan Gejala

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina, aroma air ketuban berbau manis dan tidak seperti bau amoniak, berwarna pucat, cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran. Tetapi, bila anda duduk atau berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya “menganjal” atau “menyumbat” kebocoran untuk sementara.

Sementara itu, demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi (Nugroho, 2011 :3).

e. Penilaian Klinis

Ada beberapa hal yang harus ditentukan untuk menganalisis bahwa cairan yang keluar merupakan cairan air ketuban. Adapun cara untuk menilai bahwa cairan yang keluar itu merupakan cairan air ketuban adalah sebagai berikut :

- 1) Tentukan pecahnya selaput ketuban.

Ditentukan dengan adanya cairan ketuban di vagina, jika tidak ada, dapat dicoba dengan gerakan sedikit bagian bawah janin atau meminta pasien batuk atau mengedan. Penentuan cairan ketuban dapat dilakukan dengan test lakmus (*nitrin test*) merah menjadi biru, membantu dalam menentukan jumlah cairan ketuban dan usia kehamilan kelainan janin.

- 2) Tentukan usia kehamilan bila perlu dengan USG.
- 3) Tentukan ada tidaknya infeksi, tanda-tanda infeksi : suhu ibu $\geq 38^{\circ}\text{C}$, air ketuban keruh dan berbau. Pemeriksaan air ketuban dengan tes LEA (*Leukosit Esterase*), leukosit darah $>15.000/\text{mm}^3$, janin yang mengalami *takhicardi*, mungkin mengalami infeksi *intra uterine*.
- 4) Tentukan tanda-tanda *inpartu*, tentukan adanya kontraksi yang teratur, periksa dalam dilakukan bila akan dilakukan penanganan aktif (terminasi kehamilan) antara lain untuk melihat skor pelvile.

(Pudiastuti, 2012:45-46).

f. Diagnosis

Secara klinik diagnosis KPD tidak sukar dibuat. Anamnesa pada klien dengan keluarnya air seperti kencing dengan tanda-tanda yang khas sudah dapat menilai itu mengarah ke KPD.

Untuk menentukan betul tidaknya terjadi KPD bisa dilakukan dengan cara :

- 1) Adanya cairan yang berisi mekonium (kotoran janin), verniks kaseosa (lemak putih), rambut lanugo atau bulu-bulu halus bila telah terinfeksi bau.
- 2) Pemeriksaan inspekulo, lihat dan perhatikan apakah memang air ketuban keluar dari kanalis servikalis pada bagian yang sudah pecah, atau terdapat cairan ketuban pada forniks posterior.
- 3) Terdapat infeksi genital (sistemik)
- 4) Gejala *Chorioamnionitis*
 - a) Maternal: demam dan takikardi, *uterine tenderness*, cairan amnion yang keruh, leukositosis (peningkatan sel darah putih) meninggi, leukosit esterase (LEA) meningkat, kultur darah/ urine
 - b) Fetal: takikardi, kardiokografi, profibiofisik, volume cairan ketuban berkurang.
- 5) Tes *valsava* (tes dengan melakukan ekspirasi paksa), tes *valsava* dapat dilakukan dengan cara melakukan ekspirasi paksa dengan menutup mulut dan hidung yang akan menambah tekanan pada telinga dan tekanan pada bagian fundus, sehingga jika terjadi KPD, maka air ketuban akan keluar (Fadlun, 2011 : 114)

g. Pemeriksaan penunjang

1) Pemeriksaan laboratorium

- a) Cairan yang keluar dari vagina perlu diperiksa: warna, konsentrasi, bau dan pH nya.
- b) Cairan yang keluar dari vagina ini ada kemungkinan air ketuban, urine atau secret vagina.
- c) Tes lakmus (tes nitrazin), jika kertas lakmus berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban (alkalis) dan jika kertas lakmus berubah menjadi merah menunjukkan urine. PH air ketuban 7-7,5, darah dan infeksi vagina dapat menghasilkan tes yang positif palsu.
- d) Mikroskopik (tes pakis).

2) Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

- a) Pemeriksaan ini di maksudkan untuk melihat jumlah cairan ketuban dalam kavum uteri.
- b) Pada kasus KPD terlihat jumlah cairan ketuban yang sedikit. Namun sering terjadi kesalahan pada penderita oligohidromnion (Nugroho Taufan, 2011 :6).

h. Prognosis/ komplikasi

Adapun pengaruh KPD terhadap ibu dan janin adalah:

1) Prognosis ibu

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada ibu yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama,

perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal.

2) Prognosis janin

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada janin itu yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, *enterocolitis necrotizing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, *prolaps funiculli* / penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, prolaps uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

i. Penatalaksanaan

KPD termasuk dalam kehamilan berisiko tinggi. Kesalahan dalam mengelolah KPD akan membawa akibat meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayinya. Penatalaksanaan KPD masih dilema bagi sebagian besar ahli kebidanan. Kasus KPD yang cukup bulan, jika kehamilan segera diakhiri, maka akan akan meningkatkan insidensi *secsio sesarea*, dan apabila menunggu persalinan spontan, maka akan meningkatkan insiden *chorioamnionitis*.

Kasus KPD yang kurang bulan jika menempuh cara-cara aktif harus di pastikan bahwa tidak akan terjadi RDS, dan jika menempuh cara koservatif dengan maksud memberikan waktu pematangan paru, harus bisa memantau keadaan janin

dan infeksi yang akan memeperjelek prognosis janin. Penatalaksanaan KPD tergantung pada umur kehamilan tidak di ketahui secara pasti segera dilakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk mengetahui umur kehamilan dan letak janin. Resiko yang lebih sering pada KPD dengan janin kurang bulan adalah RDS dibandingkan dengan sepsis. Oleh Karena itu pada kehamilan kurang bulan perlu evaluasi hati-hati untuk menentukan waktu yang optimal untuk persalinan. Pada umur kehamilan matang, *choriamnionitis* yang diikuti dengan sepsis pada janin merupakan sebab utama meningkatnya morbiditas dan mortalitas janin. Pada kehamilan cukup bulan, infeksi janin langsung berhubungan dengan lama pecahnya selaput ketuban atau lamanya periode laten.

Adapun penatalaksanaannya:

1) Konservatif

Penanganan secara konservatif yaitu:

- a) Rawat di rumah sakit.
- b) Beri antibiotik: bila ketuban pecah > 6 jam berupa: Ampisilin 4x500 mg atau gentamycin 1x 80 mg.
- c) Umur kehamilan < 32-34 minggu: dirawat selama air ketuban masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar lagi.
- d) Bila usia kehamilan 32-34 minggu, masih keluar air ketuban, maka usia kehamilan 35 minggu dipertimbangkan untuk terminasi kehamilan (hal ini sangat tergantung pada kemampuan keperawatan bayi prematur).
- e) Nilai tanda-tanda infeksi (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi *intra uterine*).

f) Pada usia kehamilan 32-34 minggu, berikan steroid untuk memacu kematangan paru-paru janin.

2) Aktif

Penanganan secara aktif yaitu:

- a) Kehamilan > 35 minggu: induksi oksitosin, bila gagal dilakukan seksio sesarea.
Cara induksi: 1 ampul syntocinon dalam dektrosa 5 %, dimulai 4 tetes sampai maksimum 40 tetes/ menit.
- b) Pada keadaan CPD, letak lintang dilakukan *secsio sesarea*.
- c) Bila ada tanda infeksi: beri antibiotika dosis tinggi dan persalinan diakhiri (Taufan, 2011 :8-9).

Gambar 2.2
Penatalaksanaan KPD

KETUBAN PECAH DINI
Table Penatalaksanaan ketuban pecah dini.

KETUBAN PECAH			
< 37 MINGGU		≥ 37 MINGGU	
Infeksi	Tidak ada infeksi	Infeksi	Tidak ada infeksi
Berikan penisilin, gentamisin dan metronidazol	Amoksilin + eritromisin untuk 7 hari	Berikan penisilin, gentamisin dan metronidazol	Lahirkan bayi
Lahirkan bayi	Steroid untuk pematangan paru	Lahirkan bayi	Berikan penisilin atau ampisilin
ANTIBIOTIKA SETELAH PERSALINAN			
profilaksis	Infeksi	Tidak ada infeksi	
Stop antibiotik	Lanjutkan untuk 24 – 48 jam setelah bebas panas	Tidak perlu antibiotik	

Sumber: Pudiastuti, 2012 : 47

2. Tinjauan umum tentang KPD menurut pandangan Islam

Jika anda pernah berendam di air (baik hangat maupun biasa) dalam waktu yang cukup lama, misalnya satu jam, apa yang terjadi? Kaki/ kulit/ badan anda terasa keriput, mengkerut, bahkan kita bisa menggigil kedinginan bila direndam di air biasa. Namun janin dalam kandungan biasa kuat berendam di dalam air ketuban selama 7-9 bulan dalam perut sang ibu. Anehnya, tubuh janin tidak mengkerut sama sekali, padahal jika kita terkena angin malam saja, sedikit kehujanan, maka kita akan sakit batuk esoknya.

Yang perlu kita ketahui, bahwa air ketuban pastilah merupakan media ajaib yang dibuat khusus oleh Tuhan untuk melindungi bayi tanpa merusaknya (selama kehamilan normal). Inilah salah satu kebesaran kuasa Tuhan.

Firman Allah swt dalam surah Fussilat/ 41 : 53

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٥٣

Terjemahnya:

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu” (Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013).

Makna dari ayat di atas yaitu mengajak kepada pendurhaka yang mengingkari kebenaran al-Qur’an sambil mengajak mereka berpikir dan merenungkan tentang al-Qur’an. Ayat diatas menjanjikan bantuan bagi yang hendak

berpikir secara objektif. Allah berfirman: *Kami akan memperlihatkan kepada mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan serta kebenaran firman-firman, kami disegenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa ia, yakni al-Qur'an itu adalah benar.* Apakah mereka tidak menggunakan pikiran mereka untuk memahami bukti-bukti yang terdapat dalam al-Qur'an sendiri *dan apakah belum cukup Tuhan pemeliharaan dan pembimbing-mu, wahai Nabi, Maha Menyaksikan segala sesuatu? ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan dan pengingkaran tentang pertemuan dengan Tuhan mereka* karena tidak menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah. *Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia, dengan ilmu dan kuasa-Nya, menyangkut segala sesuatu adalah Maha Meliputi.* Tidak sesuatu pun yang luput dari-Nya.

Pada masa hidup Nabi Muhammad saw, “ayat-ayat” yang dijanjikan oleh ayat ini untuk diperlihatkan antara lain adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika itu, antara lain kemenangan yang diraih oleh Nabi saw. Dalam peperangan-peperangan beliau disekian banyak daerah serta kematian tokoh-tokoh kaum musyrikin, sedang sesudah beliau wafat silih berganti peristiwa-peristiwa kemenangan yang diraih kaum muslimin. Selain itu *ayat-ayat di segenap ufuk dan diri mereka* yang diperlihatkan Allah itu adalah rahasia-rahasia alam serta keajaiban ciptaan-Nya pada diri manusia (Shihab, 2002 : 90-91).

Tatkala itu, Allah juga memperlihatkan kepada ummatnya yang berfikir bahwa janin yang ada didalam perut ibu dapat hidup dan berkembang dengan baik

dimana dalam perut ibu merupakan tempat yang amat sangat sempit dan penuh dengan kegelapan sehingga janin tidak dapat berbuat apa-apa kecuali kehendaknya.

Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar/39 : 6

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا يَخْلُقَكُمْ فِي بُطُونِ
 أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِي تُصِرُّونَ ۖ

Terjemahnya:

“Dia menciptakan kamu dari satu nafs kemudian Dia jadikan darinya pasangan dan Dia menurunkan untuk kamu delapan macam yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?” (Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013).

Ayat di atas menyatakan bahwa: *Dia menciptakan kamu dari satu nafs* yakni Adam as. *Kemudian dia jadikan darinya*, yakni nafs itu, *pasangannya*, yakni istrinya Hawwa, *dan Dia menurunkan untuk kamu delapan macam yang berpasangan dari binatang ternak*, yaitu unta, sapi, domba, dan kambing. *Dia menjadikan kamu dalam perut*, yakni rahim, *ibu kamu kejadian demi kejadian yang sangat mengagumkan*, yakni tahap demi tahap. *Dalam tiga kegelapan*. Kegelapan perut, rahim, dan plasenta. *Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan pemelihara dan pembimbing kamu*. *Milik-Nya sendiri semua kerjaan*, kepemilikan yang sempurna dan menyeluruh. *Dia juga satu-satunya Tuhan*, *tidak ada Tuhan penguasa dan pengendali alam raya dan yang berhak disembah selain Dia*; *maka bagaimana kamu*, wahai yang mempersekutukan-Nya, *dapat dipalingkan oleh satu*

dan lain hal? Sikap kamu itu sungguh merupakan sesuatu yang tidak masuk akal! (Shihab, 2002 : 442-443).

3. Teori manajemen kebidanan berdasarkan kasus persalinan dengan KPD

a. Pengertian manajemen kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Yulifah, 2014 : 125).

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Heryani, 2011 : 111).

1) Tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney

Varney (2002) menjelaskan proses manajemen merupakan proses pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awal tahun 1970 an.

a) Langkah I pengumpulan data dasar)

Pada langkah ini, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Pada kasus KPD, data yang perlu untuk dikumpulkan yaitu, data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk Rumah sakit, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi,

riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu.

Selain itu, data objektif pun termasuk kedalam asuhan kebidanan pada ibu dengan KPD yang terdiri pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan inspekulo. Terakhir yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam menegakkan diagnosis yaitu pemeriksaan laboratorium uji kertas nitrazin yang akan berubah warna menjadi biru gelap jika pelepasan yang keluar adalah cairan amnion, kemudian pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) untuk melihat jumlah cairan amnion yang ada di dalam kavum uteri dan pemeriksaan darah untuk melihat tanda-tanda infeksi yang terjadi pada ibu.

b) Langkah II (interpretasi data dasar)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahan.

c) Langkah III (identifikasi diagnosis atau masalah potensial)

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap bila diagnosis/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman (Yulifah, 2014 : 133).

Tujuan dari langkah ketiga ini adalah untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat muncul. Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial berdasarkan diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi atau diagnosis dan masalah aktual.

Diagnosis potensial yang mungkin terjadi pada ibu yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan masalah potensial yang terjadi pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome, hypothermia, neonatal feeding problem, retinopathy of prematurity, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, brain disorder (and risk of cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis), prolaps funiculli*/ penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, *prolaps uteri, dry labour*/ partus lama, APGAR score rendah, *ensefalopaty, cerebral palsy, perdarahan intracranial, renal failure, respiratory distress*), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru,

deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

Pada langkah ketiga ini, bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis potensial tidak terjadi. Dengan demikian, langkah ini benar merupakan langkah yang bersifat antisipasi yang rasional/ logis. Kaji ulang diagnosis atau masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat.

d) Langkah IV (Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera)

Tindakan segera merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara menetapkan kebutuhan tentang perlunya tindakan segera oleh bidan/ dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ke empat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Pada kasus persalinan dengan KPD, tindakan antisipasi atau tindakan segera yang harus dilakukan yaitu memberikan infus cairan larutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10%, induksi uterotonika dan pemberian antibiotik.

e) Langkah V (Perencanaan)

Perencanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen untuk masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan

kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi.

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori yang terbaru, *evidence based care*, serta divalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan dan apa perencanaan sebaiknya pasien dilibatkan, karena pada akhirnya pengambilan keputusan untuk suatu rencana asuhan harus disetujui oleh pasien.

f) Langkah VI (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh dan dilakukan dengan efisien dan aman. Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah sebelumnya dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan menghemat biaya serta meningkatkan mutu asuhan klien. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

g) Langkah VII (Evaluasi)


Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada pasien. Kita mengacu kepada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidanan, efektivitas tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil asuhan. Hasil Yang diharapkan dari manajemen kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD adalah dapat dilakukan partus secara spontan, komplikasi akibat tindakan medik dapat diatasi serta ibu dan janin dalam keadaan baik dan sehat. Evaluasi dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan (Varney dkk, 2002 : 31).

4. Pendokumentasian dalam bentuk SOAP

Menurut Helen Varney, alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan seorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

- a. S (Subjektif) menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis (langkah I Varney).
- b. O (Objektif) menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang merumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (langkah I Varney)
- c. A (Pengkajian/ *Assesment*) menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi:

- 1) Diagnosis/ masalah
 - 2) Antisipasi diagnosis/ masalah potensial
 - 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/ konsultasi/ kolaborasi dan atau rujukan (langkah II, III dan IV Varney)
- d. P (*Planning*) menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment (langkah V, VI dan VII Varney)
(Mangkuji, 2012 : 136)



BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “R”
GESTASI 37-38 MINGGU DENGAN KETUBAN PECAH DINI (KPD)
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 07 JULI 2017**

KALA I

Nomor Register : 46xxxx
Tanggal masuk rumah sakit : 07 Juli 2017, jam 13.50 wita
Tanggal pengkajian : 07 Juli 2017, jam 14.00 wita
Tanggal partus : 07 Juli 2017, jam 21.15 wita
Nama pengkaji : Sunarti

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas ibu/ suami

Nama : Ny “R”/ Tn “F”
Umur : 28 tahun/ 30 tahun
Nikah/ lamanya : 1x/ ± 8 tahun
Suku : Makassar/ Makassar
Agama : Islam/ Islam
Pendidikan : SD/ SD
Pekerjaan : IRT/ buruh harian

Alamat : dusun Gusung, desa Taeng, kabupaten Gowa

2. Anamnesa (data subjektif)

a. Alasan utama ibu masuk

Ibu masuk dengan keluhan terdapat pengeluaran air pervaginam.

b. Riwayat keluhan utama

Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga satu sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. Ibu rujukan dari Puskesmas Cambaya kecamatan Pallangga dengan keluhan ada keluar cairan melalui vagina yang berwarna jernih pada tanggal 07 Juli 2017, jam 08.00 wita (\pm 4 jam sebelum tiba di Rumah sakit), satu sarung basah akibat cairan yang keluar, dan ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang, riwayat pemeriksaan di Puskesmas yaitu belum ada kontraksi/ his, pembukaan 2 cm dan riwayat pemeriksaan tes lakmus di Puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan pelepasan air yang keluar tersebut adalah air ketuban. Sebelum masuk ke kamar bersalin RSUD Syekh Yusuf, ibu sebelumnya berada di Poliklinik KIA RSUD Syekh Yusuf dan tindakan yang telah dilakukan di Poliklinik KIA yaitu pemeriksaan USG.

c. Riwayat menstruasi

1. Menarche : 13 tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Lamanya : 5-7 hari
4. Banyaknya : 2-3x ganti pembalut per hari

5. Teratur/ tidak teratur : teratur
6. Sifat darah : encer
7. Disminore : tidak ada

d. Riwayat perkawinan

Ibu menikah 1x secara sah dengan Tn “S” pada tahun 2009, saat Ny “R” berusia 20 tahun dan Tn “S” berusia 22 tahun

e. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

No	Tahun	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL gram	PBL cm	Tempat partus	penolong	Keadaan
1	2010	Persalinan pervaginam	Perempuan	2.600 gram	47 cm	Puskesmas	Bidan	Baik

f. Riwayat nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertamanya secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan keatas.

g. Riwayat kehamilan sekarang

- 1) Hari pertama haid terakhir tanggal 19 Oktober 2016
- 2) Hari tafsiran persalinan tanggal 26 Juli 2017
- 3) Umur kehamilan 37 minggu 2 hari

- 4) Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan
- 5) Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang.
- 6) Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di BPS
 - Trimester I : 2x
 - Trimester II : 2x
 - Trimester III : 2x
- 7) Ibu telah mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 2 kali
 - TT I : tanggal 10 Februari 2017, di BPS
 - TT II : tanggal 10 Maret 2017, di BPS
- 8) Keluhan-keluhan:
 - Trimester I : mual muntah di pagi hari
 - Trimester II : tidak ada keluhan
 - Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah
- 9) Penyuluhan
 - Ibu belum pernah mendapat penyuluhan selama kehamilannya
- h. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu
 - 1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, dan hipertensi.
 - 2) Tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hepatitis dan penyakit menular seksual.
 - 3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.

4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di Rumah sakit maupun di Puskesmas.

i. Riwayat penyakit keluarga

1) Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes militus, asma dan penyakit keturunan lainnya.

j. Riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual

1) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.

2) Hubungan ibu dengan suami, keluarga, maupun tetangga baik.

3) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami.

4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

k. Riwayat KB

Sejak kelahiran anak pertama yaitu pada tahun 2010 ibu mulai menjadi akseptor KB depo progestin/ suntik 3 bulan dan berhenti pada bulan Januari tahun 2016 dengan alasan ingin hamil lagi.

l. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan:

a) Pola makan : nasi, sayur, lauk

b) Frekuensi : 3 kali sehari

c) Kebutuhan minum: 6-8 gelas per hari

Selama inpartu:

- a) Ibu makan, tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum
- 2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

- a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amoniak.
- b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu:

- a) BAK : Ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok
- b) BAB : Ibu belum BAB (ibu terakhir BAB jam 6.00 di rumahnya)
- 3) Personal hygiene

Kebiasaan:

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b) Sikat gigi : 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi
- c) Keramas : 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo
- d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu:

- a) Ibu belum mandi dan sikat gigi
- 4) Kebutuhan istirahat dan tidur

a) Kebiasaan

Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

b) Selama inpatu

Ibu tidak pernah tidur

3. Pemeriksaan fisik (data objektif)

a. Pemeriksaan umum:

- 1) Keadaan umum ibu baik
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Hari tafsiran persalinan tanggal 26 Juli 2017
- 4) Usia gestasi 37 minggu 2 hari
- 5) Tanda-tanda vital:

Tekanan darah: 110/70 mmHg Suhu : 36,8 °C (axilla)

Nadi : 80x/ menit Pernapasan : 20x/ menit

- 6) Tinggi badan : 154 cm
- 7) Berat badan sebelum hamil : 45 kg
- 8) Berat badan sekarang : 56 kg
- 9) Lingkar lengan atas (lila) : 26 cm

b. Pemeriksaan fisik (*Head To Toe*)

1) Kepala

Inspeksi : kepala bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam dan lurus

Palpasi : tidak ada massa, tidak mudah rontok dan tidak ada nyeri tekan

2) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada *oedema* pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak

Palpasi : tidak teraba adanya *oedema*

3) Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sclera putih (tidak ikterus)

4) Hidung

Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret.

Palpasi : tidak ada *oedema*, tidak ada nyeri tekan dan tidak nampak adanya polip.

5) Mulut dan gigi

Inspeksi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada stomatitis dan gusi tidak berdarah.

6) Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.

7) Leher

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis

8) Payudara

Inspeksi : payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat areola di pencet, tidak ada nyeri tekan.

9) Abdomen

Inspeksi : nampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, nampak striae alba dan linea nigra, tidak ada bekas luka operasi dan otot perut kendur.

Palpasi : Leopold I : 3 jari di bawah *processus xiphoideus* (tinggi fundus uteri 32 cm), teraba bokong

Leopold II : punggung kiri (puki)

Leopold III : kepala

Leopold IV : bergerak dalam panggul (4/5)

Lingkar perut : 90 cm

Tafsiran berat janin : 2.880 gram

Denyut jantung janin : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 126 kali per menit

His : tidak ada

10) Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varises, nampak pelepasan lendir bercampur dengan air ketuban.

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak oedema dan tidak ada nyeri tekan.

11) Anus

Inspeksi : tidak ada hemorroid

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

12) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varises

Palpasi : tidak ada oedema

c. Pemeriksaan dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal 07 July 2017, jam 14.15 wita

1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan

2) Portio : tebal/ lunak

3) Pembukaan : 2 cm

4) Air ketuban : jernih (merembes)

5) Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang

6) Penurunan : Hodge I

7) Penumbungan : tidak ada

8) Molase : tidak ada

9) Kesan panggul : normal

10) Pelepasan : lendir dan air ketuban

d. Pemeriksaan inspekulo

Tanggal 07 Juli 2017, jam 14.20 wita

Hasil pemeriksaan inspekulo yaitu terdapat pengeluaran air ketuban yang keluar dari kanalis servikalis.

e. Pemeriksaan tes *valsava*

Tanggal 07 Juli 2017, jam 14.30 wita

Hasil pemeriksaan tes *valsava* yaitu terdapat pengeluaran air ketuban

f. Pemeriksaan penunjang

1) Pemeriksaan USG

Tanggal 07 Juli 2017, jam 13.50 wita oleh dokter R Sp. OG di Poliklinik KIA

a) GII PI A0, gravid tunggal, hidup

b) Letak : kepala

c) FHR : 130 kali per menit

d) TBJ : ± 2.950 gram

e) UK: $\pm 36-37$ minggu, TP: ± 20 Juli 2017

f) Plasenta di *posterofundal grade 1*

g) Oligohidramnion

2) Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

Tanggal 07 Juli 2017, jam 14.40 wita

- a) WBC : $13.4 \times 10^3 / \mu\text{L}$
- b) RBC : $3.21 \times 10^3 / \mu\text{L}$
- c) HGB : 10,5g/dl
- d) HCT : 29.05%
- e) MCV : 90.3fL
- f) MCH : 32.7pg
- g) MCHC : 36.2g/dL
- h) Protein : negatif
- i) Reduksi : negatif
- j) HbsAg : negatif

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

GII PI A0, gestasi 37 minggu 2 hari, intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase laten dengan KPD.

1. GII PI A0

Dasar

Data subjektif : ibu mengatakan kehamilan yang kedua dan sebelumnya tidak pernah keguguran, ibu merasakan adanya pergerakan janin.

Data objektif : nampak linea nigra, striae alba dan otot perut sudah kendor, terdapat denyut jantung janin, dan pada saat palpasi teraba bagian-bagian janin.

Analisa dan interpretasi data:

Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendor, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (prawirohardjo, 2014 : 179).

2. Gestasi 37 minggu 2 hari

Dasar

Data subjektif : hari pertama haid terakhir tanggal 19 Oktober 2016

Data objektif : pemeriksaan leopold I, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah *processus xiphoideus*, dan hari tafsiran persalinan tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan rumus Neagle.

Analisa dan interpretasi data:

Dari hasil pemeriksaan, dilihat dengan menggunakan rumus Neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal 19 Oktober sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 37 minggu 2 hari (Prawirohardjo, 2014 : 279).

3. Intrauterin

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan janinnya bergerak dengan kuat dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya.

Data objektif : ibu tidak merasakan nyeri ketika dipalpasi, TFU sesuai umur kehamilan, pada palpasi leopard teraba bagian-bagian kecil janin.

Analisa dan interpretasi data:

Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intra uterin.

(Baety, 2012 : 9).

4. Tunggal

Dasar

Data subjektif : -

Data objektif : Pada Leopold I, teraba bokong di fundus yang bulat dan lunak serta tidak melenting, pada leopard II teraba punggung kiri, pada leopard III teraba bagian bulat dan melenting (kepala), dan auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, kuat dan

teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 126 kali per menit, serta tinggi fundus uteri sesuai dengan umur kehamilan.

Analisa dan interpretasi data:

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11)

5. Hidup

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan pergerakan janinnya 12 kali dalam sehari

Data objektif : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 126 kali per menit.

Analisa dan interpretasi data:

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

6. Keadaan ibu dan janin baik

Dasar

Data subjektif : tidak ada keluhan-keluhan lain dan kecemasan yang dirasakan ibu selama kehamilan, ibu merasakan pergerakan janin kuat dan biasanya bergerak 12 kali dalam sehari.

Data objektif : keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 126x per menit dan pemeriksaan *head to toe* konjungtiva merah muda, wajah dan tungkai tidak oedema, hemoglobin 10,5 g/dl menandakan ibu tidak anemia. Konjungtiva merah muda, hemoglobin yang normal, tidak adanya oedema pada wajah dan tungkai menandakan ibu dalam keadaan baik.

Analisa dan interpretasi data:

Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan denyut jantung janin (DJJ) yang teratur dan berada dalam batasan normal menandakan keadaan ibu dan janin baik, konjungtiva merah muda, hemoglobin 10,5 g/dl (Pantiawati dan Saryono, 2010 : 122)

7. Inpartu kala I fase laten dengan KPD

Data subjektif : ibu mengatakan ada pengeluaran air hingga satu sarung basah.

Data objektif : pengeluaran air pervaginam yang berwarna jernih, ada *verniks caseosa* dan berbau amis, belum ada kontraksi.

Selain itu, ada pun hasil pemeriksaan lainnya antara lain:

- a. Hasil pemeriksanan dalam jam 14.15 wita
 - 1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - 2) Portio : tebal/ lunak
 - 3) Pembukaan : 2 cm
 - 4) Ketuban : pecah, jernih (merembes)
 - 5) Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang
 - 6) Penurunan : hodge 1
 - 7) Molase : tidak ada
 - 8) Penumbungan : tidak ada
 - 9) Kesan panggul : normal
 - 10) Pelepasan : air ketuban
- b. Hasil pemeriksaan inspekulo yaitu terdapat pengeluaran air ketuban dari kanalis servikalis.
- c. Hasil pemeriksaan tes *valsava* yaitu terdapat pengeluaran air ketuban.

Analisa dan interpretasi data:

- a. Adanya pelepasan air pervaginam, jernih, dan terdapat *vernix caseosa* dengan bau amis yang menandakan telah terjadi pelepasan air ketuban (Fadhlan, 2011:114)
- b. Pemeriksaan inspekulo membuktikan terdapat pengeluaran air ketuban dari kanalis servikalis (Sepduwiana, 2011 : 144).
- c. Pemeriksaan tes *valsava* membuktikan bahwa terdapat pengeluaran air ketuban (Fadhlan, 2011:114)
- d. KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya, dimana pada primipara pembukaan serviks kurang 3 cm, dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana, 2011 : 144).
- e. Dilatasi serviks 1-3 cm merupakan kala I fase laten (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 4).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial yang akan terjadi yaitu:

1. Pada ibu, yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal,
2. Pada janin, yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati premturit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko

cerebral palsy, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal

Data subjektif : ibu mengatakan terdapat pengeluaran air pervaginam hingga satu sarung basah.

Data objektif : tampak pengeluaran air dari pervaginam, warna jernih, ada *vernix caseosa* dan bau amis.

Analisa dan interpretasi data:

- a. KPD menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan ruang rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi pada jalan lahir (Nugroho, 2011 :2).
 - b. KPD memberi pengaruh/ komplikasi keapada ibu dan janin yaitu pada ibu potensial terjadi infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).
3. Masalah potensial yang akan terjadi pada janin yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia,

sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter:

1. Pemasangan infus RL 28 tetes per menit

Rasional : membantu mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan

2. Pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam

Rasional : untuk pematangan serviks dan membantu kontraksi uterus

3. Injeksi antibiotik cefotaxime 1 gr/ IV

Rasional : mencegah resiko terjadinya infeksi

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Masalah aktual : KPD

2. Masalah potensial : potensial terjadi pada ibu yaitu infeksi *intrapartal/* dalam persalinan, infeksi *puerperalis/* masa nifas, *dry labour/* partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric*

(khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal, dan potensial terjadi pada janin yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernafasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal

3. Tujuan:

- a. Persalinan dapat berlangsung dengan normal, keadaan ibu dan janin baik.
- b. Mencegah terjadinya masalah potensial.

4. kriteria

- a. Kala I untuk multipara tidak lebih dari 7 jam dan untuk primipara 13 jam
- b. Denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120-160 kali per menit)

c. Tanda-tanda vital dalam batas normal:

1) Tekanan darah normal

a) systole 100-120 mmHg

b) diastole 60-90 mmHg

2) Suhu normal 36,5 – 37,5 °C

3) Nadi normal 60- 100x/ menit

4) Pernapasan normal 16-24x/ menit

d. Keadaan ibu dan janin baik

5. Rencana tindakan

a. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Rasional : agar ibu dan keluarga memahami tentang keadaannya dan memberi dukungan yang dapat mengurangi kecemasan dan siap menghadapi persalinan.

b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit)

Rasional : observasi tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu seperti memantau terjadinya demam yang merupakan tanda-tanda terjadinya infeksi pada ibu sehingga dapat mempermudah melakukan tindakan.

c. Observasi denyut jantung janin (DJJ) setiap 30 menit

Rasional : saat ada kontraksi, denyut jantung janin (DJJ) bisa berubah sesaat hingga apabila ada perubahan dapat diketahui dengan cepat dan dapat bertindak secara cepat dan tepat.

- d. Observasi *vaginal toucher* (VT) kontrol tiap 2 jam/ 4 jam, atau jika ada indikasi
- Rasional : untuk memantau kemajuan persalinan.
- e. Observasi his setiap 30 menit
- Rasional : karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saat sehingga mempengaruhi turunnya kepala dan dilatasi serviks
- f. Ajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, ibu menarik napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi
- Rasional : untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi
- g. Anjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin
- Rasional:
- 1) Kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar
 - 2) Menghalangi penurunan kepala bayi dan memberi perasaan tidak nyaman pada ibu
- h. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infus RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotik cefotaxime 1 gram/ IV sesuai intruksi dokter
- Rasional : pemberian infus membantu untuk mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan, pemasangan misoprostol dapat membantu pematangan serviks/ dilatasi serviks serta pemberian antibiotik dapat mencegah terjadinya infeksi.

- i. Berikan intake minum dan makan pada ibu

Rasional : agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran

- j. Menganjurkan kepada ibu untuk senang tiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

Rasional : agar ibu berserah diri dan bertawakkal kepada sang pencipta

- k. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

Rasional : merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan klinik.

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 07 July 2017, jam 14.15 wita

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his tiap 1 jam pada kala I fase laten dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan tiap 30 menit.

No	Jam (Wita)	TD (mmHg)	N (X/1')	S (axilla)	DJJ (X/1')	HIS (Frekuensi-Durasi)
1	14.45	110/70	84	36,6 °C	126	-
2	15.15		86		134	-
3	15.45		86		130	2x dalam 10 menit (15-20)
4	16.15		90		134	2x dalam 10 menit (15-20)

5	16.45		90		126	3x dalam 10 menit (20-25)
6	17.15		92		128	3x dalam 10 menit (20-25)
7	17.45		92		124	3x dalam 10 menit (20-25)
8	18.15	100/70	94	36,8 °C	128	4x dalam 10 menit (30-35)

3. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) kontrol tanggal 07 Juli 2017 jam 18.15 wita

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : tipis
- c. Pembukaan : 7 cm
- d. Ketuban : jernih (merembes)
- e. Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang
- f. Penurunan : Hodge III
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

4. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his

No	Jam (Wita)	TD (mmHg)	N (X/1')	S (axilla)	DJJ (X/1')	HIS (Frekuensi-Durasi)
9	18.45		94		126	4x dalam 10 menit (30-35)
10	19.15		92		124	5x dalam 10 menit (40-45)
11	19.45		94		126	5x dalam 10 menit (40-45)
12	20.15		94		130	5x dalam 10 menit (45-50)
13	20.55	100/70	94	37 °C	132	5x dalam 10 menit (45-50)

5. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) kontrol tanggal 07 Juli 2017 jam 20.55 wita

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : melelap
- c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- d. Ketuban : jernih (merembes)
- e. Presentasi : ubun-ubun kecil didepan symphysis
- f. Penurunan : Hodge IV
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

6. menganjurkan teknik relaksasi kepada ibu yaitu menarik napas melalui hidung dan menghembuskan lewat mulut
7. Menganjurkan pada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin
8. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infuse RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotik cefotaxime 1 gram/ IV sesuai intruksi dokter
9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his
10. Menganjurkan kepada ibu untuk senang tiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti
11. Mencatat dalam partograf

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 07 Juli 2017, jam 20.55 wita

1. Keadaan ibu dan janin baik yang ditandai dengan:
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
 - 1) Tekanan darah: 110/70 mmHg
 - 2) Suhu : 36,8 °C (axilla)
 - 3) Nadi : 80 kali per menit
 - 4) Pernapasan : 20 kali per menit
 - b. Denyut jantung janin (DJJ) 126 kali per menit terdengar jelas, kuat dan teratur
2. Kala 1 fase aktif berlangsung ditandai dengan:

- a. His yang adekuat 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik
- b. Pembukaan lengkap (10 cm) \pm 7 jam setelah *vaginal toucher* (VT) pertama dan penurunan kepala hodge IV
- c. Tidak ada tanda-tanda infeksi
- d. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan

KALA II

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : sakitnya bertambah kuat dan tembus ke belakang, ibu merasa ingin BAB, adanya dorongan kuat untuk meneran, serta adanya tekanan pada anus.

Data objektif : perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik, penurunan kepala 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), penurunan hodge IV dan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Hasil pemeriksaan dalam, jam 20.55 wita:

1. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
2. Portio : melesap
3. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
4. Air ketuban : jernih (merembes)
5. Presentasi : ubun-ubun kecil depan symphysis
6. Penurunan : Hodge IV

- 7. Molase : 0
- 8. Penumbungan : tidak ada
- 9. Kesan panggul : normal
- 10. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

- Diagnosa : perlangsungan kala II
- Masalah aktual : nyeri akibat kontraksi
- Data subjektif : ada penekanan pada anus, ada dorongan kuat untuk meneran, sakitnya sering dan bertambah sakit.
- Data objektif : perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik, penurunan kepala 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), penurunan hodge IV dan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Analisa dan interpretasi data:

Nyeri merupakan hal yang fisiologis yang dirasakan oleh ibu akibat adanya kontraksi yang justru akan mempercepat proses persalinan, tekanan yang hebat pada dasar panggul dan bagian terendah janin, akan mempermudah penurunan kepala, kontraksi yang timbul disertai ibu mengedan yang berlangsung secara refleksi (Kuswanti dan Melina, 2014 : 13)

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : perlangsungan kala II

Masalah aktual : tidak ada indikasi

Masalah potensial : tidak ada data penunjang

Tujuan:

1. Kala II berlangsung normal
2. Bayi lahir normal tanpa penyulit

Kriteria:

1. Kala II berlangsung selama \pm 15 menit tanpa ada penyulit
2. Bayi lahir spontan, segera menangis, bernapas tanpa bantuan dan bergerak dengan aktif.

Rencana tindakan:

Tanggal 07 Juli 2017, jam 20.55 wita

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorangan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

Rasional : untuk mengetahui apakah sudah dapat dilakukan pimpinan meneran

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partus set.

Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya dapat mencegah diri dari infeksi nosokomial

3. Memakai celemek plastik.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : mencegah infeksi

5. Menggunakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakan kembali kedalam wadah partus set.

Rasional : mempersiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 per menit).

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Rasional : agar ibu tidak khawatir dengan keadaan bayinya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).

Rasional : dapat membantu memperlancar proses persalinan

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Rasional : memperlancar proses berlangsungnya persalinan

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Rasional : untuk mempercepat penurunan kepala

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Rasional : untuk mengeringkan tubuh bayi

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.

Rasional : sebagai alas untuk menyokong perineum

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

18. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada kedua tangan.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenon (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, di bawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada

belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum)

Rasional : dengan menyokong yang baik, maka akan mengurangi trauma dan mencegah terjadinya ruptur perineum

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Rasional : membersihkan jalan nafas dari air ketuban dan lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal dan menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Rasional : membantu mengeluarkan bayi agar tidak terjadi robekan perineum

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Rasional : dengan tehnik sangah susur akan membantu pengeluaran tubuh bayi seluruhnya dan mencegah agar bayi tidak jatuh

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Rasional : membantu mengeluarkan bayi secara keseluruhan dan mencegah agar bayi tidak jatuh

25. Melakukan penilaian selintas :

- a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

- b. Apakah bayi bergerak aktif ?

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering. Membiarkan bayi di atas perut ibu.

Rasional : mencegah agar bayi tidak mengalami hipotermi

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 07 Juli 2017, jam 20.55 wita

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorongan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set.

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:

a. Partus set

Partus set terdiri atas 2 klem kocher, ½ kocher, 1½ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.

b. Hecting set

Hecting set terdiri atas nelvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang

c. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin K, hepatitis B dan betadin.

d. Diluar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kacamata, celemek, handscoon, alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek plastik.
4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.
6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.
7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.
8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.
 - a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
 - d. Air ketuban : pecah, jernih (merembes)
 - e. Presentasi : ubun-ubun kecil depan symphysis
 - f. Penurunan : Hodge IV
 - g. Molase : 0
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

9. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.
10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 x/menit).
11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).
13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.
14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.
15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.
16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.
17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.
19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenon (perasat untuk melindungi perineum dngan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).
20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin
21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.
22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.
23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

25. Melakukan penilaian selintas :

- c. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?
- d. Apakah bayi bergerak aktif ?

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 07 Juli 2017, jam 21.15 wita

1. Kala II berlangsung normal tanpa ada penyulit
2. Bayi lahir spontan tanggal 07 Juli, jam 21.15 wita, menangis kuat dan bernapas tanpa bantuan, bayi bergerak aktif, dan APGAR *score* 8/10.
3. Perdarahan \pm 300 cc
4. Terjadi rupture tingkat II

KALA III

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri perut bagian bawah

Data objektif : bayi lahir spontan pada tanggal 07 Juli 2017, jam 21.15 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), tinggi fundus

uteri setinggi pusat, perdarahan \pm 300 cc, kala II berlangsung selama \pm 15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala III

Data subjektif : ibu nyeri perut bagian bawah, ibu senang dengan kelahiran bayinya

Data objektif : bayi lahir spontan tanggal 07 Juli 2017, jam 21.15 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat masih nampak di vulva

Analisa dan interpretasi data:

Pada waktu kala III, volume uterus telah berkurang, dapat teraba tinggi fundus uteri setinggi pusat, pada saat kontraksi maka akan memperkecil permukaan uteri sehingga akan terasa sakit dan teraba keras dan bundar (Kuswanti dan Melina, 2014 : 7)

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : Kala III berlangsung normal, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), keadaan ibu dan bayi baik
2. kriteria : Lamanya kala III tidak lebih dari 30 menit, plasenta (selaput dan kotiledon) lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) serta keadaan ibu dan bayi baik.

Rencana tindakan:

Tanggal 07 Juli 2017, jam 21.15 wita

- 1) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

- 2) Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Rasional : mempercepat proses pengeluaran plasenta

- 3) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskuler (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Rasional : penyuntikan oksitosin membantu kontraksi uterus untuk pengeluaran plasenta

- 4) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Rasional : untuk memudahkan memotong tali pusat

- 5) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Rasional : agar bayi dapat dipisahkan dari plasenta

- 6) Mengikat tali pusat dengan benang desinfeksi tingkat tinggi pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

Rasional : agar darah tidak keluar dari pusat bayi

- 7) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Rasional : agar ibu dan bayi tidak hipotermi dan bisa melakukan kontak kulit

- 8) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Rasional : agar dapat memudahkan proses peregangan tali pusat terkendali

- 9) Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi dan tangan lain meregangkan tali pusat.

Rasional : memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

10) Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokrinal. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Rasional : dorso kranial memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

11) Melakukan peregang dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai dengan kurva jalan lahir sehingga tampak pada vulva

12) Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Rasional : mencegah robekan dan mencegah tertinggalnya selaput ketuban yang dapat menyebabkan perdarahan

13) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Rasional : agar kontraksi baik dan mencegah perdarahan

- 14) Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukkan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dapat menyebabkan perdarahan

- 15) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Rasional : penjahitan laserasi dapat mencegah terjadinya perdarahan

- 16) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Rasional : kontraksi uterus yang baik dapat mencegah perdarahan akibat atonia uteri

- 17) Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Rasional : untuk menjalin ikatan batin antara ibu dan bayi

- 18) Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral.

Rasional : agar bayi mendapat perlindungan dini terhadap komplikasi yg akan terjadi

19) Setelah satu jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Rasional : mengurangi resiko bayi terkena penyakit hepatitis

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 07 Juli 2017, jam 21.15 wita

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.
2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.
3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin).
4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.
5. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.
6. Mengikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.
7. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

8. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva
9. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.
10. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso kranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangkan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.
11. Melakukan peregangkan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).
12. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.
13. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)
14. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

15. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.
16. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
17. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
18. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.
19. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Evaluasi tanggal 07 Juli 2017, jam 21.20 wita

1. Kala III berlangsung \pm 5 menit
2. Kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 07 Juli 2017, jam 21.20 wita
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. Perdarahan kala III \pm 150 cc
5. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
6. Keadaan ibu dan bayi baik.

KALA IV

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah.

Data objektif : kala III berlangsung ± 5 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 07 Juli 2017 jam 21.20 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 150 cc dan kandung kemih kosong.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala IV dengan kelelahan

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya

Data objektif : kala III berlangsung ± 5 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 07 Juli 2017, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 100 cc dan kandung kemih kosong

Analisa dan interpretasi data:

Setelah plasenta lahir lengkap, maka menunjukkan telah masuk ke kala pengawasan/ kala observasi post partum. Kelelahan disebabkan oleh penggunaan energi dan cairan yang banyak saat persalinan (Kuswanti dan Melina, 2014 : 8).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data yang menunjang

**D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/
KOLABORASI**

Tidak ada data yang menunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : kala IV berlangsung dengan tidak terjadi perdarahan yang berlebihan, kesadaran composmentis, dan tanda-tanda vital dalam batas normal
2. Kriteria : tidak terjadi perdarahan, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), kandung kemih kosong dan tanda-tanda vital dalam batas normal

Rencana tindakan:

Tanggal 07 Juli 2017, jam 21.20 wita

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.
Rasional : mencegah terjadinya perdarahan pervaginam
2. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
Rasional : agar kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
3. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 jam pada jam kedua pasca persalinan
Rasional : mengetahui jumlah darah yang keluar

4. Memeriksa tanda-tanda vital ibu, tinggi fundus uteri kontraksi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

Rasional : tanda-tanda vital yang normal dan kandung kemih yang kosong menandakan kala IV berlangsung normal

5. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Rasional : agar bayi dalam keadaan aman dan nyaman

6. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Rasional : larutan klorin 0,5% dapat membunuh bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi

7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

8. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi (DTT), membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Rasional : agar ibu terhindar dari kuman

9. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin makan dan minum

Rasional : dengan makan dan minum akan memberikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinannya

10. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

Rasional : untuk membunuh kuman

11. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.

Rasional : mencegah infeksi silang dan sebagai tindakan desinfeksi infeksi

12. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : dekontaminasi agar tidak terkontaminasi dengan bakteri

13. Melengkapi partograf

Rasional : sebagai catatan pemantauan persalinan

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 07 Juli 2017, jam 21.20 wita

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.
2. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

3. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan

Jam (Wita)	Jumlah perdarahan
21.35	± 100 cc
21.50	± 50 cc
22.05	± 30 cc
22.20	± 20 cc
22.50	± 10 cc
23.20	± 5 cc
Total	± 215 cc

4. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan.

Jam	Waktu (Wita)	TD (mmHg)	N (X/1')	S (axilla)	TFU	Kontraksi	Kandung kemih
1	21.35	100/70	86	36,8 °C	Setinggi pusat	Baik	Kosong
	21.50	100/70	84		Setinggi pusat	Baik	Urin ± 50 cc
	22.05	100/70	84		Setinggi pusat	Baik	Urin ± 50 cc
	22.20	100/70	82		Setinggi pusat	Baik	Urin ± 50

						cc	
II	22.50	100/70	80	37 °C	Setinggi pusat	Baik	Urin ± 100 cc
	23.20	100/70	80		Setinggi pusat	Baik	Kosong

5. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.
6. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (selama 10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.
7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
8. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.
9. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.
10. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.
11. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.
12. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
13. Melengkapi partograf (Saifuddin, 2014 : 341-347).

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 07 Juli 2017, jam 23.20 wita

1. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
2. Jumlah perdarahan \pm 200 cc
3. Kandung kemih kosong
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah: 100/70 mmHg Suhu : 36,6°C (axilla)

Nadi : 76x/ menit Pernapasan : 20x/ menit

5. Ibu telah makan dan minum
6. Keadaan ibu dan bayi baik



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
PADA NY “R” GESTASI 37-38 MINGGU DENGAN KETUBAN
PECAH DINI (KPD) DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 07 JULI 2017**

No register : 46xxxx

Tanggal masuk : 07 Juli 2017, jam 13.50 wita

Tanggal pengkajian : 07 Juli 2017, jam 14.00 wita

Tanggal partus : 07 Juli 2017, jam 21.15 wita

Nama pengkaji : Sunarti

Identitas istri/ suami

Nama : Ny “R”/ Tn “F”

Umur : 28 tahun/ 30 tahun

Nikah/ lamanya : 1x/ ± 8 tahun

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam/ Islam

Pendidikan : SD/ SD

Pekerjaan : IRT/ buruh harian

Alamat : Dusun Gusung Desa Taeng, Kabupaten Gowa

A. KALA I

DATA SUBJEKTIF

4. Anamnesa (data subjektif)

a. Alasan utama ibu masuk

Ibu masuk dengan keluhan terdapat pengeluaran air pervaginam.

b. Riwayat keluhan utama

Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga satu sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. Ibu rujukan dari Puskesmas Cambaya kecamatan Pallangga dengan keluhan ada keluar cairan melalui vagina yang berwarna jernih pada tanggal 07 Juli 2017, jam 08.00 wita (\pm 4 jam sebelum tiba di Rumah sakit), satu sarung basah akibat cairan yang keluar, dan ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang, riwayat pemeriksaan di Puskesmas yaitu belum ada kontraksi/ his, pembukaan 2 cm dan riwayat pemeriksaan tes lakmus di Puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan pelepasan air yang keluar tersebut adalah air ketuban. Sebelum masuk ke kamar bersalin RSUD Syekh Yusuf, ibu sebelumnya berada di Poliklinik KIA RSUD Syekh Yusuf dan tindakan yang telah dilakukan di Poliklinik KIA yaitu pemeriksaan USG.

c. Riwayat menstruasi

- | | |
|-------------|--------------|
| 8. Menarche | : 13 tahun |
| 9. Siklus | : 28-30 hari |
| 10. Lamanya | : 5-7 hari |

11. Banyaknya : 2-3x ganti pembalut per hari

12. Teratur/ tidak teratur : teratur

13. Sifat darah : encer

14. Dismenore : tidak ada

d. Riwayat perkawinan

Ibu menikah 1x secara sah dengan Tn “S” pada tahun 2009, saat Ny “R” berusia 20 tahun dan Tn “S” berusia 22 tahun

e. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

No	Tahun	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL	PBL	Tempat partus	penolong	Keadaan
1	2010	Persalinan pervaginam	Perempuan	2.600 gram	47 cm	Puskesmas	Bidan	Baik

f. Riwayat nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertamanya secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan ke atas.

g. Riwayat kehamilan sekarang

10) Hari pertama haid terakhir tanggal 19 Oktober 2016

11) Hari tafsiran persalinan tanggal 26 Juli 2017

- 12) Umur kehamilan 37 minggu 2 hari
- 13) Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan
- 14) Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang.

15) Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di BPS

Trimester I : 2x

Trimester II : 2x

Trimester III : 2x

16) Ibu telah mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 2 kali

TT I : tanggal 10 Februari 2017, di BPS

TT II : tanggal 10 Maret 2017, di BPS

17) Keluhan-keluhan:

Trimester I : mual muntah di pagi hari

Trimester II : tidak ada keluhan

Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

18) Penyuluhan

Ibu belum pernah mendapat penyuluhan selama kehamilannya

h. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

- 5) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, dan hipertensi.
- 6) Tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hepatitis dan penyakit menular seksual.
- 7) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.

- 8) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah diopname di Rumah sakit maupun di Puskesmas.
- i. Riwayat penyakit keluarga
- 2) Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, asma dan penyakit keturunan lainnya.
- j. Riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual
- 5) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.
- 6) Hubungan ibu dengan suami, keluarga, maupun tetangga baik.
- 7) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami.
- 8) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.
- k. Riwayat KB
- Sejak kelahiran anak pertama yaitu pada tahun 2010 ibu mulai menjadi akseptor KB depo progestin/ suntik 3 bulan dan berhenti pada bulan Januari tahun 2016 dengan alasan ingin hamil lagi.
- l. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar
- 5) Kebutuhan nutrisi
- Kebiasaan:
- d) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- e) Frekuensi : 3 kali sehari
- f) Kebutuhan minum: 6-8 gelas per hari

Selama inpartu:

b) Ibu makan, tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

6) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

c) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amoniak.

d) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu:

c) BAK : Ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok

d) BAB : Ibu belum BAB (BAB terakhir ibu pada jam 06.00 wita dirumahnya)

7) Personal hygiene

Kebiasaan:

e) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi

f) Sikat gigi : 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi

g) Keramas : 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo

h) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu:

b) Ibu belum mandi dan sikat gigi

8) Kebutuhan istirahat dan tidur

c) Kebiasaan

Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

d) Selama inpartu

Ibu tidak pernah tidur

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Hari tafsiran persalinan tanggal 26 Juli 2017
4. Usia gestasi 37 minggu 2 hari
5. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah: 110/70 mmHg	Pernapasan : 20 kali per menit
Nadi : 80 kali per menit	Suhu : 36,8 °C (axilla)
6. Tinggi badan : 154 cm
7. Berat badan sebelum hamil : 45 kg
8. Berat badan sekarang : 56 kg
9. Lingkar lengan atas (LILA) : 26 cm
10. Pemeriksaan fisik (*Head To Toe*)
 - a. Kepala : bersih, tidak ada ketombe, tidak rontok, rambut hitam dan lurus, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
 - b. Wajah : tidak pucat, tidak ada *chloasma gravidarum*, tidak *oedema*, tidak ada nyeri tekan
 - c. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah mudah, sclera putih, kelopak mata tidak bengkak

- d. Hidung : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak pengeluaran secret, tidak oedema, tidak ada nyeri tekan, tidak ada polip
- e. Mulut dan gigi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada stomatitis, gusi tidak berdarah, dan tidak ada gigi yang tanggal
- f. Telinga : simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran serumen, tidak ada peradangan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
- g. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis
- h. Payudara : payudara simetris kiri dan kanan, putting susu bersih dan menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, terdapat pengeluaran kolostrum jika putting susu dipencet
- i. Abdomen : Leopold I : 3 jari di bawah *processus xiphoideus* (tinggi fundus uteri 32 cm), teraba bokong
 Leopold II : punggung kiri (puki)
 Leopold III : kepala
 Leopold IV : bergerak dalam panggul (4/5)
 LP : 90 cm
 TBJ : 2.880 gram

Denyut jantung janin : terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 126 kali per menit

His : tidak ada

- j. Ekstremitas atas : jari lengkap, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
- k. Ekstremitas bawah : tidak ada varises, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak oedema
- l. Genitalia dan anus : tidak ada varises, nampak pengeluaran lendir dan air ketuban, tidak ada oedema, tidak ada hemorroid

11. Pemeriksaan dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal 07 Juli 2017, jam 14.15 wita

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : tebal/ lunak
- c. Pembukaan : 2 cm
- d. Ketuban : jernih (merembes)
- e. Presentase : ubun-ubun kecil kanan lintang
- f. Penurunan : Hodge I
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal

j. Pelepasan : lendir dan air ketuban

12. Pemeriksaan inspekulo

Tanggal 07 Juli 2017, jam 14.20 wita

Hasil pemeriksaan inspekulo yaitu terdapat pengeluaran air ketuban yang keluar dari kanalis servikalis.

13. Pemeriksaan tes *valsava*

Tanggal 07 Juli 2017, jam 14.30 wita

Hasil pemeriksaan tes *valsava* yaitu terdapat pengeluaran air ketuban

14. Pemeriksaan penunjang

a. Pemeriksaan USG

Tanggal 07 Juli 2017, jam 13.50 wita oleh dokter R Sp. OG di Poliklinik KIA

- 1) GII PI A0 gravid tunggal, hidup
- 2) Letak : kepala
- 3) FHR : 130 bpm
- 4) TBJ : ± 2.950 gram
- 5) UK : $\pm 36-37$ minggu, TP: ± 20 Juli 2017
- 6) Plasenta di *posterofundal grade 1*
- 7) Oligohidramnion

b. Pemeriksaan laboratorium

Tanggal 07 Juli 2017, jam 14.40 wita

- k) WBC : $13.4 \times 10^3 / \mu\text{L}$
- l) RBC : $3.21 \times 10^3 / \mu\text{L}$

- m) HGB : 10,5g/dl
 n) HCT : 29.05%
 o) MCV : 90.3fL
 p) MCH : 32.7pg
 q) MCHC : 36.2g/dL
 r) Protein : negatif
 s) Reduksi : negatif
 t) HbsAg : negatif

ASSESSMENT

- Diagnosa : GII PI A0, gestasi 37 minggu 2 hari, intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase laten dengan KPD
- Masalah aktual : KPD
- Masalah potensial : Pada ibu, yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal, sedangkan pada janin, yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati premturit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*,

hiperbilirubinemia, anemia, sepsis, prolaps funiculli / penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, prolaps uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distress pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal

PLANNING (P)

Tanggal 07 Juli 2017, jam 14.15 wita

1. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Hasil : ibu telah mengetahui keadaannya sekarang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (djj) dan his tiap 1 jam pada kala I fase laten dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan tiap 30 menit

No	Jam (Wita)	TD (mmHg)	N (X/1')	S (axilla)	DJJ (X/1')	His (Frekuensi-Durasi)
1	14.45	110/70	84	36,6 °C	126	-
2	15.15		86		134	-
3	15.45		86		130	2x dalam 10 menit (15-20)

4	16.15		90		134	2x dalam 10 menit (15-20)
5	16.45		90		126	3x dalam 10 menit (20-25)
6	17.15		92		128	3x dalam 10 menit (20-25)
7	17.45		92		124	3x dalam 10 menit (20-25)
8	18.15	100/70	94	36,8 °C	128	4x dalam 10 menit (30-35)

3. Melakukan *vaginal toucher* (VT) kontrol, jam 18.15 wita

Hasil :

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : tipis
- c. Pembukaan : 7 cm
- d. Ketuban : jernih, merembes
- e. Presentase : ubun-ubun kecil kanan lintang
- f. Penurunan : hodge III
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

4. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (djj) dan his

No	Jam (Wita)	TD (mmHg)	N (X/1')	S (axilla)	DJJ (X/1')	HIS (Frekuensi-Durasi)
9	18.45		94		126	4x dalam 10 menit (30-35)
10	19.15		92		124	5x dalam 10 menit (40-45)
11	19.45		94		126	5x dalam 10 menit (40-45)
12	20.15		94		130	5x dalam 10 menit (45-50)
13	20.55	100/70	94	37 °C	132	5x dalam 10 menit (45-50)

5. Mengobservasi *vaginal toucher* (VT) kontrol, jam 20.55 wita

- k. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- l. Portio : melelap
- m. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- n. Ketuban : jernih (merembes)
- o. Presentasi : ubun-ubun kecil didepan symphysis
- p. Penurunan : hodge IV
- q. Molase : tidak ada
- r. Penumbungan : tidak ada
- s. Kesan panggul : normal
- t. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

6. Mengajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, ibu menarik napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi

Hasil : ibu telah melakukannya

7. menganjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Hasil : kandung kemih telah kosong

8. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infuse RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotik cefotaxime 1gr/ IV sesuai intruksi dokter

Hasil : infuse RL telah dipasang pada jam 14.50 wita, misoprostol 1/8 tab telah berada didalam vagina ibu pada jam 15.00 wita, dan injeksi cefotaxime telah diberikan pada jam 15.10 wita

9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his

Hasil : ibu telah diberi makan dan minum disela-sela his

10. Menganjurkan kepada ibu untuk senangtiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

Hasil : ibu selalu beristighfar saat ibu mrasakan sakit akibat kontraksi

11. Mencatat dalam partograf

Hasil : partograf telah dilengkapi

B. KALA II**DATA SUBJEKTIF**

1. Sakitnya bertambah kuat dan tembus kebelakang
2. Ibu merasa ingin buang air besar
3. Adanya dorongan kuat untuk meneran
4. Adanya tekanan pada anus

DATA OBJEKTIF

1. Perineum menonjol
2. Vulva dan vagina membuka
3. His 5x dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik
4. Pembukaan 10 cm (lengkap)
5. Penurunan kepala hodge IV (0/5)
6. Pelepasan lendir, darah dan air ketuban

ASSESSMENT

Perlangsungan kala II

PLANNING

Tanggal 07 Juli 2017, jam 20.55 wita

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorongan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

Hasil : tanda dan gejala kala II telah dirasakan

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set.

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:

f. Partus set

Partus set terdiri atas 2 klem kocher, ½ kocher, 1½ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.

g. Hecting set

Hecting set terdiri atas nelvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang

h. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin K, hepatitis B dan betadin.

i. Diluar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

j. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kacamata, celemek, handscoon, alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek plastik

Hasil : celemek telah dipakai

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Hasil : perhiasan telah disimpan dan tangan telah bersih

5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Hasil : sarung tangan telah dipakai pada tangan kanan

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.

Hasil : oksitosin 1 ampul telah berada didalam wadah partus set

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi, dengan gerakan vulva ke perineum.

Hasil : vulva dan perineum telah bersih

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Periksa dalam tanggal 07 Juli 2017, jam 20.55 wita

- k. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- l. Portio : melelap
- m. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- n. Air ketuban : pecah, jernih (merembes)

- o. Presentasi : ubun-ubun kecil didepan symphysis
- p. Penurunan : hodge IV
- q. Molase : 0
- r. Penumbangan : tidak ada
- s. Kesan panggul : normal
- t. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

9. Menceleupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

Hasil : sarung tangan telah direndam dalam larutan klorin 0,5 % secara terbalik

10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin dalam batas normal (120 – 160 kali per menit).

Hasil : denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 132 kali per menit.

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).

Hasil : ibu dalam posisi setengah duduk

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Hasil : telah dilakukan pimpinan meneran

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Hasil : ibu tetap dalam posisi setengah duduk karena sakitnya yang bertambah sering

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Hasil : handuk bersih telah diletakkan diatas perut ibu

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.

Hasil : *underpad* telah terpasang dibawah bokong ibu

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

Hasil : alat telah lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.

Hasil : sarung tangan telah dipakai pada kedua tangan

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenon (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

Hasil : kepala telah lahir

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Hasil : tidak terjadi lilitan tali pusat

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Hasil : kedua bahu telah lahir

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Hasil : lengan dan badan telah lahir

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Hasil : seluruh badan telah lahir

25. Melakukan penilaian selintas :

- e. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?
- f. Apakah bayi bergerak aktif ?

Hasil : bayi lahir spontan tanggal 07 Juli 2017, jam 21.15 wita, dengan segera menangis dan bernapas tanpa bantuan, bergerak dengan aktif dan APGAR *score* 8/10.

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu.

Hasil : ibu telah diselimuti dengan handuk bersih dan kering, serta telah berada diatas perut ibu

C. KALA III

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu lelah setelah melahirkan
2. ibu merasakan nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF

1. Bayi lahir spontan tanggal 07 Juli 2017, jam 21.15 wita
2. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. Perdarahan \pm 150 cc
5. Kala II berlangsung sealama \pm 15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva

ASSESSMENT

Perlangsungan kala III

PLANNING

Tanggal 07 Juli 2017, jam 21.15 wita

27. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Hasil : bayi tunggal

28. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Hasil : ibu bersedia untuk disuntik

29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Hasil : oksitosin telah disuntikkan di 1/3 paha atas bagian distal lateral

30. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Hasil : tali pusat telah dijepit

31. Memotong dan mengikat tali pusat (dengan satu tangan mengangkat tali pusat yang telah dijepit, kemudian melakukan pengguntingan tali pusat sambil melindungi perut bayi diantara 2 klem

Hasil : tali pusat telah dipotong

32. Mengikat tali pusat dengan benang desinfeksi tingkat tinggi atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya atau menjepit tali pusat dengan penjepit tali pusat

Hasil : tali pusat telah dijepit

33. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Hasil : bayi telah diselimuti dengan kain hangat dan topi telah terpasang di kepala

34. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Hasil : klem telah dipindahkan

35. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : satu tangan telah berada diatas perut ibu dan tangan lainnya meregangkan tali pusat

36. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso kranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Hasil : dorso kranial telah dilakukan

37. Melakukan peregang dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Hasil : plasenta telah terlepas dari tempat implantasinya

38. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Hasil : plasenta dan selaput ketuban telah lahir

39. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

40. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Hasil : plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 07 Juli 2017, jam 21.20 wita

41. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Hasil : terjadi ruptur tingkat II dan telah dijahit luar dan dalam sebanyak 6 jahitan secara jelujur

42. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Hasil : uterus berkontraksi baik (teraba keras dan bundar)

43. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Hasil : IMD telah dilakukan

44. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

Hasil : berat bayi lahir 3000 gram, panjang bayi lahir 48 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 32 cm, lingkar perut 31 cm, APGAR *score* 8/10, dan telah disuntik vitamin K1 (IM) dipaha kiri anterolateral

45. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Hasil : hepatitis B telah disuntikkan dipaha kanan anterolateral

D. KALA IV

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu lelah setelah selesai persalinannya
2. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF

1. Ibu tampak lelah setelah menjalani persalinannya
2. Plasenta lahir lengkap tanggal 07 Juli 2017, jam 21.20 wita
3. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
4. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
5. Perdarahan \pm 150 cc
6. Kandung kemih kosong

ASSESMENT

Perlangsungan kala IV dengan kelelahan

PLANNING

Tanggal 07 Juli 2017, jam 21.20 wita

46. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

47. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

Hasil : ibu telah melakukannya

48. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, setiap 15 menit selam 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam ke 2 pasca persalinan

Hasil:

Jam (Wita)	Jumlah perdarahan
21.35	± 100 cc
21.50	± 50 cc
22.05	± 30 cc
22.20	± 20 cc
22.50	± 10 cc
23.20	± 5 cc
Total	± 215 cc

49. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan.

Jam	Waktu (Wita)	TD (mmHg)	N (X/1')	S (axilla)	TFU	Kontraksi	Kandung kemih
I	21.35	100/70	86	36,8 °C	Setinggi pusat	Baik	Kosong
	21.50	100/70	84		Setinggi pusat	Baik	± 50 cc
	22.05	100/70	84		Setinggi pusat	Baik	± 50 cc
	22.20	100/70	82		Setinggi pusat	Baik	± 50 cc
II	22.50	100/70	80	37 °C	Setinggi pusat	Baik	Kosong
	23.20	100/70	80		Setinggi pusat	Baik	± 100 cc

50. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Hasil : bayi bernapas dengan normal yaitu 50 kali per menit

51. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Hasil : alat sudah dilarutkan dalam larutan klorin 0,5 %, telah dicuci dan telah bersih

52. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

Hasil : Sampah yang terkontaminasi telah dibuang ketempat sapah.

53. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi.

Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai
memakai pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu telah dalam keadaan bersih

54. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu
apabila ibu ingin minum.

Hasil : ibu telah nyaman dan telah makan dan minum

55. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

Hasil : tempat bersalin telah di dekontaminasikan

56. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan
sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan
klorin 0,5.

Hasil : sarung tangan telah dicelupkan di didalam larutan klorin 0,5 %
dalam keadaan terbalik

57. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Hasil : kedua tangan telah bersih

58. Melengkapi partograf

Hasil : partograf telah dilengkapi

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesenjangan yang terjadi antara tinjauan pustaka dan studi kasus dalam penerapan proses asuhan kebidanan intranatal pada Ny “R” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 07 Juli 2017. Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dari asuhan yang nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari tujuh langkah.

A. Langkah I identifikasi data dasar

Dalam pengkajian yang dimulai dari pengumpulan data berupa anamnesa serta data-data yang dapat ditemukan saat melakukan anamnesa yang dapat mendukung terjadinya kasus tersebut. Setelah dilakukan anamnesa, dilakukan pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Selain pemeriksaan fisik, juga dilakukan pemeriksaan dalam untuk memantau kemajuan persalinan, khususnya untuk memastikan pecahnya selaput ketuban. Pemeriksaan yang lain yaitu pemeriksaan inspekulo dan pemeriksaan tes *valsava*.

Tes *valsava* dilakukan dengan cara melakukan ekspirasi paksa dengan menutup mulut dan hidung yang akan menambah tekanan pada telinga dan tekanan pada bagian fundus, sehingga jika terjadi KPD, maka air ketuban akan keluar (Fadlun, 2011 : 114). Kemudian pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan USG untuk mendukung hasil pemeriksaan.

Dalam tahapan pengkajian, penulis tidak mendapat hambatan. Hal ini karena respon kooperatif ibu yang dapat menerima kehadiran penulis saat pengumpulan data sampai tindakan yang diberikan. Ibu menunjukkan sikap terbuka dan menerima anjuran serta saran yang diberikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan.

Pada kasus Ny "R", didapatkan riwayat keluhan masuk rumah sakit ibu dirujuk oleh bidan dari Puskesmas berupa terdapat pengeluaran air ketuban dari jalan lahir pada tanggal 07 Juli 2017, pukul 08.00 wita, dan belum ada kontraksi. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 2 cm, air ketuban merembes dan berwarna jernih. Selain itu, data yang didapatkan dari seorang bidan yang merujuk yaitu riwayat pemeriksaan tes lakmus di Puskesmas yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru, yang menandakan pelepasan air yang keluar yaitu air ketuban.

Tindakan yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk Rumah sakit, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu.

Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan dalam, pemeriksaan inspekulo dan pemeriksaan tes *valsava*. Terakhir yaitu pemeriksaan

penunjang yang terdiri dari pemeriksaan USG, dan pemeriksaan laboratorium (sampel darah).

Meskipun terdapat perbedaan antara riwayat tindakan yang dilakukan di Puskesmas dengan tindakan yang dilakukan di Rumah sakit, yaitu pemeriksaan tes lakmus yang dilakukan di Puskesmas dan pada umumnya pemeriksaan kertas lakmus di Rumah sakit tidak dilakukan pada kasus KPD. Meskipun demikian, riwayat tindakan yang telah dilakukan di Puskesmas yang berbeda dengan tindakan yang dilakukan di Rumah sakit, hal tersebut dapat saling membantu untuk pengumpulan data dalam menegakkan diagnosis.

KPD merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana, 2011 : 144). Pada langkah pertama, penulis tidak mendapatkan kesenjangan antara teori dan kasus yang terjadi di lapangan.

B. Langkah II identifikasi diagnosa/ masalah aktual

Dalam menegakkan suatu diagnosa kebidanan, didukung dan ditunjang oleh beberapa data, dan dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam

sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahan.

Pada kasus Ny”R”, telah dilakukan pengumpulan data subjektif, data objektif, maupun data penunjang, sehingga berdasarkan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa diagnosa atau masalah aktual yang dirumuskan yaitu KPD. Oleh karena itu tidak terdapat kesenjangan antara teori dan data yang diperoleh.

C. Langkah III antisipasi diagnosa/ masalah potensial

Pada perumusan diagnosa/ masalah potensial akan dibahas tentang kemungkinan terjadi hal yang lebih fatal apabila apa yang menjadi masalah aktual tidak segera ditangani. Pada tinjauan pustaka, masalah potensial yang dapat terjadi yaitu infeksi *intrapartal/* dalam persalinan, infeksi *puerperalis/* masa nifas, *dry labour/* partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome, hypothermia, neonatal feeding problem, retinopathy of prematurity, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, brain disorder (and risk of cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis), prolaps funiculli/* penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, *prolaps uteri, dry labour/* partus lama, APGAR score rendah, *ensefalopaty, cerebral palsy, perdarahan intracranial, renal failure, respiratory distress*), dan oligohidromnion (sindrom

deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

Pada kasus ini, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau komplikasi yang mungkin akan terjadi pada ibu maupun janin karena penanganan ibu bersalin atas indikasi KPD dengan tindakan pemasangan infus, pemberian obat uterotonika dan pemberian obat antibiotik telah sesuai dengan teori, sehingga tidak ada diagnosa potensial terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

D. Langkah IV identifikasi perlunya tindakan segera/ kolaborasi

Beberapa data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera yang harus dilakukan guna untuk menyelamatkan klien. Tindakan tersebut berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih professional (dokter obgyn). Pada tinjauan pustaka, tindakan segera/ kolaborasi pada KPD adalah mengkolaborasikan dengan dokter untuk pemasangan infus, pemberian uterotonika dan pemberian antibiotik.

Pada studi Ny "R" tindakan segera yang dilakukan adalah kolaborasi dengan dokter dalam menangani persalinan dengan KPD yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam, pemberian antibiotic cefotaxime 1 gr/ IV dan memantau keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal. Dalam kasus ini tidak ada perbedaan yang ditemukan antara teori dan tindakan yang diberikan pada Ny "R" yang tetap mengacu pada tindakan yang rasional sesuai kebutuhan klien.

E. Langkah V rencana tindakan

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Pada studi kasus Ny "R", penulis merencanakan tindakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yang akan terjadi, rencana tersebut yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit, pemasangan cytotec 1/8 tab pervaginam, pemberian antibiotik cefotaxime 1 gr/ IV dan memantau keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal. Dalam rencana tindakan asuhan kebidanan pada kasus Ny "R", tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada dilapangan.

F. Langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan

Semua rencana telah dilaksanakan seluruhnya dengan menyesuaikan kondisi, keadaan dan kebutuhan ibu, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2017 di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan hambatan, karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek.

G. Langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan

Adapun evaluasi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan tujuan kriteria yang diberikan

kepada Ny “R” di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 07 Juli 2017 yaitu pada kala I berlangsung tidak lebih dari 7 jam, keadaan ibu dan janin baik, dan tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi.

Selanjutnya yaitu kala II juga berlangsung normal tanpa ada penyulit, bayi lahir spontan tanggal 07 Juli 2017, jam 21.15 wita, menangis kuat, bernapas tanpa bantuan serta bergerak aktif. Pada kala III, tidak ada penyulit dan berlangsung normal, berlangsung ± 5 menit, kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 07 Juli 2017, jam 21.20 wita, TFU setinggi pusat, perdarahan ± 150 cc, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), serta keadaan ibu dan bayi baik. Terakhir yaitu kala IV atau kala pengawasan, pada kala IV kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), jumlah perdarahan ± 200 cc, kandung kemih kosong dan keadaan ibu dan bayi baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari kala I sampai dengan kala IV, semuanya berlangsung normal, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan ketuban pecah dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 07 Juli 2017, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa pengertian tentang KPD, jika dilihat dari pembukaan serviks, maka KPD diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana, 2011 : 144). Sedangkan jika dilihat dari kapan pecahnya ketuban, maka KPD dapat diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan dan ditunggu satu jam belum dimulainya tanda persalinan (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 1).
2. Setelah dilakukan pengkajian pada tanggal 07 Juli 2017, maka ditemukan bahwa tidak ada penyulit bagi ibu maupun janin dan keadaan ibu dan janin baik yang dilihat bahwa tanda-tanda vital dalam batas normal, tekanan darah: 110/70 mmHg, nadi: 80x/ menit, pernapasan: 20x/ menit, S: 36,8°C, denyut jantung janin dengan frekuensi 126x/ menit. Ibu melahirkan pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 21.15 wita dengan berat bayi lahir 3000 gram,

panjang bayi lahir 48 cm, lingkaran kepala 33 cm, lingkaran dada 32 cm, lingkaran perut 31 cm.

3. Pada pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny "R" mulai dari pengkajian sampai tahap akhir tidak ditemukan adanya hambatan karena adanya kerjasama antara klien dan petugas kesehatan sehingga semua tindakan dapat terlaksana dengan baik.
4. Pendokumentasian sangat penting dilaksanakan pada setiap tahap dari proses manajemen kebidanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Saran untuk bidan

- a. Bidan dalam memberikan asuhan harus sesuai kewenangannya, untuk itu manajemen asuhan kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang membantu seorang bidan dalam memecahkan masalah klien dalam berbagai situasi.
- b. Dalam melaksanakan asuhan kebidanan, bidan harus selalu menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi, guna mencegah terjadinya infeksi pada ibu, juga perlindungan bagi diri sendiri.
- c. Diharapkan seseorang bidan dalam melaksanakan tugasnya diperlukan adanya disiplin waktu dalam memberikan asuhan kepada klien.

2. Saran untuk Rumah sakit

Sebaiknya pihak RSUD Syekh Yusuf Gowa, lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD secara optimal melalui penanganan yang cepat dan tepat.

3. Saran untuk institusi

Adapun saran untuk institusi yaitu:

- a. Menyediakan tenaga pengajar yang professional yang dapat membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar.
- b. Perlu peningkatan pembelajaran di laboratorium khususnya penanganan KPD sehingga dapat melakukan suatu tindakan penanganan pada kasus tersebut karena praktek laboratorium sangatlah bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna untuk menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan professional

4. Saran untuk klien

Adapun saran untuk klien yaitu:

- a. Setiap ibu hamil harus segera datang ke petugas kesehatan bila didapati adanya pengeluaran air yang banyak dari jalan lahir dengan bau amis/ bau khas
- b. Diharapkan kepada ibu untuk segera ber KB
- c. Perlunya dukungan dan keterlibatan suami atau anggota keluarga dalam masa nifas merupakan interaksi terus-menerus yang bersifat saling mencintai, pemenuhan keutuhan emosional dan saling membutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

Agatha

dan Utin. "Hubungan Usia Kehamilan dan Paritas Ibu Bersalin dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pontianak." *Jurnal Vokasi Kesehatan*. Vol. II No.1 (Januari 2016). <http://ejournal.poltekkespontianak.ac.id/indeks.php/JVK/article/download> .(Diakses tanggal 10 Mei 2017)

Aisyah,

Sitidan Oktarina,

Aini. "Perbedaan Kejadian Ketuban Pecah Dini Antara Primiparadan Multipara." *Jurnal Midpro*. Edisi 1 (2012). <http://journal.unisla.ac.id/pdf/19412012/1.%20perbedaan%20kejadian%20ketuban%20pecah.pdf> (Diakses tanggal 05 Juni 2017)

Arifin, Annisa Zulfan, *Asuhan Keperawatan pada Ny Y dengan post Sectio Caesaria Indikasi Ketuban Pecah Dini Diruang Mawar III RSUD Surakarta*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Asrinah, dkk. *Asuhan Kebidanan Masa Persalinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Baety, Aprilia Nurul. *Kehamilan dan persalinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2014*. Makassar: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015. http://http://depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2014/27_Sulawesi_Selatan_2014.pdf (Diakses tanggal 11 Mei 2017).

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. *Profil Kesehatan Kabupaten Gowa, 2014*. http://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/7306_SulselKabGowa_2014.pdf (Diakses tanggal 11 Mei 2017).

Fadlun. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta : Salemba Medika, 2011.

Feryanto, Achmad. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta : Salemba Medika, 2011.

Gahwagi, Milad M. "Premature Rupture of Membranes Characteristics, Determinants, and Outcomes of in Benghazi". *Journal of Obstetrics and Gynecology* (2015). <http://www.scirp.org/journal/ojog>. (Diakses tanggal 11 Mei 2017)

- Heryani, Reni. *Buku Ajar Konsep Kebidanan*. DKI Jakarta : CV Trans Info Media, 2011.
- Iriyanti Bayu, dkk. *Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti*. Jakarta : Sagung Seto, 2014.
- Jannah, Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan-Kehamilan*. Yogyakarta : CV Andi Offset, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*. Penerbit Walidan Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Kementerian Kesehatan Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia, 2015. <http://depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profilkesehatanindonesia/profil-kesehatan-Indonesia-2015.pdf> (Diakses tgl 2 Juni)
- Kennedy, Betsy B dkk. *Modul Manajemen Intrapartum*. Jakarta : EGC, 2013
- Kuswanti, Ina dan Melina, Fitria. *Askeb II Persalinan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kosim, M Sholeh. “Pemeriksaan Kekeuhan Air Ketuban” *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 5, (Februari 2010). <http://httpsaripediatri.idai.or.id/pdf/file11-5-12.pdf> (Diakses tanggal 6 Juni 2017).
- Manguji, Betty. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP*. Jakarta : EGC, 2012.
- Marmi, dkk. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Mishra, Seemadan joshymamta. “Premature Rupture of Membrane- Risk Factors: A Clinical Study”. *Journal of Contemporary Medical Research* Volume 4 | Issue 1 | January 2017 | ICV (2015): 77.83. <http://www.ijcmr.com>. (Diakses tanggal 11 Mei 2017)
- Nugroho, Taufan. *Obstetri*. Jakarta : Medical Book, 2011.
- Nurhayati. *Konsep Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika, 2013.
- Pantiawatid dan Saryono. *Asuhan Kebidanan I (kehamilan)*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2010.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.

- Pudiastuti, RatnaDwi. *AsuhanKebidananPadaIbuBersalinPatologi*. Yogyakarta :NuhaMedika, 2012.
- Purwoastuti, Th. Endang. *KonsepKebidanan*. Yogyakarta :PustakaBaru Press, 2015.
- Rahmawati, En Nur. *IlmuPraktisKebidanan*. Jakarta : EGC, 2013.
- Sepduwiana, Henny.”FaktorTerjadinya KPD padaIbuBersalin di RSUD RokanHulu.”*Jurnal Maternity and Neonatal*.”Vol. 1 no. 3 (2011).<http://e-journal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/download/1103/804>(Diaksestanggal 06 Juni 2017).
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta :LenteraHati, 2002.
- Soepardan, Suryani. *KonsepKebidanan*. Jakarta : EGC, 2008.
- Sumarahdkk.*PerawatanIbuBersalin*. Yogyakarta :Fitramaya, 2011.
- Nurasiah, Ai. *AsuhanPersalinanNormal BagiBidan*. Bandung : PT RefikaAditama, 2014.
- Varney, Helen dkk, *BukuSakuBidan*, 2001. Varney’s pocket midwife , ed. AlfrinaHany. Jakarta: EGC, 2002.
- Yaze, IgusUlfadanDewi, Ratna.
 “PenatalaksanaanKetubanPecahDinipadaPerempuanHamilUsia 37 Tahun.”
MedulaUnila. Vol. 4 no. 4 (Januari, 2016)
http://jurnal.unila.com/wp-content/uploads/2016/02/Igus_2016_02_09_11_50_19_656pdf
 (Diaksestanggal 5 juni 2017).
- Yulianti, Lia. *AsuhanKebidananPatologiKebidanan*. DKI Jakarta :CV Trans Info Media, 2013.
- Yulifah, RitadanSurachmindari.*KonsepKebidanan*. Jakarta Selatan :SalembaMedika, 2014.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama :Sunarti
Nim : 70400114054
TTL : Takalar07 April 1996
Suku : Makassar
Agama : Islam
Alamat : DusunLantang 1, DesaLantang, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab.
Takalar
Nama orang tua :
Ayah : Syarifuddin
Ibu :Fatmawati

B. RiwayatPendidikan

1. Tahun 2000-2007 SD Negeri15 Lantang
2. Tahun 2007-2010 SMP Negeri4 Takalar
3. Tahun 2010-2013 SMA Negeri 8 Takalar
4. Tahun 2014-2017 UIN Alauddin Makassar