

**PENGARUH EMULGATOR TERHADAP STABILITAS FISIK LOTION
MINYAK NILAM (*Patchouli oil*) DAN UJI EFEK ANTI -NYAMUK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ANITA PUSPITA SARI

NIM 70 100 108 012

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2012

Penyusun,

Anita Puspita Sari
NIM. 70100108012



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Emulgator Terhadap Stabilitas Fisik Lotion Minyak Nilam (*Patchouli oil*) dan Uji Efek Anti Nyamuk” yang disusun oleh Anita Puspita Sari, NIM: 70100108012, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari rabu tanggal 12 September 2012 M yang bertepatan dengan 25 Syawal 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

Makassar, 12 Agustus 2012 M
25 Syawal 1433 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr.dr. H.Rasjidin Abdullah, MPH.,MH. Kes** (.....)

Sekretaris : **Gemy Nastity Handayany, S. Si, M. Si., Apt.** (.....)

Pembimbing I : **Isriany Ismail, S.Si, M.Si., Apt** (.....)

Pembimbing II: **Haeria, S. Si, M. Si** (.....)

Penguji I : **Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M. Si, Apt.** (.....)

Penguji II : **Dr.H.M.Mawardi Djalaluddin,Lc, M.Ag. Ph.D** (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr.dr. H.Rasjidin Abdullah, MPH.,MH. Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang disusun dengan judul “Pengaruh Emulgator Terhadap Stabilitas Fisik Lotion Minyak Nilam (*Patchouli oil*) Dan Uji Efek Anti nyamuk” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, baik itu bersifat teknis maupun non teknis. Namun berkat do'a, motivasi dan kontribusi berbagai pihak, maka kendala-kendala tersebut bisa teratasi dan terkendali dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Basri dan Ibunda Hj. Jumiati yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus sehingga memperlancar penyelesaian skripsi ini dan seluruh keluarga yang terus memberikan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


3. Bapak Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH.,MH.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Fatmawaty Mallappiang, SKM.,M.Kes selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt. selaku Wakil Dekan II sekaligus sebagai penguji kompetensi dan yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi penulis.
6. Bapak Drs.Wahyuddin. G,M.Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Isriany Ismail,S.Si.,M.Si.,Apt. selaku pembimbing pertama yang penuh kasih sayang, sabar, dan pengertian dalam memberikan bimbingan dan arahan serta berbagai bantuan baik secara fisik maupun moril selama penelitian hingga penyusunan akhir skripsi ini.
8. Ibu Haeria,S.Si.,M.Si,. selaku pembimbing kedua yang penuh kasih sayang, sabar, dan pengertian dalam memberikan bimbingan dan arahan serta berbagai bantuan baik secara fisik maupun moril selama penelitian hingga penyusunan akhir skripsi ini.
9. Bapak Dr.HM.Mawardi Djalaluddin,Lc.,M.Ag,Ph.D selaku penguji agama yang memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya skripsi ini.
10. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

11. Para Laboran Laboratorium Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah sabar dalam mendukung penelitian ini. Serta teman seperjuangan angkatan 2008 dan rekan mahasiswa farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin pada umumnya yang telah dan akan terus memberikan semangat serta bantuan baik berupa materi maupun dukungan mental selama penyelesaian skripsi ini.

Makassar, September 2012

Penyusun,

Anita Puspita Sari
NIM: 70100108012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kulit | |
| 1. Fungsi Kulit | 6 |
| 2. Anatomi fisiologi kulit..... | 8 |
| B. Kosmetik | 9 |
| 1. Defenisi Kosmetik | 9 |
| 2. Kosmetik Pelindung | 11 |

| | |
|---|----|
| 3. Lotion..... | 11 |
| 1) Emulgator | 12 |
| 2) Mekanisme Emulgator..... | 14 |
| 3) Sistem Keseimbangan Hidrofilik-Lipofilik | 15 |
| 4) Komposisi Lotion | 16 |
| C. <i>Nyamuk</i> | 20 |
| 1. Morfologi Nyamuk | 20 |
| 2. Siklus Hidup | 23 |
| 3. Pengendalian Terhadap Nyamuk | 24 |
| 4. Insektisida | 25 |
| D. <i>Uraian Tentang Tanaman Nilam</i> | 28 |
| 1. Klasifikasi Tanaman Nilam..... | 28 |
| 2. Deskripsi Tanaman | 28 |
| 3. Kandungan Kimia..... | 29 |
| E. <i>Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat</i> | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. <i>Alat dan Bahan</i> | 34 |
| B. <i>Prosedur Kerja</i> | 34 |
| 1. Penyiapan Sampel | 34 |
| 2. Pembuatan Lotion Dengan Dua Emulgator | 35 |
| 3. Pemeriksaan stabilitas fisik sediaan | 36 |
| 4. Uji Efektifitas Anti nyamuk..... | 38 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. <i>Hasil Penelitian</i> | 40 |
| 1. Evaluasi Sediaan Lotion..... | 40 |
| 2. Uji Iritasi Pada Kulit | 42 |
| 3. Pengujian Efektivitas Anti nyamuk | 43 |
| B. <i>Pembahasan</i> | 45 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------------|----|
| A. <i>Kesimpulan</i> | 53 |
| B. <i>Saran</i> | 53 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
|----------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| LAMPIRAN..... | 58 |
|---------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| RIWAYAT HIDUP | 81 |
|---------------------|----|

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 1. Rancangan Formula Lotion Minyak Nilam | 35 |
| 2. Hasil pengukuran pH sediaan | 40 |
| 3. Hasil pengamatan uji tipe emulsi dan inversi fase | 41 |
| 4. Hasil pengukuran volume kriming | 41 |
| 5. Hasil pengukuran viskositas krim (poise) | 42 |
| 6. Perhitungan uji iritasi pada kulit | 43 |
| 7. Perhitungan % efektifitas anti nyamuk daya proteksi..... | 43 |
| 8. Perhitungan Konsentrasi Surfaktan Anionik dan Nonionik..... | 63 |
| 9. Analisis Statistika Viskositas Formula Lotion Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) | 66 |
| 10. Analisis Varians Viskositas Formula Lotion | 67 |
| 11. Pengaruh Emulgator terhadap % efektifitas anti nyamuk (RAL) | 68 |
| 12. Analisis Varian..... | 69 |
| 13. Analisis Tukey HSD (Uji Beda Nyata Jujur) Efektifitas Anti nyamuk .. | 70 |
| 14. Perbandingan nilai rata-rata | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| 1. Struktur kulit | 8 |
| 2. Nyamuk culex dewasa..... | 22 |
| 3. Sampel tanaman nilam dan minyak nilam | 58 |
| 4. Skema kerja Formulasi Lotion dengan emulgator anionik | 59 |
| 5. Skema kerja Formulasi Lotion dengan emulgator nonionik..... | 60 |
| 6. Skema kerja Pengujian Kestabilan Fisik lotion | 61 |
| 7. Skema uji efektifitas anti nyamuk..... | 62 |
| 8. Gambar Sediaan Lotion sebelum Penyimpanan Dipercepat..... | 71 |
| 9. Gambar Uji Pengenceran Lotion Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat | 72 |
| 10. Gambar Uji Pengenceran Lotion Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat | 73 |
| 11. Pengamatan Uji Metilen Blue Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat | 74 |
| 12. Pengamatan Uji Metilen Blue Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat | 75 |
| 13. Uji Tetes Terdispersi Lotion pada Lotion Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat | 76 |

| | |
|---|----|
| 14. Uji Tetes Terdispersi Lotion Pada Kondisi Setelah Penyimpanan | |
| Dipercepat | 77 |
| 15. Pengujian Volume Kriming pada Kondisi Sebelum Penyimpanan | |
| Dipercepat | 78 |
| 16. Uji Volume Kriming Pada Kondisi Setelah Penyimpanan | |
| Dipercepat | 79 |
| 17. Histogram Viskositas Lotion (poise) Sebelum dan Setelah | |
| Kondisi penyimpanan Dipercepat | 80 |



ABSTRAK

Nama : Anita Puspita Sari
Nim : 70100108012
Judul Skripsi : “Pengaruh Emulgator Terhadap Stabilitas Fisik Lotion Minyak Nilam (*Patchouli oil*) Dan Uji Efek Anti nyamuk”

Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh emulgator terhadap stabilitas fisik lotion minyak nilam (*Patchouli oil*) dan uji efek anti nyamuk. Lotion dibuat dengan menggunakan dua jenis emulgator tipe minyak dalam air (m/a) yaitu emulgator Nonionik (Tween 60 dan Span 60) konsentrasi 2%, 3%, dan 4% dan emulgator Anionik (Asam stearat dan Tea) konsentrasi 2%, 3%, dan 4%. Pengujian efektifitas anti nyamuk dilakukan dengan menghitung jumlah nyamuk yang menggigit dan % daya proteksi terhadap nyamuk. Uji stabilitas sediaan lotion ditentukan berdasarkan pengamatan terhadap perubahan pH, tipe emulsi, viskositas, volume kriming dan tetes disperse sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat pada suhu 5⁰C dan 35⁰C. Analisis statistik rancangan acak lengkap taraf kepercayaan 5% dan 1% terhadap kontrol 0% dan sediaan menunjukkan bahwa jumlah emulgator mempengaruhi efektifitas anti nyamuk sediaan yang mengandung minyak nilam (*Patchouli oil*).

ABSTRACT

Author Name : Anita Puspita Sari
NIM : 70100107012
Thesis title : **Influence Surfactant to Stability Test of Physical Activity Lotion Nilam oil (*Patchouli oil*) and Test Activites of repellent.**

A research on the use influence surfactant to stability test of physical activity nilam oil (*Patchouli oil*) and test activites of repellent. The lotion was made in two surfactant tipes oil in water (m/a) is surfactant nonionic (tween 60 and span 60) concentration of 2%, 3%, 4% and surfactant anionic (stearic acid and triethanolamine) concentration of 2%, 3%, 4%. Testing is done repellent activity with show how much counting mosquito nipping and % energy protection to mosquito. Test the stability of lotion is determined by observing changes in pH, viscosity, volume criming, test before and after accelerated storage at a temperature of 5⁰C and 35⁰ C. Statistical analysis of randomized block design confidence level of 5% and 1% of the control and formulation the results showed that surfactant concentration influence of repellent activity formulation from lotion nilam oil (*Patchouli oil*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki iklim tropis yang heterogen dan rentan terhadap dampak perubahan iklim regional dan global. Perubahan iklim makro dan mikro dapat mempengaruhi penyebaran penyakit menular, termasuk penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Peningkatan kelembaban dan curah hujan berbanding lurus dengan peningkatan kepadatan nyamuk, sedangkan suhu mempunyai batas optimum bagi perkembangbiakan nyamuk antara 25-27°C (Epstein et al,1998: 409-17; Martens,1997:103-116).

Penyakit yang disebarkan nyamuk sangat berbahaya. Oleh karena itu, ada baiknya kita mencegah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk tersebut dengan penggunaan sediaan anti nyamuk. Penggunaan antinyamuk merupakan tindakan yang praktis dan ekonomis untuk mencegah penyakit-penyakit yang dibawa oleh nyamuk ke manusia, tetapi kebanyakan formula produk antinyamuk yang beredar di pasaran mengandung DEET (N,N-dietil-m-toluamid), dilaporkan memiliki efek samping seperti gejala hipersensitifitas, iritasi dan urtikaria (Qiu et al, 1998:12-27).

Untuk menghindari efek samping yang berasal dari bahan kimia sebagai komponen utama dari repelan, dapat diganti dengan bahan-bahan alami yang berasal dari alam, selain itu banyak pula tanaman yang mempunyai efek sebagai penolak nyamuk. Tumbuhan penghasil insektisida nabati adalah kelompok tumbuhan yang menghasilkan pestisida pengendali hama insekta. Beberapa jenis tanaman dapat digunakan secara langsung yaitu

dengan cara meremas-remas daun atau bunganya kemudian digosokkan ke kulit agar terhindar dari gigitan nyamuk/serangga lain (Kardinan, 2004:52-53).

Minyak nilam (*Patchouli oil*) memiliki bau khas minyak nilam dan sifatnya bisa tahan lama. Bahkan, aroma atau bau wanginya tetap terasa sampai seluruh minyaknya menguap. Oleh karena itu, minyak nilam banyak dipakai dalam berbagai industri kimia dan kosmetika atau kecantikan. Bau khas yang diciptakan dalam suatu campuran dengan minyak nilam menambah deretan manfaat minyak nilam dewasa ini (Taufiq,2008:18-20).

Ada beberapa bahan kimia yang dapat menolak nyamuk dan tidak disukai nyamuk diantaranya adalah zat pahit glikosid, alkaloida, linalol, geraniol, eugenol. Tanaman nilam (*Pogostemon cablin* Benth) mempunyai kadar dan komposisi minyak yang cukup tinggi dan bagus, salah satu kandungan yang terdapat di dalam minyak nilam adalah eugenol, bahan kimia ini diduga dapat menolak nyamuk. Minyak nilam dapat bercampur dengan minyak eteris yang lain, mudah larut dalam alkohol dan sukar menguap, karena sifatnya itulah minyak nilam digunakan sebagai fiksatif atau pengikat bahan-bahan pewangi lain (Sulaswaty, 2001:23).

Beberapa bentuk sediaan obat yang dimaksudkan untuk pemakaian pada kulit seperti salep, krim lotion, larutan topikal dan tinktur menggambarkan bentuk sediaan dermatologi yang paling sering dipakai. Preparat yang digunakan pada kulit antara lain untuk efek fisik yaitu kemampuan bekerja sebagai pelindung kulit, pelembut, pelembab dan lain-lain, atau untuk efek khusus dari bahan obat yang ada. Preparat bebas, sering mengandung campuran dari bahan obat yang digunakan dalam pengobatan kondisi tertentu seperti infeksi kulit, gatal-gatal, luka bakar, sengatan, dan

gigitan serangga, kutu air, mata ikan, penebalan kulit dan keras, kutil, ketombe, jerawat, penyakit kulit kronis dan eksim (Ansel, 1989:489).

Lotion adalah emulsi cair yang terdiri dari fase minyak dan fase air yang distabilkan oleh emulgator, mengandung satu atau lebih bahan aktif di dalamnya. Lotion dimaksudkan untuk pemakaian luar kulit sebagai pelindung. Konsistensi yang berbentuk cair memungkinkan pemakaian yang cepat dan merata pada permukaan kulit, sehingga mudah menyebar dan dapat segera kering setelah pengolesan serta meninggalkan lapisan tipis pada permukaan kulit (Lachman, 1994: 1119-1120).

Emulgator adalah bahan aktif permukaan yang mengurangi tegangan antarmuka antara minyak dan air dan mengelilingi tetesan-tetesan terdispersi sebagai lapisan kuat yang mencegah koalesensi fase terdispersi dan pemisahan fase (Parrot,1974). Zat pengemulsi yang digunakan dapat tunggal, campuran, atau kombinasi dengan zat tambahan lain (Martin, 1993: 1143-1164).

Pada umumnya sediaan kosmetik dibuat dalam bentuk emulsi m/a karena alasan harga yang lebih murah, lebih mudah dibuat, lebih enak dipakai karena tidak begitu lengket, dan lebih cepat menyebar ke permukaan kulit dan lebih dingin. Beberapa emulsifier yang digunakan dalam emulsi m/a antara lain natrium lauril sulfat, trietanolamin stearat, self emulsifying glyceryl monostearate dan lain sebagainya (Wasitaatmadja, 1997:111-116).

Dalam memformulasi lotion minyak nilam, diperlukan pemilihan jenis dan konsentrasi emulgator yang digunakan, mengingat ketepatan jenis dan konsentrasi emulgator dapat menjamin stabilitas sediaan emulsi. Disamping itu, variasi konsentrasi dari emulgator perlu dicoba karena belum diketahui HLB butuh dari minyak nilam yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan mempertimbangkan kandungan senyawa dari minyak nilam dan khasiatnya, serta kemungkinan untuk menyiapkannya dalam bentuk sediaan topikal maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Emulgator Terhadap Stabilitas Fisik Lotion Minyak Nilam (*Patchouli oil*) Dan Uji Efek Anti nyamuk dengan menggunakan emulgator anionik dan nonionik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh emulgator anionik dan nonionik terhadap stabilitas fisik sediaan lotion minyak nilam (*Patchouli oil*)?
2. Apakah Minyak Nilam (*Patchouli oil*) mempunyai efek anti nyamuk setelah diformulasikan dalam sediaan lotion dengan menggunakan emulgator anionik dan nonionik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh emulgator terhadap efektivitas anti nyamuk lotion minyak nilam (*Patchouli oil*).
2. Untuk memperoleh formula lotion minyak nilam dengan menggunakan emulgator anionik dan nonionik yang memiliki efektivitas sebagai anti nyamuk.

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan informasi pada masyarakat tentang manfaat minyak nilam (*Patchouli oil*) yang lainnya.

2. Memberikan informasi alternatif bahan baru dan alami sebagai insektisida pengendali vektor nyamuk.
3. Mendapatkan emulgator terbaik dalam pembuatan lotion minyak nilam (*Patchouli oil*).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kulit

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, selain peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan infeksi dari luar. Kulit merupakan kelenjar holokrin yang besar (Tranggono, 2007: 11-12).

1. Fungsi kulit secara umum (Galuh, 2009) :

a. Fungsi proteksi

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur.

b. Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitu pun yang larut lemak.

c. Fungsi ekskresi

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan amonia.

d. Fungsi persepsi

Kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin oleh badan krause. Rabaan diperankan oleh taktil meissner. Terhadap tekanan diperankan oleh badan *vates paccini*.

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit.


f. Fungsi pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi syaraf.

g. Fungsi keratinisasi

Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama yaitu keratinosit, sel langerhans dan melanosit.

2. Anatomi fisiologi kulit.



Gambar 1. Struktur Kulit (Galuh, 2009)

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas 3 lapisan yaitu:

a. Lapisan epidermis atau kutikula (Tranggono, 2007: 34-46) :

Bagian-bagian epidermis dapat dilihat dengan mikroskop yaitu terdiri dari:

- 1) Stratum korneum (Lapisan tanduk), selnya tipis, datar seperti sisik dan terus menerus dilepaskan.
- 2) Stratum lucidum (Lapisan jernih), selnya mempunyai batas tegas tetapi tidak ada intinya.
- 3) Stratum granulosum (Lapisan berbutir-butir), selapis sel yang jelas tampak berisi inti dan juga granulosum.
- 4) Stratum spinosum (Lapisan malphigi), yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel yang satu dengan yang lainnya di dalam lapisan ini, sehingga setiap sel seakan-akan berduri.
- 5) Stratum germinativum (Lapisan basal), yaitu sel yang terus menerus memproduksi sel epidermis baru. Sel ini disusun dengan teratur,

berderet dengan rapat dan membentuk lapisan pertama atau lapisan dua sel pertama dari sel basal yang duduk di atas papiladermis.

b. Lapisan dermis.

Korium atau dermis tersusun atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang elastik. Pada permukaan dermis tersusun papil-papil kecil yang berisi rantingranting pembuluh darah kapiler. Ujung akhir syaraf sensorik yaitu puting peraba yang terletak di dalam dermis.

c. Lapisan subkutis

Lapisan subkutis terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh trabekula fibrosa.

B. Kosmetik

1. Defenisi kosmetik

Kosmetik berasal dari kata Yunani *kosmetikos* yang berarti keterampilan menghias, mengatur. Defenisi dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/Menkes/Permenkes1998 adalah sebagai berikut :

“Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (Epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”. Dalam defenisi kosmetik di atas, yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit adalah sediaan tersebut seyogyanya tidak mempengaruhi struktural dan faal kulit.

Namun bila bahan kosmetik itu adalah bahan kimia, meskipun berasal dari bahan alam dan organ tubuh yang dikenai adalah kulit, maka dalam hal kosmetik itu akan menyebabkan reaksi-reaksi perubahan faal kulit. Karena itu pada tahun 1955 Lubowé menciptakan istilah "cosmedics" yang merupakan gabungan dari kosmetik dan obat yang sifatnya dapat mempengaruhi faal kulit secara positif, namun bukan obat (Tranggono, 2007: 22).

Berdasarkan kegunaan dan cara bekerjanya kosmetika dibagi dalam kelompok (Graf, 2005):

- a. Kosmetika pemeliharaan dan perawatan kulit terdiri dari :
 - 1) Pembersih (*cleansing*) : pembersih dengan bahan dasar air (*face tonic, skin freshener* dan lain-lain), pembersih dengan bahan dasar minyak (*cleansing cream, cleansing milk* dan lain-lain), pembersih dengan bahan dasar padat (*masker*).
 - 2) Pelembab (*moisturizing*) : *cold cream, night cream, moisturizing base make up* dan lain-lain.
 - 3) Pelindung (*protecting*) : *sunscreen, foundation cream*, dan lain-lain.
 - 4) Penipis (*thinning*) : bubuk *peeling* dan lain-lain.
- b. Kosmetika rias (*decorated cosmetics*) : kosmetika yang dipakai untuk *make up* seperti: pemerah pipi, pemerah bibir, *eye shadow*, dan lain-lain.
- c. Kosmetika wangi-wangian : parfum, *cologne*, deodoran, *vaginal spray, after shave* dan lain-lain.

2. Kosmetik pelindung

Kosmetik pelindung adalah kosmetik yang dikenakan pada kulit yang sudah bersih dengan tujuan melindungi kulit dari berbagai pengaruh lingkungan yang merugikan kulit.

Menurut tujuan spesifiknya, masing-masing kosmetik pelindung dapat dibagi dalam kelompok berikut (Tranggono, 2007: 81) :

- a. Preparat yang melindungi kulit dari bahan-bahan kimia (bahan kimia yang membakar, larutan detergen, urin yang sudah terurai, dan lain-lain).
- b. Preparat untuk melindungi kulit dari debu, kotoran, bahan pelumas, dan lain-lain.
- c. Preparat untuk melindungi kulit dari benda fisik yang membahayakan kulit (sinar ultraviolet, panas).
- d. Preparat yang melindungi kulit dari luka secara mekanis (dalam bentuk kosmetik pelumas).
- e. Preparat untuk mengusir serangga agar tidak mendekati kulit.

3. Lotion

Lotion adalah sediaan cair berupa suspensi atau dispersi, digunakan sebagai obat luar, dapat berupa suspensi zat padat dalam bentuk serbuk halus dengan bahan pesuspensi yang cocok atau emulsi tipe minyak dalam air dengan surfaktan yang cocok. Pada penyimpanan mungkin terjadi pemisahan. Dapat ditambahkan zat warna, zat pengawet dan zat pewangi yang cocok (Ditjen POM, 1979).

Emulsi adalah suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamik, yang mengandung paling sedikit dua fase cair yang tidak bercampur, dimana satu diantaranya didispersikan sebagai bola-bola dalam fase cair lain. Sistem dibuat stabil dengan adanya zat pengemulsi. Sifat zat pengemulsi, dikenal dengan karakteristik keseimbangan hidrofil-lipofil (HLB), yakni sifat polar-nonpolar dari pengemulsi. Sifat ini akan menentukan tipe emulsi yang dihasilkan apakah akan dihasilkan emulsi minyak dalam air (m/a) atukah air dalam minyak (a/m). Zat pengemulsi

yang digunakan dapat tunggal, campuran, atau kombinasi dengan zat tambahan lain (Martin, 1993: 1143-1164).

Zat pengemulsi (emulgator) merupakan komponen yang paling penting agar memperoleh emulsi yang stabil. Semua emulgator bekerja dengan membentuk film (lapisan) disekeliling butir-butir tetesan yang terdispersi dan film ini berfungsi untuk mencegah terjadinya koalesensi dan terpisahnya cairan dispersi sebagai fase terpisah. Hal yang paling utama bagi emulgator adalah kemampuannya untuk menghasilkan dan menjaga stabilitas emulsi dalam penyimpanan dan pemakaian (Anief, 2003: 132).

a. Emulgator

Emulgator adalah bahan aktif permukaan yang mengurangi tegangan antarmuka antara minyak dan air dan mengelilingi tetesan-tetesan terdispersi dalam lapisan kuat yang mencegah koalesensi dan pemisahan fase terdispersi (Parrot,1974). Berdasarkan struktur kimianya emulgator diklasifikasikan menjadi (Gennaro,1990; Lieberman,1998) :

- 1) Emulgator alam
 - a) Emulgator alam yang membentuk film multimolekuler, misalnya akasia dan gelatin.
 - b) Emulgator alam yang membentuk film monomolekuler misalnya lesitin, kolesterol
 - c) Emulgator yang membentuk film berupa partikel padat misalnya bentonit, vegum.
- 2) Emulgator sintetik atau surfaktan yang membentuk film monomolekuler, kelompok bahan aktif permukaan ini dibagi menjadi anionik, kationik, dan nonionik. Tergantung dari muatan yang dimiliki oleh surfaktan.

a) Anionik

Surfaktan ini memiliki muatan negatif. Contoh bahannya yaitu kalium, natrium, dan garam ammonium dari asam laurat dan asam oleat yang larut dalam air dan merupakan bahan pengemulsi M/A yang baik. Bahan ini mempunyai rasa yang kurang menyenangkan dan mengiritasi saluran cerna sehingga dibatasi penggunaannya hanya untuk bagian luar.

b) Kationik

Aktifitas permukaan bahan kelompok ini terletak pada kation yang bermuatan positif. pH dari sediaan emulsi dengan pengemulsi kationik yaitu antara 4-8. rentang pH ini juga menguntungkan karena masuk kedalam pH normal kulit. Contohnya yaitu senyawa ammonium kuartener.

c) Nonionik

Surfaktan yang luas penggunaannya sebagai bahan pengemulsi karena memiliki keseimbangan hidrofilik dan lipofilik dalam molekulnya. Tidak seperti anionik dan kationik, emulgator nonionik tidak dipengaruhi perubahan pH dan penambahan elektrolit. Contoh yang paling banyak digunakan yaitu ester gliseril, ester asam lemak sorbitan (span) dan turunan polioksietilennya (tween).

b. Mekanisme Emulgator

Berdasarkan mekanisme kerjanya, emulgator dibagi menjadi beberapa bagian yaitu (Gennaro, 1990):

1) Adsorpsi monomolekuler

Surfaktan atau amfibil menurunkan tegangan antarmuka karena teradsorpsi pada antarmuka minyak air membentuk film

monomolekuler. Film ini membungkus tetes terdispersi dengan suatu lapisan tunggal yang seragam berfungsi mencegah bergabungnya tetesan, idealnya film ini harus fleksibel sehingga membentuk kembali jika pecah atau terganggu.

2) Adsorpsi multimolekuler

Koloid hidrofil terhidrasi dapat dianggap sebagai bahan aktif permukaan. Karena terdapat antarmuka minyak-air tetapi berbeda dengan surfaktan sintetik. Koloid hidrofil tidak menyebabkan penurunan tegangan antarmuka yang nyata tetapi membentuk film multi-molekuler pada antarmuka tetesan. Aksi sebagai emulgator terutama disebabkan oleh film yang dibentuknya. Sebagai emulgator terutama disebabkan oleh film yang dibentuknya kuat sehingga mencegah koalesensi. Film multimolekuler ini bersifat hidrofilik sehingga cenderung membentuk minyak dalam air.

3) Adsorpsi partikel padat

Partikel padat yang dibagi halus yang terbasahi oleh minyak dan air dapat bertindak sebagai emulgator membentuk suatu film partikel halus di sekeliling tetes terdispersi pada antarmuka sehingga mencegah koalesensi.

c. Sistem keseimbangan hidrofilik-lipofilik

Hydrophilic-Lipophilic Balance adalah harga yang harus dimiliki oleh sebuah emulgator sehingga pertemuan antara fase lipofil dengan air dapat menghasilkan emulsi dengan tingkat dispersitas dan stabilitas yang optimal (Voight, 1995: 407).

Suatu emulgator dengan HLB lebih tinggi adalah lebih mudah larut dalam air dan akan membentuk tipe emulsi M/A. Sebaliknya

surfaktan dengan HLB rendah akan membentuk emulsi tipe A/M serta lebih mudah larut dalam minyak (Anief, 2003: 132).

Emulgator sering dikombinasikan untuk menggunakan emulsi yang lebih baik yaitu emulgator dengan keseimbangan hidrofilik dan lipofilik yang diinginkan, melainkan kestabilan dan sifat kohesi dari lapisan antarmuka serta mempengaruhi konsistensi dan penampakan emulsi (Gennaro, 1990)

Emulgator dengan nilai HLB dibawah 7 umumnya menghasilkan emulsi air dalam minyak (A/M), sedangkan emulgator dengan nilai HLB diatas 7 umumnya menghasilkan emulsi minyak dalam air. Tetapi sistem HLB tidak memberikan indikasi tentang konsentrasi yang digunakan sebagai aturan. Emulgator dengan konsentrasi 2% adalah jumlah yang cukup dalam suatu formula walaupun konsentrasi yang lebih kecil dapat memberikan hasil yang lebih baik. Jika konsentrasi emulgator lebih dari 5% maka emulgator akan menjadi bagian utama dari formula dan hal ini bukanlah tujuan dari penggunaan emulgator (Martin, 1971: 1143).

d. Komposisi lotion

1) Emulgator

Zat pengemulsi adalah bahan yang memungkinkan tercampurnya semua bahan- bahan secara merata, misalnya gliserin monostearat, trietanolamin (Sitompul, 2010: 12).

a) Trietanolamin (TEA)

Trietanolamina adalah campuran dari trietanolamina, dietanolamina dan monoetanolamina. Rumus molekulnya $\text{CCO,CH}_2\text{CH}_3$ dan berat molekulnya 149,1. Mengandung tidak

kurang dari 99,0 % dan tidak lebih dari 107,4 % dihitung terhadap zat anhidrat sebagai trietanolamina. $N(C_2H_4OH)_3$. Pemerian cairan kental; tidak berwarna hingga kuning pucat; bau lemah mirip amoniak; higroskopik. Kelarutan mudah larut dalam air dan dalam *etanol (95%) P*; larut dalam *kloroform*. Incompabilitasnya adalah TEA akan bereaksi dengan asam untuk TEA bereaksi dengan tembaga untuk membentuk garam. Konsentrasi yang digunakan sebagai pengemulsi 2-4% trietanolamin dan 2-5 kali pada asam lemak (Kibbe, 2000).

b) Asam stearat

Rumus molekul $C_{18}H_{36}O_2$, berwarna putih atau putih agak kekuningan, kristal putih atau kekuningan, sedikit berbau dan rasa menyerupai lemak. Asam stearat umumnya digunakan dalam sediaan oral dan topikal. Dalam sediaan topikal asam stearat digunakan sebagai emulgator atau sebagai pelarut dengan konsentrasi 1-20%. Dalam sediaan krim biasanya dikombinasi dengan trietanolamin (Rowe, 2009: 697).

c) Tween 60 (Polioxyethilen 20 Sorbitan Monooleat)

Berbentuk cairan berwarna kuning, memiliki bau khas dan hangat, rasa agak pahit. Tween adalah surfaktan nonionik yang secara luas digunakan sebagai emulgator fase minyak dalam sediaan emulsi. Tween umumnya digunakan dalam sediaan kosmetik dan produk makanan. Biasanya digunakan sebagai emulgator tunggal emulsi minyak dalam air dengan konsentrasi 1-15% dan dikombinasi dengan emulgator hidrofilik dengan konsentrasi 1-10% (Rowe, 2009: 550).

d) Span 60

Tween 60 banyak digunakan dalam sediaan kosmetik produk makanan dan sediaan farmasi sebagai emulgator nonionik fase minyak. Biasanya digunakan untuk sebagai emulgator untuk membentuk krim, emulsi dan salep untuk aplikasi topikal. Tween sering dikombinasi dengan span untuk membentuk emulsi dengan konsistensi yang bervariasi. Biasanya digunakan sebagai emulgator tunggal emulsi minyak dalam air dengan konsentrasi 1-15% dan dikombinasi dengan emulgator hidrofilik dengan konsentrasi 1-10% (Rowe, 2009: 676).

2) Penstabil

a) Setil alkohol

Rumus molekul $C_{16}H_{34}O$, umumnya digunakan dalam kosmetik dan sediaan farmasi seperti emulsi, krim dan salep. Dalam emulsi minyak dalam air (m/a) setil alkohol dapat meningkatkan stabilitas dari emulsi. Biasanya digunakan pada konsentrasi 2-5%. (Rowe, 2009: 155).

3) Emolien

Zat yang paling penting untuk bahan pelembut kulit adalah turunan dari lanolin dari derivatnya, hidrokarbon, asam lemak, lemak alkohol.

a) Lanolin

Zat berupa lemak, liat, lekat, kuning muda atau kuning pucat agak tembus cahaya, bau lemah dan khas. Praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol (95%) P, mudah larut dalam

kloroform P dan eter P. Adeps lanae umumnya digunakan dalam sediaan topikal dan kosmetik.

b) Paraffin cair

Cairan kental transparan, tidak berwarna, bebas dari fluoresensi pada cahaya matahari. Praktis tidak berasa dan tidak berbau ketika dingin dan mempunyai bau lemah ketika dipanaskan. Praktis tidak larut dalam etanol (95%), gliserin dan air. Larut dalam aseton benzen, kloroform, karbondisulfid, eter dan eter minyak tanah. berfungsi sebagai emolient pelarut (Kibbe, 2000).

4) Humektan

Humektan adalah suatu zat yang dapat mengontrol perubahan kelembaban diantara produk dan udara, baik dalam kulit maupun diluar kulit. Biasanya bahan yang digunakan adalah gliserin yang mampu menarik air dari udara dan menahan air agar tidak menguap (Balsam, 1972: 179-218).

a) Gliserin

Tidak berwarna, tidak berbau, cairan kental higroskopik, berasa manis. Dalam sediaan farmasi dan kosmetik gliserin digunakan sebagai humektan dan emolien dengan konsentrasi tidak lebih dari 30%.

5) Antioksidan

Alfa tokoferol (Kibbe, 2000)

Rumus molekul : $C_{29}H_{50}O_2$

Berupa cairan seperti minyak, kuning jernih, tidak berbau atau sedikit berbau. Larut dalam etanol (95%) P dan dapat bercampur dengan eter P, minyak nabati dan kloroform, tidak stabil.

6) Pengawet

Pengawet adalah bahan yang dapat mengawetkan kosmetik dalam jangka waktu selama mungkin agar digunakan lebih lama. Pengawet dapat bersifat antikuman sehingga menangkai terjadinya tengik oleh aktivitas mikroba sehingga kosmetik menjadi stabil. Selain itu juga dapat bersifat antioksidan yang dapat menangkai terjadinya oksidasi (Sitompul, 2010: 12).

a) Propil paraben

Serbuk putih atau kristal berwarna putih, tidak berbau dan berasa. Secara luas digunakan sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik produk makanan dan sediaan farmasi. Dapat digunakan sebagai pengawet tunggal atau dikombinasi dengan turunan paraben lainnya dan umumnya digunakan dalam sediaan kosmetik. Efektif pada pH 4-8 dan efektifitas menurun dengan peningkatan pH, lebih aktif terhadap gram positif dibanding gram negatif (Rowe, 2009: 596).

b) Metil paraben

Metil paraben mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,0% $C_8H_8O_3$. Rumus molekulnya : $C_8H_8O_3$ dan berat molekulnya : 76,09. Pemerian serbuk hablur halus, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Kelarutan larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol (95%) P dan dalam 3 bagian aseton p, mudah larut dalam eter p dan dalam larutan alkali hidroksida, larut dalam 60 bagian gliserol p panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas, jika

didinginkan larutan tetap jernih. Range metil paraben sebagai pengawet antiseptik dan sediaan farmasi lainnya adalah 0,02-0,3%. Metil paraben disimpan dalam wadah, larutan berair pada pH 3-6, dapat disterilkan pada 120°C selama 20 menit mengubah posisinya. Fungsinya adalah preservatif dan zat pengawet (Kibbe, 2000).

C. Nyamuk (*Mosquito*)

1. Morfologi

Nyamuk adalah golongan serangga yang termasuk suku Culicidae, ordo Diptera yang berbentuk langsing, baik tubuhnya, sayap maupun *proboscis*nya. *Proboscis* adalah alat untuk menusuk dan mengisap cairan makanan atau darah. Nyamuk tersebar luas di seluruh dunia mulai dari daerah kutub sampai daerah tropis, dapat dijumpai 5.000 m di atas permukaan laut sampai kedalaman 1.500 m di bawah permukaan tanah di daerah pertambangan. Nyamuk dewasa hidup di udara, telur diletakkan di air sedangkan larva dan pupa hidup di dalam air (*aquatic*). Tempat berkembang biak (*Breeding place*) adalah air yang sangat bervariasi jenisnya (Levine, 1994: 361).

Dalam perkembangan biakan nyamuk selalu memerlukan tiga macam tempat yaitu tempat berkembang biak (*breeding places*), tempat untuk mendapatkan unpan/darah (*feeding places*) dan tempat untuk beristirahat (*reesting palces*). Nyamuk mempunyai tipe *breeding palces* yang berlainan seperti *Culex* dapat berkembang di sembarangan tempat air, sedangkan *Aedes* hanya dapat berkembang biak di air yang cukup bersih dan tidak beralaskan tanah langsung, *Mansonia* senang berkembang biak di kolam-

kolam, rawa-rawa danau yang banyak tanaman airnya dan Anopheles bermacam breeding placec, sesuai dengan jenis anophelesnya.

Waktu keaktifan mencari darah dari masing -masing nyamuk berbeda –beda, nyamuk yang aktif pada malam hari menggigit, adalah anopheles dan culex sedangkan nyamuk yang aktif pada siang hari menggigit yaitu Aedes. Khusus untuk anopheles, nyamuk ini bila menggigit mempunyai perilaku bila siap menggigit langsung keluar rumah. Pada umumnya nyamuk yang menghisap darah adalah nyamuk betina. Biasanya setelah nyamuk betina menggigit orang/hewan, nyamuk tersebut akan beristirahat selama 2-3 hari, misalnya pada bagian dalam rumah sedangkan diluar rumah seperti gua, lubang lembab, tempat yang berwarna gelap dan lain-lain merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk beristirahat.



Gambar 2. nyamuk culex dewasa (Borrordkk.1992)

Klasifikasi nyamuk *Culex quinquefasciatus* menurut Borrordkk (1992) :

Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Subkelas : Pterigota

Ordo : Diptera

Famili : Culicidae

Genus : Culex

Spesies : *Culex quinquefasciatus*

Nyamuk *Culex quinquefasciatus* merupakan perantara penyakit filariasis yang disebabkan oleh cacing *Wuchereria bancrofti*. Selain dari jenis ini masih ada beberapa spesies lagi yang bisa menjadi inang dari cacing *Wuchereria bancrofti* antara lain anggota dari Anopheles, Aedes, Psorophora, dan Mansonia.

Nyamuk *C. quinquefasciatus* memiliki tubuh berwarna kecokelatan, *proboscis* berwarna gelap tetapi kebanyakan dilengkapi dengan sisik berwarna lebih pucat pada bagian bawah, *scutum* berwarna kecokelatan dan terdapat warna emas dan keperakan di sekitar sisiknya. Sayap berwarna gelap, kaki belakang memiliki *femur* yang berwarna lebih pucat, seluruh kaki berwarna gelap kecuali pada bagian persendian. Nyamuk *C. quinquefasciatus* bisa hidup baik di dalam maupun luar ruangan (Lestari, 2010).

2. Siklus hidup

Nyamuk sejak telur hingga menjadi nyamuk dewasa, sama dengan serangga yang mengalami tingkatan (*stadia*) yang berbeda-beda. Dalam siklus hidup nyamuk terdapat 4 *stadia* dengan 3 stadium berkembang di dalam air dari satu stadium hidup di alam bebas (Nurmaini, 2003: 2-3) :

a. Nyamuk dewasa

Nyamuk jantan dan betina dewasa perbandingan 1 : 1, nyamuk jantan keluar terlebih dahulu dari kepompong, baru disusul nyamuk betina, dan nyamuk jantan tersebut akan tetap tinggal di dekat sarang, sampai nyamuk betina keluar dari kepompong, setelah jenis betina keluar, maka nyamuk jantan akan langsung mengawini betina sebelum mencari darah. Selama hidupnya nyamuk betina hanya sekali

kawin. Dalam perkembangannya telur tergantung kepada beberapa faktor antara lain temperatur dan kelembaban serta spesies dari nyamuk.

b. Telur nyamuk

Nyamuk biasanya meletakkan telur di tempat yang berair, pada tempat yang keberadaannya kering telur akan rusak dan mati. Kebiasaan meletakkan telur dari nyamuk berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Nyamuk anopeles akan meletakkan telurnya dipermukaan air satu persatu atau bergerombolan tetapi saling lepas, telur anopeles mempunyai alat pengapung. Nyamuk culex akan meletakkan telur diatas permukaan air secara bergerombolan dan bersatu berbentuk rakit sehingga mampu untuk mengapung. Nyamuk Aedes meletakkan telur dan menempel pada yang terapung diatas air atau menempel pada permukaan benda yang merupakan tempat air pada batas permukaan air dan tempatnya. Sedangkan nyamuk mansonina meletakkan telurnya menempel pada tumbuhan-tumbuhan air, dan diletakkan secara bergerombol berbentuk karangan bunga. Stadium telur ini memakan waktu 1-2 hari.

c. Jentik nyamuk

Pada perkembangan stadium jentik, adalah pertumbuhan dan melengkapi bulu-bulunya, stadium jentik memerlukan waktu 1 minggu. Pertumbuhan jentik dipengaruhi faktor temperatur, nutrisi, dan tidaknya binatang predator.

d. Kepompong

Merupakan stadium terakhir dari nyamuk yang berada di dalam air, pada stadium ini memerlukan makanan dan terjadi pembentukan

sayap hingga dapat terbang, stadium kepompong memakan waktu lebih kurang 1 -2 hari.

3. Pengendalian terhadap nyamuk

Bionomik sangat penting diketahui dalam kegiatan tindakan pemberantasan misalnya dalam pemberantasan nyamuk dengan insectisida kita tidak mungkin melaksanakannya, bilamana kita belum mengetahui kebiasaan hidup dari nyamuk, terutama yang menjadi vektor dari satu penyakit. Pada hakekatnya serangga sebagai makhluk hidup mempunyai bermacam-macam kebiasaan, adapun yang perlu diketahui untuk pemberantasan/pengendalian misalnya (Nurmaini, 2003: 2-3) :

- a. Kebiasaan yang berhubungan dengan perkawinan/mencari makan, dan lamanya hidup.
 - b. Kebiasaan kegiatan diwaktu malam, dan perputaran menggigitnya.
 - c. Kebiasaan berlindung diluar rumah dan di dalam rumah.
 - d. Kebiasaan memilih mangsa
 - e. Kebiasaan yang berhubungan dengan iklim, suhu, kelembaban dll.
- Kebiasaan di dalam rumah atau di luar rumah yang berhubungan dengan penggunaan.

4. Insektisida

Insektisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk memberantas serangga. Berdasarkan atas stadium serangga yang dibunuhnya, maka insektisida dibagi menjadi imagosida yang ditujukan pada serangga dewasa, larvasida yang ditujukan kepada larva serangga dan ovosida yang ditujukan untuk membunuh telurnya. Insektisida dapat membunuh serangga dengan dua mekanisme, yaitu dengan meracuni makanannya (tanaman) dan dengan langsung meracuni serangga tersebut.

Menurut cara masuknya insektisida ke dalam tubuh serangga dibedakan menjadi 3 kelompok sebagai berikut (Soedarto, 1990: 58-61):

a. Racun Lambung

Racun lambung adalah insektisida yang membunuh serangga sasaran dengan cara masuk ke pencernaan melalui makanan yang mereka makan. Insektisida akan masuk ke organ pencernaan serangga dan diserap oleh dinding usus kemudian ditranslokasikan ke tempat sasaran yang mematikan sesuai dengan jenis bahan aktif insektisida. Beberapa tempat sasaran itu seperti: menuju ke pusat syaraf serangga, menuju ke organ-organ respirasi, meracuni sel-sel lambung dan sebagainya. Dalam hal ini serangga harus memakan tanaman yang sudah disemprot insektisida yang mengandung residu dalam jumlah yang cukup untuk membunuh.

b. Racun Kontak

Racun kontak adalah insektisida yang masuk ke dalam tubuh serangga melalui kulit, celah/lubang alami pada tubuh (*trachea*) atau langsung mengenai mulut serangga. Serangga akan mati apabila bersinggungan langsung (kontak) dengan insektisida tersebut. Kebanyakan racun kontak juga berperan sebagai racun lambung.

c. Racun Pernafasan

Racun pernafasan adalah insektisida yang masuk melalui *trachea* serangga dalam bentuk partikel mikro yang melayang di udara. Serangga akan mati bila menghirup partikel mikro insektisida dalam jumlah yang cukup. Kebanyakan racun pernafasan berupa gas, asap, maupun uap dari insektisida cair. Berdasarkan cara kerjanya, insektisida dapat dibedakan atas (Munaf, 1997: 19-21) :

1) Insektisida golongan Antikolinesterase

Golongan ini terdiri dari:

- a) Organofosfat seperti Parathion, Malathion, Systox, HETP, Diazinon, Diklorvos, dan lain-lain.
- b) Golongan Karbamat seperti Carbaryl Aldicarb, Propoxur, Zectran, Metacil, dan lain-lain.

2) Insektisida golongan Organoklorin

Golongan ini terdiri dari:

- a) Derivat kloroethana seperti DDT.
- b) Siklodena seperti Chlordane, Aldrin, Dieldrin dan lain-lain.
- c) Klorosikloheksan seperti Lindan.

Insektisida sintesis tersebut walaupun mempunyai manfaat yang cukup besar pada masyarakat, namun dapat pula memberikan dampak negatif pada manusia dan lingkungan. Pada manusia dapat menimbulkan keracunan yang dapat mengancam jiwa manusia atau menimbulkan penyakit atau cacat. DDT dan organoklorin yang lain juga dapat berlaku sebagai agen kanker dan penyebab penyakit kardiovaskular yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan Parathion dapat menyebabkan *asma bronchial*. Insektisida sintesis mempunyai dampak yang tidak baik bagi lingkungan karena membutuhkan waktu yang lama untuk bisa didegradasi. Salah satu bentuk pengaruh insektisida terhadap lingkungan berupa peningkatan suhu udara (Munaf, 1997: 19-21).

Insektisida alami merupakan senyawa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Insektisida alami mudah dibuat dan diformulasi dengan cara yang relatif sederhana dan bersifat mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak

peliharaan karena residunya mudah hilang. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka perlu dicari alternatif lain untuk mengendalikan vektor penyakit tersebut dengan suatu metode yang lebih ramah lingkungan. Salah satu cara yang lebih ramah lingkungan adalah memanfaatkan tanaman anti nyamuk. (Kardinan, 2004: 52-53).

D. Uraian Tentang Tanaman Nilam

1. Klasifikasi tanaman nilam (Taufiq, 2008: 18-20)

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tanaman Nilam.

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Angiospermae

Ordo : Lamiales

Famili : Labiatae

Genus : Pogostemon

Spesies : *Pogostemon cablin*, Benth

2. Deskripsi tanaman

Nilam (*Pogostemon cablin*, Benth) termasuk tanaman dari famili Labiatae, memiliki sekitar 200 genus yang satu di antaranya adalah pogostemon. Genus ini diperkirakan memiliki sekitar 40 spesies, yang salah satunya adalah *Pogostemoncablin*, Benth (Taufiq, 2008: 18-20). Tanaman nilam berbentuk semak dengan tinggi mencapai 1 meter. Tanaman nilam mempunyai akar serabut dengan bentuk daun bulat dan lonjong, batang berkayu berbentuk persegi, permukaan kasar dengan diameter 10-20 mm, berwarna hijau sewaktu muda dan hijau kecokelatan pada batang tua.

Tanaman nilam ada yang berbunga (nilam jawa) dan ada juga yang tidak berbunga (nilam aceh). Daun tanaman nilam yang masih muda berwarna hijau muda, sedangkan daun yang sudah tua berwarna hijau tua dengan panjang 6,33-7,64 cm dan lebar 5,34-6,25 cm.

Menurut catatan Agus Kardinan (2005), tanaman nilam yang dijumpai di Indonesia dikenal ada 3 jenis, yaitu *Pogostemon cablin*, Benth (syn *P. Patchouly* Pell.), *Pogostemon heyneanus*, Benth dan *Pogostemon hortensis*, Benth (Taufik, 2008: 18 -20).

3. Kandungan kimia

Minyak nilam mengandung beberapa senyawa, antara lain benzaldehid (2,34%), kariofilen (17,29%), *oc*-patchoulien (28,28%), buenesen (11,76%), dan patchouli alkohol (40,04%) (Taufik, 2008). Komponen-komponen kimia penyusun minyak nilam yang mempunyai persentase terbesar berdasarkan persentase area adalah patchouli alkohol (32,60%), H-guaiene (23,07%), α -guaiene (15,91%), seychellene (6,95%), dan α -patchoulene (5,47%).

Minyak nilam terdiri atas campuran senyawa terpen yang bercampur dengan alkohol, aldehid, dan ester-ester yang memberikan aroma yang khas dan spesifik. Senyawa-senyawa tersebut antara lain: sinamaldehyd, benzaldehid, patchoulen, eugenol benzoat, dan patchouli alkohol sebagai komponen utama minyak nilam. Minyak nilam yang banyak mengandung senyawa *terpen* akan menurunkan nilai kelarutannya (Hernani dan Risfaheri, 1989 : 12).

Patchouli alcohol merupakan senyawa *seskiterpen* alkohol *tersier trisiklik*, tidak larut dalam air, larut dalam alkohol, eter atau pelarut organik yang lain, mempunyai titik didih 280,37°C dan kristal yang terbentuk

memiliki titik leleh 56°C. Minyak nilam selain mengandung senyawa *Patchouli Alcohol* (komponen utama) juga mengandung komponen minor lainnya, pada umumnya senyawa penyusun minyak atsiri bersifat asam dan netral, begitu pula dengan minyak nilam, tersusun atas senyawa-senyawa yang bersifat asam dan netral misalnya senyawa asam *2-naftalenkarboksilat* yang merupakan salah satu komponen minor penyusun minyak nilam (Irawan, 2010: 23).

E. Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan itu diperlukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Lukman ayat 10 :

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik (Depag, 2005).

Surat Al-Hijr ayat 19 :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran (Depag, 2005).

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan ada manfaatnya, tugas manusia mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut. Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral, dimana ketiganya telah dijelaskan dalam Al-Quran mengandung suatu zat/obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu (Savitri, 2008).

Dalam suatu pribahasa yang mengatakan bahwa Allah SWT tidak akan memberikan suatu cobaan kepada hamba jika cobaan itu tidak bisa diselesaikan, begitu juga dengan penyakit yang diberikan oleh-Nya diturunkan bersama dengan obatnya. Obat itu menjadi rahmat dan keutamaan dari-Nya untuk hambanya yang beriman maupun yang kafir. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadits Abu Hurairah Ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (البخاري رواه)

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi SAW. bersabda; Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. (H.R. Al-Bukhari)

Setiap ciptaan Allah (penyakit) itu pasti ada penawarnya, dan setiap penyakit pasti ada obatnya yang menjadi anti penawarnya agar penyakit itu sembuh (As- Suyuthy, 1997).

Salah satu ilmu yang membahas masalah itu adalah mengenai ilmu tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan mengandung banyak vitamin dan mineral

serta unsur-unsur penyusun alamiah yang merupakan bahan kimia alamiah ciptaannya dan memungkinkan bagi tubuh untuk memanfaatkannya kembali. Unsur-unsur yang terkandung dalam tumbuhan sangat banyak dan kompleks seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Pengaruh tumbuhan sangat selektif, karena mengandung zat-zat penting bagi pertumbuhan manusia (As-Sayyid, 2006). Sebagaimana pada Firman Allah SWT pada surat Q.S.An-Nahl (16) :11

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Depag, 2005).

Pengobatan dengan menggunakan saripati tumbuh-tumbuhan yang ada merupakan suatu bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah SWT. Manusia diberi akal pikiran untuk bisa memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan sebagai salah satu cara menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Dengan akal pikiran inilah yang tentunya dibarengi dengan ilmu pengetahuan sehingga manusia bisa memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menunjang kehidupan umat manusia di muka bumi.

Surat Thaahaa ayat 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Depag, 2005).

Surat Al-Naba ayat 15 :

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan (Depag, 2005).

Berdasarkan ayat-ayat di atas diketahui bahwa Allah swt menciptakan aneka macam tumbuhan atau biji-bijian untuk dimanfaatkan manusia. Salah satunya adalah minyak nilam (*Patchouli oil*) yang diperoleh dari tanaman nilam (*Pogostemon cablin*, Benth). Tanaman ini merupakan tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan fiksatif parfum ternyata setelah diteliti, minyak nilam ini dapat dimanfaatkan kembali dalam dunia pengobatan salah satunya sebagai anti nyamuk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan bahan

1. Alat

Alat-alat gelas, cawan porselin, deck gelas, gelas arloji, kotak enkas, lampu spiritus, lumpang, objek gelas, penangas air (*Hemmer*), pH meter, pinset, sendok tanduk, stopwatch, tabung reaksi, dan timbangan analitik (*Mettler tomedo*) .

2. Bahan

Metil paraben, propil paraben, alfa tokoferol, air suling, alkohol, asam stearat, setil alkohol, TEA, tween 60, span 60, lanolin, parafin cair, gliserin dan minyak nilam.

B. Prosedur Kerja

1. Penyiapan Sampel

Pengambilan sampel minyak nilam diperoleh dari daerah Mamuju Sulawesi Barat.

2. Pembuatan Sediaan Lotion

1.Rancangan Formula

Tabel 1. Formula Lotion Minyak Nilam Tipe Emulsi Minyak Dalam Air (M/A)

| No | Nama bahan | Kode Formula (%) | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Surfaktan Anionik | | | Surfaktan Nonionik | | |
| | | FA ₁ | FA ₂ | FA ₃ | FN ₁ | FN ₂ | FN ₃ |
| 1 | Minyak nilam | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Setil alkohol | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Asam stearat | 10 | 15 | 20 | - | - | - |
| 4 | Trietanolamin | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| 5 | Lanolin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Gliserin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Paraffin cair | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Tween 60 Span 60 | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Metil paraben | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | propil paraben | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Alfa tokoferol | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Air suling hingga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

a. Pembuatan sediaan lotion untuk emulgator nonionik

Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Fase minyak dibuat dengan melebur berturut-turut lanolin, paraffin cair, dan span 60. Kemudian ditambahkan propil paraben dan alfa tokoferol, kemudian suhu dipertahankan pada 70°C. Fase air dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam air panas, pada suhu 90°C dan ditambahkan gliserin, minyak nilam kemudian ditambahkan tween 60, dipertahankan pada suhu 70°C. Dicampurkan fase minyak ke dalam fase air, lalu diaduk dengan menggunakan magnetik stirer selama 3 menit dengan kecepatan konstan hingga homogen.

b. Pembuatan sediaan lotion untuk emulgator anionik

Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Fase minyak dibuat dengan melebur berturut-turut lanolin, parafin cair, asam stearat dan setil alkohol. Kemudian ditambahkan propil paraben dan alfa tokoferol, kemudian suhu dipertahankan pada 70° C. Fase air dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam air panas, pada suhu 70° C dan ditambahkan gliserin, kemudian ditambahkan trietanolamin, dipertahankan pada suhu 70°C. Kemudian ditambahkan minyak nilam. Dicampurkan fase minyak ke dalam fase air, lalu diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 3 menit dengan kecepatan konstan, didiamkan dan diaduk hingga homogen.

3. Pemeriksaan Stabilitas fisik sediaan lotion

Pemeriksaan stabilitas fisik sediaan dilakukan pada sediaan jadi sebelum dan setelah diberi perlakuan penyimpanan dipercepat. Kondisi

penyimpanan dipercepat yaitu penyimpanan pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus.

Uji untuk pemeriksaan stabilitas fisik meliputi :

a. Penentuan pH Sediaan

Elektroda pada pH meter dicelupkan dalam sediaan, kemudian dicatat angka pada pH meter. Angka yang ditunjukkan pH meter menunjukkan pH sediaan.

b. Penentuan Tipe Emulsi

Penentuan tipe emulsi dilakukan dengan menggunakan metode pengenceran, yaitu sejumlah tertentu sediaan diencerkan dengan aquadest. Jika emulsi tersebut bercampur sempurna dengan air, maka emulsi tersebut bertipe minyak dalam air dan bila tidak bercampur sempurna dengan air, maka emulsi tersebut bertipe air dalam minyak. Inversi fase ditunjukkan dengan perubahan tipe emulsi dari tipe emulsi yang dirancang.

c. Pengukuran kekentalan

Pengukuran kekentalan dilakukan terhadap sediaan lotion yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengukuran kekentalan dilakukan dengan menggunakan viscometer.

d. Pengukuran volume kriming

Lotion sebanyak 25 mL, dimasukkan dalam gelas ukur kemudian diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu penyimpanan pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengamatan volume kriming dihitung dalam % dengan rumus :

$$\text{Volume kriming : } \frac{H_u}{H_o} \times 100 \%$$

Dimana : H_u = volume emulsi yang kriming

H_o = volume total lotion

e. Pengukuran tetes dispersi

Lotion dimasukkan dalam vial kemudian dilakukan pengukuran tetes terdispersi sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengamatan ukuran tetes dispersi dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Dengan meneteskan lotion pada objek gelas kemudian ditutup dengan deck gelas dan setelah diperoleh pembesaran yang sesuai maka diamati rentang ukuran partikel tetes terdispersinya.

4. Uji efektifitas antinyamuk

a. Uji iritasi sediaan

Uji iritasi dilakukan terhadap sediaan lotion yang dibuat dari minyak nilam (*Patchouli oil*) dengan maksud untuk memastikan bahwa lotion yang dibuat tidak menimbulkan iritasi padankulit. Teknik yang digunakan pada uji iritasi ini adalah uji tempel terbuka (*Patch Test*) pada lengan bawah bagian dalam terhadap 3 orang sukarelawan. Uji temple terbuka dilakukan dengan mengoleskan sediaan yang dibuat pada lokasi lekatan dengan luas tertentu (2,5 x 2,5 cm), dibiarkan terbuka dan diamati apa yang terjadi. Uji ini dilakukan sebanyak 1x 24 jam untuk sediaan dengan konsentrasi minyak nilam sebesar 10%, reaksi yang terjadi diamati. Reaksi iritasi positif ditandai oleh adanya

kemerahan, gatal-gatal, atau bengkak pada kulit lengan bawah bagian dalam yang diberi perlakuan. Adanya kulit merah diberi tanda (+), gatal-gatal (++) , bengkak (+++), dan yang tidak menunjukkan reaksi apa-apa diberi tanda (-).

b. Uji efek anti nyamuk

Selanjutnya uji efektifitas anti nyamuk dilakukan terhadap 6 orang sukarelawan. Sebelumnya nyamuk yang digunakan untuk pengujian dimasukkan dalam kotak enkas. Pengujian dilakukan dengan cara tangan yang satu diolesi dengan lotion minyak nilam dan yang satu lagi tidak diolesi lotion. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak enkas yang berisi nyamuk, biarkan selama 2 jam. Lalu diamati dan dihitung jumlah gigitan nyamuk tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil pengamatan dari penelitian yang telah dilakukan meliputi uji stabilitas fisik sediaan sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat (pengukuran pH, penentuan tipe emulsi, pengukuran kekentalan, pengukuran volume kriming, dan pengukuran tetes terdispersi) pada sediaan lotion dengan menggunakan dua emulgator yang berbeda yaitu emulgator anionik dan emulgator nonionik adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi sediaan lotion

a. Pengukuran pH

Tabel 2. Hasil pengukuran pH

| Formula | Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat | Sesudah kondisi penyimpanan dipercepat |
|------------------|--|--|
| I (Anionik 2%) | 7 | 7 |
| II (Anionik 3%) | 7 | 7 |
| III (Anionik 4%) | 7 | 7 |
| IV (Nonionik 2%) | 6 | 6 |
| V (Nonionik 3%) | 5 | 5 |
| VI (Nonionik 4%) | 5 | 5 |

b. Penentuan Tipe Emulsi dan Inversi Fase

Tabel 3. Hasil pengamatan uji tipe emulsi dan inverse fase

| Formula Lotion | Tipe Emulsi | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | Sebelum Penyimpanan | | Setelah Penyimpanan | |
| | Uji Pengenceran | Uji Dispersi Zat Warna | Uji Pengenceran | Uji Dispersi Zat Warna |
| I | M/A | M/A | M/A | M/A |
| II | M/A | M/A | M/A | M/A |
| III | M/A | M/A | M/A | M/A |
| IV | M/A | M/A | M/A | M/A |
| V | M/A | M/A | M/A | M/A |
| VI | M/A | M/A | M/A | M/A |

Keterangan:

M/A = Emulsi tipe minyak dalam air

c. Evaluasi Kestabilan Fisik

1) Volume Kriming

Tabel 4. Hasil pengukuran volume kriming

| Siklus | % Volume Kriming | | | | | |
|--------|------------------|----|-----|----|---|----|
| | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) Viskositas Lotion

Tabel 5. Hasil pengukuran viskositas lotion (poise)

| Formula Lotion | Sebelum Penyimpanan | Setelah Penyimpanan |
|----------------|---------------------|---------------------|
| I | 106,33 | 102 |
| II | 117,66 | 107 |
| III | 115 | 111 |
| IV | 13,66 | 46,66 |
| V | 46 | 40,66 |
| VI | 49,66 | 24,66 |

3) Pengamatan Tetes Terdispersi

Pada pengamatan, seluruh lotion memperlihatkan perubahan ukuran tetes terdispersi dari fase minyak membentuk ukuran partikel yang lebih besar setelah penyimpanan dipercepat ketika diamati pada mikroskop.

2. Uji Iritasi Terhadap Jenis Formula

Penggunaan kosmetik yang tidak baik pada kulit dapat menyebabkan berbagai reaksi (efek samping) untuk mengetahui ada atau tidaknya efek samping tersebut maka dilakukan uji daya iritasi

terhadap kulit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Data Uji Iritasi Terhadap Kulit

| No. | Gejala iritasi | Hasil | | |
|-----|-------------------|-------------|----|-----|
| | | Sukarelawan | | |
| | | I | II | III |
| 1. | Merah pada kulit | - | - | - |
| 2. | Gatal pada kulit | - | - | - |
| 3. | Bengak pada kulit | - | - | - |

Keterangan : + : Terjadi iritasi

- : Tidak terjadi iritasi

3. Uji efektifitas anti nyamuk

Pengujian dilakukan terhadap 6 orang sukarelawan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Data kemampuan sediaan lotion terhadap gigitan nyamuk

| No | Sukarelawan | Jumlah gigitan nyamuk | | | | | | |
|----|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Kode formula | | | | | | |
| | | K 0% | FA _I | FA ₂ | FA ₃ | FN ₁ | FN ₂ | FN ₃ |
| 1. | I | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | II | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 3. | III | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4. | IV | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | V | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | VI | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Keterangan: K: Kontrol (tanpa perlakuan)

Formula A : Emulgator Anionik dengan konsentrasi 2%, 3%, 4%.

Formula N : Emulgator Nonionik dengan konsentrasi 2%, 3%, 4%.

Tabel 7. Data proteksi sediaan lotion terhadap gigitan nyamuk

| Sukarelawan | Daya proteksi (%) | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| | Kode formula | | | | | | |
| | K 0% | A 2% | A 3% | A 4% | N 2% | N 3% | N 4% |
| I | 0 | 75 | 83 | 75 | 75 | 83 | 91 |
| II | 0 | 83 | 91 | 83 | 83 | 91 | 91 |
| III | 0 | 75 | 91 | 91 | 83 | 91 | 83 |
| IV | 0 | 83 | 91 | 83 | 91 | 91 | 83 |
| V | 0 | 91 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| VI | 0 | 75 | 91 | 83 | 83 | 91 | 91 |
| Jumlah | 0 | 482 | 530 | 498 | 498 | 530 | 522 |
| Rata-rata | 0 | 80,33 | 88,33 | 83 | 83 | 88 | 87 |

B. Pembahasan

Nyamuk merupakan salah satu vektor penyakit pada manusia. Sebagian nyamuk mampu menyebarkan penyakit pada manusia seperti malaria, penyakit filaria, dan penyakit bawaan virus seperti demam kuning, dan demam berdarah. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak nilam (*Patchouli oil*) yang secara umum hanya digunakan sebagai bahan pengikat parfum. Untuk bias menemukan manfaat lain dari minyak nilam, dilakukan penelitian yang bertujuan menentukan besarnya efektifitas anti nyamuk dari minyak nilam itu sendiri sehingga nilai pemanfaatannya bertambah, tidak hanya sebagai bahan pengikat parfum tapi juga bisa dikembangkan dan digunakan sebagai anti repelant dalam industri farmasi.

Ketaren (1985) menyatakan bahwa komponen penyusun minyak nilam adalah seskuiterpen dan patchouli alkohol (terpen teroksigenasi) yang terdiri dari benzaldehida, eugenol benzoat, simaldehida, alkohol dan semikarbozom. Minyak nilam memiliki bahan aktif seskuiterpen yang dapat berperan sebagai repellent dan penghambat perkembangbiakan nyamuk.

Pada formulasi lotion minyak nilam dengan surfaktan anionik, dalam hal ini asam stearat dan TEA digunakan tiga variasi konsentrasi yakni TEA 2% - asam stearat 10% , TEA 3% - asam stearat 15% dan TEA 4%- asam stearat 20%. Ketiga variasi tersebut memiliki nilai perbandingan TEA : asam stearat yang sama yaitu 1:5.

Sedangkan pada formulasi lotion dengan surfaktan nonionik, dalam hal ini kombinasi Tween 60 dan Span 60 digunakan tiga variasi konsentrasi yakni 2%, 3%, dan 4%. Jumlah Tween 60 maupun Span 60

yang digunakan dalam tiap formula diperoleh dari perhitungan HLB berdasarkan konsentrasi tersebut (Lampiran 3). Konsentrasi ini umum digunakan dalam formulasi yang menggunakan minyak atsiri pada tanaman yang nilai HLBnya tidak diketahui. Namun, pada penelitian ini tetap diformulasikan juga menggunakan surfaktan anionik untuk melihat perbedaan antara keduanya. Emulgator kombinasi juga dipilih dengan alasan emulgator gabungan lebih efektif daripada emulgator tunggal. Kemampuan emulgator gabungan untuk mengemas lebih kuat molekul-molekul zat aktif permukaan menambah kekuatan lapisan antarmuka, dan karenanya menambah kestabilan emulsi. Umumnya emulgator mungkin membentuk struktur yang agak rapat pada antarmuka, dan menghasilkan suatu lapisan antarmuka yang stabil (Lachman, 2007: 1034-1036).

Evaluasi formula lotion dilakukan dengan cara membandingkan karakteristiknya sebelum dan setelah dilakukan penyimpanan dipercepat dengan menggunakan parameter-parameter kestabilan fisik sehingga dapat diketahui kestabilan fisik dari formula lotion yang berbeda konsentrasi emulgatornya.

Pada penelitian ini dilakukan uji *cycling test* yaitu melakukan penyimpanan formula lotion pada dua suhu berbeda yaitu 5⁰C dan 35⁰C selama 10 siklus. Tujuannya adalah untuk mengetahui kestabilan fisik dari lotion yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan waktu penyimpanan. Efek normal penyimpanan suatu emulsi pada suhu yang lebih tinggi adalah mempercepat koalesensi dan terjadinya kriming dan hal ini biasanya diikuti dengan perubahan kekentalan. Kebanyakan emulsi menjadi lebih encer pada suhu tinggi dan menjadi lebih kental bila dibiarkan mencapai suhu kamar (Lachman, 1994).

Pada pengujian tipe emulsi lotion minyak nilam sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat memperlihatkan bahwa keenam formula lotion minyak nilam mempunyai tipe emulsi minyak dalam air (M/A) baik dengan uji pengenceran dengan air, maupun uji dispersi zat warna larut air dengan *metilen blue*, kedua uji tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa fase luar emulsi minyak dalam air (M/A) dapat diencerkan. Hasil ini sesuai dengan tujuan formulasi awal yaitu memformulasi lotion tipe minyak dalam air (M/A). Hal ini disebabkan karena jumlah fase terdispersi (minyak/lemak) yang digunakan dalam lotion lebih kecil dari fase pendispersi (fase air), sehingga fase minyak akan terdispersi merata ke dalam fase air dan membentuk emulsi minyak dalam air dengan bantuan emulgator.

Hasil pengamatan pH sediaan lotion tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat. pH lotion selama kondisi penyimpanan masih sesuai dengan rentang pH kulit yaitu 4,5-7 sehingga pH sediaan masih dianggap stabil. Sediaan harus sesuai dengan pH kulit supaya tidak mengiritasi kulit atau tidak merusak mantel asam yang menjadi pelindung kulit paling luar. Oleh sebab itu pH sediaan harus sedekat mungkin dengan pH fisiologis mantel asam kulit (Wasiatmadja,1997).

Pengamatan volume kriming menunjukkan tidak terjadinya kriming untuk semua formula lotion dengan emulgator yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya kestabilan emulgator dari lotion yang memberikan kerapatan maksimal dari kedua fase, sehingga penyatuan fase minyak yang menjadikan terjadinya koalesensi pada lotion tidak terjadi. Karena semakin besar kerapatan dari kedua fase, maka tetes terdispersi fase

minyak makin terjaga (tidak terjadi penyatuan yang berlebihan) sehingga makin kecil kemungkinan terjadinya kriming. Selain itu, viskositas yang tinggi dari fase luar lotion juga merupakan faktor peningkat kestabilan sehingga tidak terbentuk kriming pada keenam formula.

Kriming bukanlah tanda pecahnya emulsi tetapi secara estetika tidak menarik (Scovilles, 1995). Menurut persamaan Stoke laju pemisahan dari fase terdispersi dari suatu emulsi dapat dihubungkan dengan faktor-faktor seperti, ukuran partikel dari fase terdispersi, perbedaan dalam kerapatan antar fase, dan viskositas fase luar. Analisis persamaan menunjukkan bahwa jika fase terdispersi kurang rapat dibandingkan dengan fase kontinyu yang merupakan hal umum dalam emulsi m/a, kecepatan sedimentasi menjadi negatif, yakni dihasilkannya kriming yang mengarah ke atas. Jika fase dalam lebih berat dari fase luar, bola-bola akan mengendap. Fenomena ini sering terdapat pada emulsi tipe a/m dimana kriming mengarah ke bawah. Makin besar perbedaan kerapatan dari kedua fase tersebut, makin besar bola-bola minyak dan makin menurun viskositas dari fase luar sehingga laju kriming makin besar. Faktor-faktor dalam persamaan Stoke dapat diubah untuk mengurangi laju kriming dalam suatu emulsi (Gennaro AR, 1990).

Hasil pengukuran viskositas masing-masing lotion sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat, menunjukkan adanya perubahan viskositas. Hal ini dapat dilihat pada histogram viskositas. Berdasarkan histogram tersebut terjadi peningkatan viskositas setelah penyimpanan dipercepat pada formula dengan konsentrasi emulgator nonionik 2%. Hal ini umumnya disebabkan oleh pensiklusian antara dua temperatur yang berbeda. Kebanyakan emulsi menjadi lebih encer pada temperature yang

dinaikkan dan lebih kental pada suhu dingin. Namun, dari kedua lotion, terjadinya kehilangan air yang menyebabkan viskositas meningkat setelah penyimpanan mungkin terjadi. Sedangkan untuk formula dengan konsentrasi emulgator anionik 2%, 3%, 4% dan konsentrasi emulgator nonionik 3%, 4% terjadi penurunan viskositas sedangkan pada konsentrasi emulgator nonionik 2% terjadi peningkatan. Adanya peningkatan ukuran fase terdispersi (minyak/lemak) menimbulkan penurunan viskositas pada sediaan emulsi. Namun terdapat perbedaan viskositas antara lotion dengan surfaktan anionik dan lotion dengan surfaktan nonionik. Lotion dengan surfaktan anionik memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan lotion yang menggunakan surfaktan nonionik. Konsistensi dari lotion dengan surfaktan nonionik jauh lebih encer yang disebabkan kurangnya pembentuk massa dalam komposisinya, sehingga perlu ada penambahan bahan tersebut untuk memberikan konsistensi yang lebih baik. Sedangkan pada lotion dengan surfaktan anionik yang menggunakan emulgator asam stearat dimana kita ketahui asam stearat adalah salah satu komponen pembentuk massa, meskipun dalam formulasi ini ia juga berfungsi sebagai emulgator yang dikombinasikan dengan TEA.

Hasil analisis statistik rancangan acak kelompok (RAK) dan analisis variansi pada perubahan viskositas lotion dengan konsentrasi emulgator yang berbeda sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan menunjukkan tidak adanya perubahan viskositas yang nyata setelah penyimpanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel (table. 9) dimana $F_{hitung} < F_{tabel}$.

Hasil pengamatan tetes terdispersi yang diperlihatkan pada gambar menunjukkan adanya perbedaan ukuran sebelum dan setelah penyimpanan

dipercepat. Jika dilihat di bawah mikroskop dari pembesaran yang sama terlihat bahwa tetes terdispersi lotion sebelum penyimpanan terlihat sangat rapat dengan tingkat dispersitas yang baik, sedangkan setelah penyimpanan terlihat perbedaan kerapatan karena terdapat beberapa partikel minyak yang menyatu membentuk partikel yang lebih besar namun tidak sampai pada tahap pecahnya emulsi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh emulgator yang tidak maksimal bekerja, namun masih dapat memberikan kestabilan pada emulsi.

Emulsi akan menunjukkan stabilitas dan tingkat dispersitas yang optimal, jika lapisan tipis menyaluti batas antar permukaan secara total, yang menyalut bola-bola kecil menjadi semacam kulitnya atau sebagai lapisan yang kaku. Jika secara kebetulan dua bola kecil saling bersentuhan maka lapisan tipis semacam ini member perlindungan yang cukup untuk menghindari penggabungannya (Voigt, R, 1995).

Lotion minyak nilam diformulasi dengan konsentrasi sebagai repelant yaitu 10%. Pemilihan konsentrasi berdasarkan orientasi dosis efektif minyak nilam yang dipilih secara acak pada tiga konsentrasi yaitu 2%, 6%, dan 10% untuk diuji besar efektifitas anti nyamuknya. Pada konsentrasi minyak nilam 10% telah mempunyai efektivitas sebagai pengusir nyamuk selama dua jam.

Uji iritasi dilakukan terhadap sediaan lotion yang dibuat dari minyak nilam (*Patchouli oil*) dengan maksud untuk memastikan bahwa lotion yang dibuat tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Teknik yang digunakan pada uji iritasi ini adalah uji tempel terbuka (*Patch Test*) pada lengan bawah bagian dalam terhadap 3 orang sukarelawan. Uji tempel terbuka dilakukan dengan mengoleskan sediaan yang dibuat pada lokasi

lekatan dengan luas tertentu (2,5 x 2,5 cm), dibiarkan terbuka dan diamati apa yang terjadi. Uji ini dilakukan sebanyak 1x 24 jam untuk sediaan dengan konsentrasi minyak nilam sebesar 10%, reaksi yang terjadi diamati. Reaksi iritasi positif ditandai oleh adanya kemerahan, gatal-gatal, atau bengkak pada kulit lengan bawah bagian dalam yang diberi perlakuan. Hasil pengamatan menunjukkan tidak adanya reaksi alergi yang ditimbulkan oleh sediaan lotion minyak nilam dengan konsentrasi 10%.

Uji efektifitas anti nyamuk terhadap 6 orang sukarelawan. Sebelumnya nyamuk yang digunakan untuk pengujian dimasukkan dalam kotak enkas. Pengujian dilakukan dengan cara tangan yang satu diolesi dengan lotion minyak nilam dan yang satu lagi tidak diolesi lotion. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak enkas yang berisi nyamuk, biarkan selama 2 jam. Pengujian dilakukan dengan menghitung jumlah gigitan nyamuk pada tangan serta melihat daya proteksi masing-masing perlakuan. Daya proteksi dihitung dengan rumus:

$$\text{Daya Proteksi} = \frac{\Sigma \text{nyamuk hinggap pada kontrol} - \Sigma \text{pada perlakuan}}{\Sigma \text{nyamuk pada kontrol}} \times 100\%$$

Hasil penelitian menunjukkan, ketika mengoleskan lotion minyak nilam dioleskan pada tangan manusia, maka minyak atsiri yang terkandung dalam minyak nilam meresap ke pori-pori lalu menguap ke udara. Bau ini akan terdeteksi oleh reseptor kimia (*chemoreceptor*) yang terdapat pada tubuh nyamuk dan menuju ke impuls saraf. Itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam otak sehingga nyamuk akan mengekspresikan untuk menghindar tanpa mengisap darah lagi.

Hasil statistik Rancangan Acak Kelompok (RAL) efektifitas anti nyamuk oleh kontrol dan sediaan menunjukkan bahwa pada perlakuan (kontrol dan sediaan) memiliki F hitung $>$ F tabel pada taraf kepercayaan 5% dan 1%. Hal ini berarti bahwa efektifitas anti nyamuk antara kontrol dan sediaan sangat berbeda signifikan. Hasil analisis statistik rancangan acak lengkap efektifitas anti nyamuk setiap jumlah emulgator terlihat bahwa nilai F hitung $>$ F tabel pada taraf kepercayaan 5% dan 1% untuk % efektifitas anti nyamuk masing-masing emulgator dalam sediaan. Hal ini berarti bahwa % emulgator dalam sediaan berbeda nyata, sehingga ditinjau dari efisiensi dan efektivitas penggunaan jumlah emulgator maka dapat digunakan dengan konsentrasi (3%) untuk emulgator anionik dan nonionik, karena pada konsentrasi tersebut menunjukkan % daya proteksi yang baik yaitu 88%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan pH, penentuan tipe emulsi, pengukuran volume kriming, viskositas, ukuran tetes terdispersi, inverse fase dan pengujian efektifitas anti nyamuk, setelah dianalisis secara statistika dan dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Lotion minyak nilam (*Patchouli oil*) memiliki efektifitas anti nyamuk untuk formula lotion tipe minyak dalam air (M/A) dengan menggunakan emulgator anionik dan emulgator nonionik.
2. Konsentrasi emulgator 3% anionik dan nonionik memiliki efektifitas anti nyamuk sebesar 88%.
3. Lotion yang mengandung bahan anti nyamuk minyak nilam (*Patchouli oil*) memenuhi syarat kestabilan fisika suatu lotion.
4. Konsistensi dari keenam formula lotion minyak nilam menunjukkan perubahan yang lebih baik diikuti dengan bertambahnya konsentrasi emulgator yang diberikan.

B. Saran

Disarankan untuk pengujian stabilitas kimia dan upaya untuk menghilangkan bau dari sediaan yang kurang enak agar lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur 'an dan Terjemahan*. 2005. Departemen Agama RI, Bandung; CV. Penerbit J-ART.
- Anief, M. (2003). *Ilmu Meracik Obat, Teori dan Praktik*. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press. Hal 132.
- Ansel. C. Howard. 1989. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Universitas Indonesia; Jakarta, hal 489.
- As-Sayyid, A. B. M. 2006. *Pola Makan Rasulullah; Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Almahira; Jakarta.
- As-Suyuthy, J., Abd., Rahman. 1987. *Pengobatan Cara Nabi*, Pustaka Hidayah; Bandung.
- Balsam, M. S. (1972). *Cosmetic Science and Technology*. Second Edition. New York. John Willy and Son, Inc. P 179- 218.
- Barror, D J, C A Triplehorn and N F Johnson. 1992. *Pengenalan Pelajaran Serangga*. (Penerjemah : Partosoedjono, S dan M.D Brotowijoyo). Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- Ditjen POM. (1979). *Farmakope Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Hal. 8, 19.
- Epstein PR, Diaz HR, Elias S, Grabherr G, Graham NE, Martens WJM, Thomson EM, Susskind J. (ED). 1998. *Biological and physical signs of climate change : focused on mosquito borne diseases*. Bul Amer Meterol Soc 79 : 409-17.
- Galuh. Putri. Y. 2009. *Formulasi Gel Obat Jerawat Minyak Atsiri Dauk Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia, Swingle)*. Muhammadiyah; Surakarta.

- Gennaro AR Lund, Walter. 1990. *Remington Pharmaceutical Sciences, eighteenth edition*, Mack Publishing Compan; Easton Pennsylvania.
- Graf,jeannete, 2005.*Cosmetics Dermatology*. Germany: Verlag Berlin Heidelberg.
- Guenther, E, 1987. *Minyak Atsiri*. Diterjemahkan oleh R.S. Ketaren dan R. Mulyono. Jakarta, UI Press.
- Hernani dan Risfaheri, 1989. *Pengaruh Perlakuan Bahan Sebelum penyulingan Terhadap Rendemen dan Karakteristik Minyak Nilam*, Pemberitaan Litri XV (2).
- Irawan, 2010. *Peningkatan Mutu Minyak Nilam Dengan Ekstraksi Dan Destilasi Pada Berbagai Komposisi Pelarut*. Universitas Diponegoro Semarang, hal 23.
- Kardinan, A. (2004). *Pestisida Nabati, Ramuan dan Aplikasi*. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 52-53.
- Ketaren, 1985. *Pengantar Teknologi Minyak Atsiri*. Jakarta : Balai Pustaka hal.27-30.
- Kibbe, Arthur .H. 2000. *Handbook Of Pharmaceutical Exipients. 3th Edition*. University Of Pharmacy; Pennsylvany.
- Lachman, L., H.A. Lieberman, and J.L. Kanig. 1994. *Teori dan praktek Farmasi Industri, jilid II, edisi III*, Universitas Indonesia. hal. 1119-1120.
- Lestari, Bekti Dyah; Gama, Zulfaidah P; Rahardi, Brian. 2011. *Identifikasi Nyamuk di Kelurahan Sawojajar Kota Malang*.
- Levine, N. D. (1994). *Parasitologi Veteriner*. Yogyakarta: UGM University Press. Hal. 361
- Liebermen, HA.,Lachman L., Schwariz. 1998. *Pharmaceutical Dosage Form: Dispersi System. Volume I*. Marcel Dekker, Inc.; New York.

- Martens WJM. 1997. *Malaria and climate change. Enviromental health perspectives*. University of Limburg, Maastricht, The Netherland.97 : 103-116.
- Martin A., Lieberman, H.A., Kanig, J.L., diterjemahkan oleh Yoshita, 1993, *Farmasi Fisik : Dasar-Dasar Farmasi Fisik dalam ilmu Farmasetik*, Penerbit Universitas Indonesia, edisi ke-3, hal. 1143-1164
- Martin Eric.L. 1971. *Dispensing of Madication. 7th Edition*. Mack Publishing Company. Easton. Pennsylvania.
- Munaf, S. (1997). *Keracunan Akut Pestisid: Teknik Diagnosis, Pertolongan Pertama, Pengobatan dan Pencegahannya* . Jakarta: Widya Medika. Hal. 7, 19-21.
- Nurmaini (2003). *Mentifikasi Vektor Dan Pengendalian Nyamuk Anopheles Aconitus Secara Sederhana*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Bagian Kesehatan Lingkungan Universitas Sumatera Utara, hal 2-3.
- Rowe, Raymond C, Paul J Sheskey dan Marian E Quinn. 2009. *Handbokk of Pharmaceutical Excipients Sixth Edition*. Pharmaceutical Press. London.
- Savitri, Evika Sandi, 2008. *Tumbuhan Berkhasiat Obat Prespektif Islam*. UIN Malang press. Malang.
- Sitompul, 2010. *Penggunaan Sari Buah Anggur Merah (Fructus Vitis vinifera) Sebagai Pelembab Dalam Sediaan Krim*. Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Medan, hal 12.
- Soedarto. (1990). *Entomologi Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Buku kedokteran EGC. Hal. 58-61.
- Sulaswaty, Wuryaningsih A, 2001. *Teknologi Ekstraksi Dan Pemurnian Atsiri Sebagai Bahan Baku Flavor Dan Fragrance* . Pusat peneliti kimia LIPI,Serpong,hal 23
- Taufiq A.,M.M.,ir.Tuhana.2008. *Menyuling Minyak Atsiri*, PT. Citra Aji Parama; Yogyakarta, hal 18-20.
- Tranggono, I. R. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT Gramedia Pustaka Utama; Jarkata, hal 11, 22, 34- 46.

Voigth, R. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi farmasi*. Edisi V., Gajah Mada University Press: Yogyakarta, hal 407.

Wasitaatmadja, S.M., 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Penerbit Universitas Indonesia, hal.111-116.




Lampiran 1. Sampel tanaman nilam (*Pogestemon cablin. L*) dan minyak nilam (*Patchouli oil*)



Minyak nilam


Gambar 3. Sampel tanaman nilam (*Pogestemon cablin, L*)
Minyak nilam (*Patchouli oil*)

Lampiran 2. Pembuatan lotion dengan surfaktan anionik




Gambar 3. Skema kerja pembuatan lotion dengan surfaktan anionik

Lampiran 3. Pembuatan lotion dengan surfaktan nonionik




Gambar 4. Skema kerja pembuatan lotion dengan surfaktan nonionik

Lampiran 4. Uji stabilitas fisik sediaan lotion anti nyamuk minyak nilam



Gambar 5. Skema kerja Uji stabilitas fisik sediaan lotion anti nyamuk minyak nilam.

Lampiran 5. Uji efektifitas anti nyamuk sediaan lotion



Gambar 6. Skema kerja uji efektifitas anti nyamuk sediaan lotion

Lampiran 6 : Konsentrasi Surfaktan

Tabel 7. Perhitungan Konsentrasi Surfaktan Nonionik

| Fase minyak | A (gram) | HLB Butuh | A x B | $\frac{A \times B}{\text{Jumlah A}} \times B$ (gram) |
|------------------|-------------|--------------|-------|---|
| Setil alkohol | 3 | 13 | 39 | 4,3 |
| Lanolin anhidrat | 1 | 15 | 15 | 1,6 |
| Parafin cair | 5 | 12 | 60 | 6,6 |
| Total | 9 | | | 12,5 |

Jumlah HLB butuh fase minyak 12,5

HLB Span 4,7

HLB Tween 14,9

$$(B_1 \times HLB_1) + (B_2 \times HLB_2) = (B \text{ campuran} \times HLB \text{ campuran})$$

Ket:

B = Bobot emulgator

Konsentrasi emulgator 2%

$$\frac{2}{100} \times 100 \text{ gram} = 2 \text{ gram}$$

$$\text{Tween 60} = X$$

$$\text{Span} = 2-X$$

$$(X \cdot 14,9) + [(2-X) \cdot 4,7] = (2 \times 12,5)$$

$$10,2 X + 9,4 = 25$$

$$10,2 X = 15,6$$

$$X = 1,529 \text{ gram}$$

$$\text{Tween 60} = 1,529 \text{ gram}$$

$$\text{Span 60} = 2 \cdot 1,529 \text{ gram}$$

$$= 0,471 \text{ gram}$$

Konsentrasi emulgator 3%

$$\frac{3}{100} \times 100 \text{ gram} = 3 \text{ gram}$$

$$\text{Tween 60} = X$$

$$\text{Span} = 3 \cdot X$$

$$(X \cdot 14,9) + [(3 \cdot X) \cdot 4,7] = (3 \times 12,5)$$

$$10,2 X + 14,1 = 37,5$$

$$10,2 X = 23,4$$

$$X = 2,294 \text{ gram}$$

$$\text{Tween 60} = 2,294 \text{ gram}$$

$$\text{Span 60} = 3 \cdot 2,294 \text{ gram}$$

$$= 0,706 \text{ gram}$$

Konsentrasi emulgator 4%

$$\frac{4}{100} \times 100 \text{ gram} = 4 \text{ gram}$$

$$\text{Tween 60} = X$$

$$\text{Span} = 4 \cdot X$$

$$(X \cdot 14,9) + [(4 \cdot X) \cdot 4,7] = (4 \times 12,5)$$

$$10,2 X + 18,8 = 50$$

$$10,2 X = 31,2$$

$$X = 3,058 \text{ gram}$$

$$\text{Tween 60} = 3,058 \text{ gram}$$

$$\text{Span 60} = 4 - 3,058 \text{ gram}$$

$$= 0,942 \text{ gram}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 7: Analisis Statistika Viskositas Formula Lotion Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Tabel 8. Analisis statistika viskositas formula lotion dengan rancangan acak kelompok (RAK)

| Kondisi | Viskositas | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|-----|-------|-------|-------|---------|-----------|
| | Formula Lotion | | | | | | Total | Rata-rata |
| | I | II | III | IV | V | VI | | |
| Sebelum Penyimpanan | 106,33 | 117,66 | 115 | 13,66 | 46 | 49,66 | 448,31 | 74,71 |
| Setelah Penyimpanan | 102 | 107 | 111 | 46,66 | 40,66 | 24,66 | 431,98 | 71,99 |
| Total | 208,33 | 224,66 | 226 | 60,32 | 86,66 | 74,32 | 880,29 | 146,71 |
| Rata | 104,165 | 112,33 | 113 | 30,16 | 43,33 | 37,16 | 440,145 | 73,40 |

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\sum Y)^2}{axb} = \frac{(880,29)^2}{6 \times 2} = 64575,87$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (106,33)^2 + (117,66)^2 + (115)^2 + \dots + (24,66)^2 - FK \\ &= 81810,163 - 64575,87 \\ &= 17234,293 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Lotion (JKL)} &= \frac{(208,33)^2 + (224,66)^2 + (226)^2 + (60,32)^2 + (86,66)^2 + (74,32)^2}{2} - FK \\ &= 75810,715 - 64575,87 \\ &= 11234,845 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \frac{(448,31)^2 + (431,98)^2}{6} - FK \\ &= 64598,097 - 64575,87 \end{aligned}$$

$$= 22,227$$

$$\text{JK Galat (JKT)} = \text{JK Total} - (\text{JK Lotion} + \text{JK Kondisi})$$

$$= 17234,293 - (11234,845 + 22,227)$$

$$= 17234,293 - 11257,072$$

$$= 5977,221$$

Table 9. Analisis Varians Viskositas Formula lotion

| | Db | JK | KT | Fh | Tabel 5% | Tabel 1% |
|---------|----|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|
| Lotion | 5 | 11234,845 | 5617,4225 | 1,879 | 5,05 | 10,97 |
| Kondisi | 1 | 22,227 | 22,227 | 0,007 | 6,61 | 16,26 |
| Galat | 5 | 5977,221 | 2988,610 | | | |
| Total | 11 | | | | | |

$F_{hitung} < F_{tabel} = \text{tidak berbeda} = \text{sama}$

$F_{hitung} > F_{tabel} : \text{Berbeda nyata (5\%)} \text{ sangat nyata (1\%)}$

Kesimpulan:

- Viskositas sediaan tidak berbeda antara tiap formula lotion
- Viskositas sediaan tidak berbeda sebelum dan setelah penyimpanan

Lampiran 8: Analisis Statistik Efektivitas Anti nyamuk dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)

Tabel 10. Analisis statistic uji efektivitas anti nyamuk dengan rancangan acak lengkap

| Formula Lotion | Jumlah gigitan nyamuk | | | | | | Total | Rata-Rata |
|----------------|-----------------------|----|-----|----|----|----|-------|-----------|
| | I | II | III | IV | V | VI | | |
| A 2% | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1,83 |
| A 3% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1,33 |
| A 4% | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1,83 |
| N 2% | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2,16 |
| N 3% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1,83 |
| N 4% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1,66 |
| Kontrol | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 15 | 73 | 12,16 |
| Total | 26 | 19 | 22 | 21 | 21 | 25 | 134 | 22,33 |

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{(\sum Y)^2}{a \times b} = \frac{(134)^2}{7 \times 6} = 427,52$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (3)^2 + (2)^2 + (1)^2 \dots + (15)^2 - \text{FK} \\ &= 1028 - 427,52 \\ &= 600,48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Lotion (JKL)} &= \frac{(11)^2 + (8)^2 + \dots + (73)^2}{3} - \text{FK} \\ &= 5968 - 427,52 \\ &= 5540,48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat (JKT)} &= \text{JK Total} - \text{JK Lotion} \\ &= 600,48 - 427,52 \\ &= 172,96 \end{aligned}$$

Lampiran 9: Analisis Varians Efektivitas Anti nyamuk

Tabel 11. Analisis varians efektivitas anti nyamuk

| SK | Db | JK | KT | Fh | Tabel 5% | Tabel 1% |
|----------------|----|---------|--------|-------|----------|----------|
| Formula Lotion | 6 | 5540,48 | 923,41 | 71,25 | 3,00 | 4,82 |
| Galat | 12 | 5112,96 | 852,16 | | | |
| Total | 18 | | | | | |

Kesimpulan:

$F_{hitung} < F_{tabel} =$ tidak berbeda = sama

$F_{hitung} > F_{tabel} :$ Berbeda nyata (5%) sangat nyata (1%)

Lampiran 10: Analisis Tukey HSD (Uji Beda Nyata Jujur/BNJ)

Tabel 12. Analisis tukey HSD (Uji Beda NyataJujur) efektivitas Anti nyamuk

| SK | Db | JK | KT | Fh | Tabel 5% | Tabel 1% |
|----------------|----|---------|--------|-------|----------|----------|
| Formula Lotion | 6 | 5540,48 | 923,41 | 71,25 | 3,00 | 4,82 |
| Galat | 12 | 5112,96 | 852,16 | | | |
| Total | 18 | | | | | |

$$\begin{aligned}
 \text{BNJ}_{0,05} &= q(p, \text{dbgalat}, \alpha) \cdot \sqrt{\frac{\text{KT Galat}}{\text{jumlah kelompok}}} \\
 &= q(6, 12, 0.05) \cdot \sqrt{\frac{852,16}{6}} \\
 &= 3,6 \cdot \sqrt{2,44} \\
 &= \mathbf{5,61}
 \end{aligned}$$

Tabel 13. Perbandingan nilai rata-rata

| perlakuan | Rata-Rata | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 4% | Kontrol |
|-----------|-----------|------|-------|------|------|------|------|---------|
| | | 1,83 | 1,33 | 1,83 | 2,16 | 1,83 | 1,66 | |
| 2% | 1,83 | 0 | 0,5 | 0,17 | 0,33 | 0 | 0,17 | 10,3 |
| 3% | 1,33 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,83 | 0,5 | 0,33 | 10,8 |
| 4% | 1,83 | 0 | 0,5 | 0 | 0,33 | 0 | 0,17 | 10,3 |
| 2% | 2,16 | 0,33 | 0,83 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,5 | 10 |
| 3% | 1,83 | 0 | 0,5 | 0 | 0,33 | 0 | 0,17 | 10,3 |
| 4% | 1,66 | 0,17 | 0,33 | 0,17 | 0,5 | 0,17 | 0 | 10,5 |
| Kontrol | 12,16 | 10,3 | 10,8* | 10,3 | 10 | 10,3 | 10,5 | 0 |


BNJ 0,05 = 5,61

Kesimpulan:

Merah : signifikan

Biru : non signifikan

Lampiran 11: Lotion Setelah Formulasi




Gambar 6. Foto Pengamatan Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:

- I = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 2%
- II = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 3%
- III = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 4%
- IV = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 2%
- V = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 3%
- VI = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 4%

Lampiran 12 : Uji Pengenceran Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat




Gambar 7: Foto Uji Pengenceran Lotion Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:

- I = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 2%
- II = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 3%
- III = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 4%
- IV = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 2%
- V = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 3%
- VI = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 4%

Lampiran 13: Uji Pengenceran Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat




Gambar 8. Uji Pengenceran Lotion Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:

- I = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 2%
- II = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 3%
- III = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 4%
- IV = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 2%
- V = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 3%
- VI = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 4%

Lampiran 14: Uji Metilen Blue pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat




Gambar 9. Foto Pengamatan Uji Metilen Blue Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:

- I = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 2%
- II = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 3%
- III = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 4%
- IV = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 2%
- V = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 3%
- VI = Lotion minyak nilam dengan emulgator nonionik 4%

Lampiran 15: Uji Metilen Blue pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat




Gambar 10. Foto Pengamatan Uji Metilen Blue Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:

- I = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 2%
- II = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 3%
- III = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 4%
- IV = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 2%
- V = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 3%
- VI = Lotion minyak nilam dengan emulgator anionik 4%

Lampiran 16: Uji Tetes Terdispersi Lotion pada Kondisi Sebelum Penyimpanan dipercepat




Gambar 11: Foto Uji Tetes Terdispersi Lotion pada Lation Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:

- I = Lotion dengan emulgator anionik 2%
- II = Lotion dengan emulgator anionik 3%
- III = Lotion dengan emulgator anionik 4%
- IV = Lotion dengan emulgator nonionik 2%
- V = Lotion dengan emulgator nonionik 3%
- VI = Lotion dengan emulgator nonionik 4%

Lampiran 17: Uji Tetes Terdispersi Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat




Gambar 12 : Foto Uji Tetes Terdispersi Lotion Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:

- I = Lotion dengan emulgator anionik 2%
- II = Lotion dengan emulgator anionik 3%
- III = Lotion dengan emulgator anionik 4%
- IV = Lotion dengan emulgator nonionik 2%
- V = Lotion dengan emulgator nonionik 3%
- VI = Lotion dengan emulgator nonionik 4%

Lampiran 18: Lotion Pengujian Volume Kriming pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat




Gambar 13: Foto Lotion Pengujian Volume Kriming pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:

- I = Lotion dengan emulgator anionik 2%
- II = Lotion dengan emulgator anionik 3%
- III = Lotion dengan emulgator anionik 4%
- III = Lotion dengan emulgator nonionik 2%
- III = Lotion dengan emulgator nonionik 3%
- III = Lotion dengan emulgator nonionik 4%

Lampiran 19: Uji Volume Kriming Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat




Gambar 14 : Foto Uji Volume Kriming Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:

- I = Lotion dengan emulgator anionik 2%
- II = Lotion dengan emulgator anionik 3%
- III = Lotion dengan emulgator anionik 4%
- III = Lotion dengan emulgator nonionik 2%
- III = Lotion dengan emulgator nonionik 3%
- III = Lotion dengan emulgator nonionik 4%

Lampiran 20: Histogram Viskositas lotion Sebelum dan Setelah Kondisi Dipercepat



Gambar 15. Histogram Viskositas Lotion (poise) Sebelum dan Setelah Kondisi penyimpanan Dipercepat.



Anita Puspita Sari, lahir di Bone 01 Oktober 1990 dari ibu **Hj. Jumiati** dan ayah **Basri** yang selalu mengirim Do'a, memberikan cucuran kasih sayang, bimbingan, didikan, ajaran untuk terus mendekatkan diri pada sang Khalik, dan dorongan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan Ummat.

Jenjang pendidikan formal berawal di SD Inpres 12./79 Palattae, SMP Negeri 1 Kahu Palattae, dan SMK YAPI Makassar. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya Farmasi UIN Alauddin Makassar. Selama menempuh masa kuliah aktif di organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2009-2010 dan Ismafarsi 2008-2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R