

**PEMANFAATAN SUSU SKIM SEBAGAI BAHAN DASAR DALAM
PEMBUATAN PRODUK OLAHAN MAKANAN TRADISIONAL
DANGKE DENGAN BANTUAN BAKTERI ASAM LAKTAT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

AHMAD RUSMIN R
NIM. 70100110006

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rusmin R
NIM : 70100110006
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang/20 November 1992
Jurusan : Farmasi
Alamat : BTN. Ranggong Permai Blok N no.6 Antang
Judul : Pemanfaatan Susu Skim Sebagai Bahan Dasar Dalam Pembuatan Produk Olahan Makanan Tradisional Dangke Dengan Bantuan Bakteri Asam Laktat

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, September 2014

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

AHMAD RUSMIN R
NIM. 70100110006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Susu Skim Sebagai Bahan Dasar Dalam Pembuatan Produk Olahan Makanan Tradisional Dangke Dengan Bantuan Bakteri Asam Laktat” yang disusun oleh Ahmad Rusmin R., NIM: 70100110006, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 8 September 2014 M yang bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 8 September 2014 M
13 Dzulqaidah 1435 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)
Sekretaris : Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing I : Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing II : Nur Ida, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Penguji I : Andi Tenriugi Dg. Pine, S.Si., M.Si. (.....)
Penguji II : Munirah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah subhānahu wata’āla atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Bunda beserta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu mendukung baik dari segi materi maupun non materi, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S. KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan bidang Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan bidang Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

6. Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.. selaku pembimbing pertama penulis yang telah memberi begitu banyak saran dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Nur Ida, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Andi Tenriugi Dg. Pine, S.Si., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Ibu Munirah, S.Ag., M.Ag. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan yang terdapat di dalam skripsi.
11. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga selesainya skripsi ini.
12. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, kakak-kakak angkatan 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005, serta adik-adik angkatan 2011, 2012 dan 2013 mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas segala

bantuan dan kerjasama yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah subhānahu wata'āla. Amin.

Wassalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Gowa, 8 September 2014

Penyusun,

AHMAD RUSMIN R
NIM. 70100110006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10-29
A. Susu Skim	10
B. Fermentasi	14
C. Bakteri Asam Laktat	17
D. Dangke	21
E. Enzim Papain	25
F. Tinjauan Islam Tentang Penelitian Susu	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31-38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel	31
C. Instrumen penelitian	32
D. Metode Kerja	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39-53
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	54-55
A. Kesimpulan	54
B. Implikasi Penelitian	54
KEPUSTAKAAN	56-59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60-72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja pembuatan starter	60
2. Skema kerja pembuatan dangke	61
3. Tabel hasil uji hedonik	62
a. Warna	62
b. Aroma	63
c. Rasa	63
d. Tukstur	64
4. Tabel hasil perhitungan kadar total asam laktat.....	65
5. Tabel hasil hasil perhitungan kadar protein	66
6. Tabel hasil perhitungan kadar lemak	68
7. Foto uji pH	69
8. Foto dangke	70



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi Susu Skim per 100 g Bahan.....	11
2. Komposisi susu skim (Tropicana slim)	12
3. Komposisi Kimia Dangke dan Produk Sejenis	23
4. Nilai rata-rata uji hedonik dan derajat keasaman dangke susu skim	39
5. Hasil Analisis Pengaruh Konsentrasi Susu Skim Dan Waktu Fermentasi terhadap Kadar Total Asam Laktat	39
6. Hasil Analisis Pengaruh Konsentrasi Susu Skim Dan Waktu Fermentasi terhadap Kadar Protein	41
7. Hasil Analisis Pengaruh Konsentrasi Susu Skim Dan Waktu Fermentasi terhadap Kadar Lemak	42
8. Hasil pengamatan uji hedonik untuk warna	62
9. Hasil pengamatan uji hedonik untuk aroma	63
10. Hasil pengamatan uji hedonik untuk rasa	63
11. Hasil pengamatan uji hedonik untuk tekstur.....	64
12. Hasil perhitungan kadar total asam laktat	65
13. Hasil perhitungan kadar protein	66
14. Hasil perhitungan kadar lemak	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram Alir Pengolahan Dangke	24
2. Produk Dangke Usai Cetak dan Siap Kemasan.....	24
3. Pengaruh konsentrasi terhadap kadar total asam laktat.....	40
4. Pengaruh lama hari fermentasi terhadap kadar total asam laktat.....	41
5. Pengaruh konsentrasi terhadap kadar protein.....	42
6. Pengaruh lama hari fermentasi terhadap kadar protein.....	43
7. Pengaruh konsentrasi terhadap kadar lemak.....	43
8. Pengaruh lama hari fermentasi terhadap kadar lemak.....	44
9. Foto Uji pH produk	69
10. Hasil Produksi Dangke dengan Fermentasi susu skim 5 %.....	70
11. Hasil Produksi Dangke dengan Fermentasi susu skim 10 %.....	71
12. Hasil Produksi Dangke dengan Fermentasi susu skim 15 %.....	72



ABSTRAK

Nama : Ahmad Rusmin R

NIM : 70100110006

Judul : Pemanfaatan Susu Skim Sebagai Bahan Dasar Dalam Pembuatan Produk Olahan Makanan Tradisional “Dangke” Dengan Bantuan Bakteri Asam Laktat

Dangke adalah produk pangan tradisional khas Enrekang, yang merupakan produk semacam keju tanpa pemeraman, dan tidak dikoagulasi dengan rennet melainkan dengan papain (getah buah pepaya). Dangke dalam formula ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar susu skim yang kemudian akan difermentasikan dengan menggunakan bakteri *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus bulgaricus* yang telah umum dipakai dalam proses pembuatan fermentasi susu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mutu produk makanan olahan tradisional Dangke yang dibuat dari bahan dasar susu skim, mengetahui pengaruh konsentrasi susu skim dan lama fermentasi pada pembuatan dangke terhadap dangke yang dihasilkan, serta mengetahui pandangan islam terhadap produk susu. Pentingnya meminum susu telah diatur didalam al quran karena merupakan minuman yang segar dan menyehatkan. Metode penelitian meliputi pembuatan Dangke dengan 3 variasi konsentrasi susu skim 5 %, 10 %, 15 %, Pemanasan pada suhu 65°C. Pendinginan suhu 40°C, inokulasi dengan bakteri *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus bulgaricus*. Inkubasi di oven suhu 40,5°C. Pada masa inkubasi 1, 2, 3 hari dilakukan pengujian hedonik yang berupa warna, aroma, rasa, dan tekstur kemudian dilakukan analisis yaitu kadar lemak, protein, dan asam laktat. Hasil analisis organoleptik menunjukkan bahwa mutu produk makanan olahan tradisional Dangke yang dibuat dari bahan dasar susu skim pada pembuatan dangke menghasilkan dangke berwarna putih, beraroma asam laktat, berasa asam, bertekstur semi padat. Hasil analisis nilai gizi menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi susu skim dan waktu fermentasi yang semakin lama menyebabkan kenaikan kadar protein, total asam laktat dan penurunan kadar lemak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah susu skim dapat dijadikan alternatif bahan baku dalam pembuatan dangke. Pengaruh konsentrasi susu skim dan lama fermentasi terhadap mutu dangke dapat meningkatkan kadar total asam laktat, kadar protein serta menurunkan kadar lemak. Mutu dangke fermentasi lebih baik dari dangke konvensional.

Kata kunci : Dangke, Susu Skim, Fermentasi, *Lactobacillus bulgaricus*, *Streptococcus thermophilus*

ABSTRACK

Name : Ahmad Rusmin R

NIM : 70100110006

Title : Utilization of Skim Milk In Development For Raw Material Processed Food Products Traditional "Dangke" With the assistance of Lactic Acid Bacteria

Dangke is Enrekang traditional food products, which is a kind of cheese products without curing, and not coagulated with rennet but with papain (papaya latex). Dangke in this formula made using skim milk base material which is then fermented using bacteria *Lactobacillus bulgaricus* and *Streptococcus thermophilus* which has been commonly used in the manufacturing process of milk fermentation. The purpose of this study was to determine the quality of processed food products made from the traditional Dangke basic ingredients skim milk, skim milk determine the effect of concentration and fermentation time on making dangke to dangke produced, and to know the view of Islam to dairy products. The importance of drinking milk has been arranged in the Qur'an because it is fresh and healthy drinks. Research methods include making Dangke with 3 variations of the concentration of skim milk 5%, 10%, 15%, heating at a temperature of 65°C. 40°C cooling, inoculation with bacteria *Lactobacillus bulgaricus* and *Streptococcus thermophilus*. The oven temperature incubation 40,5°C. In the incubation period 1, 2, 3 days in the form of hedonic testing color, aroma, flavor, and texture analysis is then performed fat, protein, and lactic acid. The results of the analysis showed that the organoleptic quality of processed food products traditional Dangke made from basic ingredients in the manufacture of skim milk yield dangke dangke white, flavored lactic acid, sour, textured semi-solid. The results of the analysis indicate that the nutritional value of the higher concentration of skim milk and the longer the fermentation time caused the increase in protein content, total lactic acid and a decrease in fat content. The conclusion of this study is skim milk can be used as an alternative raw material in the manufacture dangke. Effect of skim milk concentration and fermentation time on the quality of dangke can increase total levels of lactic acid, protein content and lower fat content. Fermentation dangke better quality than the conventional dangke.

Keywords: *Dangke, Skim Milk, Fermentation, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Susu adalah sekresi ambing hewan yang diproduksi dengan tujuan penyediaan makanan bagi anaknya yang baru dilahirkan. Karena berfungsi sebagai makanan tunggal bagi mahluk yang baru dilahirkan dan mulai tumbuh, susu mempunyai nilai gizi yang sempurna. Dalam susu terdapat semua zat gizi yang diperlukan bagi kebutuhan pertumbuhan anak (Setya, 2012: 3).

Susu merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Susu berperan sebagai asupan penting untuk kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan, khususnya anak-anak. Kesadaran masyarakat terhadap konsumsi susu, menjadikan susu sebagai komoditas ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis (Miftah, 2011:196).

Pentingnya mengkonsumsi susu sebenarnya telah di anjurkan dalam Al Quran, diantara ayatnya terdapat pada QS an-Nahl /16: 66.



Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya

(berupa) susu yang bersih antara hati dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya” (Kementrian Agama, 2013: 274).

Ayat tersebut memberi informasi kepada kita bahwa pentingnya kita mengkonsumsi susu dalam perut binatang ternak karna ada minuman yang segar dan menyehatkan serta memiliki gizi yang cukup untuk dinikmati oleh manusia.

Selain itu, dijelaskan pula dalam Al Quran yang mengajarkan kepada manusia agar mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi (makanan sehat). Diantara ayatnya terdapat pada QS Al-Baqarah / 2: 168.



Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Kementrian Agama, 2013: 25).

Maksudnya makanan yang halal dan bergizi. Makanan yang halal pada pengertian ayat tersebut yakni zat makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang dihalalkan agama, misalnya ikan, daging hewan, susu dan madu. Namun harus menjadi persyaratan mutlak, diteliti cara memperolehnya. Diperoleh dengan cara yang halal. Karena sekalipun makanan itu zatnya halal, tapi memperolehnya bukan cara yang benar, belum disebut mengandung gizi secara hakikat dan dapat merusak

pertumbuhan pendidikan dan jiwa anak. Karena arti makanan bergizi ialah dapat membangkitkan api kebenaran untuk memperoleh ilmu dan melakukan kebaikan misalnya salat dan berbuat amal untuk masyarakat. Jadi, Makanan yang halal dan bergizi adalah sumber energi kehidupan yang penuh keberkahan, mendatangkan manfaat, dan memacu produktivitas. Karena itu produksi pangan dewasa ini juga harus meningkat termasuk makanan hasil fermentasi seperti fermentasi susu, fermentasi kacang-kacangan dan lain-lain.

Produk-produk fermentasi seperti fermentasi susu telah lama diketahui mempunyai berbagai keunggulan ditinjau dari aspek gizi dan kesehatan. Produk-produk fermentasi susu yang sudah banyak diproduksi dan dikenal antara lain produk keju dan produk susu yang diasamkan seperti yoghurt, kefir, cultured buttermilk, acidophilus milk, dan lain-lain.

Fermentasi susu menjadai yoghurt dilakukan dengan bantuan bakteri asam laktat yaitu *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus bulgaricus*, tujuan utama fermentasi adalah untuk memperpanjang daya simpan susu karena mikroorganisme sulit tumbuh pada suasana asam dan kondisi kental. Susu fermentasi adalah susu yang berbentuk semi padat dari hasil fermentasi oleh kultur *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* atau penggunaan salah satu kultur saja (Prasetyo, 2010: 16).

Diversifikasi atau penganekaragaman produk susu selain sebagai upaya dalam meningkatkan konsumsi gizi masyarakat dengan daya tarik keragaman produknya, juga bertujuan untuk meningkatkan daya tahan produk sehingga dapat mengatasi

masalah keterbatasan ruang dan waktu. Dangka adalah salah satu produk tradisional yang berasal dari Kabupaten Enrekang yang merupakan bentuk diversifikasi produk olahan susu. Produk ini sangat disenangi dan diminati oleh masyarakat khususnya di kabupaten Enrekang (Fitrah, 2012: 5). Dangka biasanya dibuat dari susu kerbau atau susu sapi, yang memiliki komposisi kandungan kimia air 47,75%, lemak 32,81%, protein 17,20%, mineral 2,32% (Fitrah, 2012: 18). Oleh karena, memiliki kandungan gizi yang cukup besar terutama memiliki kandungan lemak yang dapat menyebabkan kolesterol, dipandang dari segi kesehatan maka perlu digunakan susu skim sebagai bahan dasar dalam pembuatan.

Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim mengandung semua zat makanan susu, sedikit lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim seringkali disebut sebagai susu bubuk tak berlemak yang banyak mengandung protein dan kadar air sebesar 5% (Setya, 2012: 38).

Susu skim adalah bagian susu yang banyak mengandung protein, sering disebut “serum susu”. Susu skim dapat digunakan oleh orang yang menginginkan nilai kalori rendah di dalam makanannya, karena susu skim mengandung hanya 55% dari seluruh energi susu dan susu juga digunakan dalam bahan baku dalam pembuatan keju berlemak rendah, yoghurt rendah lemak dan produk *bakery* (Laksmi, 2010: 12)

Kelemahan susu skim adalah susu skim mengandung sedikit lemak dan vitamin yang larut dalam lemak serta susu skim tidak memiliki beta karoten.

Betakaroten merupakan salah satu senyawa karotenoid yang mempunyai aktivitas vitamin A sangat tinggi. Dalam saluran pencernaan, betakaroten dikonversi oleh sistem enzim menjadi retinol, yang selanjutnya berfungsi sebagai vitamin A. Betakaroten dan karotenoid lain yang tidak terkonversi menjadi vitamin A, mempunyai sifat antioksidan, sehingga dapat menjaga integritas sel tubuh (Eli budi dkk, 2013: 10). Oleh karena itu, susu skim tidak baik bagi pertumbuhan mata dan kulit.

Manfaat susu skim adalah susu skim dapat digunakan oleh orang yang menginginkan kalori rendah dalam makanannya, Karena susu skim hanya mengandung 55 % dari seluruh energi susu dan susu juga digunakan dalam pembuatan keju dan yoghurt dengan kadar lemak rendah (Laksmi, 2010: 12).

Penggunaan susu skim dalam berbagai produk makanan memiliki keuntungan yaitu (1) mudah dicerna dan dapat dicampur dengan makanan padat atau semi padat, (2) susu skim mengandung nilai gizi yang tinggi, protein susu mengandung asam amino esensial (3) susu skim dapat disimpan lebih lama daripada *whole milk* karena kandungan lemaknya yang sangat rendah. Walaupun susu skim merupakan sumber protein yang baik, susu skim memiliki kekurangan yaitu rendahnya energi yang dikandung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukanlah penelitian tentang pemanfaatan susu skim sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk olahan makanan tradisional “Dangke” dengan bantuan bakteri asam laktat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan permasalahan yang diteliti antara lain:

1. Bagaimana mutu produk Dangke yang dibuat dari bahan dasar dengan menggunakan susu skim ?
2. Bagaimanakah pengaruh antara konsentrasi susu skim dan waktu fermentasi terhadap hasil pembuatan Dangke ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi operasional

- a. Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim mengandung semua zat makanan susu, sedikit lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim seringkali disebut sebagai susu bubuk tak berlemak yang banyak mengandung protein dan kadar air sebesar 5%.
- b. Konsentrasi susu skim adalah konsentrasi susu yang dibuat dari jumlah bahan dasarnya (5 %,10 %,15 %). Konsentrasi susu skim disini sebagai Variabel peubah.
- c. Fermentasi berasal dari bahasa Latin *fervere* yang berarti mendidihkan. Seiring perkembangan teknologi, definisi fermentasi meluas menjadi semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang disebut metabolit primer dan sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan.

- d. Waktu fermentasi adalah waktu yang diperlukan oleh bakteri asam laktat untuk dapat menguraikan laktosa menjadi asam laktat (1 hari, 2 hari, 3 hari). Waktu fermentasi disini sebagai Variabel peubah.
- e. Curd adalah hasil koagulasi (penggumpalan) casein susu membentuk padatan
- f. Whey adalah cairan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan dangke.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian yaitu dilakukan di laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada bulan Mei – Juni 2014.

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originilitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Dari beberapa penelitian sebelumnya oleh Yuniwati, Murni. dkk (2008) Jurusan Teknik Kimia, FTI, IST AKPRIND Yogyakarta dalam penelitiannya *Pemanfaatan Enzim Papain Sebagai Penggumpal Dalam Pembuatan* telah dikatakan bahwa dengan menggunakan 300 ml susu sapi diperoleh kondisi operasi yang baik yaitu dengan menggunakan konsentrasi enzim papain 0,4 % dan penambahan enzim dilakukan pada suhu 60°C. Pada kondisi tersebut diperoleh kadar protein yaitu 19,3864 %. Perendaman mentah dalam larutan 5 % massa dapat mengawetkan mentah hingga 5 hari sebelum diproses lebih lanjut.

Penelitian oleh Astuti. T Yuni dan T. Setyawardani (2004) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dalam penelitiannya *Penggunaan Susu Skim dan Asam Lemak Essensial sebagai Alternatif Cara Memperbaiki Kualitas Nutrisi Yoghurt* telah dikatakan bahwa Penambahan prolin dengan dosis 30 g per milliliter ke dalam pengencer susu skim memberikan hasil yang lebih baik daripada dosis lainnya maupun tanpa prolin.

Penelitian oleh Wahniyathi Hatta S. Pt. M. Si., (2013) Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dalam penelitiannya *Survei Potensi Pengembangan Dangke Susu Sapi Sebagai Alternatif Dangke Susu Kerbau Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan* telah dikatakan bahwa Potensi dangke susu sapi sebagai alternatif dangke susu kerbau meliputi ketersediaan bahan baku lebih banyak, kualitasnya (kadar air, lemak, protein, abu, dan nilai pH) sama dengan dangke susu kerbau, harga lebih murah, gampang dicari, karakteristik konsumen orang Enrekang mendukung penerimaan dangke susu sapi, lebih disukai oleh konsumen bukan orang Enrekang, serta memiliki warna dan aroma yang disukai konsumen.

Penelitian oleh Nurzainah Ginting, dan Elsegustri Pasaribu (2005) Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dalam penelitiannya *Pengaruh Temperatur Dalam Pembuatan Yoghurt dari Berbagai Jenis Susu Dengan Menggunakan (*Lactobacillus Bulgaricus* dan *Streptococcus Thermophilus*)* telah dikatakan bahwa Hasil yang paling baik diperoleh pada temperatur 44°C dengan pemakaian susu sapi *full* krim sebagai bahan dasarnya.

Penelitian oleh Fitrah Isyana (2012) Jurusan Produksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dalam penelitiannya *Studi Tingkat Higiene Dan Cemarkan Bakteri (Salmonella sp) Pada Pembuatan Dangke Susu Sapi Di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang* telah dikatakan bahwa Tingkat higiene pada aspek pengadaan dan pengelolaan bahan baku dangke masih rendah. Tangan pekerja, cetakan tempurung, daun pisang dan produk dangke yang diteliti tidak menunjukkan adanya cemarkan *Salmonella sp*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui mutu produk makanan olahan tradisional Dangke yang dibuat dari bahan dasar susu skim.
- b. Mengetahui pengaruh konsentrasi susu skim dan waktu fermentasi terhadap kadar protein, kadar air, kadar asam laktat dan cemarkan mikrobial dari hasil pembuatan Dangke

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah meningkatkan nilai fungsional dari susu skim dalam bahan dasar dalam pembuatan produk olahan susu dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Susu Skim*

Berdasarkan SNI 3752-2011, yang dimaksud susu bubuk adalah produk susu yang diperoleh dengan cara mengurangi sebagian besar air melalui proses pengeringan susu segar dan atau susu rekombinasi yang telah dipasteurisasi, dengan atau tanpa penambahan vitamin, mineral, dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Pembuatan susu bubuk merupakan salah satu upaya untuk mengawetkan susu sehingga dapat tahan lebih lama. Susu jenis ini dapat langsung dibedakan dari bentuk dan penampilannya. Produk susu bubuk merupakan hasil proses penguapan dan pengeringan dengan cara penyemprotan dalam tekanan tinggi. Kadar air susu bubuk sekitar 5%. Proses pembuatannya melalui tahap pemanasan pendahuluan dan pengeringan. Pemanasan pendahuluan bertujuan untuk menguapkan air sehingga tinggal sekitar 45-50%. Pemanasan pendahuluan menggunakan temperatur antara 65-170°C, tergantung jenis susu bubuk yang akan dibuat. Susu bubuk penuh menggunakan suhu yang rendah dibanding susu bubuk skim. Klasifikasikan susu bubuk ada beberapa jenis seperti berikut, (Setya, 2012: 41).

1. Susu bubuk *full cream*, susu bubuk dengan kandungan lemak sampai 100%
2. Susu bubuk *half cream*, susu bubuk kandungan lemaknya dikurangi hingga hanya 50%
3. Susu skim, susu bubuk yang kandungan lemaknya hanya sekitar 10%
4. *Whey powder*, merupakan bahan sisa dari proses pembuatan susu bubuk.

Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim mengandung semua zat makanan susu, sedikit lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim seringkali disebut sebagai susu bubuk tak berlemak yang banyak mengandung protein dan kadar air sebesar 5%. Penggunaannya dalam pengolahan pangan dapat berfungsi sebagai penstabil emulsi, pengikat air, koagulasi, dan lain-lain. Susu kering tanpa lemak ini mempunyai kemampuan untuk mengemulsikan lemak yang terbatas, karena kasein yang dimilikinya berkombinasi dengan sejumlah kalsium (Ca), sehingga tidak mudah larut dalam air. Jika sodium menggantikan sebagian Ca, kelarutan kasein dalam air dan kapasitas emulsifikasi akan meningkat (Setya, 2012: 38).

Komposisi susu skim dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Susu Skim per 100 g Bahan

Komponen	Berat (%)
Protein Lemak	35 - 370,8
Laktosa	49 - 52
Air	3
Abu	7,5 - 8

Sumber: Setya (2012).

Kandungan gizi 100 gram susu skim yaitu energi 36 Kkal, protein 3,5 gram, lemak 0,1 gram, dan karbohidrat 5,1 gram (santoso, 2013:2). Krim adalah bagian susu yang banyak mengandung lemak yang timbul ke bagian atas dari susu pada waktu didiamkan atau dipisahkan dengan alat pemisah. Ada pula yang menyebutnya 'kepala susu'. Susu skim adalah bagian susu yang banyak mengandung protein,

sering disebut “serum susu”. Susu skim mengandung semua zat makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Krim dan susu skim dapat dipisahkan dengan alat yang disebut *separator*. Alat ini bekerja berdasarkan gaya sentrifuge. Pemisahan krim dan susu skim dapat terjadi karena kedua bahan tersebut mempunyai berat jenis yang berbeda. Krim mempunyai berat jenis yang rendah karena banyak mengandung lemak. Susu skim mempunyai berat jenis yang tinggi karena banyak mengandung protein, sehingga dalam sentrifugasi akan berada dibagian dalam (mengendap).

Susu skim dapat digunakan oleh orang yang menginginkan nilai kalori rendah di dalam makanannya, karena susu skim hanya mengandung 55% dari seluruh energi susu, dan susu skim juga digunakan dalam pembuatan keju dengan lemak rendah dan yoghurt. Susu skim seharusnya tidak digunakan untuk makanan bayi tanpa adanya pengawasan gizi karena tidak adanya lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak (Eniza, 2010: 5).

Menurut Food and Drug Administration (FDA) komposisi susu skim (Tropicana slim) sebagai berikut :

Tabel 2. Komposisi susu skim (Tropicana slim).

Komposisi	/100 gr	/22,5 gr	% DV
Kalori (Kal)	347	78	-
Kalsium (Mg)	1920	432	54%
Total Lemak (gr)	**	-	-
Karbohidrat (gr)	50,5	11,4	4%
Protein (gr)	33,8	7,6	15%
Vit A (IU)	5550	1250	25%

Vit D (IU)	445	100	25%
Vit E (IU)	22	5	25%

Keterangan:

** : Kurang dari 0,21 gr/penyajian

* DV : Kebutuhan perhari orang dewasa menurut standar Amerika

Susu tersusun atas krim dan susu skim. Krim merupakan bagian susu yang banyak mengandung lemak yang timbul ke bagian atas dari susu pada waktu didiamkan atau dipisahkan dengan alat pemisah. Susu skim adalah bagian susu yang banyak mengandung protein, sering disebut “serum susu” dan mengandung hanya 55% dari seluruh energy susu. Susu skim mengandung semua zat gizi dari susu kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak.

Susu skim dapat digunakan oleh orang yang menginginkan nilai kalori rendah di dalam makanannya, dan bahan baku dalam pembuatan keju berlemak rendah, yoghurt rendah lemak dan produk *bakery* (Laksmi, 2010: 12).

Susu skim adalah bagian dari susu yang tertinggal setelah lemak dipisahkan melalui proses separasi. Laktosa yang terkandung dalam susu skim adalah 5% dengan pH 6,6. Laktosa merupakan karbohidrat utama dalam susu yang dapat digunakan oleh bakteri starter sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya (septiani, 2013: 2).

Susu merupakan bahan baku yang sangat potensial untuk menghasilkan produk-produk yang menggunakan teknologi mikroorganisme, karena susu dapat menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Saat ini telah terjadi pergeseran pola makan pada masyarakat. Kesadaran konsumen untuk

mengonsumsi makanan sehat semakin meningkat, sehingga menyebabkan konsumsi produk pangan hasil fermentasi juga meningkat. Produk-produk fermentasi telah lama diketahui mempunyai berbagai keunggulan ditinjau dari aspek gizi dan kesehatan (Anita, 2010: 4)

B. Fermentasi

Fermentasi adalah suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Untuk hidup semua mikroorganisme membutuhkan sumber energi yang diperoleh dari metabolisme bahan pangan dimana mikroorganisme berada di dalamnya. Bahan baku energi yang paling banyak digunakan oleh mikroorganisme adalah glukosa. Dengan adanya oksigen beberapa mikroorganisme mencerna glukosa dan menghasilkan air, karbondioksida, dan sejumlah besar energi (ATP) yang digunakan untuk tumbuh. Ini adalah metabolisme tipe aerobik. Akan tetapi beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan baku energinya tanpa adanya oksigen dan sebagai hasilnya bahan baku energi ini hanya sebagian yang dipecah. Bukan air, karbondioksida, dan sejumlah besar energi yang dihasilkan, tetapi hanya sejumlah kecil energi, karbondioksida, air, dan produk akhir metabolik organik lain yang dihasilkan. Zat-zat produk akhir ini termasuk sejumlah besar asam laktat, asam asetat, dan etanol, serta sejumlah kecil asam organik volatil lainnya, alkohol dan ester dari alkohol tersebut. Pertumbuhan yang terjadi tanpa adanya oksigen sering dikenal sebagai fermentasi (Suprihatin, 2010: 2).

Fermentasi adalah salah satu kegiatan mikrobial untuk menggunakan senyawa organik atau sumber karbon guna memperoleh tenaga bahan metabolismenya dengan hasil ikutan berupa gas sebagai sumber karbon dalam fermentasi adalah lipida. Mikrobia yang berperan dalam fermentasi dapat diklasifikasikan dalam golongan bakteri, kapang dan khamir (Prasetyo, 2010: 16)

Fermentasi secara teknik dapat didefinisikan sebagai suatu proses oksidasi anaerobic atau parsial anaerobic karbohidrat yang menghasilkan alkohol serta beberapa asam.² Gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa sebagai bahan dasar ketika difermentasi dalam kondisi anaerob akan menghasilkan etanol, asam laktat, asam butirat, aseton, dan hydrogen. Proses fermentasi ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi asam atau penurunan pH.³ Terjadinya penurunan pH mengindikasikan terjadinya aktifitas mikroba dalam menguraikan karbohidrat. Mikroba yang umum ditemukan dalam fermentasi adalah bakteri, khamir, dan kapang (Nurisva, 2013: 81-82)

Proses fermentasi dapat meningkatkan ketersediaan zat-zat makanan seperti protein dan energi metabolis serta mampu memecah komponen kompleks menjadi komponen sederhana. Fermentasi merupakan proses perombakan dari struktur keras secara fisik, kimia, dan biologis sehingga bahan dari struktur kompleks menjadi sederhana sehingga daya cerna ternak menjadi lebih efisien (Askari, 2012: 3).

Mikroorganisme yang memfermentasi bahan pangan dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan (produk-produk fermentasi yang diinginkan) dan perubahan yang merugikan (kerusakan bahan pangan). Dari mikroorganisme yang

memfermentasi bahan pangan, yang paling penting adalah bakteri pembentuk asam laktat, asam asetat, dan beberapa jenis khamir penghasil alkohol (Suprihatin, 2010: 3).

Fermentasi susu menjadai yoghurt dilakukan dengan bantuan bakteri asam laktat yaitu *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus bulgaricus*. Tujuan utama fermentasi adalah untuk memperpanjang daya simpan susu karena mikroorganismenya sulit tumbuh pada suasana asam dan kondisi kental. Susu fermentasi adalah susu yang berbentuk semi padat dari hasil fermentasi oleh kultur *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* atau penggunaan salah satu kultur saja (Prasetyo, 2010: 16).

Pengolahan susu melalui proses fermentasi telah banyak dilakukan untuk mendapat susu yang bersifat asam. Buckle *et al* (1987), menyatakan bahwa salah satu produk susu fermentasi adalah yogurt. Berabad-abad yang lalu masyarakat di Eropa membiarkan susu tercemar secara alami oleh bakteri sehingga menjadi asam pada suhu 40-50°C, cara tersebut telah berevolusi dengan menambahkan bakteri asam laktat secara sengaja pada susu sehingga susu mengalami fermentasi menjadi asam (Prasetyo, 2010: 17).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaruh makanan dan minuman dengan manfaat fungsional bagi kesehatan, produk fermentasi berkembang dengan pesat salah satunya produk probiotik yang menggunakan bakteri asam laktat (Sintasari, dkk., 2014: 66).

C. Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat (BAL) dikategorikan sebagai *foodgrade microorganism* karena bersifat nonpatogen dan aman bagi manusia. Peranannya pada bidang pangan sudah sangat luas terutama pada *processing* makanan seperti fermentasi susu, daging dan sayuran. Salah satu manfaat BAL yang paling penting adalah menghambat pertumbuhan bakteri perusak makanan atau patogenik asal makanan, seperti *Staphylococcus aureus* dan *Listeria monocytogenes*, *Clostridium botulinum*, *C. perfringens*, *Bacillus cereus*, dan lain lain. Aktivitas antimikroba disebabkan oleh karena BAL dapat menghasilkan senyawa antimikroba, termasuk asam lemak organik, diasetil dan hydrogen peroksida. Beberapa diantaranya telah diketahui dapat menghasilkan bakteriosin, yaitu peptida atau protein bakterisida yang aktif secara biologis.

Secara umum BAL didefinisikan sebagai kelompok bakteri Gram positif, tidak menghasilkan spora, berbentuk bulat atau batang. Beberapa jenis bakteri asam laktat ada yang digolongkan ke dalam bakteri probiotik, seperti *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, dan *Streptococcus*. Bakteri asam laktat yang digolongkan ke dalam probiotik harus memiliki aktifitas antimikroba terhadap beberapa mikroorganisme tertentu, toleran terhadap asam lambung, dan tidak berbahaya (Nursiva, 2013: 82).

BAL termaksud kelompok mikroorganisme dengan substrat dan lingkungan hidup sangat luas, baik di perairan, tanah, lumpur, maupun batuan. BAL juga dapat menempel pada jasad hidup lain seperti tanaman, hewan, serta manusia. Pada

manusia, sejumlah BAL ditemukan di usus, aliran darah, paru-paru, serta mulut (Anita, 2010: 1)

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan salah satu bakteri yang dihasilkan selama proses fermentasi karbohidrat. Bakteri ini dapat memproduksi asam laktat, asam asetat, etanol, dan CO₂. Aktifitas bakteri ini dapat menyebabkan penurunan pH dimana bakteri patogen tidak dapat tumbuh pada pH yang rendah dan meningkatkan nilai sehat terhadap makanan atau minuman yang difermentasi. Selain itu, saat ini BAL digunakan untuk pengawetan, memberikan tekstur, dan menambah cita rasa makanan atau minuman (Nursiva, 2013: 82).

BAL berperan penting dalam proses fermentasi minuman dan makanan. Pengawetan makanan dengan fermentasi asam laktat merupakan perubahan bahan makanan dan minuman menjadi produk lain yang lebih awet. Banyak bahan makanan dan minuman yang diawetkan dengan fermentasi asam laktat seperti susu, daging, buah, dan sayuran. BAL ini tidak hanya menghasilkan asam laktat dan laktobasilin. Dihasilkan pula senyawa tertentu yang dapat meningkatkan nilai organoleptik makanan dan minuman, termaksud rasa dan bau yang mengundang selera serta memperbaiki tekstur produk (Anita, 2010: 3)

Bakteri asam laktat yang paling umum digunakan dalam fermentasi yoghurt adalah *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus*. Bakteri ini dapat digunakan secara terpisah, namun penggunaan keduanya dalam kultur starter yogurt secara bersama sama terbukti telah bersimbiosis dan meningkatkan efisiensi kerja kedua bakteri.

Bakteri asam laktat yang terlibat dalam proses fermentasi yoghurt dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan, khususnya menjaga keseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan, produk dari pangan fermentasi yang demikian dikenal sebagai makanan fungsional (Triyono, 2010: 1)

Beberapa spesies yang penting dalam kelompok bakteri asam laktat adalah: *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, *Streptococcus lactis*, *Streptococcus cremoris*, *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus acidophilus*, *leuconoctoc devtranicum*.

1. *Streptococcus thermophilus*

a. Klasifikasi

Divisio : Protozoa

Kelas : Schizomycetes

Bangsa : Eubacteriales

Suku : Lactobacteriaceae

Genus : Stertococcus

Spesies : *Streptococcus thermophilus* (Irianto, 2006: 7).

b. Morfologi

Selnya berbentuk bulat lonjong, berdiameter kurang dari 2 μm , terdapat berpasangan atau dalam rantai bila ditumbuhkan dalam medium cair, anaerobic fakultatif, gram positif, metabolisme fermentatif (Irianto, 2006: 7).

2. *Lactobacillus bulgaricus*

a. Klasifikasi

Divisio : Protozoa

Kelas : Schizomycetes

Bangsa : Eubacteriales

Suku : Lactobacteriaceae

Genus : *Lactobacillus*

Spesies : *Lactobacillus bulgaricus* (Irianto, 2006: 7).

b. Morfologi

Selnya berbentuk batang, bervariasi dari panjang dan ramping sampai kokobasilus pendek. Pembentuk rantai umum dijumpai terutama pada fase pertumbuhan, tidak membentuk spora, gram negatif dengan bertambahnya umur dan derajat keasaman (Irianto, 2006: 7).

D. Dangke

Dangke adalah sejenis makanan bergizi yang dibuat dari susu kerbau. Kadang-kadang dangke juga dibuat dari susu sapi. Dangke dibuat di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Fitrah, 2012: 16). Daerah yang terkenal sebagai penghasil dangke di Kabupaten Enrekang adalah Kecamatan Cendana, Baraka, Anggeraja, dan Kecamatan Alla. Dangke telah dikenal sejak sebelum tahun 1905. Adapun nama dangke berasal dari bahasa Belanda, sewaktu orang Belanda melihat jenis makanan yang terbuat dari susu tersebut, mereka mengatakan “DANK WELL” yang artinya terima kasih. Rakyat yang mendengar kata dangke mengira itulah nama makanan tersebut.

Khususnya di Kabupaten Enrekang, susu sapi dan kerbau segar yang diperah sebagian besar diperuntukkan untuk pembuatan dangke dalam skala usaha rumah tangga. Untuk menghasilkan sebuah dangke berukuran setengah tempurung kelapa, dibutuhkan sekitar 1,25 – 1,50 liter susu segar, tergantung bangsa sapi, getah papaya dan garam melalui proses pemanasan/pemasakan yang selanjutnya dikemas menggunakan daun pisang (Fitrah, 2012: 16).

Kuantitas produksi yang dihasilkan tiap unit usaha rumah tangga bergantung pada jumlah induk laktasi yang dimiliki. Data yang tercatat pada Januari 2008 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 256 unit usaha pengolah dangke dan berdasarkan jumlah populasi yang ada sekarang (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Enrekang, 2010), dapat dihasilkan susu murni sekitar 672.000 liter/tahun yang diolah menjadi dangke. Dari tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2009,

tercatat angka produksi susu antara 3.287 sampai 3.376 liter/hari se-Kabupaten Enrekang. Jika diasumsikan untuk menghasilkan sebuah dangke dibutuhkan 1,5 liter susu segar, berarti sekitar 2000 dangke di produksi setiap harinya.

Sebagai salah satu produk olahan susu, dangke memiliki nilai tambah (*added value*) tersendiri dari limbahnya yakni berupa *whey* dangke yang juga dapat diolah menjadi produk olahan bergizi tinggi lainnya, misalnya dalam bentuk *nata de whey*. Namun untuk saat ini, *whey* hanya dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai susu substitusi (tambahan/pengganti) bagi pedet sapi perah (Fitrah, 2012: 17).

Saat ini pemasaran dangke tidak hanya di daerah Sulawesi Selatan, tetapi bahkan sampai ke Kalimantan, Jakarta, Papua, Malaysia, dan daerah-daerah dimana komunitas masyarakat Enrekang berada (Fitrah, 2012: 17). Salah satu kendala yang dialami dalam pengembangan makanan tradisional tersebut adalah ketidakseragaman kualitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat dan masa simpan produk yang masih cukup singkat sehingga relatif sulit dalam menjangkau wilayah pemasaran yang lebih luas.

Dangke adalah produk semacam keju tanpa pemeraman, dan tidak dikoagulasi dengan rennet melainkan dengan papain (getah buah pepaya). Dangke yang diproduksi di Enrekang, Sulawesi Selatan umumnya dikonsumsi sebagai lauk pauk. Dangke asli berwarna putih dan bersifat elastis sedangkan dangke campuran (palsu) warnanya agak kuning kusam dan tidak elastis (Fitrah, 2012: 17). Dangke merupakan bahan pangan dengan nilai gizi yang tinggi. Adapun perbedaan komposisi kimia dangke dan produk lainnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 3. Komposisi Kimia Dangke dan Produk Sejenis

Produk	Komposisi Kimia (%)			
	Air	Lemak	Protein	Mineral
Dangke (a)	47,75	32,81	17,20	2,32
Dali (b)	62,86	23,25	11,51	-
Dadih (c)	82,40	8,17	7,06	0,91
Cottage cheese (d)	79,20	4,30	13,20	0,80


Ket : (a,b,c) Bahan baku susu kerbau

(d) Bahan baku susu sapi

Sumber: (a) Marzoeki (1978). (b,c) Mattila dan saarela (2000)


Dangke diolah dari susu sapi atau susu kerbau yang dipanaskan dengan api kecil sampai hampir mendidih, kemudian ditambahkan koagulan berupa getah buah pepaya (papain) sehingga terjadi penggumpalan, dan terkadang juga ditambahkan garam. Setelah terjadi pemisahan antara gumpalan dan cairan berwarna kuning, gumpalan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang terbuat dari tempurung kelapa (bagian ujungnya dilubangi untuk jalan ke luar cairan) sambil ditekan-tekan supaya cairannya terpisah (Fitrah, 2012: 18).

Biasanya jika menggunakan konsentrasi papain (getah buah pepaya muda ditambah air) lebih kurang setengah sendok makan untuk 5 liter susu, dapat dihasilkan 4 buah dangke. Dangke yang masih dalam keadaan panas kemudian dibungkus dengan daun pisang. Alur proses pembuatan dangke dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Pengolahan Dangka (Fitrah, 2012: 19).

Dangka yang tidak langsung dikonsumsi dapat disimpan dalam *freezer* yang sebelumnya ditaburi dengan garam halus. Penyimpanan dengan cara ini dapat mempertahankan kualitas produk hingga kurang lebih 3 (tiga) minggu (Fitrah, 2012: 19). Produk dangke yang telah dicetak selanjutnya dikemas menggunakan daun pisang sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Produk Dangka Usai Cetak dan Siap Kemas (Fitrah, 2012: 19).

E. Enzim Papain

Susu dapat dikatakan sebagai produk yang mendekati sempurna untuk makanan bagi manusia sehingga dianjurkan untuk berdo'a setelah meminumnya. Susu mengandung bahan pangan yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu air, lemak, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Kadar zat gizi tersebut dalam perbandingan yang sempurna dan mudah dicerna oleh tubuh sehingga susu merupakan salah satu bahan makanan yang penting untuk manusia (Rokhayati, 2011). Berdasarkan susunan zat tersebut menyebabkan susu merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme sehingga mudah rusak (Habibah, 2011). Upaya untuk mengatasinya dengan cara pengolahan susu menjadi bahan makanan lain seperti tahu susu selain dapat mengawetkan susu juga menunjang program penganekaragaman pangan dalam bentuk olahan yang sudah memasyarakat (Firmanita, 2013: 843).

Tahu susu dapat diperoleh dengan cara menggumpalkan protein yang terdapat di dalam susu. Penggumpalan susu dalam proses pembuatan tahu susu dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan asam atau enzim proteolitik serta dapat dipercepat dengan perebusan (Rokhayati, 2011). Enzim proteolitik yang biasa digunakan rennet, renin dan papain (Miskiyah dkk., 2011).

Proses pembuatan tahu susu meliputi proses pasteurisasi, penambahan bahan penggumpal, pemansan 90°C, penyaringan, pengepresan dan pengukusan. Pengukusan bertujuan untuk memanaskan adonan sehingga menghasilkan struktur tahu susu yang baik. Suhu optimal aktivitas papain yaitu 50-65°C dengan pH optimum 5-7. Enzim papain pada umumnya peka terhadap kondisi panas terutama

pada rentangan suhu diatas aktivitasnya. Papain mempunyai daya tahan panas lebih tinggi dari enzim lain. Keaktifan enzim papain hanya menurun 20% pada pemanasan 70°C selama 30 menit pada pH 7,0 (Firmanita, 2013: 843).

Penggumpalan merupakan tahapan proses yang paling penting karena adanya korelasi yang kompleks pada variabel kimia (total padatan, pH dan volume), jumlah dan konsentrasi penggumpal, metode penambahan dan pencampuran serta suhu dan waktu. Pemanasan protein dapat mengalami denaturasi, artinya strukturnya berubah dari bentuk ganda yang kuat menjadi kendur dan terbuka sehingga memudahkan bagi enzim untuk menghidrolisis dan memecahkan protein menjadi asam-asam amino. Denaturasi dapat merubah sifat protein menjadi sukar larut dan semakin kental, keadaan ini disebut koagulasi. Menurut Miskiyah dkk., (2011) aktivitas papain ditandai dengan proses pemecahan substrat menjadi produk oleh gugus histidin dan sistein pada sisi aktif enzim (Firmanita, 2013:844).

Enzim rennet yang digunakan sebagai pengkoagulan pada proses pembuatan keju sangat mahal, sehingga perlu adanya pengganti enzim rennet. Salah satu enzim yang dapat digunakan sebagai pengganti enzim rennet adalah papain dari getah pepaya (Egrina, 2010: 38).

F. Tinjauan Islam Tentang Penelitian Susu

Susu merupakan makanan yang penting bagi manusia maupun setiap hewan yang menyusui (mamalia) terutama pada awal masa pertumbuhannya sebab susu mengandung gizi yang tinggi yang sulit ditandingi oleh susu buatan yang telah ada selama ini.

Rasulullah saw kadang-kadang meminum susu murni dan kadang-kadang susu yang dicampur dengan sedikit air. Susu dapat menetralsir suhu badan dan mengandung nilai gizi yang tinggi dan amat baik. Selain itu susu menjadi salah satu makanan atau minuman yang sangat digemari oleh masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa. Sehingga banyak produk makanan yang menjelaskan susu sebagai bahan dasar dalam pembuatan permen, es krim, kue, yoghurt, keju dan lain-lain.

Dalam Al Quran Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya pada QS an-Nahl /16: 66.



Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara hati dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya” (Kementrian Agama, 2013: 274).

Ayat tersebut member informasi kepada kita bahwa dalam perlu binatang ternak itu ada minuman yang segar dan menyehatkan serta memilki gizi yang cukup

untuk dinikmati oleh manusia. Yang perlu diteliti lebih lanjut adalah memanfaatkannya baik sebagai minuman maupun sebagai bahan yang digunakan menjadi makanan.

Sekalipun demikian tinggi gizinya, berhubungan juga jika mengonsumsi sesuatu dengan berlebih-lebihan. Pernyataan Allah dalam QS al-A'raf/ 7: 31.

Allah swt berfirman:

..... **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا**

Terjemahan:

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.....” (Kementerian Agama, 2013: 154)

Allah swt memberikan petunjuk kepada hamba-hambaNya untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh yang dapat memperkuat ketahanan tubuh. Namun banyaknya makanan harus dapat membawa manfaat untuk tubuh. Jika makanan itu melampaui batas ukuran yang semestinya akan dapat menimbulkan penyakit. Demikian pula sebaliknya, tidak makan dan tidak minum juga dapat menimbulkan penyakit.

Susu dapat dikatakan sebagai produk yang mendekati sempurna untuk makanan bagi manusia sehingga dianjurkan untuk berdoa setelah meminumnya. Sesuai yang diriwayatkan oleh imam Turmudzi.



Artinya : “ Ya Allah, berilah kami berkah dengan minuman itu dan berilah tambahan lagi daripadanya” (H.R. Turmudzi, hadis no.3455)

Pentingnya meminum susu yang telah dianjurkan oleh Allah SWT sangatlah penting bagi umat manusia karena pemberian Allah SWT tidak ada yang sia-sia. Sesuai yang diriwayatkan di dalam Al Quran Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya pada QS al-Imran /3: 191.



Terjemahan:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka” (Kementerian Agama, 2013: 274).

Karena telah menjadi minuman atau makanan maka Rasulullah member petunjuk supaya lebih bermanfaat dan berkualitas sebelum meminum atau mengkonsumsi makanann atau minuman tersebut, hendaklah berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Turmudzi

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَخَلِبَتْ فَشَرِبَ ثُمَّ أُخْرَ فَشَرِبَهُمْ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ جِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْعَدِ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَخَلِبَتْ فَشَرِبَ جِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ

يَشْرَبُ فِي مَعِي وَاجِدِ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ

سُهَيْلٍ

artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al Anshari, telah menceritakan kepada kami Ma'n, telah menceritakan kepada kami Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah kedatangan tamu seorang kafir, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk didatangkan seekor kambing dan memeras susunya. Maka laki-laki kafir itu pun meminumnya, kemudian diperaskan lagi dan diminumnya lagi, diperaskan lagi dan diminumnya lagi hingga ia menghabisinya tujuh bejana susu. Lalu pada esok hari ia masuk Islam, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memerintahkan agar laki-laki itu diperaskan susu kambing. Maka laki-laki itu meminumnya, sesudah itu ditawarkan lagi padanya, namun tidak ia tidak sanggup untuk menghabiskannya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin itu hanya minum dengan satu usus, sementara orang kafir minum dengan tujuh usus." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits shahih gharib dari haditsnya Suhail” (H.R. Turmudzi)

Berdasarkan hadis tersebut nabi menyarankan bahwa hendaknya berdoa sebelum meminum susu. Kandungan gizi dari susu sangat tinggi karena itu susu dapat menjadi bahan minuman bahkan dapat dijadikan bahan untuk makanan atau minuman lain yang dipasarkan dengan menggunakan bahan dengan atau tambahan dari susu termaksud dalam pembuatan dangke.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara eksperimentatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berlangsung mulai dari bulan Mei 2014 sampai dengan Juli 2014.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah susu skim yang diperoleh dari salah satu supermarket di Makassar.

2. Sampel

Sampel penelitian diambil secara random dari populasi yang ada dengan kriteria sebagai berikut: Susu yang tertinggal setelah krim diambil sebagian atau seluruhnya. Mengandung semua komponen gizi dari susu yang tidak dipisahkan, kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak (Setya, 2012: 38).

C. Instrumen Penelitian

1. Alat Kerja

Alat yang digunakan adalah autoklaf (Smic model YX-280 B[®]), batang pengaduk, buret 50 ml (Pyrex[®]), cawan petri (Pyrex[®]), cawan porselin, corong pisah (Pyrex[®]), enkas, erlenmeyer 250 ml (Pyrex[®]), gelas kimia (Pyrex[®]), gelas ukur 100 ml (Pyrex[®]), inkubator (Memmert[®]), kamera digital (Conan[®]), kapas, kertas timbang, labu tentuukur 50 dan 500 ml (Pyrex[®]), lap halus dan kasar, lemari asam, neraca analitik (AND[®]), ose, oven (Memmert[®]), penangas air, panci, pipet tetes, pipet volume 2 dan 10 ml (Pyrex[®]), rak tabung, saringan teh, senduk tanduk, spoit 10 ml (OneMed[®]), statif dan klem, tabung reaksi (Pyrex[®]), thermometer, toples, dan alat-alat gelas.

2. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan susu skim, medium Man Rogosa and Sharpe Broth (MRSB), Nutrien Agar (NA), kultur murni *Lactobacillus bulgaris* dan *Streptococcus thermophilus*, enzim papain, aluminium foil, air suling steril, alcohol 70%, larutan fenolftalein, NaOH 0,1 N, kertas pH universal, selen reagen mixture, H₂SO₄ (P), asam borat 1%, larutan bromocresol green, HCl 0,1 N, N-hexsan.

D. Metode Kerja

1. Pengolahan Sampel

a. Penyiapan Sampel

Susu skim yang digunakan diperoleh dari pasar supermarket makassar yang selanjutnya dibawa ke laboratorium.

b. Pelarutan sampel

Susu skim 5% (15 gram susu skim), 10% (30 gram susu skim), 15% (45 gram susu skim) masing-masing dilarutkan dengan menggunakan aquades 300 ml di dalam gelas Erlenmeyer, dipanaskan di atas water bath selama 2 menit ketika suhunya telah mencapai 100°C sampai susu larut.

2. Sterilisasi Alat (Djide, M. Natsir dan Sartini 2011).

Peralatan gelas seperti cawan petri, tabung reaksi, dan pipet, erlenmeyer, gelas ukur, yang telah digunakan untuk membiakkan mikroorganisme harus disterilkan dalam autoklaf pada tekanan 2 atm pada suhu 120°C selama 15 menit. Untuk pipet yang telah dipakai untuk mengambil mikroorganisme harus didesinfeksi dengan larutan fenol 5 % selang waktu tertentu. Kemudian digodok dengan larutan Na_3PO_4 1% sampai mendidih beberapa menit. Lalu dicuci dengan air sampai bersih dan direndam dalam larutan HCl 1% selama beberapa jam atau 24 jam untuk melarutkan sisa fosfat pada gelas. Dicuci kembali dengan air dan dibilas dengan air suling. Dikeringkan dalam oven dengan suhu 160-170°C selama kurang lebih 1-3 jam. Sebelum disterilkan cawan petri ujungnya disumbat sedikit dengan kapas. Selanjutnya pipet dibungkus dengan kertas. Jarum ose disterilkan dengan membakar langsung alat tersebut diatas lampu spiritus sampai pijar dan diulang beberapa kali.

3. Pembuatan medium (Difco, 1988: 121)

a. Medium Man Ragosa and Sharpe Agar (MRSA)

Komposisi:

MRS Broth 52 gram

Agar	15 gram
Aquades	1000 ml
pH	6,0

Pembuatan:

Bahan-bahan yang digunakan sesuai kebutuhan dimasukkan kedalam gelas Erlenmeyer. Lalu dilarutkan dengan air suling 800 ml. Kemudian dipanaskan hingga larut. Diatur pHnya sampai 6,0 selanjutnya dicukupkan volunya dengan air suling hingga 100 ml. kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Medium Nutrien Agar (NA)

Komposisi:

Eksterk beef	5 gram
Pepton	10 gram
Agar	15 gram
Air suling	1000 ml
pH	7,0

Pembuatan:

Bahan-bahan yang digunakan sesuai kebutuhan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer lalu dilarutkan dengan air suling 800 ml. kemudian dipanaskan hingga larut. Diatur pHnya sampai pH 7,0 selanjutnya dicukupkan volumenya dengan air suling hingga 1000 ml. kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

4. Peremajaan bakteri

Bakteri *Lactobacillus bulgaricus* diremajakan dengan cara mengisolasi secara aseptis satu ose biakan bakteri pada medium NA lalu diinkubasi pada suhu 40,5°C selama 24 jam. Hal yang sama dilakukan terhadap bakteri *Streptococcus thermophilus* tetapi pada medium MRSB

5. Pembuatan Medium Starter

Komposisi:

Susu skim 100 ml

pH 7,0

Pembuatan:

Dimasukkan 100 ml susu skim ke dalam botol Pasteurisasi. Dipanaskan pada suhu 70°C selama 15 menit. Kemudian didinginkan.

6. Pembuatan Kultur Starter

Kultur starter dibuat dengan mengisolasi 1 ose biakan *Lactobacillus bulgaris* yang telah diremajakan untuk tiap 2,5 ml medium starter. Kemudian diinkubasi pada suhu 40°C selama 24 jam. Hal yang sama juga dilakukan pada bakteri *Streptococcus thermophilus*.

7. Pembuatan formula dangke susu skim konvensional

Susu skim cair dengan konsentrasi 10 % dari bahan baku dipanaskan dan ditambahkan enzim papain dengan konsentrasi 0,4 % sampai curd yang terbentuk selama 30 menit, setelah itu whey dibuang. Terbentuklah dangke konvensional segar.

8. Pembuatan formula dangke susu skim fermentasi

Susu skim cair dengan konsentrasi 5 %, 10 %, 15 % dari bahan baku dipasteurisasi 65°C selama 30 menit lalu didinginkan hingga suhu 40°C. Kemudian ditambahkan 1 ose starter biakan bakteri (*Lactobacillus bulgaris* dan *Streptococcus thermophilus*). Diinkubasi dengan lama waktu fermentasi 1, 2, 3 Hari. Dipanaskan dan ditambahkan enzim papain dengan konsentrasi 0,4 % sampai curd yang terbentuk selama 30 menit, setelah itu whey dibuang. Terbentuklah dangke segar.

9. Analisis Kualitas Dangke

a. Uji Hedonik

Uji hedonik dilakukan dengan menggunakan sepuluh orang panelis dengan kriteria laki-laki atau wanita yang memiliki pengalaman mengonsumsi dangke tradisional. Melakukan pengamatan terhadap (A) tekstur, (B) aroma, (C) rasa, (D) warna, penilaian diberikan dengan angka 1 sampai 7, yaitu:

7 = Amat sangat suka

6 = Sangat suka

5 = Suka

4 = Agak suka

3 = Agak tidak suka

2 = Tidak suka

1 = Sangat tidak suka

b. Uji pH

Sampel yang berupa dangke segar diukur pHnya dengan menggunakan kertas pH universal.

c. Kadar protein (Apriyantono 1989).

1. Ditimbang sampel 1 gram, masukkan ke dalam labu kjehdal
2. Tambahkan selen reagen mixture 0,5 gram
3. Tambahkan 15-20 ml H_2SO_4 (P)
4. Dekstruksi dilemari asam sampai larutan jernih
5. Dinginkan
6. Tambahkan aquades sampai volume 200 ml
7. Tambahkan 2-3 tetes indikator PP 0,1 %
8. Tambahkan NaOH sampai pH basa
9. Destilasi
10. Tampung destilat dalam larutan H_3BO_3 1%
11. Titrasi dengan HCl 0,1N

d. Kadar Asam Laktat (Hadiwiyoto 1994)

Sampel ditimbang seberat 1 gram dimasukkan dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 5 ml air suling dan 2-3 tetes larutan 1% fenolftalein sebagai indikator. Sampel dititrasi dengan larutan natrium hidroksida 0,1 N sampai warnanya berubah menjadi kemerah-merahan dan warna ini tidak hilang selama 30 detik.

Kadar total asam laktat dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ kadar asam laktat} = \frac{V \times N \times 0,09}{\text{Bobot sampel (g)}} \times 100\%$$

Bobot sampel (g)

Dimana : V = Volume titran

N = Normalitas NaOH

0,09 = Berat equivalen asam laktat (g/mEq)

e. Kadar Lemak

Sampel ditimbang seberat 5 gram dimasukkan dalam labu alas bulat. Kemudian ekstraksi sampel menggunakan pelarut organik N-hexsan. Tampung hasil ekstrak dilabu ukur, kemudian evaporator. Hasil dari evaporator dikeringkan di oven pada suhu 105°C selama 1 jam. Selanjutnya dinginkan hasil yang sudah di oven di dalam eksikator selama 30 menit, lalu timbang hasil.

$$\% \text{ kadar lemak} = \frac{\text{Bobot lemak (g)}}{\text{Bobot sampel (g)}} \times 100\%$$

Bobot sampel (g)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Hedonik dan Derajat Keasaman

Hasil pengujian organoleptis meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa serta derajat keasaman yaitu:

Tabel 4. Nilai rata-rata uji hedonik dan derajat keasaman dangke susu skim

Kriteria	Formula								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Warna	5,7	5,5	5,2	5,5	5,4	5,0	5,0	4,7	4,7
Aroma	3,7	4,0	4,1	4,0	3,4	4,6	3,7	3,7	4,3
Rasa	3,6	3,4	3,9	3,5	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6
Tekstur	4,8	4,7	4,9	5,0	4,9	5,3	4,8	4,9	5,0
pH	5	4	5	5	5	5	5	5	5

Keterangan:


- A. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 1 hari
- B. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 1 hari
- C. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 1 hari
- D. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 2 hari
- E. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 2 hari
- F. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 2 hari
- G. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 3 hari
- H. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 3 hari
- I. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 3 hari

2. Kadar Total Asam Laktat


Tabel 5. Hasil Analisis Kadar Total Asam Laktat Dangke Susu Skim

Konsentrasi Susu Skim (%)	Kadar Total Asam Laktat Pada Dangka Fermentasi (%)			Metode Konvensional
	1 Hari	2 Hari	3 Hari	
5	7,94	9,39	12,37	0,42
10	7,42	10,24	14,67	
15	10,07	10,84	15,62	

Hasil Pengaruh Konsentrasi Susu Skim Dan Waktu Fermentasi terhadap Kadar Protein juga dapat diamati pada histogram berikut.



Gambar 3. Pengaruh konsentrasi terhadap kadar total asam laktat.




Gambar 4. Pengaruh lama hari fermentasi terhadap kadar total asam laktat.

3. Kadar Protein


Tabel 6. Hasil Analisis Kadar Protein Dangka Susu Skim

Konsentarsi Susu Skim (%)	Kadar Protein Pada Dangka Fermentasi (%)			Metode Konvensional
	1 Hari	2 Hari	3 Hari	
5	14,39	14,4	15,33	12,09
10	14,73	16,00	16,92	
15	15,09	16,8	18,22	

Hasil Pengaruh Konsentrasi Susu Skim Dan Waktu Fermentasi terhadap Kadar Protein juga dapat diamati pada histogram berikut.



Gambar 5. Pengaruh konsentasi terhadap kadar protein.




Gambar 6. Pengaruh lama hari fermentasi terhadap kadar protein.

4. Kadar Lemak


Tabel 7. Hasil Analisis Kadar Lemak Dangke Susu Skim

Konsentrasi Susu Skim (%)	Kadar Lemak Pada Dangka Fermentasi (%)			Metode Konvensional
	1 Hari	2 Hari	3 Hari	
5	0,06	0,04	0,001	0.11
10	0,08	0,05	0,04	
15	0,09	0,002	0,03	

Hasil Pengaruh Konsentrasi Susu Skim Dan Waktu Fermentasi terhadap Kadar Lemak juga dapat diamati pada histogram berikut.



Gambar 7. Pengaruh konsentrasi terhadap kadar lemak



Gambar 8. Pengaruh lama hari fermentasi terhadap kadar lemak.

B. Pembahasan

Pada pembuatan Dangke fermentasi, digunakan susu skim sebagai bahan dasar dalam pembuatan yang nantinya sebagai media pertumbuhan bakteri asam laktat. Sterilisasi susu skim sebelum difermentasi dilakukan pemanasan pada suhu 65°C yang bertujuan untuk membunuh semua mikroorganisme patogen yang terkandung dalam susu. Fermentasi ini melibatkan bakteri *Lactobacillus bulgaris* dan *Streptococcus thermophilus* sebagai bakteri fermentasi. Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri yang mempunyai kemampuan untuk membentuk asam laktat dari metabolisme karbohidrat. *Lactobacillus bulgaris* berperan pada pembentukan aroma sedangkan *Streptococcus thermophilus* berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt.

Keuntungan dari bakteri asam laktat (BAL) adalah mampu menghambat pertumbuhan organisme pengganggu dalam sistem pencernaan serta membantu menurunkan derajat keasaman. Bakteri akan mengelola gula susu alami (laktosa) menjadi asam laktat sehingga akan meningkatkan keasaman. Dengan peningkatan keasaman akan mencegah proliferasi (perbanyak sel) dari bakteri patogen.

1. Uji Hedonik

Penilaian organoleptik dilakukan dengan metode hedonik yaitu tingkat kesukaan terhadap warna, rasa, aroma dan tekstur dangke susu skim fermentasi pada sepuluh orang panelis dengan tingkatan kesukaan dan skor yaitu: sangat tidak suka (1), tidak suka (2), agak tidak suka (3), agak suka (4), suka (5), sangat suka (6), amat sangat suka (7). Adapun hasil penelitiannya yaitu:

a. Warna

Berdasarkan hasil pengamatan untuk uji hedonik yang meliputi warna dengan menggunakan 10 panelis. Diperoleh hasil bahwa semua berwarna putih susu dan warna pada produk dangke susu skim fermentasi memberi hasil tingkat kesukaan panelis 74,1% dari semua formula dengan warna putih. Warna ini berbeda dengan warna dangke yang sebenarnya yaitu berwarna putih susu kekuningan, hal ini disebabkan karena pada susu skim tidak memiliki kandungan karoten dan riboflavin yang terdapat pada lemak, dimana lemak pada susu skim sangat kecil (Nurzainah Ginting, 2005: 3). Kecilnya kandungan lemak pada susu skim mengakibatkan warna pada dangke susu skim fermentasi berwarna putih.

b. Aroma

Aroma mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu produk pangan karena turut menentukan daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Menurut Ratnaningtyas (2003) aroma tidak hanya ditentukan oleh satu komponen, tetapi merupakan perpaduan dari bahan-bahan pembentuknya. Sunarlim dan Usmiati (2006) menyatakan penilaian citarasa makanan menggunakan indera manusia sebagai alat penilaian dikenal dengan istilah penilaian organoleptik.

Uji hedonik yang dilakukan menunjukkan bahwa lama fermentasi 1,2 dan 3 hari tidak memberikan aroma yang berbeda terhadap produk dangke, namun lama fermentasi 1 hari cenderung menghasilkan aroma agak sedap dibandingkan dangke dengan lama fermentasi 2 dan 3 hari walaupun memberikan hanya sedikit perbedaan. Hal ini disebabkan aroma dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu aroma bahan dasar

dan aroma yang timbul dari proses fermentasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Egrina (2010), yang menyatakan bahwa rasa dan aroma yang asam disebabkan oleh asam laktat yang dihasilkan dari fermentasi laktosa dalam susu. Berdasarkan hasil pengamatan untuk uji organoleptis yang meliputi aroma dengan menggunakan 10 panelis. Diperoleh hasil bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap produk dangke adalah 56,3% dari semua formula dangke. Hal ini disebabkan karena perubahan komposisi susu setelah fermentasi menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh mikroorganisme yaitu asam-asam organik meliputi NH_3 dan indol yang menimbulkan aroma yang khas asam laktat yang sangat berbeda dengan aroma pada dangke konvensional yang beraroma tahu susu.

c. Rasa

Uji hedonik yang dilakukan menunjukkan bahwa lama fermentasi 1,2 dan 3 hari tidak memberikan rasa yang berbeda terhadap produk dangke. Rasa yang dihasilkan dalam produk ini adalah rasa asam. Hal ini disebabkan Selama pemeraman (inkubasi) akan timbul senyawa-senyawa asam laktat, asetaldehida, diasetil, asam asetat dan senyawa-senyawa yang mudah menguap yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Senyawa-senyawa tersebut akan memberikan cita rasa spesifik. Hal ini sejalan dengan pendapat Surono (2004) yang mengatakan bahwa selama proses fermentasi oleh bakteri asam laktat yang melakukan perombakan terhadap komponen kimia yang terdapat pada susu yaitu laktosa yang dipecah menjadi asam laktat. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Helferich (1980) dalam roswita (2007) yang mengatakan bahwa starter bakter dari *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus*

dapat bersinergi untuk membentuk asam karena *Streptococcus thermophilus* akan memecah laktosa menjadi asam laktat yang dapat menurunkan nilai pH menjadi lebih asam sehingga *Lactobacillus bulgaricus* dapat tumbuh baik karena adanya asam format yang diproduksi oleh *Streptococcus thermophilus*.

Pengujian rasa dengan menggunakan 10 orang panelis diperoleh hasil bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap produk dangke adalah 51,6% dari semua formula dangke.

d. Tekstur

Uji hedonik yang dilakukan menunjukkan bahwa lama fermentasi 1,2 dan 3 hari tidak memberikan tekstur yang berbeda terhadap produk tahu susu, namun lama fermentasi 3 hari cenderung menghasilkan tekstur agak padat dibandingkan tahu susu dengan lama fermentasi 1 dan 2 hari walaupun memberikan hanya sedikit perbedaan. Hal ini disebabkan tekstur dipengaruhi oleh lama fermentasi yang dilakukan oleh bakteri asam laktat. Berdasarkan hasil pengamatan untuk uji organoleptis yang meliputi tekstur dengan menggunakan 10 panelis. Diperoleh hasil bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap produk dangke adalah 70,3% dari semua formula dangke dengan berstruktur berongga dan agak keras berwarna putih. Hal ini disebabkan adanya aktivitas bakteri asam laktat yang di bantu oleh aktivitas enzim papain. Sejalan dengan pendapat Egrina (2010) Enzim papain dapat mengkoagulasi misel kasein dalam susu. Enzim papain akan mengganggu bagian k-kasein (kappa kasein) yang berada pada bagian permukaan misel kasein sehingga membentuk para-kappa-kasein. Papain memotong ikatan peptida antara phenil (105) dan metionin (106)

dalam k- kasein, merusak strukturnya dan dihasilkan para-kappa-kasein yang memiliki bagian hidrofobik. Selanjutnya ketika pH mendekati titik isoelektrik kasein (pH 4,6-4,7) misel-misel kasein akan bergabung dan menggumpal membentuk gel. Misel-misel ini dapat bergabung disebabkan oleh intraksi bagian-bagian hidrofobik pada para-para kasein. Adanya kalsium yang terdapat dalam susu akan membantu proses koagulasi, yaitu berperan sebagai jembatan penghubung antar misel.

2. Derajat keasaman

Pengujian pH pada produk dangke susu skim fermentasi diperoleh bahwa semua formula pHnya adalah 5,0 kecuali pada formula B pHnya 4,0, dimana pada pH awal dari susu skim adalah 7,0. Terjadinya penurunan pH karena adanya asam organik yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat selama proses fermentasi (Suro,2004). Ini berarti bahwa perubahan laktosa menjadi asam laktat tersebut menyebabkan menurunnya kadar laktosa dan pH produk sehingga pH media menjadi 4,0-5,0.

Hal ini didukung oleh pernyataan Saleh (2004) yang menyatakan bahwa dengan adanya *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* yang mengurai laktosa menjadi asam laktat, maka susu fermentasi yang dihasilkan akan menjadi asam dan terjadinya penurunan pH.

3. Kadar total asam laktat

Produk dangke yang dihasilkan dari proses fermentasi yang melibatkan bakteri asam laktat akan menghasilkan asam laktat pada produk akhir. Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri yang mempunyai kemampuan untuk membentuk

asam laktat dari metabolisme karbohidrat, dan mampu memfermentasi laktosa susu (Djide 2005,1-5). Pada pengujian total asam laktat diperoleh hasil yaitu untuk pengaruh konsentasi terhadap kadar total asam laktat terjadi kenaikan dengan bertambahnya konsentrasi susu skim, dimana kadar asam laktat tertinggi didapatkan pada konsentrasi 15 % yaitu sebesar 15,62 %. Untuk pengaruh lama hari fermentasi terhadap kadar total asam laktat terjadi pula kenaikan dengan bertambahnya lama hari fermentasi, dimana kadar asam laktat tertinggi didapatkan pada lama fermentasi 3 hari yaitu sebesar 15,62 %. Jadi, kadar total asam laktat tertinggi didapatkan pada konsentrasi susu skim 15 % dengan lama fermentasi 3 hari yaitu sebesar 15,62 %. Dari analisis kadar asam laktat yang diperoleh diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi susu skim dan waktu fermentasi yang semakin lama maka terjadi kenaikan kadar total asam laktat. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentasi susu skim akan meningkatkan jumlah laktosa dalam campuran dan meningkat pula aktivitas mikrobial/bakteri untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Namun, pada konsentrasi susu skim 10 % dengan lama fermentasi 1 hari tidak menunjukkan kenaikan (7,42%) dari konsentrasi susu skim 5% dengan lama fermentasi yang sama 1 hari (7,94%) tetapi pada konsentrasi susu skim 15% dengan lama fermentasi 1 hari terjadi kembali kenaikan.

Kandungan total asam laktat dangke susu skim fermentasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kandungan protein dalam dangke susu skim tanpa fermentasi, hal ini di karenakan tidak adanya penambahan bakteri starter asam laktat sehingga tidak terjadi aktivitas penguraian laktosa menjadi asam laktat.

4. Kadar Protein

Pengujian kadar protein pada produk dangke susu skim fermentasi ditentukan dengan metode Kjeldahl. Pada pengujian kadar protein diperoleh hasil yaitu untuk pengaruh konsentasi terhadap kadar protein terjadi kenaikan dengan bertambahnya konsentrasi susu skim, dimana kadar protein tertinggi didapatkan pada konsentrasi 15 % yaitu sebesar 18,22 %. Untuk pengaruh lama hari fermentasi terhadap kadar protein terjadi pula kenaikan dengan bertambahnya lama hari fermentasi, dimana kadar protein tertinggi didapatkan pada lama fermentasi 3 hari yaitu sebesar 18,22 %. Jadi, kadar protein tertinggi didapatkan pada konsentrasi susu skim 15 % dengan lama fermentasi 3 hari yaitu sebesar 18,22 %. Dari analisis kadar protein diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi susu skim dan waktu fermentasi yang semakin lama terjadi peningkatan protein, ini disebabkan karena adanya penambahan protein dari aktivitas mikrobia yang digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Astuti (2008) yang mengatakan bahwa *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus bulgaricus* yang ditambahkan akan memanfaatkan sumber nitrogen dan karbon yang terdapat pada susu kedelai untuk hidup dan berkembang biak (memperbanyak diri). Semakin banyak jumlah mikrobia yang terdapat didalam soygurt maka akan semakin tinggi kandungan proteinnya karena sebagian besar komponen penyusun mikrobia/ bakteri adalah protein.

Kandungan protein dangke susu skim fermentasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kandungan protein dalam dangke susu skim tanpa fermentasi, hal ini di karenakan adanya penambahan bakteri starter yang dapat meningkatkan


kandungan protein. Hal ini disebabkan karena adanya bakteriosin yang dihasilkan dari metabolisme sekunder bakteri starter. Bakteriosin merupakan protein atau peptida antimikroba yang hanya diproduksi oleh bakteri asam laktat (Buckle, 2007: 41).

5. Kadar Lemak

Pengujian kadar lemak pada produk dangke susu skim fermentasi ditentukan dengan metode Gravimetri. Pada pengujian kadar lemak diperoleh hasil yaitu untuk pengaruh konsentasi terhadap kadar lemak terjadi kenaikan dengan bertambahnya konsentrasi susu skim, dimana kadar lemak tertinggi didapatkan pada konsentrasi 15 % yaitu sebesar 0,09 %. Untuk pengaruh lama hari fermentasi terhadap kadar lemak terjadi penurunan dengan bertambahnya lama hari fermentasi, dimana kadar lemak terendah didapatkan pada lama fermentasi 3 hari yaitu sebesar 0,001 %. Jadi, kadar lemak tertinggi didapatkan pada konsentrasi susu skim 15 % dengan lama fermentasi 1 hari yaitu sebesar 0,09 %. Serta kadar lemak terendah didapatkan pada konsentrasi susu skim 5 % dengan lama fermentasi 3 hari yaitu sebesar 0,001 %. Dari hasil analisis kadar lemak diketahui bahwa dalam konsentrasi yang sama dengan waktu fermentasi yang semakin lama, terjadi penurunan kandungan lemak pada dangke yang dihasilkan. Hal ini disebabkan sewaktu fermentasi, terjadi sintesa protein dari lemak. Hal ini sejalan dengan pendapat Bottazi (1983) dalam Roswita, dkk (2007) yang menyatakan bahwa bakteri asam laktat memiliki aktivitas lipolitik sekunder, yang dapat memecah lemak susu menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana. Sementara semakin bertambahnya konsentrasi susu skim dengan waktu fermentasi

yang sama akan terjadi kenaikan kandungannya, hal ini disebabkan karena sumber gula semakin banyak maka lemakpun juga bertambah.

Kandungan lemak dangke susu skim fermentasi lebih rendah jika dibandingkan dengan kandungan protein dalam dangke susu skim tanpa fermentasi, hal ini di karenakan kandungan lemak pada dangke susu skim tanpa fermentasi tidak mengalami pemecah lemak susu menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana oleh aktivitas bakteri asam laktat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Susu skim dapat dijadikan alternatif bahan baku dalam pembuatan *dangke*.
2. Pengaruh konsentrasi susu skim terhadap mutu *dangke*, dapat meningkatkan mutu *dangke* yang didapatkan pada konsentrasi 15 % yaitu total asam laktat (15,62 %), protein (18,22 %), lemak (0,09 %).
3. Pengaruh lama fermentasi terhadap mutu *dangke*, dapat meningkatkan mutu *dangke* yang didapatkan pada lama fermentasi 3 hari yaitu total asam laktat (15,62 %), protein (18,22 %), serta menurunkan mutu lemak yang didapatkan pada fermentasi 3 hari yaitu 0,001 %.
4. Mutu *dangke* fermentasi lebih baik dari *dangke* konvensional.
5. Semakin tinggi konsentrasi susu skim dan waktu fermentasi maka akan semakin meningkatkan kadar protein, kadar total asam laktat, dan serta menurunkan kadar lemak.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut sehingga diperoleh kondisi *stationary phase*, fase kecepatan dimana bakteri akan hidup dan fase dimana bakteri akan mati.

2. Perlunya diadakan penelitian lebih lanjut dimana pada bahan dasar dalam pembuatan formulanya menggunakan susu kerbau dan susu sapi perah asli.




DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baarri, A.N. dan T.W. Murti. *Evaluasi Komposisi Kimia Susu Kambing Segar yang Difortifikasi Bakteri Asam Laktat dengan Kehadiran Ekstrak Susu Kedelai*. Semarang: Proceeding Simposium Nasional di Unika Soegijapranata. 2006
- Apriyantono, A., dkk. *Analisis Pangan*. Bogor: PAU Pangan dan Gizi IPB Press. 1989
- Askari Zakariah, M. *Fermentasi Asam Laktat Pada Silase*. Yogyakarta. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. 2012
- Ayu Sintasari, Rinelda. *Pengaruh Penambahan Konsentrasi Susu Skim Dan Sukrosa Terhadap Karakteristik Minuman Probiotik Sari Beras Merah*. Malang. FTP Universitas Brawijaya Malang. 2014
- Budiyanto, A.K., *Mikrobiologi Terapan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Budi Santoso, Eli, dkk. *Pengaruh Penambahan Berbagai Jenis Dan Konsentrasi Susu Terhadap Sifat Sensoris Dan Sifat Fisikokimia Puree Labu Kuning (Cucurbita moschata)*. Surakarta. Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. 2013.
- Chan, L.A. *Membuat Es Krim*. Jakarta: Agromedia. 2008.
- Darwis, A. Azis dan Sukara E. *Penuntun Praktikum Isolasi, Purifikasi dan Karakterisasi Enzim*. Bogor: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat jendral Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Anatar Universitas Bioteknologi Institute Pertanian Bogor. 1990.
- Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup. *Panduan Inspeksi Penaatan Pengelolaan Lingkungan Industri Pengolahan Susu*. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Agroindustri. 2006.
- Dewi, Astuti Herawati, dkk. *Pengaruh Konsentrasi Susu Skim Dan Waktu Fermentasi Terhadap Hasil Pembuatan Soyghurt*. Surakarta: Universitas Setia Budi. 2008.
- Difco. *Culture Media Handbook*. E. Darmstad: Merck. 1988.


- Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang. *Statistik Peternakan Kabupaten Enrekang*. Enrekang: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Enrekang. 2009.
- Fardiaz, D., dkk. *Petunjuk Laboratorium Teknik Analisis Sifat Kimia dan Fungsional Komponen Pangan*. Bogor: PAU Pangan dan Gizi, IPB. 1992.
- Firmanita Dewi, Indri, dkk. *Pengaruh Lama Perebusan Dan Level Pemberian Papain Komersial Terhadap Rendemen Dan Aroma Tahu Susu*. Purwokerto: Fakultas Peternakan. Universitas Jenderal Soedirman. 2013
- Fitrah isyana. *Studi Tingkat Higiene Dan Cemaran Bakteri Salmonella sp Pada Pembuatan Dangke Susu Sapi Di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.
- Geantaresa, Egrina dan Titin Supriyanti. *Pemanfaatan Ekstrak Kasar Papain Sebagai Koagulan Pada Pembuatan Keju Cottage Menggunakan Bakteri Streptococcus Termophilus, Lactobacillus Lactis, Dan Leuconactoc Mesentroides*. Program Studi Kimia. Universitas Pendidikan Indonesia. 2010
- Habibah. *Pengaruh Lama Pasteurisasi dan Lama Penyimpanan Terhadap Kualitas Air Susu Sapi Perah Fresien Holstein*. *Bioscientiae*. 2011
- Hadiwiyoto, S. *Pengujian Mutu Susu dan Hasil Olahannya*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1994.
- Hartayanie, Laksmi dan Ita Sulistyawati. *Sentuhan Teknologi Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Susu Sapi*. Semarang. Fakultas Teknologi Pertanian Unika Soegijapranata Semarang. 2010
- Hidayat, Nur, dkk. *Mikrobiologi Industri*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2006.
- <http://lordbroken.wordpress.com/2013/06/19/karakteristik-susu-skim/>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2014.
- Idris, S. *Pengantar Teknologi Susu*. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 1992.
- Ihsan al-Atsary, Abu dan Ummu Ihsan Choiriyah. *Panduan Amal Sehari Semalam "Memeknai Setiap Detik Kehidupan Dengan Beramal Shalih"*. Bogor: CV. Darul Ilmi. 2010
- Japan International Cooperation Agency [JICA]. *Laporan Hasil Kegiatan: Identifikasi dan Kajian Komoditi Utama Propinsi Sulawesi Selatan: Komoditas Susu*. Makassar: JICA dan UNHAS. 2009.
- Koswara, S. *Jahe dan Hasil Olahannya*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan. 1995.

- Lay, B, W. *Analisis Mikroba*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Marzuki, A.M., dkk. *Peningkatan Mutu Dangke..* Ujung Pandang: Departemen Perindustrian. 1978.
- Miskiyah., S. Usmiati dan Mulyorini. *Pengaruh Enzim Proteolitik dengan Bakteri Asam laktat Probiotik terhadap Karakteristik Dadih Susu Sapi*. JITV. 2011
- Miftah Farid. *Pengembangan Susu Segar Dalam Negeri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Susu Nasional*. Jakarta: Litbang Perdagangan. 2011
- Nurisva Maya Sari, Yuni dkk., *Isolasi, Karakterisasi, Dan Identifikasi Dna Bakteri Asam Laktat (Bal) Yang Berpotensi Sebagai Antimikroba Dari Fermentasi Markisa Kuning (Passiflora edulis var. flavicarpa)*. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 2013.
- Nurzainah Ginting, Elsegustri Pasaribu. *Pengaruh Temperatur Dalam Pembuatan Yoghurt dari Berbagai Jenis Susu Dengan Menggunakan Lactobacillus Bulgaricus dan Streptococcus Thermophilus*. Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. 2005.
- Pelezar, Michael, J, Jr. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.1988.
- Persagi. *Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM)*. Jakarta: Persagi; 2005.
- Prasetyo, Heru. *Pengaruh Penggunaan Starter Yoghurt Pada Level Tertentu Terhadap Karakteristik Yoghurt Yang Dihasilkan*. Surakarta. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 2010
- Prentis, Stave. *Bioteknologi Suatu Revolusi Yang Baru*. Jakarta: Erlangga. 1990.
- Rahman, Ansori. *Teknologi Fermentasi*. Jakarta: Penerbit Arcun. 1992.
- Ratnaningtyas, A. *Tahu Dari Kacang Non Kedelai; Studi Kasus Kacang Komak*. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. IPB. Bogor. 2003
- RI, Kementrian Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Media Pustaka. 2013
- Rokhayati, A. U. *Pengaruh Penggunaan Asam Cuka dan Subtitusi Susu Kedelai Terhadap Bau Tahu Susu*. Inovasi. 2011
- Saleh, E. 2004. Dasar Pengolahan Susu dan Hasil Ikutan Ternak. *Dalam Jurnal Program Studi Produksi Ternak*. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. 2004
- Sardjoko. *Bioteknologi, Latar Belakang dan Beberapa Penerapannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1991.

- Septiani, A. H, dkk., Pengaruh Penambahan Susu Skim Pada Proses Pembuatan *Frozen Yogurt* Yang Berbahan Dasar Whey Terhadap Total Asam, pH Dan Jumlah Bakteri Asam Laktat. Semarang. Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. 2013
- Setya Wardana, Agung. *Teknologi Pegolahan Susu*. Surakarta. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Slamet Riyadi. 2012
- Setyarini Indriyati, Anita. *Isolasi Dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat (Bal) Dari Susu Formula Balita Yang Berpotensi Menghasilkan Substansi Antimikroba*. Yogyakarta. Fakultas Sains Dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2010
- Soeparno. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Suhartono. T. *Enzim dan Bioteknologi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 1989.
- Sunarlim, Roswita, dkk., *Pengaruh Kombinasi Starter Bakteri Lactobacillus Bulgaricus, Streptococcus Thermophilus Dan Lactobacillus Plantarum Terhadap Sifat Mutu Susu Fermentasi*. Bogor. Balai Besar Penelitian Veteriner. 2007
- Sunarlim, R, dan S. Usmiati. *Sifat Mikrobiologi dan Sensori Dadih Susu Sapi yang Difermentasi Menggunakan Lactobacillus Plantarum dalam Kemasan yang Berbeda*. Buletin Peternakan. 2006
- Suprihatin. *Teknologi Fermentasi*. UNESA University Press. 2010
- Surono, S. *Probiotik, Susu Fermentasi dan Kesehatan*. Jakarta: PT. Tri Cipta Karya. 2004.
- Susilorini, T.E. dan M.E. Sawitri. *Produk Olahan Susu*. Yogyakarta: Penebar Swadaya. 2007.
- Triyono, Agus. *Mempelajari Pengaruh Maltodekstrin Dan Susu Skim Terhadap Karakteristik Yoghurt Kacang Hijau (Phaseolus radiatus L.)*. Subang. Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI. 2010
- Winarno. *Fisiologi Lepas Panen*. Bogor: Fakultas Pertanian. IPB. 1992.

Lampiran 1. Skema kerja pembuatan starter

Lampiran 2. Skema kerja pembuatan dangke



Lampiran 3. Tabel. Hasil uji hedonik

1. Warna

Tabel 8. Hasil pengamatan uji organoleptis untuk warna

Panelis	Formula								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
P1	5	5	4	5	5	4	4	5	5
P2	5	5	7	5	5	3	3	4	5
P3	5	5	5	7	5	5	5	5	5
P4	6	5	5	5	5	5	5	5	5
P5	7	7	4	5	6	5	6	4	4
P6	5	5	6	5	4	5	6	5	5
P7	7	6	5	6	5	6	5	5	5
P8	5	4	5	6	6	7	5	4	4
P9	6	6	5	5	6	5	6	5	4
P10	6	7	6	6	7	5	5	5	5
Jumlah	57	55	52	55	54	50	50	47	47

Keterangan:

J. Dangka susu skim konsentrasi 5% fermentasi 1 hari

K. Dangka susu skim konsentrasi 10% fermentasi 1 hari

L. Dangka susu skim konsentrasi 15% fermentasi 1 hari

M. Dangka susu skim konsentrasi 5% fermentasi 2 hari

N. Dangka susu skim konsentrasi 10% fermentasi 2 hari

O. Dangka susu skim konsentrasi 15% fermentasi 2 hari

P. Dangka susu skim konsentrasi 5% fermentasi 3 hari

Q. Dangka susu skim konsentrasi 10% fermentasi 3 hari

R. Dangka susu skim konsentrasi 15% fermentasi 3 hari

1 = Sangat tidak suka

2 = Tidak suka

3 = Agak tidak suka

4 = Agak suka

5 = Suka

6 = Sangat suka

7 = Amat sangat suka

Pn = Panelis

2. Aroma

Tabel 9. Hasil pengamatan uji organoleptis untuk aroma

Panelis	Formula								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
P1	5	3	5	4	2	6	4	3	5
P2	4	4	5	4	2	4	3	4	4
P3	3	3	5	4	2	5	4	4	5
P4	4	6	2	5	4	4	4	4	3
P5	3	5	2	2	5	4	3	3	4
P6	3	2	4	4	4	5	3	3	5
P7	4	5	5	5	5	3	4	4	4
P8	2	2	5	3	3	5	4	4	5
P9	5	5	4	4	3	5	4	3	4
P10	4	5	4	5	4	5	4	5	4
Jumlah	37	40	41	40	34	46	37	37	43

3. Rasa

Tabel 10. Hasil pengamatan uji organoleptis untuk rasa

Panelis	Formula								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
P1	4	4	4	2	3	4	3	4	4
P2	4	4	4	3	3	4	2	3	4
P3	4	4	5	4	2	3	4	4	3
P4	5	4	4	5	4	4	5	5	3
P5	2	3	2	4	4	3	4	3	3
P6	4	2	4	4	4	4	3	3	4
P7	2	2	4	3	3	3	3	4	3
P8	3	2	3	4	4	3	4	3	4
P9	5	5	4	3	5	4	4	3	4
P10	3	4	5	3	4	5	4	4	4
Jumlah	36	34	39	35	36	37	36	36	36

4. Tekstur

Tabel 11. Hasil pengamatan uji organoleptis untuk tekstur

Panelis	Formula								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
P1	5	4	5	4	7	5	4	5	5
P2	4	3	6	3	5	5	5	5	4
P3	4	4	5	7	3	5	5	4	4
P4	6	4	5	6	5	4	6	4	5
P5	7	7	3	5	4	6	5	6	5
P6	4	2	5	5	5	5	5	5	6
P7	5	7	5	6	6	5	4	4	6
P8	2	5	5	5	4	6	4	5	5
P9	6	6	5	5	5	6	5	6	5
P10	5	5	5	4	5	6	5	5	5
Jumlah	48	47	49	50	49	53	48	49	50

Lampiran 4. Tabel. Hasil perhitungan kadar total asam laktat

Tabel 12. Hasil perhitungan kadar total asam laktat

Formula	Jumlah Sampel (g)	Volume Titran (ml)	% Kadar (%)
A	1	9,3	7,94
B	1	8,7	7,42
C	1	11,8	10,07
D	1	11	9,39
E	1	12	10,24
F	1	12,7	10,84
G	1	15,5	12,37
H	1	17,2	14,67
I	1	17,6	15,62

Keterangan:

- A. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 1 hari
- B. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 1 hari
- C. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 1 hari
- D. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 2 hari
- E. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 2 hari
- F. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 2 hari
- G. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 3 hari
- H. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 3 hari
- I. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 3 hari

Contoh perhitungan kadar total asam laktat

mgrek Asam Laktat = mgrek NaOH

$$\begin{aligned}
 \frac{\text{mg}}{\text{BE}} &= V \times N \\
 \text{mg (x)} &= \text{BE} \times V \times N \\
 &= 90,01 \times 9,3 \times 0,095 \\
 &= 79,523835 \\
 \% \text{ Kadar} &= \frac{\text{mg (x)}}{\text{mg (sampel)}} \times 100\% \\
 &= \frac{79,523835}{1001,39} \times 100\% \\
 &= 7,941345
 \end{aligned}$$

Lampiran 5. Tabel. Hasil perhitungan kadar protein

Tabel 13. Hasil perhitungan kadar protein

Formula	Jumlah Sampel (g)	Volume Titran (ml)	% Kadar (%)
A	1	16,9	14,39
B	1	17,6	14,73
C	1	18,2	15,09
D	1	17,4	14,40
E	1	19,0	16,00
F	1	20,5	16,80
G	1	18,3	15,33
H	1	20,7	16,92
I	1	22,0	18,22

Keterangan:

- A. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 1 hari
- B. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 1 hari
- C. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 1 hari
- D. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 2 hari
- E. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 2 hari
- F. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 2 hari
- G. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 3 hari
- H. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 3 hari
- I. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 3 hari

Contoh perhitungan kadar protein

$$\begin{aligned}
 x (\%) &= \frac{(V_{\text{tit sampel}} - V_{\text{tit blanko}}) \text{ml} \times N \text{ HCl} \times \text{BM Nitrogen}}{\text{mg (sampel)}} \times 100\% \\
 &= \frac{(16,9 - 0,2) \text{ml} \times 0,09704 \times 14,007}{1006 \text{ mg}} \times 100\% \\
 &= \frac{16,7 \text{ ml} \times 0,09704 \times 14,007}{1006 \text{ mg}} \times 100\% \\
 &= \frac{22,699296 \text{ ml}}{1006 \text{ mg}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 2,2563$$

$$\% \text{ Protein} = x (\%) \times \text{Faktor konversi}$$

$$= 2,2563 \times 6,38$$

$$= 14,3957$$



Lampiran 6. Tabel. Hasil perhitungan kadar lemak

Tabel 14. Hasil perhitungan kadar lemak

Formula	Berat Sampel (g)	Berat Cawan Porselin Awal (g) (X)	Berat Cawan Porselin + Sampel Akhir (g) (Y)	Kadar Lemak (%)
A	5	50,38995	50,39305	0,06110
B	5	50,42787	50,43192	0,08059
C	5	51,98864	51,99325	0,09043
D	5	50,70440	50,70658	0,04335
E	5	51,26431	51,26726	0,05791
F	5	55,19374	55,19386	0,00236
G	5	45,71464	45,71474	0,00197
H	5	42,32356	42,32558	0,04011
I	5	53,06030	53,06230	0,03950

Keterangan:

- A. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 1 hari
- B. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 1 hari
- C. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 1 hari
- D. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 2 hari
- E. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 2 hari
- F. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 2 hari
- G. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 3 hari
- H. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 3 hari
- I. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 3 hari

Contoh perhitungan kadar lemak

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Lemak} &= \frac{B-A}{\text{Sampel (g)}} \times 100\% \\
 &= \frac{50,39305 - 50,38995}{5,07351} \times 100\% \\
 &= 0,06110
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- X. Berat kosong cawan porselin awal
- Y. Berat cawan porselin + Sampel akhir

Lampiran 7. Foto uji pH




Gambar 9. Foto Uji pH produk

Keterangan:

- A. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 1 hari
 - B. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 1 hari
 - C. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 1 hari
 - D. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 2 hari
 - E. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 2 hari
 - F. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 2 hari
 - G. Dangke susu skim konsentrasi 5% fermentasi 3 hari
 - H. Dangke susu skim konsentrasi 10% fermentasi 3 hari
 - I. Dangke susu skim konsentrasi 15% fermentasi 3 hari
- 4-5 = nilai pH

Lampiran 8. Foto dangke

Fermentasi 1 Hari



Fermentasi 2 Hari




Fermentasi 3 Hari



Gambar 10. Hasil Produksi Dangke dengan Fermentasi susu skim 5 %


Fermentasi 1 Hari



Fermentasi 2 Hari




Fermentasi 3 Hari




Gambar 11. Hasil Produksi Dangke dengan Fermentasi susu skim 10 %

Fermentasi 1 Hari



Fermentasi 2 Hari



Fermentasi 3 Hari



Gambar 12. Hasil Produksi Dangka dengan Fermentasi susu skim 15 %

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ahmad Rusmin R. lahir di Ujung Pandang, Kota. Makassar pada 20 November 1992, merupakan anak kedua dari pasangan suami-istri Rodding S.Pd dan Aminah R. Pertama kali memasuki pendidikan formal di TK Pertiwi Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1996 selama 2 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Borong Jambu I Antang, Sulawesi Selatan pada tahun 1998 hingga menyelesaikan studi di Sekolah dasar pada tahun 2004 dan menjadi alumni. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 17 Makassar, Sulawesi Selatan hingga pada tahun 2007. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 10 Makassar, Sulawesi Selatan hingga pada tahun 2010. Pada tahun ini pula melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.