

**GAMBARAN RISIKO KEJADIAN *CARPAL TUNNEL SYNDROME* (CTS)
PADA PEKERJA WANITA DI PT. BOGATAMA MARINUSA
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANNISA NURUL MUKHLISA

70200110021

ALA UDDIN
M A K A S S A R

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan taslim tak lupa pula penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah saw. yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita di masa kejahiliah zaman dulu menuju masa peradaban yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul **“Gambaran Risiko Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada Pekerja Wanita di PT. Bogatama Marinusa Makassar”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penyelesaian skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda **Ir. H. Mukhsin Tahir, MM** dan Ibunda **Hj. Nurjannah Syamsuddin, SE** terima kasih atas kasih sayang, do'a dan restunya yang senantiasa terpanjatkan untuk anakda serta atas bantuan materil dan moril yang tidak ternilai harganya, hingga anakda dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kepada saudara (i)ku, **Ahmad Dian Pradhana, Amd., Muhammad Idris Rukmana, SP., Nur Istiqomah Desiana, S.Sos., dan Muhammad Fajrin Affandy**. Persembahan penyelesaian tugas akhir ini tidaklah sebanding harganya dengan apa yang mereka persembahkan. Namun semoga hasil tulisan ini dapat menjadi kebahagiaan serta kebanggan bagi mereka.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu **Fatmawaty Mallapiang, S.KM, M.Kes** dan Ibu **Nurdiyanah Syarifuddin, S.KM, M.PH** selaku dosen pembimbing atas ketulusannya yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu, dengan niat suci dan hati yang tulus diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. A. H. Qadir Gassing, HT, MS** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak **Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Bapak **M. Fais Satrianegara, S.KM, M.Kes**, selaku Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar
4. Bapak **Hasbi Ibrahim, S.KM, M.Kes** dan Bapak **Dr. Misbahuddin, S.Ag, M.Ag** selaku penguji kompetensi dan penguji integritas keilmuan. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan demi perbaikan skripsi ini.
5. Ibu **Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes**, selaku Penasehat Akademik penulis
6. Seluruh dosen pengajar Prodi Kesehatan Masyarakat atas segala ilmu dan motivasi yang telah diberikan.
7. Ibu **Hj. Rismawati** selaku staf Personalia PT. Bogatama Marinusa Makassar serta para pekerja yang telah bersedia menjadi objek penelitian penulis.
8. Saudari **Dwi Putri Nursetyaningsih, Ani Asriani Basri, Citra Mentari**, dan **Delfany Gemely** atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
9. Rekan-rekan Posko 9 PBL angkatan 2010 (**Nur Ichsan, Rahmi Mulyani, Ratih, Lusy, Nurhalimah, Muzayyid**, dan **Djaelani**) Lingkungan Bulu Ballea Kecamatan Tinggimoncong atas bantuan, motivasi, dan kebersamaannya.

10. Rekan-rekan Posko III KKN Profesi Angkatan IV (**Mushawwir, Nurhakimah, Alamsyah, Syathir, Risqah, Nur Hijrah, Zulqaidah, Jumriani, Hasan, Akmal, Arif, dan Ardiansyah**) dan Seluruh Warga RW III Lingkungan Parinring, Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala atas do'a dan semangat serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Seluruh rekan peminatan K3 2010 dan seluruh rekan Kesmas A 2010
12. Keluarga besar mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar angkatan 2010
13. serta pihak-pihak yang turut andil membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak, semoga Allah swt. mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga Allah memberikan yang lebih dari bantuan yang diberikan.

Disadari sepenuhnya bahwa meskipun tulisan ini telah disusun dengan usaha yang semaksimal mungkin, namun bukan mustahil bila di dalamnya terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu setiap kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan pelajaran di masa yang akan datang diterima dengan kerendahan hati..

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan memberi sebuah nilai bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmatnya bagi kita semua. Amin.

Gowa, Agustus 2014

Penulis


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN HASIL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11-51
A. Tinjauan Umum Ergonomi	11
1. Pengertian Ergonomi	11
2. Keluhan Muskuloskeletal Terkait Ergonomi	12
B. Tinjauan Umum <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS).....	15
1. Definisi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS).....	15
2. Faktor Risiko <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS).....	17
3. Patologi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS).....	23
4. Gejala Klinis <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS).....	24
5. Diagnosis <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS).....	26
6. Pencegahan dan Penanggulangan <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS).....	31
C. Tinjauan Umum Pekerja Wanita.....	32
D. Tinjauan Umum Gerakan Berulang.....	34
E. Tinjauan Umum Pekerjaan Menggenggam/menjepit	35
F. Tinjauan Umum Postur Janggal.....	36
G. Tinjauan Umum Umur.....	37
H. Tinjauan Umum Obesitas	38
I. Tinjauan Umum Penyakit Metabolik.....	39

1. <i>Diabetes mellitus</i>	39
2. <i>Arthritis rheumatoid</i>	39
J. Pandangan Islam tentang Kejadian <i>Carpal Tunnel Syndrome (CTS)</i>	40
K. Kerangka Teori	47
L. Kerangka Konsep.....	48
1. Dasar Pemikiran Variabel.....	48
2. Kerangka Konsep.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52-56
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	53
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Instrumen Penelitian	54
F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen	55
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57-80
A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	57
B. Hasil.....	60
C. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	81-82
A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Penelitian	82
KEPUSTAKAAN	83
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Area Distribusi Nervus Medianus	16
Gambar 2.2 Postur Fleksi	19
Gambar 2.3 Postur Ekstensi	19
Gambar 2.4 Postur Deviasi Radial	20
Gambar 2.5 Postur Deviasi Ulnar.....	20
Gambar 2.6 Tes <i>Phalen</i>	29



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Unit Kerja Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	61
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	61
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Status Pekerja Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	62
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Gerakan Berulang Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	62
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Menggenggam atau Menjepit Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	63
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Postur Janggal Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	63
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Umur Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014	64
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Obesitas Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	64
Tabel 4.9	Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat <i>Diabetes Mellitus</i> Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014	65
Tabel 4.10	Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat <i>Arthritis Rheumatoid</i> Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	65
Tabel 4.11	Distribusi Responden Berdasarkan <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS) Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014	66

Tabel 4.12	Distribusi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS) Berdasarkan Gerakan Berulang Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	66
Tabel 4.13	Distribusi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS) Berdasarkan Pekerjaan Menggenggan atau Menjepit Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014	67
Tabel 4.14	Distribusi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS) Berdasarkan Postur Janggal Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	68
Tabel 4.15	Distribusi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS) Berdasarkan Umur Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014	68
Tabel 4.16	Distribusi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS) Berdasarkan Obesitas Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	69
Tabel 4.17	Distribusi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS) Berdasarkan Riwayat <i>Diabetes Mellitus</i> Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014.....	70
Tabel 4.18	Distribusi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS) Berdasarkan Riwayat <i>Arthritis Rheumatoid</i> Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Botama Marinusa Makassar Tahun 2014	70

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Annisa Nurul Mukhlisa
NIM : 70200110021
Judul Skripsi : Gambaran Risiko Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) pada Pekerja Wanita di PT. Bogatama Marinusa Makassar

Berbagai aktivitas yang banyak menggunakan tangan dalam waktu yang lama sering dihubungkan dengan terjadinya *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS). CTS berhubungan dengan pekerjaan yang menggunakan pekerjaan kombinasi antara kekuatan dan pengulangan gerakan yang lama pada jari-jari selama periode yang lama.

Dalam surah al-Maidah (QS.5:92) dijelaskan Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan pekerjaan apapun, termasuk pada saat bekerja agar terhindar dari CTS. CTS terjadi akibat dari sikap kerja pada tangan dan jari-jari yang tidak ergonomis.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran risiko kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada pekerja wanita di PT. Bogatama Marinusa Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan survei deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pekerja wanita bagian produksi PT. Bogatama Marinusa sejumlah 409 orang. Jumlah sampel sebanyak 123 orang dengan teknik penarikan sampel *Simple Random Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 45 responden (36,6%) yang terdiagnosis memiliki risiko CTS. Responden yang melakukan gerakan berulang yang berisiko dan terdiagnosis memiliki risiko CTS yaitu 20 responden (16,26%). 12 responden (9,75%) dari 17 responden (13,82%) dengan pekerjaan menggenggam atau menjepit terdiagnosis memiliki risiko CTS. Terdapat 19 responden (15,44%) dengan postur janggal pada tangan yang memiliki risiko kejadian CTS. Kisaran umur yang paling banyak memiliki risiko CTS yaitu 17-25 tahun sebanyak 19 responden sedangkan kisaran umur yang paling sedikit memiliki risiko CTS yaitu 36-45 tahun sebanyak 10 responden (8,1%). Tidak terdapat responden dengan obesitas yang memiliki risiko kejadian CTS. 9 responden (7,3%) dari 16 responden (13%) dengan riwayat *Diabetes mellitus* memiliki risiko CTS. Terdapat 3 responden (2,43%) dengan riwayat *Arthritis rheumatoid* yang memiliki risiko *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS).

Sebaiknya pihak perusahaan mengupayakan peralatan dan fasilitas kerja yang ergonomis untuk mengurangi gerakan berulang, pekerjaan menggenggam atau menjepit dan postur janggal dalam bekerja.

Kata kunci: Carpal Tunnel Syndrome, gerakan berulang, pekerjaan menggenggam atau menjepit, postur janggal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) atau biasa juga disebut Sindrom Terowongan Karpal (STK) merupakan neuropati tekanan atau cerutan terhadap nervus medianus di dalam terowongan karpal pada pergelangan tangan, tepatnya di bawah fleksor retinakulum. Dulu, sindroma ini juga disebut dengan nama *acroparesthesia*, *median thenar neuritis* atau *partial thenar atrophy* (Rambe, 2004:2).

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) merupakan salah satu dari *Work-related Musculoskeletal Disorders* (WMSDs) atau biasa pula disebut *Occupational Overuse Syndrome* (OOS) dan juga *Repetitive Strain Injuries* (RSI). Di Amerika, dikenal dengan *Cumulative Trauma Disorders* (CTD) (Harrianto, 1999:99).

Berbagai aktivitas yang banyak menggunakan tangan dalam waktu yang lama sering dihubungkan dengan terjadinya *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS). CTS berhubungan dengan pekerjaan yang menggunakan pekerjaan kombinasi antara kekuatan dan pengulangan gerakan yang lama pada jari-jari selama periode yang lama (Suherman, dkk., 2012).

CTS dapat menimbulkan kecacatan pada pekerja karena selain menyebabkan rasa nyeri, dapat pula membatasi fungsi-fungsi pergelangan tangan dan tangan sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan sehari-hari (Tana, 2003:100)

Pada tahun 1994 menurut *National Institute of Occupational Safety and Health* (NIOSH) terdapat 705.800 kasus sakit akibat kerja yang diakibatkan oleh pekerjaan melebihi beban atau pekerjaan dengan jenis pengulangan, 367.424

cedera akibat mengangkat beban yang terlalu berat, 93.325 cedera akibat menahan, membawa atau memutar objek, dan 47.861 gangguan pada bahu, 95.576 cedera atau penyakit, terjadi karena pergerakan pekerjaan yang berulang, termasuk di dalamnya pengulangan dalam penggunaan peralatan kerja, pengulangan pada saat menempatkan, memegang, dan memindahkan benda. Kasus kejadian cedera ini 55% terjadi pada pergelangan tangan, 7% pada bahu. Lebih dari 40 studi epidemiologi telah dilakukan untuk melihat hubungan antara gangguan muskuloskeletal dengan faktor pekerjaan yang bersifat berulang dan melibatkan pergerakan tangan dan lengan yang kontinu dengan gangguan muskuloskeletal yang ada (NIOSH, 1997 dalam Muis, 2011:2)

Prevalensi Sindrom Terowongan Karpal bervariasi. Di Mayo Clinic, Amerika pada tahun 1976-1980 insidensinya 173 per 100.000 pasien wanita/tahun dan 68 per 100.000 pasien pria/tahun. Di Maastricht, Belanda, 16% wanita dan 8% pria dilaporkan terbangun dari tidurnya akibat parestesia jari-jari. 45% wanita dan 8% pria yang mengalami gejala ini terbukti menderita Sindrom Terowongan Karpal setelah dikonfirmasi dengan pemeriksaan elektrodagnostik. Pada populasi Rochester, Minnesota, ditemukan rata-rata 99 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Sedangkan Hudson dkk menemukan bahwa 62% entrapment neuropathy adalah Sindrom Terowongan Karpal (Rambe, 2004:3).

Faton, dkk (2012) dalam Wahyu (2013:2) mengemukakan prevalensi kejadian CTS di Amerika Serikat adalah 1:20 pada orang usia 45-60 tahun. Artikel dari media Medika Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah melaporkan di Poliklinik IRS Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang selama 1 tahun (2006) didapatkan 34 penderita CTS baru. Kejadian terbanyak pada ibu rumah

tangga dengan kelompok umur 41-50 tahun (38,2%) dan 51-60 tahun (38,2%) (Lusan dan Pudjowojayanto, 2008, dalam Wahyu, 2013:2)

PT. Bogatama Marinusa adalah pabrik makanan yang memproduksi produk makanan udang beku dengan orientasi ke pasar ekspor. Jenis pekerjaan di PT. Bogatama Marinusa dominan pekerjaan monoton yang memerlukan gerakan cepat untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar. Semakin banyak produk yang dihasilkan maka tenaga kerja akan mendapat upah yang lebih besar pula (Ekawati, 2012:65)

Dari pengambilan data awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 April 2014, terlihat bahwa jenis pekerjaan di bagian produksi PT. Bogatama Marinusa merupakan jenis pekerjaan dengan gerakan cepat dan berulang, serta dilakukan dengan posisi berdiri. Terlebih pekerjaan tersebut dilakukan terus-menerus selama 8-10 jam kerja. Setelah dilakukan diagnosis dengan tes provokatif yaitu tes *Phalen*, diperoleh hasil 61% dari 36 orang pekerja (22 orang) yang berhasil ditemui positif mengalami gejala CTS dengan gejala terbanyak adalah nyeri, parestesia, mati rasa dan kram. Dari hasil tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* di PT. Bogatama Marinusa Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Risiko Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada Pekerja Wanita di PT. Bogatama Marinusa Makassar?”

C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)

Carpal Tunnel Syndrome dalam penelitian ini adalah gangguan pada tangan yang ditandai dengan gejala yaitu mati rasa, kram, kesemutan, parestesia (rasa seperti tertusuk atau terkena aliran listrik), sensasi bengkak, dan nyeri pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah (sisi radial) jari manis yang diakibatkan oleh faktor fisik dari pekerjaan yang diukur dengan tes *Phalen*.

Kriteria objektif

Berisiko : Bila pada saat tes *Phalen* responden merasakan satu atau lebih gejala CTS

Tidak berisiko : Bila pada saat tes *Phalen* responden tidak merasakan satupun gejala CTS

(Bahrudin, 2011)

b. Gerakan Berulang

Gerakan berulang dalam penelitian ini adalah aktivitas tangan yang berulang secara terus menerus dalam melakukan pekerjaan.

Kriteria objektif

Berisiko : Frekuensi gerakan ≥ 30 kali dalam satu menit

Tidak berisiko : Frekuensi gerakan < 30 kali dalam satu menit.

(Humantech, 1995)

c. Pekerjaan Menggenggam atau Menjepit

Pekerjaan menggenggam atau menjepit dalam penelitian ini adalah aktivitas tangan yang menjepit/menggenggam alat atau objek kerja secara terus menerus saat melaksanakan pekerjaan.

Kriteria objektif

Berisiko : Apabila responden melakukan pekerjaan menggenggam atau menjepit secara terus menerus saat melakukan pekerjaan.

Tidak berisiko : Apabila responden tidak melakukan pekerjaan menggenggam/menjepit secara terus menerus saat melakukan pekerjaan.

(Armstrong *et al.*, 1993)

d. Postur Janggal

Postur janggal dalam penelitian ini adalah posisi tangan atau pergelangan tangan yang tidak alamiah dan kaku secara terus menerus dalam melakukan pekerjaan berupa fleksi (posisi pergelangan tangan tertekuk ke bawah), ekstensi (posisi pergelangan tangan tertekuk ke atas), deviasi ulnar (posisi pergelangan tangan tertekuk menyamping ke arah luar), dan deviasi radial (posisi pergelangan tangan tertekuk menyamping ke arah dalam).

Kriteria objektif

Berisiko : Apabila responden bekerja dengan postur tangan yang tidak alamiah.

Tidak berisiko : Apabila responden bekerja dengan postur tangan yang alamiah.

(Bernard, 1997)

e. Umur

Umur dalam penelitian ini adalah usia responden dalam tahun dimulai dari responden dilahirkan hingga saat penelitian berlangsung.

Kriteria objektif

Kelompok usia muda : 18-25 tahun

Kelompok usia dewasa : 26-35 tahun

Kelompok usia tengah : 36-45 tahun

Kelompok usia tua : > 45 tahun

f. Obesitas

Obesitas dalam penelitian ini adalah kategori status gizi yang berasal dari hasil pengukuran indeks massa tubuh (IMT) pekerja dengan nilai ≥ 30.00 .

Kriteria objektif

Berisiko : Apabila responden dinyatakan obesitas dengan nilai IMT responden ≥ 30.00

Tidak berisiko : Apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas

(Levy *et al*, 2011)

g. *Diabetes Mellitus*

Diabetes mellitus dalam penelitian ini adalah penyakit metabolik yang disebabkan oleh peningkatan kadar glukosa dalam darah sehingga pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin.

Kriteria objektif

Berisiko : Bila responden memiliki riwayat penyakit *Diabetes mellitus*

Tidak berisiko : Bila responden tidak memiliki riwayat penyakit *Diabetes mellitus*

(Ginsberg, 2008)

h. Arthritis Rheumatoid

Arthritis rheumatoid dalam penelitian ini adalah penyakit pembengkakan pada sendi yang lazim disebut dengan reumatik.

Kriteria objektif

Berisiko : Bila responden memiliki riwayat penyakit *Arthritis rheumatoid*

Tidak berisiko : Bila responden tidak memiliki riwayat penyakit *Arthritis rheumatoid*

(*American Society for Surgery of The Hand* , 2011)

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai gambaran kejadian CTS dari faktor risiko pekerjaan fisik, dan faktor risiko individu. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi dengan hanya membahas gerakan berulang, pekerjaan menggenggam/menjejit dengan kekuatan, dan postur janggal pada tangan sebagai faktor risiko pekerjaan serta hanya membahas faktor umur, obesitas dan penyakit metabolik berupa *Diabetes mellitus* dan *Arthritis Rheumatoid* sebagai faktor risiko individu kejadian CTS.

D. Kajian Pustaka

Dari studi pustaka yang dilakukan peneliti diperoleh beberapa penelitian mengenai *Carpal Tunnel Syndrome* yang relevan sebagai acuan untuk dikembangkan. Beberapa penelitian mengenai kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* tersebut antara lain:

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) pada Pekerja Pembersih Kulit Bawang di Unit Dagang (UD) Bawang Lanang Kelurahan Iringmulyo' oleh Pratiwi, dkk (2013). Jurnal penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional* dengan variabel yang diteliti yaitu masa kerja dan gerakan repetisi (berulang). Adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan kejadian CTS ($p < 0.05$) dan tidak terdapat hubungan bermakna antara gerakan repetisi (berulang) dengan kejadian CTS ($p > 0.05$).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Suherman, dkk (2012) dengan judul 'Beberapa Faktor Kerja yang Berhubungan dengan Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) pada Petugas Rental Komputer di Kelurahan Kahuripan Tasikmalaya'. Jurnal penelitian ini juga menggunakan pendekatan *cross sectional* dengan variabel yang diteliti yaitu masa kerja, lama kerja, umur, dan posisi tangan saat mengetik. Berdasarkan hasil uji *chi-square* didapatkan ada hubungan antara masa kerja ($p = 0.000$), lama kerja ($p = 0.000$), umur ($p = 0.001$), posisi tangan saat mengetik ($p = 0.000$) dengan kejadian CTS.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mollayousefi *et al.*, (2008) dengan judul '*Assessment of Body Mass Index and Hand Anthropometric Measurements as Independent Risk Factors for Carpal Tunnel Syndrome*'. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor risiko independen kejadian

Carpal Tunnel Syndrome dengan menggunakan variabel indeks massa tubuh (IMT), rasio pergelangan tangan, indeks bentuk, indeks digit, dan rasio panjang/tinggi tangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IMT, rasio pergelangan tangan, dan indeks bentuk merupakan faktor risiko independen untuk CTS, indeks digit, dan rasio panjang/tinggi tangan bukan merupakan faktor risiko independen untuk CTS.

Penelitian tentang kejadian CTS juga pernah dilakukan oleh Merijanti (2005) yaitu 'Gerakan Repetitif Berulang sebagai Faktor Risiko Terjadinya Sindrom Terowongan Karpal pada Pekerja Wanita di Pabrik Pengolahan Makanan' dengan variabel yang diteliti yaitu umur, pendidikan, masa kerja, indeks massa tubuh (IMT), status reproduksi, unit kerja, jenis gerakan, dan jumlah gerakan repetitif. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat dua variabel yang berhubungan dengan kejadian CTS yaitu gerakan repetitif dan IMT.

Dari beberapa penelitian di atas, jelas terdapat relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, secara menyeluruh melihat faktor pekerjaan fisik yaitu gerakan berulang, pekerjaan menggenggam/menjepit, dan postur janggal pada tangan sebagai faktor pekerjaan yang berisiko menyebabkan CTS.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) pada pekerja wanita di PT. Bogatama Marinusa Makassar

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui gambaran risiko kejadian CTS berdasarkan gerakan berulang
- 2) Untuk mengetahui gambaran risiko kejadian CTS berdasarkan pekerjaan menggenggam atau menjepit
- 3) Untuk mengetahui gambaran risiko kejadian CTS berdasarkan postur janggal
- 4) Untuk mengetahui gambaran risiko kejadian CTS berdasarkan umur
- 5) Untuk mengetahui gambaran risiko kejadian CTS berdasarkan obesitas
- 6) Untuk mengetahui risiko kejadian CTS berdasarkan riwayat *Diabetes mellitus*
- 7) Untuk mengetahui risiko kejadian CTS berdasarkan riwayat *Arthritis Rheumatoid*

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi pihak PT. Bogatama Marinusa Makassar

Sebagai bahan referensi mengenai faktor-faktor risiko kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada pekerja sehingga upaya pencegahan sedini mungkin dapat dilakukan.

b. Bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi, bahan referensi serta dapat menjadi tambahan studi pustaka bagi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan tentang *Carpal Tunnel Syndrome*.

d. Bagi masyarakat pekerja:

Memberikan informasi kepada masyarakat pekerja tentang kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Ergonomi

1. Pengertian Ergonomi

Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “ergon” berarti kerja dan “nomos” berarti aturan atau hukum. Jadi secara ringkas ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Di Indonesia memakai istilah ergonomi, tetapi di beberapa negara seperti di Skandinavia menggunakan istilah “Bioteknologi” sedangkan di negara Amerika Serikat menggunakan istilah “*Human Engineering*” atau “*Human Factors Engineering*”. Namun demikian, kesemuanya membahas hal yang sama yaitu tentang optimalisasi manusia terhadap aktivitas yang dilakukan (Mallapiang, 2012:1).

Sasaran ergonomi ini adalah seluruh tenaga kerja, baik yang bekerja di sektor industri modern maupun pada sektor industri tradisional dan informal, sesuai dengan tujuannya yaitu tercapainya produktivitas dan efisiensi kerja yang cukup tinggi (Suma'mur, 2009:334)

Pengelompokkan bidang kajian ergonomi yang secara lengkap dikelompokkan oleh Satalaksana (1979) dalam Mallapiang (2012:45) sebagai berikut:

- a. Faal kerja, yaitu bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Tujuan dan bidang kajian ini

adalah untuk perancangan sistem kerja yang dapat meminimasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja.

- b. Antropometri, yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan peralatan dan fasilitas sehingga sesuai dengan pemakainya.
- c. Biomekanika, yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan, misalnya keterlibatan otot manusia dalam bekerja dan sebagainya. Menurut Suma'mur (2009: 337) menjelaskan ilmu tentang postur kerja dan gerakan seluruh atau sebagian termasuk anggota badan disebut biomekanik. Dari sudut pandang ilmu tersebut, seorang tenaga kerja memenuhi persyaratan biomekanis dalam melaksanakan pekerjaannya, apabila postur kerja dan gerakan-gerakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keadaan alami dari tubuh beserta anggota badan; untuk mewujudkan hal tersebut tenaga kerja dilatih dalam keterampilan kerja melakukan pekerjaannya dengan metoda yang berdasarkan biomekanis.
- d. Penginderaan, yaitu bidang kajian ergonomi yang erat kaitannya dengan masalah penginderaan manusia, baik indera penglihatan, penciuman, perasa, dan sebagainya.
- e. Psikologi kerja, yaitu bidang kajian ergonomi yang berkaitan dengan efek psikologis dan suatu pekerjaan terhadap pekerjanya, misalnya terjadinya stress dan lain sebagainya.

2. Keluhan Muskuloskeletal Terkait Ergonomi

Sikap kerja yang tidak sesuai saat bekerja, penyesuaian antara tubuh dan alat kerja, lingkungan kerja, dan proses kerja yang tidak sesuai, penggunaan kerja otot yang berlebihan dan kurangnya waktu pemulihan atau istirahat dapat menyebabkan beberapa keluhan muskuloskeletal.

Gangguan musculoskeletal adalah salah satu dari penyakit terkait pekerjaan (*work-related disease*), berbeda dengan penyakit akibat kerja (*occupational disease*). Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang muncul yang penyebab langsungnya adalah akibat bahaya dan penyakit di tempat kerja (contoh: asbestos merupakan penyebab asbestosis). Penyakit terkait pekerjaan adalah penyakit yang muncul secara multifaktorial ketika lingkungan kerja dan performa dari pekerja berkontribusi secara signifikan sebagai penyebab penyakit. Penyakit terkait pekerjaan secara parsial dapat diakibatkan oleh kondisi kerja. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh paparan di tempat kerja dan dapat menurunkan kapasitas kerja (Armstrong *et al.*, 1993:74).

Menurut Suma'mur (2009) inti dari kerja otot atau upaya fisik adalah kontraksi otot yang dengannya terjadi gerak tubuh dan anggota badan yang mekanismenya ditentukan oleh berubahnya posisi dalam sistem muskuloskeletal (otot rangka): gerak tubuh dan anggota badan demikian membentuk perbuatan kerja. Selain otot dan tulang, dalam sistem muskuloskeletal terdapat bagian tubuh yang lain seperti saraf, pembuluh darah, ligamen, persendian serta struktur lainnya, sehingga pada bekerjanya sistem muskuloskeletal bagian tersebut juga ikut berperan sesuai dengan

fungsi fisiologisnya atau mengalami efek dari bekerjanya sistem muskuloskeletal. Setiap kontraksi otot yang dipaksakan atau melebihi kemampuan atau penggunaannya melampaui kapasitasnya dapat menyebabkan trauma pada sistem muskuloskeletal yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Trauma tersebut tidak hanya mengenai ototnya saja, tetapi juga terhadap saraf, sendi, ligamen atau struktur lainnya. Oleh karena dalam bekerja kontraksi otot berulang ulang, trauma yang dialami oleh sistem muskuloskeletal bersifat repetitif (*repetitive strain injuries*) dan kesemuanya berakumulasi mengakibatkan kelainan trauma kumulatif pada sistem tersebut (*cummulative trauma disorders*).

Mallapiang (2012:143) menjelaskan keluhan muskuloskeletal adalah keluhan sakit, nyeri, pegal-pegal dan lainnya pada sistem otot (muskuloskeletal) seperti tendon, pembuluh darah, sendi, tulang, saraf, dan lainnya yang disebabkan oleh aktivitas kerja. Keluhan muskuloskeletal sering juga dinamakan MSD (*Muskuloskeletal Disorder*), RSI (*Repetitive Strain Injuries*), CTD (*Cumulative Trauma Disorders*), dan RMI (*Repetitive Motion Injury*).

Menurut NIOSH (1997) keluhan Muskuloskeletal (*Muskuloskeletal Disorders/MSDs*) adalah:

- a. Gangguan pada otot, saraf, tendon, ligamen, sendi, tulang rawan, dan sendi tulang belakang
- b. Gangguan tidak khusus yang disebabkan oleh kejadian yang cepat/tiba-tiba (tergelincir, tersandung/terjatuh) yang berkembang sedikit demi sedikit atau bersifat kronik

- c. Gangguan yang terdiagnosa oleh riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, atau tes medis lainnya mulai dari tingkat paling ringan, berangsur-angsur melemahkan dan kronik.
- d. Gangguan dengan beberapa gejala yang kelihatan seperti *Carpal Tunnel Syndrome* sampai pada gangguan yang tidak kelihatan namun terasa sakit seperti *Low Back Pain*.

(dalam Mallapiang, 2012:144)

B. Tinjauan Umum *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)


1. Definisi *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)

Carpal Tunnel Syndrome merupakan salah satu jenis *Cummulative Trauma Disorders* (CTD) yang disebabkan karena terjebaknya saraf medianus dalam terowongan karpal pada pergelangan tangan, yang ditandai oleh gejala rasa kesemutan, nyeri, kebas pada jari-jari dan tangan di daerah persarafan saraf medianus (Tanaka, 1995 dalam Tana (2003).

Levy *et al.* (2011:348) mendefinisikan *Carpal Tunnel Syndrome* sebagai sindroma yang ditandai dengan nyeri, parestesia, dan sakit pada area distribusi nervus medianus pada tangan, terjadi karena tekanan pada nervus medianus yang berada pada terowongan karpal di pergelangan tangan.

Hal yang hampir serupa dikemukakan Viera (2003) dalam Baharudin (2011:2) bahwa *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) atau Sindroma terowongan karpal adalah salah satu gangguan pada lengan tangan karena terjadi penyempitan pada terowongan *karpal*, baik akibat *edema fasia* pada terowongan tersebut maupun akibat kelainan pada tulang-tulang kecil tangan sehingga terjadi penekanan terhadap *nervus medianus* di pergelangan tangan.

CTS diartikan sebagai kelemahan pada tangan yang disertai nyeri pada daerah distribusi *nervus medianus*.



Gambar 2.1
Area Distribusi Nervus Medianus
(Davis, 2005)

Rampen (1995) mengemukakan CTS adalah kelainan yang merupakan sekumpulan gejala yang disebabkan oleh reaksi inflamasi, mengakibatkan penebalan ligamentum dan pembengkakan tendon di terowongan karpal, sehingga menekan saraf medianus yang berada di dalam terowongan tersebut. Sindrom ini dapat mengganggu mobilitas, kekuatan, kemampuan atau pengendalian motorik sehingga menurunkan kinerja (dalam Merijanti, 2005:2)

Terowongan karpal merupakan suatu celah yang terdapat pada lengan bawah sampai pergelangan tangan. Dinding terowongan tersebut terdiri dari dinding bagian bawah, kanan, dan kiri yang dibentuk oleh tulang-

tulang karpal sedangkan bagian atas dibentuk oleh jalinan *ligamen* yang lebar dan kuat. Di dalam terowongan tersebut terdapat saraf *medianus* yang berfungsi menyalurkan sensori ke ibu jari, telunjuk dan jari manis serta mempersarafi fungsi otot-otot dasar sisi dari ibu jari (otot tenar). Selain saraf medianus, di dalam terowongan tersebut terdapat pula tendon-tendon yang berfungsi untuk menggerakkan jari-jari (Harvard Medical School, 1998 dalam Tana, 2003:99)

Terowongan karpal terdapat di bagian sentral dari pergelangan tangan di mana tulang dan ligamentum membentuk suatu terowongan sempit yang dilalui oleh beberapa tendon dan nervus medianus. Tulang-tulang karpalia membentuk dasar dan sisi-sisi terowongan yang keras dan kaku sedangkan atapnya dibentuk oleh fleksor retinakulum (*transverse carpal ligament dan palmar carpal ligament*) yang kuat dan melengkung di atas tulang-tulang karpalia tersebut. Setiap perubahan yang mempersempit terowongan ini akan menyebabkan tekanan pada struktur yang paling rentan di dalamnya yaitu nervus medianus (Rambe, 2004)

2. Faktor Risiko *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)

Faktor risiko terjadinya CTS oleh Levy *et al* (2011:349) dikelompokkan menjadi faktor individu dan faktor fisik terkait pekerjaan. Faktor fisik terkait pekerjaan yaitu pekerjaan tangan dengan gerakan berulang yang tinggi, pekerjaan menggenggam atau menjepit dengan kekuatan, postur janggal pada pergelangan tangan dalam waktu yang lama, dan getaran lengan-tangan. Faktor individu terdiri dari riwayat penyakit

diabetes mellitus, hipotiroidisme, obesitas, *arthritis rheumatoid*, umur, dan jenis kelamin wanita.

Hal yang hampir serupa dikemukakan Silverstein *et al.* (1987) dalam Tana (2003:100) bahwa sindroma terowongan karpal yang berhubungan dengan pekerjaan adalah suatu sindrom yang disebabkan oleh pekerjaan dengan tekanan biomekanis pada pergelangan tangan dan tangan. Tekanan biomekanis tersebut dapat berupa gerakan berulang, gerakan menggenggam atau menjepit dengan kuat, posisi ekstrim pada pergelangan tangan misalnya deviasi ulnar, tekanan langsung pada terowongan karpal dan penggunaan alat bantu genggam yang bergetar. Pekerjaan-pekerjaan dengan kombinasi antara pemakaian tenaga yang kuat dan pengulangan gerakan yang sama pada jari dan tangan, menggenggam alat dengan kuat, menjepit benda dengan jari, posisi/postur sendi tidak baik/ekstrim, tekanan langsung pada sendi, vibrasi/getaran serta peregangan yang berlangsung lama dapat meningkatkan risiko terjadinya CTS.

Freivaldes (2004) mengemukakan faktor penyebab CTS yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu gerakan berulang, pekerjaan tangan dengan kekuatan serta posisi janggal pada tangan dapat menyebabkan kelelahan otot dan ketidaknyamanan pada area karpal. Kondisi ini akan mereda dengan cepat jika interval antara kegiatan cukup panjang. Namun, apabila pekerjaan terus berlanjut akan menyebabkan kelelahan, dapat mengakibatkan munculnya *tendinitis* dan pembengkakan pada terowongan karpal, menyebabkan terjadinya tekanan pada terowongan karpal (dalam Bugajska *et al.*, 2007:30).

a. Faktor Risiko Terkait Pekerjaan Fisik:

1) Gerakan Tangan Berulang

Seseorang yang bekerja dengan melakukan aktivitas kerja berulang yang melibatkan gerakan tangan atau pergelangan tangan atau jari-jari adalah suatu faktor risiko CTS yang memiliki pengaruh pada faktor beban fisik. Semakin tinggi frekuensi gerakan berulang semakin tinggi risiko terjadinya CTS (Kurniawan, 2008 dalam Pratiwi, dkk, 2013:144)

2) Pekerjaan Menggenggam/menjepit dengan Kekuatan

Pekerjaan dengan tenaga/kekuatan pada tangan akan meningkatkan risiko CTS. Terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak. Sebagai contoh, pada saat tangan harus memegang alat, maka jaringan otot tangan yang lunak akan menerima tekanan langsung dari pegangan alat, dan apabila hal ini sering terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang menetap (Tarwaka et al, 2004 dalam Nurhikmah, 2011:46).


3) Postur Janggal Pada Pergelangan Tangan

Postur daerah tangan/pergelangan tangan termasuk deviasi ulnar, deviasi radial pergelangan tangan fleksi/ekstensi adalah postur yang menjadi risiko kejadian CTS (Bernard, 1997:5a22)

Skie *et al.* (1990), Armstrong *et al.* (1991) mengemukakan postur fleksi pada pergelangan tangan dapat merusak area terowongan karpal yang dapat meningkatkan risiko CTS. (dalam Bernard, 1997: 5a24)




Gambar 2.2
Postur Deviasi Radial



Gambar 2.3
Posur Deviasi Ulnar



Gambar 2.4
Postur Fleksi



Gambar 2.5
Postur Ekstensi

4) Getaran Lengan-Tangan (*Hand-Arm Vibration*)

Getaran langsung pada tangan atau penggunaan alat genggam yang bergetar akan berdampak pada meningkatnya kontraksi otot. Getaran juga dapat menyebabkan abrasi mekanik selubung tendon, neurologis dan gangguan peredaran darah. Getaran dapat langsung melukai saraf perifer, ujung saraf, dan reseptor mekanik dan menimbulkan gejala mati rasa, kesemutan, rasa sakit, dan kehilangan sensitivitas. Getaran dapat memiliki

efek langsung pada arteri digital. Lapisan terdalam dari sel-sel di dinding pembuluh darah muncul terutama rentan terhadap cedera mekanik dengan getaran. Jika rusak, pembuluh ini dapat menjadi kurang sensitif terhadap tindakan vasodilator tertentu yang membutuhkan endotelium utuh (Bernard, 1997: 5a27).

Griffin (2007) dalam Yusuf dan Herry (2010:90) mengemukakan getaran pada mesin yang digunakan dengan bantuan tangan untuk mengoperasikan dapat dapat menyebabkan penyakit *Carpal Tunnel Syndrome* dimana adanya gangguan pada syaraf yang disebabkan karena terperangkapnya nervus medianus dan atau karena adanya penekanan pada nervus medianus yang melewati terowongan karpal. Gangguan pada syaraf ini berhubungan dengan pekerjaan yang mempunyai paparan getaran dalam jangka waktu panjang secara berulang

Alat yang mengakibatkan getaran-getaran pada lengan atau tangan masih banyak digunakan dalam perusahaan. Selama bekerja dengan menggunakan alat yang getarannya di bawah nilai ambang batas yaitu 4 m/det^2 untuk 8 jam kerja maka tidak begitu mendatangkan bahaya bagi kesehatan pekerja, tetapi dalam industri pertambangan dan kehutanan ada pekerjaan yang menggunakan alat-alat bergetar secara terus menerus dengan nilai di atas ambang batas getaran yaitu 4 m/det^2 (Suma'mur, 1996 dalam Yusuf dan Herry, 2010:90).

Menurut Suma'mur (1995) dalam Lubis (2006:199) getaran yang memicu terjadinya *Carpal Tunnel Syndrome* adalah getaran lokal melalui tangan.

b. Faktor Risiko Individu

1) Umur

Pertambahan usia dapat memperbesar risiko terjadinya sindroma terowongan karpal. Menurut NIOSH (1986) umur yang berisiko terkena CTS adalah 40-60 tahun.

2) Jenis Kelamin Wanita

Wanita mempunyai risiko tiga kali lebih besar untuk terjadinya sindrom terowongan karpal dibandingkan pria. Hal ini disebabkan oleh ukuran terowongan karpal pada wanita lebih sempit dan pengaruh estrogen yang dimiliki oleh wanita (Merijanti, 2005:16)

3) Obesitas

CTS terjadi karena kompresi saraf di bawah ligamentum karpal transversal berhubungan dengan naiknya berat badan dan IMT (Kouyoumdjian, 2000 dalam Bahrudin, 2011:5). *American Obesity Association* menemukan bahwa 70% dari penderita CTS memiliki kelebihan berat badan (Astroshi, 1999). Setiap peningkatan nilai IMT 8% risiko CTS meningkat. (dalam Bahrudin, 2011:5)

4) *Diabetes Mellitus*

Diabetes Mellitus dapat mengakibatkan komplikasi neuropati perifer yang dapat mempunyai beberapa bentuk salah satunya neuropati akibat jepitan, misalnya pada *Carpal Tunnel Syndrome* dimana diabetes menyebabkan saraf menjadi sensitif terhadap tekanan (Ginsberg, 2008)

5) Hipotiroidisme

Hipotiroid merupakan salah satu penyakit hormonal. Gangguan hormonal pada tubuh dapat menyebabkan meningkatnya tekanan pada karpal kanal (Armstrong *et al.*, 1993:74). Hipotiroid dapat menimbulkan kerusakan pada saraf perifer, nyeri, kekakuan dan pembengkakan pada sendi (Laboratorium Klinik Prodia). Kerusakan pada saraf perifer (mononeuropati) dapat menyebabkan CTS (Ginsberg, 2008).

6) *Arthritis Rheumatoid*

Menurut *American Society for Surgery of The Hand* (2011) Arthritis Rheumatoid dapat mempersempit terowongan karpal. Terowongan karpal yang menyempit secara langsung dapat menyebabkan CTS karena terjadinya penekanan pada saraf medianus.

3. **Patologi *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)**

Umumnya CTS terjadi secara kronis dimana terjadi penebalan *fleksor retinakulum* yang menyebabkan tekanan pada nervus medianus. Tekanan yang berulang-ulang dan lama akan mengakibatkan peninggian tekanan intravasikuler. Akibatnya aliran darah vena intravasikuler melambat. Kongesti yang terjadi ini akan mengganggu nutrisi intravasikuler lalu diikuti anoksia yang akan merusak endotel. Kerusakan endotel ini akan mengakibatkan kebocoran protein sehingga terjadi *edema epineural*. Hipotesa ini menerangkan bagaimana keluhan nyeri dan sembab yang timbul terutama pada malam atau pagi hari akan berkurang setelah tangan yang terlibat digerak-gerakkan atau diurut, mungkin akibat terjadinya perbaikan sementara pada aliran darah. Apabila kondisi ini terus berlanjut akan terjadi

fibrosis epineural yang merusak serabut saraf. Lama-kelamaan saraf menjadi atrofi dan digantikan oleh jaringan ikat yang mengakibatkan fungsi nervus medianus terganggu secara menyeluruh (Moeliono, 1993 dan Davis, 2005 dalam Baharuddin (2011:9)

Sedangkan menurut Lukman dan Ningsih (2009:162) saraf medianus lewat melalui kumparan *tunnel* pada tulang, yang terjadi karena karpal dorsalis dan ligament transversal pada karpal mengalami peradangan. Tendon fleksor bergerak melalui paralel tunnel menuju saraf medianus. Radang dan pembengkakan dari garis synovial selaput tendon mempersempit ruang yang ada dan menyebabkan tekanan pada saraf medianus. Gangguan kesehatan dengan gejala kesemutan dan nyeri akan muncul, hal ini diakibatkan oleh pembengkakan saraf yang melewati terowongan karpal di pergelangan tangan. Penekanan yang berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya peninggian tekanan intravasikuler, akibatnya aliran vena melambat dan menyebabkan anoksia serta kerusakan endotel karena gangguan pemenuhan nutrisi ke dalam sel. Apabila kondisi ini terus berlanjut, akan terjadi fibrosis epineural yang menyebabkan nekrosis serabut saraf. Lama-kelamaan saraf akan atrofi dan digantikan oleh jaringan ikat yang mengakibatkan fungsi nervus medianus terganggu secara menyeluruh.

4. Gejala Klinis *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)

Gejala dini penyakit ini adalah mati rasa dan kesemutan di ibu jari, telunjuk dan jari tengah yang seringkali membangunkan pasien pada saat tidur malam. Gangguan sensasi ini akan menyebar ke seluruh tangan dan lengan sehingga menimbulkan kesukaran untuk memungut benda-benda

kecil, yang pada akhirnya menimbulkan rasa nyeri dan kelumpuhan dari otot-otot (NOHSC, 1986 dalam Harrianto 1999:102).

Tana (2003:101) menjelaskan gejala CTS biasanya dapat dikenali dari riwayat penyakit berupa keluhan rasa baal, kesemutan, rasa geli atau nyeri di daerah pernafasan saraf medianus yang menyebabkan penderita terbangun waktu malam atau pagi hari. Kadang-kadang rasa nyeri disertai sembab di tangan. Kemampuan untuk merasakan rasa panas atau dingin hilang, tangan terasa sembab. Gejala ini terjadi tidak hanya saat tangan sedang dipergunakan tapi juga pada saat istirahat. Keluhan berkurang jika tangan digerak-gerakkan atau diangkat. Gangguan motorik saraf medianus akan menyebabkan kelemahan, kekakuan serta kecanggungan gerak koordinasi ibu jari dan telunjuk, dengan manifestasi timbulnya kesukaran membuka tutup botol, memutar kunci. Umumnya pasien dengan kekuatan ibu jari yang menurun tidak menyadari bahwa telah terjadi atrofi otot tenar.

Gejala CTS biasanya memburuk secara perlahan dari beberapa minggu sampai beberapa tahun. Pada beberapa kasus CTS yang berhubungan dengan pekerjaan, gejala terjadi pertama kali terasa saat tidak bekerja sehingga pasien tidak menghubungkan gejala tersebut dengan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaannya. Gejala penyakit berhubungan dengan jenis tugas yang menimbulkan tekanan biomekanis berulang pada tangan dan pergelangan tangan seperti frekuensi, kekuatan, pengulangan, posisi kerja yang tidak baik dan getaran.

Long (1996) dalam Lukman dan Ningsih (2009:163) mengemukakan tanda dan gejala yang dapat ditemukan adalah disestesia,

parestesia, hipotesia pada ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Keluhan terasa hebat setelah terjadi fleksi yang dipaksakan pada tangan dan berlangsung lama, seperti setelah mengetik. Gejala dapat terasa bila diketuk saraf median pada pergelangan tangan (*tunnel's sign*). Klien merasa tangannya membengkak, kaku bila memegang, terutama memegang benda kecil. Juga ditemukan rasa nyeri yang menjalar ke lengan atas, pada tingkat lanjut ditemukan adanya atropi.

Lubis (2006:200) mengemukakan keluhan-keluhan yang timbul pada Sindrom Terowongan Karpal yang umumnya terjadi secara berangsur-angsur dan spesifik adalah:

- a. Rasa nyeri di tangan, yang biasanya timbul malam atau pagi hari. Penderita sering terbangun karena rasa nyeri ini.
- b. Rasa kebas, kesemutan, kurang berasa pada jari-jari. Biasanya jari ke 1,2,3, dan 4 (kecuali jari kelingking)
- c. Kadang-kadang rasa nyeri dapat menjalar sampai lengan atas dan leher, tetapi rasa kebas hanya terbatas di distal pergelangan tangan saja.
- d. Gerakan jari kurang terampil, misalnya ketika menyulam atau memungut benda kecil.
- e. Ada juga penderita yang datang dengan keluhan otot telapak tangannya mengecil dan makin lama semakin menciut.

5. Diagnosis *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)

Penyaring diagnosis sindroma terowongan karpal hubungannya dengan pekerjaan menurut NIOSH (*National Institute for Occupational Safety and Health*) dalam Lubis (2006:201) adalah:

- a. Terdapat satu atau lebih gejala klinik yang mengarah pada kecurigaan terhadap Sindrom Terowongan Karpal berupa: parestesia, hipoestesia, nyeri atau kekakuan karena dingin yang mengikuti persarafan n. medianus pada lengan.
- b. Pemeriksaan secara obyektif yang mengarah pada sindroma terowongan karpal berupa pemeriksaan fisik *diagnostic Tinel's sign* atau *Phalen's test* atau secara elektrodagnostik ada indikasi gangguan fungsi n. medianus yang melintasi terowongan karpal.
- c. Riwayat pekerjaan yang mendukung perkembangan gejala-gejala berupa penggunaan berulang dan frekuensinya sering pada pergelangan tangan, penggunaan alat-alat yang dapat menggetarkan tangan dan frekuensi yang sering dan berlangsung lama pada tekanan berlebihan di pergelangan tangan atau telapak tangan.

Menurut Bahrudin (2011:11), diagnosa CTS ditegakkan selain berdasarkan gejala-klinis seperti di atas dan diperkuat dengan pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada penderita dengan perhatian khusus pada fungsi, motorik, sensorik dan otonom tangan. Beberapa pemeriksaan dan tes provokasi yang dapat membantu menegakkan diagnosa CTS adalah:

- 1) *Phalen's test*: Penderita diminta melakukan fleksi tangan secara maksimal. Bila dalam waktu 60 detik timbul gejala seperti CTS,

tes ini menyokong diagnosa. Beberapa penulis berpendapat bahwa tes ini sangat sensitif untuk menegakkan diagnosa CTS.

- 2) *Torniquet test*: Pada pemeriksaan ini dilakukan pemasangan tomiquet dengan menggunakan tensimeter di atas siku dengan tekanan sedikit di atas tekanan sistolik. Bila dalam 1 menit timbul gejala seperti CTS, tes ini menyokong diagnosa.
- 3) *Tinel's sign*: Tes ini mendukung diagnosa bila timbul parestesia atau nyeri pada daerah distribusi nervus medianus jika dilakukan perkusi pada terowongan karpal dengan posisi tangan sedikit dorsofleksi.
- 4) *Flick's sign*: Penderita diminta mengibas-ibaskan tangan atau menggerak-gerakkan jari-jarinya. Bila keluhan berkurang atau menghilang akan menyokong diagnosa CTS. Harus diingat bahwa tanda ini juga dapat dijumpai pada penyakit Raynaud.
- 5) *Thenar wasting*: Pada inspeksi dan palpasi dapat ditemukan adanya atrofi otot-otot thenar.
- 6) Menilai kekuatan dan ketrampilan serta kekuatan otot secara manual maupun dengan alat dynamometer.
- 7) *Wrist extension test*: Penderita diminta melakukan ekstensi tangan secara maksimal, sebaiknya dilakukan serentak pada kedua tangan sehingga dapat dibandingkan. Bila dalam 60 detik timbul gejala-gejala seperti CTS, maka tes ini menyokong diagnosa CTS.

- 8) *Pressure test*: Nervus medianus ditekan di terowongan karpal dengan menggunakan ibu jari. Bila dalam waktu kurang dari 120 detik timbul gejala seperti CTS, tes ini menyokong diagnosa.
- 9) *Luthy's sign (bottle's sign)*: Penderita diminta melingkarkan ibu jari dan jari telunjuknya pada botol atau gelas. Bila kulit tangan penderita tidak dapat menyentuh dindingnya dengan rapat, tes dinyatakan positif dan mendukung diagnose
- 10) Pemeriksaan sensibilitas: Bila penderita tidak dapat membedakan dua titik (*two-point discrimination*) pada jarak lebih dari 6 mm di daerah nervus medianus, tes dianggap positif dan menyokong diagnose
- 11) Pemeriksaan fungsi otonom: Pada penderita diperhatikan apakah ada perbedaan keringat, kulit yang kering atau licin yang terbatas pada daerah innervasi nervus medianus. Bila ada akan mendukung diagnose CTS. Dari pemeriksaan provokasi diatas Phalen test dan Tinel test adalah sangat patognomonis untuk CTS.

Uji provokatif klinis menurut Bugajska *et al.*, (2007:33) merupakan uji yang mudah untuk dilakukan dan dapat membantu dalam *screening*. Dalam diagnosis, khususnya dalam studi epidemiologi CTS, terdapat tes provokasi sederhana yang khas untuk sindrom ini. Salah satunya *Manuver Phalen* (menempatkan pergelangan tangan pasien dalam posisi hiperfleksi selama 30-60 detik, tes positif apabila dapat menyebabkan nyeri), uji *Flick* (pasien merasakan nyeri lega dengan menggerakkan tangan seperti saat mengibas-ngibaskan termometer), *Circumduction* ibu jari, tes terdiri dengan menggabungkan ujung

jari-jari 1 dan 4 secara aktif, (yang dapat menyebabkan sensasi nyeri), tes *Tinel* (perkusi dari tendon di daerah pergelangan tangan menyebabkan ketidaknyamanan atau nyeri pada pergelangan tangan) dan uji *Mc Murthy* (pada tingkat positif jika endapan di terowongan karpal di telapak tangan pengguna terdapat gejala nyeri atau parestesia). 34 sumber menyatakan dari empat tes provokasi diatas, tes phalen merupakan tes dengan sensitivitas dan spesifisitas tertinggi yaitu tingkat sensitivitas 71% dan tingkat spesifisitas 80%.



Gambar 2.6
Tes *Phalen*
(Bahrudin, 2011)

Adapun, sensitivitas adalah kemampuan untuk mendiagnosa secara tepat penderita dengan hasil tes positif (+) atau proporsi hasil tes (+) dan benar sakit sedangkan spesifisitas adalah kemampuan untuk mendiagnosa secara benar terhadap bukan penderita dengan hasil tes negative (-) atau proporsi hasil tes (-) dan benar tidak sakit (Habibi, 2013:10).

2. Pemeriksaan neurofisiologi (elektrodiagnostik)

- 1) Pemeriksaan EMG dapat menunjukkan adanya fibrilasi, polifasik, gelombang positif dan berkurangnya jumlah motor unit pada otot-otot thenar. Pada beberapa kasus tidak dijumpai kelainan pada otot-otot lumbrikal. EMG bisa normal pada 31 % kasus CTS.

2) Kecepatan Hantar Saraf (KHS). Pada 15-25% kasus, KHS bisa normal. Pada yang lainnya KHS akan menurun dan masa laten distal (distal latency) memanjang, menunjukkan adanya gangguan pada konduksi saraf di pergelangan tangan. Masa laten sensorik lebih sensitif dari masa laten motorik (Moeliono, 1993 dalam Bahrudin, 2011:14)

3. Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan sinar-X terhadap pergelangan tangan dapat membantu melihat apakah ada penyebab lain seperti fraktur atau artritis. Foto polosleher berguna untuk menyingkirkan adanya penyakit lain pada vertebra. USG, *CT-scan* dan MRI dilakukan pada kasus yang selektif terutama yang akan dioperasi (Rambe, 2004:5).

4. Pemeriksaan Laboratorium

Bila etiologi CTS belum jelas, misalnya pada penderita usia muda tanpa adanya gerakan tangan yang repetitif, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan seperti kadar gula darah, kadar hormon tiroid ataupun darah lengkap (Rambe, 2004:5)

6. Pencegahan dan Penanggulangan *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)

a. Pencegahan *Carpal Tunnel Syndrome*

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya CTS, antara lain:

- 1) Mengurangi posisi kaku pada pergelangan tangan, gerakan berulang, getaran peralatan pada saat bekerja
- 2) Desain peralatan kerja supaya tangan dalam posisi natural saat bekerja
- 3) Modifikasi tata ruang kerja untuk memudahkan variasi gerakan

- 4) Mengubah metode kerja untuk sesekali istirahat pendek serta mengupayakan rotasi kerja
- 5) Meningkatkan pengetahuan pekerja tentang gejala-gejala dini CTS sehingga pekerja dapat mengenali gejala-gejala CTS lebih dini. (Bahrudin, 2011:18)

Menurut Harsono (1995) dalam Tana (2003:103) untuk pencegahan, hal yang perlu dilakukan adalah penerapan prinsip-prinsip ilmu ergonomi pada pekerjaan, peralatan kerja, prosedur kerja dan lingkungan kerja sehingga dapat diperoleh penampilan pekerja yang optimal. Rotasi kerja pada jangka waktu tertentu dapat dilakukan, yaitu dengan merotasi pekerja pada tugas dengan risiko yang berbeda. Penyesuaian peralatan kerja dapat meminimalkan masalah yang terjadi contohnya penyesuaian peralatan yang ergonomik kepada pekerja. Untuk mengurangi efek beban tenaga pada pergelangan maka alat dan tugas seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi gerakan menggenggam atau menjepit dengan kuat. Perancangan alat kerja contohnya tinggi meja kerja yang dipakai sesuai dengan ukuran antropometri pekerja, penggunaan alat pemotong/gunting yang tajam sehingga mengurangi beban pada pergelangan tangan dan tangan.

b. Pengobatan *Carpal Tunnel Syndrome*

Berbagai macam pengobatan dapat dilakukan untuk mengurangi sakit akibat CTS. Menurut Mallapiang (2012:156) terapi untuk penderita tahap ringan adalah terapi konservatif alias tanpa operasi. Penderita diberi obat untuk meredakan rasa sakit, pembengkakan dan peradangan. Kemudian dilakukan fisioterapi yaitu menghangatkan peradangan dengan ultrasound, atau sinar laser.

Tana (2003:103) menyatakan pemakaian bidai/*splint* pada posisi netral akan mengurangi penekanan terhadap saraf medianus dan mengurangi keluhan yang ada. Bidai dapat dipakai pada malam hari atau selama berolah raga. Bila gejala sudah berkurang pasien boleh melakukan latihan dengan pengawasan dan disarankan untuk melakukan pelatihan relaksasi.

C. Tinjauan Umum Pekerja Wanita

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 dan 3).

Kalsum (2004:1) mengemukakan GBHN 1988 dalam bidang peranan wanita dalam pembangunan bangsa, wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber instansi bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dalam segenap kegiatan pembangunan. Demikian juga jika tenaga kerja wanita yang bekerja di perusahaan atau pabrik maupun yang menjual jasa dari tenaganya, harus mendapat perlindungan yang baik atas keselamatan, kesehatan, serta kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Tenaga kerja wanita memiliki karakter fisik yang berbeda dengan pria. Kekuatan tubuh fisik seorang wanita rata-rata sekitar $\frac{2}{3}$ dari pria. Selain itu, wanita juga mengalami proses biologis yaitu haid, kehamilan, masa nifas, menyusui, dan menopause. Karena beberapa perbedaan karakter tersebut, pekerja

wanita sering kali mendapatkan perlakuan yang berbeda. Pekerja wanita sering dianggap kurang mampu sehingga mendapat pekerjaan yang rutin, repetitif, dan tidak diberi kesempatan mengambil keputusan sendiri. Pekerja wanita lebih mudah terkena gangguan muskuloskeletal, antara lain karena ukuran alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh wanita, serta pemberian tugas yang monoton dan repetitif/berulang (Sulaksmo, 2012).

Wanita mempunyai risiko tiga kali lebih besar untuk terjadinya Sindrom Terowongan Karpal dibandingkan pria. Hal ini disebabkan oleh ukuran terowongan karpal pada wanita lebih sempit dan pengaruh estrogen yang dimiliki oleh wanita (Merijanti, 2005:16)

Selain itu, pengaruh hormon estrogen pada wanita dapat menyebabkan retensi cairan. Reaksi alami tubuh terhadap iritasi pada tendon akibat CTS adalah untuk menghasilkan cairan sinovial yang lebih di bagian yang iritasi. Cairan ini masuk ke selubung tendon dalam upaya alami tubuh untuk memecahkan masalah iritasi (Healey dan Walker, 2009:191)

Perbedaan gender memiliki perbedaan proporsi yang lebih besar pada wanita diperkirakan karena proporsi wanita lebih kepada pekerjaan yang berulang-ulang sedangkan proporsi pria lebih kepada pekerjaan dengan kekuatan atau tenaga. Selain itu, wanita cenderung memiliki kemauan yang lebih besar untuk melaporkan gejala (Bureau 1992, dalam Levy *et al*, 2011:349)

D. Tinjauan Umum Gerakan Berulang

Gerakan repetitif atau gerakan yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya waktu istirahat untuk otot yang bekerja menyebabkan otot menjadi lelah dan kram (Mallapiang, 2012:163).

Purwanti (2011) mengemukakan berbagai aktivitas yang banyak menggunakan tangan dalam waktu yang lama sering dihubungkan dengan terjadinya *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS). CTS berhubungan dengan pekerjaan yang menggunakan pekerjaan kombinasi antara kekuatan dan pengulangan gerakan yang lama pada jari-jari selama periode yang lama (dalam Suherman, dkk., 2012:3)

Bernard (1997:5a3) mengemukakan gerakan repetitif untuk CTS didefinisikan sebagai pengulangan aktivitas pada tangan dan pergelangan tangan yang terlibat sebagai siklus kerja berulang-ulang baik gerakan tangan/jari yang berulang-ulang serta pergelangan tangan seperti tangan mencengkeram atau pergelangan tangan ekstensi/fleksi dan deviasi ulnaris/radial.

Kurniawan (2008) mengemukakan seseorang yang bekerja dengan melakukan gerakan berulang pada tangan dan pergelangan tangan merupakan aktivitas kerja berulang yang melibatkan gerakan tangan atau pergelangan tangan atau jari-jari adalah suatu faktor risiko CTS yang memiliki pengaruh pada faktor beban fisik. Semakin tinggi frekuensi gerakan berulang semakin tinggi risiko terjadinya CTS (dalam Pratiwi, dkk, 2013:144).

Peningkatan pengulangan gerakan yang sama setiap hari akan meningkatkan risiko untuk terjadinya *tendinitis*. Kerusakan ini dapat menjadi penyebab terjadinya kompresi pada saraf dan menimbulkan CTS. Gerakan berulang akan meningkatkan tekanan pada *carpal tunnel*. Penekanan pada *carpal tunnel* akan menimbulkan kerusakan baik *reversibel* ataupun *irreversibel*. Peningkatan intensitas dan durasi yang cukup lama, akan mengurangi aliran darah pada pembuluh darah tepi. Dalam jangka waktu yang lama aliran darah

akan berpengaruh pada sirkulasi kapiler dan akhirnya berdampak pada permeabilitas pembuluh darah pada pergelangan tangan (Kurniawan, dkk., 2008:36)

Humantech (1995) dalam Nurhikmah (2011:45) mengemukakan, posisi tangan dan pergelangan tangan berisiko apabila dilakukan gerakan berulang/frekuensi sebanyak 30 kali dalam semenit.

E. Tinjauan Umum Pekerjaan Menggenggam/menjepit

Pekerjaan dengan tenaga/kekuatan pada tangan akan meningkatkan risiko CTS. Terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak. Sebagai contoh, pada saat tangan harus memegang alat, maka jaringan otot tangan yang lunak akan menerima tekanan langsung dari pegangan alat, dan apabila hal ini sering terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang menetap (Tarwaka *et al.*, 2004 dalam Nurhikmah, 2011:46).

Armstrong *et al.*, (1993:80) menyatakan pada kasus pekerjaan material terbukti bahwa buruknya desain ergonomi pada alat kerja yang digunakan yaitu berat, bentuk, dan ukuran alat dapat menyebabkan posisi ekstrim pada tangan dan membuat pekerja mengerahkan tenaga yang lebih besar saat bekerja. Menggenggam objek (alat) dengan kekuatan menyebabkan tekanan pada fleksor tendon jari dan dapat mengakibatkan tekanan pada terowongan karpal. Semakin berat suatu objek (alat), semakin banyak kekuatan yang dikerahkan untuk menggenggam objek (alat).

Hal yang sama dikemukakan Moore and Garg (1994) bahwa pekerjaan dengan tenaga/kekuatan salah satunya adalah pekerjaan yang menyesuaikan

antara berat alat yang digunakan dengan kecepatan gerakan saat bekerja (dalam Bernard, 1997:5a4)

F. Tinjauan Umum Postur Janggal

Postur tubuh yang canggung atau postur kerja yang tidak benar merupakan masalah yang menjadi pertimbangan khusus dalam pencegahan keluhan muskuloskeletal (Mallapiang, 2012:162).

Postur daerah tangan/pergelangan tangan termasuk gerakan mencengkeram atau menjepit, deviasi ulnar, pergelangan tangan fleksi/ ekstensi adalah postur tangan yang menjadi risiko kejadian CTS (Bernard, 1997:5a22)

Merijanti (2005:21) mengemukakan gerakan fleksi tangan dan pergelangan tangan > 45 derajat termasuk dalam jenis gerakan yang tidak netral/alamiah (*awkward posture*). Gerakan ini dapat menyebabkan tekanan secara langsung pada saraf medianus sehingga bila dilakukan berulang dapat menimbulkan terjadinya Sindrom Terowongan Karpal.

Healey dan Walker (2009:190) mengemukakan dalam studi yang mereka lakukan pada industri pengepakan daging yang sedang mengalami masalah CTS, gerakan berulang frekuensi tinggi dengan postur canggung dan tenaga yang kuat, banyak dilakukan pekerja untuk mengubah seluruh hewan menjadi produk. Postur canggung banyak terjadi dalam penggunaan pisau saat mereka melakukan pekerjaan. Hal ini membuktikan bahwa postur canggung atau tidak alamiah merupakan salah satu faktor risiko kejadian CTS.

Skie *et al.* (1990), Armstrong *et al.* (1991) mengemukakan postur fleksi pada pergelangan tangan dapat merusak area terowongan karpal yang dapat meningkatkan risiko CTS (dalam Bernard, 1997: 5a24)

G. Tinjauan Umum Umur

Umur berhubungan dengan keluhan pada otot. Demikian pula pada CTS. Pertambahan usia dapat memperbesar risiko terjadinya sindroma terowongan karpal (Pakasi, 2005 dalam Suherman, 2012:7). NIOSH (1986) menyatakan CTS lebih sering terjadi pada wanita sekitar umur 40 – 60 tahun (dalam Harrianto, 1999:102)

Hal yang berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan Kurniawan, dkk (2008:34) disimpulkan bahwa *Carpal Tunnel Syndrome* paling sering ditemukan pada usia 30-60 tahun tetapi banyak faktor lainnya yang memiliki pengaruh pada usia dalam kasus CTS. Umur merupakan salah satu risiko yang berkaitan erat dengan kejadian CTS, hal tersebut disebabkan karena semakin tuanya seseorang cairan *synovial* akan berkurang sehingga bisa menyebabkan pembengkakan pada bagian persendian (dalam Suherman, dkk., 2012:7)

H. Tinjauan Umum Obesitas

Obesitas merupakan salah satu faktor risiko CTS (Levy *et al.*, 2011:349). Obesitas adalah suatu keadaan dimana indeks massa tubuh (IMT) seseorang lebih dari 30.00 menurut standar *World Health Organization* (WHO). Penentuan status apakah seseorang dinyatakan obesitas dapat diketahui dengan pengukuran IMT. Pengukuran IMT dapat dilakukan dengan rumus berat badan (Kg) dibagi dengan tinggi badan (m^2).

Keterkaitan status gizi dengan kejadian CTS juga terlihat pada penelitian yang dilakukan Kouyoumdjian (2000) yang menyatakan CTS terjadi karena kompresi saraf di bawah ligamentum karpal transversal berhubungan dengan naiknya berat badan dan IMT. IMT yang rendah merupakan kondisi

kesehatan yang baik untuk proteksi nervus medianus (Werner, 2004). Pekerja dengan IMT ≥ 25 lebih mungkin untuk terkena CTS dibandingkan dengan pekerja yang mempunyai badan ramping.

Salah satu faktor yang diperkirakan pada seseorang dengan tubuh yang gemuk yaitu akan meningkatkan kandungan lemak terowongan karpal yang selanjutnya menyebabkan tekanan hidrostatis meningkat. Pada orang dengan IMT tinggi, peningkatan volume darah bergeser ke ekstremitas atas saat dalam posisi baring yang selanjutnya menyebabkan kongesti vena dalam lembaran fleksor synovial dari terowongan karpal dan menyebabkan tekanan intrakarpal meningkat (Mollayousefi *et al.*, 2008:40)

American Obesity Association menemukan bahwa 70% dari penderita CTS memiliki kelebihan berat badan. Setiap peningkatan nilai IMT 8% risiko CTS meningkat (dalam Bahrudin, 2011:5)

I. Tinjauan Umum Penyakit Metabolik

1. *Diabetes mellitus*

Diabetes mellitus adalah suatu keadaan hiperglikemik kronis dan perlahan namun pasti dapat merusak jaringan dalam tubuh jika tidak ditangani secara serius. Penyakit ini akan mengakibatkan berbagai macam komplikasi kronis terjadi pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah (Nurkhozin, dkk, 2009). Penyakit ini terjadi akibat meningkatnya kadar glukosa dalam darah.

Diabetes Mellitus dapat mengakibatkan komplikasi neuropati perifer yang dapat mempunyai beberapa bentuk salah satunya neuropati akibat jepitan, misalnya pada sindrom terowongan karpal (*Carpal Tunnel Syndrome*)

(diabetes menyebabkan saraf menjadi sensitif terhadap tekanan) (Ginsberg, 2008)

2. *Arthritis rheumatoid*

Arthritis rheumatoid adalah penyakit autoimun dengan karakteristik adanya inflamasi kronik pada sendi disertai dengan manifestasi sistemik seperti anemia, *fatigue*, dan osteoporosis.

Menurut *American Society for Surgery of The Hand* (2011) arthritis rheumatoid dapat mempersempit terowongan karpal. *Arthritis Rheumatoid* dapat menyebabkan munculnya CTS jika terjadi pembengkakan pada sendi di jari atau pergelangan tangan dan penebalan *tenosyovium* yang akan mempersempit ruang dalam terowongan karpal. Gejala-gejala CTS tidak akan muncul jika pembengkakan dan penebalan tenosynovium tidak sampai menekan saraf medianus (Kurniawan, dkk., 2008: 37).

J. *Pandangan Islam tentang Risiko Kejadian Carpal Tunnel Syndrome (CTS)*

Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan lahir dan batin termasuk mencegah agar terhindar dari penyakit. Sesungguhnya risiko kejadian CTS dalam pekerjaan dapat dicegah, yaitu dengan penerapan prinsip ergonomi yang baik bagi pekerja. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap bencana termasuk penyakit yang menimpa manusia semua berasal dari kesalahannya sendiri. Keluhan musculoskeletal (keluhan otot) salah satunya CTS merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena kesalahan manusia dalam hal ergonomi. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa (4:79)

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ
 لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja yang menimpamu, berupa bencana maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi (Kementerian Agama RI, 2001:236)

Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan ayat ini menegaskan sisi upaya manusia yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Hukum-hukum alam dan kemasyarakatan cukup banyak dan beraneka ragam. Dampak baik dan dampak buruk untuk setiap gerak dan tindakan telah ditetapkan Allah melalui hukum-hukum tersebut. Manusia diberi kemampuan memilah dan memilih, dan masing-masing akan mendapatkan hasil pilihannya. Allah sendiri melalui perintah dan larangan-Nya menghendaki bahkan menganjurkan agar manusia memilih kebaikan dan nikmat-Nya. Karena itu diingatkannya bahwa *apa saja nikmat yang engkau peroleh*, wahai Muhammad adalah dari Allah yaitu Dia yang mewujudkan anugerah-Nya dan apa saja bencana yang menimpa engkau wahai Muhammad, maka bencana itu dari kesalahan dirimu sendiri (Shihab, 2009:489).

Dalam tafsir Al-Maragi (Al-Maragi, 1993:160) juga dijelaskan bahwa Apa saja nikmat yang kamu peroleh berasal dari Allah Ta'ala secara mutlak, dan keburukan berasal dari manusia sendiri secara mutlak. Masing-masing dari dua kemutlakan ini mempunyai posisi pembicaraanya tersendiri. Posisi ayat yang membatalkan kesialan dimaksudkan agar manusia mengetahui bahwa keburukan yang menimpa mereka bukan gara-gara kesialan seseorang. Pada masa jahiliyah mereka sering mengatakan sial, kemudian Islam membatalkannya. Akan tetapi

hingga kini hal itu masih tersebar luas. Ketika ditimpa keburukan, hendaknya seseorang mencari sebab pada dirinya sendiri, karena keburukan itu menimpanya disebabkan ketidaktahuannya tentang sunnah-sunnah yang telah digariskan oleh Allah, berupa pencarian sebab-sebab mendapatkan manfaat dan menghindarkan bahaya dengan menjauhi sebab-sebabnya, kemudian memilih apa yang bermanfaat baginya dan menyingkirkan apa yang membahayakannya.

Dalam Surah Asyasyura' (QS.42:30) juga dijelaskan:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (Kementerian Agama RI, 2001:1304)

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan, Al-Biqai lebih kurang berpendapat bahwa ayat-ayat yang lalu menguraikan nikmat dan kekuasaan-Nya. Ayat-ayat di atas bagaikan menyatakan: Allah yang telah menciptakan kamu, memberi kamu rezeki, dan Dia juga yang mengendalikan urusan kamu setelah menyebarluaskan kamu di pentas bumi ini. Tidak ada nikmat kecuali yang bersumber dari-Nya, dan tidak ada pula petaka kecuali atas izin-Nya. Dengan demikian Dialah sendiri yang merupakan “*waliyy*” yang mengurus kamu. Nikmat apapun yang kamu rasakan maka itu adalah bersumber dari-Nya dan atas kemurahan-Nya, dan *apa* yakni musibah yang menimpa kamu- kapan dan dimana pun terjadinya- maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri yakni dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan, paling tidak disebabkan oleh kecerobohan atau ketidakhati-hatian kamu. Musibah yang kamu alami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahan kamu, karena Allah tetap melimpahkan

rahmat-Nya kepada kamu *dan Allah memaafkan banyak* dari kesalahan-kesalahan kamu, sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak mengakibatkan musibah atas diri kamu.

Seperti yang telah dipaparkan dalam tafsir di atas, kejadian CTS dapat merupakan salah satu dari musibah yang diperoleh manusia dalam hal ini pekerja karena kecerobohan dan ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pekerjaan.

Tafsir Al-Azhar (Hamka, 1987:6514) menjelaskan ayat di atas adalah satu peringatan bahwa apabila suatu malapetaka dating menimpa, janganlah segera menyalahkan orang lain, apatah lagi menyalahkan Tuhan. Periksalah diri sendiri. Manusia memang selalu lalai memperhitungkan bahwa dia bersalah. Setelah datang malapetaka dengan tiba-tiba dia jadi bingung, lalu menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan takdir. Kadang-kadang kesalahan yang paling besar ialah lupa kepada Tuhan, sehingga malapetaka yang tadinya bias menjadi cobaan peneguh iman, menjadi satu sengsara yang amat berat; tidak terpikul oleh jiwa, karena jiwa tidak ada pegangan. maka jika tiba giliran mendapat musibah, maka periksalah diri.

Dari tafsir di atas terdapat perintah bagi kita umat manusia untuk senantiasa mengoreksi diri untuk memperbaiki kesalahan agar tidak ditimpa musibah. Termasuk pada kejadian CTS, akan lebih baik bagi kita untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan keadaan alamiah kita dalam pekerjaan sehingga kita dapat terkena sindroma ini. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi risiko kejadian sindroma ini.

Kejadian CTS merupakan risiko dari proses kerja yang tidak ergonomis atau dengan kata lain tidak sesuai dengan keadaan alamiah dari pekerja. Prinsip ergonomi sendiri yakni *fit the job to the man* yaitu penyesuaian antara pekerjaan dengan atribut/keadaan pekerja terdapat dalam Al-Qur'an QS Az-Zumar (39:39)

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مٰكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌۭ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui (Kementerian Agama RI, 2001:1243)

Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan, Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. bahwa: *katakanlah* kepada mereka: “*Hai kaumku*, yakni kerabat, suku, dan orang-orang yang hidup dalam satu masyarakat denganku, *bekerjalah*, yakni lakukan secara terus menerus apa yang hendak kamu lakukan *sesuai dengan keadaan*, kemampuan, dan sikap hidup *kamu*, *sesungguhnya aku akan bekerja* pula dalam aneka kegiatan positif sesuai kemampuan dan sikap hidup yang diajarkan Allah kepadaku, *maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya* di dunia ini dan ditimpa pula oleh *azab yang kekal* di akhirat nanti” (Shihab, 2009:503).

Penafsiran yang sedikit berbeda terdapat pada tafsir Al-Azhar (1987:6285) yang menjelaskan surah Az-zumar ayat 39 memiliki penafsiran “*Katakanlah! Wahai kaumku!*” (pangkal ayat 39). Seruan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Rasul-Nya agar disampaikan kepada kaumnya yang masih mempertahankan pendirian musyrik yang kufur itu; “*Bekerjalah kamu atas tempat tegak kamu dan aku pun akan bekerja pula*”. Kalau pendirian yang jelas salah itu hendak kamu pertahankan juga, dan seruan dakwahku tidak kamu

perdulikan, silakan kamu bekerja meneruskan keyakinan dan pendirian kamu itu. Aku pun akan meneruskan pekerjaanku pula menurut keyakinan dan pendirianku; “*Maka kelak kamu akan mengetahui*” (ujung ayat 39). Yang setelah kita meneruskan pekerjaan menurut keyakinan masing-masing, akan kamu lihatlah kelak, siapakah diantara kita di pihak yang benar.

Dalam tafsir Al-Maragi (1992:15) juga dijelaskan bahwa kandungan dari Surah Az-Zumar ayat 39 ini berisi: Katakanlah; Hai kaumku berbuatlah kamu sekalian dengan mengandalkan kekuatan dan keperkasaan yang menurut kepercayaanmu ada pada dirimu dan berusahalah sungguh-sungguh mengatur segala macam makar dan tipu daya. Sesungguhnya aku pun berusaha menegakkan agamaku dan berusaha menyebarkannya di kalangan manusia. Niscaya kalian akan tahu apakah azab dan kehinaan di dunia akan menimpa diriku atautkah menimpa kalian. Maka akan kelihatanlah pada waktu itu, siapakah di antara kita yang salah, aku kah atau kalian. Dan apakah azab yang kekal yang akan menimpa diriku di akhirat atautkah menimpa kalian.

Dari ayat di atas dapat dipahami sebuah perintah untuk bekerja sesuai keadaan. Keadaan atau kondisi manusia diartikan sebagai semua atribut yang melekat pada manusia. Atribut itu bisa diartikan berupa keadaan, kemampuan, kelebihan, kebolehan, kelemahan, karakteristik, keterbatasan, kebutuhan, keahlian, bakat dan minat, potensi, *trait*, *fenotip*, dan sebagainya. Atribut itu bisa berupa fisik (seperti antropometri fisik, fisiologi tubuh, dan sebagainya) atau non fisik (antropometri non fisik/psikometri, psikologi, kecerdasan dan sebagainya). Ini artinya pekerjaan yang dilakukan harus sesuai (fit) dengan keadaan atau atribut manusia (Rusdimayanti, 2012:13). Jenis pekerjaan fisik yang menjadi

risiko kejadian CTS berupa jenis pekerjaan yang menuntut pekerja untuk melakukan gerakan tangan berulang-ulang, postur janggal dan pekerjaan mengenggam/menjepit secara intensif jelas saja bukanlah keadaan yang alamiah bagi pekerja.

Kejadian CTS lebih banyak terjadi pada wanita yang disebabkan beberapa faktor yang membuat wanita terlelah bagi wanita yang bekerja lebih berisiko akan sindrom ini. Sedangkan menurut pandangan Islam, mengenai hukum wanita yang bekerja adalah pada prinsipnya, Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya secara mandiri atau bersama-sama, dengan pihak swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama mereka dapat memelihara tuntutan agama, serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan itu terhadap diri dan lingkungannya. Bekerja dapat menjadi wajib bagi wanita, jika keadaan membutuhkannya, seperti jika seseorang akan melahirkan dan tidak ada bidan yang membantunya kecuali dia, atau dia selaku pekerja membutuhkannya, demi memelihara kelangsungan hidupnya atau hidup anak-anaknya (Shihab, 2008 dalam Fadhilah, 2011:32)

Dalam Al-qur'an terdapat banyak ayat yang menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi manusia laki-laki dan perempuan salah satunya terdapat pada QS. Al-Jumuah (62:10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Kementerian Agama RI, 2001:1489)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Tuhan sama sekali tidak membedakan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) dalam mencari anugerah (bekerja). Tuhan juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain. Al-qur'an juga mendesak kaum muslimin untuk tidak menahan hak orang lain (Fadhilah, 2011:32)


Tafsir Al-Azhar (Hamka, 1985:197) menjelaskan maksud dari ayat di atas adalah perintah bertebaranlah di muka bumi "*dan carilah karunia Allah*". Karena karunia Allah itu ada dimana-mana asal saja orang mau berusaha dan bekerja. Karunia dari bertani dan berladang, usaha dari menggembala dan beternak, usaha dari berniaga dan jual-beli, dan usaha dari macam-macam rezeki yang halal. "*Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya*" artinya kemana saja pun kamu, dimana saja pun, dalam suasana apa saja, jangan lupa kepada Allah. karena dengan selalu ingat kepada Allah akan dapatlah kita mengendalikan diri sehingga tidak terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. "*Supaya kamu memperoleh keberuntungan*". Keberuntungan yang utama bahwa segala apa yang diusahakan mendapat berkat Allah. Kalau mendapat rezeki, merupakan rezeki yang halal. di samping keuntungan benda, yang utama sekali ialah keberuntungan karena hilangnya kekacauan pikiran sebab perbuatan yang tidak halal.

K. Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dikemukakan, dapatlah diketahui bahwa faktor-faktor risiko terjadinya CTS adalah faktor pekerjaan

antara lain: gerakan berulang (Levy *et al.*, 2011; Silverstein *et al.*, 1987; Bernard, 1987; Humantech, 1995; Freivalder, 2004), pekerjaan menggenggam/menjepit (Levy *et al.*, 2011; Silverstein *et al.*, 1987; Armstrong *et al.*, 1993; Tarwaka *et al.*, 2004; Moore dan Garg, 1994; Freivalder, 2004), postur janggal (Levy *et al.*, 2011; Bernard 1997; Skie *et al.*, 1990; Armstrong *et al.*, 1991; Freivalder, 2004), dan getaran (Levy *et al.*, 2011; Bernard, 1997; Griffin, 2007; Suma'mur, 1995)

Faktor pekerja (individu) terbagi atas *diabetes mellitus* (Levy, *et al.*, 2011; Ginsberg, 2008), hipotiroidisme (Levy *et al.*, 2011; Ginsberg, 2008), obesitas (Levy *et al.*, 2011; Werner, 2004; Mollayousefi, 2008), *arthritis rheumatoid* (Levy *et al.*, 2011), umur (Levy *et al.*, 2011; Pakasi, 2005), dan jenis kelamin wanita (Levy *et al.*, 2011; Bureau, 1992)



L. Kerangka Konsep

1. Dasar Pemikiran Variabel

Salah satu gangguan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan tangan yang berlebihan serta bentuk pekerjaan fisik yang banyak mengeksploitasi tangan dan jari-jari dalam pekerjaan adalah kejadian CTS. Kejadian CTS merupakan dampak dari pekerjaan fisik seperti gerakan berulang, pekerjaan menggenggam/menjepit dengan kekuatan, dan postur janggal.

Faktor individu juga berpengaruh terhadap kejadian CTS, yaitu umur, obesitas, serta penyakit metabolik seperti *Diabetes mellitus*, *Arthritis rheumatoid*, dan hipotiroidisme.

a. Gerakan Berulang

Gerakan berulang dapat meningkatkan risiko CTS terlebih apabila frekuensi gerakan lebih dari 30 kali dalam semenit. Hal tersebut dikarenakan gerakan berulang dapat menyebabkan tekanan pada saraf medianus sehingga menyebabkan terjadinya CTS.

b. Pekerjaan Menggenggam/menjepit

Pekerjaan menggenggam/menjepit dengan mengerahkan kekuatan pada tangan dapat meningkatkan fleksor pada jari dan menyebabkan tekanan langsung pada terowongan karpal. Tekanan tersebut dapat menyebabkan CTS.

c. Postur Janggal

Postur janggal atau postur yang tidak alamiah pada pergelangan tangan dapat menyebabkan tekanan secara langsung pada saraf medianus yang merupakan penyebab CTS.

d. Umur

Umur berpengaruh terhadap kejadian CTS karena semakin bertambahnya umur seseorang maka cairan *synovial* yang ia miliki akan semakin berkurang sehingga dapat menyebabkan pembengkakan pada terowongan karpal dan dapat menyebabkan CTS.

e. Obesitas

Status gizi berpengaruh terhadap kejadian CTS karena kategori status gizi obesitas dapat menyebabkan peningkatan kandungan lemak terowongan karpal dan menyebabkan tekanan intrakarpal meningkat sehingga dapat menyebabkan CTS.

f. *Diabetes mellitus*


Diabetes mellitus berpengaruh terhadap kejadian CTS karena dapat menyebabkan saraf medianus menjadi sensitif terhadap tekanan sehingga tekanan pada pergelangan tangan seseorang yang menderita Diabetes, dapat berisiko terkena CTS.

g. *Arthritis rheumatoid*


Arthritis rheumatoid atau reumatik berpengaruh terhadap kejadian CTS karena menyebabkan pembengkakan pada sendi di jari atau pergelangan tangan yang dapat mempersempit ruang dalam terowongan karpal sehingga kejadian CTS lebih berisiko pada orang yang menderita reumatik.

2. Kerangka Konsep

Faktor Pekerjaan Fisik:



Faktor Pekerja (Individu):



: variabel yang diteliti

: variabel yang tidak diteliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu survei. Adapun penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dengan tujuan mengetahui karakteristik responden atau mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel tanpa adanya intervensi peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bogatama Marinusa yang terletak di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Jl. Kima Raya 2 Kav. N-4 B1 Makassar.

Pemilihan lokasi penelitian di PT. Bogatama Marinusa yaitu dengan pertimbangan jenis pekerjaan di industri ini merupakan pekerjaan yang berisiko terhadap kejadian *Carpal Tunnel Syndrome*. Selain itu, industri ini memiliki pekerja wanita lebih banyak daripada industri lainnya.

B. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Survei deskriptif dapat didefinisikan suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam bidang kesehatan masyarakat survei deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memotret masalah kesehatan serta yang terkait dengan kesehatan sekelompok penduduk atau orang yang tinggal dalam komunitas tertentu (Notoadmodjo, 2012:36)

C. Populasi Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pekerja wanita pada bagian produksi di PT. Bogatama Marinusa Makassar yaitu 409 pekerja yang terbagi ke dalam 7 unit kerja.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005: 79).

Adapun, penentuan besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti yaitu pertimbangan waktu, biaya, sarana dan tenaga. Saryono (2013:169) menjelaskan penentuan besar sampel dengan cara ini didasarkan pada persentase dari besarnya populasi. Teknik ini cocok dipakai pada penelitian survei, misalnya mengambil 5%, 10%, atau 20% atas pertimbangan tertentu. Bila populasi kurang 100 sebaiknya dicuplik 50% dari populasi, dan bila populasi beberapa ratus diambil 25% sampai 30%.

Berdasarkan teori di atas, dapatlah ditentukan besar sampel dalam penelitian ini yaitu:

$$409 \times 30\% = 122,7 \text{ atau } 123$$

Jadi, besar sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 123 orang pekerja. Adapun metode pemilihan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling*.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi jumlah gerakan berulang, observasi pekerjaan menggenggam/menjepit, observasi postur janggal, dan

indeks massa tubuh, diperoleh langsung dari responden yaitu 123 pekerja wanita di bagian produksi PT. Bogatama Marinusa Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi jumlah pekerja wanita, status kerja, dan profil perusahaan diperoleh dari bagian personalia PT. Bogatama Marinusa Makassar

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang akan diamati (Sugiyono, 2013: 117). Instrumen dalam penelitian ini yaitu:

1. *Stopwatch*, digunakan pada saat observasi gerakan berulang untuk mengukur rentang waktu 1 menit dalam menghitung jumlah gerakan serta digunakan untuk menghitung rentang waktu 60 detik dalam pelaksanaan tes *Phalen*.
2. Timbangan *seca*, digunakan untuk mengetahui berat badan responden untuk menghitung indeks massa tubuh
3. *Microtoise*, digunakan untuk mengetahui tinggi badan responden untuk menghitung indeks massa tubuh
4. Lembar observasi, digunakan pada saat observasi gerakan berulang, pekerjaan menggenggam/menjepit, dan postur janggal.
5. Tabel *checklist*, digunakan pada saat tes *Phalen* untuk mencatat gejala-gejala yang dirasakan responden
6. Kamera, digunakan untuk dokumentasi saat penelitian berlangsung.

F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen

1. Validasi

Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Jadi validitas suatu instrumen berhubungan dengan tingkat akurasi dari suatu alat ukur mengukur apa yang akan diukur.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan validasi yaitu timbangan dan *microtoise*. Timbangan *seca* yang digunakan dalam penelitian ini telah valid, dengan ketelitian 0,1 kg. *Microtoise* yang digunakan dalam penelitian ini juga telah valid dengan ketelitian 0,1 cm.

2. Reliabilitasi

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur. Instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2011:168).

Kedua instrument di atas juga telah reliabel untuk digunakan karena menghasilkan data yang sama walaupun digunakan berulang pada objek yang sama.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah menggunakan bantuan komputer dengan penggunaan program *Statistical Package for Social Sciences* 17.0 (SPSS 17.0) kemudian dianalisis dengan metode pengolahan analisis

univariat dan bivariat. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel berupa tabel distribusi dan frekuensi, kemudian dinarasikan secara deskriptif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Singkat

Sejak tahun 1986, perusahaan *parent* kami mulai keluar sebagai perusahaan akuakultur, memproduksi udang dari larva ke dewasa. Dengan lebih dari 15 tahun pengalaman dan profesionalisme memproduksi udang, perusahaan ini bergerak maju pada tahun 2001 dengan berdirinya PT. Bogatama Marinusa. Pabrik dibangun dengan teknologi terbaru pengolahan makanan sesuai dengan GMP, SSOP, IQMP berbasis *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) untuk jaminan kualitas dan prosedur yang tepat (Data Sekunder, 2014).

PT. Bogatama Marinusa adalah pabrik makanan yang memproduksi produk makanan udang beku dengan orientasi ke pasar ekspor. Perusahaan milik industry udang terpadu yang dimulai sebagai perusahaan akuakultur kembali pada tahun 1986. Seluruh operasi pabrik ini dibangun berdasarkan Standar Internasional (SI) prinsip *Good Manufacturing Practice* dan HACCP, dan memiliki reputasi yang luar biasa dalam industry untuk keunggulan dalam kualitas produk. Fasilitas Pabrik PT. Bogatama Marinusa Fasilitas-fasilitas yang ada di pabrik PT. Bogatama Marinusa, yaitu:

a. Potong Kepala (PK)

Potong kepala adalah proses pemotongan kepala dari bahan udang yang bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan bakteri pada tubuh udang di dalam PK (potong kepala), genjer tidak boleh pendek/gundul karena akan mempengaruhi rendement. Pada proses PK suhunya harus tetap terjaga.

Untuk menjaga agar suhu tetap stabil, maka di atas udang diberi es agar suhunya dapat terkontrol. Setelah melakukan proses potong kepala, udang dicuci dengan air bersih dengan suhu dan ozon 0,5- 1 ppm. Pada proses pencucian ini udang harus tercuci sampai bersih, agar tidak terjadi kontaminasi pada proses berikutnya. Bahan datang dari PK dianalisa oleh *checker* untuk menentukan *setting size* berdasarkan “OM PPIC” agar bisa digunakan panduan untuk *setting* mesin *grade*.

b. Sortasi

1) Sortasi Warna

Sortasi warna adalah proses pemisahan udang sesuai dengan warnanya. Dalam sortasi warna pada dasarnya ada tiga warna yaitu *black* (hitam), *blue* (biru), dan *white* (putih) yang harus dibedakan dengan tujuan untuk mempertinggi nilai artistiknya. Meskipun kualitas udang lebih penting, akan tetapi dari segi keindahan susunan dan keseragaman warna juga sangat berperan dalam menarik minat konsumen (Haryadi, 1994 dalam Ekawati, 2013:

56)

2) Sortasi Ukuran

Sortasi ukuran adalah suatu cara penyortiran udang berdasarkan ukuran. Sortasi dilakukan sesuai dengan jumlah udang untuk setiap *pound*. Pada tahap ini udang selalu dipertahankan pada kondisi dingin yaitu dengan cara member es cuari pada udang yang sedang disortir.

3) Sortasi Final

Sortasi final dilakukan untuk mengoreksi hasil sortasi yang belum seragam baik mutu, ukuran, dan warna. Untuk pengecekan dilakukan per 1 *pound* dengan timbangan. Bila jumlah udang sudah sesuai dengan jumlah standar pada daftar, maka proses penanganan dapat dilanjutkan.

c. *Value Added Product* (VAP)

Value Added Product (VAP) yaitu produk udang beku yang mendapat perlakuan tambahan. Udang yang diproduksi sebagai produk VAP adalah udang ukuran 21 dan 31. Produk VAP ada dua jenis, yaitu:

- 1) VAP *belly cut* (BC) yaitu produk udang beku yang dikupas dan disisakan satu ruas di dekat ekor kemudian dipijit dan diluruskan.
- 2) VAP *non belly cut* (NBC) yaitu produk udang beku yang dikupas, tetapi tidak dipijit dan diluruskan, hanya dibuang ususnya.

d. Pemberian Tepung (*Breaded*)

Udang dari VAP kemudian dibawa ke bagian *breaded*. Sebelum diberikan tepung udang terlebih dahulu dicuci sebanyak dua kali setelah itu dilakukan pengeringan. Udang yang sudah kering barulah dilumuri tepung.

e. Pengawetan (*Block*)

Apabila perusahaan tidak mendapatkan penawaran dari pasar, maka udang ditempatkan di bagian pengawetan sampai ada tawaran dari pasar. Pembekuan udang sering dilakukan dengan menggunakan *contact plate freezer* dan *air blast freezer* bila udang dibekukan dalam bentuk blok. Apabila udang blok dibekukan secara individu bisa menggunakan

individual quick freezer. Setelah dibekukan, udang harus di *glazing* atau diberi lapisan es tipis sehingga permukaan udang beku atau blok tampak mengkilat.

Adapun *glazing* dilakukan dengan cara menyiram atau mencelupkan udang beku dalam air bersuhu 0-5 °C. Setelah di-*glazing*, kemudian udang dikemas dan disimpan dalam gudang beku (*cold storage*).

f. *Finish Product* (Pengemasan)

Pengemasan adalah suatu cara untuk melindungi dan mengawetkan produk pangan maupun non pangan, pengemasan juga merupakan penunjang untuk transportasi, distribusi, dan merupakan bagian penting dari usaha untuk mengatasi persaingan dalam pemasaran.

Dalam keadaan beku produk dapat mengalami perubahan, untuk mencegah pengeringan, oksidasi dan diskolorisasi maka produk harus dilindungi antara lain dengan cara:

- 1) Penggelasan (*glazing*) dengan cara melapisi produk beku dengan film es menyelubungi produk.
- 2) Mengepak produk dengan bahan-bahan kedap air (*water proof*), kedap oksigen (*oksigen proof*), dan tidak menghimpun lemak atau mengepak vakum (*vacuum packaging*).

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Distribusi umur responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1
Distribusi Responden Menurut Umur Pekerja Wanita Bagian Produksi
PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Umur	Frekuensi	Persentase %
17-25 tahun	66	53,7
26-35 tahun	40	32,5
35-45 tahun	17	13,8
Total	123	100

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada kelompok umur 17-25 tahun sebanyak 66 orang (53,7%) sedangkan persentase terendah pada kelompok umur 34-45 tahun sebanyak 17 orang (13,8%).

b. Jenis Kelamin

Pada penelitian ini keseluruhan responden yaitu 123 orang pekerja berjenis kelamin wanita.

c. Unit Kerja

Distribusi pembagian unit kerja responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.2
Distribusi Responden Menurut Unit Kerja Pekerja Wanita Bagian
Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Unit Kerja	Frekuensi (n)	Persentase %
Receiving	9	7,3
Sortasi	14	11,4
Breaded	17	13,8
VAP (kupas)	9	7,3
Cook	22	17,9
Potong Kepala	23	18,7
Block	10	8,1
Stamp	7	5,7
Pengepakan	12	9,8

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada kelompok unit kerja Potong Kepala sebanyak 23 orang (18,7%)

sedangkan persentase terendah pada kelompok unit kerja Stamp sebanyak 7 orang (5,7%).

d. Masa Kerja

Distribusi masa kerja responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.3

Distribusi Responden Menurut Masa Kerja Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Masa Kerja	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1-5 tahun	87	70,7
6-10 tahun	29	23,6
>10 tahun	7	5,7

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada kelompok masa kerja 1-5 tahun sebanyak 87 orang (70,07%) sedangkan persentase terendah pada kelompok masa kerja >10 tahun sebanyak 7 orang (5,7%).

e. Status Pekerja

Distribusi umur responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.4

Distribusi Responden Menurut Status Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Status Pekerja	Frekuensi	Persentase %
Harian Tetap	27	21,95
Harian Lepas	47	38,21
Borongan	49	39,83

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada kelompok status pekerja borongan sebanyak 57 orang (22%) sedangkan persentase terendah pada kelompok status pekerja harian tetap sebanyak 27 orang (22%).

2. Analisis Univariat

a. Gerakan Berulang

Distribusi yang bekerja dengan gerakan berulang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.5

Distribusi Responden Menurut Gerakan Berulang Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Gerakan Berulang	Jumlah	Persentase %
Berisiko	49	39,8
Tidak berisiko	74	60,2
Total	123	100

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa persentase responden yang melakukan gerakan berulang tidak berisiko yaitu 74 orang (60,2%) lebih banyak dibandingkan yang melakukan gerakan berulang berisiko yaitu 49 orang (39,8%).

b. Pekerjaan Menggenggam atau Menjepit

Distribusi pekerjaan menggenggam atau menjepit responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.6

Distribusi Responden Menurut Pekerjaan Menggenggam atau Menjepit Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Pekerjaan Menggenggam atau Menjepit	Jumlah	Persentase %
Berisiko	17	13,8
Tidak Berisiko	106	86,2
Total	123	100

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa persentase responden yang tidak melakukan pekerjaan menggenggam atau menjepit yaitu 106 orang (86,2%) lebih banyak dibandingkan responden dengan pekerjaan menggenggam atau menjepit yaitu 17 orang (13,8%).

c. Postur Janggal

Distribusi responden yang bekerja dengan postur janggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.7

Distribusi Responden Menurut Postur Janggal Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Postur Janggal	Jumlah	Persentase %
Berisiko	50	40,7
Tidak Berisiko	73	59,3
Total	123	100

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa persentase responden yang tidak melakukan postur janggal yaitu 73 orang (59,3%) lebih banyak dibandingkan responden dengan postur janggal berisiko yaitu 50 orang (40,7%).

d. Umur

Distribusi umur responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.8

Distribusi Responden Menurut Umur Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Umur	Frekuensi	Persentase %
17-25 tahun	66	53,7
26-35 tahun	40	32,5
35-45 tahun	17	13,8
Total	123	100

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada kelompok umur 17-25 tahun sebanyak 66 orang (53,7%) sedangkan persentase terendah pada kelompok umur 34-45 tahun sebanyak 17 orang (13,8%).

e. Obesitas

Distribusi responden dengan obesitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.9

Distribusi Responden Menurut Obesitas Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Status Obesitas	Jumlah	Persentase %
Berisiko	0	0
Tidak Berisiko	123	100
Total	123	100

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa persentase responden tidak obesitas yaitu 123 orang (100%) atau dapat dikatakan seluruh responden tidak mengalami obesitas.

f. Riwayat *Diabetes Mellitus*

Distribusi riwayat *Diabetes mellitus* berdasarkan pengakuan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.10

Distribusi Responden Menurut Riwayat *Diabetes mellitus* Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Riwayat <i>Diabetes mellitus</i>	Jumlah	Persentase %
Ya	16	13
Tidak	107	87
Total	123	100

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa persentase responden yang mengaku tidak memiliki riwayat *Diabetes mellitus* yaitu 107 orang (87%) lebih banyak dibandingkan responden yang memiliki riwayat *Diabetes mellitus* yaitu 16 orang (13%).

g. Riwayat *Arthritis Rheumatoid*

Distribusi riwayat *Arthritis Rheumatoid* berdasarkan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.11

Distribusi Responden Menurut Riwayat *Arthritis Rheumatoid* Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Riwayat <i>Arthritis Rheumatoid</i>	Jumlah	Persentase %
Ya	4	3,3
Tidak	119	96,7
Total	123	100

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa persentase responden yang mengaku tidak memiliki riwayat *Arthritis Rheumatoid* yaitu 119 orang (96,7%) lebih banyak dibandingkan responden yang memiliki riwayat *Arthritis Rheumatoid* yaitu 4 orang (3,3%).

h. *Carpal Tunnel Sindrom* (CTS)

Distribusi risiko *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) responden berdasarkan hasil tes *Phalen* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.12

Distribusi Responden Menurut *Carpal Tunnel Syndrome* Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

<i>Carpal Tunnel Syndrome</i>	Jumlah	Persentase %
Berisiko	45	36,58
Tidak Berisiko	78	63,42
Total	123	100

Sumber: Data primer 2014

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa persentase responden tidak berisiko *Carpal Tunnel Syndrome* yaitu 78 orang (63,4%) lebih banyak dibandingkan responden berisiko *Carpal Tunnel Syndrome* yaitu 45 orang (36,6%).

3. Analisis Bivariat

1. Gerakan Berulang dengan *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)

Distribusi risiko kejadian CTS berdasarkan gerakan berulang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Distribusi *Carpal Tunnel Syndrome* Berdasarkan Gerakan Berulang
Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa
Tahun 2014

Gerakan Berulang responden	<i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS)				Jumlah	
	Berisiko		Tidak Berisiko		n	%
	n	%	n	%		
Berisiko	20	16,26	29	23,57	49	39,83
Tidak Berisiko	25	20,32	49	39,83	74	60,16
Total	45	36,58	78	63,42	123	100

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.13 diperoleh responden yang tidak melakukan gerakan berulang berisiko dan tidak memiliki risiko CTS yaitu 49 orang (39,83%), lebih banyak dibandingkan responden dengan gerakan berulang berisiko dan memiliki risiko CTS yaitu 20 orang (16,26%)

2. Pekerjaan Menggenggam atau Menjepit dengan *Carpal Tunnel Syndrome*
Distribusi risiko kejadian CTS berdasarkan pekerjaan menggenggam atau menjepit yang dilakukan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Distribusi *Carpal Tunnel Syndrome* Berdasarkan Pekerjaan Menggenggam atau Menjepit Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa
Tahun 2014

Pekerjaan Menggenggam atau Menjepit Responden	<i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS)				Jumlah	
	Berisiko		Tidak Berisiko		n	%
	n	%	n	%		
Berisiko	12	9,75	5	4,06	17	13,82
Tidak Berisiko	33	26,82	73	59,34	106	86,17
Total	45	36,58	78	63,42	123	100

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.14 diperoleh hasil responden yang tidak melakukan pekerjaan menggenggam atau menjepit dan tidak memiliki risiko CTS yaitu 73 orang (59,34%) lebih banyak dibandingkan responden yang melakukan pekerjaan menggenggam atau menjepit dan tidak memiliki risiko CTS yaitu 5 orang (4,06%).

3. Postur Janggal dengan *Carpal Tunnel Syndrome*

Distribusi risiko kejadian CTS berdasarkan postur janggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Distribusi *Carpal Tunnel Syndrome* Berdasarkan Postur Janggal Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Postur Janggal Responden	<i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS)				Jumlah	
	Berisiko		Tidak Berisiko		n	%
	n	%	n	%		
Berisiko	19	15,44	31	25,2	50	40,65
Tidak Berisiko	26	21,13	47	38,21	73	59,34
Total	45	36,58	78	63,42	123	100

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.15 diperoleh hasil responden yang tidak melakukan pekerjaan dengan postur janggal dan memiliki risiko CTS yaitu 47 orang (38,21%) lebih banyak dibandingkan responden yang melakukan pekerjaan dengan postur janggal dan memiliki risiko CTS yaitu 19 orang (15,44%).

4. Umur dengan *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)

Distribusi risiko kejadian CTS berdasarkan umur responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Distribusi *Carpal Tunnel Syndrome* Berdasarkan Umur Pekerja Wanita
Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Umur responden (tahun)	<i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS)				Jumlah	
	Berisiko		Tidak Berisiko		n	%
	n	%	n	%		
17-25 tahun	19	15,4	47	38,2	66	53,65
26-35 tahun	16	13,08	24	19,5	40	32,52
36-45 tahun	10	8,10	7	5,60	17	13,82
Total	45	36,58	78	63,42	123	100

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.16 diperoleh hasil responden dengan umur 17-25 tahun dan tidak memiliki risiko CTS yaitu 47 orang (38,2%) lebih banyak dibandingkan responden dengan umur 36-45 tahun dan tidak memiliki risiko CTS yaitu 7 orang (5,6%).

5. Obesitas dengan *Carpal Tunnel Syndrome*

Distribusi risiko kejadian CTS berdasarkan obesitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Distribusi *Carpal Tunnel Syndrome* Berdasarkan Obesitas Pekerja
Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Obesitas	<i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS)				Jumlah	
	Berisiko		Tidak Berisiko		n	%
	n	%	n	%		
Berisiko	0	0	0	0	0	0
Tidak Berisiko	45	36,58	78	63,42	73	63,42
Total	45	36,58	78	63,42	123	100

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.17, diperoleh hasil tidak terdapat responden yang obesitas. Responden yang tidak obesitas dan memiliki risiko CTS yaitu 45 orang (36,58%) dan yang tidak memiliki risiko CTS yaitu 78 orang (63,42%).

6. Riwayat *Diabetes mellitus* dengan *Carpal Tunnel Syndrome*

Distribusi risiko kejadian CTS berdasarkan riwayat *Diabetes mellitus* responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18

Distribusi *Carpal Tunnel Syndrome* Berdasarkan Riwayat *Diabetes mellitus* Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Riwayat <i>Diabetes mellitus</i>	<i>Carpal Tunnel Syndrome</i> (CTS)				Jumlah	
	Berisiko		Tidak Berisiko		n	%
	n	%	n	%		
Berisiko	9	7,30	7	5,69	16	13,01
Tidak Berisiko	36	29,26	71	57,72	107	86,99
Total	45	36,58	78	63,42	123	100

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.18 diperoleh responden yang mengaku tidak memiliki riwayat *Diabetes mellitus* dan tidak memiliki risiko CTS yaitu 71 orang (57,72%) lebih banyak dibandingkan responden yang mengaku tidak memiliki riwayat *Diabetes mellitus* dan tidak memiliki risiko CTS yaitu 7 orang (5,69%).

7. Riwayat *Arthritis Rheumatoid* dengan *Carpal Tunnel Syndrome*

Distribusi risiko kejadian CTS berdasarkan *Arthritis Rheumatoid* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Distribusi *Carpal Tunnel Syndrome* Berdasarkan Riwayat *Arthritis Rheumatoid* Pekerja Wanita Bagian Produksi PT. Bogatama Marinusa Tahun 2014

Riwayat <i>Arthritis Rheumatoid</i>	<i>Carpal Tunnel Syndrome (CTS)</i>				Jumlah	
	Berisiko		Tidak Berisiko		n	%
	n	%	n	%		
Berisiko	3	2,43	1	0,81	4	3,25
Tidak Berisiko	42	34,14	77	62,6	119	96,75
Total	45	36,58	78	63,42	123	100

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.19 diperoleh hasil responden yang mengaku tidak memiliki riwayat *Arthritis Rheumatoid* dan yang tidak memiliki risiko CTS yaitu 77 orang (62,6%) lebih banyak dibandingkan responden yang mengaku memiliki riwayat *Arthritis Rheumatoid* tetapi tidak memiliki risiko CTS yaitu sebanyak 1 orang (0,81%)

C. Pembahasan

Setelah dilakukan analisis data terhadap 123 responden pada pekerja wanita bagian produksi PT. Bogatama Marinusa Makassar Tahun 2014 maka hasil dari analisis tersebut masing-masing akan dibahas sebagai berikut:

1. Gerakan Berulang

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 20 (16,26%) responden dengan gerakan berulang berisiko yang memiliki risiko CTS dari 49 responden (39,83%) yang melakukan pekerjaan dengan gerakan berulang berisiko. Hal ini dapat terjadi karena pekerja tersebut selain melakukan pekerjaan dengan gerakan berulang mereka melakukan pekerjaan dengan menggenggam atau menjepit, ataupun melakukan pekerjaan dengan postur janggal saat bekerja. Seperti pada unit cook dan VAP (kupas) para pekerja

menggunakan alat bantu genggam berupa pisau serta pada unit breaded, sortasi, dan potong kepala para pekerja melakukan pekerjaan dengan gerakan cepat dan berulang disertai dengan postur janggal yaitu fleksi, ekstensi, dan deviasi ulnar.

Pada dasarnya jenis pekerjaan di PT. Bogatama Marinusa pada beberapa unit kerja terutama pada bagian sortasi, kupas, potong kepala, breaded, dan block banyak menuntut pekerja melakukan gerakan berulang secara terus menerus. Selain itu pada unit-unit tersebut, tangan pekerja terpapar dengan suhu dingin dari es batu curai yang digunakan untuk menjaga suhu udang yang sedang diproses ditambah dengan rendahnya suhu ruangan yaitu 16-18°C pada unit sortasi, kupas (VAP), potong kepala (PK), dan breaded serta -16°C pada unit block (Ekawati, 2013: 61). Rasa dingin dari es batu diakui tetap dirasakan oleh pekerja meskipun mereka menggunakan hingga 3 lapis sarung tangan karet.

Simoneau *et al* (1996) mengungkapkan paparan dingin merupakan faktor risiko yang dapat berkontribusi dalam pengembangan WMSDs (*Work-related Musculoskeletal Disorders*). Dingin dapat berperan langsung dalam meningkatkan beban otot bagian atas. Diketahui dengan baik bahwa dingin dapat mengurangi keterampilan dan kekuatan tangan untuk pekerjaan manual, oleh karena itu mengerjakan pekerjaan dengan tangan akan lebih sulit dalam kondisi dingin.

Terdapat 29 responden (23,57%) dengan gerakan berulang namun tidak memiliki risiko CTS karena sebagian besar pekerja yang memiliki risiko CTS memiliki masa kerja yang lebih lama dibandingkan dengan responden yang melakukan gerakan berulang berisiko namun memiliki

masa kerja yang lebih singkat. Pekerja dengan gerakan berulang dan memiliki masa kerja yang lebih lama lebih terampil dan gesit dalam melakukan pekerjaan sehingga frekuensi gerakan berulang yang mereka lakukan lebih tinggi. Gerakan berulang dengan masa kerja yang lebih lama akan meningkatkan tekanan pada terowongan karpal. Penekanan pada terowongan karpal akan menimbulkan kerusakan baik *reversibel* maupun *irreversibel*. Peningkatan intensitas dan durasi yang cukup lama, akan mengurangi aliran darah pada pembuluh tepi. Dalam jangka waktu yang lama aliran darah akan berpengaruh pada sirkulasi kapiler dan akhirnya berdampak pada peremabilitas pembuluh darah pada pergelangan tangan. Itulah mengapa sebagian besar responden dengan masa kerja yang lebih lama diketahui memiliki risiko CTS dibandingkan responden dengan gerakan berulang berisiko namun memiliki masa kerja yang lebih singkat.

Kurniawan (2008, dalam Pratiwi, 2013) mengemukakan seseorang yang bekerja dengan melakukan gerakan berulang pada tangan dan pergelangan tangan merupakan aktivitas kerja berulang yang melibatkan gerakan tangan atau pergelangan tangan atau jari-jari adalah suatu faktor risiko CTS yang memiliki pengaruh terhadap faktor kerja fisik. Semakin tinggi frekuensi gerakan berulang maka semakin tinggi risiko terjadinya CTS.

Pada penelitian yang dilakukan Pratiwi, dkk (2013:144) pada pekerja pembersih kulit bawang didapatkan data bahwa pada responden dengan gerakan berulang >30 kali permenit yang mengalami CTS sebanyak 29 orang (50,9%) dari 57 responden. Para pekerja pembersih kulit bawang

tersebut melakukan pekerjaan 6-8 jam perhari dengan gerakan berulang-ulang serta dengan postur ekstensi, fleksi, dan pronasi pada tangan.

Pada penelitian yang dilakukan Merijanti (2005:22) pada pekerja wanita di pabrik pengolahan makanan menunjukkan pekerja dengan gerakan berulang tinggi yaitu > 1200 gerakan per jam mempunyai risiko lima kali lebih besar terhadap CTS bila dibandingkan dengan yang rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan gerakan berulang merupakan faktor risiko yang memiliki hubungan bermakna dengan kejadian CTS.

Sebagai manusia sebaiknya kita melakukan kontrol dan berhati-hati dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, termasuk gerakan berulang yang berisiko dalam bekerja. Allah swt. memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya dan berhati-hati dari segala perbuatan. Jika kita berpaling dari ketaatan tersebut maka Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diamanahkan Allah dengan terang dan gamblang. Maka semua itu akan ada balasannya kelak (Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuti, 2003:471) seperti yang terdapat dalam QS. al-Maidah/5:92

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

Terjemahannya:

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang” (Kementerian Agama RI, 2001:323)

2. Pekerjaan Menggenggam atau Menjepit

Pada penelitian ini dari hasil observasi didapatkan responden dengan pekerjaan menggenggam atau menjepit yang tidak memiliki risiko CTS yaitu sebanyak 5 orang (4,06%) sedangkan responden yang tidak melakukan pekerjaan menggenggam atau menjepit dan memiliki risiko CTS yaitu sebanyak 33 orang (26,82%).

Berdasarkan teori yang dikemukakan Tarwaka (2004, dalam Nurhikmah, 2011:46) terjadinya tekanan langsung pada jaringan lunak sebagai contoh, pada saat tangan harus memegang alat, maka jaringan otot tangan yang lunak akan menerima tekanan langsung dari pegangan alat, dan apabila hal ini sering terjadi, dapat menimbulkan rasa nyeri otot yang menetap.

Hasil penelitian ini menunjukkan hanya terdapat 17 orang (13,82%) responden yang melakukan pekerjaan menggenggam atau menjepit dan hanya 12 responden (9,75%) diantaranya yang memiliki risiko CTS berdasarkan tes *Phalen*. Hal ini dikarenakan hanya di beberapa unit yang memerlukan pekerjaan dengan alat bantu genggam yaitu pada unit VAP (kupas), dan Cook dimana alat bantu genggam yang paling banyak digunakan yaitu pisau. Adapun bagi pekerja yang melakukan pekerjaan menggenggam atau menjepit namun tidak memiliki risiko CTS saat dilakukan tes *phalen* dapat dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan tangan saat melakukan pekerjaan menggenggam atau menjepit yang lebih tinggi bagi pekerja yang memiliki risiko CTS .

3. Postur Janggal

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 19 orang (15,44%) responden dengan postur janggal memiliki risiko CTS. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan di bagian produksi terutama pada bagian sortasi banyak melakukan pekerjaan dengan postur deviasi ulnar, pada bagian breaded banyak melakukan pekerjaan dengan postur ekstensi, dan pada bagian potong kepala banyak melakukan pekerjaan dengan postur fleksi.

Terdapat 31 orang (25,02%) responden dengan postur janggal namun tidak memiliki risiko CTS. Hal ini dapat dipengaruhi oleh derajat postur tangan/pergelangan tangan mereka bervariasi. Merijanti (2005) mengemukakan postur fleksi dan ekstensi tangan/pergelangan tangan yang melebihi 45° dapat menyebabkan tekanan secara langsung pada saraf medianus sehingga apabila dilakukan terus-menerus dapat menimbulkan terjadinya CTS. Pendapat ini memperkuat perbedaan jenis postur dan derajat postur janggal responden berpengaruh terhadap risiko kejadian CTS.

Beberapa pekerja yang tidak melakukan pekerjaan dengan postur janggal (21,13%) namun memiliki risiko CTS dapat terjadi karena dipengaruhi faktor pekerjaan fisik lain seperti gerakan berulang dan pekerjaan menggenggam/menjepit yang dilakukan oleh pekerja tersebut.

Penelitian yang dilakukan Suherman, dkk (2012:8) pada petugas rental computer mengemukakan frekuensi posisi tangan saat mengetik berhubungan dengan kejadian CTS. Perwujudan pekerjaan mengetik dalam pelaksanaannya dimana melakukan aktivitas dengan menggunakan gerakan berulang-ulang yang berlangsung secara terus-menerus dengan postur

ekstensi yang statis dan posisi kerja yang tidak ergonomis yang dapat menyebabkan CTS.

4. Umur

Pada hasil penelitian ini didapatkan responden dengan risiko CTS pada usia 17-25 tahun yaitu sebanyak 19 orang (15,4%), pada usia 26-35 tahun sebanyak 16 orang (13,08%) dan pada usia 36-45 tahun yaitu 10 orang (8,7%).

Risiko kejadian CTS lebih banyak ditemukan pada responden dengan usia 17-25 tahun yaitu 19 orang (15,4%) responden. Hal tersebut dikarenakan sebaran responden terbanyak berada pada usia tersebut yaitu 66 orang (53,65%). Selain itu, perusahaan memang sangat banyak menerima pekerja dengan usia muda sehingga sebagian besar pekerja berada pada kisaran usia tersebut.

Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan fisik yang dimiliki pekerja dengan usia muda lebih optimal sehingga dapat bekerja dengan lebih cepat dan gesit sehingga berdampak pada gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja tersebut mempengaruhi peningkatan risiko kejadian CTS. Terlebih jika dibandingkan dengan pekerja dengan usia yang lebih tua karena mengalami penurunan kemampuan fisik. Kurniawan, dkk (2008) mengemukakan kemampuan fisik seseorang dicapai pada saat usianya antara 25-30 tahun, dan kapasitas fisiologis seseorang akan menurun 1% per tahunnya setelah kondisi puncaknya terlampaui.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat Griffith (1982 dalam Kurniawan, dkk, 2008:35) bahwa CTS lebih sering dialami oleh wanita berusia 29-62 tahun. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan

Atrosi (1999 dalam Bahrudin, 2011:5) bahwa CTS lebih sering mengenai wanita daripada pria dengan usia berkisar 25-64 tahun.

Pada penelitian yang dilakukan Suherman, dkk (2012) proporsi CTS lebih banyak ditemukan pada responden yang mempunyai kisaran umur 25-34 tahun (89.2%), dibandingkan dengan responden dengan umur ≤ 24 tahun (28.6%). Penelitian ini menunjukkan kategori umur berhubungan dengan kejadian CTS. Umur salah satu resiko yang berkaitan erat dengan kejadian CTS, hal tersebut disebabkan karena semakin tuanya seseorang cairan *synovial* akan berkurang sehingga bisa menyebabkan pembengkakan pada bagian persendian (Darwono, 2001 dalam Suherman, dkk, 2012)

5. Obesitas

Hasil penelitian ini menunjukkan dari 123 orang responden tidak terdapat pekerja yang mengalami obesitas. Namun, 45 orang (36,58%) responden memiliki risiko CTS. Hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya CTS bagi pekerja yang tidak mengalami obesitas, diantaranya faktor pekerjaan seperti gerakan berulang, pekerjaan menggenggam atau menjepit, dan postur janggal serta dipengaruhi oleh riwayat penyakit metabolik seperti Diabetes dan Reumatik yang dimiliki oleh responden tersebut .

Levy, *et al* (2011:349) menyatakan bahwa obesitas merupakan faktor risiko terjadinya CTS karena dapat menyebabkan penimbunan lemak atau cairan yang dapat menimbulkan penyempitan pada terowongan karpal.

Penelitian yang dilakukan Merijanti (2005) terdapat 7 orang (17,1%) dari 11 orang (20,8%) dengan kategori gemuk yang memiliki risiko CTS. Hasil analisis statistik menunjukkan faktor IMT terbukti mempunyai

hubungan dengan STK, responden yang bertubuh gemuk mempunyai risiko lima kali lebih besar untuk terjadinya STK bila dibandingkan dengan yang kurus dan normal.

6. Riwayat *Diabetes mellitus*

Hasil penelitian ini menunjukkan dari 16 orang (13,0%) responden yang mengaku memiliki riwayat Diabetes terdapat 9 orang (7,3%) responden yang memiliki risiko CTS. Menurut teori yang dikemukakan Ginsberg (2008) yang mengemukakan *Diabetes mellitus* dapat mengakibatkan neuropati perifer yang dapat mempunyai beberapa bentuk salah satunya neuropati akibat jepitan, misalnya pada sindrom terowongan karpal. Diabetes dapat menyebabkan saraf menjadi sensitif terhadap tekanan. Seseorang dengan diabetes mempunyai risiko yang lebih besar untuk terkena CTS apabila terjadi tekanan pada terowongan karpal.

Terdapat 7 orang (5,69%) responden yang mengaku memiliki riwayat Diabetes namun tidak memiliki risiko CTS dapat dipicu oleh kadar glukosa dalam darah responden tersebut yang bisa jadi sedang dalam keadaan normal pada saat penelitian berlangsung. Namun tidak dilakukan pengukuran lebih jauh mengenai kadar glukosa responden pada penelitian ini.

Pada penelitian yang dilakukan Kurniawan, dkk (2008) pada wanita pemetik melati terdapat 77,8% responden dengan faktor kesehatan berisiko (diabetes, reumatik, fraktur pada tangan, dan obesitas) yang memiliki risiko CTS. Namun dari hasil analisis statistik diketahui bahwa tidak ada hubungan antara faktor kesehatan (riwayat Diabetes, reumatik, fraktur pada tangan, dan obesitas) dengan kejadian CTS karena beberapa

responden dengan kondisi kesehatan berisiko tidak terdiagnosis menderita CTS. Dalam penelitian tersebut diketahui hasil tersebut dikarenakan responden hanya menyimpulkan sendiri bahwa mereka menderita salah satu penyakit yang berisiko CTS tanpa adanya diagnose medis.

7. Riwayat *Arthritis Rheumatoid*

Pada penelitian ini didapatkan responden yang mengaku memiliki riwayat *Arthritis Rheumatoid* dan memiliki risiko CTS berdasarkan tes *phalen* yaitu sebanyak 3 orang (2,4%), dan responden dengan riwayat *Arthritis Rheumatoid* yang tidak memiliki risiko CTS yaitu sebanyak 1 orang (0,81%) sedangkan responden yang tidak memiliki riwayat *Arthritis Rheumatoid* dan memiliki risiko CTS yaitu sebanyak 42 orang (34,1%).

Terdapat responden dengan riwayat reumatik yang tidak memiliki risiko CTS saat dilakukan tes *phalen* dapat terjadi karena pekerja tersebut tidak melakukan pekerjaan fisik yang berisiko. Adapun responden yang tidak memiliki riwayat reumatik namun memiliki risiko CTS saat dilakukan tes *phalen* dapat terjadi karena faktor pekerjaan fisik yang dilakukan oleh para responden tersebut.

Menurut Kurniawan, dkk (2008) *Arthritis rheumatoid* dapat menyebabkan munculnya CTS jika terjadi pembengkakan pada sendi di jari atau pergelangan tangan dan penebalan *tenosynovium* yang akan mempersempit ruang dalam terowongan karpal sehingga seseorang dengan riwayat *Arthritis Rheumatoid* memiliki risiko kejadian CTS yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa risiko kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) menggunakan tes *Phalen* pada pekerja wanita di bagian produksi PT. Bogatama Marinusa dimiliki 36,58% responden dengan faktor-faktor risiko yaitu:

1. Pekerjaan dengan gerakan berulang dilakukan sebanyak 39,83% responden, 16,26% responden diantaranya memiliki risiko CTS. Pada industri ini pekerjaan dengan gerakan cepat dan berulang terdapat hampir di seluruh unit produksi sehingga jenis pekerjaan ini sulit untuk dihindari. Gerakan berulang merupakan faktor risiko yang berada di urutan pertama yang menjadi pemicu kejadian CTS di industri ini karena paling banyak dilakukan oleh pekerja yang memiliki risiko CTS dibandingkan dengan faktor risiko lainnya.
2. Dalam penelitian ini pekerjaan menggenggam atau menjepit dilakukan sebanyak 13,82% responden, 9,75% responden diantaranya memiliki risiko CTS. Pada industri ini pekerjaan menggenggam atau menjepit dilakukan paling banyak saat akan mengolah udang menjadi produk makanan dengan alat bantu genggam yang paling banyak digunakan yaitu pisau.
3. Postur janggal pada tangan saat bekerja dilakukan sebanyak 15,44% responden yang memiliki risiko CTS dengan postur yang paling banyak dilakukan yaitu postur fleksi pada unit potong kepala (PK), ekstensi pada unit breaded dan pengepakan, serta deviasi ulnar pada unit sortasi.

4. Kisaran umur yang paling banyak memiliki risiko kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) yaitu 17-25 tahun sebanyak 15,4% responden dan yang paling sedikit memiliki risiko *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) pada kisaran umur 36-45 tahun yaitu 8,1% responden.
5. Tidak terdapat pekerja dengan obesitas dalam penelitian ini.
6. Pekerja dengan riwayat *Diabetes mellitus* yang memiliki risiko *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) sebanyak 7,3% responden. Tidak diketahui kondisi kadar glukosa responden pada saat penelitian berlangsung yang apabila dalam keadaan normal maka akan mempengaruhi hasil pengukuran tes *phalen*.
7. Pekerja dengan riwayat *Arthritis rheumatoid* yang memiliki risiko *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) sebanyak 2,43%. Keadaan reumatik akan meningkatkan risiko CTS apabila dipadukan dengan risiko pekerjaan fisik yang dilakukan responden.

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi pekerja yang mengalami keluhan *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) sebaiknya mempunyai inisiatif untuk melaporkan keluhan mereka kepada Poliklinik perusahaan agar keluhan mereka segera ditindak-lanjuti
2. Bagi pekerja, sebagai upaya pencegahan sebaiknya para pekerja agar sesekali melakukan istirahat pendek atau istirahat curian mengingat gerakan cepat dan berulang sangat dibutuhkan pada pabrik ini, tidak dimungkinkan untuk memperlakukan rotasi kerja karena risiko ini terdapat hampir di seluruh unit kerja.
3. Bagi perusahaan sebaiknya mengupayakan modifikasi tata ruang kerja sehingga para pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan lebih natural

untuk menghindari postur janggal dalam bekerja serta agar tidak semua pekerjaan dilakukan dengan posisi berdiri

4. Bagi perusahaan sebaiknya mengupayakan penggunaan alat yang ergonomis bagi pekerja, penggunaan alat kerja seperti pisau yang lebih tajam untuk mengurangi beban kerja dan risiko pekerjaan menggenggam atau menjepit selama proses pekerjaan.
5. Meskipun tidak mengalami obesitas, setiap pekerja sebaiknya mengupayakan sikap kerja yang ergonomis untuk mengurangi risiko kejadian CTS.
6. Bagi pekerja yang mempunyai riwayat kesehatan yang berisiko sebaiknya mengurangi pekerjaan yang menjadi risiko CTS.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Waktu untuk berinteraksi dengan responden sangat singkat karena diizinkan hanya pada saat jam istirahat berlangsung. Mengingat penelitian dilakukan di bulan Ramadhan, sebagian besar responden mempergunakan waktu istirahat untuk tidur, sehingga beberapa responden harus ditemui di tempat tinggal mereka.
2. Keterangan mengenai riwayat Diabetes dan Reumatik responden hanya diperoleh berdasarkan pengakuan responden dan tidak dilakukan pengukuran lebih jauh untuk mengetahui kedua riwayat penyakit yang dimiliki responden tersebut sehingga tidak diketahui kondisi Diabetes ataupun Reumatik yang dimiliki responden pada saat penelitian berlangsung yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran tes *phalen*.

KEPUSTAKAAN

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Penerbit Toha Putra. 1993
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2001
- American Society for Surgery of The Hand. "Carpal Tunnel Syndrome". Developed by the ASSH Public Education Committee*. 2011 (Diakses pada 14 Maret 2014)
- Bahreisy, H. Salim dan Said Bahreisy. *Tafsir Ibnu Katsier*. Kuala Lumpur: Penerbit Victory Agency. 2003
- Bahrudin, Mohammad. "*Carpal Tunnel Syndrome*" Universitas Muhammadiyah Malang, 2011 (Diakses 14 Maret 2014)
- Bugajska, et al. "*Carpal Tunnel Syndrome in Occupational Medicine Practice*". *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*. Vol. 2013, No. 1, 2007 (Diakses 8 April 2014)
- Ekawati, Citra. "Gambaran Stres Kerja pada Tenaga Kerja Wanita di PT. Bogatama Marinusa Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, 2013
- Fadhilah. "Studi Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Tenaga Kerja Wanita di Departemen Produksi PT. Maruki Internasional Indonesia Tahun 2011". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, 2011
- Ginsberg, Lionel. *Lecture Notes: Neurologi*. Edisi Delapan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz. 28*. Jakarta: Penerbit Panjimas 1985
- Harrianto, Ridwan. "*Occupational Overuse Syndrome*". *Jurnal Kedokter Trisakti*. Vol. 18 No. 2. 1999 (Diakses 26 Maret 2014)
- Healey and Walker. *Introduction to Occupational Health in Public Health Practice*. USA: Jossey Bass. 2009
- Kalsum. "Tenaga Kerja Wanita dan Perlindungan". Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. 2004 (Diakses 2 April 2014)
- Kim, dkk. "*Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome in Meat and Fish Processing Plants*". *Journal of Occupational Health*. Volume 46, 2004 (Diakses 22 April 2014)

- Kurniawan, dkk. "Faktor Risiko Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada Wanita Pemetik Melati di Desa Karangcengis, Purbalingga". *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*. Vol.3, No.1, 2008 (Diakses 14 Maret 2014)
- Laboratorium Klinik Prodia. "Hipotiroid". *Artikel Kesehatan*. 2014 (www.prodia-hipotiroid.go) (Diakses 26 Maret 2014)
- Levy *et al.*, *Occupational and Enviromental Health Recognizing and Preventing Disease and Injury*. Sixth Edition. Oxford University Press, 2011 (Diakses 8 April 2014)
- Lubis, Halinda Sari. "Sindroma Terowongan Karpal Akibat Kerja". *Jurnal Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja FKM USU*. 2006 (Diakses 19 Maret 2014)
- Lukman dan Nurna Ningsih. *Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika, 2009
- Mallapiang, Fatmawaty. *Ergonomi dan Keluhan Muskuloskeletal*. Makassar: Alauddin University Press. 2012
- Merijanti S, Lie T. "Gerakan Repetitif Berulang sebagai Faktor Risiko Terjadinya Sindrom Terowongan Karpal pada Pekerja Wanita di Pabrik Pengolahan Makanan" *Universa Medicina* Vol. 24 No. 1, 2005 (Diakses 17 Maret 2014)
- Mollayousefi, *et al.* "Assessment of Body Mass Index and Hand Anthropometric Measurements as Independent Risk Factors For Carpal Tunnel Syndrome". *Folia Morphol.* Vol. 67, No.1, 2008 (Diakses 22 April 2014)
- Muis, Abdul. "Gambaran Risiko Ergonomi dan Keluhan Muskuloskeletal pada Usaja Konveksi di Kec. Somba Opu Kab. Gowa". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, 2011
- National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH). Department of Health and Human Services. *Cumulative Trauma Disorders in The Workplace*. 1995 (Diakses 8 April 2014)
- Notoadmojo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Nurhikmah. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Pekerja Furnitur di Kecamatan Benda Kota Tangerang Tahun 2011". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah. 2011 (Diakses 7 April 2014)

- Pratiwi, dkk. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) pada Pekerja Pembersih Kulit Bawang di Unit Dagang (UD) Bawang Lanang Kelurahan Iringmulyo Kota Metro”. Jurnal. 2013 (Diakses 14 Maret 2014)
- Rusdi, Yusuf dan Herry Koesyanto. “Hubungan Antara Getaran Mesin Produksi dengan *Carpal Tunnel Syndrome*”. Jurnal Kesehatan Masyarakat. KEMAS 5 No. 2. 2010 (Diakses 18 Maret 2014)
- Rusdimayanti, Nur Suci. “Gambaran Keluhan Muskuloskeletal pada Pekerja Bagian Produksi PT. Maruki International Indonesia Tahun 2012”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, 2012
- Saryono dan Mekar Dwi Anggraeni. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika. 2013
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume. 12. Bandung: Penerbit Lentera Hati. 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 2. Bandung: Penerbit Lentera Hati, 2009
- Simoneau *et al.* *Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) a Better Understanding for More Effective Prevention*. Institute de recherche robertsaure en santé et en securite du travail, 1996 (Diakses 8 April 2014)
- Suherman, dkk. “Beberapa Faktor Kerja Yang Berhubungan Dengan Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* (Cts) Pada Petugas Rental Komputer Di Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya”. Jurnal. 2012 (Diakses 19 Maret 2014)
- Sulaksmono, M. “Tenaga Kerja Wanita dan Kesehatan Reproduksi”. Artikel Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2012 (Diakses 18 Maret 2014)
- Suma'mur. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES)*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2009
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010 (Diakses 17 April 2014)
- Tana, Lusianawaty, dkk. “*Carpal Tunnel Syndrome* Pada Pekerja Garmen di Jakarta”. Buletin Penelitian Kesehatan. Volume 32 No. 2, 2004 (Diakses 26 Maret 2014)
- Tana, Lusianawaty. “Sindrom Terowongan Karpal pada Pekerja: Pencegahan dan Pengobatannya”. Jurnal Kedokteran Trisakti. Vol. 22 No. 3 2003 (Diakses 20 Maret 2014)

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin University Press Makassar: 2013

Wahyu, Airin. “Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada Wanita Pelinting Jenang”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang. 2013 (Diakses 18 Maret 2014)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dokumentasi



1969
STAS ISLAM
UD
M A K A S S A R



RIWAYAT HIDUP PENULIS



ANNISA NURUL MUKHLISA, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 8 Desember 1992, merupakan anak keempat dari lima bersaudara pasangan Ir. H. Mukhsin Tahir, MM dan Hj. Nurjannah Syamsuddin, SE.

Pendidikan formal yang telah dilalui adalah pendidikan SDN Centre Mangalli pada tahun 1998-2004. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sungguminasa pada tahun 2004-2007. Setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 2 Makassar pada tahun 2007-2010. Pada tahun 2010 penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur SPMB PTAIN dan memilih peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tahun 2011.

Sebagai seorang mahasiswa, penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai jenis kegiatan dan organisasi dalam lingkup kampus. Pengalaman organisasi penulis antara lain adalah sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat periode 2012-2013.