

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT TERHADAP  
PENILAIAN *GLASGOW COMA SCALE* (GCS) PADA PASIEN  
TRAUMA CAPITIS DI RUANG INSTALASI RAWAT  
DARURAT RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**ARDHYANZAH ANSAR**

**NIM: 70300110016**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat terhadap Penilaian Glasgow Coma Scale (GCS) pada Pasien Trauma Capitis di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar*”. Shalawat dan salam senantiasa terkirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana pada program ilmu Keperawatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk Ayahanda Ansar dan Ibunda St. Maryam yang telah memberikan kepercayaan, do’a tulus, kasih sayang, dukungan moral maupun material selama ini, dan yang tak bosan-bosannya memberikan nasehat kepada penulis tentang arti sebuah perjuangan sehingga menjadi inspirasi penulis dalam meraih kesuksesan.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi. Namun atas bantuan, bimbingan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat terlewati dan teratasi. Untuk itu perkenankanlah penulis dengan segala hormat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M. S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Hj. St. Suriah N. Zen, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku pembimbing 1 dan Bapak Mahyudin, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan perhatian serta bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Risnah, S.KM, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku penguji 1 dan Bapak Prof. Dr. H. Rahim Yunus, M.Ag, selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Direktur, Kepala Ruangan IRD, serta para Perawat RSUD Labuang Baji Makassar yang ikut membantu baik dalam memberikan izin ataupun menjadi sampel dari penelitian.
7. Adikku Fajri Wahyudi Ansar dan Suci Fidhyana Ansar beserta Keluarga besar penulis serta Ilma Adriana yang senantiasa mendo'akan, memberi motivasi dan bahkan menjadi inspirasi bagi penulis.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Keperawatan 2010 UIN Alauddin Makassar atas bantuan dan kebersamaanya selama ini.

9. Kak Zaenal, S.Hum dan Kak Fajrul, S.Hum yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Pihak-pihak yang telah ikut membantu proses penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan semua secara satu-satu.

Penulis menyadari bahwa meskipun skripsi ini dibuat dengan usaha yang maksimal dari peneliti, tidak menutup kemungkinan di dalamnya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berkarya lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Akhirnya, harapan dan do'a penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, Agustus 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Ardhyanzah Ansar

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1-13
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	9
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14-47
A. Tinjauan Umum tentang Trauma Capitis .....	12
B. Tinjauan Umum tentang <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) .....	32
C. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan .....	39

D. Kerangka Konsep .....	48
BAB III METODE PENELITIAN .....	49-55
A. Desain Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	49
C. Populasi dan Sampel .....	49
D. Teknik Sampling.....	50
E. Sumber Data .....	51
F. Instrumen Penelitian.....	51
G. Pengolahan Data.....	52
H. Analisis Data.....	53
I. Etika Penelitian .....	54
BAB IV PEMBAHASAN .....	56-69
A. Hasil penelitian .....	56
B. Pembahasan .....	63
BAB V PENUTUP .....	70-71
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	60
Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	61
Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja .....	61
Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman .....	62
Tabel 5.5 Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Pendidikan .....	63
Tabel 5.6 Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Usia .....	64
Tabel 5.7 Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Lama Kerja .....	65
Tabel 5.8 Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Pengalaman .....	66



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Kerangka Konsep .....	48
--	----





## ABSTRAK

**Nama : Ardhyanzah Ansar**

**Nim : 70300110016**

**Judul Skripsi : Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat Terhadap Penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) pada Pasien Trauma Capitis di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar.**

---

Setiap hari ada 30 orang mati di jalanan di Indonesia. Angka kematian yang tinggi, terutama dengan cedera kepala. Cedera kepala sangat sering dijumpai. Hampir 30% kematian akibat cedera pada anak disebabkan oleh cedera kepala. Setiap tahun diperkirakan 29.000 anak mengalami cacat menetap dari cedera kepala yang menengah atau parah. Penanganan di lokasi kejadian dan selama transportasi korban ke rumah sakit, penilaian dan tindakan awal di ruang gawat darurat sangat menentukan penatalaksanaan dan prognosis selanjutnya. *Glasgow Coma Scale* (GCS) yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, (apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak) dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal yaitu reaksi membuka mata, bicara dan motorik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau informasi mengenai tingkat pengetahuan perawat dalam penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) pada pasien trauma capitis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pembagian kuesioner. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan responden digunakan skala Guttman. Skala ini merupakan skala yang bersifat tegas dan konsisten dengan memberikan jawaban yang tegas seperti jawaban dari pertanyaan/pernyataan: ya dan tidak, positif dan negatif, setuju dan tidak setuju, benar dan salah. Skala Guttman ini pada umumnya dibuat seperti *checklist* dengan intrepetasi penelitian, apabila skor benar nilainya 1 dan apabila salah nilainya 0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 responden diperoleh hasil yaitu mayoritas responden berada pada kategori tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 18 responden (78,26 %) sedangkan sisanya berada pada kategori tingkat pengetahuan baik yaitu sebanyak 5 responden (21,73 %).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Dewasa ini tingkat angka kematian baik di Indonesia maupun di dunia secara global relatif meningkat pertahunnya, hal ini baik disebabkan kecelakaan, proses penuaan yang menyebabkan kelemahan fungsi organ tubuh ataupun karena menderita berbagai macam penyakit (Depkes RI,2012).

Sekitar 3,5 jiwa manusia di dunia terengut tiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 2 juta di antaranya adalah korban kecelakaan di jalan raya (Bustan, 2007).

Berdasarkan laporan WHO, saat ini kecelakaan transportasi jalan di dunia telah mencapai 1,5 juta korban meninggal dan 35 korban luka-luka/cacat akibat kecelakaan lalu lintas pertahun (2,739 jiwa dan luka-luka 63,013 jiwa perhari). Sebanyak 85% korban meninggal akibat kecelakaan, ini terjadi di negara-negara berkembang. Tingkat kecelakaan transportasi jalan di kawasan Asia Pasifik memberikan kontribusi sebesar 44% dari total kecelakaan di dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya (Russeng, 2011).

Cedera kepala sangat sering dijumpai. Sekitar satu juta pasien setiap tahunnya datang ke departemen Kecelakaan dan Kegawatdaruratan di Inggris dengan cedera kepala dan sekitar 5000 pasien meninggal setiap tahunnya setelah mengalami cedera kepala (Grace & Borley, 2007).

Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat memperkirakan bahwa peristiwa jatuh bertanggung jawab atas lebih dari separuh cedera kepala pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Pada anak-anak di atas 5 tahun, cedera kepala biasanya disebabkan oleh olahraga, jatuh, dan kecelakaan kendaraan bermotor.

Hampir 30% kematian akibat cedera pada anak disebabkan oleh cedera kepala. Setiap tahun diperkirakan 29.000 anak mengalami cacat menetap dari cedera kepala yang menengah atau parah (Purwoko, 2006).

Setiap hari ada 30 orang mati di jalanan di Indonesia. Angka kematian yang tinggi, terutama dengan cedera kepala. Kejadian yang ditemukan sekitar 40.000 KLL setahun atau 100-150 KKL perhari dengan 30 korban jiwa, 54 luka berat, 76 luka ringan (Bustan, 2007).

Di Indonesia, jumlah kecelakaan ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1988, menurut catatan Jasa Raharja, korban meninggal, cacat atau luka sekitar 36.000 jiwa. Tahun 1992 menjadi 40.500 jiwa korban KLL; lebih 100 kejadian perhari. Jumlah ini tentu belum termasuk yang belum terpantau oleh Jasa Raharja (Bustan, 2007).

Menurut data dari Ditjen Perhubungan Darat tahun 2006, Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 di Indonesia setelah penyakit jantung dan stroke. Setiap tahunnya 30.000 nyawa melayang di jalan raya dan setiap tahunnya 9.000 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Data dari Kepolisian RI tahun 2006 didapatkan angka rata-rata yang sangat mencengangkan ini bahwa tiap 1 jam rata-rata telah terjadi 10 kecelakaan lalu lintas. Tiap 10 menit 1 orang menderita luka ringan

akibat kecelakaan. Tiap 15 menit 1 orang menderita luka berat akibat kecelakaan dan tiap 30 menit 1 orang meninggal dunia akibat kecelakaan (Russeng, 2011).

Jumlah sepeda motor mendominasi sekitar 75% jumlah kendaraan di Indonesia. Dan karena itu pengendara motor menjadi korban terbanyak kecelakaan di jalanan. Misalnya 59% (1986) kecelakaan di Bali melibatkan pengendara motor. Dan dari mereka yang cidera, 80% merupakan trauma kepala. Dan dari mereka yang trauma kepala ini, 90% yang meninggal (Bustan, 2007).

Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Lalu Lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas 1.127 kasus untuk tahun 2006, 1.493 kasus untuk tahun 2007 dan 1.872 kasus untuk tahun 2008. Dari data tersebut yang meninggal 681 orang pada tahun 2006, 938 orang pada tahun 2007, 958 orang pada tahun 2008 (Russeng, 2011).

Dalam Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dijelaskan bahwa penyebab kematian tertinggi penyakit tidak menular berbasis puskesmas rawat inap yaitu kecelakaan lalu lintas dengan 99 kasus. Sedangkan penyebab kematian tertinggi penyakit tidak menular berbasis rumah sakit rawat inap, kecelakaan lalu lintas berada di urutan ke dua dengan 77 kasus (Depkes RI, 2012).

Data dari RSUD Labuang Baji Makassar, sepanjang tahun 2012 terdapat 73 kasus rawat inap dengan kasus trauma capitis berkomplikasi dengan perdarahan intrakranial dengan cedera intrakranial. Dari 73 kasus tersebut 15 diantaranya berakhir dengan kematian. Disamping itu juga terdapat 76 kasus baru yang menjalani

rawat jalan. Sedangkan pada tahun 2013, meningkat menjadi 221 kasus rawat inap yang 23 dari kasus tersebut berakhir dengan kematian.

Setiap terjadi kecelakaan dan korban mengalami benturan di kepala apalagi sampai pingsan, harus dianggap sebagai kecelakaan berat dan berbahaya serta patut diduga mengalami gegar otak. Demikian pula setiap korban yang pingsan dan diduga mengalami cedera di kepala harus diperlakukan secara hati-hati (Junaidi, 2011).

Sekitar 40% penderita cedera multiple akan mengalami cedera Susunan Syaraf Pusat (SSP). Kelompok ini akan mengalami angka kematian dua kali lebih tinggi (35% banding 17%) dibandingkan dengan kelompok tanpa cedera SSP. Cedera kepala mencakup 25% dari seluruh kematian akibat trauma dan meliputi setengah dari kematian kecelakaan sepeda motor sebagaimana cedera lain, evaluasi dan penatalaksanaan yang menyeluruh dan evaluasi dan penatalaksanaan yang menyeluruh dan segera akan memberikan kemungkinan sembuh yang lebih baik (Widyanti, 2012).

Cedera kepala merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan utama pada kelompok usia produktif dan sebagian besar terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Di samping penanganan di lokasi kejadian dan selama transportasi korban ke rumah sakit, penilaian dan tindakan awal di ruang gawat darurat sangat menentukan penatalaksanaan dan prognosis selanjutnya. Tindakan resusitasi, anamnesis dan pemeriksaan fisis umum dan neurologis harus dilakukan secara serentak. Pendekatan yang sistematis dapat mengurangi kemungkinan terlewatnya evaluasi unsur vital.

Tingkat keparahan cedera kepala menjadi ringan segera ditentukan saat pasien tiba di rumah sakit (Mansjoer, 2008).

Untuk melakukan penatalaksanaan cedera kepala dengan efektif, perlu pemahaman anatomi dasar dan fisiologi yang baik tentang kepala dan otak. Cedera kepala yang terjadi dapat berupa memar jaringan otak yang diikuti dengan 'swelling' dan peningkatan tekanan intra kranial, cedera terhadap pembuluh darah disertai pendarahan dan peningkatan tekanan intra kranial atau cedera tembus yang merusak jaringan otak.

Untuk mendapatkan keseragaman penilaian tingkat kesadaran secara kuantitatif (sebelumnya dilakukan penilaian kesadaran secara kualitatif seperti apatis, somnolen, koma dan hasil pengukuran tidak seragam antara yang satu dengan yang lain), dilakukan pemeriksaan dengan skala *Glasgow Coma Scale* (GCS) (Widyanti, 2012).

Menurut salah satu ketua tim perawat di ruang baji kamase II RSUD Labuang Baji Makassar, bahwa pernah terjadi suatu kejadian dimana perawat dari ruang intensif rawat darurat merencanakan untuk memindahkan pasien dari ruang intensif rawat darurat ke ruang baji kamase II berhubung karena kondisi pasien sudah membaik termasuk tentang nilai GCS dari pasien tersebut. Tapi saat dalam perjalanan menuju ke ruang Baji Kamase II pasien tersebut meninggal (Mahyudin, Wawancara, 2014).

Berdasarkan kasus di atas, tentu sangat diharapkan bahwa seluruh tenaga medis yang ikut terlibat dalam tindakan penanganan pada cedera kepala agar betul-

betul dapat bekerja secara profesional. Sangat diharapkan bahwa yang ikut terlibat adalah tenaga medis yang kompeten sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pasien dan tentunya dapat meningkatkan kesehatan pasien. Terlebih lebih bagi tenaga keperawatan yang merupakan tenaga medis yang lebih banyak bersentuhan dengan pasien. Sehingga dalam melakukan tindakan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik demikian pula dalam hal pemeriksaan GCS pada pasien.

Di samping sebagai keharusan dalam menjunjung tinggi profesionalitas juga sebagai suatu perbuatan yang baik yaitu dengan menolong atau membantu sesama yaitu pasien itu sendiri dan keluarganya.


Hal seperti ini terdapat dalam QS At-Taubah/9: 71 yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah/9: 71)

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam kehidupan di dunia ini tentu akan ada yang jadi penolong dan ditolong. Dan yang menjadi penolong adalah mereka yang beriman baik itu laki-laki maupun perempuan sebagaimana disebutkan di awal ayat. Demikian pula halnya dengan yang terjadi di rumah sakit. Para tenaga medislah yang berperan sebagai penolong dan yang ditolong adalah pasien. Di samping itu juga dijelaskan bahwa orang yang menjadi penolong tersebut akan menyuruh atau mengajak melakukan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Dalam konteks ini dapat diartikan bahwa mengajak pada kebaikan adalah dengan mengajak pada pasien untuk selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kesehatan utamanya yang menyangkut dengan penyakit yang dideritanya. Sedangkan dalam hal mencegah keburukan yaitu dengan mengingatkan pula pada pasien tentang apa-apa saja yang harus dihindari terlebih lagi yang menyangkut dengan penyakitnya. Di samping itu pula juga dijelaskan bahwa para penolong tersebut juga tak lupa untuk senantiasa melakukan hal-hal kebajikan lainnya misalnya mendirikan shalat, membayar zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan di akhir ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi mereka yang memberikan pertolongan bagi yang lain.

Di samping sudah menjadi tuntutan dalam dunia profesi, hal itu juga merupakan suatu keharusan dalam agama, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al-Qashash/28: 77 yaitu:

ط  
 ..... وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ



Artinya: “...dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu..” (QS. Al-Qashash/28: 77)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyeru kepada ummat manusia agar berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepada kita melalui nikmatnya yang tak terhingga.

Hal itu juga tertuang dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab III Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hak kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dan juga pada Pasal 12, dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat terhadap Penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) pada Pasien Trauma Capitis di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian “*Bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat terhadap Penilaian Glasgow Coma Scale (GCS) pada Pasien Trauma Capitis di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar ?*”.

### ***C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif***

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati (diukur) itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain (Nursalam, 2008).

Sekiranya di dalam literatur tidak terdapat definisi operasionalnya, maka harus dibuat sendiri, dengan menggunakan pemikiran sendiri, sesuai dengan maksud dari penelitian itu, atau dengan berkonsultasi dan berdiskusi dengan para ahli (Machfoedz, 2010).

#### **1. Pendidikan**

Secara luas pendidikan mencakup seluruh proses kehidupan individu sejak dalam ayunan hingga liang lahat, berupa interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal maupun informal proses kegiatan pendidikan pada dasarnya melibatkan perilaku individu maupun kelompok. Kegiatan pendidikan formal maupun informal berfokus pada proses mengajar, dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku yaitu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dan pendidikan yang peneliti maksud di sini adalah pendidikan formal yaitu tingkatan pendidikan yang telah ditempuh oleh perawat.

Kriteria Objektif:

- a. Tingkat pengetahuan berdasarkan pendidikan baik bila skor atau nilai 76-100 %

- b. Tingkat pengetahuan berdasarkan pendidikan cukup bila skor atau nilai 60-75%
- c. Tingkat pengetahuan berdasarkan pendidikan buruk bila skor atau nilai < 60 %

## 2. Usia

Sebagian besar orang mengalami peningkatan masalah mengingat informasi (memori) pada waktu mereka menua, terutama kemampuan untuk mengingat pengalaman yang belum lama berlangsung. Penurunan kemampuan tersebut terjadi baik dalam hal kemampuan menghimpun informasi baru dan kemampuan untuk “mengambil” informasi yang telah ada dari “tempat penyimpanan memori” (otak). Selain itu, terjadi juga sedikit penurunan kemampuan untuk menyimpan informasi yang baru saja dipelajarinya.

### Kriteria Objektif:

- a. Tingkat pengetahuan berdasarkan usia baik bila skor atau nilai 76-100 %
- b. Tingkat pengetahuan berdasarkan usia cukup bila skor atau nilai 60-75%
- c. Tingkat pengetahuan berdasarkan usia buruk bila skor atau nilai < 60 %

## 3. Lama kerja

Lama kerja merupakan waktu di mana seseorang bekerja. Makin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Pengalaman seseorang mempunyai dampak yang dalam bersikap positif maupun negatif. Mengingat pengalaman banyak atau lama akan mempunyai kecenderungan untuk bertindak lebih baik dari yang baru. Jadi lama kerja yang peneliti maksud adalah tentang rentang waktu yang perawat lalui sejak mulai bekerja baik itu sejak di ruang intensif rawat darurat ataupun ruang perawatan lainnya.

Kriteria objektif :

- a. Tingkat pengetahuan berdasarkan lama kerja baik bila skor atau nilai 76-100 %
- b. Tingkat pengetahuan berdasarkan lama kerja cukup bila skor atau nilai 60-75%
- c. Tingkat pengetahuan berdasarkan lama kerja buruk bila skor atau nilai < 60 %

#### **4. Pengalaman**

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. Adapun pengalaman yang peneliti maksud adalah pengalaman perawat tentang penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) apakah pernah melakukan atau belum.

Kriteria Objektif:

- a. Tingkat pengetahuan berdasarkan pengalaman baik bila skor atau nilai 76-100 %
- b. Tingkat pengetahuan berdasarkan pengalaman cukup bila skor atau nilai 60-75%
- c. Tingkat pengetahuan berdasarkan pengalaman buruk bila skor atau nilai < 60 %

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Faizin dan Winarti (2008) yang menemukan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan lama kerja perawat terhadap kinerja perawat.

## **E. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan perawat terhadap penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) pada pasien trauma capitis di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan perawat terhadap penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) berdasarkan pendidikan perawat di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar
- b. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan perawat terhadap penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) berdasarkan usia perawat di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar
- c. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan perawat terhadap penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) berdasarkan lama bekerja perawat di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar
- d. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan perawat terhadap penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) berdasarkan pengalaman perawat di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, sehingga peneliti dapat mengetahui tingkat pengetahuan perawat dalam menentukan *Glasgow Coma Scale* (GCS) pada pasien trauma capitis dan menambah pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian. Serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Bagi Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau referensi bagi profesi keperawatan utamanya para mahasiswa yang nantinya akan bekerja atau praktek di lapangan.

### **3. Bagi Instansi**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada instansi yang terkait agar kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Trauma Capitis*

##### 1. Pengertian

Cedera kepala (*Trauma Capitis*) adalah suatu gangguan traumatic dari fungsi otak yang disertai pendarahan intersisial dalam substansi otak, tanpa terputusnya kontinuitas otak (Krisanty, 2009).

##### 2. Patofisiologi

Suatu sentakan traumatic pada kepala dapat menyebabkan cedera kepala. Sentakan biasanya tiba-tiba dan dengan kekuatan penuh, seperti jatuh, kecelakaan kendaraan bermotor, atau kepala terbentur. Jika sentakan menyebabkan suatu trauma akselerasi - deselerasi atau *coup-counter coup*, maka kontusio serebri dapat terjadi. Trauma akselerasi - deselerasi dapat terjadi langsung di bawah sisi yang terkena ketika otak terpantul ke arah tengkorak dari kekuatan suatu sentakan (suatu pukulan benda tumpul, sebagai contoh), ketika kekuatan sentakan mendorong otak terpantul ke arah sisi berlawanan tengkorak, atau ketika kepala terdorong ke depan dan berhenti seketika. Otak terus bergerak dan terbentur kembali ke tengkorak (akselerasi) dan terpantul (deselerasi) (Kristanty, 2009).

##### *Mekanisme Trauma*

Trauma kepala terjadi bila ada kekuatan mekanik yang ditransmisikan ke jaringan otak. Mekanisme yang berkontribusi terhadap trauma kepala :

- a. Akselerasi: kepala yang diam (tak bergerak) ditabrak oleh benda bergerak
- b. Deselerasi: kepala membentur benda yang tak bergerak

Deformasi: benturan pada kepala (tidak menyebabkan fraktur tulang tengkorak) menyebabkan pecahnya pembuluh darah vena terdapat di permukaan kotikal sampai ke dura sehingga terjadi perdarahan subdural (Kristanty, 2009).

### 3. Penyebab

- a. Trauma Tumpul

Kekuatan benturan akan menyebabkan kerusakan yang menyebar. Berat ringannya cedera yang terjadi tergantung pada proses akselerasi-deselerasi, kekuatan benturan dan kekuatan rotasi internal. Rotasi internal dapat menyebabkan perpindahan cairan dan perdarahan peteki karena pada saat otak “bergeser” akan terjadi “pergeseran” antara permukaan otak dengan tonjolan-tonjolan yang terdapat di permukaan dalam tengkorak laserasi jaringan otak sehingga mengubah intervensi vaskuler otak.

- b. Trauma Tajam

Disebabkan oleh pisau, peluru atau fragmen tulang pada fraktur tulang tengkorak. Kerusakan tergantung pada kecepatan gerak (*velocity*) benda tajam tersebut menancap ke kepala atau otak. Kerusakan hanya terjadi pada area di mana benda tersebut merobek otak (lokal). Obyek dengan *velocity* tinggi (peluru) menyebabkan kerusakan struktur otak yang luas. Adanya luka terbuka menyebabkan resiko infeksi.



### *Coup dan Contracoup*

Pada cedera coup kerusakan terjadi segera pada daerah benturan sedangkan pada cedera contracoup kerusakan terjadi pada sisi yang berlawanan dengan cedera coup (Kristanty, 2009).

#### **4. Berat - ringannya trauma,**

Hudak dkk dalam Krisanty (2009) membagi cedera kepala sebagai berikut :

- a. Cedera kepala ringan
  - 1) Nilai GCS 13-15
  - 2) Amnesi kurang dari 30 menit
  - 3) Trauma sekunder dan trauma neurologis tidak ada
  - 4) Kepala pusing beberapa jam sampai beberapa hari
- b. Cedera kepala sedang
  - 1) Nilai GCS 9-12
  - 2) Penurunan kesadaran 30 menit – 24 jam
  - 3) Terdapat trauma sekunder
  - 4) Gangguan neurologis sedang
- c. Cedera kepala berat
  - 1) Nilai GCS 3-8
  - 2) Kehilangan kesadaran lebih dari 24 jam sampai berhari-hari
  - 3) Terdapat cedera sekunder: kontusio, fraktur tengkorak , perdarahan dan hematoma intrakranial

## 5. Klasifikasi Cedera Kepala

### a. *Scalp wounds* (trauma kulit kepala)

Kulit kepala mempunyai banyak pembuluh darah, sehingga setiap luka dapat menyebabkan perdarahan hebat. Luka kulit kepala yang berdarah tidak mempengaruhi aliran darah ke otak (Thygerson, 2011).

Kulit kepala harus diperiksa apakah ada bukti luka atau perdarahan akibat fraktur tengkorak. Adanya obyek yang berpenetrasi atau benda asing harus diangkat atau ditutupi dengan kain steril, perawatan untuk tidak menekan area luka. Laserasi pada kulit kepala cenderung menyebabkan perdarahan hebat dan harus ditangani dengan pengaplikasian penekanan langsung. Kegagalan mengontrol perdarahan dapat menyebabkan terjadinya syok. Semenjak beberapa laserasi tidak dapat dideteksi dengan mudah, periksa kulit kepala dengan menggunakan sarung tangan, sisihkan rambut untuk memfasilitasi inspeksi. Palpasi tengkorak dan catat adanya fragmen tulang. Jangan memberikan tekanan pada tulang tengkorak atau jaringan otak yang tidak stabil jika fraktur ditemukan, sejak jaringan otak dan area sekitarnya dikelilingi oleh pembuluh-pembuluh darah dapat menyebabkan cedera lebih lanjut. Rambut di sekitar laserasi kulit kepala harus dicukur dan luka dibersihkan, didebridemen, dan diinspeksi keseluruhan areanya sebelum ditutup (Krisanty, 2009).

### b. *Fraktur tengkorak*

Kekuatan signifikan yang mengenai kepala dapat menyebabkan fraktur tulang tengkorak. Keadaan ini terjadi bila bagian-bagian tulang tengkorak (tulang-tulang pembentuk kepala) patah (Thygerson, 2011).

Fraktur kalvaria (atap tengkorak) apabila tidak terbuka (tidak ada hubungan otak dengan dunia luar) tidak memerlukan perhatian segera. Yang lebih penting adalah keadaan intrakranialnya. Fraktur tengkorak tidak memerlukan tindakan pengobatan istimewa apabila ada fraktur impresi tulang maka operasi operasi untuk mengembalikan posisi.

Pada fraktur basis kranium dapat berbahaya terutama karena perdarahan yang ditimbulkan sehingga menimbulkan ancaman terhadap jalan nafas. Pada fraktur ini, aliran cairan serebro spinal berhenti dalam 5-6 hari dan terdapat hematom kacamata, yaitu hematom sekitar orbita (Kristanty, 2009).

c. *Commutio Cerebri* (gegar otak)

Gegar otak adalah cedera kepala tertutup yang biasanya ditandai dengan penurunan kesadaran. Gegar otak menyebabkan periode peneha yang singkat. Gegar otak dapat ringan, sedang, atau berat, bergantung pada lama individu tidak sadar. Keadaan tidak sadar dalam waktu lama diperkirakan menyebabkan hasil yang buruk. Akan tetapi, bahkan gegar otak ringan dapat berkaitan dengan perubahan kognitif atau perilaku yang tidak kentara walaupun tidak terdapat patologi otak yang jelas. Keadaan tersebut, yang disebut sindrom pasca gegar otak, dapat berlangsung selama lebih setahun (Corwin, 2009).

Sebagian besar gegar otak bersifat ringan, dan orang akan sembuh sempurna, tetapi prosesnya memerlukan waktu. Gegar otak tidak disertai perdarahan di bawah tulang tengkorak atau pembengkakan jaringan otak (Thygerson, 2011).

Korban dikatakan mengalami cedera atau gegar otak bila muncul gejala mual dan atau muntah serta penurunan kesadaran sampai koma setelah kepalanya terbentur atau terpukul. Setelah sadar biasanya korban lupa pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kecelakaan terjadi. Semakin lama korban tidak sadarkan diri, biasanya semakin berat gegar otak yang diderita. Demikian pula semakin lama korban lupa (baik tentang hal-hal sebelum maupun sesudah kecelakaan), semakin berat pula gegar otaknya. Gegar otak yang ringan biasanya akan sembuh sempurna tanpa komplikasi. Gegar otak yang berat dapat terjadi komplikasi saraf, seperti yang tampak pada gejala dan tanda stroke, misalnya kelumpuhan, gangguan koordinasi gerak, bicara pelo, atau komplikasi pikun, dan sebagainya (Junaidi, 2011).

Kehilangan kesadaran sementara (kurang dari 15 menit). Sesudah itu klien mungkin mengalami disorientasi dan bingung hanya dalam waktu yang relatif singkat. Gejala lain meliputi: sakit kepala, tidak mampu untuk berkonsentrasi, gangguan memori sementara, pusing dan peka. Beberapa klien mengalami amnesia retrogard. Kebanyakan klien sembuh sempurna dan cepat, tetapi beberapa penderita lainnya dapat mengalami gejala lanjut selama beberapa bulan. Penderita tetap dibawa ke RS, karena kemungkinan cedera yang lain (Krisanty, 2009).

d. *Contusio cerebri* (Memar otak)

Beberapa tanda dan gejala yang dapat terlihat adalah sebagai berikut :

- 1) Perdarahan kecil/ptechie jaringan otak
- 2) Edema serebri
- 3) TIK meningkat

- 4) Gejala klinis sama dengan komusio serebri namun lebih berat
- 5) Gangguan neurologis fokal (Ariani, 2013).

Kehilangan kesadaran lebih lama. Dikenal juga dengan *Diffuse Axonal Injury* (DAI), yang mempunyai prognosis lebih buruk. (Krisanty, 2009)

e. Perdarahan *intrakranial*

Dapat berupa perdarahan epidural, perdarahan subdural atau perdarahan intrakranial. Terutama perdarahan epidural dapat berbahaya karena perdarahan berlanjut akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang semakin berat (Krisanty, 2009).

1) Hematoma epidural

Hematoma epidural adalah akumulasi darah di atas dura mater. Hematoma epidural terjadi secara akut dan biasanya disebabkan oleh perdarahan arteri yang mengancam jiwa (Corwin, 2009).

Hematoma epidural merupakan suatu akibat serius dari cedera kepala dengan angka mortalitas sekitar 50%. Hematoma epidural paling sering terjadi di daerah parietotemporal akibat robekan arteria meningeal media. Hematoma epidural di daerah frontal dan oksipital sering tidak dicurigai dan memberi tanda-tanda setempat yang tidak jelas. Bila hematoma epidural tidak disertai dengan cedera lain dari otak biasanya pengobatan yang dini dapat menyembuhkan penderita dengan sedikit atau tanpa defisit neurologis. Riwayat klasik dari penderita hematoma epidural adalah terjadinya cedera kepala yang diikuti keadaan tidak sadar dalam beberapa saat (Ariani, 2013).

## 2) Hematoma subdural

Hematoma subdural adalah kumpulan darah antara permukaan dalam dura mater dan araknoid mater. Pada sebagian besar kasus, hematom ini disebabkan oleh kerusakan vena penghubung (*bridging veins*) yang berjalan dari permukaan otak ke sinus dura (Kumar, Cotran, Robbins, 2007).

Hematoma subdural biasanya disebabkan oleh robekan vena walaupun kadang-kadang dapat terjadi perdarahan arteri subdural. Hematoma subdural dapat terjadi dengan cepat, yang disebut hematoma subdural akut, atau dapat terjadi akibat perdarahan lambat, yang disebut hematoma subdural subakut. Penyalahgunaan alkohol kronis dan lansia dapat mengalami hematoma yang berkembang lambat selama periode beberapa bulan setelah cedera kepala ringan, dan tidak dapat memperlihatkan gejala yang jelas akibat hematoma sampai hematoma besar. Hal ini disebut hematoma subdural kronis. Hematoma subdural kronis mungkin terjadi karena lansia dan penyalahguna alkohol kronis mengalami penurunan jaringan otak, yang memungkinkan kranium mengakomodasi hematoma berkembang tanpa mengalami peningkatan tekanan yang signifikan (Corwin, 2009).

## 3) Hemoragi subaraknoid

Hemoragi subaraknoid adalah akumulasi darah di bawah membran araknoid, tetapi di atas pia mater. Ruang ini normalnya hanya berisi CSS. Hemoragi subaraknoid biasanya terjadi akibat pecahnya aneurisma intrakranial, hipertensi berat, malformasi arteriovenosa, atau cedera kepala. Darah yang berakumulasi di atas atau

di bawah meninges menyebabkan peningkatan tekanan di jaringan otak di bawahnya (Corwin, 2009).

## **6. Tekanan Intra Kranial (TIK)**

Isi kranium termasuk jaringan otak, darah, cairan serebrospinal (CSF). Komponen-komponen ini terbungkus dalam tengkorak yang kaku. Dalam ruangan ini, terdapat suatu ruangan kecil untuk komponen-komponen berekspansi atau meningkatkan volume. Melalui proses akomodasi dan komplians, tekanan intra kranial dipertahankan dalam tingkat normal antara 10 - 15 mm Hg (136 – 204 mmH<sub>2</sub>O) dan adanya tekanan ini terutama oleh karena peranan pulsasi arteri yang ditransmisikan langsung ke otak melalui pleksus khoroides. Menurut hipotesa Monro-Killie, adanya peningkatan volume pada satu komponen haruslah dikompensasikan dengan penurunan volume salah satu dari komponen lainnya. Dengan kata lain, terjadinya peningkatan TIK selalu diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan antara volume intrakranial dengan isi kranium (Kristanty, 2009).

## **7. Manifestasi Klinik**

- a. Peningkatan TIK, dengan manifestasi sebagai berikut:
  - 1) Trias TIK: penurunan tingkat kesadaran, gelisah/irritable, papil edema, muntah proyektil
  - 2) Penurunan fungsi neurologis, seperti: perubahan bicara, perubahan reaksi pupil, sensori motorik berubah
  - 3) Sakit kepala, mual, pandangan kabur (diplopia)

b. Fraktur tengkorak, dengan manifestasi sebagai berikut:

- 1) CSF atau darah mengalir dari telinga dan hidung
- 2) Perdarahan di belakang membran timpani
- 3) Periorbital ekhimosis (*raccoon eyes*)
- 4) Battle's sign (memar di daerah mastoid) (Krisanty, 2009)

*Neurologis*

- 1) Perubahan bentuk tengkorak
- 2) Perdarahan konjungtiva (berhubungan dengan fraktur fossa anterior)
- 3) Rinorea cairan serebrospinal
- 4) Otorrea cairan serebrospinal (CSS)
- 5) Kelumpuhan nervus kranialis C1, C7, dan C8
- 6) Kejang pasca trauma (tanda lanjut)
- 7) Koma

*Kardiovaskuler*

- 1) Hipovolemia (berhubungan dengan fraktur di atas sinus sagitalis atau lateral)

*Integumen*

- 2) Ekimosis pada dasar leher (berhubungan dengan fraktur dasar tengkorak dengan fraktur di atas processus mastoid) (Speer. 2007)

c. Kerusakan saraf cranial dan telinga tengah dapat terjadi saat kecelakaan terjadi atau kemudian dengan manifestasi sebagai berikut:

- 1) Perubahan penglihatan akibat kerusakan nervus optikus
- 2) Pendengaran berkurang akibat kerusakan nervus auditory



- 3) Hilangnya daya penciuman akibat rusaknya nervus olfaktorius
  - 4) Pupil dilatasi, ketidak mampuan mata bergerak akibat kerusakan nervus okulomotor
  - 5) Vertigo akibat kerusakan otolith di telinga tengah
  - 6) Nistagmus karena kerusakan sistem vestibuler (Krisanty, 2009).
- d. Komosio serebri, dengan manifestasi sebagai berikut:
- 1) Sakit kepala - pusing
  - 2) Retrograde amnesia
  - 3) Tidak sadar lebih dari atau sama dengan 5 menit
- e. Kontusi serebri, dengan manifestasi sebagai berikut:
- Terjadi pada injuri berat, termasuk fraktur servikalis:
- 1) Peningkatan TIK
  - 2) Tanda dan gejala herniasi otak
- a) Kontusio serebri
- Manifestasi tergantung area hemisfer otak yang kena. Kontusio pada lobus temporal: agitasi, confuse; kontusio frontal: hemiparese, klien sadar; kontusio frontotemporal: aphasia
- Tanda dan gejala tersebut reversible
- b) Kontusio batang otak
- (1) Respon segera menghilang dan pasien koma
  - (2) Penurunan tingkat kesadaran terjadi sehari-hari, bila kerusakan berat
  - (3) Pada sistem ritucular terjadi *comatuse* permanen

- (4) Pada perubahan tingkat kesadaran:
- (a) Respirasi: dapat normal/periodik/cepat
  - (b) Pupil: simetris konstriksi dan reaktif
  - (c) Kerusakan pada batang otak bagian atas pupil abnormal
  - (d) Gerakan bola mata: tidak ada (Krisanty, 2009).

Biasanya cedera ini lebih berat dan gejalanya hampir mirip dengan komusio serebri. Setelah trauma pada kepala, terjadi kehilangan kesadaran dalam waktu yang lama. Beberapa menit sampai beberapa hari disertai kelainan organ/jaringan otak. Gejala-gejala : muntah, berkeringat dingin, pusing, pasien tidak sadar, dan amnesia: lupa kejadian-kejadian yang lalu (Wibowo, 2007).

#### **8. Perangkat diagnostik**

Radiograf tengkorak dapat mengidentifikasi lokasi fraktur atau perdarahan atau bekuan darah yang terjadi. CT scan atau MRI dapat dengan tepat menentukan letak dan luas cedera. CT scan biasanya merupakan perangkat diagnostik pilihan di ruang kedaruratan walaupun hasil CT mungkin normal yang menyesatkan. MRI adalah perangkat yang lebih sensitif dan akurat, dapat mendiagnosis cedera akson difus, namun mahal dan kurang dapat diakses di sebagian besar fasilitas (Corwin, 2009).

#### **9. Komplikasi**

Perdarahan di dalam otak, yang disebut hematoma intraserebral, dapat menyertai cedera kepala tertutup yang berat, atau lebih sering, cedera kepala terbuka. Pada perdarahan di otak, tekanan intrakranial meningkat, dan sel neuron dan vaskular

tertekan. Ini adalah jenis cedera otak sekunder. Pada hematoma, kesadaran dapat menurun dengan segera, atau dapat menurun setelahnya ketika hematoma meluas dan edema interstisial memburuk.

Perubahan perilaku yang tidak kentara dan defisit kognitif dapat terjadi dan tetap ada (Corwin, 2009).

## 10. Penatalaksanaan

### a. Perawatan emergensi

#### 1) Primary survey

#### a) Nilai tingkat kesadaran

#### b) Lakukan penilaian ABC:

*A-Airway* : kaji apakah ada muntah, perdarahan, benda asing dalam mulut

*B-Breathing* : kaji kemampuan bernafas, peningkatan PCO<sub>2</sub> akan memperburuk edema serebri

*C-Circulation* : nilai denyut nadi dan perdarahan

c) Imobilisasi kepala atau leher dengan *collar neck* atau alat lain dipertahankan sampai *x-ray* membuktikan tidak ada fraktur servical.

#### 2) Intervensi primer

a) Bukan jalan nafas dengan teknik “*jaw-thrust*” – kepala jangan ditekuk, isap lendir kalau perlu

b) Beri O<sub>2</sub> 4-6 liter/menit untuk mencegah anoksia serebri

c) Hiperventilasi 20-25 x/menit meningkatkan kontriksi pembuluh darah otak sehingga edema serebri menurun

- d) Kontrol perdarahan, jangan beri tekanan pada luka perdarahan di kepala, tutup saja dengan kassa, diplester. Jangan berusaha menghentikan aliran darah dari lubang telinga atau hidung dengan menyumbat/menutup lubang tersebut.
  - e) Pasang infus
- 3) Secondary survey
- a) Kaji riwayat trauma
  - b) Tingkat kesadaran
  - c) Ukur tanda-tanda vital
  - d) Respon pupil, apakah simetris atau tidak
  - e) Gangguan penglihatan
  - f) Sunkun eyes (mata terdorong ke dalam): satu atau keduanya
  - g) Aktivitas kejang
  - h) Tanda *Battle's* yaitu "*blush discoloration*" atau memar di belakang telinga (*mastoid*) menandakan adanya fraktur dasar tengkorak
  - i) Rinorea atau otorea menandakan kebocoran CSF
  - j) Periorbital ecchymosis akan ditemukan pada fraktur anterior basilar
- b. Penatalaksanaan jalan nafas dan proteksi *spinal cord*

Pasien dengan kepala, leher, atau trauma wajah juga diduga mengalami trauma tulang belakang, maka pencegahan trauma tulang belakang harus dipertahankan melalui periode pengkajian awal sampai perkembangan trauma dapat dipastikan. Jalan nafas harus dipertahankan tanpa hiperekstensi. Teknik *jaw-thrust* dan manuver *chin-lift* direkomendasikan untuk mempertahankan jalan nafas, dan

pernafasan mungkin memerlukan bantuan awal dengan satu unit *bag-valve-mask*, sejak kekurangan oksigen berkontribusi pada edema serebral. Otak mempunyai kemampuan menyimpan suplai oksigen dalam waktu singkat (misalnya sekitar 10 detik), sehingga kebutuhan metabolik jaringan menderita saat kekurangan ventilasi dan difusi. Pasien trauma kepala serius harus iventilasi dengan oksigen tambahan (10-12 liter/menit) dengan pernafasan 24 x/menit. Jika pasien tidak sadar, nilai normal analisa gas darah harus dipertahankan dan intubasi endotrakeal (ET) mungkin diberikan. Perawatan diberikan untuk memastikan plester atau alat yang digunakan lain terpasang dengan tube ET tidak melintang atau menekan area jungularis, yang mungkin menghambat aliran vena dari kepala. Sedasi dan analgesik narkotika mungkin digunakan dalam intubasi pasien untuk mengontrol stimulasi letal, yang dapat meningkatkan tekanan intra kranial. Agen neuromuskular-*blocking* juga mungkin diberikan untuk mencegah peningkatan tekanan vena yang berhubungan dengan efek Valsava yang mengimbangi pemberian ventilator.

Hiperkarbia adalah suatu vasodilator serebral yang efektif. Pengontrolan hiperventilasi harus dipertahankan jika seseorang diduga tinggi TIK. Tujuan akhir adalah mempertahankan tekanan parsial oksigen ( $PO_2$ ) lebih dari 70 mmHg dan  $PCO_2$  antara 25 sampai 30 mmHg, yang menyebabkan vasokonstriksi, sehingga menurunkan volume darah serebral. Nilai  $PCO_2$  sebaiknya tidak rendah terus menerus, akan tetapi, sejak vasokonstriksi ekstrim dapat menyebabkan baik iskemia atau infark serebral. Kadar pH seharusnya antara 7,50 – 7,55. Sejak edema paru neurogenik dapat menginduksi perpindahan cairan ke jaringan sirkulasi bertekanan

rendah seperti penampang paru selama stimulasi simpatis masif setelah trauma, status pernafasan harus secara ketat diobservasi.

Ancaman muntah dan aspirasi selalu muncul setelah trauma. Intubasi Nasogastrik (NG) awal dan dekomresi adalah penting untuk mencegah yang hal diatas, yang dapat memperburuk TIK. Jika terdapat trauma wajah yang dapat mengganggu konfigurasi tulang pada saluran nafas atas (contoh nasal, orbital, atau fraktur maxillarymandibular), alat pelindung harus digunakan untuk mencegah kemungkinan trauma otak iatrogenik lebih lanjut dari pemasangan NGT, yang dapat masuk ke ruang kranium melalui suatu fraktur cribriform plate. Jika terdapat adanya kebocoran cairan CSF dari hidung (rhinorhea) atau dari telinga (otorhea, atau hemotympanum), terdapat kecendrungan suatu fraktur tulang tengkorak basal atau frontal, membuat suatu komunikasi langsung dari struktur jalan nafas atas ke otak. Aliran CSF tersebut harusnya tidak dihambat dengan cara apapun. Kadang-kadang pasien akan mengeluh “terasa garam” dalam mulut atau tenggorokan, diperkirakan kebocoran cairan CSF. Suction harus dihindari, sejak ini meningkatkan TIK dan mungkin suatu alat untuk memasukkan mikroorganisme ke dalam otak melalui penetrasi pada meningen. Monitoring TIK adalah suatu trknik yang berguna untuk mengetahui elevasi TIK (Krisanty, 2009).

c. Tanda-tanda vital

Tanda-tanda vital seharusnya secara teratur diukur, sejak tanda-tanda vital mungkin memberikan petunjuk adanya perkembangan syok sebaik adanya

peningkatan TIK. Monitor harus dilakukan untuk pengukuran oksimetri, pembacaan EKG, dan tekanan darah, dan untuk pengkajian suhu konstan.

1) Tekanan darah

Tekanan darah dan nadi aslinya adalah stabil pada awal periode setelah trauma kepala, tetapi ketika tekanan perfusi serebral menjadi terancam, karena berbagai sebab, reseptor pressor dalam pusat vasomotor medulla terstimulasi untuk menaikkan tekanan darah. Elevasi tekanan darah dan pelebaran tekanan nadi adalah refleksi iskemik mempengaruhi medulla peningkatan TIK, atau disebabkan miokardial, dalam banyak kasus. Tekanan darah rendah tidaklah spesifik pada trauma neurologi sampai kematian dapat terjadi segera.

2) Nadi

Nadi biasanya lambat dan terikat hubungannya dengan trauma kepala mayor. Jika bradikardia muncul, ini mendorong penekanan pada batang otak, suatu massa dalam fossa posterior, atau suatu trauma spinal dimana jalur simpatis ascendens terputus. Dalam kasus-kasus peningkatan TIK yang berat, nadi melambat dan penuh, kadangkala 40-50 bpm. Adanya tachikardia menimbulkan hipotensi membutuhkan resusitasi volume. Nadi yang cepat, tidak beraturan mungkin mengikuti dekomposisi peningkatan TIK terminal. Disritmia terjadi pada pasien dengan darah dalam CSF dan berhubungan dengan gangguan otak tertentu, seperti yang melibatkan fossa anterior.

### 3) Suhu

Suhu mungkin berguna dalam pengkajian koma, sejak pasien-pasien dengan masalah-masalah metabolik mungkin dapat meningkat atau menurun dari normal yang dimediasi oleh hipotalamus. Ruptur aneurisma ventrikular dan infeksi tertentu dari sistem saraf pusat yang diikuti dengan peningkatan suhu. Akan tetapi, pada trauma kepala akut, suhu mungkin berfluktuasi, dan mungkin mengalami baik hipotermia maupun hipertermia.

### 4) Pernafasan

Pola pernafasan mungkin sangat menolong pada pengkajian pasien trauma kepala. Pernafasan Chyne-Stokes dikarakteristikan dengan peningkatan dan penurunan kedalaman ekskursi diikuti dengan suatu periode apnea. Pola yang dipicu karena peninggian sensitivitas medulla terhadap karbondioksida. Fase apnea berhubungan dengan penurunan stimulasi dari hemisfer serebral. Pernafsan Chyne-Stokes berhubungan dengan perdarahan kedalaman ganglia basalis, kondisi yang mendorong tekanan pada pusat pernafasan medullaris, lesi hemisfer bilateral dalam serebrum, atau suatu disfungsi serebrum, otak tengah, dan pons atas. Hipertensi ensepalopati dapat juga meningkatkan fenomena ini.

Hiperventilasi neurogenik pusat adalah hiperventilasi berkelanjutan pada RR 40-50 x/menit; ini mungkin terjadi pada infark pons atau akibat dari berbagai lesi di pons (seperti hematoma sereberal). Ini juga mungkin juga diikuti lesi hipotalamus-otak tengah dan beberapa metabolik yang menyebabkan ketidaksadaran, seperti ketoasidosis diabetikum, asidosis laktat dari banyak penyebab, atau uremia. Dalam



hal konfirmasi pola nafas ini, pasien harus mempunyai PaO<sub>2</sub> lebih dari 70 mmHg untuk setidaknya 24 jam.

Pernafasan apneustik (misalnya pernafasan dalam yang cepat diikuti dengan 2 sampai 3 detik pause) menunjukkan kerusakan struktur pada pusat kontrol pernafasan di pertengahan sampai bawah pons, biasanya menunjukkan kematian yang akan segera terjadi.

Pernafasan kluster adalah suatu pola pernafasan ireguler dengan interval apnea ireguler. Ini berhubungan dengan lesi bawah pons atas atau atas medulla.

Pernafasan ataksis sama dengan pernafasan Chene-Stokes kecuali bahwa periode apnea ireguler. Pernafasan ataksis menunjukkan kerusakan medular atau peningkatan tekanan dalam fossa posterior. Perdarahan serebelar dan meningitis berat juga meningkatkan terjadinya pernafasan ataksik.

d. Parameter monitor lainnya

Refleks dan sistem motorik juga harus secara berseri dievaluasi. Sejalan dengan kelanjutan pengkajian motorik, kedua sisi harus dites dan dibandingkan. Postur abnormal harus dicatat.

Tanda peningkatan TIK harus dicatat, yaitu termasuk:

- 1) Sakit kepala
- 2) Muntah proyektil
- 3) Deviasi mata kesisi lesi
- 4) Perubahan kekuatan atau tonus otot
- 5) Kejang

- 6) Peningkatan tekanan darah dan penurunan tekanan nadi
- 7) Perubahan pernafasan
- 8) Tachycardia
- 9) Postur abnormal (contoh deserebrasi atau dekortikasi) (Krisanty, 2009).

## **B. *Glasgow Coma Scale (GCS)***

### **1. Pengertian**

Kehilangan kesadaran atau koma terjadi ketika seseorang tetap menutup mata, tidak bersuara dan tidak bergerak oleh rangsang nyeri atau perintah apa pun. Koma biasanya terjadi setelah kerusakan atau disfungsi batang otak yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

Untuk mengukur derajat kesadaran seseorang yang telah mengalami cedera otak traumatis, para dokter dan paramedis menggunakan apa yang disebut Skala Koma Glasgow (*Glasgow Coma Scale/GCS*). Skala yang ditemukan oleh Graham Teasdale dan Bryan J. Jennett dari Universitas Glasgow ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1974 (Majalahkesehatan.com, 2011).

GCS (*Glasgow Coma Scale*) yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, (apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak) dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal yaitu reaksi membuka mata, bicara dan motorik (Nursingbegin.com, 2009).

Skala Koma Glasgow (GCS), memberikan tiga bidang fungsi neurologik, memberikan gambaran pada tingkat responsif pasien dan dapat digunakan dalam

percarian yang luas pada saat mengevaluasi status neurologik pasien yang mengalami cedera kepala. Evaluasi ini tidak dapat digunakan pengkajian neurologik yang lebih dalam, cukup hanya mengevaluasi motorik pasien, verbal dan respon membuka mata. Elemen-elemen ini selanjutnya dibagi menjadi tingkat-tingkat yang berbeda. Masing-masing respon diberikan sebuah angka (tinggi untuk normal dan rendah untuk gangguan), dan penjumlahan dari gambaran ini memberikan indikasi beratnya keadaan koma dan sebuah prediksi kemungkinan yang terjadi dari hasil yang ada. Nilai terendah adalah 3 (respon paling sedikit), nilai tertinggi adalah 15 (paling berespon) (Smeltzer & Bare, 2001).

Semakin rendah nilai GCS, semakin banyak defisit dan semakin tinggi tingkat mortalitasnya. Nilai GCS terbukti konsisten pada regio-regio berbeda dengan mekanisme dan pengobatan yang berbeda. Penilaian ini juga dapat dilakukan di lapangan sebelum dibawa ke rumah sakit (Greenberg, 2008).

## 2. Poin GCS

- a. Buka mata Nilai total : 4
- 1) Buka mata tidak ada meskipun dirangsang : nilai 1
  - 2) Buka mata jika ada nyeri : nilai 2
  - 3) Buka mata jika diajak bicara/ disuruh : nilai 3
  - 4) Buka mata spontan : nilai 4
- b. Respon motorik Nilai total : 6
- 1) Respon motor tidak ada : nilai 1
  - 2) Respon motor ekstensi : nilai 2

- 3) Respon motor fleksi abnormal : nilai 3
- 4) Respon motor menghindari nyeri : nilai 4
- 5) Respon motor tunjuk/lokalisir nyeri : nilai 5
- 6) Respon motor menurut perintah : nilai 6

c. Respon verbal Nilai total : 5

- 1) Respon verbal tidak ada : nilai 1
- 2) Respon verbal tanpa arti : nilai 2
- 3) Respon verbal tak benar : nilai 3
- 4) Respon verbal bicara ngacau : nilai 4
- 5) Respon verbal orientasi baik : nilai 5

(Healthyentusiast.com, 2014).

### 3. Cara penulisan

Cara penulisannya berurutan E-V-M sesuai nilai yang didapatkan. Penderita yang sadar = compos mentis GCSnya 15 (4-5-6), sedang penderita koma dalam, GCSnya 3 (1-1-1). Bila salah satu reaksi tidak bisa dinilai, misal kedua mata bengkok sedang V dan M normal, penulisannya X-5-6. Bila ada trakheostomi sedang E dan M normal, penulisannya 4-X-6. Atau bila tetra parese sedang E dan V normal, penulisannya 4-5-X. Atau jika ditotal skor GCS dapat diklasifikasikan :

- a. Skor 14-15 : compos mentis
- b. Skor 12-13 : apatis
- c. Skor 11-12 : somnolent
- d. Skor 8-10 : stupor

- e. Skor < 5 : koma (Lenterabiru.com, 2010).

Jika dihubungkan dengan kasus trauma kapitis maka didapatkan hasil :

GCS : 13 – 15 = **CKR** (cedera kepala ringan)

GCS : 9 – 12 = **CKS** (cedera kepala sedang)

GCS : 3 – 8 = **CKB** (cedera kepala berat)

#### 4. Kualitas Kesadaran

- a. Compos Mentis (conscious), yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya.
- b. Apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh.
- c. Delirium yaitu gelisah, disorientasi (orang, tempat, waktu) memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang berkhayal.
- d. Somnolen (Obtundasi, Letargi), yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang (mudah dibangunkan) tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberi jawaban verbal.
- e. Stupor (soporo koma), yaitu keadaan seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri.
- f. Coma (comatose), yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun (tidak ada respon kornea maupun reflek muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya) (Ruhyanudini, 2011).

## 5. Cara pengukuran GCS

Hal utama yang harus diperhatikan dalam proses pengukuran GCS adalah tentang ketelitian. Teliti adalah cermat atau seksama, berhati-hati, penuh perhitungan dalam berpikir dan bertindak, serta tidak tergesa-gesa dan tidak ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan. Sikap ketelitian sangat dibutuhkan dalam mencapai hasil yang maksimal. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk bersikap teliti dalam setiap pekerjaan. Allah tidak menyukai makhluknya yang bekerja dengan tergesa-gesa karena bisa menimbulkan kesalahan dan kegagalan dalam mencapai suatu tujuan. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Anbiya'/21: 37, yaitu:

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوهَا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab)-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera. (QS Al-Anbiya'/21: 37)

Adapun langkah-langkah dalam pengukuran GCS adalah:

- a. Pasien dibaringkan di atas tempat tidur
- b. Nilai status pasien, adakah kelainan gawat yang harus ditangani terlebih dahulu/tidak.
- c. Periksa kesadaran pasien dengan GCS (dewasa) dan PCS (anak-anak)
- d. *Glasgow Coma Scale* (GCS) :
  - 1) Eye/mata :
    - a) saat dokter mendatangi pasien, pasien spontan membuka mata dan memandang

dokter : skor 4.

- b) pasien membuka mata saat namanya dipanggil atau diperintahkan untuk membuka mata oleh dokter : skor 3.
- c) pasien membuka mata saat dirangsang nyeri (cubitan) : skor 2.
- d) pasien tidak membuka mata dengan pemberian rangsang apapun: skor 1.

2) Verbal :

- a) pasien berbicara secara normal dan dapat menjawab pertanyaan dokter dengan benar (pasien menyadari bahwa ia ada di rumah sakit, menyebutkan namanya, alamatnya, dll) : skor 5.
- b) pasien dapat berbicara normal tapi tampak bingung, pasien tidak tahu secara pasti apa yang telah terjadi pada dirinya, dan memberikan jawaban yang salah saat ditanya oleh dokter : skor 4.
- c) pasien mengucapkan kata “jangan/stop” saat diberi rangsang nyeri, tapi tidak bisa menyelesaikan seluruh kalimat, dan tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dari dokter : skor 3.
- d) pasien tidak bisa menjawab pertanyaan sama sekali, dan hanya mengeluarkan suara yang tidak membentuk kata (bergumam) : skor 2.
- e) pasien tidak mengeluarkan suara walau diberi rangsang nyeri (cubitan) : skor 1.

3) Motorik :

- a) pasien dapat mengikuti perintah dokter, misalkan “Tunjukkan pada saya 2 jari!” : skor 6.
- b) pasien tidak dapat menuruti perintah, tapi saat diberi rangsang nyeri (penekanan

ujung jari/penekanan sternum dengan jari-jari tangan terkepal) pasien dapat melokalisasi nyeri : skor 5.

- c) pasien berusaha menolak rangsang nyeri : skor 4.
- d) saat diberi rangsang nyeri, kedua tangan pasien menggenggam dan di kedua sisi tubuh di bagian atas sternum (posisi dekortikasi) : skor 3.
- e) saat diberi rangsang nyeri, pasien meletakkan kedua tangannya secara lurus dan kaku di kedua sisi tubuh (posisi deserebrasi) : skor 2.
- f) pasien tidak bergerak walaupun diberi rangsang nyeri : skor 1  
(Kedokteran.unsoed.ac.id, 2011).

## **6. Hambatan dalam melakukan GCS**

Skor GCS pada pasien di bawah pengaruh obat/narkoba, memiliki gangguan wicara atau fungsi mata mungkin perlu interpretasi khusus (Majalahkesehatan.com, 2011).

Kesulitan timbul dalam menilai pasien yang diintubasi, disedasi, atau mengalami paralisis sebelum pengukuran GCS. GCS tidak menilai tanda-tanda fokal atau lateralisasi (Greenberg, 2008).

## **C. Pengetahuan**

### **1. Pengertian**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *Knowledge*. Dalam *encyclopedia of philosophy* dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar sedangkan secara terminologi, menurut Sidi Gazalba,



pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu (Bakhtiar, 2007).

Pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya) (Taufik, 2007).

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas bayeslin adalah benar atau berguna (Meliono & Irmayanti, 2007).

Menurut Notoadmodjo (2007), Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behavior*). Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi (Damayana, 2013).

Dalam agama islam juga dijelaskan tentang pengetahuan, seperti firman Allah swt yang tercantum dalam QS Az-Zumar/39: 9 yaitu:

..... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya: *“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran”* (QS Az-Zumar/39: 9)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, dan dijelaskan pula bahwa syarat dari belajar atau menerima pelajaran adalah berakal.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan**

Menurut Notoatmodjo (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah :

- a. Faktor internal : faktor dari dalam diri sendiri, misalnya intelegensia dan kondisi fisik
- b. Faktor eksternal : faktor dari luar diri, misalnya keluarga, masyarakat, dan sarana serta faktor pendekatan belajar seperti upaya belajar, misalnya strategi dan metode dalam pembelajaran (Damayana, 2013).

Sedang pada buku lainnya juga dijelaskan bahwa pengetahuan seseorang dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, di antaranya :

- a. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat dapat kita kerucutkan pada sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia.

Secara luas pendidikan mencakup seluruh proses kehidupan individu sejak dalam ayunan hingga liang lahat, berupa interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal maupun informal proses kegiatan pendidikan pada dasarnya melibatkan perilaku individu maupun kelompok. Kegiatan pendidikan formal maupun informal berfokus pada proses mengajar, dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku yaitu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (رواه مسلم)

Terjemahan : “*Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga*” (HR. Muslim)

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa siapa saja yang menuntut ilmu baik itu dengan menempuh pendidikan formal ataupun non formal maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jelas bahwa menuntut ilmu sesuatu yang baik bahkan mulia sehingga Allah akan mengganjar orang-orang yang menuntut ilmu itu sebuah hadiah yang semua orang tentu menginginkannya yaitu surga.

#### b. Media

Media yang secara khusus didesain mencapai masyarakat yang sangat luas. Jadi contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran dan majalah.

#### c. Keterpaparan Informasi

Pengertian informasi menurut *Oxford English Dictionary*, adalah “*that of which one is apprised or told: intelligence, news*”. Kamus lain menyebutkan bahwa

informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Selain itu istilah informasi juga memiliki arti yang lain sebagaimana diartikan oleh RUU teknologi informasi yang mengartikannya sebagai suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu (Meliono & Irmayanti (2007).

d. Pengalaman

Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Fitriani (2013), Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

e. Usia

Makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun (Singgih, 1998 dalam Hendra AW, 2008). Selain itu Abu Ahmadi, dalam Hendra AW (2008) juga mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur (Fitriani, 2013).

Penelitian terhadap otak manusia menunjukkan terjadinya penurunan ukuran otak sepanjang hidup, yang dimulai dari waktu bayi dilahirkan. Akan tetapi meskipun terjadi perubahan anatomis dan fisiologis otak, namun penelitian membuktikan bahwa hanya terjadi sedikit penurunan fungsi intelektual yang disebabkan oleh penuaan.

Pengujian intelegensia menunjukkan suatu pola perubahan (penurunan) intelektual akibat pertambahan umur, dan umumnya dimulai setelah berumur 60 tahun.

Sebagian besar orang mengalami peningkatan masalah mengingat informasi (memori) pada waktu mereka menua, terutama kemampuan untuk mengingat pengalaman yang belum lama berlangsung. Penurunan kemampuan tersebut terjadi baik dalam hal kemampuan menghimpun informasi baru dan kemampuan untuk “mengambil” informasi yang telah ada dari “tempat penyimpanan memori” (otak). Selain itu, terjadi juga sedikit penurunan kemampuan untuk menyimpan informasi yang baru saja dipelajarinya.

Proses mempelajari informasi baru dan “memberi kode” (*encoding*) informasi tersebut untuk disimpan memerlukan waktu lebih lama pada individu yang mengalami penuaan, karena terjadinya penurunan efisiensi transmisi syaraf dan karena kurangnya sensori yang membatasi kemampuan seseorang secara cepat dan tepat memandang informasi untuk dipelajari (Muchtadi, 2009).

Menyangkut tentang usia seseorang dalam aspek pengetahuan, maka dalam agama islam juga ikut disinggung di antaranya tentang sebuah hadits tapi sebagian

ulama juga mengatakan bahwa itu bukan hadits yang sahih karena sanadnya lemah tetapi sebuah nasihat, tetapi meskipun demikian itu seringkali diucapkan oleh ulama dalam berdakwah yaitu :

أَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Terjemahan : *“Carilah ilmu sejak dari buaian hingga ke liang lahat”*

Berdasarkan hadits/nasehat di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menuntut ilmu itu tidak memiliki batasan dalam hal usia. Mulai dari bayi sampai dengan tua nanti kita masih dapat menuntut ilmu terlebih - lebih lagi jika kita masih dalam usia muda karena masih mempunyai daya intelektual yang baik.

f. Lama kerja

Menurut Notoatmodjo (2003), Lama kerja merupakan waktu dimana seseorang bekerja. Makin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Pengalaman seseorang mempunyai dampak yang dalam bersikap positif maupun negatif. Mengingat pengalaman banyak atau lama akan mempunyai kecenderungan untuk bertindak lebih baik dari yang baru. Masa kerja 5-10 tahun mempunyai sikap positif mengingat puncak masa kerja seseorang pada masa tersebut (Fitriani, 2013).

### 3. Tingkatan pengetahuan

Menurut Notoatmodjo, Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yakni :

a. Tahu (*know*)

Tahu sebagai tingkatan yang paling rendah diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar. Dengan kata lain dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan. Metode, prinsip, dan sebagainya dalam suatu situasi.

d. Analisis (*analysis*)

Analisi adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen dalam suatu struktur organisasi masih saling berkaitan.

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis diartikan sebagai suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah merupakan kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori yang telah ada.

f. Evaluasi (*evaluating*)

Evaluating ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 2007).

#### **4. Pengukuran pengetahuan**

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden (Notoatmodjo, 2007). Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan domain pengukuran tingkat pengetahuan yang ingin diukur. (Damayana, 2013).

Dalam agama islam, banyak dalil-dalil tentang ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan, seperti potongan ayat berikut dalam QS. Al-Mujaadilah/58: 11 yaitu :




.....يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : ".....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"

(QS. Al-Mujaadilah/58: 11)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman serta orang-orang yang berilmu. Jadi jelas bahwa dalam agama orang-orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai kedudukan yang spesial di hadapan Allah SWT sehingga derajat mereka akan ditinggikan beberapa derajat dibandingkan dengan yang lainnya.

#### D. Kerangka Konsep



Keterangan :

: Diteliti

: Tidak diteliti

**Gambar 1.** Kerangka Konsep

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. *Desain Penelitian*

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau informasi yang jelas mengenai tingkat pengetahuan perawat dalam penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) pada pasien trauma capitis di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar.

#### B. *Tempat dan Waktu Penelitian*

##### 1. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar.

##### 2. Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 3-6 Juli 2014.

#### C. *Populasi dan Sampel Penelitian*

##### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Hidayat, 2009).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat yang bekerja di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2009).

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2008).

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah semua perawat yang bekerja di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar yang berjumlah 23 orang.

### **D. Teknik Sampling**

Teknik pengambilan sampel dengan Sampling Jenuh atau total sampling. Cara pengambilan sampel ini dengan mengambil semua anggota populasi menjadi sampel (Hidayat, 2009).

Responden yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Kriteria Inklusi

- a. Perawat yang bersedia menjadi responden
- b. Perawat yang terdaftar di bagian ketenagaan sebagai perawat di ruangan intensif rawat darurat

#### 2. Kriteria Eksklusi

- a. Perawat yang sedang cuti/pendidikan
- b. Perawat yang sedang tidak di tempat saat dilakukan penelitian

### **E. Sumber Data**

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri baik secara observasi, wawancara dan kuesioner.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain khususnya dari RSUD Labuang Baji.

### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan cara menggunakan angket/kuesioner. Menurut Hidayat (2008) Angket/kuesioner merupakan alat ukur berupa angket atau kuesioner dengan beberapa pertanyaan. Dan menurut Nasution (2012) Angket pada umumnya meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden dan juga mengenai pendapat atau sikap.

Menurut Tiro (2009) Angket biasanya terdiri atas sejumlah pernyataan yang harus dinilai atau pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Angket dibicarakan dengan memusatkan perhatian pada masalah yang ingin dipecahkan. Adapun jenis kuesioner dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

#### 1. Kuesioner I

Kuesioner untuk karakteristik responden yang terdiri dari 7 item yaitu: nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama kerja dan pengalaman (pernah atau tidaknya melakukan penilaian GCS).

## 2. Kuesioner II

Kuesioner untuk tingkat pengetahuan perawat mengenai penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS). Untuk mengetahui gambaran pengetahuan responden tentang penilaian GSC pada pasien trauma capitis digunakan skala Guttman. Skala ini merupakan skala yang bersifat tegas dan konsisten dengan memberikan jawaban yang tegas seperti jawaban dari pertanyaan/ Pernyataan: ya dan tidak, positif dan negatif, setuju dan tidak setuju, benar dan salah. Skala Guttman ini pada umumnya dibuat seperti *checklist* dengan interpretasi penelitian, apabila skor benar nilainya 1 dan apabila salah nilainya 0.

### **G. Pengolahan Data**

#### 1. Penyuntingan data (*editing*)

Setelah data terkumpul maka dilakukan *editing* atau penyunting dan peneliti memeriksa kelengkapan kuesioner yang telah diisi oleh responden.

#### 2. Pengkodean (*coding*)

Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data yaitu dengan melakukan pengkodean pada daftar pertanyaan yang telah diisi untuk setiap jawaban responden.

#### 3. Tabulasi

Setelah dilakukan pengkodean kemudian data dimasukkan ke dalam tabel untuk memudahkan penganalisaan data.

## H. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa univariate (Analisis Deskriptif) yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya analisa ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari setiap variabel (Notoatmodjo, 2010 dalam Fitriani, 2013).

Menurut Riwidikdo, 2007 (dalam Subekti, 2012), rumus untuk mengukur tingkat pengetahuan, sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Skore} = \frac{\text{Skor yang dperoleh responden}}{\text{Total skor maksimal yang seharusnya diperoleh}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Rumus} \quad : P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan : P = Presentase

F = Jumlah Jawaban Benar

N = Jumlah Soal

100% = Bilangan Ketepatan

Menurut Arikunto, dalam Sitompul (2012) mengemukakan bahwa untuk mengetahui secara kualitas tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi 3 tingkatan yaitu :

1. Tingkat pengetahuan baik bila skor atau nilai 76-100 %
2. Tingkat pengetahuan cukup bila skor atau nilai 60-75%
3. Tingkat pengetahuan buruk bila skor atau nilai < 60 %

## **I. Etika Penelitian**

Menurut Yurisa (2008) dalam bukunya Etika Penelitian Kesehatan, bahwasanya Komite Nasional Etika Penelitian telah membagi empat etika yang harus ada dalam melakukan penelitian kesehatan yaitu :

### 1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*)

### 2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

### 3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

### 4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Karakteristik Responden

Penelitian ini mengenai gambaran tingkat pengetahuan perawat terhadap penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS) pada pasien trauma capitis di ruang instalasi rawat darurat RSUD Labuang Baji Makassar, yang dimulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 7 Juli 2014. Perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 23 orang. Responden diberi pertanyaan dalam bentuk angket (kuesioner). Data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

##### a. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 5.1

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2014

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
DIII	9	39,13 %
DIV	1	4,34 %
S1	9	39,13 %
S1+Profesi	4	17,39 %
Total	23	100 %

*Sumber : Data Primer 2014*

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian pada tabel 5.1 di atas, dapat dilihat bahwa kelompok terbesar adalah responden dengan tingkat pendidikan DIII dan S1

yang jumlahnya sama banyak yaitu 9 responden (39,13 %), dan yang terendah adalah DIV yang hanya terdapat 1 responden (4,34 %).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 5.2  
Distribusi Responden Berdasarkan Usia di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD  
Labuang Baji Makassar Tahun 2014

Usia	Frekuensi	Presentase
21 – 34 Tahun	17	73,91 %
35 – 65 Tahun	6	26,08 %
Total	23	100 %

*Sumber : Data Primer 2014*

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian pada tabel 5.2 di atas, dapat dilihat bahwa responden dengan kelompok terbanyak adalah usia 21 – 34 tahun yaitu sebanyak 17 responden (73,91 %), sedangkan kelompok usia 35 – 65 tahun hanya sebanyak 6 responden (26,08 %).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja

Tabel 5.3  
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja di Ruang Instalasi Rawat Darurat  
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2014

Lama Kerja	Frekuensi	Presentase
> 5 Tahun	15	65,21 %
< 5 Tahun	8	34,78 %
Total	23	100 %

*Sumber : Data Primer 2014*

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian pada tabel 5.3 di atas, dapat dilihat bahwa kelompok terbesar adalah perawat yang mempunyai lama kerja > 5 tahun yaitu sebanyak 15 responden (65,21 %), sedangkan yang terendah adalah yang memiliki lama kerja < 5 tahun yaitu sebanyak 8 responden (34,78 %).

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman

Tabel 5.4  
Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2014

<b>Pengalaman (Pernah Melakukan Pemeriksaan GCS)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	18	78,26 %
Tidak	5	21,73 %
Total	23	100 %

*Sumber : Data Primer 2014*

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian pada tabel 5.4 di atas, dapat dilihat bahwa kelompok terbesar adalah perawat yang pernah melakukan pemeriksaan GCS yaitu sebanyak 18 responden (78,26 %), sedangkan yang terendah adalah yang tidak pernah melakukan pemeriksaan GCS yaitu sebanyak 5 responden (21,73 %).

## 2. Karakteristik Tingkat Pengetahuan Perawat

### a. Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Pendidikan

Tabel 5.5  
Tingkat Pengetahuan Responden Berdasarkan Pendidikan di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2014

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
<b>DIII</b>		
- Baik	2	8,69 %
- Cukup	7	30,43 %
- Kurang	-	-
<b>DIV</b>		
- Baik	1	4,34 %
- Cukup	-	-
- Kurang	-	-
<b>S1</b>		
- Baik	2	8,69 %
- Cukup	7	30,43 %
- Kurang	-	-
<b>S1+Profesi</b>		
- Baik	-	-
- Cukup	4	17,39 %
- Kurang	-	-
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian pada tabel 5.5 di atas, dapat dilihat bahwa kelompok terbesar adalah responden yang memiliki pengetahuan cukup yaitu

sebanyak 18 responden (78,26 %), yang terdiri atas 7 responden dengan pendidikan DIII (30,43 %), 7 responden dengan pendidikan S1 (30,43 %) dan 4 responden dengan pendidikan S1+Profesi (17,39 %), sedangkan yang terendah adalah responden yang memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 5 responden (21,72 %) yang terdiri atas 2 responden dengan pendidikan DIII (8,69 %), 1 responden dengan pendidikan DIV (4,34) dan 2 responden dengan pendidikan S1 (8,69).

b. Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Usia

Tabel 5.6  
Tingkat Pengetahuan Responden Berdasarkan Usia di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2014

Usia	Frekuensi	Presentase
21 – 34 Tahun		
- Baik	2	8,69 %
- Cukup	15	65,21 %
- Kurang	-	-
35 – 65 Tahun		
- Baik	3	13,04 %
- Cukup	3	13,04 %
- Kurang	-	-
Total	23	100 %

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian pada tabel 5.6 di atas, dapat dilihat bahwa kelompok tertinggi adalah responden dengan tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 18 responden (78,26 %) yang terdiri atas 15 responden usia 21 – 34 tahun (65,21 %) dan 3 responden usia 35 – 65 tahun (13,04 %), sedangkan yang terendah

adalah responden dengan tingkat pengetahuan baik yaitu sebanyak 5 responden (21,73 %) yang terdiri atas 2 responden usia 21 – 34 tahun (8,69 %) dan 3 responden usia 35 – 65 tahun (13,04 %).

c. Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Lama Kerja

Tabel 5.7  
Tingkat Pengetahuan Responden Berdasarkan Lama Kerja di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2014

Lama Kerja	Frekuensi	Presentase
> 5 Tahun		
- Baik	5	21,73 %
- Cukup	10	43,47 %
- Kurang	-	-
< 5 Tahun		
- Baik	-	-
- Cukup	8	34,78 %
- Kurang	-	-
Total	23	100 %

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian pada tabel 5.7 di atas, dapat dilihat bahwa kelompok tertinggi adalah responden dengan tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 18 responden (78,26 %) yang terdiri atas 10 responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun (43,47 %) dan 8 responden dengan lama kerja kurang dari 5 tahun (34,78 %), sedangkan yang terendah adalah responden dengan tingkat pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 5 responden (21,73 %) yang semuanya adalah responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun.

## d. Tingkat Pengetahuan Perawat berdasarkan Pengalaman

Tabel 5.8  
Tingkat Pengetahuan Responden Berdasarkan Pengalaman di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2014

Pengalaman (Pernah Melakukan Pemeriksaan GCS)	Frekuensi	Presentase
Ya		
- Baik	5	21,73 %
- Cukup	13	56,52 %
- Kurang	-	-
Tidak		
- Baik	-	-
- Cukup	5	21,73 %
- Kurang	-	-
Total	23	100 %

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian pada tabel 5.8 di atas, dapat dilihat bahwa kelompok tertinggi adalah responden dengan tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 18 responden (78,26 %) yang terdiri atas 13 responden yang pernah melakukan pemeriksaan GCS (56,52 %) dan 5 responden yang tidak pernah melakukan pemeriksaan GCS (21,73 %). Sedangkan yang terendah adalah responden yang dengan tingkat pengetahuan baik yaitu sebanyak 5 responden (21,73 %) yang semua adalah responden yang pernah melakukan GCS.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar tentang pengetahuan perawat tentang pemeriksaan *Glasgow Coma Scale* (GCS) didapatkan hasil secara umum bahwa dari total 23 perawat yang menjadi responden, kelompok terbesar adalah responden dengan tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 18 responden (78,26 %) dan yang terendah adalah responden dengan tingkat pengetahuan baik yaitu sebanyak 5 responden (21,73 %). Dalam penelitian ini tidak didapatkan adanya responden yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang. Adapun dari total 23 responden tersebut terdapat kategori yang mempunyai pendidikan, usia, lama kerja serta pengalaman tentang GCS yang berbeda-beda.

### **1. Pengetahuan perawat berdasarkan pendidikan**

Perawat yang berpendidikan S1+Profesi semuanya berada pada kategori tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 4 responden (17,39 %). Perawat yang berpendidikan S1 yang termasuk dalam tingkat pengetahuan baik sebanyak 2 responden (8,69 %) dan untuk tingkat pengetahuan cukup sebanyak 7 responden (30,43 %). Perawat yang berpendidikan DIV hanya terdapat 1 dan termasuk dalam kategori tingkat pengetahuan baik (17,39 %). Sedangkan untuk pendidikan DIII, responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik hanya ada 2 responden (8,69 %) sedangkan untuk tingkat pengetahuan cukup terdapat 7 responden (30,43 %).

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah berlangsung seumur hidup. Menurut batasan ini proses pendidikan itu tidak hanya sampai pada kedewasaan saja,



melainkan berlangsung seumur hidup. Tingkat pendidikan menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik pula pengetahuannya.

Menurut Arfida (2003) Salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas atau kinerja perawat adalah pendidikan formal perawat. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran tugas. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi produktivitas kerja (Faizin, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak terdapat adanya responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, hanya saja jumlah responden dengan pengetahuan cukup lebih banyak dari pada responden dengan tingkat pengetahuan baik. DIII dan S1 merupakan penyumbang terbanyak dalam kategori tingkat pendidikan cukup yaitu masing-masing 7 responden (30,43 %).

Menurut asumsi peneliti, DIII merupakan tingkat pendidikan terendah dari semua tingkat pendidikan responden yang diteliti, yang lama pendidikan formal tersebut selama 6 semester (3 tahun) yang lebih singkat dari pada tingkat pendidikan lainnya. Sehingga jumlah pelajaran yang diajarkan pada saat melakukan pendidikan juga lebih sedikit dibandingkan pendidikan di atasnya. Sedangkan S1 merupakan pendidikan dengan minimal lama pendidikan yaitu 8 semester (4 tahun) yang umumnya lebih berfokus pada teori ketimbang praktek yang terkadang hal yang

sudah dipelajari tapi tidak diaplikasikan/praktekkan bisa berakibat pada lupa. Atau mungkin saja karena faktor-faktor lain selain dari pendidikan yang mempengaruhi hasil dari penelitian ini semisal nya yang peneliti juga teliti yaitu usia, lama kerja dan pengalaman. Ataupun dapat juga disebabkan faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sedangkan menurut asumsi peneliti untuk pendidikan DIV yang mempunyai tingkat pengetahuan baik dikarenakan lama pendidikannya lebih lama. DIV adalah lanjutan dari DIII yang lebih lama dengan semester yang bertambah pula yaitu 2 semester (1 tahun). Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih di bangku pendidikan dari pada responden dengan pendidikan DIII dan S1.

Responden dengan pendidikan S1+Profesi yang semuanya termasuk dalam kategori tingkat pengetahuan cukup. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Arfida (2003) karena dari segi pendidikan formal, pendidikan S1+Profesi lebih di atas dalam hal lama pendidikan dibanding DIII, DIV dan S1 sehingga harusnya pengetahuannya juga lebih baik dari responden dengan pendidikan di bawahnya, sehingga penulis berasumsi bahwa pengetahuan responden ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari responden tetapi bisa saja dikarenakan faktor lain misalnya usia, pengalaman dan lama kerja ataupun hal lainnya yang tidak diteliti.

Jadi menurut asumsi peneliti secara umum berdasarkan penjelasan di atas, tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan responden dalam

hal penilaian *Glasgoe Coma Scale* (GCS) meskipun pada beberapa responden tidak ditemukan adanya pengaruh tingkat pendidikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizin (2008) yang menemukan adanya hubungan tingkat pendidikan perawat terhadap kinerja perawat.

## 2. Pengetahuan perawat berdasarkan usia

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, responden usia 21 – 34 adalah penyumbang terbanyak untuk kategori responden dengan tingkat pengetahuan cukup yaitu 15 responden (65,21 %) dan 3 responden (13,04 %) dari kelompok usia 35 – 65 tahun, sedangkan untuk kategori pengetahuan baik terdapat 3 responden (13,04 %) dari kelompok usia 35 – 65 tahun sedang 2 responden (8,69 %) adalah kelompok usia 21 – 34 tahun.

Menurut Notoatmodjo (2005), Usia perawat berpengaruh terhadap pengetahuan perawat di mana usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia semakin akan semakin bertambah pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin bagus. Pada usia pertengahan, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini (Fitriani, 2013).

Menurut asumsi peneliti, banyaknya kelompok usia 21 – 34 tahun yang termasuk dalam kategori tingkat pendidikan cukup karena memang dari 23 responden, 17 di antaranya adalah kelompok usia 21 – 45 tahun. Tapi jika melihat dari responden yang berada dalam kategori tingkat pengetahuan baik maka kelompok usia 35 – 65 tahun lebih banyak dari pada kelompok usia 21 – 34 tahun. Hal ini dapat dikarenakan rata-rata responden kelompok usia 35 – 65 tahun berada pada usia di mana bisa dikatakan sudah lebih dewasa dan lebih matang yang mana diikuti pula dengan kematangan kognitif.

Jadi dapat diasumsikan bahwa tingkatan pengetahuan kadang dipengaruhi oleh usia seseorang. Karena semakin bertambahnya usia, maka bertambah pula kematangan kognitif seseorang. Tapi proses tersebut dapat berhenti dan bahkan mengalami kemunduran jika sampai pada batasan usia tertentu misalnya pada lanjut usia.

### 3. Pengetahuan perawat berdasarkan lama kerja

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa responden dengan tingkat pengetahuan cukup adalah yang terbanyak yaitu 10 responden (43,47 %) dari kelompok responden yang lama kerjanya lebih dari 5 tahun dan 8 responden (34,78 %) dari kelompok responden yang lama kerjanya kurang dari 5 tahun. Adapun untuk responden dengan kategori pengetahuan baik hanya berasal dari kelompok responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 5 responden (21,73 %). Hal tersebut dikarenakan dari 23 responden, 15 di antaranya adalah responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun.

Lama kerja merupakan waktu di mana seseorang bekerja. Makin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Pengalaman seseorang mempunyai dampak yang dalam bersikap positif maupun negatif. Mengingat pengalaman banyak atau lama akan mempunyai kecenderungan untuk bertindak lebih baik dari yang baru. Masa kerja 5-10 tahun mempunyai sikap positif mengingat puncak masa kerja seseorang pada masa tersebut (Notoatmodjo, 2005).

Menurut asumsi peneliti, lama kerja dapat berpengaruh pada pengetahuan seseorang hal ini melihat dari hasil penelitian yang pada kelompok responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun, terdapat 5 responden yang mempunyai pengetahuan baik, tapi hal tersebut tidak ditemukan pada kelompok responden dengan lama kerja kurang dari 5 tahun. Ketika seseorang mempunyai lama kerja yang lama, maka kemungkinan dari hal tersebut adalah dia dapat sesering mungkin mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat yang menyangkut dari pekerjaannya. Berbeda dengan seseorang yang masa kerjanya singkat atau belum lama, tentu kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya juga sedikit. Karena ilmu yang didapatkan akan terjaga atau tetap teringat ketika ilmu tersebut dapat diaplikasikan terlebih lagi dalam hal penilaian GCS. Tapi ilmu yang jarang atau bahkan tidak pernah diaplikasikan sangat memungkinkan untuk terlupa akan ilmu tersebut.

Hal di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizin (2008), yang menyatakan bahwa ada hubungan antara lama kerja perawat terhadap kinerja perawat.

#### 4. Pengetahuan perawat berdasarkan pengalaman

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa jumlah terbanyak responden dengan tingkat pengetahuan cukup adalah responden dari kelompok dengan pengalaman pernah melakukan pengukuran GCS yaitu 13 responden (56,52 %) dan 5 responden (21,73 %) yang berasal dari responden dengan pengalaman tidak pernah melakukan GCS. Tapi dalam kategori tingkat pengetahuan baik, semuanya berasal dari kelompok responden dengan pengalaman pernah melakukan GCS yaitu sebanyak 5 orang (21,73 %).

Menurut Notoatmodjo (2005), Pengalaman adalah guru yang terbaik, demikian bunyi pepatah. Pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

Menurut asumsi peneliti, jika melihat dari jumlah responden yang berpengetahuan baik yang semuanya adalah responden dengan pengalaman pernah melakukan pengukuran GCS, maka hal itu dikarenakan responden yang pernah melakukan penilaian GCS tentu akan lebih paham atau lebih tahu dibandingkan dengan responden yang belum pernah melakukan penilaian GCS. Ilmu yang didapatkan melalui teori ketika dibarengi dengan praktek akan lebih berbekas atau mudah teringat dibandingkan dengan ilmu yang hanya melalui teori saja.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

1. Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan responden dalam hal penilaian *Glasgoe Coma Scale* (GCS) meskipun pada beberapa responden tidak ditemukan adanya pengaruh tingkat pendidikan. Hal tersebut bisa terjadi karena dapat dipengaruhi oleh faktor lain baik yang peneliti ikut teliti ataupun yang tidak diteliti.
2. Tingkatan pengetahuan kadang dipengaruhi oleh usia seseorang. Karena semakin bertambahnya usia, maka bertambah pula kematangan kognitif seseorang. Tapi proses tersebut dapat berhenti dan bahkan mengalami kemunduran jika sampai pada batasan usia tertentu misalnya pada lanjut usia.
3. Lama kerja dapat berpengaruh pada pengetahuan seseorang hal ini melihat dari hasil penelitian yang pada kelompok responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun, terdapat 5 responden yang mempunyai pengetahuan baik, tapi hal tersebut tidak ditemukan pada kelompok responden dengan lama kerja kurang dari 5 tahun. Ketika seseorang mempunyai lama kerja yang lama, maka kemungkinan dari hal tersebut adalah dia dapat sesering mungkin mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat yang menyangkut dari pekerjaannya. Berbeda dengan seseorang yang masa kerjanya singkat atau belum lama, tentu kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya juga sedikit.

4. Pengalaman berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan responden, hal itu bisa dilihat dari jumlah responden yang berpengetahuan baik yang semuanya adalah responden dengan pengalaman pernah melakukan pengukuran GCS. Hal itu dikarenakan responden yang pernah melakukan penilaian GCS tentu akan lebih paham atau lebih tahu dibandingkan dengan responden yang belum pernah melakukan penilaian GCS. Ilmu yang didapatkan melalui teori ketika dibarengi dengan praktek akan lebih berbekas atau mudah teringat dibandingkan dengan ilmu yang hanya melalui teori saja.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan bagi institusi agar dapat menambah atau menyediakan sarana berupa bahan bacaan mengenai keterampilan perawat termasuk tentang penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS).
2. Diharapkan bagi instansi rumah sakit agar dapat lebih meningkatkan pengetahuan perawat utamanya dalam hal keterampilan perawat yang dapat berupa pelatihan agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dan memuaskan pasien.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara mengkaji lebih dalam lagi tentang hal ini misalnya tentang hubungan, pengaruh dan sebagainya. Diharapkan dapat membuat suatu metode pengukuran pengetahuan yang lebih efektif dibandingkan kuesioner karena saat mengisi kuesioner bisa saja responden mengisinya dengan asal-asalan saja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andri, "Cedera Kepala Bisa Bikin Gangguan Jiwa". *Kompas Online*. 6 Juli 2011. <http://health.kompas.com/read/2011/07/06/0538596/Cedera.Kepala.Bisa.Bikin.Gangguan.Jiwa> (10 Februari 2014)
- Anggi, Claudia. "Kurangi Angka Kecelakaan Mulai Dari Diri Sendiri". *Tanya Dok.com*. 16 November 2012. <http://Www.Tanyadok.Com/Berita/Kurangi-Angka-Kecelakaan-Mulai-Dari-Diri-Sendiri> (11 februari 2014)
- Ariani, Tutu April. *Sistem Neurobehaviour*. Jakarta: Salemba Medika, 2013.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu Edisi 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bustan, M. N. *Epidemiologi : Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Corwin, Elizabeth J. *Buku Saku Patofisiologi, Edisi 3*. Jakarta :EGC, 2009.
- Damayana, Sri Nur. "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Orang Tua dengan Reaksi Sibling Rivalry pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Batua Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Depkes RI. "Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012". *Depkes.go.id*. [http://www.depkes.go.id/downloads/PROFIL\\_KES\\_PROV\\_INSI\\_2012/26\\_Profil\\_Kes.Prov.SulawesiSelatan\\_2012.pdf](http://www.depkes.go.id/downloads/PROFIL_KES_PROV_INSI_2012/26_Profil_Kes.Prov.SulawesiSelatan_2012.pdf) (2 Februari 2014)
- Fitriani. "Gambaran Pengetahuan Perawat tentang Tatalaksana Diare di Ruang Perawatan Anak RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan" *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, 2013.
- Faizin & Winarsih. "Hubungan Tingkat Pendidikan dan Lama Kerja Perawat dengan Kinerja Perawat Di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali". <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/499/3g.pdf> (21 Juli 2014)
- Ginberg, Lionel. *Lecture Notes: Neurologi, Edisi 8*. Jakarta : Erlangga, 2008.
- "Glasgow Coma Scale". *Wikipedia the free encyclopedia*. [http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Skala\\_Koma\\_Glasgow&oldid=7020473](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Skala_Koma_Glasgow&oldid=7020473) (20 februari 2014)

- Grace & Borley. *At a Galance Ilmu Bedah Edisi 3*. Jakarta. Erlangga, 2007.
- Greenberg, Michael I. *Teks-atlas Kedokteran Darurat*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Hidayat, A.Aziz Alimul. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis data*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Junaidi, Iskandar. *Pedoman Pertolongan Pertama yang Harus Dilakukan Saat Gawat Darurat Medis Edisi 1*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2011.
- Kumar, Vinai. Cotran, S Ramsey. Robbins, L Stanley. *Buku Ajar Patologi Robbins, Edisi 7, Volume 2*. Jakarta: EGC, 2007.
- Kristanty, Paula. *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat*. Jakarta : Trans Info Media, 2009.
- Machfoedz, Ircham. *Cara membuat Kuesioner & Panduan Wawancara (alat Ukur Penelitian Bidang Kesehatan, Kedokteran, Keperawatan, dan Kebidanan)*. Yogyakarta: Firamaya, 2010.
- Mansjoer, Arif. *Kapita Selekta Kedokteran Edisi 3 Jilid 2*. Jakarta : Media Aesculapius, 2000.
- Meliono & Irmayanti. *MPKT I*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2007.
- Muchtadi, Deddy. *Gizi Anti Penuaan Dini*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Nasutin, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Pemerintah RI, *UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & UU RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Surabaya: Anfaka Perdana, 2011.
- “Pemeriksaan GCS” *Nursing Begin.com*. 23 April 2009. <http://nursingbegin.com/tag/glasgow-coma-scale/> (14 februari 2014)
- “Pemeriksaan Neurologis Fungsi Cerebral”, *Lentera Biru.com*. 19 Januari 2010. <http://www.lenterabiru.com/2010/01/glasgow-coma-scale.htm> (14 Februari 2014)
- Permata, Titis jati. “Kasus Cedera Otak Bertambah, RSUD Dr Soetomo Butuh Trauma Center”. *Surabaya Tribun-news.com*. 14 September 2011.

<http://surabaya.tribunnews.com/2011/09/14/kasus-cedera-otak-bertambah-rsu-dr-soetomo-butuh-trauma-center> (10 Februari 2014)

Purwoko, Susi. *Pertolongan Pertama dan RJP pada Anak*. Jakarta: Arcan, 2006.

Retnaningsih, “Bahaya Cedera Kepala”. *Suara Merdeka.com*. 10 Juli 2013. <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/07/10/230419> (10 Februari 2014)

RS Panti Rapih. “Cedera Kepala”. *Panti Rapih.or.id*. <http://www.pantirapih.or.id/index.php/artikel/umum/139-cedera-kepala> (10 Februari 2014)

Ruhyandudin, Faqih. “Pemeriksaan Neurologis”. Faqudin Staff.umm.ac.id. 2011. <http://faqudin.staff.umm.ac.id/files/2011/09/PEMERIKSAAN-NEUROLOGIS.pdf> (14 Februari 2014)

Russeng, Syamsiar S. *Kelelahan Kerja dan Lalu Lintas*. Yogyakarta: Ombak, 2011.

Salma, “Apakah Sakala Koma Glasgow?”, *Majalah Kesehatan.com*, 11 Maret 2011. <http://majalahkesehatan.com/apakah-skala-koma-glasgow/> (20 Februari 2014)

Siswanto, Susila, Suyanto. *Metodologi Kedokteran dan Kesehatan*. Yogyakarta: Bursa Ilmu, 2013.

Sitompul, MT. “Pengetahuan”. *Universitas Sumatra Utara*. 2012. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31806/4/Chapter%20II.pdf> (17 Mei 2014)

Smeltzer, Suzanne C & Bare, Brenda G. *Keperawatan Medikal-Bedah Brunner & Suddarth*. Jakarta: EGC, 2001.

Subekti, Nia. “Tingkat Pengetahuan Akseptor KB AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim) tentang AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim) di BPS Yayuk Desy Desa Jeblogan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”. *STIK Kususma Husada*. 2012. <http://stikeskusumahusada.ac.id/digilib/files/disk1/2/01-gdl-niasubekti-51-1-niasube-5.pdf> (17 Mei 2014)

Speer, Kathleen Morgan. *Rencana Asuhan Keperawatan Pediatrik dengan Clinical Pathways*. Jakarta : EGC, 2007.

Sukinto. “Cedera Kepala – Apa Saja Yang Perlu Kita Ketahui?”. *Dokter Sehat.com*. 13 Juli 2013. <http://doktersehat.com/cedera-kepala-apa-saja-yang-perlu-kita-ketahui/> (14 Februari 2014)

Taufik, M. *Prinsip-prinsip Promosi Kesehatan dalam Bidang Keperawatan*. Jakarta : CV. Infomedika, 2007.

Thianti Sylviningrum, "Pemeriksaan GCS dan PCS". *Kedokteran Unsoed.ac.id*  
<http://kedokteran.unsoed.ac.id/Files/Kuliah/modul%20/Ganjil%20II%20-%20Pemeriksaan%20GCS%20dan%20PCS.pdf> (11 februari 2014)


Thygerson, *Pertolongan Pertama*. Jakarta : EGC, 2011.

Wibowo, Hardianto. *Pencegahan dan Penatalaksanaan Cedera Olahraga Edisi 2*. Jakarta : EGC, 2007.

Widyanti, Sukma Nolo. *Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012.

Yunisa, Ade. *Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*. Jakarta: Victory Inti Cipta, 2010.

Yurisa, Wella. *Etika Penelitian Kesehatan*. Riau: FKUR, 2008.



### MASTER TABEL PENELITIAN

No.	Inisial	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Kerja	Pengalaman	Presentase	Ket
1	Lh	35	2	4	1	1	65,38 %	Cukup
2	Ms	31	1	1	1	1	65,38 %	Cukup
3	A	32	1	3	1	1	65,38 %	Cukup
4	Rs	36	2	3	2	1	76,92 %	Baik
5	Is	33	2	3	1	1	65,38 %	Cukup
6	Um	35	2	3	1	1	65,38 %	Cukup
7	R	30	1	1	1	1	65,38 %	Cukup
8	Y	45	2	2	1	1	84,61 %	Baik
9	Rs	38	2	3	1	1	80,76 %	Baik
10	Ad	30	1	1	1	1	80,76 %	Baik
11	A	30	1	4	2	1	65,38 %	Cukup
12	B	26	2	1	2	2	65,38 %	Cukup
13	Wh	33	2	1	1	1	76,92 %	Baik
14	Sy	33	1	1	1	1	73,07 %	Cukup
15	M	29	2	4	2	1	69,23 %	Cukup
16	S	32	1	1	1	1	65,38 %	Cukup
17	I	24	2	1	2	2	61,53 %	Cukup
18	H	35	2	3	2	2	65,38 %	Cukup
19	Ir	23	2	3	2	2	65,38 %	Cukup
20	R	27	2	4	1	1	65,38 %	Cukup
21	S	29	2	1	2	2	65,38 %	Cukup
22	Ra	35	1	3	1	1	73,07 %	Cukup
23	H	34	2	3	1	1	73,07 %	Cukup

Keterangan :

Jenis Kelamin: 1 = Laki-laki                      Lama Kerja: 1 = > 5 Tahun

2 = Perempuan                                      2 = < 5 Tahun

Pendidikan: 1 = DIII                                      Pengalaman: 1 = Pernah

2 = DIV    2 = Tidak Pernah

3 = S1

4 = S1+Profesi

## LEMBAR KUESIONER

Judul penelitian : Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat Terhadap Penilaian Glasgow Coma Scale (GCS) pada Pasien Trauma Capitis di Ruang Instalasi Rawat Darurat RSUD Labuang Baji Makassar

Tanggal Penelitian :

No. Kode Responden :

### PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dan pahami tiap pernyataan dan jawablah dengan menyilang (X) kotak-kotak sesuai jawaban yang dipilih.
2. Jangan sampai ada pernyataan yang terlewatkan

**Terima kasih dan selamat mengerjakan... !!!**

### I. Data Demografi

1. Inisial Responden :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :  

<input type="checkbox"/> SPK	<input type="checkbox"/> S1
<input type="checkbox"/> DIII	<input type="checkbox"/> S2
<input type="checkbox"/> DIV	<input type="checkbox"/> S3
5. Lama Bekerja :  < 5 tahun  5 tahun atau lebih
6. Pernah Melakukan GCS sebelumnya :  Ya  Tidak

## II. Pertanyaan tentang GCS

No.	Pertanyaan	Jawaban	
	Dasar GCS	Benar	Salah
1.	GCS adalah Glasgow Coma Scale atau Skala Koma Glasgow yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran secara kualitatif		
2.	GCS adalah yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, (apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak) dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan		
3.	Respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal yaitu reaksi membuka mata/eye (E), gerak/motorik (M) dan bicara/verbal (V)		
4.	Nilai maksimal GCS adalah 15 dan nilai minimalnya adalah 0		
5.	GCS : 13 – 15 = <b>CKR</b> (cedera kepala ringan), GCS : 9 – 12 = <b>CKS</b> (cedera kepala sedang), GCS : 3 – 8 = <b>CKB</b> (cedera kepala berat)		
6.	Kesulitan timbul dalam menilai pasien yang dalam pengaruh alkohol atau obat, diintubasi, disedasi, atau mengalami paralisis sebelum pengukuran GCS		
7.	Cara penulisan GCS dan PGCS/PCS yaitu berurutan E-V-M sesuai nilai yang didapatkan, ataupun bisa juga ditulis secara acak		
8.	Apabila salah satu reaksi/respon tidak dapat dinilai maka ditulis dengan X misalnya x-5-6 atau 4-x-6 atau 4-5-x		
	<b>Respon Mata/Eye (E)</b>	<b>Benar</b>	<b>Salah</b>
9.	Nilai maksimal pada respon respon mata/eye (E) adalah 4		
10.	Pemeriksa memanggil nama pasien/memerintahkan pasien untuk membuka mata : skor 4		
11.	Pemeriksa mendekati pasien dan pasien spontan membuka mata dan memandang pemeriksa : skor 3		
12.	Pemeriksa memberi rangsang nyeri berupa cubitan, pasien akan membuka mata : skor 2		

13.	Pemeriksa memberi rangsang apapun (suara keras/cubitan) pasien tidak membuka mata : skor 1		
	<b>Respon Bicara/Verbal</b>	<b>Benar</b>	<b>Salah</b>
14.	Nilai maksimal pada respon respon bicara/verbal (V) adalah 5		
15.	Pemeriksa menanyakan orientasi pasien (tempat, orang, waktu), pasien menjawab dengan jelas, benar, dan cepat : skor 5		
16.	Pemeriksa memberi pertanyaan tapi pasien tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan dan tidak dapat menyelesaikan seluruh kalimat : skor 4		
17.	Pemeriksa menanyakan orientasi pada pasien, pasien dapat menjawab tapi bingung, tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya : skor 3		
18.	Pemeriksa memberi pertanyaan dan pasien hanya bisa bergumam : skor 2		
19.	Pemeriksa memberikan rangsang tapi pasien tidak mengeluarkan suara /tidak ada respon : skor 1		
	<b>Respon Bergerak/Motorik</b>	<b>Benar</b>	<b>Salah</b>
20.	Nilai maksimal pada respon respon bergerak/motorik (M) adalah 6		
21.	Pemeriksa memberi perintah dan pasien dapat melaksanakannya : skor 6		
22.	Pemeriksa memberi rangsang nyeri dan pasien berusaha menolaknya : skor 5		
23.	Pemeriksa memberi perintah, tapi pasien mangabaikannya, diberi rangsang nyeri pasien dapat melokalisir nyeri : skor 4		
24.	Pemeriksa memberi rangsang nyeri, kedua tangan pasien menggenggam dan di kedua sisi tubuh di bagian atas sternum (posisi dekortikasi) : skor 3.		
25.	Pemeriksa memberi rangsang nyeri, pasien meletakkan kedua tangannya secara lurus dan kaku di kedua sisi tubuh (posisi deserebrasi) : skor 2.		
26.	Pemeriksa memberi rangsang apapun pasien tidak bergerak/tidak berespon : skor 1		



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ardhyanzah Ansar lahir di Seppong, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 03 April 1992. Penulis merupakan anak dari pasangan Ansar dan St. Maryam. Penulis juga merupakan pertama dari tiga bersaudara. Penulis pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD No. 23 Inpres Seppong, dan tamat pada tahun 2004. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke MTs. Pesantren Pondok Madinah Makassar, tetapi dua tahun kemudian pindah ke SMP Negeri 3 Majene dan lulus pada tahun 2007. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMK Bina Bangsa Majene yang mana penulis mengambil jurusan Keperawatan dan selesai pada tahun 2010. Penulis akhirnya memilih melanjutkan jenjang pendidikannya di Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama di bangku kuliah, penulis juga aktif dalam beberapa organisasi baik organisasi internal kampus ataupun eksternal kampus. Penulis pernah menjabat anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Fakultas Ilmu Kesehatan, serta anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat Universitas. Penulis terakhir menjabat sebagai Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Kesehatan selama satu periode. Selain itu, penulis juga adalah anggota dari Study Club of Nursing UIN Alauddin (SCLERA), Pionner of English Nursing (PEN) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Bagi penulis, semoga perjalanan hidup terutama dalam menuntut ilmu tidak hanya sampai di sini, karena jalan masih panjang ke depan. Hidup adalah pilihan, apa yang kita pilih maka jalaniilah dengan sepenuh hati dan jangan pernah putus asa karena Allah SWT tidak akan pernah memberikan cobaan kepada Kita jika itu di atas kemampuan Kita. Terus berjuang, terus berjalan ke depan dan sekali-kali menengoklah ke belakang karena mungkin saja di sana ada sesuatu yang dapat kita jadikan pelajaran dalam melangkah ke depan.