

UJI TOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN SURUHAN
(*Pepperomia pellucida* L. Kunth) DENGAN METODE BST (*Brine*
***Shrimp Lethality Test*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan

Oleh :

DYAN ANGGA SAPUTRA

NIM 70100110035

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dyan Angga Saputra
NIM : 70100110035
Tempat/Tanggal Lahir : palopo, 24 januari 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jl. Toddopuli, Makassar
Judul : Uji Toksisitas ekstrak etanol daun suruhan (*pepermoia
pellucida L. Kunt*) dengan Metode Brine Shrimp Lethality
Test.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 27 Desember 2014

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S

DYAN ANGGA SAPUTRA
NIM. 70100110035

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Daun Suruhan dengan Metode *Brine Shrimp Lethality Test* ” yang disusun oleh Dyan Angga Saputra, NIM : 70100110035, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Seminar Hasil yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, **27 Desember 2014 M**
4 Safar 1436 H


DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing II : Haeria, S.Si., M.Si. (.....)
Penguji I : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Penguji II : Nurhalis A gaffar, S.hum., M.hum (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang. M.A
NIP. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita hantarkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi dengan judul “Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Daun Suruhan (*Pepperomia Pellucida* L. kunt) dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Taska talib dan Ibunda Nurpati sadik, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa

materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudaraku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan doa'nya.

2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Fatmawaty Mallapiang, S. KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
5. Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Nursalam Hamzah, S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Surya Ningsi, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Haeria S.Si.,M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis
9. Mukhriani, S.Si, M.Si., selaku penguji kompetensi yang telah memberi masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag.,M.Hum. selaku Penguji Agama yang telah memberi masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini..

11. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.
12. Kepada seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis teman-teman farmasi angkatan 2010 khususnya kelas Farmasi A, kakak-kakak angkatan 2005-2009, dan adik-adik angkatan 2011-2013 Farmasi UIN Alauddin Makassar.

Besar harapan saya kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar, 2 Februari 2015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Defenisi Operasional.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tanaman	7
B. Uraian <i>Artemia salina</i> Leach	8

C.	Ekstraksi, Fraksinasi, Identifikasi Komponen Kimia dan Toksisitas	10
D.	Tinjauan Islam.....	19
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian	27
B.	Pendekatan Penelitian	27
C.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	28
D.	Penyiapan Sampel dan Pelaksanaan Uji	28
E.	Instrumen Penelitian.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	34
B.	Pembahasan.....	37
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	43
B.	Saran.....	43
KEPUSTAKAAN	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Ekstrak Etanol dan Fraksinasi Daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt) dengan Metode BST	45
2. Pelaksanaan Uji Brine Shrimp Lethality Test Ekstrak Etanol dan Fraksi Daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt)	47
3. Hasil uji toksisitas ekstrak daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt)	48
4. Hasil uji toksisitas Fraksi ekstrak etanol Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt)	49
5. Tabel Harga Probit sesuai persentasenya	50
6. Hasil perhitungan ekstrak etanol daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt)	51
7. Data hasil perhitungan fraksi A ekstrak etanol daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt)	53
8. Data hasil perhitungan fraksi B ekstrak etanol daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt)	55
9. Data hasil perhitungan fraksi C ekstrak etanol daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt)	57
10. Gambar Foto tanaman daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt).....	59
11. Gambar Siklus Larva Udang <i>Artemia salina</i> Leach	59
12. Gambar Profil Kromatogram Lapis Tipis ekstrak etanol daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt)	60

13. Gambar Profil Kromatogram Lapis Tipis Fraksi ekstrak etanol daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt).....	61
14. Gambar Profil Kromatogram Lapis Tipis hasil identifikasi Fraksi B ekstrak etanol daun Suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt).....	62



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil uji toksisitas ekstrak etanol daun suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt) dengan menggunakan metode BST.....	35
2. Hasil uji toksisitas fraksi ekstrak etanol daun suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt) dengan metode BST.....	35
3. Hasil uji identifikasi fraksi pada lempeng KLT.....	36
4. Data hasil pengamatan Larva Udang (<i>Artemia salina</i> L) yang mati setelah 24 jam perlakuan dengan ekstrak etanol daun suruhan.....	48
5. Data hasil pengamatan Larva Udang (<i>Artemia salina</i> L) yang mati setelah 24 jam perlakuan dengan Fraksi-fraksi hasil fraksinasi KCV ekstrak etanol 96% daun Suruhan (<i>pepperomia pellucida</i> L. Kunt).....	49
6. Harga Probit Sesuai Persentasenya.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Foto tanaman daun suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt).....	59
2. Siklus hidup <i>Artemia salina</i> Leach	59
3. Profil Kromatogram Lapis Tipis ekstrak etanol daun suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt).....	60
4. Profil Kromatogram Lapis Tipis Fraksi daun suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. kunt).....	61
5. Profil Kromatogram hasil identifikasi Fraksi B ekstrak daun suruhan (<i>Pepperomia pellucida</i> L. Kunt).....	62



ABSTRAK

Nama : Dyan Angga Saputra

NIM : 70100110035

Judul : Uji Toksisitas Ekstrak Etanol 96% Daun Suruhan (*Peppermoia pellucida* L. Kunt) Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test

Telah dilakukan penelitian Uji Toksisitas Ekstrak Etanol 96% Daun suruhan (*peppermoia pellucida* L. Kunt) beserta hasil fraksinasinya Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek toksikitas dari ekstrak dan fraksinya dengan pengujian terhadap *Artemia salina* Leach. Ekstrak yang diperoleh diuji terlebih dahulu toksisitasnya dengan metode *Brine Shrimp Lethality Test*. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak memiliki tingkat toksik terhadap larva *Artemia salina* dengan nilai LC_{50} sebesar 40,74 $\mu\text{g/ml}$. Ekstrak difraksinasi dengan kromatografi kolom cair vakum sehingga diperoleh 3 fraksi gabungan yaitu fraksi A, B, dan C. Masing-masing fraksi diuji toksisitasnya dan diperoleh hasil fraksi B yang memiliki tingkat toksik yang lebih besar di bandingkan fraksi yang lain dengan nilai LC_{50} sebesar 58,88 $\mu\text{g/ml}$. Dan hasil identifikasi fraksi B menunjukkan bahwa adanya senyawa aktif golongan fenol, flavonoid dan steroid.

Kata kunci : *Brine Shrimp Letality Test* (BST), Daun Suruhan (*Peppermoia pellucida* L. Kunt), Ekstrak Etanol 96%.

ABSTRACT

Name of Writer : Dyan Angga Saputra

Reg. No : 70100110035

Title of Thesis : “Toxicity Assay of Ethanol Ekstrakt 96% of Leaves Suruhan (*Pepperomia pellucida*) with Brine Shrimp Letality Test Method”.

Screening Toxicity test have been conducted to n-Hexan and Ethanolic Extract of Suruhan ' (*Pepperomia pellucida* L. kunt) with the aim of determinine the toxic effects of Suruhan' extract on larvae of *Artemia salina* Leach. Kaca-kaca' leaves was extracted by maceration with n-hexane and ethanol, that extract then tested each of its toxicity effect by *Brine Shremp lethality Test* method. The result showed that n-hexane extract has more toxicity effect to *Artemia salina* larvae ethanol extract by the value of LC_{50} 40,74 $\mu\text{g/ml}$. n-Hexane extract was fractionated by vacuum liquid column chromatography and it obtained 3 combination fractions A, B and C . Each fraction then tested is toxicity effect and it showed that fraction B is the most active fraction with value of LC_{50} 58,88 $\mu\text{g/ml}$. The result of Identification showed that fraction B contain phenol and Steroid componen group.

Key words : *Brine Shrimp Letality Test* (BST), the leaves of 'Suruhan' (*Chromolaena odorata*), then-hexane extract.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peperomia pellucida L. Kunth secara lokal di daerah Sleman Yogyakarta dikenal sebagai suruhan sedangkan di daerah Gowa Sulawesi Selatan di kenal sebagai daun kaca-kaca tanaman ini sering digunakan sebagai ramuan dalam pengobatan tradisional. *Peperomia pellucida* secara luas didistribusikan di banyak negara Amerika dan Asia Selatan (Arrigoni-Blank, 2004). Tumbuhan ini memiliki manfaat dalam pengobatan sakit kepala, demam, sakit perut, dan kejang-kejang (Ghani, 1998).

Menurut laporan *Manila medical society* tahun 2011 (Cao, 2011), suruhan dapat digunakan untuk meredakan nyeri rematik. Tumbuhan ini dapat digunakan sebagai anti bakteri, anti inflamasi, dan analgesik. Isolasi arilpropanoid dari suruhan digunakan sebagai anti jamur, sedangkan peperomin dapat digunakan sebagai anti kanker. Meskipun tumbuhan ini memiliki aktivitas anti bakteri, namun belum diketahui senyawa aktif yang berperan sebagai anti bakteri tersebut (Cao, 2011). Meskipun tumbuhan ini dapat menyebabkan asma dengan gejala seperti hipersensitivitas, namun belum ada data klinis yang dilaporkan dari gejala tersebut (Aziba et al, 2001).

Tumbuhan suruhan ini sudah lama dikenal oleh masyarakat luas sebagai obat, bahkan telah diperdagangkan dengan nama dagang suruhan. Secara empiris herba suruhan juga dapat mengatasi sakit kepala, nyeri perut, dan membantu mengatasi

timbulnya jerawat. Suruhan umumnya dikonsumsi dengan cara diseduh, tetapi ada juga yang mengkonsumsinya sebagai lalapan segar (Cao, 2011). Senyawa kimia yang terdapat dalam suruhan diantaranya adalah alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, polifenol, kalsium oksalat, lemak, dan minyak atsiri (Djauhariya dan Hernani, 2004).

Uji toksisitas merupakan uji pendahuluan untuk mengamati aktifitas farmakologi suatu senyawa. Prinsip uji toksisitas adalah bahwa komponen bioaktif selalu bersifat toksik jika diberikan dengan dosis tinggi dan menjadi obat pada dosis rendah.

Metode *Brine Shrimp Lethality Test* merupakan salah satu metode *bioassay* yang dipertimbangkan sebagai uji pendahuluan toksisitas dan digunakan untuk mendeteksi racun jamur, toksisitas ekstrak tanaman, logam berat, pestisida, dan uji sitotoksitas bahan pembuatan gigi (Khrisnaraju *et al.* 2006, 4:115-125). Metode ini sering digunakan untuk praskrining terhadap senyawa aktif yang terkandung di dalam ekstrak tanaman karena murah, mudah (tidak perlu kondisi aseptis) dan dapat dipercaya. Lebih dari itu larva udang ini juga digunakan untuk praskrining terhadap senyawa-senyawa yang diduga berkhasiat sebagai anti tumor. Dengan kata lain, uji ini mempunyai korelasi positif dengan potensinya sebagai anti kanker (Sukardiman dan Pratiwi 2004, 4: 1).

Uji toksisitas dilakukan untuk menentukan LC_{50} dari ekstrak etanol daun suruhan terhadap larva udang (*Artemia salina*) dengan metode *Brine Shrimp Lethality Test*. Sifat sitotoksik ini dapat juga diketahui berdasarkan jumlah kematian larva

pada konsentrasi tertentu. Suatu ekstrak dikatakan toksik jika memiliki nilai LC_{50} kurang dari 1000 $\mu\text{g/ml}$ setelah waktu 24 jam (Indrayani, Soetjipto, dan Sihasale).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan skrining toksisitas ekstrak Daun suruhan (*Peperomia pellucida* L. Kunth) dengan metode *Brine Shrimp Lethality Test*. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut n-heksan dan metanol. Fraksinasi dilakukan menggunakan kromatografi kolom cair vakum. Pada setiap tahap pengerjaan dipandu dengan metode BST hingga diperoleh fraksi yang aktif terhadap *Artemia salina* Leach. Fraksi aktif diidentifikasi dengan menggunakan beberapa pereaksi semprot.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Ekstrak daun suruhan (*Peperomia pellucida* L. Kunth) dapat memberi efek toksik terhadap larva *Artemia salina* Leach ?
2. Fraksi dari ekstrak daun suruhan manakah yang paling toksik terhadap larva *Artemia Salina* Leach ?
3. Berapakah nilai LC_{50} dari ekstrak dan fraksi aktif ekstrak daun suruhan ?

C. Hipotesis

1 Hipotesis Mayor

Ekstrak daun suruhan (*Peperomia pellucida* L. Kunt) mempunyai potensi toksisitas.

2. Hipotesis Minor

- a. Nilai LC 50 larva *Artemia salina* leach setelah pemberian ekstrak daun suruhan kurang dari 1000 µg/ml.
- b. Ekstrak daun suruhan dapat membunuh larva *Artemia salina* leach

D. Defunisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a) *Brine Shrimp Lethality Test* (BST) merupakan metode untuk uji toksisitas akut dengan menggunakan larva *Artemia salina* Leach sebagai hewan coba dan digunakan sebagai suatu *bioassay* yang pertama untuk penelitian bahan alam.
- b) *Artemia salina* Leach adalah sejenis udang-udangan primitif yang termasuk dalam filum *Arthropoda* yang hidup planktonik di perairan yang kadar garamnya tinggi (kadar 5 - 150/ml), dengan suhu sekitar 25 - 30°C, kadar Oksigen 2 - 7 ppm dan pH 3 - 8, serta digunakan sebagai hewan coba uji toksisitas akut bahan alam dengan metode BST.
- c) Ekstrak daun suruhan yang digunakan merupakan sediaan yang dibuat dengan mengekstraksi daun suruhan dengan menggunakan pelarut etanol, n-heksan dan etil asetat dengan metode maserasi, lalu pelarutnya diuapkan dan didapatkan ekstrak yang kental.
- d) LC 50 (*Lethal Concentration* 50) merupakan konsentrasi zat yang menyebabkan terjadinya kematian pada 50 % hewan percobaan yaitu larva *Artemia salina* Leach
- e) Potensi toksisitas ekstrak daun suruhan terhadap larva *Artemia salina* Leach Dinyatakan toksik bila nilai LC 50 dibawah 1000 µg/ml.

- f) Kriteria kematian standar larva *Artemia salina* Leach adalah bila larva udang tidak menunjukkan pergerakan selama beberapa detik observasi.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi bidang farmasi dan fitokimia.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nanang Yunarto dengan judul efek ekstrak air dan heksan herba suruhan (*Peperomia pellucida* L kunth) terhadap penurunan kadar asam urat serum darah ayam kampung jantan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *in vivo* ekstrak air dan heksan herba suruhan (*Peperomia pellucida*, (L) Kunth) memiliki potensi sebagai penurun kadar asam urat darah hewan uji. Potensi menurunkan kadar asam urat ekstrak air lebih besar dibandingkan dengan ekstrak heksan. Khasiat ekstrak air 200 mg/Kg BB sebanding dengan Allopurinol 10 mg/Kg BB.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya diatas maka dilakukan pengujian ekstrak etanol daun suruhan dengan metode *Brine Shrimp Lethality Test*. Untuk menguji apakah ekstrak etanol dari daun suruhan dapat menunjukkan aktivitasnya sebagai anti kanker.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan penelitian

- a. Menentukan toksisitas ekstrak dan fraksi daun suruhan (*Peperomia pellucida* L. Kunth) terhadap larva *Artemia salina* Leach.

- b. Menentukan nilai LC_{50} ekstrak dan fraksi daun suruhan (*Peperomia pellucida* L. Kunth).
- c. Menentukan kandungan kimia yang paling toksik terhadap larva *Artemia salina* Leach.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini menambah data ilmiah daun suruhan (*Peperomia pellucida* L. Kunth), khususnya toksisitasnya terhadap larva *Artemia salina* yang mendukung pengembangan ekstrak daun suruhan sebagai sumber senyawa bioaktif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan

1. *Klasifikasi* (Backer. C., 1968 : 85-594, Sutrisno.B, 1998 : 9-234).

Kerajaan	: plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Bangsa	: Piperales
Suku	: Piperaceae
Marga	: Peperomia
Jenis	: <i>Peperomia pellucida</i> L. Kunth

2. *Morfologi* (Backer. C., 1965:351)

Suruhan biasa ditemukan tumbuh liar di tempat-tempat yang agak lembab atau sedikit terlindung pada daerah yang kurang subur, seperti pinggiran selokan, sela-sela bebatuan, celah dinding yang retak, dinding yang curam, ladang, dan pekarangan. Tanaman yang berasal dari Amerika tropis ini bisa ditemukan dari dataran rendah sampai 1000 m di permukaan laut. Pada daerah yang tidak begitu kering. Tanaman semusim ini tumbuh tegak dengan tinggi 40 cm. Kalau agak tinggi kadang menggantung. Batang bulat, penampang 3-5 mm,

3. Nama Daerah

Jawa : Saladaan (Sunda), ketumpang ayer (melayu), Rangu-rangu (jawa),
Gofugoroho (Temate). Nama asing : Cao hu jiao (C)

Sulawesi : Daun kaca-kaca (Makassar)

4. Kandungan Kimia (Khare.C.P, 2007:649-650)

Tanaman ini mengandung alkaloid, tanin, kalsium oksalat, lemak, dan minyak atsiri.

5. Khasiat (Heyne.K, 1987: 1672-1973)

Tanaman suruhan mempunyai banyak manfaat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti penyakit ginjal, sakit kepala saat demam, sakit perut, luka bakar, bisul, jerawat, radang kulit.

B. Uraian *Artemia Salina* Leach

1. Klasifikasi .(Mudjiman, 1988 : 15)

Filum	: Arthropoda
Kelas	: Crustaceae
Anak kelas	: Branchiopoda
Bangsa	: Anostraca
Suku	: Artemiidae
Marga	: Artemia
Jenis	: <i>Artemia Salina</i> Leach.

2. *Morfologi* (Mudjiman, 1988 : 15-25)

Tingkat hidup *Artemia salina* Leach mengalami beberapa tingkatan, tetapi secara jelas dapat dilihat dalam 3 bentuk yang sangat berlainan yaitu bentuk telur, nauplius (larva) dan artemia dewasa.

Secara berkala, pada saat air laut atau danau menguap, partikel-partikel yang berwarna coklat, berdiameter sekitar 0,2-0,3 mm akan naik ke permukaan, oleh angin akan dibawa hanyut ke darat. Partikel tersebut merupakan telur-telur yang inaktif atau tidur dari *Artemia salina*. Sepanjang telur-telur tersebut terdehidrasi dan dalam keadaan diapauze, akan memiliki ketahanan dan kestabilan dalam penyimpanan yang lama.

Jika telur-telur tersebut (yang embrionya dalam keadaan diapauze) direndam ke dalam larutan bergaram (air laut), telur akan menyerap air laut hingga mengembang. Proses penyerapan ini berlangsung secara hiperosmotik yaitu adanya tekanan osmose di dalam telur yang lebih tinggi dari pada diluarnya. Setelah telur mengembang dan metabolisme berlangsung terus, maka mulailah cangkang telur pecah. Untuk mencapai tingkatan ini dibutuhkan waktu sekitar 15 jam. Terjadinya pemecahan cangkang telur yang keras itu dibantu oleh kegiatan enzim yaitu enzim penetasan pada pH lebih dari 8. Sekitar 17 jam perendaman, embrio yang keluar dari cangkang yang masih dibungkus oleh selaput penetasan tumbuh terus hingga akhirnya keluar dari selaputnya menjadi makhluk hidup baru, yaitu sebagai buruyak, tingkatan nauplius (larva). Sampai disini kira-kira telah memakan waktu 19 jam,

hingga rata-rata berkisar antara 24-36 jam. Dalam perkembangan selanjutnya, burayak mengalami metamorfosis. Pada tingkatan Instar I, kandungan energi masih cukup tinggi. Sekitar 24 jam kemudian, mereka sudah berubah menjadi instar II mulai mempunyai mulut, saluran pencernaan dan dubur. Oleh karenanya mereka mulai mencari makanan. Demikian seterusnya sampai instar XV. Setelah itu berubah menjadi artemia dewasa. Proses ini biasanya berlangsung 1-3 minggu.

Reproduksi *Artemia salina* dapat dengan bertelur atau dengan melahirkan anak. Pergantian reproduksi ini dimungkinkan oleh jumlah klorofil dalam makanannya dan faktor oksigen dalam lingkungan. Konsentrasi oksigen yang rendah dan klorofil yang tinggi dalam makanannya menyebabkan reproduksi dengan telur, dan sebaliknya akan menyebabkan reproduksi dengan melahirkan anak.

C. Ekstraksi, Fraksinasi dan Identifikasi Komponen Kimia

1. Definisi Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung (Anonim 1979, 9).

Proses untuk mendapatkan ekstrak disebut ekstraksi, yaitu penyarian zat berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut (Dirjen POM 1986).

Ragam ekstraksi yang tepat sudah tentu bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis senyawa yang

diisolasi. Umumnya kita perlu ‘membunuh’ jaringan tumbuhan untuk mencegah terjadinya oksidasi enzim atau hidrolisis. Bila ampas jaringan, pada ekstraksi ulang, sama sekali tak berwarna hijau lagi, dapat dianggap semua senyawa berbobot molekul rendah telah terekstraksi (Harborne,1987: 6).

Tujuan Ekstraksi Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia dari tanaman. Ekstrak adalah senyawa aktif dari tanaman atau jaringan hewan, dengan menggunakan pelarut yang selektif. Proses ekstraksi ini berdasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mengandung zat aktif (Dirjen POM,1986).

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara dingin. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin yaitu dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Sudjadi,1988: 60).

2. Fraksinasi

Kromatografi adalah suatu metode fisik, dimana komponen-komponen yang dipisahkan didistribusikan diantara 2 fasa, salah satu fasa tersebut adalah fasa stasioner dengan permukaan yang luas, yang lainnya sebagai fluida yang mengalir lembut di sepanjang landasan stasioner. Dalam semua teknik kromatografi, zat-zat terlarut yang dipisahkan bermigrasi sepanjang kolom, dan tentu saja dasar pemisahan terletak dalam laju perpindahan sebuah zat terlarut sebagai hasil dua faktor, yang satu cenderung menggerakkan zat terlarut itu, dan yang lain menahannya (Day, Jr, R.A dan Underwood, A.L, 2002).

Solute akan terelusi menurut perbandingan distribusinya. Jika perbedaan perbandingan distribusi solut cukup besar maka campuran-campuran solut akan mudah dan cepat dipisahkan. Solut yang tidak tertahan akan bermigrasi dengan kecepatan yang sama dengan fase gerak, karena perbandingan distribusi dan faktor retensinya sama dengan fase gerak. Nilai minimum R_f adalah 0 dan ini teramati jika solut tertahan pada posisi titik awal di permukaan fase diam (Rahman. A., 2007).

a. Kromatografi Cair Vakum

Kromatografi cair vakum menggunakan corong Buchner kaca masir atau kolom pendek dan dapat pula menggunakan kolom yang lebih panjang. Kolom kromatografi dikemas kering (biasanya dengan penjerap KLT 10-40 mikrometer) dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Vakum dihentikan, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penyerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap digunakan. Sampel dilarutkan dalam pelarut yang cocok kemudian dimasukkan pada bagian atas kolom atau lapisan penyerap dan di hisap perlahan-lahan ke dalam kemasan dengan mengvakumkannya. Kolom dielusikan dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan, kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi. Oleh karena itu kromatografi cair vakum menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostetman dan Marston, 1985 : 33-34).

Kromatografi cair vakum memiliki kekuatan melarutkan yang bagus, mudah di aplikasikan dalam kromatografi skala besar (sampai 100 g) dan cepat. Teknik ini

ekonomis dan secara signifikan mengurangi penggunaan pelarut dan jumlah silika yang digunakan. Artinya setiap komponen akan terdapat di sedikit fraksi dan mengurangi tercampurnya setiap fraksi jika diamati (Pedersen, D.S. Rosenbohm, 2009).

b. Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi lapis tipis adalah cara pemisahan dengan adsorpsi pada lapisan tipis adsorben yang dapat digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa seperti ion-ion anorganik, kompleks senyawa-senyawa organik dengan anorganik dan senyawa-senyawa organik baik yang terdapat di alam maupun senyawa-senyawa organik sintesis (Adnan, 1997 : 1-9).

Kromatografi lapis tipis atau TLC sama halnya dengan kromatografi kertas, murah dan mudah dilakukan. Kromatografi ini memiliki satu keunggulan dari segi kecepatan dari kromatografi kertas yaitu proses kromatografi lapis tipis membutuhkan hanya setengah jam saja. TLC sangat terkenal dan rutin digunakan di berbagai laboratorium (Day dan Underwood, 2002 : 551-552).

Prinsip KLT adalah pemisahan secara fisika kimia. Lapisan yang memisahkan yang terdiri dari bahan yang berbutir-butir (Fase diam), ditempatkan dalam penyangga berupa plat gelas, logam atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisah berupa larutan yang ditotolkan berupa bercak atau pita (awal). Setelah plat atau lapisan ditaruh di dalam bejana yang ditutup rapat berisi fase gerak, pemisahan terjadi selama pengembangan. Senyawa berwarna terdeteksi (Stahl, 1985 : 3).

Pada kromatografi lapis tipis, fase diam berupa lapisan tipis (ketebalan 0,1-2 mm) yang terdiri atas bahan padat yang dilapiskan pada permukaan penyangga datar yang biasanya terbuat dari kaca, tetapi dapat pula terbuat plat polimer atau logam. Lapisan melekat pada permukaan dengan bantuan pengikat, biasanya dengan kalsium sulfat atau amilum (Gritter, Bobbit, Schwarting, 1991 : 109).

Lapisan tipis sering mengandung indikator fluoresensi yang ditambahkan untuk membantu penampakan bercak warna pada lapisan yang dikembangkan. Indikator fluoresensi ialah senyawa yang memancarkan sinar tampak jika disinari dengan sinar berpanjang gelombang lain, biasanya sinar UV. Indikator fluoresensi yang paling berguna ialah sulfide anorganik yang memancarkan cahaya jika disinari cahaya pada panjang gelombang 254 nm. Beberapa senyawa organik bersinar atau berfluoresensi sendiri jika disinari pada panjang gelombang 254 nm atau 366 nm dan dapat tampak dengan mudah (Gritter, Bobbit, dan Schwarting, 1991, 2 : 111).

3. Identifikasi komponen kimia

Pada identifikasi suatu kandungan tumbuhan, setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan, pertama-tama harus kita tentukan dahulu golongannya, kemudian barulah ditentukan senyawa dalam golongan tersebut. Sebelum itu, keserbasamaan senyawa tersebut harus diperiksa secara cermat, artinya senyawa harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT dan/ atau KKt (Harborne, 1987).

Sebelum melakukan isolasi terhadap suatu senyawa kimia yang diinginkan dalam suatu tumbuhan maka perlu dilakukan identifikasi pendahuluan kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada pada masing-masing tumbuhan, sehingga dapat

diketahui kandungan senyawa yang ada secara kualitatif dan mungkin juga secara kuantitatif golongan senyawa yang dikandung oleh tumbuhan tersebut (Darwis, 2000 : 4).

Terdapat berbagai kemungkinan untuk deteksi senyawa tanpa warna pada kromatogram. Deteksi paling sederhana adalah jika senyawa menunjukkan penyerapan di daerah UV gelombang pendek (radiasi utama pada kira-kira 254 nm) atau jika senyawa itu dapat dieksitasi ke fluoresensi radial UV gelombang pendek dan/atau gelombang panjang (366 nm). Jika dengan kedua cara itu senyawa tidak dapat dideteksi, harus dicoba dengan pereaksi kimia; pertama tanpa dipanaskan, kemudian bila perlu dengan dipanaskan (Stahl, E., 1985 : 13).

Kromatografi lapis tipis merupakan suatu cara pemisahan dengan adsorpsi pada lapisan adsorben. Penggunaannya telah meluas dan telah diakui merupakan cara pemisahan yang baik, khususnya untuk kegunaan analisis kualitatif. Ini juga dapat digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa seperti ion-ion anorganik, dan senyawa-senyawa organik sintetik (Adnan M, 1997).

Pemisahan komponen kimia yang dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis tergantung pada jenis pelarut, zat penjerap dengan sifat daya serap masing-masing komponen. Komponen yang terlarut akan terbawa oleh fase gerak dengan kecepatan pemindahan yang berbeda-beda. Perbandingan kecepatan Bergeraknya komponen terlarut dalam fase gerak (pelarut) adalah dasar untuk mengidentifikasi komponen

kimia yang dipisahkan. Perbandingan kecepatan ini dinyatakan dalam R_f (retardation factor) dengan persamaan

$$R_f = \frac{\text{jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal}}{\text{jarak yang ditempuh oleh larutan pengembang dari titik asal}}$$

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga R_f , antara lain :

1. Struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan.
2. Ukuran partikel penjerap.
3. Derajat keaktifan lapisan penjerap.
4. Kemurnian dan konsentrasi pelarut.
5. Tabel dan kerataan lapisan penjerap.
6. Kejenuhan ruang elusi.
7. Terdapatnya pengotoran pada ekstrak.
8. Jumlah cuplikan yang digunakan.
9. Perbandingan eluen.
10. Suhu.
11. Keseimbangan.

Harga R_f merupakan karakteristik pada KLT. Harga ini merupakan kecepatan migrasi suatu senyawa pada kromatogram dan pada kondisi konstan merupakan besaran karakteristik dan reproduibel.

Sistem pelarut dari KLT dapat dipilih dari pustaka, tetapi lebih sering kita mencoba-coba saja karena waktu yang diperlukan sebentar. Pemilihan sistem pelarut

atas dasar like dissolves like berarti untuk memisahkan sampel yang bersifat nonpolar digunakan sistem pelarut nonpolar. Proses pengembangan akan lebih baik bila ruangan pengembangan tersebut telah jenuh dengan uap sistem pelarut. Hal ini dapat tercapai dengan meletakkan kertas filter pada dinding ruangan dengan dasar kertas tersebut tercelup pada sistem pelarutnya.

Visualisasi dimaksudkan untuk melihat komponen penyusun yang sudah terpisah setelah proses pengembangan yaitu dengan "charing" atau dengan penyemprotan dengan menggunakan reagensia tertentu (mis: H₂SO₄ pekat, uap amonia) (Adnan, M., 1997).

D. Uji Toksisitas Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BST)

Belakangan ini telah banyak pengujian tentang toksisitas yang dikembangkan untuk pencarian produk alam yang potensial sebagai bahan antineoplastik. Metode pengujian tersebut antara lain *Simple Branch-Top Bioassay* (terdiri dari *Brine Shrimp Lethality test*, *Lemna Minor Bioassay* dan *Crown-Gall Potato disc bioassay*) dan pengujian pada sel telur bulu babi. Pengujian efek toksik dengan larva udang *Artemia salina* dihitung dengan metode LC₅₀ yang mana kematian setelah 6 jam pemaparan dimasukkan dalam kategori LC₅₀ akut dan pemaparan setelah 24 jam digolongkan LC₅₀ kronis, dan dalam pengerjaannya biasanya digunakan LC₅₀ setelah 24 jam mengingat kelarutan ekstrak yang sukar larut membutuhkan waktu yang lebih panjang (McLaughlin 1991, 2: 107-110).

Uji toksisitas menggunakan larva *A. salina* (*Brine shrimp lethality test* = BST) sering dianalogkan dengan kemampuan suatu bahan obat yang memiliki efek antikanker. Metode ini disarankan untuk digunakan pada skrining senyawa bioaktif bahan alam karena menunjukkan adanya korelasi dengan metode sitotoksik *in vitro* lainnya. (Carballo, *et al.*, 2002).

Metode ini sering digunakan untuk praskrining terhadap senyawa aktif yang terkandung di dalam ekstrak tanaman karena murah, mudah (tidak perlu kondisi aseptis) dan dapat dipercaya. Sifat sitotoksik dapat diketahui berdasarkan jumlah kematian larva pada konsentrasi tertentu. Uji pendahuluan toksisitas digunakan untuk mengetahui toksin jamur, toksisitas ekstrak tanaman, logam berat, toksin *cyanobacteria*, pestisida, dan uji sitotoksitas bahan pembuatan gigi (Carballo, *et al.*, 2002).

Toksisitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu zat untuk menimbulkan keracunan. Toksisitas merupakan suatu sifat relatif dari zat kimia dan sejauh menyangkut diri manusia secara langsung atau tidak langsung. Uji toksisitas dibagi 2 golongan yaitu uji toksisitas tak khas (akut, subkronis dan kronis) dan uji toksisitas khas yang meliputi potensi teratogenik, mutagenik dan karsinogenik.

Uji toksisitas akut dengan hewan uji *Aretmia Salina* dapat digunakan sebagai uji pendahuluan pada penelitian yang mengarah ke uji sitotoksik, karena ada kaitan antara uji sitotoksik akut dengan uji sitotoksik jika harga LC_{50} dari toksisitas akut < 1000 $\mu\text{g/mL}$ (Mayer *et al.*, 1982).

E. Tinjauan Islam Tentang Penelitian Tanaman Obat

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia yang sesuai dengan fitrah manusia. maka Islam Menegakkan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Keanekaragaman tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah swt yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik itu digunakan sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan pengobatan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki banyak manfaat sehingga dihamparkan dibumi dan dikelola oleh manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Hanya saja dalam pengelolaannya di butuhkan Ilmu pengetahuan, dengan itu manusia sebagai khalifah dapat mengambil manfaat dari ciptaan Allah swt terutama dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pengobatan.

Firman Allah swt dalam (QS *Thaahaa* / 20 : 53)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Departemen Agama RI, 2005 : 316)

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, bahwa Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-

tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Dan Kata *azwaj* yang menguraikan aneka tumbuhan dapat dipahami dalam arti *jenis-jenis tumbuhan*, katakanlah seperti tumbuhan berkeping dua (dikotil) semacam kacang-kacangan, atau tumbuhan berkeping satu (monokotil) seperti pisang, nanas, palem, dan lain-lain (Quraish Shihab, 2006 : 317 - 318).

Dalam buku *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* jilid 5, menjelaskan bahwa “Dan yang menurunkan air dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan” Maksudnya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan buah-buahan, ada yang masam, manis, pahit, dan yang lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan (Tim Ahli Tafsir, 2011 : 733).

Dari ayat diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt memberi hidayah kepada manusia dengan menurunkan air dari langit berupa hujan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup yang dijadikan sebagai bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain. Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dari variatif yang telah diciptakan Allah swt dengan hikmah dan takdir-Nya.

Semua yang diciptakan Allah swt memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam pemanfaatannya sebagai obat.

Allah swt menciptakan tumbuhan dan menumbuhkannya di bumi tak lain untuk kebaikan bagi manusia karena banyak tumbuhan yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tanaman termasuk tanaman suruhan ini dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan Islam.

Firman Allah swt dalam QS. asy-Syu'ara'/26 ayat 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Departemen Agama RI, 2005 : 368).

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, Kata *zauj* berarti *Pasangan*. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Dan Kata *karim* antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik setiap objek yang

disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Quraish Shihab, 2006 : 11 - 12).

Dari ayat diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. dapat dipahami bahwa untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya menghendaki agar manusia senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah swt yang memiliki manfaat untuk kebutuhan manusia.

Islam senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan. Hal inilah yang mendorong umat muslim untuk mengenal banyak ilmu salah satunya adalah ilmu pengobatan yang menggunakan bahan alam khususnya tumbuhan. Peradaban islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim di era kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat Muslim juga tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat.

Dengan banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat ketika terkena penyakit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

"Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga" (Khan, 1994: 938).

Menurut Muhadi & Muadzin dalam bukunya Semua Penyakit Ada Obatnya, prinsip pengobatan didalam penyembuhan penyakit menurut Rasulullah saw diterapkan tertentu sebagai pedoman yang perlu diketahui dan dilaksanakan. Rasulullah saw mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi harus halal dan baik. Jika kita menginginkan kesembuhan dari Allah swt maka obat yang digunakan juga harus baik dan diridhai oleh Allah swt karena Allah melarang memasukkan barang yang haram dan merusak ke dalam tubuh kita (Muhadi & Muadzin, 2009 : 13).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua penyakit memiliki obat dan obat yang diberikan sesuai dengan penyakitnya. Oleh karena itu manusia harus senantiasa berusaha dan mencari tahu, meneliti obat untuk memperoleh pengobatan yang sesuai. Namun, tidak lupa bahwa kesembuhan dari suatu penyakit hanya karena izin Allah swt. Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar

seiring dengan munculnya berbagai macam penyakit dikalangan masyarakat (Ali Al-Ju'aisin 2001: 59).

Hal ini juga mengajak kita berfikir bahwa penyakit akan sembuh dengan izin Allah swt sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. asy-Syu'ara/26: 80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” (Depatemen Agama, 2005 : 371).

Menurut Muhadi & Muadzina Allah swt yang menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dialah yang menyembuhkannya. Jika kita menginginkan kesembuhan dari Allah swt. maka obat yang digunakan juga harus baik dan diridhai oleh Allah swt karena Allah melarang memasukkan barang yang haram dan merusak ke dalam tubuh kita (Muhadi & Muadzina, 2009 : 13).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt yang menyembuhkan, akan tetapi Allah swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud r.a bahwa Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

Artinya:


“Dari Amru bin Syu'aib dari Bapak dari Kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengobati sedangkan ia dikenal bukan sebagai seorang yang mengetahui ilmu pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab”

Dengan kalimat *“maka ia harus bertanggung jawab”* tersebut dapat dipahami sebagai isyarat Allah swt kepada umatNya untuk mempertanggung jawabkan ilmu pengetahuannya.

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen ilmiah dan hukum sebab akibat. Pengobatan menurut Rasulullah adalah pengobatan yang merujuk pada ilmu pengetahuan dan eksperimen, bukan pada perkiraan dan fatamorgana belaka. Konsep pengobatan Islam adalah menggunakan obat yang halal dan baik.

Ada beberapa hal yang penting dari apa yang disampaikan Rasulullah Saw, bahwa tidak mungkin obat-obat yang digunakan seseorang adalah sesuatu yang haram, karena pastinya ketika Allah menciptakan suatu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya, namun karena Allah Maha Suci (Al-Quddus), tidaklah mungkin Allah akan menurunkan penawarnya dari benda yang haram. Hal ini patut menjadi perhatian dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang pengobatan, karena perihal halal haram menjadi suatu hal yang sangat penting dalam Islam, yang bisa membuat amalan seseorang tidak diterima oleh Allah swt karena permasalahan obat yang diminum. Selain itu, suatu obat selain halal juga baik, antara lain tidak membawa mudharat yang akan mencatikan tubuh atau berbau takhayul, bid'ah, dan khurafat.

Maka dari itu dianjurkan untuk tidak melakukan pengobatan yang membawa kemudharatan dan menimbulkan masalah baru seperti merusak tubuh, Terlebih bila pengobatan tersebut bisa mengakibatkan pelakunya jatuh dalam jurang kekafiran. Oleh karena itu, dalam kitan Thibbun Nabawi dianjurkan semampu mungkin umat manusia menjaga tubuh kesehatan secara jasmani dan rohani dengan tetap berpegang teguh pada tuntunan syariat Islam dan landasan normatif (Zaidul Akbar, 2011).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara eksperimental. Perlakuan dengan pemberian ekstrak daun suruhan (*Pepperomia pellucida* L. Kunt) terhadap larva *Artemia salina* Leach.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan eksperimentatif.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah larva *Artemia salina* Leach berumur 48 jam sebagai hewan uji.

2. Sampel

Daun suruhan (*Pepperomia pellucida* L. Kunch) yang di larutkan dengan pelarut Etanol.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung

1. Penyiapan Sampel (ekstrak daun suruhan)

a) Pengambilan Sampel

Sampel daun kaca-kaca (*Peperomia pellucida* L. Kunth) diperoleh di daerah Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari. Daun yang digunakan adalah daun yang tidak rusak dan tidak berjamur.

b) Pengolahan Sampel

Sampel yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan dari kotoran, lalu dicuci dengan air bersih. Setelah itu sampel dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, terlindung dari sinar matahari kemudian dipotong-potong kecil dan diserbukkan.

c) Ekstraksi Sampel

Simplisia daun suruhan (*Peperomia pellucida* L. Kunth) disediakan sebanyak 500 g lalu dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan etanol 96% hingga simplisia terendam dan ditambahkan kembali etanol 96% hingga pelarut 2 cm di atas simplisia. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat terlindung dari sinar matahari sambil diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya.

Ampas diekstraksi kembali dengan penyari yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus dilakukan hingga cairan penyari tampak bening. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya dalam rotavapor 40°C sampai diperoleh ekstrak etanol kental. Ekstrak sampel disaring dengan kertas *whatman* menggunakan rangkaian pompa vakum. Ekstrak encer yang melewati penyaringan dibebaskan etanolkan, kemudian Lapisan bebas etanolnya dipisahkan dan dikeringkan.

2. Uji Toksisitas dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test

a) Penyiapan Larva Udang

Telur udang ditetaskan dalam wadah penetas dengan menggunakan air laut (pembuatannya menggunakan 38 g garam air laut dalam 1 L air). Penetas dilengkapi dengan lampu sebagai sumber cahaya dan diberi aerator sebagai sumber oksigen dan menjaga agar telur tidak mengendap. Wadah yang digunakan berbentuk kerucut. Telur dimasukkan pada wadah dan akan menetas kira-kira 24 jam setelah ditaburkan. Larva yang digunakan dalam pengujian adalah larva yang berumur 48 jam.

b) Pembuatan Konsentrasi Sampel dan Kontrol

Sebanyak 30 mg ekstrak etanol dan n-heksan daun *Suruhan* (*Peperomia pellucida* L. Kunth) dilarutkan dalam pelarut kloroform-etanol (1:1) dan ekstrak n-heksan dilarutkan dalam kloroform masing-masing sebanyak 3 ml sehingga diperoleh konsentrasi 10 mg/ml sebagai larutan stok. Dari larutan stok tersebut dipipet ke dalam vial masing-masing 5 µl, 50 µl dan 500 µl dengan menggunakan mikropipet. Karena volume akhir vial 5 ml maka diperoleh konsentrasi 10, 100 dan 1000 µg/ml. Pelarut

dibiarkan menguap sampai kering dan tidak berbau pelarut lagi. Untuk kontrol negatif dilakukan dengan memasukan pelarut saja dengan volume 500 µl.

c) Pelaksanaan Uji

Sepuluh ekor larva Artemia yang telah berumur 48 jam dimasukkan secara acak ke dalam vial yang telah berisi sampel uji dan dicukupkan air laut sampai volume 5 ml. Dibuat suspensi yeast 0,6 mg/ml dan ditambahkan ke dalam tiap vial masing-masing 1 tetes sebagai makanan. Setelah 24 jam jumlah larva yang hidup dihitung dengan bantuan kaca pembesar.

3. Fraksinasi Komponen Kimia

a) Persiapan Kolom Kromatografi Cair Vakum

Kolom kromatografi cair vakum dibersihkan kemudian dipasang tegak lurus. Adsorben (silika gel 60 PF₂₅₄) dimasukkan dalam kolom kemudian ditambahkan cairan pengelusi n-heksan, selanjutnya pompa vakum dijalankan hingga adsorben (silika gel) rapat.

b) Pemisahan Komponen Kimia

Ekstrak etanol yang memiliki toksisitas paling besar ditimbang sebanyak 3 g. Kemudian ditimbang silika gel sebanyak 20 g. Ditambahkan sedikit silika gel dan metanol dari penimbangan tadi kemudian diaduk hingga homogen lalu didiamkan hingga kering. Setelah kering dimasukkan ke dalam kolom dan bagian atasnya ditutup dengan kertas saring.

Ekstrak etanol difraksinasi menggunakan kromatografi kolom cair vakum (KCV) memakai fase diam silika gel 60 PF₂₅₄ dan fase gerak dengan gradien kepolaran berdasarkan profil KLT yang diperoleh. Masing-masing fraksinasi diuji toksisitasnya dengan metode BST.

4. Identifikasi Senyawa Bioaktif

Fraksi dengan LC₅₀ paling rendah ditotolkan pada lempeng KLT kemudian dielusi dengan n-heksan: etil asetat, kromatogramnya disemprot dengan menggunakan pereaksi penampak noda sebagai berikut :

1. Pereaksi H₂SO₄ 10 %: kromatogram dipanaskan pada 105 °C selama 5 menit dan diamati. Kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, hitam.
2. Pereaksi Dragendorf: akan dihasilkan warna jingga dengan latar belakang kuning untuk senyawa golongan alkaloida.
3. Pereaksi FeCl₃ 5 % : akan dihasilkan warna hitam-biru atau hijau untuk senyawa golongan fenol.
4. Pereaksi Liebermann-Burchard : kromatogram terlebih dipanaskan, kemudian diamati di lampu UV 366. Munculnya noda berfluoresensi merah menunjukkan adanya triterpen, sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.
5. Pereaksi AlCl₃ 5% : diamati di lampu UV, akan dihasilkan noda berfluoresensi kuning untuk senyawa golongan flavonoid.

E. Instrumen Penelitian / Pengumpulan Data

1. Alat- Alat yang Digunakan

Aerator, cawan porselin, chamber, corong pisah, corong, erlenmeyer (*Pyrex*), gelas ukur, kompor listrik, lampu UV 254, 366 nm, mikropipet (*Socorex*), neraca analitik, oven, pipet ukur, rotavapor (IKA), sentrifuge (*K*), seperangkat alat kromatografi cair vakum, seperangkat alat uji BST, timbangan kasar (*O'Hauss*), vortex mixer (*K*), wadah maserasi.

2. Bahan- Bahan yang Digunakan

Air suling, lempeng silika gel GF₂₅₄ (*E.Merck*), metanol, NaCl, pereaksi AlCl₃ 5%, Dragendorf, FeCl₃ 5 %, H₂SO₄ 10 %, kaca pembesar, n-heksan, ragi, sampel daun suruhan (*Peperomia pellucida* L. Kunth), silika gel 60 PF₂₅₄ (*E.Merck*). dan telur udang *Artemia salina* Leach.

F. Validasi dan Reliabilitas

Validitas dijaga dengan:

1. Menyamakan kondisi larva udang
2. Mengambil secara acak
3. Menggunakan kriteria standar dalam menilai kematian larva udang dan menggunakan alat ukur yang sama.

Reliabilitas data dijaga dengan replikasi tiga kali pada tiap uji.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil penelitian akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data dari uji toksisitas tersebut akan dianalisis dengan Analisis Probit menggunakan *SPSS for windows* untuk mengetahui harga LC 50.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Sampel

Hasil maserasi 500 g daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. kunt) yang telah kering dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% diperoleh ekstrak kental sebanyak 46 g. Profil KLT ekstrak etanol 96% dapat dilihat pada gambar 3

2. Fraksinasi Sampel

Ekstrak etanol 96% daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. kunt) sebanyak 3 g difraksinasi menggunakan kromatografi kolom cair vakum (KCV) diperoleh 14 fraksi. fraksi yang memiliki kesamaan profil KLT digabung sehingga diperoleh 3 fraksi yaitu fraksi A (fraksi 1 dan 5) seberat 0,3129 g, B (fraksi 6-8) seberat 0,3441 g, C (fraksi 9-14) seberat 0,2716 g dan adapun profil KLT-nya dapat dilihat pada gambar 4.

3. Uji BST (*Brine Shrimp Letahlity Test*)

Skrining toksisitas ekstrak etanol 96% daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. Kunt) dengan metode BST (*Brine Shrimp Lethality Test*) menggunakan larva *Artemia salina* Leach berumur 48 jam dengan konsentrasi 10, 100, 1000 µg/ml diperoleh hasil seperti tercantum pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil uji toksisitas ekstrak etanol daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. Kunt) dengan menggunakan metode BST

No.	Fraksi	Kematian larva (%)Konsentrasi ($\mu\text{g/ml}$)				LC ₅₀ ($\mu\text{g/ml}$)	Persamaan regresi
		1	10	100	1000		
1	Etanol	1	6	88	100	1,61	$Y = 1,413x + 2,713$

Ekstrak daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. Kunt) memiliki efek toksik terhadap *Artemia salina* Leach. Ekstrak tersebut kemudian difraksinasi dengan metode Kromatografi Kolom Cair Vakum (KCV). Masing-masing hasil fraksinasi diuji kembali toksisitasnya dengan metode *Brine Shrimp Lethality Test*, dengan konsentrasi yaitu 10, 100 dan 1000 $\mu\text{g/ml}$ seperti yang tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji toksisitas fraksi ekstrak etanol daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. Kunt) dengan metode BST

No.	Fraksi	Bobot (g)	Kematian larva (%) / Konsentrasi ($\mu\text{g/ml}$)				LC ₅₀ ($\mu\text{g/ml}$)	Persamaan regresi
			1	10	100	1000		
1	A	0,15 g	2	6	26	68	2,61	$Y = 0,847x + 2,787$
2	B	0,2 g	6	10	44	100	1,77	$Y = 1,103x + 3,038$
3	C	1,58 g	4	14	28	44	3,17	$Y = 0,529x + 3,319$

1. Identifikasi Senyawa Bioaktif

Fraksi B yang memiliki toksisitas tertinggi selanjutnya diidentifikasi dengan

Tabel 3. Hasil uji identifikasi fraksi pada lempeng KLT terhadap beberapa penampak bercak.

berbagai pereaksi sebagai berikut :

No	Jenis Pereaksi	Hasil
1.	H ₂ SO ₄ 10%	(+)
2.	Dragendorf	(-)
3.	FeCl ₃ 5%	(+)
4.	Lieberman-Bouchard	(+)
5.	AlCl ₃ 5%	(+)
6.	KOH	(-)

Keterangan :

1. Dengan pereaksi H₂SO₄ 10%, menunjukkan adanya noda berwarna coklat dan kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat dan hitam.
2. Dengan pereaksi dragendorf, menunjukkan hasil negatif terhadap golongan alkaloid.
3. Dengan pereaksi FeCl₃ 5%, terdapat noda yang berwarna hitam kehijauan sehingga hasil positif terhadap golongan fenol.

- 4) Dengan pereaksi Liebermann-Bouchard, terdapat noda berwarna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.
- 5) Dengan pereaksi AlCl_3 5%, menunjukkan hasil positif terhadap golongan flavonoid karena adanya noda yang berwarna merah.
- 6) Dengan pereaksi KOH, menunjukkan hasil negatif terhadap golongan senyawa khumarin.

B. Pembahasan

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. Kunt). Secara empiris herba suruhan juga dapat mengatasi sakit kepala, nyeri perut, dan membantu mengatasi timbulnya jerawat. Senyawa kimia yang terdapat dalam suruhan diantaranya adalah alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, polifenol, kalsium oksalat, lemak, dan minyak atsiri (Djauhariya dan Hernani 2004).

Pemisahan komponen kimia daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. Kunt) dilakukan secara bertahap yang meliputi ekstraksi dan fraksinasi. Masing-masing hasil pemisahan tersebut dilakukan pengujian *Bioassay* menggunakan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BST) sebagai proses pengujian toksisitas yang terbukti memiliki efek toksik. Pada penelitian ini proses pemisahan komponen bioaktif dari daun suruhan dilakukan secara bertahap menggunakan metode ekstraksi dengan cara maserasi dan fraksinasi menggunakan metode *Vacum Liquid Chromatography* (VLC) untuk memperoleh komponen senyawa yang lebih spesifik. Kromatografi cair vakum memiliki kekuatan melarutkan yang bagus, mudah diaplikasikan dalam kromatografi

skala besar (Sampai 100 g) dan cepat. Teknik ini ekonomis dan secara signifikan mengurangi penggunaan pelarut dan jumlah silica yang digunakan. Artinya setiap komponen akan terdapat di sedikit fraksi dan mengurangi tercampurnya setiap fraksi jika diamati (Pedersen dan Rosenbohm, 2009).

Mula-mula daun Suruhan (*Pepermoia pellucida* L. Kunt) dibuat menjadi bentuk simplisia lalu diserbukkan, hal ini dilakukan untuk memperbesar luas permukaan sampel sehingga kontak antara cairan penyari dan sampel lebih besar sehingga memudahkan penyarian komponen kimia yang terdapat dalam sampel. Sampel diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96% hingga bening. Komponen kimia yang memiliki kepolaran yang sama dengan kepolaran etanol 96% akan ikut tertarik atau tersari, sehingga akan di dapatkan ekstrak etanol 96% yang cair. Untuk mendapatkan ekstrak yang lebih kental maka ekstrak yang didapatkan dipekatkan dengan bantuan alat *Rotavapor*. Dimana prinsip pemekatan ekstrak pada alat ini yaitu dengan cara memisahkan ekstrak dengan cairan penyarinya berdasarkan titik didihnya, sehingga akan didapatkan ekstrak yang lebih pekat atau ekstrak yang lebih kental.

Uji toksisitas ekstrak daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. Kunt) dilakukan dengan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BST) pada setiap pengerjaan, begitupula dengan hasil fraksinasinya sehingga diperoleh fraksi yang memiliki efek toksik yang tinggi terhadap *Artemia salina* Leach ekstrak daun suruhan (*Pepermoia pellucida* L. Kunt). Uji toksisitas dengan larva udang *Artemia salina* Leach dipilih karena pengerjaannya yang sederhana, murah, mudah, cepat pelaksanaannya dan memiliki

korelasi positif terhadap efek toksiknya. Penggunaan larva udang sebagai hewan uji ketoksikan disebabkan karena ukurannya yang sangat kecil sehingga tidak membutuhkan sampel yang banyak dan tidak sulit dalam penanganan. Metode BST (*Brine Shrimp Lethality Test*) dilakukan untuk mendeteksi keberadaan senyawa toksik yang dipakai untuk memonitor dalam isolasi senyawa dari tumbuhan yang berefek toksik dengan menentukan nilai LC_{50} dari senyawa aktif. Larva *Artemia salina* Leach diuji pada saat berumur 48 jam karena pada umur tersebut *Artemia salina* Leach mengalami pertumbuhan sel yang abnormal.

Ekstrak yang diperoleh diuji efek toksiknya terhadap *Artemia salina* Leach dengan menggunakan konsentrasi 10, 100 dan 1000 $\mu\text{g/ml}$. hal ini dimaksudkan untuk melihat variasi respon yang diberikan. Bila LC_{50} dibawah 1000 $\mu\text{g/ml}$ dinyatakan toksik dan diatas 1000 $\mu\text{g/ml}$ dinyatakan tidak toksik. kontrol negatif dilakukan untuk melihat apakah respon kematian hewan uji benar-benar berasal dari sampel dan bukan disebabkan oleh pelarut yang digunakan. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol 96% daun suruhan (*Pepermoia pellucida L. Kunt*) memiliki nilai $LC_{50} = 1,61 \mu\text{g/ml}$. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol 96% daun suruhan (*pepermoia pellucida L. Kunt*) memiliki efek toksik terhadap larva udang *Artemia salina* Leach.

Ekstrak etanol 96% daun suruhan (*Pepermoia pellucida L. Kunt*) selanjutnya dilakukan pencarian profil KLT-nya yang bertujuan untuk mengetahui eluen yang sesuai untuk penampakan nodanya sebelum dilakukan proses fraksinasi. Sehingga

didapatkan profil KLT-nya yaitu dengan menggunakan eluen n-heksan:etil asetat (1:3). selanjutnya difraksinasi dengan metode kromatografi cair vakum (KCV). Metode ini dipakai karena cepat dan mudah dalam proses pemisahan komponen kimia. Metode ini dilakukan menggunakan fase diam silika gel 60F₂₄ dan fase gerak dengan gradient kepolaran yang semakin meningkat yaitu berturut-turut n-heksan:etil asetat (12:3), (9:3), (6:3), (3:3), (1:3), (1:6), (1:9), (1:12), etil asetat, etil asetat:MeOH (9:1), (6:1), (3:1), (1:3), (1:6), dan MeOH

Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan, kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi. Oleh karena itu kromatografi cair vakum menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostetman, K., M. Hostetman dan A. Marston, 1985: 33-34).

Dari proses fraksinasi menggunakan 14 perbandingan pelarut yang tingkat kepolarannya mulai dari rendah ke tingkat kepolaran yang lebih tinggi, maka didapatkan pula 14 hasil fraksi, dimana hasil fraksinasi tersebut akan dilakukan proses KLT untuk menggabungkan hasil fraksinasinya yang dianggap mengandung senyawa yang sama dengan cara melihat penampakan nodanya, kemudian dari proses KLT tersebut maka didapatkan dari 14 hasil fraksi menjadi 3 hasil fraksi yaitu fraksi A (fraksi 1 dan 5) seberat 0,3129 gram, B (fraksi 6-8) seberat 0,3441 gram, C (fraksi 9-14) seberat 0,2716 gram. dan adapun profil KLT-nya dapat dilihat pada gambar 4.

Fraksi yang diperoleh selanjutnya diuji kembali dengan metode BST (*Brine Shrimp Lethality Test*) dengan konsentrasi yaitu 10 µg/ml, 100 µg/ml dan 1000 µg/ml. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah efek toksik hasil fraksinasi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan efek toksik ekstrak awal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fraksi B memiliki efek toksik yang paling besar terhadap larva *Artemia salina* Leach dengan nilai $LC_{50} = 1,93$ µg/ml, sedangkan LC_{50} fraksi A dan C lebih kecil dibandingkan dengan fraksi B. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya fraksi B yang memiliki efek toksik lebih besar dari ekstrak awal. Fraksi yang lain menjadi kurang toksik setelah difraksinasi diduga karena disebabkan oleh efek sinergis dari senyawa kimia yang terdapat dalam ekstrak.

Fraksi B selanjutnya diidentifikasi senyawa golongannya. Mula-mula fraksi B diencerkan lalu ditotolkan pada lempeng KLT kemudian dielusi dengan dengan n-heksan:etil asetat (1:1). Hasil kromatogramnya disemprot dengan menggunakan pereaksi penampak noda seperti H_2SO_4 10% sebagai pereaksi penampak umum, dragendorf untuk golongan alkaloid atau komponen kimia yang mengandung senyawa nitrogen, $FeCl_3$ 5% untuk senyawa golongan fenol, pereaksi Liebermann-Bouchard untuk golongan senyawa terpenoid seperti triterpen dan sterol, pereaksi $AlCl_3$ 5% untuk senyawa golongan flavonoid, serta pereaksi KOH untuk senyawa kumarin.

Pada uji identifikasi senyawa golongan menggunakan H_2SO_4 menunjukkan hasil positif dengan adanya penampakan noda berwarna setelah pemanasan yang menunjukkan adanya senyawa organik, pereaksi Liebermann-Burchard memberikan

hasil positif dengan adanya noda berwarna hijau kebiruan setelah pemanasan yang menunjukkan adanya komponen kimia golongan steroid, pereaksi FeCl_3 5% memberikan hasil positif dengan adanya noda berwarna hitam dengan pengamatan mata langsung yang menunjukkan adanya komponen kimia golongan fenol, pereaksi AlCl_3 memberikan hasil positif dengan menunjukkan penampakan noda yang berwarna merah pada pengamatan dibawah sinar UV gelombang 366 yang berarti mengandung senyawa golongan flavanoid dan memberikan hasil negatif terhadap pereaksi Dragendorff dengan tidak adanya noda berwarna kuning latar jingga pada pengamatan mata langsung yang berarti tidak adanya senyawa golongan alkaloid, serta pada pereaksi KOH memberikan hasil negatif dengan tidak adanya noda berwarna merah pada pengamatan mata langsung.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa fraksi B memiliki nilai LC_{50} $\mu\text{g/ml}$. Ini menunjukkan bahwa fraksi B memiliki potensi nilai LC_{50} sebagai anti mikroba. Dan adapun golongan senyawa yang terdapat pada fraksi B yaitu fenol, flavonoid dan steroid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol 96% daun suruhan (*Pepermoia pellucida L. Kunt*) memiliki efek toksisitas lebih besar terhadap larva udang *Artemia salina* Leach, dibandingkan dengan hasil fraksi aktifnya yaitu fraksi B memiliki daya toksisitas yang lebih kecil terhadap larva udang *Artemia salina* Leach.
2. Nilai LC_{50} dari ekstrak etanol 96% daun suruhan (*Pepermoia pellucida L. Kunt*) sebesar 40,74 $\mu\text{g/ml}$. sedangkan fraksi aktifnya yaitu fraksi B memiliki nilai LC_{50} sebesar 58,88 $\mu\text{g/ml}$.
3. Hasil identifikasi dengan pereaksi penampak noda menunjukkan bahwa fraksi B mengandung senyawa flavanoid, terpenoid dan fenol.

B. Saran

Pada pengembangan penelitian selanjutnya perlu dilakukan uji Skringing bioautografi ekstrak maupun fraksi dari ekstrak etanol 96% daun suruhan (*Pepermoia pellucida L. Kunt*) dengan metode lain yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Anonim. Billy-Goat Weed *Newsletter of The Asia-Pacific Forest Invasive Species Network*(APFISN). Vol.13,2007.

Armisman, Andi. *Ekstraksi dan Fraksinasi Senyawa Antibakteri Daun Jati (Tectona grandis L.F)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2009.

Backer. C.A V brink R.C.B, *flora Of Java*, Netherlands : 1968. Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. Bandung: Penerbit ITB, 1987.

Carballo, J.L. *et al*. A Comparison Between Two Brine Shrimp Assay to Detect In Vitro Cytotoxicity in Marine Natural Products. *BMC Biotechnology*, Vol. 2:17, 2002.

Day. Jr,R.A, dan Underwood A.L. *Analisa Kimia Kuantitatif*. Penerjemah Lis Sopyan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.

Darwis, D. *Teknik Dasar Laboratorium Dalam Penelitian Senyawa Bahan Alam Hayati*. Padang: FMIPA Universitas Andalas, 2000.

Dirjen POM. *Sediaan Galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1986.

Djaelani, A Kadir. *Konsepsi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Putra Harapan, 1997.

Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. Bandung: Penerbit ITB, 1987.

Hartati, R., Asep, G., Komar, R. *Detail Penelitian Obat Bahan Alam, Telaah Flavanoid dan Fenolat daun Jati (tectona grandis L.F Verbenaceae)*. SekolahFarmasi ITB <http://bahanalam.fa.itb.id> (diakses 16 Februari 2009).

Heyne.K. *Tumbuhan Berguna Indonesia III*, Dinas Kehutanan, 1987.


Indrayani, L., Soetjipto, H., dan Sihasale, L. *Skrining Fitokimia dan Uji Toksisitas Ekstrak Daun Pecut Kuda (Stachytarpheta jamaicensis L. Valh) terhadap Larva Udang Artemia salina Leach*. *Berk. Penel. Hayati*. Vol. 12, 2006.

Khare. C.P. *Indian Medical Plants*. India. New Delhi : Springer 2007.


Krishnaraju. *Biological screening of Medicinal Plants Collected from Eastern Ghats of India Using Artemia salina (Brine Shrimp Test)*, *International Journal of Applied science and Engineering*. Vol.4, 2006.

- Mayer, B. N. Brine shrimp : A convenient General bioassay for active plants constituents. *Planta med.*, Vol. 45, 1982.
- Mc. Laughlin, J.L., Goetz, C.M., Anderson, J.E.A. Blind Comparison of Simple Bench Top Bioassay and Human Tumor Cell Cytotoxicities as Antitumor Prescreens. *Phytochem. Anal.*, Vol. 2, 1991.
- Mudjiman, A. *Undang Renik Air Asin*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1988.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Penerbit lentera Hati : Jakarta. 2006.
- Stahl, E. *Analisis Obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi*. Penerjemah Dr. Kosasih Padmawinata. Bandung: Penerbit ITB, 1985.
- Sudjadi. *Metode Pemisahan Edisi I*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Tim Ahli Tafsir. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Thomson, W.J., Rahman, A., Ginoudhary, M. I.2001. *Bioassay Techniques For Drug Development*. Harword academic Publisher. Australia 39-41.
- Van der Vosen, H.A.M., Umali, B.E., 2001. "*Plant Resources of South- East Asia: Vegetables oils and fats, Volume 14*, Backhuys Publishers, Leiden, 70-72

Lampiran 1. Skema Kerja Ekstrak Etanol dan Fraksinasi Daun Suruhan (*pepermoia pellucida* L Kunt) dengan Metode BST.



Lampiran 2. Pelaksanaan Uji Brine Shrimp Lethality Test Ekstrak Etanol dan Fraksi Daun suruhan (*pepermoia pellucida L. Kunt*).



Lampiran 3. Tabel 4. Data hasil pengamatan Larva Udang (*Artemia salina* L. Kunt) yang mati setelah 24 jam perlakuan dengan ekstrak etanol daun Suruhan.

Sampel	Konsentrasi			
	1000	100	10	1
Ekstrak Etanol 96%	9	9	1	0
	10	7	0	0
	10	10	1	0
	10	9	0	1
	9	9	1	0
Jumlah	48	44	3	1
	96%	88%	6%	2%
Kontrol Negatif	Konsentrasi			
	1000	100	10	1
Etanol 96%	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Lampiran 4. Tabel 5. Data hasil pengamatan Larva Udang (*Artemia salina* L) yang mati setelah 24 jam perlakuan dengan Fraksi-fraksi hasil fraksinasi KCV ekstrak etanol 96% daun Suruhan (*pepermoia pellucida* L. Kunt).

Sampel	Konsentrasi			
	1000	100	10	1
Fraksi A	7	4	1	0
	7	1	1	0
	7	1	0	1
	6	5	1	0
	7	2	0	0
Jumlah	34	13	3	1
	68%	26%	6%	2%
Fraksi B	9	4	1	0
	10	3	0	2
	9	4	2	0
	10	5	1	1
	10	6	1	0
Jumlah	48	22	5	3
	96%	44%	10%	6%
Fraksi C	5	3	1	0
	5	2	1	0
	4	3	1	0
	4	3	2	1
	4	3	2	1
Jumlah	22	14	7	0
	44%	28%	14%	4%


Lampiran 5. Tabel 6. Harga Probit sesuai persentasenya.

Prosentase	PROBIT									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59	3,66
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,93	3,95	4,01	4,05	4,08	4,12
20	4,17	4,19	4,32	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45
30	4,48	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69	4,72
40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95	4,97
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20	5,23
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47	5,50
70	5,25	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77	5,81
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18	6,23
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,88	7,05	7,33
99	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,58	7,66	7,75	7,88	8,09

Sumber : Musyidi,A.,(1984) “Statistik Farmasi Dan Biologi”,Ghalia Indonesia Cetakan 1, Jakarta,157

Lampiran 6. Data hasil perhitungan LC_{50} ekstrak etanol daun suruhan (*pepermoia pellucida L. Kunt*) menurut Metode Grafik Probit Log-konsentrasi.

Konsentrasi	(X)	%Kematian	NP
1000	3	96	6,75
100	2	88	6,18
10	1	6	3,45
1	0	2	2,95



Persamaan garis linear :

$$Y = a + bx$$

Y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log – konsentrasi ekstrak

a = Intersep

b = Slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 2,713$$

$$b = 1,413$$

$$r = 0,911$$

Sehingga diperoleh persamaan Regresi :

Nilai LC_{50} :

$$Y = 1,413x + 2,713$$

Untuk $\log LC_{50} y = 5$

$$x = \frac{5 - 2,713}{1,413} = 1,61$$


sehingga $LC_{50} = \text{anti log } x$

$$= \text{anti log } 1,61$$

$$= 40,74 \mu\text{g/ml}$$

Lampiran 7. Data hasil perhitungan LC_{50} fraksi A ekstrak etanol daun suruhan (*pepermoia pellucida L. Kunt*) menurut Metode Grafik Probit Log-Konsentrasi.

Konsentrasi	(X)	%Kematian	NP
1000	3	68	5,47
100	2	26	4,36
10	1	6	3,45
1	0	2	2,95



Persamaan garis linear :

$$Y = a + bx$$

Y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log – konsentrasi ekstrak

a = Intersep

b = Slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 2,787$$

$$b = 0,847$$

$$r = 0,974$$

Sehingga diperoleh persamaan Regresi :

Nilai LC_{50} :

$$Y = 0,847x + 2,787$$

Untuk $\log LC_{50} y = 5$

$$x = \frac{5 - 2,787}{0,847} = 2,61$$


sehingga $LC_{50} = \text{anti log } x$

$$= \text{anti log } 2,61$$

$$= 406,38 \mu\text{g/ml}$$

Lampiran 8. Data hasil perhitungan LC_{50} fraksi B ekstrak etanol daun suruhan (*pepermoia pellucida L. Kunt*) menurut Metode Grafik Probit Log-Konsentrasi.

Konsentrasi	(X)	%Kematian	NP
1000	3	98	6,75
100	2	44	4,85
10	1	10	3,72
1	0	6	3,45



Persamaan garis linear :

$$Y = a + bx$$

Y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log – konsentrasi ekstrak

a = Intersep

b = Slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 3,038$$

$$b = 1,103$$

$$r = 0,901$$

Sehingga diperoleh persamaan Regresi :

Nilai LC_{50} :

$$Y = 1,103x + 3,038$$

Untuk $\log LC_{50} y = 5$

$$x = \frac{5 - 3,038}{1.103} = 1,77$$


sehingga $LC_{50} = \text{anti log } x$

$$= \text{anti log } 1.77$$

$$= 58,88 \mu\text{g/ml}$$

Lampiran 9. Data hasil perhitungan LC₅₀ fraksi C ekstrak etanol daun suruhan (*pepermoia pellucida L. Kunt*) menurut Metode Grafik Probit Log-Konsentrasi.

Konsentrasi	(X)	%Kematian	NP
1000	3	44	4,85
100	2	28	4,42
10	1	14	3,93
1	0	4	3,25



Persamaan garis linear :

$$Y = a + bx$$

Y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log – konsentrasi ekstrak

a = Intersep

b = Slope

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

a = 3,319

b = 0,529

r = 0,988

Sehingga diperoleh persamaan Regresi :

Nilai LC_{50} :

$$Y = 0,529x + 3,319$$

Untuk $\log LC_{50} y = 5$

$$x = \frac{5 - 3,319}{0,529} = 3,17$$

sehingga $LC_{50} = \text{anti log } x$


$$= \text{anti log } 3,17$$

$$= 1479,11 \mu\text{g/ml}$$


Lampiran 11. Gambar 1. Foto Tanaman suruhan (*pepermoia pellucida* L. Kunt)



Lampiran 12. Gambar 2. Siklus Larva Udang *Artemia salina* Leach



Lampiran 13. Gambar 3. Profil Kromatogram Lapis Tipis ekstrak etanol daun suruhan (*pepermoia pellucida L. Kunt*)



Keterangan gambar :


Fase gerak : n-heksan : etil asetat (1:3)

Fase diam : silka gel GF₂₅₄


a : Gambar profil KLT dilihat pada UV 366

b : Gambar profil KLT dilihat pada UV 254

Lampiran 14. Gambar 4. Profil Kromatogram Lapis Tipis Fraksi ekstrak etanol daun suruhan (*pepermoia pellucida L. Kunt*)



(a)



(b)

Keterangan gambar :

Fase gerak : n-heksan : etil asetat (1:1)

Fase diam : silka gel GF₂₅₄

a : Gambar profil KLT dilihat pada UV 366

b : Gambar profil KLT dilihat pada UV 254


Lampiran 15. Gambar 5. Profil Kromatogram Lapis Tipis hasil identifikasi Fraksi B ekstrak etanol daun suruhan (*pepermoia pellucida L. Kunt*)



A



B




C



D



E



F

Keterangan gambar:

A : Identifikasi dengan pereaksi semprot H_2SO_4 10%

B : Identifikasi dengan pereaksi dragendorf

C : Identifikasi dengan pereaksi FeCl_3 5%

D : Identifikasi dengan pereaksi AlCl_3 5%

E : Identifikasi dengan pereaksi Liebermann-Bouchard

F : Identifikasi dengan pereaksi KOH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dyan Angga Saputra lahir di Palopo pada tanggal 24 januari 1992, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang dianugerahkan kepada pasangan suami-istri Meliansya Slamet dan Nurpati sadik. Jenjang pendidikan pertama kali dimulai di TK Handayani palopo pada tahun 1997, kemudian pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan

di SDN Muhammadiyah Palopo dan selesai pada tahun 2004. dia melanjutkan pendidikannya di MTs Negeri Model Palopo dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama dia melanjutkan lagi pendidikannya di MAN Model Palopo hingga tahun 2010. Pada tahun itu pula dia melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi yaitu Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R