

**ANALISIS RESIDU PESTISIDA PADA CABAI MERAH BESAR DAN
CABAI MERAH KERITING DI PASAR SWALAYAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2014**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

NURHAYATI
70200110074

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2014

“Ketahuilah bahwa engkau bukan satu-satunya orang yang mendapat ujian. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah sedih, dan tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masa-masa sulit” (La Tahzan)

SEBUAH PERSEMBAHAN:

Ku ucapkan Syukur Hanya Padamu

Robby Penguasa Jiwaku Hanya Padamu

Muhammad SAW

Karya ini akan Nur persembahkan kepada:

Ibuku tercinta dan terkasih yang penuh kasih sayang, selalu memberikan motivasi dan dorongan. Do'a yang tak pernah lelah, ibu baktiku hanya untukmu love u. Bapak terima kasih engkau telah mendidik, membimbing dan memberikan kekuatan jiwa untukku.

Kakakku Serda Ahmat Yahya, Salmawati S.E dan Syahriani S. Kep celotehanmu adalah inspirasiku.

Suamiku Serda Hafifi yang tersayang dan terkasih, terima kasih atas kasih sayangmu, kesabaranmu, motivasimu yang menguatkanmu dan menemaniku dalam perjalanan hidupku.

Kepada seluruh guru dan Dosen yang saya hormati, yang telah memberikan ilmunya, terima kasih tak terhingga atas didikan dan bimbingan serta ilmu yang Engkau berikan selama ini yang penuh kesabaran dalam memberikannya. Semoga Allah membalas yang terbaik atas jasanya....Amin

Sahabat-sahabatku yang menemaniku saat ku senang dan sedih, memberikannku semangat dan arti sebuah sahabat. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi.

Seluruh teman-teman Kesehatan Masyarakat khususnya Kesmas B angkatan 2010 semoga generasi kita berjaya selalu..Amin..

Dan untuk semua yang membantu memberikan motivasi dan inspirasi selama Nur berjuang menyelesaikan karya ilmiah ini terima kasih banyak.

Nurhayati

KATA PENGANTAR

Maha Besar Allah SWT. Yang telah memberikan kemudahan bagi umat manusia untuk menguak misteri dalam setiap rahasia yang diciptakan-Nya, guna menunjukkan betapa kuasanya Allah terhadap segala jenis makhluk-Nya. Rahasia itu menjadi ladang bagi umat manusia untuk menuai hikmah dan makna selama rentang kehidupan yang sangat singkat. Segala puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Residu Pestisida pada Cabai Merah Besar dan Cabai Merah Keriting di Pasar Swalayan Kota Makassar”** dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi umat di dunia. Dialah Nabi akhir zaman, revolusioner dunia, yang mampu menguak dan merubah kejahilian menuju *sirhotul mustaqim*, yakni agama islam.

Telah banyak kisah yang terukir dalam rangkaian perjalanan mengarungi waktu dalam rangka penyusunan tugas akhir ini. Episode suka dan duka terangkum dalam kisah ini sebagai bentuk harapan, kenangan, dan tantangan.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami oleh penulis. Namun berkat usaha, tekak yang kuat serta bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, maka semua yang menjadi penghalang dan rintangan dapat teratasi.

Terkhusus dan teristimewa penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta serta suamiku tersayang, atas segala

pengorbanan dan do'a restu yang telah mereka berikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga Allah SWT, mengampuni dosa-dosa mereka, mengalirkan pahala kebaikan dan memberikan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. Qadir Gassing, HT., MS, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, dan III
2. Dr. Dr. Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS, Selaku ketua jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Makmur Selomo. Ms dan Muhammad Rusmin, SKM. Mars, sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, koreksi dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Muh. Saleh Jastam, SKM., M.Kes dan dr. Hasaruddin selaku penguji kompetenis dan integrasi keislaman yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses study, serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Ilmu Fakultas Kesehatan UIN

Alauddin Makassar yang banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Para Ibu dan Bapak Laboratorium Pengujian Pestisida BPTH Maros Sulawesi Selatan, Khususnya Ka. Laboratorium Pestisida Bapak Yumarto. SP,M.Si dan Ibu Rahma yang telah banyak membantu selama proses penelitian.
8. Saudara-saudara yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam proses study ini.
9. Semua teman-teman yang telah membantu penulis serta memberikan semangatnya selama proses penyusunan skripsi ini, terkhususnya Ida Fitriani Marsun SKM teman seperjuangan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Kesehatan Masyarakat khususnya teman Kesling dan kesmas B.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Makassar, 16 Desember 2014

Penulis

Nurhayati

70200110074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	10-35
A. Tinjauan Tentang Cabai.....	10
B. Tinjauan Tentang Pestisida.....	19
C. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36-44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36

B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Validasi dan Rehabilitasi Instrumen.....	43
G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45-60
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan Penelitian.....	50
BAB V PENUTUP.....	61-62
A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian.....	62
KEPUSTAKAAN.....	63-65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kandungan Gizi Cabai Merah 2008 Waktu Retensi Baku Pembandingan Residu Pestisida	13
2.2	Kandungan Nutrisi Cabai (<i>Capsicum Annum</i>) per Gram 2009	15
2.3	Pestisida yang digunakan untuk Mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman Cabai 2012	29
2.4	BMR Pestisida Cabai Berdasarkan Jenis Pestisida Menurut SNI 2008	33
4.1	Waktu Retensi Baku Perbandingan Residu Pestisida pada alat Kromatografi Gas Tahun 2014	47
4.2	Hasil Analisa Keberadaan Residu Pestisida	48
4.3	Keamanan dari Residu Pestisida Bahan Aktif pada Cabai Merah Besar dan Cabai Merah Keriting di Pasar Swalayan Kota Makassar Tahun 2014	49

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Cabai Merah Besar	14
2.2	Cabai Merah Keriting	14
2.3	Kerangka Fikir	15



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan izin Penelitian
2	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Balai Pengujian Pestisida BPTPH Sulawesi Selatan
4	Dokumentasi Penelitian
5	Riwayat Peneliti



ABSTRAK

Nama : Nurhayati
NIM : 70200110074
Konsentrasi : Kesehatan Lingkungan
Judul : Analisis Residu Pestisida pada Cabai Merah Besar dan Cabai Merah Keriting di Pasar Swalayan Kota Makassar

Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Sehingga penggunaan pestisida tidak dapat dihindari, akibatnya sayuran sering terkontaminasi oleh residu pestisida. Pestisida adalah salah satu bagian penting dalam pertanian. Namun pestisida berifat bioaktif dan merupakan racun. Setiap racunnya mengandung bahaya dalam penggunaannya, baik terhadap lingkungan maupun manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan jenis dan konsentrasi residu pestisida dalam cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A, cabai merah besar di pasar swalayan B dalam provinsi dan cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu study observasi dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di pasar swalayan A, B dan C kota Makassar. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Pengujian Pestisida BTPH Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa residu pestisida dengan bahan aktif prefenofos pada sampel cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A terdeteksi berdasarkan alat kromatografi gas dengan konsentrasi 0,439 mg/kg, nilai ini masih berada di bawah nilaimambang batas BMR pestisida berdasarkan SNI 2008 yaitu 2,0 mg/kg. Hasil pemeriksaan sampel cabai merah besar luar provinsi di pasar swalayan B dengan bahan aktif klorpirifos terdeteksi berdasarkan alat kromatografi gas dengan konsentrasi 0,0074 mg/kg, nilai ini masih berada di bawah nilaimambang batas BMR pestisida berdasarkan SNI 2008 yaitu 0,5 mg/kg. Sedangkan hasil pemeriksaan sampel cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C dengan bahan aktif deltametrin terdeteksi berdasarkan alat kromatografi gas dengan konsentrasi 0,135 mg/kg.

Kesimpulan: semua sampel cabai yang dijual di Pasar Swalayan A, B, dan C terdeteksi di bawah konsentrasi standar alat kromatografi gas (*gas chromatography*: agilent teknologi 7890A) di Laboratorium Pestisida UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultural Sulawesi Selatan. Saran untuk manajemen pasar swalayan kota Makassar agar tetap menjaga kebersihan sayuran cabai yang dijual sehingga mutunya terjamin dan aman bagi kesehatan.

Kata Kunci: Residu, Pestisida, Cabai besar, Cabai keriting, Pasar swalayan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-An'am : 99 mengingatkan kita akan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang memang penuh dengan tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan keperkasaan-Nya. Dalam tanah yang sama, unsur makanan yang sama, dan air yang sama, biji-biji yang sangat kecil itu menumbuhkan ribuan jenis tumbuhan dan buah-buahan dalam segala bentuk, warna, bau dan rasa.

Kekuatan Allah dalam tumbuh-tumbuhan terlihat pada modifikasi tumbuh-tumbuhan itu sesuai dengan kondisi lingkungan. Kelompok tumbuhan itu sebagian besarnya adalah tumbuhan penghasil, seperti kacang, kapas, gandum, jagung, cabai dan tomat (Pasya, 2004 dalam Sri Wahyuningsi, 2008 :1).

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya:

Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (QS. AT-Thaha : 53).

Cabai merupakan salah satu tanaman yang mengandung protein, lemak dan vitamin yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman kacang-kacangan lainnya. Tanaman ini merupakan sayuran yang permintaanya cukup tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor ke manca negara, seperti

Malaysia dan Singapura. Cabai salah satu sayuran yang mudah rusak dan sulit dipertahankan dalam bentuk segar, penggunaan cabai tidak hanya untuk konsumsi segar, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk seperti saus, sambal, pasta, bubuk, dan obat anestesi. Cabai merah dimanfaatkan pula sebagai penghias hidangan, diiris dan dibuat berbagai bentuk hiasan, saat ini cabai banyak dipergunakan sebagai bahan baku industri dan diperdagangkan dalam bentuk kering, namun dalam kegiatan produksinya sering menghadapi kendala serangan hama dan penyakit yang menyebabkan gagal panen atau hasilnya berkurang. (Munarso dkk, 2008: 3).

Produksi cabai memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pendapatan petani bahkan sumber devisa negara. Namun dalam kegiatan produksinya sering menghadapi kendala serangan hama dan penyakit yang menyebabkan gagal panen atau hasilnya berkurang (Miskiyah dan Munarso, 2009 dalam Purnama, 2013: 2).

Metode pengendalian yang paling dominan dilakukan petani untuk mengurangi serangan hama dan penyakit adalah dengan penggunaan pestisida. Sampai saat ini penggunaan pestisida yang paling banyak adalah pada tanaman hortikultura sehingga konsumen dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi akan konsentrasi residu pestisida.

Pestisida merupakan bahan kimia, sehingga penggunaannya yang berlebihan dapat menjadi sumber pencemar pada bahan pangan, air dan lingkungan hidup. Residu pestisida yang terdapat dalam produk pertanian menimbulkan efek yang bersifat tidak langsung terhadap konsumen, namun

dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan diantaranya berupa gangguan pada syaraf dan metabolisme enzim(Ameriana, 2008 dalam Purnama, 2013: 44).

Pestisida yang sering digunakan di Indonesia adalah golongan organoklorin yang merupakan racun kronis dan sangat berbahaya bagi lingkungan karena daya tahannya yang lama dan sukar terurai. Sekali pestisida ini digunakan maka racunnya akan berada di lingkungan dalam waktu yang sangat lama. Pestisida banyak digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT), seperti pada tanaman cabai, kubis, bayam dan wortel (Sudarmo, 1991 dalam Ohorella, 2013: 4).

Dampak aplikasi suatu pestisida dapat berupa keracunan akut ataupun keracunan kronis. Menurut laporan dari WHO dan UNEP, di seluruh dunia terdapat lebih dari 26 juta manusia keracunan pestisida dengan sekitar 220 ribu kematian pertahun. Di amerika Serikat, terdapat 67 ribu manusia per tahun keracunan pestisida. Sedangkan di Cina, terdapat 0,5 juta manusia keracunan pestisida dengan 0,1 juta kematian per tahun (Zhang, et al, 2011 dalam Purnama, 2013: 66).

Monitoring terbatas yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian melalui Direktorat Perlindungan Tanaman tahun 1980 menemukan sejumlah residu pestisida yang telah mencemari beberapa jenis sayuran seperti kentang, kubis, sawi, tomat, cabai, dan wortel pada daerah-daerah sentra sayuran di jawa. Hasil analisa menunjukkan bahwa residu pestisida tersebut di atas adalah dari jenis DDT, Diazinon, Dieldrin,

Fenitrihion dan Klorifirifos. Di negara-negara maju beberapa pestisida telah diteliti dapat bersifat *carcinogenic agent*, *mutagenic agent*, *teratogenic agent*, dan menjadi penyebab dari penyakit lain seperti leukimia dan sebagainya (Saenong, 2007 dalam Purnama, 2013: 67).

Data hasil pengawasan keamanan pangan yang dilakukan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tahun 2009-2007 menemukan residu pestisida golongan organofosfat pada sawi dan kangkung yang dijual dipasar swalayan di Terong Makassar. Hasil kajian yang dilakukan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular kelas 1 Makassar mengenai analisis dampak penggunaan pestisida terhadap petani dan lingkungan di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 menemukan adanya residu pestisida pada sayuran kentang, yaitu <0,002 mg/kg karbaril, <0,002 mg/kg karboforun, dan 6,46 mg/kg klorofirifos (Yusnani, 2013: 6).

Residu pestisida dapat menghambat pertumbuhan janin dan meningkatkan resiko kelainan bawaan. Apalagi selama perkembangannya, janin belum mampu mendetoksifikasi racun yang ada. Sementara otak dan sistem saraf sendiri masih terus berkembang hingga anak berusia 12 tahun. Sedangkan anak yang terpapar residu pestisida sejak balita, ketika usia SD kecerdasannya akan berpengaruh.

Beberapa laporan penelitian di Indonesia mengenai terdeteksinya residu pestisida organoklorin pada berbagai produk hasil pertanian di antaranya adalah adanya residu DDT, endosulfan, lindane dan aldrin yang

melampaui ambang batas sayuran wortel dari beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari hasil penelitian Sinulingga tahun 2006 mengenai residu pestisida dengan bahan aktif lindane juga ditemukan dalam sampel wortel di kawasan Sentra Kabupaten Karo Sumatra Utara. Dari hasil keamanan pangan tahun 2012 hasil uji residu pestisida, logam berat dan cemaran mikroba pada pasar bantaeng kandungan residu pestisida jenis organoklorin pada sayuran wortel tidak aman dengan konsentrasi lindane 0,0115 ppm artinya batas aman dilarang (Ohorella, 2013: 6).

Hasil pengawasan keamanan pangan di Pasar Terong Makassar untuk beberapa jenis sayuran dan buah yang diperiksa menunjukkan adanya residu pestisida golongan organoklorin masih digunakan secara insentif dalam jenis, dosis dan frekuensi penggunaannya oleh petani di Indonesia, meskipun beberapa jenis pestisida ini telah dilarang dan dibatasi penggunaannya (Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, 2012 dalam Ohorella, 2013:7).

Beberapa penelitian tentang residu pestisida pada sayuran didapatkan residu insektisida golongan organofosfat dengan kandungan profenofos dan klorpirifos pada bawang merah 0,565 – 1,167 ppm, cabe merah 0,024 – 1,713 ppm dan pada kentang 0,125 – 4,333 ppm. Sedangkan berdasarkan batas maksimum residu (BMR) untuk pestisida klorpirifos dan profenofos yaitu sebesar 0,1 mg/kg (Nur, 2013: 14).

Sebagian besar masyarakat di kota Makassar berbelanja di pasar swalayan karena tren masa kini. Pasar swalayan terkenal praktis pelayanannya dan akses yang sangat mudah untuk menjangkaunya. Pada pasar swalayan

tersedia sayuran yang segar dalam provinsi dan luar provinsi sehingga kebanyakan masyarakat di Makassar tertarik untuk berbelanja disana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Residu Pestisida pada Cabai Merah Besar dan Cabai Merah Keriting di Pasar Swalayan Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah terdapat residu pestisida pada cabai merah besar dan cabai merah keriting yang dijual di pasar swalayan A, pasar swalayan B, dan pasar swlayan C Kota Makassar”?

C. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat residu pestisida pada cabai merah besar dan cabai merah keriting di pasar swalayan Kota Makassar ?
2. Apakah cabai merah besar dan cabai merah keriting pada pasar swalayan Kota Makassar layak dikonsumsi ?

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Defenisi operasional dan kriteria objektif dijelaskan sebagai berikut:

Keamanan cabai adalah cabai terbebas dari residu pestisida dan aman untuk dikonsumsi

Kriteria objektif:

Aman: Apabila tidak ditemukan residu pestisida pada cabai merah besar dan cabai merah keriting

Masih aman: Apabila ditemukan residu pestisida pada cabai merah besar dan cabai merah keriting dibawah BMR pestisida

2. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar swalayan Kota Makassar selama ± satu bulan.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait residu pestisida adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Nama	Judul	Hasil
1	2012	Khodija Tussolihin Dalimunthe	Analisi Kuantitatif Residu Pestisida Prefenofos pada cabai merah segar dan cabai merah giling di beberapa Pasar Tradisionla Kota Medan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga sampel yang positif mengandung insektisida <i>prefenofos</i> di beberapa pasar tradisional kota medan
2	2013	Lilis Karlina	Identifikasi Residu Pestisida Klorpirifos dalam Cabai Besar dan Cabai Rawit di Pasar Terong dan Lotte Mart Kota Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdeteksi berdasarkan batas minimum deteksi pada alat Kromatografi gas di Balai Besar Laboraterium Kesehatan Makassar. Sedangkan hasil pemeriksaan residu pestisida yang dilakukan di Laboraterium pengujian pestisida BPTPH sebagai Laboraterium pembanding menemukan hasil positif mengandung pestisida dengan bahan aktif Klorpirifos.

No	Tahun	Nama	Judul	Hasil
3	2012	Yumarto	Uji Residu Insektisida pada Buah Cabai (<i>Capsicum Annum Linnaeus</i>) di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar residu insektisida dengan bahan aktif klorpirifos di pinrang satu dan di pinrang tiga tidak terdeteksi.
4	20013	Nur Ilma Hidayat	Identifikasi Residu Pestisida Klorpirifos dan Prefenofos pada Bawang Merah (<i>Allium ascalonicum</i>) di Pasar Terong dan Lotte Mart Kota Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdeteksinya pestisida klorpirifos pada bawang merah Lotte Mart dengan konsentrasi 0,00615 mg/kg dan pestisida prefenofos pada bawang merah dengan konsentrasi 0,0039 mg/kg. Residu pestisida ini masih dibawah batas maksimum residu (BMR) berdasarkan SNI 2008 YAITU 0,1 mg/kg.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui keberadaan residu pestisida pada cabai merah besar dan cabai merah keriting di pasar swalayan A, pasar swalayan B, dan pasar swalayan C Kota Makassar.

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui apakah terdapat residu pestisida pada cabai merah besar dan cabai merah keriting di pasar swalayan A, pasar swalayan B, dan pasar swalayan C Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai bahan referensi yang memberikan informasi tentang kandungan residu pestisida pada cabai merah besar dan cabai merah keriting yang akan berdampak timbulnya masalah kesehatan.

b. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan informasi bagaimana kandungan residu pestisida terhadap cabai merah besar dan cabai merah keriting di pasar swalayan untuk dijadikan sebagai acuan oleh pihak pasar swalayan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Cabai

1. Sejarah Cabai

Cabai diduga mulai dikonsumsi oleh orang-orang Indian pada awal 7000 sebelum Masehi. Menurut Smith 1968 bukti-bukti arkeologi berupa potongan, serpihan serta biji-biji cabai liar yang ditemukan di lantai gua Ocampo, Tamaulipas dan Tehuaca pada awal 5000 sebelum Masehi, telah teridentifikasi sebagai *C. Annuum*. Adanya dugaan bahwa cabai pertama kali ditemukan sebagai tumbuhan liar, bisa dibuktikan antara lain bahwa antara 5200 dan 3400 sebelum Masehi, orang-orang Indian baru mulai menanam tumbuhan cabai diantara tanaman budidaya tertua di Amerika. Pada 2500 sebelum Masehi di Amerika Selatan dilaporkan bahwa tumbuhan liar tersebut berasal dari Ancon dan Huaca Prieta di Peru, sehingga ada dugaan bahwa cabai berasal dari Meksiko (Heiser, 1969 dalam Warisno, 2010: 2).

Alur persebaran cabai yang diawali dari manusia primitif di Amerika, dapat diketahui dari data-data sejarah. Bagi orang-orang Indian, cabai merupakan jenis tumbuhan yang sangat dihargai dan menempati urutan kedua setelah jagung dan ubi kayu. Selain itu cabai juga mempunyai peranan penting dalam upacara keagamaan dan kultur budaya orang-orang Indian. Proses domestikasinya sendiri diwujudkan dalam bentuk adanya perubahan-perubahan terutama pada tipe buah

misalnya bentuk liarnya berukuran kecil, posisinya tegak, bila sudah berwarna merah mudah luruh, berubah menjadi buah yang berukuran besar, seringkali posisinya menggantung, tidak mudah luruh serta mempunyai variasi warna merah pada buahnya (Tutie, 2005: 4).

Menurut Rahmi Yuniarti, Muhammad Syukur, Rahmansyah Dermawan tahun 2012, Tanaman cabai juga sudah berabad-abad ditanam di Indonesia. Tanaman cabai memiliki banyak ragam, bentuk dan tipe pertumbuhan. Bentuk buahnya bervariasi; mulai dari bulat, lonjong, hingga panjang, dengan ukuran kecil sampai besar. Variasi juga terdapat pada warna buah cabai. Ada yang berwarna merah, ungu, hijau, kuning dan putih.

2. Taksonomi Tanaman Cabai

Tanaman cabai memiliki banyak nama populer di berbagai negara. Namun secara umum tanaman cabai disebut sebagai *pepper* atau *chili*. Namun *pepper* lebih umum digunakan untuk menyebut berbagai jenis cabai besar, cabai manis, atau paprika. Sedangkan *chili*, biasanya digunakan untuk menyebut cabai pedas, misalnya cabai rawit.

Di Indonesia sendiri, penamaan cabai juga bermacam-macam tergantung daerahnya. Cabai sering disebut dengan berbagai nama lain, misalnya, lombok, mengkreng, rawit, cengis, cengek.

Dalam tata nama ilmiah, tanaman cabai termasuk dalam genus *Capsicum*, dengan klasifikasi lengkap sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Devisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Sub Kelas : Asteridae
Ordo : Solanales
Famili : Solanaceae
Genus : Capsicum
Spesies : Capsicum annuum (cabai besar, cabai lonceng)
Capsicum frutescens (cabai kecil/cabai rawit)

a. Taksonomi Tanaman Cabai Merah:

Kingdom : *Plantae* (Tumbuhan)
Subkingdom : *Tracheobionts* (berpembuluh)
Superdivisio : *Magnoliophyta* (menghasilkan biji)
Diviso : *Magnoliophyta* (berbunga)
Kelas : *Magnoliopsida* (berkeping dua/dikotil)
Sub-Kelas : *Asteridae*
Ordo : *Solanales*
Familia : *Solanaceae* (suku terung-terungan)
Genus : *Capsicum*
Spesies : *Capsicum annum* L

Buah muda berwarna hijau tua setelah masak menjadi merah cerah. Biji yang masih muda berwarna kuning, setelah tua menjadi coklat, berbentuk pipih, berdiameter sekitar 4 mm. Rasa buahnya

yang pedas dapat mengeluarkan air mata orang yang menciumnya. Cabai merah dapat diperbanyak dengan biji (Dalimartha, 2003 dalam Susilowati, 2009: 6).

b. Kandungan Kimia Cabai Merah

Cabai merah mengandung banyak kandungan gizi seperti terlihat Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Kandungan Gizi Cabai Merah

Kandungan Gizi	Jumlah
Energi	31,00 kal
Protein	1,00 g
Lemak	0,30 g
Karbohidrat	7,30 g
Kalsium	29,00 mg
Fosfor	24,00 mg
Serat	0,30 g
Besi	0,50 mg
Vitamin A	71,00 mg
Vitamin B ₁	0,05 mg
Vitamin B ₂	0,03 mg
Vitamin C	18,00 mg
Niacin	0,20 mg

Sumber : Wirahakusumah (1995) dalam Susilowati (2008: 7)

Keterangan : kandungan dalam 100 BDD (Berat Dapat Dimakan)

3. Jenis bentuk, warna dan tingkat kepedasan cabai merah besar dan cabai merah keriting yaitu:

1) Cabai Merah Besar

Tinggi tanaman : 45-100 cm

Ukuran buah : 6-10cm

Warna buah :hijau tua jika masih muda dan merah jika sudah matang.

Permukaan buah : rata dan licin

Daging buah : tebal

Rasa : relatif kurang pedas



Gambar 2.1. Cabai Besar

2) Cabai Keriting

Tinggi tanaman : 50-100 cm

Ukuran buah : 1,0-3,0cm

Warna buah : hijau tua, putih kehijauan, atau putih jika masih muda dan merah bila sudah matang.

Permukaan buah : licin

Rasa : cukup pedas



Gambar 2.2. Cabai Keriting

Sumber: Susilowati (2008:9)

4. Kandungan dan Manfaat Cabai

Secara umum cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, diantaranya Kalori, Protein, Lemak, Karbohidrat, Kalsium, Vitamin A, B1,C dan mineral terdapat dalam buah cabai. Cabai tidak hanya bersifat pedas namun kandungan gizi cabai ternyata setara dengan berbagai jenis buah-buahan yang rasa manis. Namun karena adanya kandungan minyak atsiri yang bersifat ‘membakar’, maka cabai terasa pedas dan dilupakan kandungan gizinya. Jenis cabai yang tidak pedas seperti paprika, merupakan salah satu yang kaya gizi. Bisa dikatakan bahwa cabai, bahkan yang paling pedas sekalipun, kandungan gizinya setara dengan sayur dan buah-buahan lain.

Tabel 2.2
Kandungan Nutrisi Cabai (*Capsicum Annum*) per Gram

Komposisi Nutrisi	Jumlah	
Energi	318	Kkal
Nutrisi Utama		
1. Air	8,05	Mg
2. Protein	12,01	Mg
3. Lipid	17,27	Mg
4. Abu	6,04	Mg
5. Karbohidrat	56,63	Mg
Jumlah	100	Mg
Nutrisi Mikro (Sub Utama)		
1. Serat	27,20	Mg
2. Gula	10,34	Mg
3. Kalsium (Ca)	148,00	Mg
4. Besi (Fe)	7,80	Mg
5. Magnesium (Mg)	152,00	Mg
6. Fosfor (p)	293,00	Mg
7. Kalium (K)	2.014,00	Mg
8. Natrium (Na)	30,00	Mg
9. Zink (Zn)	2,48	Mg
Komposisi Nutrisi	318	Mg

10. Tembaga (Cu)	0,37	Mg
11. Mangan (Mn)	2,00	Mg
12. Selenium (Se)	8,80	Mcg
13. Vitamin	76,40	Mg
14. Thiamin	0,33	Mg
15. Ribaflavin	0,92	Mg
16. Niacin	8,70	Mg
17. Vitamin B6	2,45	Mg
18. Folate	106,00	Mcg
19. Choline	51,50	Mg
20. Vitamin A	41,61	Mcg
21. Vitamin E	29,83	Mg
22. Vitamin K	80,30	Mcg
23. Asam Lemak	3,26	G
24. Fitosterol	83,00	Mg
25. Beta Karoten	21.840,00	Mcg
26. Beta Cryptoxanthin	6.252,00	Mcg
27. Lutein + Zeoxanthin	12.157,00	Mcg

Sumber: Dia Mufti Erlina, (2009: 9)

Berdasarkan nilai gizinya cabai berkhasiat untuk menjaga kesehatan tubuh seperti:

1. Penghangat badan

Unsur pedas cabai yang dihasilkan oleh minyak asiri membuat tubuh kita menjadi hangat. Selain minyak atsiri, kandungan lemak pada cabai juga membantu menghangatkan tubuh. Jadi tidak heran jika kita akan merasa panas dan bercucuran keringat saat mengkonsumsinya.

2. Menghasilkan energi

Total kalori yang dihasilkan cabai sebanyak 318 kkal yang berasal dari karbohidrat, lemak dan protein. Kalori akan dibakar untuk menghasilkan energi. Namun kebutuhan kalori anda tidak akan terpenuhi dengan hanya memakan cabai saja. Fungsi penghasil energi pada cabai hanyalah untuk tambahan bukan bahan pokok.

3. Mencerdaskan dan membangun sel baru

Unsur protein dalam cabai cukup tinggi. Protein berfungsi membentuk sel baru sehingga kita akan mudah sembuh jika terluka. Selain itu protein juga berfungsi mencerdaskan otak. Jadi konsumsi cabai perlu ditingkatkan terutama cabai paprika yang tidak pedas.

4. Antioksidan

Cabai juga melawan zat toksik dan bibit penyakit dalam tubuh. Beberapa antioksidan dalam cabai adalah vitamin C, vitamin E, vitamin K, fitosterol, beta karoten, dan beta crytoxantin. Dengan mengkonsumsi cabai akan mengurangi resiko kanker.

5. Meningkatkan kesuburan dan menutrisi kulit

Sudah tidak diragukan lagi kalau vitamin E membuat seseorang lebih subur. Selain itu, vitamin E pada cabai juga berfungsi menyehatkan kulit dan membuatnya tetap kencang.

6. Menurunkan kolesterol sekaligus mencegah penyakit jantung

Didalam cabai ada zat yang namanya fitosterol sebagai lemak baik untuk tubuh kita. Fitosterol akan mengangkat plak pada pembuluh darah, mencegah penyerapan kolesterol darah di usus, serta menurunkan pembentukan kolesterol sehingga tidak ada penumpukan kolesterol dipembuluh darah maupun koroner jantung. Dengan begitu pembuluh darah kita tetap elastis dan jantung tetap sehat.

7. Memenuhi kebutuhan mineral tubuh

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa cabai mengandung mineral kompleks. Mineral ini sangat berfungsi dalam fisiologis tubuh seperti system syaraf yang membutuhkan natrium dan kalium, hemoglobin yang terbentuk dari fe, Zn sebagai anti diare.

8. Mencegah osteoporosis

Kandungan kalsium cabai cukup tinggi sehingga bisa menghindarkan kita dari kerapuhan tulang dan pengeroposan gigi. Jadi tetap tegak dan bisa makan enak sampai tua.

9. Meredakan pilek dan hidung tersumbat

Cabai mengandung senyawa capsaicin yang membuat rasanya pedas. Capsaicin dapat mengencerkan lendir yang menyumbat rongga hidung kita. Ini juga berlaku untuk penderita batuk berdahak.

10. Analgesik

Rasa pedas dan panas yang ditimbulkan capsaicin akan menghambat pengiriman signal rasa sakit kesaraf otak. Selain itu capsaicin juga merangsang pembentukan hormon endorphin yang membangkitkan rasa nikmat dan bahagia.

11. Menjaga kesehatan mata

Ternyata cabai tinggi vitamin A yang menjaga kesehatan mata kita. Memang kandungan vitamin A pada cabai tidak lebih tinggi dari wortel, tapi lebih tinggi dibandingkan makanan lain. Bagi yang tidak suka wortel bisa menggunakan cabai sebagai alternatif penjaga kesehatan mata.

12. Menyembuhkan reumatik

Lagi-lagi kandungan capsaicin mampu menghilangkan rasa pegal dan ngilu akibat reumatik.

13. Mengobati bengkak atau bisul

Ternyata cabai juga efektif dan bermanfaat untuk mengatasi bengkak dan bisul.

Cabai mengandung berbagai macam senyawa berguna bagi kesehatan manusia. Cabai mengandung anti oksidan yang berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan radikal bebas (Warisno, 2010: 2).

B. Tinjauan Tentang Pestisida

1. Pengertian Pestisida

Pestisida (Inggris : Pesticide) berasal dari kata pest yang berarti hama dan cide yang berarti mematikan/racun. Jadi pestisida adalah racun hama. Secara umum pestisida dapat didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mengendalikan populasi jasad yang dianggap sebagai pest (hama) yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan manusia.

Peraturan Menteri Pertanian no 07/PERMENTAN/SR.140/2/2007 mendefinisikan bahwa pestisida adalah zat kimia atau bahan lain dan jasad renik serta virus yang digunakan untuk:

- a) Memberantas atau mencegah hama-hama tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian.
- b) Memberantas rerumputan

- c) Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan.
- d) Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan.
- e) Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan perairan dan ternak.
- f) Memberantas dan mencegah hama-hama air.
- g) Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan alat-alat pengangkutan
- h) Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan menggunakan pada tanaman, tanah atau air.

Pestisida adalah bahan kimia untuk membunuh hama, baik insekta, jamur maupun gulma, sehingga pestisida dikelompokkan menjadi : Insektisida (pembunuh Insekta), Fungisida (Pembunuh Jamur), dan Herbisida (pembunuh tanaman pengganggu/gulma). Pestisida telah secara luas digunakan untuk tujuan memberantas hama dan penyakit tanaman dalam bidang pertanian. Pestisida telah secara luas digunakan untuk tujuan memberantas nyamuk, kepinding, kecoa dan berbagai serangga pengganggu lainnya. Di lain pihak pestisida ini secara nyata banyak menimbulkan keracunan pada orang (Afrianto, 2008: 4).

2. Pengelolaan Pesticida

Penggolongan Pesticida :

a. Berdasarkan hama sasaran yaitu : (Kementrian Pertanian, 2011) yaitu:

- 1) Akarisida, berasal dari kata akari, yang dalam bahasa Yunani berarti tungau atau kutu. Akarisida sering juga disebut Mitesida. Fungsinya untuk membunuh tungau atau kutu. Contohnya Kelthane MF dan Trithion 4 E.
- 2) Algasida, berasal dari kata alga, bahasa latinnya berarti ganggang laut, berfungsi untuk membunuh algae. Contohnya Dimanin.
- 3) Alvisida, berasal dari kata avis, bahasa latinnya berarti burung, fungsinya sebagai pembunuh atau penolak burung. Contohnya Avitrol untuk burung kakaktua.
- 4) Bakterisida, Berasal dari katya latin bacterium, atau kata Yunani bakron, berfungsi untuk membunuh bakteri. Contohnya Agrept, Agrimycin, Bacticin, Tetracyclin, Trichlorophenol Streptomycin.
- 5) Fungisida, berasal dari kata latin fungus, atau kata Yunani spongos yang artinya jamur, berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan. Dapat bersifat fungitoksik (membunuh cendawan) atau fungistatik (menekan pertumbuhan cendawan). Contohnya Benlate, Dithane M-45 80P, Antracol 70 WP, Cupravit OB 21, Delsene MX 200, Dimatan 50 WP.

- 6) Herbisida, berasal dari kata lain herba, artinya tanaman setahun, berfungsi untuk membunuh gulma. Contohnya Gramoxone, Basta 200 AS, Basfapon 85 SP, Esteron 45 P
- 7) Insektisida, berasal dari kata latin insectum, artinya potongan, keratan segmen tubuh, berfungsi untuk membunuh serangga. Contohnya Lebaycid, Liroside 650 EC, Thiodan, Sevin, Sevidan 70 WP, Tamaron
- 8) Molluskisida, berasal dari kata Yunani molluscus, artinya berselubung tipis atau lembek, berfungsi untuk membunuh siput. Contohnya Morestan, PLP, Brestan 60.
- 9) Nematisida, berasal dari kata latin nematoda, atau bahasa Yunani nema berarti benang, berfungsi untuk membunuh nematoda. Contohnya Nemacur, Furadan, Basamid G, Temik 10 G, Vydate.
- 10) Ovisida, berasal dari kata latin ovum berarti telur, berfungsi untuk merusak telur.
- 11) Pedukulisida, berasal dari kata latin pedis, berarti kutu, tuma, berfungsi untuk membunuh kutu atau tuma.
- 12) Piscisida, berasal dari kata Yunani Piscis, berarti ikan, berfungsi untuk membunuh ikan. Contohnya Sqousin untuk Cypirinidae, Chemish 5 EC.
- 13) Predisida, berasal dari kata Yunani Praeda berarti pemangsa, berfungsi sebagai pembunuh predator.
- 14) Rodentisida, berasal dari kata Yunani rodere, berarti pengerat berfungsi untuk membunuh binatang pengerat. Contohnya Dipachin 110, Klerat RMB, Racumin, Raticus RB, Ratilan, Ratak, Gisorin.

- 15) Termisida, berasal dari kata Yunani termes, artinya serangga pelubang kayu berfungsi untuk membunuh rayap. Contohnya Agrolene 26 WP, Chlordane 960 EC, Sevidol 20/20 WP, Lindamul 10 EC, Difusol CB.
- 16) Silvisida, berasal dari kata latin silva berarti hutan, berfungsi untuk membunuh pohon atau pembersih pohon.
- 17) Larvasida, berasal dari kata Yunani lar, berfungsi membunuh ulat (larva). Contohnya Fenthion, Dipel (Thuricide)
3. Berdasarkan cara bekerjanya yaitu :
- a) Racun perut
- Berarti mempunyai daya bunuh setelah jasad sasaran memakan pestisida. Pestisida yang termasuk golongan ini pada umumnya dipakai untuk membasmi serangga-serangga pengunyah, penjilat dan penggigit. Daya bunuhnya melalui perut. Contoh: Diazinon 60 EC.
- b) Racun kontak
- Berarti mempunyai daya bunuh setelah tubuh jasad terkena pestisida. Organisme tersebut terkena pestisida secara kontak langsung atau bersinggungan dengan residu yang terdapat di permukaan yang terkena pestisida. Contoh: Mipcin 50 WP.
- c) Racun gas
- Berarti mempunyai daya bunuh setelah jasad sasaran terkena uap atau gas. Jenis racun yang disebut juga fumigant ini digunakan terbatas pada ruangan ruangan tertutup.

4. Berdasarkan Struktur Kimia Pestisida yaitu : (Dep.Kes RI Dirjen P2M dan PL 2000 dalam Diana (2009):

a) Golongan organochlorin

Pestisida organochlorin misalnya DDT, Dieldrin, Endrin dan lain-lain. Umumnya golongan ini mempunyai sifat: merupakan racun yang universal, degradasinya berlangsung sangat lambat larut dalam lemak.

b) Golongan organophosfat

Pestisida organophosfat misalnya diazonin dan basudin. Golongan ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : merupakan racun yang tidak selektif degradasinya berlangsung lebih cepat atau kurang persisten di lingkungan, menimbulkan resisten pada berbagai serangga dan memusnahkan populasi predator dan serangga parasit, lebih toksik terhadap manusia dari pada organoklor.

c) Golongan carbamat termasuk baygon, bayrusil, dan lain-lain:

Golongan ini mempunyai sifat sebagai berikut : mirip dengan sifat pestisida organophosfat, tidak terakumulasi dalam sistem kehidupan, degradaasi tetap cepat diturunkan dan dieliminasi namun pestisida ini aman untuk hewan, tetapi toksik yang kuat untuk tawon.

d) Senyawa dinitrofenol misalnya morocidho 40EC.

Salah satu pernafasan dalam sel hidup melalui proses perubahan ADP (Adenosine-5-diphosphate) dengan bantuan energi sesuai dengan kebutuhan dan diperoleh dari rangkaian pengaliran elektronik potensial tinggi ke yang lebih rendah sampai dengan reaksi proton

dengan oksigen dalam sel. Berperan memacu proses pernafasan sehingga energi berlebihan dari yang diperlukan akibatnya menimbulkan proses kerusakan jaringan.

e) Pyretroid

Salah satu insektisida tertua di dunia, merupakan campuran dari beberapa ester yang disebut pyretrin yang diekstraksi dari bunga dari genus *Chrysanthemum*. Jenis pyretroid yang relatif stabil terhadap sinar matahari adalah : deltametrin, permetrin, fenvalerate. Sedangkan jenis pyretroid yang sintetis yang stabil terhadap sinar matahari dan sangat beracun bagi serangga adalah : difetrin, sipermetrin, fluvalinate, siflutrin, fenpropatrin, tralometrin, sihalometrin, flusitriate.

f) Fumigant

Fumigant adalah senyawa atau campuran yang menghasilkan gas atau uap atau asap untuk membunuh serangga, cacing, bakteri, dan tikus. Biasanya fumigant merupakan cairan atau zat padat yang mudah menguap atau menghasilkan gas yang mengandung halogen yang radikal (Cl, Br, F), misalnya chlorofikrin, ethylendibromide, naftalene, metylbromide, formaldehid, fostin.

g) Petroleum

Minyak bumi yang dipakai sebagai insektisida dan miksida. Minyak tanah yang juga digunakan sebagai herbisida.

h) Antibiotik

Misalnya senyawa kimia seperti penicillin yang dihasilkan dari mikroorganisme ini mempunyai efek sebagai bakterisida dan fungisida.

5. Formulasi pestisida yaitu : (Depkes RI 2009 dalam Yuantari,2013)

Pestisida yang telah diformulasi penggunaannya perlu dicairkan terlebih dahulu, atau dapat langsung digunakan tergantung dari formulasinya. Keuntungan diperoleh dari formulasi suatu jenis pestisida antara lain :

- a) Dapat meningkatkan aktivitasnya sebagai pestisida
- b) Dapat tahan lama disimpan tanpa mudah rusak oleh pengaruh suhu atau cuaca.

c) Mudah ditangani oleh pengguna

1) Jenis Formulasi Pestisida yaitu :

a) Emulsi Pekat (*Emulsifiable Concentrate*)

Merupakan formulasi cairan yang bahan aktifnya dapat larut dalam pelarut yang tidak larut dalam air, bila dicampur dengan air formulasi ini akan membentuk emulsi pekat. Formulasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu cairan yang kepekatan rendah (1-10% bahan aktif) yang biasanya digunakan untuk mengendalikan serangga terbang atau merayap dan cairan yang kepekatan tinggi (10-80% bahan aktif) biasanya digunakan pada sayur-sayuran atau hewan ternak.

b) Serbuk basah (*Wettable powders*)

Merupakan formulasi pestisida yang kering dengan kandungan bahan aktif yang cukup tinggi. Bila dicampur dengan air, akan terbentuk

dua lapisan yang terpisah dengan serbuknya terapung dibagian atas. Untuk menghindari ini, perlu dicampur dengan bahan pembasah (wetting agent), formulasi ini mengandung 50-75% tanah liat atau bedak. Formulasi ini lebih mudah terhisap oleh pemakai pada saat menyiapkannya, sehingga perlu menggunakan alat pelindung.

c) Serbuk larut air (*Water soluble powders*)

Formulasi kering yang mengandung 50% bahan aktif dan diperlukan bahan pembasah atau perata jika akan digunakan untuk menyemprot tanaman yang mempunyai permukaan batang/daun yang licin atau berbulu.

d) Suspensi

Formulasi ini bahan aktifnya dicampur dengan serbuk tertentu dan sedikit air, sehingga terbentuk pestisida dengan serbuk yang halus dan basah.

e) Debu (*Dust*)

Merupakan formulasi pestisida yang paling sederhana dalam pemakaiannya dan merupakan formulasi kering yang mengandung bahan aktif yang sangat rendah, berkisar antara 1-10%. Formulasi ini senantiasa digunakan dalam keadaan kering tanpa perlu dicampur air atau zat pelarut lainnya.

f) Butiran (*Granules*)

Formulasi ini menyerupai debu tetapi dengan ukuran yang lebih besar dengan ukuran 20-80 mesh dan dapat digunakan langsung tanpa

perlu dicairkan atau dicampur dengan bahan pelarut. Bahan aktif dari formulasi ini pada umumnya berbentuk cair tetapi setelah dicampurkan dengan butiran, bahan aktifnya akan menyerap atau melekat pada butiran, dengan konsentrasi bahan aktifnya berkisar 2%-45 %.

g) Aerosol

Bahan aktif pestisida jenis ini harus dilarutkan dan mudah menguap dengan ukuran butiran kurang dari 10 mikron sehingga mudah terhisap sewaktu bernapas dan masuk paru-paru. Formulasi jenis ini hanya efektif terhadap serangga yang terbang atau merayap dengan residu yang sangat rendah.

h) Umpan

Umpan merupakan makanan atau bahan tertentu yang telah dicampur racun. Bahan makanan ini menjadi daya penarik jasad pengganggu sasaran. Pestisida dengan formulasi ini sangat mudah untuk digunakan yaitu hanya dengan meletakkannya di tempat-tempat tertentu yang strategis. Jumlah bahan aktif didalam umpan sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan, tetapi berbahaya bagi anak-anak dan hewan ternak.

i) Fumigansia (*Fumigant*)

Fumigant merupakan formulasi yang berada dalam bentuk gas atau cairan yang mudah menguap. Gas ini dapat terhisap oleh kulit dan sangat beracun terhadap manusia, biasanya digunakan untuk

mengendalikan hama-hama gudang dan jamur pathogen yang berada didalam tanah.

Tabel 2.3
Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman Cabe.

NO	Jenis OPT	Nama Dagang	Bahan Aktif
	Hama		
1.	Kutu Daun <i>Aphis sp</i>	Pengasus 500 ES Rotraz 200 EC Supracide 40 EC Arrivo 30 EC Marshal 200 EC	Diafentiuron 500 g/l Amitraz 200 g/l Metidation 25% Sipermetrin 30,36 g/l Karbosulfan 200 g/l
2.	Kutu Daun <i>Trips sp</i>	Tetrin 30 EC Voltage 560 EC Tokuthion 500 C Curacron 500 EC Decis 2,5 EC Mesurol 150 WP Mition 500 EC Condifor 200 SL Delta 25 EC Kanon 400 EC Rotraz 200 EC Pegasus 500 SC	Teta sipermetrin: 30g/l Piraklofos: 559 g/l Protiofos: 500 g/ Profenofos: 500 g/l Deltametrin: 25 % Merkaptodimetru: 50% Etion: 500 g/l Imidaklorprid: 200 g/l Deltametrin: 25% Dimetoat: 400 g/l Amitraz: 200 g/l Amitraz: 200 g/l Diafentiuron: 500 g/l
3.	Kutu Putih <i>Planococcus sp.</i>	Akothion 400 EC Apploud 10 WP Diazinon 10 G	Metidation: 400 g/l Buprofezin: 440 g/l Diazinon: 10%
1.	Penyakit Penyakit layu bakteri <i>R. solanacearum</i>	Agrept 20 WP Basamid G Kasumin 5/75 WP Starner 20 WP Bactocin 15 L Stamycin 20 WP Basamid G	Streptomisin sulfat: 20% Dazomet: 98% Kasumisin hidroklorida: 5% Asam oksolinik: 20% Ksitetrasiklin: 150 g/l Streptomisin Dazomet 98 g/l
	Penyakit Akar Nematoda	Curater 3 G Furadam 3 G Indofuradam 3 G Marshal 5 G Petrofur 3 G	Karbofuran : 3% Karbofuran : 3 % Karbofuran : 3% Karbosulfan : 5% Karbofuran : 3% Kadusafos: 10%

NO	Jenis OPT	Nama Dagang	Bahan Aktif
2.	Busuk akar rimpang <i>Pythium sp.</i>	Rugby 10 G Altan 50 WP Antracol 70 WP Benlate Amistar 250 SC Anvil 50 SC Basvistin 50 WP Bavistin 50 DF Bendas 50 WP Champion 77 WP	Kaptan : 50% Propineb : 70% Benomil : 50% Dazomet : 98% Tembaga oksiklorida:50% Mancozeb : 73,8% Kaptan : 50% Mancozeb : 80 % Mancozeb :80% Kaptan :50%
3.	Bercak daun <i>Colletotrichum sp</i>	Daconil 75 WP Daconil 500 F Dithane M-45 80 WP Kibox 85 WP Kumulus 80 WDC Kocide 54 WCD petrostar 70 WP Rubigan 120 EC Redhos 70/12 WP Topsin M 500 F	hidroklorida:722g/l Metiram : 80 % Mankozeb : 80 % Azoksistrobin : 250 g/l Heksakonazol : 50 g/l Karbendazim : 50% Karbendazim : 50% Karbendazim : 50% Tembaga hidrosida: 77% Klorotalonil : 75% Klorotalonil : 500 g/l Mankozeb : 80%

Sumber: dinas Pertanian kecamatan pinrang, 2007 (dalam Yumarto,2012:3)

6. Dampak Pestisida

a. Dampak pestisida terhadap hasil pertanian

Risiko bagi konsumen adalah keracunan residu-residu (sisa-sisa) pestisida yang terdapat dalam hasil pertanian. Risiko bagi konsumen dapat berupa keracunan langsung karena memakan produk pertanian yang tercemar pestisida atau lewat rantai makanan. Meskipun bukan tidak mungkin konsumen menderita keracunan akut, tetapi risiko konsumen umumnya dalam bentuk keracunan kronis, tidak segera terasa, dan dalam jangka panjang mungkin menyebabkan gangguan kesehatan (Yumarto, 2012: 4).

b. Dampak Pestisida Terhadap Lingkungan

Dibalik manfaatnya yang besar, pestisida memiliki dampak yang cukup merugikan pada pemakaiannya. Pestisida dapat merusak ekosistem air yang berada disekitar lahan pertanian. Jika pestisida digunakan, akan menghasilkan sisa-sisa air yang mengandung pestisida. Air yang mengandung pestisida ini akan mengalir melalui sungai atau aliran irigasi (Yuantari, 2013: 2).

Penggunaan pestisida oleh petani dapat tersebar di lingkungan sekitarnya, air permukaan, air tanah, tanah dan tanaman. Sifat yang dimiliki akan berpengaruh terhadap kehidupan organisme non sasaran, kualitas air, kualitas tanah, dan udara. Pestisida sebagai salah satu agen pencemar ke dalam lingkungan baik melalui udara, air maupun tanah dapat berakibat langsung terhadap komunitas hewan, tumbuhan terlebih manusia. Pestisida yang masuk kedalam lingkungan melalui beberapa proses baik pada tataran permukaan tanah maupun bawah permukaan tanah. Penurunan kualitas air tanah serta kemungkinan terjangkitnya penyakit akibat pencemaran air merupakan inplikasi langsung dari masuknya pestisida ke dalam lingkungan. Aliran permukaan seperti sungai, danau, dan waduk yang tercemar pestisida akan mengalami proses dekomposisi bahan pencemar. Dan pada tingkat tertentu, bahan pencemar tersebut mampu terakumulasi (Karlina, 2013).

Pestisida di udara terjadi melalui proses penguapan oleh foto-dekomposisi sinar matahari terhadap badan air dan tumbuhan. Selain pada itu masuknya pestisida di udara disebabkan oleh driff yaitu proses penyebaran pestisida ke udara melalui penyemprotan oleh petani yang terbawa angin. Akumulasi pestisida yang terlalu berat di udara pada akhirnya akan menambah parah pencemaran udara. Gangguan pestisida oleh residunya terhadap tanah biasanya terlihat pada tingkat kejenuhan karena tingginya kandungan pestisida persatuan volume tanah. Unsur-unsur hara alami pada tanah makin terdesak dan sulit melakukan regenerasi hingga mengakibatkan tanah-tanah masam dan tidak produktif (Sulistiyono, 2004 dalam Yuantari, 2013: 4).

Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Ruum : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Ar-Ruum : 41).

Peringatan Alqur’an tersebut mutlak benar. Kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat “perbuatan tangan manusia”, faktanya memang demikian. Karena pestisida kimia yang digunakan dalam membasmi hama biasanya tidak hanya berpengaruh kepada hama sasaran yang merugikan tanaman saja, akan tetapi hama yang bermanfaat juga ikut terbasmi. Bahkan, adapula yang masih menyisakan residu pada tanaman yang diambil manfaat

manusia tersebut. Sehingga dibutuhkan pestisida yang hanya mempengaruhi efek pada pestisida yang mengganggu saja dan sifatnya tidak membuat hama tersebut resisten (kebal) terhadap pestisida. Penyebab rusaknya keseimbangan alam itu adalah keserakahan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan sesaat tanpa mengindahkan hak hidup sesamanya. (Bakrydan Sukri, 1996 dalam Sri Wahyuningsi, 2008 : 36).

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya dengan menjaga lingkungan melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati.

Tabel 2.4
BMR Pestisida Cabai Berdasarkan Jenis Pestisida Menurut SNI 2008

No.	Jenis Pestisida	BMR
1	Klorpirifos	0,5mg/kg
2	Profenofos	2mg/kg
3	Lindane	2mg/kg
4	Malation	3mg/kg
5	Amitraz	0,5mg/kg
6	Asefat	1mg/kg
7	Toksafen	2mg/kg
8	Dikofol	1mg/kg
9	Metil	5mg/kg
10	Metil Azinphos	1mg/kg
11	Mevinfos	0,2mg/kg
12	Ovamyl	2mg/kg

Sumber SNI 2008

c. Efek Pestisida Terhadap Kesehatan

1) Mekanisme kerja pestisida dalam tubuh manusia


Pestisida golongan organofosfat dan karbamat adalah persenyawaan yang tergolong asetilkolinesterase seperti physostigmin, prostigmin, diisopropyl fouro fosfat dan karbamat.

Aksi toksis organofosfat adalah “Cara bekerjanya pestisida organofosfat pada serangga maupun pada manusia berpengaruh sebagai penekanan cholinesterase yang irreversible” , sehingga dalam waktu yang lama akan terjadi stimulasi yang berlebihan pada syaraf kholinergis dan susunan syaraf pusat (SSP), karena adanya stimulasi asetilkholin”. Pestisida jenis organofosfat akan mengadakan ikatan yang kuat dengan fosfat, sehingga menjadi rusak dan hilang kemampuannya untuk menghidrolisa asetilkholin.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian merupakan kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur atau diamati melalui penelitian yang akan dilakukan. Sehingga menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, kerangka konsep yang baik dapat memberikan informasi yang jelas kepada peneliti dalam memilih desain penelitian (Rianto, 2011).

Gambar 2.3 Kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian observational study yaitu menganalisis residu pestisida yang terdapat pada cabai merah besar dan cabai merah keriting melalui pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan alat kromatografi gas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di pasar swalayan A, pasar swalayan B, dan pasar swalayan C Kota Makassar, pemeriksaan laboratorium pengujian pestisida BPTPH Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu menganalisis residu pestisida yang terdapat pada cabai merah besar dan cabai merah keriting di pasar swalayan A, pasar swalayan B, dan pasar swalayan C Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A, cabai merah besar luar provinsi di pasar swalayan B dan cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 kg cabai, dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 lokasi yaitu pasar swalayan A, pasar swalayan B, dan pasar swalayan C Kota Makassar. Sampel yang diambil masing-masing 1 kg cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A, 1 kg cabai merah besar luar provinsi di pasar swalayan B, dan 1 kg cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C, sehingga jumlah sampel yang dianalisa sebanyak 3 sampel, lama kedatangan sampel 2 hari.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang digunakan terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium BPTPH Sulawesi Selatan dan hasil wawancara dengan karyawan pasar swalayan A, pasar swalayan B, dan pasar swalayan C Kota Makassar. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari panduan referensi buku, internet, jurnal, dan karya tulis.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Laboratorium Pengujian Pestisida BPTPH Sulawesi Selatan.

1. Pengambilan sampel cabai merah besar dan cabai merah keriting :

Masing-masing sampel cabai merah besar dan cabai merah keriting yang diambil dari beberapa lokasi tersebut dimasukkan ke dalam plastik steril dan diikat dengan pengikat karet. Selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk segera dianalisa kadar residu pestisidanya.

2. Metode Pengujian:

a. Prinsip bahan aktif Prefenofos dan Klopifos

Pestisida diekstraksi dengan aseton, diklorometana dan petroleum eter $40^{\circ} - 60^{\circ}$. Ekstrak diuapkan sampai hampir kering dan residu dilarutkan dalam iso oktana/toluena. Umumnya tidak diperlukan pembersihan (*clean up*), dan ditetapkan dengan kromatograf gas menggunakan detektor spesifik untuk senyawa yang mengandung unsur fosfor, yaitu detektor fotometri nyala (FDF) dengan filter P (526 nm) atau detektor ionisasi alkali (AFID).

Pereaksi:

- 1) Aseton
- 2) Diklorometana
- 3) Petroleum eter $40^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}$
- 4) Iso Oktana
- 5) Toluena

Peralatan:

- 1) Pencincang
- 2) Blender atau Ultra turaks
- 3) Kromatograf gas, dilengkapi dengan detektor spesifik untuk senyawa yang mengandung unsur fosfor (FPD dan NPD)

Prosedur

Ekstraksi:

- 1) Contoh analitik yang telah dicincang, ditimbang seberat 15 gram
- 2) Lumatkan dengan ultra turaks (blender) dengan 30 ml. Aseton selama 30 detik.
- 3) Tambahkan 30 ml. diklormetan dan 30 ml. Petroleum eter $40^{\circ} - 60^{\circ}$

- 4) campuran dilumatkan selama 30 detik
- 5) Sentrifugasi selama 2 menit pada 4.000 rpm (bila larutan keruh)
- 6) Enap tuangkan fase organik
- 7) Pipet 25 mL fase organik ke dalam labu bulat
- 8) Pekatkan dalam rotavapor pada suhu tangas air 40⁰ C. Sampai hampir kering, kemudian keringkan dengan mengalirkan gas nitrogen sampai kering
- 9) Larutkan residu dalam 5 mL iso oktana: toluena (90: 10, v/v).

Pembersihan (*clean up*):

Umunya tidak diperlukan pembersihan.

b. Prinsip Metode Pengujian bahan aktif Deltametrin

Pestisida diekstraksi dengan aseton, diklorometana dan petroleum eter. Ekstrak diuapkan sampai hampir kering dan residu dilarutkan dalam iso oktana/toluena umumnya tidak diperlukan pembersihan. Bila ada gangguan pembersihan dilakukan dengan kolom silika gel dan ditetapkan dengan kromatografi gas menggunakan detektor penangkap elektron (ECD).

Pereaksi:

- 1) Aseton
- 2) Diklorometana
- 3) Petroleum eter 40⁰ - 60⁰
- 4) Isooktana
- 5) Toluena
- 6) Etil asetat
- 7) n-Heksana
- 8) n.Dekana

- 9) silika gel 60, ukuran partikel 70-230 mesh, merk art no.7754. aktifkan silika gel pada suhu 130 °C selama satu malam dan biarkan dingin dalam Erlenmeyer bertutup didalam eksikator. Tambahkan 5bagian (berat) air kedalam 95 bagian (berat) silika diaktifkan, aduk hingga merata dan tidak ada gumpalan. Biarkan 24 jam sebelum digunakan .
 - 10) Eluen A: Ampuran etil asetat dan n-Heksana (0,2:99,8 v/v)
 - 11) Eluen B: Campuran etil asetat dan n-Heksana (10:90 v/v)
 - 12) Baku internal (internal standar) dekaklorobifenil (DCB), larutan dekaklorobifenil 1µg DCH/ml. n-Heksana.
- Peralatan:
- 13) Pencincang
 - 14) Ultra turaks atau blender
 - 15) Ro'avapor
 - 16) Kolom kromatografi, 250 mm x 6 mm yang dilengkapi dengan kran teflon dan tempat cadangan pelarut.
 - 17) Kapas atau wol kaca yang telah dibersihkan dengan campuran petroleum eter dan aseton (4: 1, v/v) selama 8 jam dalam suxlet
 - 18) Kromatograf gas, yang dilengkapi dengan detektor penangkap elektron (ECD)
 - 19) Alat sentrifus

Prosedur

Ekstraksi:

- 1) Contoh analitik yang telah dicincang, ditimbang seberat 15 gram.
- 2) Umatkan dengan ultra turaks (blender) dengan 30 ml. aseton selama 30 detik.
- 3) Tambahkan 30 ml. diklormetrin dan 30 ml. petroleum eter $40^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}$.
- 4) Campuran dilumatkan selama 30 detik.
- 5) Sentrifugasi selama 2 menit pada 4.000 rpm (bila larutan keruh).
- 6) Enap tuangkan fase organik.

CATATAN: ukur volume yang didapat (menggunakan metode akstraksi berbasis aseton, harus dilakukan sedikit koreksi sebesar 87/90 untuk perhitungan kadar residu karena adanya kontraksi volume).

- 7) Pipet 25 ml. fase organik kedalam labu bulat
- 8) Pekatkan dalam rotavapor pada suhu tangas air lebih kurang 40°C , sampai hampir kering, kemudian keringkan dengan mengalirkan gas nitrogen sampai kering.
- 9) Larutkan residu dalam 5 ml. iso oktara: toluena (90: 10, v/v)
- 10) Suntikkan 1-2 μl , ekstrak kedalam kromatograf gas

c. Analisa residu pestisida:

Analisa residu insektisida dikerjakan berdasarkan metode pengujian residu pestisida yang diterbitkan oleh Komisi Pestisida Departemen Pertanian tahun 1977 dengan mengacu kepada metode yang direkomendasikan oleh Codex Alimentarius Commission (CAC) dengan menggunakan Gas Cromatography (Agilent 7890 A) yang dilengkapi

dengan detector FPD (Flame Photometric Detector). Tahapan analisa meliputi: sampel segar dirajang halus, dihomogenkan lalu ditimbang 1 kg per sampel, kemudian dimasukkan kedalam Cup Homogenizer. Tambahkan aseton 100 ml dan homogenkan dengan menjalankan alat selama 20 menit dengan kecepatan 100 rpm. Sampel kemudian disaring menggunakan corong Buchner celit 545, tampung pelarut dalam labu bundar 300 ml. Evaporasi hingga ± 1 ml. Kemudian tambahkan 50 ml heksan secara bertahap. Selanjutnya dimurnikan dengan melewati sampel pada kolom kromatografi yang telah diisi dengan florisil ± 3 g dan sodium anhidrat. Evaporasi hingga ± 1 ml. Kemudian bilas tabung dengan aseton secara bertahap dan tampung dalam tabung uji sampai volume 10 ml. Selanjutnya sampel siap di injeksikan/diderivatisasi ke dalam GC sebanyak 2 μ m.

Contoh hasil ekstraksi diinjeksikan pada alat GC dan detektor electro capture detector (ECD) dengan kondisi suhu injeksi 240⁰C, suhu kolom 220-230⁰C, kecepatan alir gas 40 ml/menit, serta kecepatan kertas 5 mm/menit.

Data hasil analisis residu pestisida pada masing-masing cabai kemudian diinterpretasikan, dan angka yang diperoleh dibandingkan dengan standar BMR residu pestisida yang ada (RSNI 3). Kemudian disajikan secara deskriptif.

F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

1. Validasi

Validasi adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Uji validasi atau kesahihan digunakan untuk mengetahui secara tepat suatu alat ukur mampu melakukan fungsinya. Validasi dalam penelitian ini menggunakan peralatan laboratorium yang sudah sesuai. Sedangkan pengukur dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang telah ahli dalam melakukan pengujian, khususnya dalam analisis residu pestisida.

2. Rehabilitasi Instrumen

Rehabilitasi adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan dua perlakuan yaitu simplo dan duplo. Hal ini dilakukan untuk melihat perbandingan pengujian pertama dengan kedua apakah terdapat perbedaan atau kesalahan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel cabai merah besar dan cabai merah keriting di laboratorium diolah secara manual dengan bantuan komputer dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi (tabel umum) disertai dengan penjelasan.

2. Analisis data

Data yang terdapat dalam tabel dianalisis secara deskriptif, kemudian dibandingkan dengan standar batas maksimum residu (BMR) menurut SNI 2008 yaitu 2 mg/kg tentang syarat-syarat residu pestisida sehingga diketahui apakah kualitas cabai merah besar dan cabai merah keriting tersebut memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Geografis

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan pada tanggal 15 September 2014 yang dilakukan di pasar swalayan kota Makassar dan melakukan pemeriksaan residu pestisida di Laboratorium Pestisida UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulawesi Selatan.

1. Pasar Swalayan A

Lokasi pasar swalayan A berada di Jln. Boluevard (depan) dan Jln. Pengayoman (belakang Mall sekaligus parkir).

2. Pasar Swalayan B

Lokasi pasar swalayan B berada di Jln. Pengayoman Blok A9. Panakukang Makassar.

3. Pasar Swalayan C

Lokasi pasar swalayan C berada di Jalan Perintis Kemerdekaan km. 8 No. 234 (Tamalanrea) Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Hasil Penelitian

1. Alur distribusi cabai

Mengenai distribusi cabai, diketahui bahwa cabai memiliki perantara sebelum sampai ketangan konsumen untuk dikonsumsi mulai dari petani cabai kemudian cabai tersebut dikumpulkan oleh distributor cabai dan distribusi ke pasar swalayan tertentu sebelum ke konsumen. Alur distribusi cabai ini diketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara

yang dilakukan peneliti dilokasi penelitian, diketahui bahwa cabai yang dijual di pasar swalayan A, pasar swalayan B dan pasar swalayan C memiliki distributor yang berbeda baik berbeda dari jenis cabai maupun lokasi hasil pertanian.

Cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A umumnya berasal dari daerah Malino. Jika pada daerah penghasil cabai sedang kurang hasil panennya, maka distribusi cabai biasanya berasal dari daerah lain seperti bantaeng, dan enrekang. Dan cabai merah besar luar provinsi yang dijual di pasar swalayan B berasal dari Surabaya. Sedangkan Pada cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C berasal dari hasil pertanian Malino dan Sungguminasa Kab Gowa. Cabai ini adalah cabai merah besar luar provinsi antar kota. Data tersebut merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pegawai pasar swalayan A, pasar swalayan B dan pasar swalayan C kota Makassar.

Pestisida yang paling banyak digunakan oleh petani adalah pestisida golongan organofosfat dan pyrethroid karena mempunyai daya basmi yang kuat, cepat dan hasilnya kelihatan. Hal ini sejalan dengan data peredaran pestisida dari BPTPH Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pestisida yang paling sering digunakan oleh petani adalah pestisida dengan bahan aktif prefenopos, klorpirifos dan deltametrin, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan cabai merah besar dan cabai merah keriting dengan memeriksa keberadaan residu pestisida bahan aktif prefenopos

pada cabai merah besar dalam provinsi, bahan aktif klorpirifos pada cabai merah besar luar provinsi dan deltametrin pada cabai merah keriting.

Keberadaan residu pestisida pada cabai merah besar dan cabai merah keriting di pasar swalayan kota Makassar, tahun 2014.

1. Keberadaan Residu Pestisida

Tabel 4.1
Waktu Retensi Baku Pembanding Residu Pestisida

jenis bahan aktif pestisida	waktu retensi (menit)
Prefenofos	7.124
klorpirifos	5.883
Deltametrin	7.021

Sumber; standar alat kromatografi gas, 2014

Berdasarkan tabel 4.1 adalah acuan standar untuk mengetahui ada tidaknya kandungan residu pestisida bahan aktif prefenofos dan klorpirifos pada sampel yang akan diteliti. Tabel standar acuan ini, merupakan standar yang keluar dari hasil pengukuran dengan menggunakan kromatografi gas (*Gas Chromatography : agilent technologies 7890A*). Apabila hasil sampel dari simplo (pengujian I) dan duplo (pengujian II) berada dikisaran waktu retensi yang ditetapkan tidak jauh dari 1% maka positif ada bahan kandungan residu pestisida pada sampel tersebut.

Tabel 4.2 Hasil Analisa Keberadaan Residu Pestisida

Sampel	Tempat	Hasil Pengujian				Ket
		Pref	Klop	Delta	Konsentrasi	
Cabai Merah Besar (L)	Pasar Swalayan A	(+)			0,439 mg/kg	Terdeteksi
Cabai Merah Besar (I)	Pasar Swalayan B		(+)		0.0074 mg/kg	Terdeteksi
Cabai Merah Keriting (L)	Pasar Swalayan C			(+)	0,135 mg/kg	Terdeteksi

Sumber: data primer 2014

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil pemeriksaan kandungan residu pestisida di laboratorium pestisida UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulawesi Selatan pada cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A terdeteksi mengandung residu pestisida bahan aktif prefenofos dengan konsentrasi dibawah konsentrasi standar alat kromatografi gas (*gas chromatography*: aqilent teknologi 7890A) berdasarkan waktu retensi yang telah ditetapkan sebagai batas deteksi alat Kromatografi. Hasil pemeriksaan pada cabai merah besar luar provinsi di pasar swalayan B terdeteksi mengandung residu pestisida bahan aktif klopiprifos dengan konsentrasi dibawah konsentrasi standar alat kromatografi gas (*gas chromatography*: aqilent teknologi 7890A) berdasarkan waktu retensi yang telah ditetapkan sebagai batas deteksi alat kromatografi. Hasil pemeriksaan pada cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C terdeteksi mengandung residu pestisida dengan bahan aktif deltametrin dengan konsentrasi dibawah konsentrasi standar alat kromatografi gas (*gas chromatography*: aqilent teknologi 7890A) berdasarkan waktu retensi yang telah ditetapkan sebagai batas deteksi alat kromatografi gas dengan menggunakan elektron (ECD).

2. Keamanan Cabai dari Residu Pestisida

Tabel 4.3
Keamanan dari Residu Pestisida Bahan Aktif pada Cabai Merah Besar dan
Cabai Merah Keriting di Pasar Swalayan Kota Makassar Tahun 2014

Sampel	Tempat	BMR		Hasil pemeriksaan	Ket
		Bahan Aktif	mg/kg		
Cabai Merah Besar (L)	Pasar Swalayan A	Prefenofos	2,0 mg/kg	0,439 mg/kg	Masih Aman
Cabai Merah Besar (I)	Pasar Swalayan B	Klopirifos	0,5 mg/kg	0,0074mg/kg	Masih Aman
Cabai Merah Keriting (L)	Pasar Swalayan C	Deltametrin	0 (berdasarkan instansi BPTPH)	0,135 mg/kg	Masih Aman

Sumber: data primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hasil pemeriksaan kandungan konsentrasi residu pestisida bahan aktif di Laboratorium Pestisida UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulawesi Selatan pada cabai merah besar dalam provinsi, cabai merah besar luar provinsi dan cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan Kota Makassar. Hasil pemeriksaan kandungan konsentrasi residu pestisida cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A terdeteksi dengan bahan aktif Prefenofos, namun masih dibawah batas maksimum residu dan tidak dikonsumsi secara terus menerus, sehingga masih aman bagi tubuh manusia. Hasil pemeriksaan kandungan konsentrasi residu pestisida cabai merah besar luar provinsi di pasar swalayan B terdeteksi dengan bahan aktif Klopirifos, namun masih dibawah batas maksimum residu dan tidak dikonsumsi secara terus menerus, sehingga masih aman untuk dikonsumsi. Hasil pemeriksaan kandungan konsentrasi residu pestisida cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C terdeteksi

dengan bahan aktif Deltametrin, namun masih aman menurut laboraterium pestisida BTPH Sulawesi Selatan.

1. Pembahasan

1. Keberadaan Residu Pestisida

Pestisida yang paling banyak digunakan oleh petani adalah pestisida golongan organofosfat dan pyrethroid karena mempunyai daya basmi yang kuat, cepat dan hasilnya kelihatan. Hal ini sejalan dengan data peredaran pestisida dari BTPH Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pestisida yang paling sering digunakan oleh petani cabai adalah pestisida dengan bahan aktif Deltametrin, Prefenofos dan Klorpirifos sehingga peneliti melakukan penelitian pada cabai merah keriting dalam provinsi, dan cabai merah besar dalam dan luar provinsi di pasar swalayan kota Makassar.

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan waktu retensi baku perbandingan residu pestisida pada bahan aktif prefenofos yaitu 7.124 menit, waktu retensi baku perbandingan residu pestisida bahan aktif klorpirifos yaitu 5.883 dan waktu retensi baku perbandingan residu pestisida bahan aktif deltametrin yaitu 7.021. tabel standar acuan ini, merupakan standar yang keluar dari hasil pengukuran pada saat akan dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada sampel yang akan diperiksa sehingga setiap pemeriksaan harus bersamaan waktu injeksinya. Hal ini memungkinkan untuk mengurangi kesalahan prosedur dalam pemeriksaan sampel pada saat diuji laboratorium. Pemeriksaan

laboratorium juga dilakukan dua kali agar hasilnya akurat yaitu pengujian pertama (*simplo*) kemudian pengujian kedua yaitu (*duplo*). Apabila hasil pemeriksaan sampel berada pada kisaran waktu retensi yang telah ditetapkan dan tidak jauh dari 1% dari kisaran, maka sampel dinyatakan positif ada bahan aktif pestisida sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil analisis konsentrasi residu pestisida dengan bahan aktif profenofos dalam cabai merah besar dalam provinsi yang dijual di pasar swalayan A menunjukkan bahwa residu pestisida bahan aktif Profenofos terdeteksi namun berada dibawah nilai deteksi pada alat kromatografi gas yang memiliki standar waktu retensi sekitar 7.124 menit dengan beda selisih paling jauh 1% dari waktu retensi yang telah ditetapkan pada saat pemeriksaan sampel cabai merah besar dalam provinsi. Hasil analisa konsentrasi residu pestisida dengan bahan aktif Klorpirifos dalam cabai merah besar luar provinsi yang dijual di pasar swalayan B menunjukkan bahwa residu pestisida bahan aktif klorpirifos terdeteksi namun berada dibawah nilai deteksi pada alat Kromatografi gas yang memiliki standar waktu retensi sekitar 5.883 menit dengan beda selisi paling jauh 1% dari waktu retensi yang telah ditetapkan pada saat pemeriksaan sampel cabai merah besar luar provinsi.

Hasil analisa konsentarsi residu pestisida dengan bahan aktif deltametrin dalam cabai merah besar keriting dalam provinsi yang dijual dipasar swalayan C menunjukkan bahwa residu pestisida bahan aktif

deltametrin terdeteksi namun berada dibawah nilai deteksi pada alat kromatografi gas yang memiliki standar waktu retensi sekitar 7.021 menit dengan beda selisi paling jauh 1% dari waktu retensi yang telah ditetapkan pada saat pemeriksaan sampel cabai merah keriting dalam provinsi. Hal ini berarti ditemukan residu pestisida dibawah ambang batas dengan bahan aktif Propenofos di pasar swalayan A, Klopififos di pasar swalayan B dan Deltametrin di pasar swalayan C kota Makassar. Hasil ini memberikan dua kemungkinan, yaitu residu pestisida pada sampel cabai yang di periksa berasal dari tempat penjual pasar swalayan atau petani pemasok cabai tersebut memang menggunakan pestisida golongan Organofosfat berbahan aktif Profenofos, Klopififos dan pestisida golongan Pyretroid berbahan aktif Deltametrin.

Hasil diatas menunjukkan bahwa semua sampel cabai terdeteksi residu pestisida namun masih dibawah konsentrasi standar alat Kromatografi gas (gas. Cromatografi:agilent 789 OA) berdasarkan waktu retensi yang telah ditetapkan sebagai batas deteksi alat kromatografi. Di dalam lingkungan pasar swalayan sebelum menjual ke konsumen sayuran dilakukan pencucian oleh para pegawai sayuran dan buah-buahan di mana tujuannya untuk mebersihkan sayuran dan buah-buahan dari kotoran yang menempel seperti debu, kotoran, tanah sisa pestisida, atau zat pengaruh tubuh, dan jamur agar sayuran dan buah-buahan terlihat mengkilap, bersih, segar dan lebih menarik. Hal ini tidak dilakukan hanya sekali saja, namun berulang kali sehingga sisa-sisa pestisida yang

melekat pada kulit sayuran akan berkurang, pada sayuran dan buah-buahan di pasar swalayan sedikit berbeda dengan pasar tradisional karena di pasar swalayan menyimpan pada tempat pendinginan atau freezer sehingga lebih lama bertahan dan tetap segar kelihatannya.

2. Keamanan Cabai

Keamanan cabai dari residu pestisida dengan bahan aktif yang beragam, namun pestisida yang paling banyak digunakan oleh petani adalah pestisida golongan Organofosfat dan pestisida golongan Pyretroid karena mempunyai daya basmi yang kuat, cepat dan hasilnya kelihatan. Hal ini sejalan dengan data peredaran pestisida dari BPTPH Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pestisida yang paling sering digunakan oleh petani cabai adalah pestisida dengan bahan aktif Profenofos, Klopifrifos dan Deltametrin. Pestisida golongan Organofosfat sifatnya lebih cepat mengalami penguapan dan mudah larut dalam air, sedangkan pestisida golongan Pyretroid sifatnya yang sintesisi dan stabil jenis ini tidak larut dalam air melainkan hanya tercampur saja.

Hasil analisis konsentrasi residu pestisida dengan bahan aktif profenofos dalam cabai merah besar dalam provinsi yang dijual di pasar swalayan A menunjukkan bahwa residu pestisida bahan aktif Profenofos terdeteksi sesuai dengan ketentuannya mulai dari jenis, dosis dan penggunaan pestisida dalam buku pedoman penggunaan insektisida (pestisida) dalam pengendalian vektor oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, sehingga cabai merah besar dalam provinsi yang

dijual di pasar swalayan A kota Makassar tersebut aman ditinjau dari BMR bahan aktif Profenofos dalam cabai berdasarkan SNI 7313:2008 yaitu 2,0 mg/kg dari hasil pemeriksaan residu pestisida.

Adapun hasil analisis konsentrasi residu pestisida dengan bahan aktif Klorpirifos dalam cabai merah besar luar provinsi yang dijual di pasar swalayan B kota Makassar menunjukkan bahwa residu pestisida bahan aktif Klorpirifos terdeteksi, namun berada dibawah nilai BMR bahan aktif Klorpirifos yaitu 0,5 mg/kg. Sedangkan hasil analisa konsentarsi residu pestisida dengan bahan aktif Deltametrin dalam cabai merah keriting dalam provinsi yang dijual di pasar swalayan C kota Makassar menunjukkan bahwa residu pestisida bahan aktif deltametrin terdeteksi namun masih dibawah nilai BMR berdasarkan SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian No. 711/Kpts/TP270/8/98, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/PP.340/5/2009. Jika dibandingkan dengan standar SNI 7313:2008 maka residu pestisida yang terdeteksi masih dibawah ambang batas residu pestisida yang diperbolehkan dalam makanan. Hal ini menunjukkan bahwa residu pestisida pada sampel cabai merah besar dalam provinsi, cabai merah besar luar provinsi dan cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan A, B dan C kota Makassar menunjukkan bahwa ditemukannya residu pestisida bahan aktif profenofos, klorpirifos dan deltametrin dibawah BMR, di mana kemungkinan penggunaan pestisida pada petani yang menjadi pemasok cabai yang dijual dipasar swalayan A, B dan

pasar swalayan C kota Makassar masih sesuai dengan ketentuannya mulai dari jenis, dosis dan penggunaan pestisida dalam buku pedoman penggunaan insektisida (pestisida) dalam pengendalian vektor oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, sehingga cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A yaitu 0,439 mg/kg, cabai merah besar luar provinsi di pasar swalayan B yaitu 0,0074 mg/kg dan cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C yaitu 0,135 mg/kg Kota Makassar tersebut masih aman ditinjau dari BMR bahan aktif Profenofos, Klorpirifos dan Deltametrin dalam cabai berdasarkan SNI 7313: 2008. Sehingga cabai yang dijual di pasar swalayan A, pasar swalayan B dan pasar swalayan C kota Makassar tersebut aman ditinjau dari BMR bahan aktif Profenofos, Klorpirifos dan Deltametrin dalam cabai, tetapi belum bisa dikatakan aman untuk dikonsumsi, karena kemungkinan terdapat senyawa atau residu pestisida lain mengingat penelitian ini hanya mengidentifikasi salah satu bahan aktif pestisida di setiap sampel cabai.

Dalam Al-Quran Allah swt, juga berfirman dalam Q.S Al-Thaahaa/20:81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ
تَحَلَّىٰ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَىٰ ﴿٨١﴾

Terjemahnya:

“Makanlah diantara rezki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku kepadamu. Dan barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia, ” (Departemen Agama RI, 2009).

Ayat di atas menyatakan bahwa kita umat manusia diberitahukan untuk senantiasa menjaga diri sebaik-baiknya. Salah satunya dengan cara menjaga kesehatan melalui mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita dan makanan yang telah diberikan kepada kita. Hal tersebut tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun mental seseorang dan jangan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh serta jangan pula melampaui batas makanan yang diharamkan baik cara mendapatkannya maupun ketika akan dikonsumsi. Makananlah makanan sesuai dengan kebutuhan, tidak mengganggu kesehatan dan dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai hal-hal yang berlebihan serta menghindari perbuatan yang berlebih-lebihan dalam hal apa pun agar Allah swt tidak murka kepada manusia.

Dalam Al-Quran Allah SWT, juga berfirman dalam surah Al A'raaf : 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak Menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa makanlah makanan yang halal, enak dan bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta makanlah apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu, dan janganlah berlebihan dalam segala hal karena sesungguhnya Allah tidak menyukai. (Shihab, 2002).

Dalam Al-Quran Allah SWT, juga berfirman dalam surah Al Maidah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ



Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (*thayib*) dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya-Nya”(QS. Al Maidah: 88).

Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan halal, tapi juga baik (*Halalan Thoyyiban*) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas.

Hal tersebut juga merupakan peringatan pada cara penempatan/penyimpanan yang digunakan selama masih ditempat penjualan serta penggunaan pestisida pada petani yang tidak berlebihan dalam pemakaiannya pada tanaman cabai dan harus sesuai dengan tata cara penggunaan pestisida yang baik dan benar, sehingga tidak merugikan pihak konsumen, penggunaan pestisida pada cabai yang berlebihan pada saat ditanam hingga masa panen dapat menyebabkan adanya residu pestisida pada cabai yang seharusnya tidak ada pada cabai sebelum dimakan oleh manusia, karena penggunaan pestisida sebenarnya hanya untuk membasmi hama tanaman sehingga tidak merusak tanaman cabai dan buahnya.

Residu pestisida dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis pestisida, dosis pestisida yang digunakan, tehnik aplikasi pestisida, iklim dan cuaca. Pencucian oleh hujan bisa mengakibatkan berkurangnya residu pestisida. Selain itu kemungkinan yang terjadi setelah pestisida

disemprotkan yaitu terurai dengan alam baik di udara, air hujan. Umumnya pestisida golongan mudah terurai dengan waktu paruh yang diperlukan pestisida bahan aktif profenofos dan klopififos hanya selama seminggu. Jika terkena panas matahari, pestisida golongan organofosfat dapat menguap sedangkan golongan pyretroid mdah terurai dengan waktu \pm 2 minggu, sehingga dalam proses distribusi cabai dari petani hingga sampai ketangan suplayer ke pasar swalayan dapat berkurang kandungan residu pestisidanya karena terkena sinar matahari atau hujan dalam proses transportasinya serta pencucian yang dilakukan oleh suplayer pasar swlayan sebelum sampai ke tokoh, serta pencucian yang dilakukan konsumen sebelum dikonsumsi. Selain itu, kromatografi gas yang digunakan juga dapat berpengaruh karena prosedur yang telah ditetapkan, setelah sampel dan bahan aktif diinjeksi kemudian larutan pembersih, untuk membersihkan kromatografi gas dari sisa senyawa sebelumnya dan waktu pemeriksaan yang seharusnya disegerakan di injeksi.

Menurut Astawan (2009), residu pestisida seringkali masih tertinggal pada sayuran sampai beberapa hari setelah penyemprotan, terutama pada musim kemarau karena itu seharusnya petani tidak memanen sayuran sehabis disemprot pestisida. Proses pencucian sayur yang tidak sempurna juga perlu diwaspadai, pasalnya beberapa zat kimia dalam pestisida ada yang tidak bisa hilang meski dicuci.

Penelitian Karlina (2013), menyatakan bahwa hasil analisis konsentrasi residu petisia dengan bahan aktif Klorpirifos dalam cabai besar dan cabai rawit yang dijual di Pasar Terong dan Lotte Mart Kota Makassar menunjukkan bahwa residu pestisida Klorpirifos tidak terdeteksi berdasarkan batas minimum deteksi pada alat kromatografi gas di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Sedangkan hasil pemeriksaan residu pestisida yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Pestisida BPTPH sebagai laboratorium pembanding menemukan hasil positif mengandung residu pestisida dengan bahan aktif klorpirifos.

Penelitian Dalimunthe (2012), menyatakan bahwa hasil analisis konsentrasi residu pestisida terdapat tiga sampel yang positif mengandung residu insektisida propenofos berdasarkan batas deteksi pada alat kromatografi gas yaitu cabai merah segar di pasar Aksara dengan nilai 1,205 mg/kg, cabai merah segar dari pasar Sukaramai dengan nilai 1,205 mg/kg, dan cabai merah giling dari pasar Petisah dengan nilai 0,128 mg/kg.

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa hasil pemeriksaan residu pestisida pada cabai merah besar dalam provinsi, cabai merah besar luar provinsi dan cabai merah keriting dalam provinsi di temukan residu pestisida golongan organofosfat berbahan aktif profenofos, klorpirifos dan residu pestisida golongan pyrethroid dengan bahan aktif deltametrin di bawah BMR pada cabai merah besar dalam provinsi di pasar swlayan A, cabai merah besar luar provinsi di pasar swlayan B dan cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swlayan C,

tetapi masih aman untuk dikonsumsi oleh konsumen untuk residu pestisida golongan organofosfat bahan aktif profenofos, klorpirifos dan residu pestisida golongan pyrethroid bahan aktif deltametrin, namun hal tersebut tidak dapat dinyatakan aman karena positif terdeteksi bahan aktif residu pestisida dan diketahui bahwa banyak beragam bahan aktif pestisida yang beredar di Indonesia.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terbatas dalam mengetahui residu yang terkandung dalam sampel yang diteliti karena peneliti hanya meneliti satu bahan aktif residu pestisida per sampel sehingga kemungkinan masih ada residu pestisida bahan aktif lain yang bisa di temukan selain bahan aktif yang peneliti teliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian analisis residu pestisida pada cabai merah besardan cabai merah keriting di pasar swalayan Kota Makassar Tahun 2014, disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat residu pestisida pada sampel Cabai Merah Besar dalam provinsi dengan bahan aktif Profenefos pada pasar swalayan A kota Makassar.
2. Terdapat residu pestisida pada sampel Cabai Merah Besar luar provinsi dengan bahan aktif Klorpirifos pada pasar swalayan B kota Makassar.
3. Terdapat residu pestisida pada sampel Cabai Merah Keriting dalam provinsi dengan bahan aktif Deltametrin pada pasar swalayan C kota Makassar.
4. Sampel cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A, cabai merah besar luar provinsi di pasar swalayan B dan sampel cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C kota Makassar masih aman karena masih di bawah BMR pestisida menurut SNI 2008.

B. Implikasi Penelitian

1. Manajemen pasar swalayan agar tetap menjaga kebersihan sayuran pada cabai yang dijual sehingga mutunya terjamin dan aman bagi kesehatan
2. Penelitian prodik oleh Dinas kesehatan dan peningkatan pengawasan oleh BPOM kepada pasar swalayan kota Makassar dan petani agar pestisida pada sayur dan buah tetap sesuai dengan penggunaan dan dosisnya.

3. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan analisis residu pestisida pada bahan pangan lainnya di pasar pasar swalayan lain ataupun pemeriksaan residu pestisida selain bahan aktif prefenofos, klopirifos dan deltametrin pada sampel yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto. Kajian Keracunan Pestisida Pada Petani Penyemprot Cabe di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Magister Kesehatan Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang: Semarang 2008. <http://eprints.undip.ac.id/16195/1/AFRIYANTO.pdf>
- Andarwati, A. U. Efisiensi Teknis Usaha Tani Kentang dan Faktor yang mempengaruhi Dikecamatan Batur Kabupaten Banjar Negara. *Skripsi*. [online] <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/51239/H11aau.pdf?sequence=1> [diakses 14 Juni 2014]. 2011.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya. Kementrian Agama.
- Narwanti. I. Residu Pestisida Piretroid pada Bawang Merah di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan: Yogyakarta 2012.
- Khodija T D. Analisis Kuantitatif Residu Insektisida Prefenofos pada Cabai Merah Segar dan Cabai merah giling di beberapa Pasar Tradisional Kota Medan. *skripsi*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Medan 2012.
- Karlina L, Daud A, Ruslan. Identifikasi Residu Pestisida Klorpirifo dalam Cabai Besar dan Cabai Rawit di pasar Terong dan Lotte Mart. Fakultas Kesehatan Masyarakat: UNHAS Makassar 2013.
- Shihab Q, Tafsir Al-Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.
- Muharlis. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Konsumen dalam mengkonsumsi Cbai Merah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. 2007.
- Miskiyah dan S.J Munarso. Kontaminasi Residu Pestisida pada Cabai Merah, Selada, dan Bawang Merah. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian: Bogor 2008.
- Astawan M. Kandungan Gizi Aneka Bahan Makanan. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi IPB. 2009.
- Muh Taufik. Analisi Pendapatan Usaha Tani dan Penanganan Pascapanen Cabai Merah. Balai Pengkajian Teknologi Petanian Sulawesi Selatan: Makassar 2010.
- Made Astawan. bahaya lalapan mentah. Ahli teknologi pangan dan gizi dari IPB. Dalam bukunya Kandungsn Gizi Aneka Bahan Makanan 2009.
- Mill, Raymond Grinding. *SNI Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian 2008*: Badan Standardisasi Nasional. 2014

<http://www.scribd.com/doc//SNI-Batas-Maksimum-Pestisida> (Diakses 17juli 2014)

- Nur I H. Identifikasi Residu Pestisida Klorpirifos dan Prefenofos pada Bawang Merah (*Allium acalonicum*) di Pasar Terong dan Lotte Mart Kota Makassar. Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat: Universitas Hasanuddin 2013.
- Ohorella, A. Identifikasi Residu Pestisida Golongan Organoklorin bahan aktif Lindan pada Wortel di Pasar Tradisional (Pasar terong) dan Pasar Modern (Swalayan Ramayana M'tos Supermaket) Kota Makassar. Fakultas Kesehatan Masyarakat: UNHAS Makassar. 2011.
- Purnama, A, I. Identifikasi residu Pestisida pada Lindane pada tomat buah dan tomat biasa dipasar terong dan Lotte Mart kota Makassar. Fakultas Kesehatan Masyarakat: UNHAS Makassar. 2013.
- Rahmayani, A. Analisa Keterpaduan Pasar Komoditas Cabai Merah antara Pasar Bundar Kabupaten Sragen Dengan Pasar Legi Kota Surakarta. Fakultas pertanian universitas Seblas Maret: Surakarta. 2009.
- Rianto, A. *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Nuhmed. 2011.
- Widianto R, Petunjuk Penggunaan Pestisida. 2008.
- Notoadmojo. Metodologi Penelitian Kesehatan. 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta. Lentera hati: 2002.
- susilowati. Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Karotenoid dari Cabai Merah (*Capsicum annum L*). Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN): Malang 2008.
- Sriwahyuningai. Manfaat Tanaman dan Tumbuhan dalam Perspektif Islam. Jurusan biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang (UIM): Malang 2008.
- Joni M, Miskiyah. Wisnu Broto. Studi Kandungan Residu Pestisida pada Kubis, Tomat, dan Wortel di Malang dan Cianjur. Balai besar pertanian dan pengembangan pasca panen pertanian, 2009.
- Samin, S. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2013.

Tutie D, *Capsicum* spp. (Cabai): Asal, Persebaran dan Nilai Ekonomi. Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor 16122: Bogor 2005.

Tukiran T H M. Penelitian Kuantitatif. Penerbit ALFABETA: Bandung 2012

Warisno, Kres D. Peluang Usaha dan Budidaya Cabai. Pt Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI: Jakarta 2010 <http://informasitips.com/kandungan-gizi-dan-manfaat-cabai-cabe> diakses 17 Agustus 2014.

Yumarto, A G, Sylvia S. Uji Residu Pestisida pada Cabai (*Capsicum annum* Linnaeus) di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Program Magister Ilmu Hama Penyakit dan Tumbuhan. Fakultas Pertanian: UNHAS Makassar 2012.

Yusnani. Identifikasi Residu Pestisida Golongan Organofosfat pada Sayuran Kentang di Swalayan Lottemart dan Pasar Terong Kota Makassar. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat: UNHAS Makassar 2013.

Yuantari. Dampak Pestisida Organoklorin Terhadap Kesehatan Manusia dan Lingkungan Serta Penanggulangannya. *Skripsi*. Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang: Semarang 2013.



L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

N



Gambar 1. Pengambilan Sampel Cabai



Gambar 2. Pengambilan Sampel Cabai Secara Penyilangan



Gambar 3. Sampel Cabai yang akan di uji



Gambar 4. Sampel Cabai dicincang



Gambar 5. Penimbangan, memulai dengan tombol On/Off



Gambar 6. Sampel ditimbang seberat 15 gram



Gambar 7. Sampel Cabai yang telah ditimbang seberat 15 gram



Gambar 8. Penambahan 30 mL, diklometan dan 30 mL, Petroleum eter 40⁰-60⁰



Gambar 9. Campuran dilumatkan selama 30 detik



Gambar 10. Fase organik yang telah dilumatkan di saring

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Gambar 11. Penyaringan



Gambar 12. Pipet 25 mL, kedalam labu bulat




Gambar 13. Pekatkan dalam retavapor pada suhu tangas air 40⁰ C, sampai kering



Gambar 14. Penambahan residu dalam 5 mL, iso oktana: toluena (90:10, v/v)



Gambar 15. Pipet kedalam labu



Gambar 16. Sampel cabai yang telah diekstraksi



Gambar 17. Alat kromatografi gas