

**FORMULASI DAN UJI EFEKTIVITAS ANTIOKSIDAN KRIM EKSTRAK
ETANOL DAUN BOTTO'-BOTTO' (*Chromolaena odorata* L.) dengan
METODE DPPH.**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

IRNA UMAR
NIM. 70100110056

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irna Umar
NIM : 70100110056
Tempat/TanggalLahir : Cakke, 5 Oktober 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Bumi Tamalanrea Permai, Komp. Ruko Pelangi D/6
Judul : Formulasi dan Uji Efektivitas Antioksidan krim ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dengan metode DPPH

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2014

Penyusun,

IRNA UMAR
NIM. 70100110056

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi dan Uji Efektivitas Antioksidan Krim Ekstrak Etanol Daun Botto’-Botto’ (*Chromolaena odorata* L.) dengan Metode DPPH” yang disusun oleh Irna Umar, NIM: 70100110056, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 25 Agustus 2014 M
29 Syawal 1435 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes. (.....)

Pembimbing I : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II: Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Penguji I : A. Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)

Penguji II : DR. Darsul S Puyu, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19530203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta H. Umar (Alm.) dan Ibunda tercinta Hj. Maryam serta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu mendukung baik dari segi materi maupun non materi, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin M. Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Drs. Wahyuddin G, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

6. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar
7. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. A. Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt. selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
10. DR. Darsul S Puyu, M.Ag. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi.
11. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, kakak-kakak angkatan 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005, serta adik-adik angkatan 2011, 2012 dan 2013 mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dibidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah *subhānahu wata'āla*. Amin.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Gowa, Agustus 2014

Penyusun,

IRNA UMAR
NIM. 70100110056



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
<i>A. Latar Belakang Masalah</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	5
<i>C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	6
<i>D. Kajian Pustaka</i>	7
<i>E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i>	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
<i>A. Uraian Tanaman</i>	9
<i>B. Radikal Bebas</i>	12
<i>C. Antioksidan</i>	16
<i>D. Uraian DPPH</i>	20
<i>E. Formulasi Krim</i>	20
<i>F. Komposisi sediaan krim</i>	22

G. Uraian Ekstraksi	25
H. Uraian Spektrofotometr UV-Vis	27
I. Uraian Kulit	29
J. Tinjauan Islam tentang Penggunaan Tanaman dan Pemanfaatannya dalam Menjaga Kesehatan dan Keindahan	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sampel	40
D. Metode pengumpulan data	41
E. Instrumen penelitian	44
F. Validasi dan Reabilitasi Instrumen	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Implikasi penelitian	49
KEPUSTAKAAN	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54
RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rancangan formula sediaan krim.....	42
2. Perhitungan HLB	58
3. Perhitungan persen peredaman krim ekstrak etanol daun botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.) terhadap DPPH	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur kulit	30
2. Skema proses penelitian	54
3. Skema ekstraksi daun botto'-botto' (<i>Chromolaena odorata</i> L.)	55
4. Skema pembuatan krim antioksidan	56
5. Skema pengujian krim antioksidan terhadap DPPH	60
6. Skema pembuatan kurva baku DPPH	60
7. Grafik kurva baku DPPH	60
8. Gambar sediaan krim	64
9. Dokumentasi sampel penelitian	65

ABSTRAK

Nama : Irna Umar

Nim : 70100110056

Judul : Formulasi dan Uji Efektivitas Antioksidan Krim Ekstrak Etanol Daun Botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dengan Metode DPPH

Telah dilakukan penelitian formulasi dan uji efektivitas antioksidan krim ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dengan metode DPPH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap DPPH dan untuk mengetahui berapa konsentrasi ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang efektif sebagai antioksidan pada sediaan krim. Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% dan dibuat sediaan krim menggunakan variasi konsentrasi ekstrak pada formula I, II dan III berturut-turut 0,0008%, 0,0016% dan 0,0024%. Kemudian diuji aktivitas antioksidannya terhadap DPPH dan dihitung rata-rata persen peredaman masing-masing formula. Hasil yang diperoleh menunjukkan rata-rata persen peredaman pada formula I, II, dan III berturut-turut 15,07%, 36,09% dan 41,62%. Dari ketiga formula yang paling efektif aktivitas antioksidannya yaitu pada konsentrasi ekstrak 0,0024%.

Kata kunci: Antioksidan, Radikal bebas, DPPH (1,1 Difenil, 2 pikrilhidrazil).

ABSTRACT

Name : Irna Umar

Nim : 70100110056

Title : Formulation and Test Effectivity of Antioxidant Cream Extract Ethanol Leaf of Botto'-Botto' (*Chromolaena Odorata* L.) with Method of DPPH.

A research have been done formulations and test the effectiveness of ethanol leaf extract antioxidant cream botto'-botto (*Chromolaena odorata* L.) by DPPH method. This study aims to determine the antioxidant activity of cream preparation containing ethanol extract of leaves botto'-botto '(*Chromolaena odorata* L.) against DPPH and to find out how the concentration of the ethanol extract of leaves botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) is effective as an antioxidant the cream preparation. Botto'-botto (*Chromolaena odorata* L.) was extracted by maceration using 96% ethanol and cream preparations made using various concentration of extract in the formula I, II and III respectively 0.0008%, 0.0016% and 0, 0024%. Then tested antioxidant activity against DPPH and calculated the average percent reduction of each formula. The results showed an average percent reduction in formula I, II, and III respectively 15.07%, 36.09% and 41.62%. Of the three most effective formulas that antioxidant activity at a concentration of 0.0024% extract.

Keywords: Antioxidant, free radicals, DPPH (1,1 Diphenyl, 2 pikrilhidrazil).

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perhatian dunia kedokteran terhadap radikal bebas dan oksidan makin meningkat. Pengertian oksidan dan radikal bebas (*free radicals*) sering dikaitkan karena keduanya memiliki sifat yang sama serta aktivitas kedua jenis senyawa ini juga sering menghasilkan akibat yang sama (Dyatmiko, 2010: 24).

Perhatian ini terutama ditimbulkan oleh kesadaran bahwa radikal bebas dan oksidan dapat menimbulkan kerusakan sel dan menjadi penyebab atau mendasari berbagai penyakit degeneratif. Bahkan diketahui ikut berperan dalam proses penuaan (*aging*). Radikal bebas didefinisikan sebagai suatu molekul atau atom yang sangat tidak stabil karena memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan (Winarsi, 2013: 11).

Radikal bebas dapat dihasilkan dari dalam tubuh, misalnya dari proses oksidasi dan olahraga yang berlebihan, peradangan akibat menderita sakit kronik dan stres, sedangkan dari luar tubuh radikal bebas dapat diperoleh melalui proses merokok, terpapar udara yang tercemar, radiasi matahari, radiasi fototerapi (penyinaran), konsumsi obat-obatan termasuk kemoterapi, pestisida dan zat kimia lainnya (Adiatma, 2010: 6).

Oksidan dan radikal bebas ini memiliki sifat reaktif yang tinggi dan kecenderungannya mengubah molekul lain menjadi radikal. Sehingga menyebabkan

terjadinya rantai reaksi (*chain reaction*) yang dapat menyebabkan salah satu kerusakan kulit yaitu penuaan. Reaksi rantai tersebut baru berhenti apabila radikal bebas tersebut dapat diredam. Tubuh manusia, sebenarnya memiliki antiradikal atau antioksidan tetapi jumlahnya seringkali tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh (Winarsi, 2013: 12).

Antioksidan adalah zat yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah terjadinya proses oksidasi serta menetralkan radikal bebas. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Stres oksidatif (*oxidative stress*) adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas (peroksidan) dan antioksidan yang dipicu oleh dua kondisi umum, yaitu kurangnya antioksidan dan kelebihan pereduksi radikal bebas (Prakash, 2011: 2).

Akhir-akhir ini, penggunaan senyawa antioksidan baik secara sistemik maupun lokal semakin digemari karena dipercaya dapat mencegah berbagai macam penyakit serta melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Penggunaan antioksidan topikal banyak ditemui pada sediaan kosmetik, terutama untuk perawatan anti aging. Penemuan antioksidan dalam bentuk sediaan topikal menjadi proteksi kulit tambahan terhadap paparan sinar UV. Suplementasi kulit dengan antioksidan tambahan, telah terbukti memberikan proteksi tambahan dari kerusakan akibat paparan sinar matahari, memperlambat penuaan kulit dan pada akhirnya dapat memperbaiki tampilan kulit (Trifena, 2012: 12).

Salah satu uji untuk menentukan aktivitas antioksidan penangkap radikal yaitu metode DPPH (1,1 Difenil-2-picrylhidrazil). DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu kamar dan sering digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan beberapa senyawa atau bahan alam. DPPH memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan warna violet yang gelap. (Sunarni, 2011: 53).

Antioksidan dapat berasal dari alam maupun sintetis. Antioksidan alam lebih disukai karena efek sampingnya lebih kecil. Salah satu sumber antioksidan alam yang terdapat dalam tanaman adalah flavonoid yang bisa ditemukan pada beberapa tanaman dari Famili *Asteraceae* (Rukmana, 2010: 95)

Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) merupakan salah satu jenis tumbuhan dari famili *Asteraceae*. Daunnya mengandung beberapa senyawa utama seperti tannin, fenol, flavonoid, saponin dan steroid. Minyak esensial dari daunnya memiliki kandungan α -pinene, cadinene, camphora, limonene, β -caryophyllene dan candinol isomer (Benjamin, 2011: 227).

Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dikenal dengan nama tekelan atau gulma siam yang mengganggu pertumbuhan tanaman lain dan mengurangi kesuburan tanah. Ekstrak kasar daun *Chromolaena odorata* memiliki efek antioksidan. Efek yang dihasilkan ini kemungkinan disebabkan oleh kandungannya yang tinggi akan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan, yang mampu menghambat proses oksidasi (Ngozi, 2009: 2).

Penggunaan daun botto'-botto (*Chromolaena odorata* L.) selama ini masih sangat sederhana, sehingga efek antioksidannya belum optimal. Penggunaan antioksidan secara topikal diharapkan mampu melindungi kulit dari efek buruk radikal bebas yang disebabkan oleh sinar matahari, untuk itu dibuatlah sediaan dalam bentuk krim yang lebih praktis. Krim adalah sediaan setengah padat, berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Krim ada dua tipe yakni krim tipe minyak dalam air (M/A) dan tipe air dalam minyak (A/M) (Anonim, 1979: 45).

Keuntungan sediaan krim ialah kemampuan penyebarannya yang baik pada kulit, memberikan efek dingin karena lambatnya penguapan air pada kulit, mudah dicuci dengan air, serta pelepasan obat yang baik. Selain itu tidak terjadi penyumbatan dikulit dan krimnya tampak putih dan bersifat lembut (Voight, 1995: 24).

Dalam Islam dinyatakan bahwa, semua yang diciptakan oleh Allah swt dimuka bumi ini mempunyai manfaat masing-masing tidak terkecuali tumbuh-tumbuhan. Selain sebagai makanan pokok ada juga dimanfaatkan sebagai obat dengan penyakit-penyakit tertentu. Allah swt tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia.

Sebagaimana firman Allah swt, dalam QS Al-Syu'ara/26:7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Kementerian Agama RI, 2014: 67)

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit dan ini merupakan Anugerah Allah swt.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi senyawa ekstrak daun botto'-botto' yang berkhasiat sebagai antioksidan yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu 400 µg/mL dan 800 µg/mL (Phan *et al.*, 2004: 822), nilai ini yang akan menjadi konsentrasi zat aktif dalam sediaan krim yang akan diformulasi.

B. Rumusan masalah

1. Apakah ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) memiliki aktivitas antioksidan terhadap radikal bebas DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrasil) pada sediaan krim.
2. Berapakah konsentrasi ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang efektif sebagai antioksidan pada sediaan krim.

C. Defenisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Antioksidan merupakan semua bahan yang dapat menunda atau mencegah kerusakan akibat oksidasi pada molekul sasaran.

- b. Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Adanya elektron yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut reaktif mencari pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada disekitarnya.
- c. Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) adalah suatu senyawa radikal nitrogen. Metode DPPH mudah digunakan, cepat, cukup teliti dan mudah untuk mengukur kapasitas antioksidan dengan menggunakan radikal bebas DPPH. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel padatan, larutan dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan tertentu. Elektron bebas dalam radikal DPPH memberikan absorbansi maksimum pada 517 nm dan berwarna ungu.
- d. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar.
- e. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.
- f. Spektrofotometer UV-Vis merupakan alat yang digunakan untuk mengukur energi yang relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang.
- g. Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dikenal di Indonesia dan negara lain dengan nama yang berbeda. Di Makassar khususnya, spesies ini dikenal dengan

beberapa nama, seperti botto'-botto', Laruna, dan Gondrong-Gondrong. Ekstrak kasar daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) memiliki efek antioksidan. Efek yang dihasilkan ini kemungkinan disebabkan oleh kandungannya yang tinggi akan flavonoid, saponin, dan tanin.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Disiplin ilmu yang terkait dalam penelitian ini adalah bidang Teknologi dan Sediaan Farmasi, Fitokimia, dan Analisis kimia. Rentang waktu yang digunakan sekitar 2 bulan yaitu mei-juni.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh *Phan TT, See J, Lee ST, Chan SY* pada tahun 2004 tentang “*Antioxidant effects of the extracts from the leaves of Chromolaena odorata on human dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes against hydrogen peroxide and hypoxanthine-xanthine oxidase induced damage (Herbal Traditional Medicine)*” yang menyatakan bahwa daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) memiliki aktivitas antioksidan dengan konsentrasi 400 µg/mL dan 800 µg/mL.

Penelitian juga dilakukan oleh *Ngozi Igboh M, Jude Ikewuchi C dan Catherine Ikewuchi C* pada tahun 2009 tentang “*Chemical Profile of Chromolaena odorata L. (King and Robinson) Leaves*” bahwa daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dikenal dengan nama tekelan atau gulma siam yang mengganggu pertumbuhan tanaman lain dan mengurangi kesuburan tanah. Ekstrak kasar daun *Chromolaena odorata* memiliki efek antioksidan. Efek yang dihasilkan ini kemungkinan

disebabkan oleh kandungannya yang tinggi akan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan, yang mampu menghambat proses oksidasi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap DPPH pada sediaan krim.
- b. Mengetahui konsentrasi dari ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang efektif sebagai antioksidan pada sediaan krim.

2. Manfaat penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan data ilmiah mengenai potensi aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap DPPH pada sediaan krim.
- b. Dapat mengetahui konsentrasi dari ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang efektif sebagai antioksidan pada sediaan krim.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Subkelas	: Asteridae
Ordo	: Asterales
Famili	: Asteraceae
Genus	: <i>Chromolaena</i>
Spesies	: <i>Chromolaena odorata</i> (L.) (Anonim, 2013).

2. Nama daerah

Chromolaena odorata (L.) dikenal di Indonesia dan negara lain dengan nama yang berbeda. Daerah Sulawesi Selatan, di Makassar misalnya, spesies ini dikenal dengan beberapa nama, seperti Botto'-Botto', Laruna, dan Gondrong-Gondrong kemudian Kopasanda (Pangkep dan Maros), Tekelan (Jawa), Kirinyuh (Sunda), *Siam Weed* atau *Jack in the Bush* (Inggris) (Prawiradiputra, 2006: 46).

3. Morfologi

Laruna atau Botto'-botto' termasuk keluarga *Asteraceae* atau *Compositae*. Daunnya oval, bagian bawah lebar, makin ke ujung makin runcing. Panjang daun 6 – 10 cm dan lebar 3 – 6 cm. Tepi daun bergerigi, menghadap ke pangkal. Letak daun berhadap-hadapan. Karangan bunga terletak di ujung cabang (terminal). Setiap karangan terdiri atas 20 – 35 bunga. Warna bunga selagi muda kebiru-biruan, makin tua jadi coklat.

Laruna atau Botto'-botto' berbunga pada musim kemarau, yaitu selama 3 – 4 minggu. Pada saat biji masak, tumbuhan mengering. Pada saat itu biji pecah dan terbang terbawa angin. Kira-kira satu bulan setelah awal penghujan, potongan batang, cabang dan pangkal batang bertunas kembali. Biji-biji yang jatuh ke tanah mulai berkecambah sehingga dalam waktu dua bulan kecambah dan tunas-tunas telah mendominasi area. Tumbuhan ini sangat cepat tumbuh dan berkembang biak. Karena cepat perkembangbiakan dan pertumbuhannya, gulma ini cepat membentuk komunitas sehingga dapat menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain. Botto'-botto' dapat tumbuh pada ketinggian 1000 – 2800 m di atas permukaan laut, tetapi di Indonesia banyak ditemukan didataran rendah (0 – 500 m dpl) seperti di kebun karet dan kelapa serta di padang penggembalaan (Prawidiputra, 2006: 47).

4. Kandungan Kimia

Skrining fitokimia pada sampel daun botto'-botto' yang dilakukan oleh Harbone (1987). Mereka menyaring beberapa senyawa kimia kelompok pada

sampel, berupa alkaloid, glikosida, flavonoid (auron, kalcon, flavon, and flavonol), saponin, dan tanin. Determinasi kuantitatif pada senyawa saponin dan tanin lebih lanjut dipublikasikan dengan metode relevan oleh Asosiasi Kimia Analisis Resmi pada tahun 2006.

Ngozi (2009) menemukan asam amino dari botto'-botto', dengan melakukan serangkaian metode yaitu dengan mengeringkan daun botto'-botto' hingga bobotnya konstan, dibebas-lemakkan, dihidrolisis, lalu dievaporasi hingga diproses lebih lanjut dalam Aplikator Teknisi Multi-sampel dari Analitik Asam Amino (Ngozi, 2009: 521).

Kandungan nitratnya yang tinggi (lima hingga enam kali di atas kadar toksik) dapat menyebabkan aborsi bahkan kematian ternak serta dapat meracuni daun dan tunas muda tanaman kebun (Afolabi, 2007: 191).

Senyawa flavanoid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak air daun *Chromolaena odorata*. Menurut Robinson (1995) dan Rahmawan (2008) flavanoid merupakan senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak reaksi oksidasi, baik secara enzim maupun non enzim. Flavanoid bertindak sebagai penampung yang baik radikal hidroksi dan superoksida dengan demikian melindungi lipid membran terhadap reaksi yang merusak.

5. Kegunaan

Dilaporkan oleh Ngozi (2009) bahwa dalam pengobatan tradisional, botto'-botto' digunakan sebagai bahan alam yang berkhasiat antispasmodik,

antiprotozoa, antibakteria, antifungi, antihipertensi, antiinflamasi, astringen, antitripanosoma, diuretik dan bahan hepatotropik.

Ekstrak kasar daun *Chromolaena odorata* memiliki efek antioksidan. Efek yang dihasilkan ini kemungkinan disebabkan oleh kandungannya yang tinggi akan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan, yang mampu menghambat proses oksidasi (Ngozi, 2009: 2).

Botto'-botto' memberikan keuntungan bagi pertanian, khususnya tanaman pangan. Di India, gulma ini dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil berbagai jenis tanaman pangan, seperti kedelai, palak dan pembuatan ragi yang tumbuh di sana (Prawiradiputra, 2006: 50).

B. Radikal bebas

Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya. Adanya elektron yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut reaktif mencari pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada disekitarnya. Senyawa yang mudah teroksidasi secara umum adalah senyawa yang berikatan kovalen. Ikatan kovalen akan sangat berbahaya karena ikatan yang digunakan secara bersama-sama pada orbital terluarnya. Senyawa yang memiliki ikatan kovalen umumnya merupakan molekul-molekul besar (biomakromolekul), yaitu lipid, protein, maupun DNA. Target utama radikal bebas adalah protein, asam lemak tak jenuh dan lipoprotein serta unsur DNA termasuk karbohidrat. Asam lemak tak jenuh merupakan molekul yang paling rentan terhadap serangan radikal bebas. Radikal bebas memiliki reaktivitas yang

tinggi, yaitu sifatnya yang segera menarik atau menyerang elektron disekelilingnya. Senyawa radikal bebas juga dapat mengubah suatu molekul menjadi radikal bebas. Senyawa radikal bebas di dalam tubuh dapat merusak asam lemak tak jenuh ganda pada membran sel yang mengakibatkan dinding sel menjadi rapuh. Senyawa radikal bebas ini berpotensi merusak DNA sehingga mengacaukan sistem info genetika dan berlanjut pada pembentukan sel kanker. Jaringan lipid juga akan dirusak oleh senyawa radikal bebas sehingga terbentuk peroksida yang memicu munculnya penyakit degeneratif (Winarsi, 2013: 14-17).

Reaksi oksidatif tidak hanya menyerang komponen lipid, melainkan juga komponen penyusun sel lainnya, seperti protein, lipoprotein, maupun DNA. Radikal bebas dapat merusak 3 senyawa penting yang berperan untuk mempertahankan integritas (Lampe, 2010: 2) :

- a. Asam lemak, terutama asam lemak tidak jenuh yang merupakan komponen penting fosfolipid penyusun membran sel.
- b. DNA, yang merupakan perangkat genetik sel.
- c. Protein, yang berperan sebagai enzim, reseptor, antibodi dan penyusun matriks serta sitoskeleton.

1. Reaksi pembentukan radikal bebas

Mekanisme reaksi radikal bebas paling tepat di bayangkan sebagai suatu deret reaksi-reaksi bertahap, yaitu (Fessenden, 1992: 224) :

a. Inisiasi

Tahap inisiasi ialah pembentukan awal radikal-radikal bebas. Dalam klorinasi metana, tahap inisiasi ialah pemaksapisahan (cleavage) homolitik molekul C_{12} menjadi dua radikal bebas klor. Energi untuk reaksi ini diberikan oleh cahaya ultraviolet (UV) atau oleh pemanasan campuran ketemperatur yang sangat tinggi.

b. Propagasi

Setelah terbentuk, radikal bebas klor mengalami sederetan reaksi sehingga terbentuk radikal bebas baru. Secara kolektif, terbentuknya reaksi ini disebut tahap propagasi dari reaksi radikal bebas. Pada hakikatnya, pembentukan awal beberapa radikal bebas akan mengakibatkan perkembangbiakan radikal bebas baru dalam suatu reaksi pengabdian diri (*self perpetuating*) yang disebut reaksi rantai. Sebagai tahap propagasi pertama, radikal bebas klor yang reaktif merebut sebuah atom hidrogen dari molekul metana, menghasilkan radikal bebas metil dan HCl. Radikal bebas metil itu juga reaktif. Dalam tahap propagasi kedua, radikal bebas metil merebut sebuah atom klor dari dalam molekul Cl_2 . Tahap ini menghasilkan salah satu dari produk keseluruhan klormetana. Produk ini juga menghasilkan ulang radikal bebas klor, yang nantinya dapat merebut atom hidrogen dari molekul metana lain dan memulai deret propagasi selanjutnya.

c. Terminasi

Daur propagasi terputus oleh reaksi-reaksi pengakhiran (*termination*) reaksi apa saja yang memusnahkan radikal bebas atau mengubah radikal bebas menjadi radikal yang stabil dan tidak reaktif, dapat mengakhiri daur propagasi radikal bebas.

Klorinasi metana di akhiri terutama oleh bergabungnya radikal-radikal bebas, inilah pemusnahan radikal bebas. Senyawa apa saja yang mudah terurai menjadi radikal bebas dapat bertindak sebagai satu inisiator. Satu contoh ialah peroksida (ROOR), yang mudah membentuk radikal bebas karena energi disosiasi ikatan RO-RO hanyalah sekitar 35 kkal/mol, lebih rendah daripada kebanyakan ikatan.

2. Jenis-jenis radikal

Jenis-jenis radikal bebas yang merusak lipid terdiri dari (Setiati, 2013):

- a. *Reactive Oxygen Species* (ROS), yaitu senyawa reaktif turunan oksigen, misalnya radikal superoksida (O_2^*), radikal hidroksil (OH^*), radikal alkoksil (RO^*), radikal peroksil (RO_2^*) serta senyawa bukan radikal yang berfungsi sebagai pengoksidasi atau senyawa yang mudah mengalami perubahan menjadi radikal bebas, seperti hidrogen peroksida (H_2O_2), ozon (O_3) dan HOCl.
- b. *Reactive Nitrogen Species* (RNS), misalnya nitrogen dioksida (NO_2^*), dan peroksinitrit ($ONOO^*$) dan bukan radikal seperti HNO_2 dan N_2O_4 . Radikal bebas DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil), yaitu suatu senyawa organik yang mengandung nitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λ_{max} 517 nm dan berwarna ungu gelap. Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer dan diplotkan terhadap konsentrasi. Keberadaan sebuah antioksidan yang dapat menyumbangkan elektron kepada DPPH, menghasilkan warna kuning yang merupakan ciri spesifik dari reaksi radikal DPPH. Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi

berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang di ambil (Sunarni, 2011: 35).

C. Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang menangkap radikal bebas (Prakash, 2011: 1). Antioksidan digunakan untuk menghambat autooksidasi. Fenol-fenol, senyawa dengan satu gugus OH yang terikat pada karbon cincin aromatik, merupakan antioksidan yang efektif, produk radikal bebas senyawa-senyawa ini terstabilkan secara resonansi dan karena itu tidak reaktif dibandingkan dengan kebanyakan radikal bebas lain. Vitamin E dan flavonoid adalah suatu antioksidan alamiah yang dijumpai dalam minyak-minyak nabati (Fessenden, 1992: 241).

Dalam pengertian kimia, antioksidan adalah senyawa-senyawa pemberi elektron, tetapi dalam pengertian biologis lebih luas lagi, yaitu semua senyawa yang dapat meredam dampak negatif oksidan, termasuk enzim-enzim dan protein-protein pengikat logam (Rohman, 2012).

Adapun penentuan persen peredaman aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus;

$$\% \text{ peredaman} = \frac{\text{absorban DPPH} - \text{absorban sampel uji}}{\text{absorban DPPH}} \times 100\%$$

1. Jenis-jenis antioksidan

Berdasarkan sumbernya, antioksidan di golongan menjadi 2 kelompok, yaitu antioksidan primer dan antioksidan sekunder (Edawati, 2012: 15-16).

a. Antioksidan primer

Antioksidan primer disebut juga antioksidan enzimatis. Suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan primer apabila dapat memberikan atom hidrogen secara cepat kepada senyawa radikal, kemudian radikal antioksidan yang terbentuk segera berubah menjadi senyawa yang lebih stabil. Antioksidan primer meliputi enzim superoksida dismutase (SOD), katalase dan glutathion peroksidase. Sebagai antioksidan, enzim-enzim tersebut menghambat pembentukan radikal bebas dengan cara memutuskan reaksi berantai, kemudian mengubahnya menjadi lebih stabil. Misalnya Transferin, Feritin, albumin (Wardiah, 2010: 20).

b. Antioksidan sekunder

Antioksidan sekunder di sebut juga antioksidan eksogenus atau non-enzimatik. Antioksidan dalam kelompok ini juga disebut sistem pertahanan preventif. Dalam sistem pertahanan ini terbentuknya senyawa oksigen reaktif dihambat dengan cara pengkhelatan metal, atau dirusak pembentukannya. Pengkhelatan metal terjadi dalam cairan ekstraseluler. Antioksidan non-enzimatis dapat berupa komponen non-nutrisi dan komponen nutrisi dari sayuran dan buah-buahan. Kerja sistem antioksidan ini yaitu dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkapnya. Akibatnya, radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler, misalnya Superoxide Dismutase (SOD), Glutathion Peroxidase (GPx), vitamin C, vitamin E dan β -Caroten (Wardiah, 2010: 20).

c. Antioksidan tersier

Kelompok antioksidan tersier meliputi sistem enzim DNA- repair dan metionin sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini berfungsi dalam perbaikan biomolekuler yang rusak akibat reaktivitas radikal bebas (Yuliani, 2010: 24).

Berdasarkan jenisnya, antioksidan dapat di bedakan menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Antioksidan enzimatik (SOD, glutathion peroksidase, katalase),
- b. Antioksidan hidrofilik (asam askorbat, GSH, asam urat),
- c. Antioksidan lipofilik (tokoferol, flavonoid, karotenoid, ubikuinol),
- d. Antioksidan pereduksi (glutathion reduktase, dehidroaskorbat reduktase, tioredoksin reduktase).

2. Mekanisme antioksidan

Reaksi oksidasi dapat dicegah oleh bahan-bahan berikut (Kenneth, 1985):

- a. Bahan pengkhelat, yaitu untuk ion-ion logam pencetus terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas. Berlangsungnya reaksi oksidatif seringkali diinisiasi oleh adanya logam seperti Fe^{3+} , Cu^{3+} , Ni^{2+} , Mn^{3+} . Ion-ion logam ini bertindak sebagai inisiator, karena pada tahap oksidasi mereka mampu bekerja sebagai radikal. Sebagai contoh, Cu^{2+} memiliki 27 elektron dan memerlukan sebuah elektron lebih untuk melengkapi pasangan elektronnya. Ion logam mengkatalisis reaksi oksidatif lewat sejumlah cara. Mereka dapat bereaksi langsung dengan oksigen menghasilkan radikal oksigen, yang kemudian menginisiasi suatu autoksidasi. Ion logam dapat membentuk kompleks dengan oksigen dan kemudian membentuk radikal peroksi. Bahan pengkhelat memiliki kekuatan antioksidan dalam bentuk pengikatan ion

logam, jadi secara termodinamik di katakan melepaskan logam tersebut dari lingkungan dalam larutan.

- b. Bahan pereduksi, yakni senyawa yang dapat mereduksi obat yang teroksidasi.
- c. Senyawa-senyawa yang mudah teroksidasi, yaitu berupa bahan yang mempunyai sifat lebih mudah teroksidasi dibanding obat yang dilindungi. Ada beberapa senyawa yang sangat lebih mudah teroksidasi dibanding senyawa yang dilindungi. Sesungguhnya bahan-bahan ini bertindak sebagai pembersih oksigen yang baik dalam farmasi adalah natrium bisulfit dan asam askorbat.
- d. Terminator rantai, yaitu suatu bahan yang dalam obat mampu bereaksi dengan radikal, membentuk senyawa baru yang bersifat radikal terminator rantai, yang tidak lagi membuat pemasukan baru dalam siklus propagasi radikal. Radikal yang baru ini diharapkan akan bersifat stabil secara intrinsik atau mungkin dapat membentuk molekul yang inert. Setiap senyawa yang dapat memberi radikal hidrogen, sementara dia sendiri membentuk radikal yang stabil dan tidak mampu meneruskan siklus propagasi rantai, dapat bereaksi sebagai antioksidan. Dengan demikian antioksidan ini bereaksi sebagai aseptor yang juga disebut terminator rantai.

3. Metode penentuan aktivitas antioksidan

Metode-metode pengukuran aktivitas antiradikal bebas di antaranya (Widyastuti, 2010: 9)

- a. Metode CUPRAC menggunakan bis (neokuproin) tembaga (II) ($\text{Cu}(\text{Nc})_2^{2+}$) sebagai pereaksi kromogenik. Pereaksi $\text{Cu}(\text{Nc})_2^{2+}$ yang berwarna kuning.

- b. Metode DPPH menggunakan 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil sebagai sumber radikal bebas. Prinsipnya adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari zat antioksidan.
- c. Metode FRAF (benzie dan strain, 1996) menggunakan Fe (TPTZ)₂³⁺ kompleks besi ligan 2,4,6-tripiridil-triazin sebagai pereaksi yang kompleks biru.

D. Uraian DPPH (1,1-diphenil-2-pikrilhidrazil)

Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) adalah suatu senyawa radikal nitrogen. DPPH akan mengambil atom hidrogen yang terdapat dalam suatu senyawa, misalnya senyawaan fenol. Mekanisme terjadinya reaksi DPPH ini berlangsung melalui transfer elektron. Larutan DPPH yang berwarna ungu memberikan serapan absorbans maksimum pada 517 nm. Larutan DPPH ini akan mengoksidasi senyawa dalam ekstrak tanaman. Proses ini ditandai dengan memudarnya warna larutan dari ungu menjadi kuning (Widyastuti, 2010: 14).

Metode DPPH mudah digunakan, cepat, cukup teliti dan mudah untuk mengukur kapasitas antioksidan dengan menggunakan radikal bebas DPPH. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel padatan, larutan dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan tertentu. Elektron bebas dalam radikal DPPH memberikan absorbansi maksimum pada 517 nm dan berwarna ungu (Prakash, 2011: 1-2).

E. Formulasi krim

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai

konsistensi relatif cair di formulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih di tujukan penggunaan kosmetik dan estetika (Depkes RI, 1995: 398).

Proses penuaan ditandai dengan kulit yang menipis dan kering, peningkatan keriput, adanya pigmen dan menurunnya elastisitas kulit. Hal ini dapat dikurangi dengan penggunaan krim atau lotio pada malam hari. Untuk mengatasi kulit kering yaitu dengan pemberian krim pelembab. Krim pelembab bertujuan untuk memberikan kelembaban pada kulit yang dibutuhkan bagi kehidupan sel-sel di bawah kulit. Pada dasarnya krim pelembab mengandung bahan-bahan yang dapat menarik air dari bawah kulit sambil mencegah penguapan, contohnya gliserin, sorbitol, lanolin, paraffin cair, minyak, lemak dan lilin. Sementara untuk mengatasi peningkatan keriput dengan pemberian krim yang mengandung retinoid, Alpha Hydroxy Acid (AHA) yaitu asam glikolat, vitamin C, hormon estrogen secara topikal yaitu 0,01% estradiol dan estriol 0,3% bisa merangsang produksi kolagen dan elastin, menghaluskan garis-garis halus, mengencangkan kulit dan membantu memperkecil pori-pori kulit (Hernani, 2013: 17).

Pengaruh bahan-bahan kimia yang dicampurkan dalam produk kosmetik dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, apalagi pemakaian produk tersebut dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, para produsen akhirnya

mencoba bahan alami sebagai bahan campuran agar tidak menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan (Hernani, 2013: 18).

F. Komposisi sediaan krim

1. Fase minyak

Fase minyak atau fase lipofil (hidrofobik) adalah minyak mineral atau minyak tumbuhan atau lemak (minyak lemak, paraffin, vaselin, lemak coklat, lanolin) (Voight, 1995).

a. Asam stearat (Kibbe, 2000: 534)

Memiliki rumus molekul : $C_{18}H_{36}O_2$. Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang di peroleh dari lemak. Merupakan zat padat, kristal mengkilat, menunjukkan susunan hablur, putih atau kuning pucat, mirip lemak lilin, praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol (95%)P, dalam 2 bagian kloroform P, suhu lebur tidak kurang dari 54°C. Asam stearat merupakan bahan pengemulsi. Digunakan luas secara oral dan topikal dalam formulasi. Untuk penggunaan topikal asam stearat digunakan sebagai bahan pengemulsi. Digunakan umumnya karena tidak toksik dan tidak mengiritasi.

b. Setil alkohol (Kibbe, 2000: 117)

Memiliki rumus molekul : $C_{16}H_{34}O$. Setil alkohol merupakan lilin, putih, granul, persegi. Memiliki bau dan rasa yang khas. Setil alkohol yang digunakan dalam sediaan farmasi merupakan alkohol alifatik padat pada umumnya. Setil alkohol umumnya digunakan dalam sediaan farmasi dan kosmetik, seperti emulsi, krim dan

salep. Dalam emulsi M/A setil alkohol dapat meningkatkan stabilitas dari emulsi. Memiliki titik lebur 45°C-52°C.

c. Adeps Lanae (Kibbe, 2000).

Cairan jernih, tidak berasa, tidak berwarna. Praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, mudah larut dalam kloroform dan eter. Berfungsi sebagai peningkat konsistensi.

2. Emulgator

Emulgator (zat pengemulsi) merupakan komponen paling penting agar memperoleh emulsi yang baik.

a. Polisorbat 60 (Kibbe, 2000: 416).

Memiliki rumus molekul : $C_{64}H_{126}O_{26}$. Polisorbat memiliki karakteristik berbau dan hangat, kadang-kadang rasa menggigit, berwarna kuning, cairan berminyak. Digunakan sebagai bahan pengemulsi nonionik tipe M/A. Pada konsentrasi 1-15%, sedangkan dalam kombinasi 1-10%, memiliki HLB butuh yaitu 14,9. Berfungsi sebagai emulgator untuk fase air.

b. Sorbitan 60 (Kibbe, 2000: 511)

Memiliki rumus molekul : $C_7OH_{130}O_{30}$, dimana merupakan bahan pengemulsi nonionik yang dapat dikombinasikan dengan bahan pengemulsi lain dengan konsentrasi 1-10%. Banyak digunakan sebagai bahan pengemulsi karena tidak bersifat toksik. Umumnya larut dan bercampur dengan minyak, juga larut dalam kebanyakan pelarut organik, dalam air umumnya tidak larut tetapi terdispersi. Nilai

HLB butuh adalah 4,7. Span 60 melebur pada suhu 50°C-53°C. Berfungsi sebagai emulgator fase minyak.

3. Pengawet

Pengawet digunakan pada sediaan, agar sediaan tidak terkontaminasi dengan mikroba.

a. Metil paraben (Kibbe, 2000: 340)

Memiliki rumus molekul : $C_8H_8O_3$, dimana merupakan serbuk putih, berbau, serbuk higroskopik, mudah larut dalam air. Digunakan sebagai pengawet pada kosmetik, makanan dan sediaan farmasetik. Dapat digunakan sendiri, kombinasi, dengan pengawet paraben lain atau dengan antimikroba lainnya. Lebih efektif terhadap gram negatif daripada gram positif. Aktif pada pH antara 6-8. Efektifitas pengawetnya meningkat dengan peningkatan pH.

b. Propil paraben (Kibbe, 2000: 450)

Memiliki rumus molekul : $C_{10}H_{12}O_3$, dimana merupakan kristal putih, berbau dan berasa. Aktif pada range pH 4-8. Lebih efektif pada gram positif dibandingkan gram negatif. Untuk penggunaan topikal konsentrasi yang digunakan yaitu 0,001-0,006%. Dapat digunakan sendiri atau kombinasi dengan pengawet paraben lainnya.

4. Humektan

a. Gliserin

Gliserin memiliki rumus molekul : $C_3H_8O_3$, merupakan cairan seperti cairan sirup berwarna, tidak berbau, manis diikuti rasa hangat, higroskopik. Dapat bercampur

dengan air dan dengan etanol (95%)P, praktis tidak larut dalam kloroform P, dalam eter P dan minyak lemak. Berfungsi sebagai humektan. (Kibbe, 2000)

5. Vitamin C

Vitamin C atau asam askorbat mempunyai berat molekul 176,13 dengan rumus kimia $C_6H_8O_6$, dengan titik lebur 190-192 °C. Asam askorbat mengandung tidak kurang dari 99,0% $C_6H_8O_6$. Pemerian: serbuk atau hablur putih atau agak kuning, tidak berbau, rasa asam, oleh pengaruh cahaya lambat laun akan menjadi gelap, dalam larutan cepat teroksidasi. Kelarutan: mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol (95%) P, praktis tidak larut dalam kloroform P, dan eter P dan dalam benzen P. Penyimpanan dalam wadah tertutup, tyerlindung dari cahaya. Khasiat sebagai antiskorbut (Depkes RI, 1995).

G. Uraian ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat yang berkhasiat atau zat-zat dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat didalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda pula dengan ketebalannya, sehingga diperlukan dengan metode ekstraksi dan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya (Harbone, 1987: 7).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Adapun mekanisme ekstraksi yaitu pelarut organik akan membus dinding sel dan masuk ke dalam

rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan melarut dalam pelarut organik tersebut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif didalam sel dan pelarut organik diluar sel, maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi cairan zat aktif dalam dan luar sel (Harbone, 1987: 7).

Ada beberapa metode ekstraksi yang dapat digunakan, yaitu;

1. Cara dingin (Departemen Kesehatan RI, 2000: 82-84).

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserat pertama dan seterusnya.

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak) terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

2. Cara panas

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

b. Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu 40-50° C.

c. Infus

Infus adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 90° C) selama 15 menit.

d. Dekok

Dekok adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur 90° C selama 30 menit.

e. Sokletasi

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan di ekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas saring) di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1995: 570).

H. Uraian spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang

diabsorpsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi yang relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 2007: 215).

Spektrofotometer merupakan salah satu metode analisis yang berdasarkan pada hasil yang interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik. Interaksi tersebut akan menghasilkan peristiwa berupa hamburan, serapan dan emisi. Alat spektrofotometer pada dasarnya terdiri atas sumber sinar, monokromator, tempat sel untuk yang diperiksa, detektor, penguat arus, penguat arus dan alat ukur atau pencatat (Departemen Kesehatan RI, 1995: 772).

Komponen-komponen spektrofotometer UV-Vis antara lain:

1. Sumber cahaya

Lampu deuterium untuk daerah UV dari 190-350 nm dan lampu halogen kuartz atau lampu tungsten untuk daerah visible dari 350-900 nm.

2. Monokromator

Digunakan untuk menghamburkan cahaya ke dalam panjang gelombang unsur-unsurnya, yang diseleksi lebih lanjut dengan celah. Monokromator berotasi sehingga rentang panjang gelombang dilewatkan melalui sampel ketika instrumen tersebut memindai sepanjang spektrum.

3. Optik

Dirancang untuk memilahkan berkas cahaya sehingga berkas tersebut melewati dua kompartemen sampel dan pada instrumen berkas rangkap tersebut, larutan blanko dapat digunakan dalam satu kompartemen untuk memperbaiki pembacaan

atau spektrum sampel tersebut. Blanko umumnya adalah pelarut yang dapat melarutkan sampel (Watson, 2009: 110).

4. Detektor

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang (Khopkar, 2007: 215).


Adapun cara kerja dari alat spektrofotometer UV-Vis adalah dimana suatu radiasi dikenakan secara bergantian atau simultan melalui sampel dan blanko yang dapat berupa pelarut atau udara. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel dan blanko kemudian diteruskan ke detektor, sehingga perbedaan intensitas ini diantara kedua berkas sinar ini dapat memberikan gambaran tentang fraksi radiasi yang diserap oleh sampel. Detektor alat ini mampu untuk mengubah informasi radiasi ini menjadi sinyal elektrik yang jika diamplifikasikan akan dapat menggerakkan pena pencatat diatas kertas grafik khusus alat ini.

I. Kulit

1. Anatomi kulit

Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh yang sempurna terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, selain

peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan infeksi dari luar. Kulit merupakan kelenjar holokrin yang besar (Tranggono, 2007: 11).



Gambar 1. Penampang kulit (Sloane, 2004: 85).

a. Lapisan epidermis

Bagian-bagian epidermis dapat dilihat dengan mikroskop, yaitu terdiri dari:

1. Stratum korneum (lapisan tanduk), selnya tipis, datar seperti sisik dan terus menerus dilepaskan.
2. Stratum lucidum (lapisan jernih), selnya mempunyai batas tegas tetapi tidak ada intinya.
3. Stratum granulosum (lapisan butir-butir), selapis sel yang jelas tampak berisi inti dan juga granulosum.

4. Stratum spinosum (lapisan malphigi), yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel yang satu dengan yang lainnya di dalam lapisan ini, sehingga setiap sel seakan-akan berduri.
5. Stratum germinativum (lapisan basal), yaitu sel yang terus menerus memproduksi sel epidermis baru. Sel ini disusun dengan teratur, berderet dengan rapat dan membentuk lapisan pertama atau lapisan dua sel pertama dari sel basal yang duduk di atas papiladermis.

b. Lapisan dermis

Korium atau dermis tersusun atas jaringan fibrous dan jaringan ikat yang elastis. Pada permukaan dermis tersusun papil-papil kecil yang berisi ranting-ranting pembuluh darah kapiler. Ujung akhir syaraf sensorik yaitu puting peraba yang terletak di dalam dermis.

c. Lapisan hypodermis

Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, syaraf-syaraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan syaraf-syaraf menuju lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, memebentuk kontor tubuh, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur.

2. Fungsi kulit

a. Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut lemak.

b. Fungsi proteksi

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur.

c. Fungsi ekskresi

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan amonia.

d. Fungsi persepsi

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan *ruffini* di dermis dan subkutis. Terhadap dingin oleh badan *krause*. Rabaan diperankan oleh taktil *meissner*. Terhadap tekanan diperankan oleh badan *vates paccini*.

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot berkontraksi pembuluh darah kulit.

f. Fungsi pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen dewasa mempunyai 3 jenis sel utama, yaitu keratinosit, sel langerhans dan melanosit (Rosyad, 2007: 13).

J. Pandangan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuh-tumbuhan

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Salah satu fungsinya adalah sebagai bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari keanekaragaman tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Thaahaa /20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat diatas menyatakan bahwa Dia yang telah menjadikan bagi kamu sebagai hamparan adalah isyarat bahwa keberadaan manusia dimuka bumi ini dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah swt. Firmannya: menjadikan bagi kamu dibumi itu jalan-jalan adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya

firman-Nya bahwa: Dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Dalam hal ini salah satu tanaman yang dimaksud adalah daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang berkhasiat sebagai antioksidan dalam sediaan krim.

Demikian pula pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nahl/ 16: 11

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat ini menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang. Ayat ini juga mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri nikmat Allah swt dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa Dia yang maha kuasa itu lah yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan, air hujan untuk kamu manfaatkan. Salah satunya tanaman yang

dapat dimanfaatkan untuk pengobatan yaitu daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang berkhasiat sebagai antioksidan kulit.

Salah satu ayat lagi yang menjelaskan mengenai manfaat tentang segala yang diciptakan oleh Allah swt dalam QS Al-Qaaf/ 50: 7

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata (Kementrian Agama RI, 2012).

Allah swt telah menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Air hujan yang diturunkan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup tanaman tumbuh-tumbuhan yang menjadi salah satu sumber makanan bagi makhluk hidup lain termasuk manusia. Di dalam tanaman terdapat berbagai macam zat yang menjadi sumber penyembuhan terhadap penyakit. Salah satu tanaman disekitar kita yang dikenal selama ini sebagai gulma atau tanaman pengganggu yaitu daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang ternyata memiliki banyak manfaat salah satunya yaitu sebagai antioksidan kulit.

Sesuai dengan yang diriwayatkan hadist H.R Bukhari/7:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

Artinya:

(Hadis) dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya.” (H.R. al-Bukhariy, VII : 12)

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa segala penyakit yang diturunkan Allah pasti akan diturunkan juga obatnya. Segala penyakit yang diberikan Allah pasti akan ada penawarnya dan akan sembuh dengan seizin Allah swt. Yang dalam hal ini salah satu obat yang bisa dijadikan untuk penyembuhan penyakit yaitu daun botto’-botto’ (*Chromolaena odorata* L.) yang dapat berfungsi sebagai antioksidan yang diformulasi dalam sediaan krim sehingga dengan seizin Allah swt maka penyakit seseorang dapat disembuhkan.

Adapun hadis tentang kesembuhan suatu penyakit karena obat tertentu yang diriwaytakan oleh H.R Muslim/4:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya:

(Hadis) dari Jabir dari Rasulullah saw. beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya, apabila didapatkan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit maka penyakit itu akan hilang karena seizin Allah *azza wa jalla*.”(H.R. Muslim, IV : 1729)

Dalam hadis ini pula dijelaskan bahwa segala penyakit yang diturunkan oleh Allah swt pasti akan ada pula obat yang cocok untuk menyembuhkan penyakit tersebut tentunya dengan seizin Allah swt. Berhubungan dengan penelitian ini maka salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan penyakit tersebut dengan melalui perantara dari salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antioksidan yaitu daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang selama ini kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanaman pengganggu dan biasanya hanya digunakan sebagai pakan ternak, ternyata memiliki khasiat sebagai obat.

Salah satu hadis tentang perlunya menjaga kecantikan diri yang diriwayatkan oleh H.R Muslim/1:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ (رواه مسلم)

Artinya:

(Hadis) dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi saw.bersabda: “Tidak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada seberat *zarra* sifat sombong”. Seseorang bertanya :jika ada seorang yang ingin bajunya dan sandalnya (diliat) baik, (Apakah termasuk sombong). Jawab Nabi: “Sesungguhnya Allah itu Indah dan menyukai keindahan, orang yang sombong tidak menerima kebenaran dan meremehkan orang lain” (H.R. Muslim, I : 93).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perlunya kita memelihara keindahan diri karena sesungguhnya Allah itu Indah dan menyukai keindahan dan bagi orang yang sombong itu dia tidak akan meremehkan orang lain dan dijauhkan daripadanya surga kelak diakhirat. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, dimana dikatakan

Allah itu menyukai suatu keindahan. Maka dengan dilakukannya penelitian tentang daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang berkhasiat sebagai antioksidan, maka diharapkan sediaan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu krim yang dapat memperbaiki atau memperindah penampilan seseorang. Tentunya dalam hal ini seseorang yang dimaksud bukanlah orang yang memperindah diri hanya karena ingin dilihat baik atau cantik karena sifat sombong.

Hadis tentang memperbaiki penampilan sebagai nikmat Allah yang diriwayatkan oleh H.R Turmudzi dan Al Hakim:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ». (رواه الترمذی والحاكم قال أبو
عيسى هذا حديث حسن.)

Artinya:

(Hadis) dari kakeknya 'Amr bin Syu'aib berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :Sesungguhnya Allah menyukai melihat (tampaknya) bekas nikmat (yang dilimpahkan-Nya) kepada hamba-Nya. (HR. al-Turmudzi dan al-Hakim, menurut al-Turmudzi hadis ini berkualitas hasan).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt menyukai keindahan karenanya kita dianjurkan untuk memperbaiki penampilan sebagai salah satu nikmat Allah swt. Keindahan yang Allah perintahkan dalam diri kita adalah yang sesuai syariat sesuai aturannya dalam firman Al-Qur'an dan Al-Hadist karena indah bukan mengumbar apa yang Allah berikan, indah itu mengatur pemberian sesuai yang Dia perkenankan. Dalam hal ini memperindah penampilan dengan melalui hasil dari penelitian tanaman yang berkhasiat sebagai antioksidan yang diformulasi dalam

sediaan krim yaitu daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang merupakan salah satu nikmat Allah yang dimaksud.

Berdasarkan ayat dan hadist di atas, diketahui bahwa Allah swt menciptakan aneka ragam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satunya tanaman yang dimaksud yaitu daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang selama ini kita kenal sebagai gulma atau tanaman pengganggu, biasanya hanya digunakan untuk pakan ternak ternyata tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan tersebut sebagai bahan pengobatan yang dalam hal ini berkhasiat sebagai antioksidan yang diformulasi dalam bentuk sediaan krim. Dari pengobatan itu maka kita dianjurkan untuk memperindah diri karena sesungguhnya Allah swt menyukai keindahan, tentunya dengan keindahan yang dimaksud yang sesuai dengan syariat islam dan sesungguhnya Allah juga tidak akan menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara eksperimental dengan metode DPPH, menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis untuk melihat aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.).

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia, Farmasetika dan Kimia Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan eksperimentatif yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil dari eksperimen yang dilakukan.

C. Sampel

Sampel daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) diperoleh disekitar kota Pangkep, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari. Daun yang digunakan adalah seluruh daun yang tidak rusak dan tidak berjamur.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Penyiapan Sampel

a. Pengolahan sampel

Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) yang telah diambil, di cuci hingga bersih dengan air mengalir, dikeringkan/diingin-anginkan tanpa terkena sinar matahari langsung kurang lebih 10 hari, lalu diserbukkan hingga menjadi simplisia setengah kasar.

b. Ekstraksi sampel

Simplisia daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) disediakan sebanyak 750 gram, lalu dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan etanol 96% sebanyak 5 liter. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat terlindung dari sinar matahari sambil diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya.

Ampas diekstraksi kembali dengan penyari yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus dilakukan hingga cairan penyari tampak bening. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian disatukan dan diuapkan cairan penyarinya dengan menggunakan rotavapor 40°C sampai diperoleh ekstrak etanol kental.

2. Formulasi krim

a. Rancangan formula

Tabel 1. Rancangan formula sediaan krim antioksidan ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

Bahan	Kadar (%) untuk masing-masing bahan dalam 50 gram					Fungsi
	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	
Ekstrak daun botto'-botto' (<i>Chromolaena Odorata</i> L.)	0,0008	0,0016	0,0024	-	-	Zat aktif
Vitamin C	-	-	-	-	0,05	Pembanding
Asam stearat	5	5	5	5	5	Pengemulsi
Setil alkohol	5	5	5	5	5	Penstabil
Propil paraben	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Pengawet
Metil paraben	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Pengawet
Tween 80	5	5	5	5	5	Emulgator
Span 80	5	5	5	5	5	Emulgator
Gliserin	15	15	15	15	15	Pelembut
Adeps lanae	5	5	5	5	5	Basis
Paraffin cair	5	5	5	5	5	Emulient
Air suling ad	100	100	100	100	100	Pelarut

b. Pembuatan sediaan krim

Alat dan bahan disiapkan. Masing-masing bahan ditimbang sesuai dengan perhitungan. Fase minyak dibuat dengan melebur berturut-turut adeps lanae, asam stearat, setil alkohol, span 80 di atas penangas air, kemudian ditambahkan propil paraben. Kemudian fase air dibuat dengan cara melarutkan metil paraben dalam air yang telah dipanaskan hingga 70°C, kemudian ditambahkan gliserin dan tween 80.

Emulsi dibuat dengan cara menambahkan fase minyak ke dalam fase air sambil diaduk dalam lumpang hingga terbentuk emulsi yang stabil. Kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) gerus dalam lumpang hingga terbentuk emulsi yang homogen. Krim dimasukkan dalam wadah tertutup rapat dan diberi etiket.

3. Pengujian krim antioksidan

a. Pembuatan kurva baku larutan DPPH

Ditimbang DPPH sebanyak 10 mg dan di encerkan dalam labu ukur 100 ml dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a hingga 100,0 ml, sebagai larutan stok. Untuk konsentrasi 15,0 ppm, dipipet larutan DPPH sebanyak 1,50 ml kemudian dicukupkan volumenya dengan etanol p.a hingga 10,0 ml dan diamati absorbansinya pada spektrofotometer. Hal yang sama dilakukan untuk masing-masing konsentrasi 20,0 ppm, 25,0 ppm, 30,0 ppm dan 35,0 ppm.

b. Penetapan panjang gelombang maksimum (λ_{maks}) DPPH

Pengujian dilakukan dengan mencampur larutan DPPH sebanyak 3,50 ml dengan etanol sampai volumenya 10,0 ml dalam labu ukur. Larutan ini kemudian dipindahkan dalam wadah vial cokelat, reaksi dibiarkan selama 30 menit pada suhu 37°C dan diamati absorbansinya pada panjang gelombang 400-600 nm. Panjang gelombang yang memberikan nilai absorbansi paling besar ditetapkan sebagai panjang gelombang maksimum DPPH.

c. Pengujian krim terhadap DPPH

Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan cara krim ditimbang sebanyak 2,50 g masing-masing formula (F1, F2, F3, F4 dan F5) yang kemudian dilarutkan dengan 5,0 ml etanol p.a dan dimasukkan dalam tabung sentrifuge. Krim uji disentrifuge selama 10 menit pada 3000 rpm. Krim yang telah disentrifuge kemudian disaring pisahkan endapannya hingga diperoleh larutan uji kemudian ditambahkan 2,0 ml DPPH dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a hingga 10,0 ml dalam labu ukur. Masing-masing campuran dipindahkan dalam vial dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37°C. Masing-masing larutan ini kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh.

E. Instrumen Penelitian

1. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat gelas, seperangkat alat maserasi, cawan porselin, rotavapor, spektrofotometer UV-Vis (*Genesys*®), timbangan analitik (*Kern*®), wadah krim.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Air suling, DPPH, ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L), asam stearat, adeps lanae, etanol p.a (*Merck*), aluminium foil, metil paraben, setil alkohol, tween 80, propil paraben, parafin cair, gliserin, span 80, vitamin C.

F. Validasi dan Realibilitas Instrumen

Metode yang digunakan untuk melihat aktivitas antioksidan yaitu metode DPPH. Alat yang digunakan yaitu spektrofotometri UV-Vis. Validasi dijaga dengan cara menggunakan instrumen yang terkalibrasi. Reabilitas dijaga dengan melakukan pengulangan pengukuran sampai tiga kali untuk konsentrasi yang sama.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian aktivitas antioksidan krim ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil perhitungan persen penghambatan krim ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

Formula	Absorbansi			Peredaman (%)			Peredaman rata-rata (%)
	1	2	3	1	2	3	
I	0,552	0,554	0,522	13,61	13,30	18,30	15,07
II	0,399	0,436	0,390	37,55	31,76	38,96	36,09
III	0,389	0,368	0,362	39,12	42,41	43,34	41,62
IV	0,595	0,574	0,615	6,88	10,17	3,75	6,93
V	0,334	0,332	0,328	47,64	47,96	48,58	48,06

B. Pembahasan

Antioksidan adalah zat yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah terjadinya proses oksidasi serta menetralkan radikal bebas, dimana antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki oleh radikal bebas. Salah satu uji untuk menentukan aktivitas antioksidan penangkap radikal adalah metode DPPH (1,1 Difenil-2-picrylhidrazil). DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu kamar dan sering digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan beberapa senyawa atau bahan alam. DPPH memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan warna violet yang gelap. Penangkal radikal bebas menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil (Sunarni, 2011: 53).

Daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dikenal dengan nama tekelan atau gulma siam yang mengganggu pertumbuhan tanaman lain dan mengurangi kesuburan tanah.

Ekstrak kasar daun *Chromolaena odorata* memiliki efek antioksidan. Efek yang dihasilkan ini kemungkinan disebabkan oleh kandungannya yang tinggi akan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan, yang mampu menghambat proses oksidasi (Ngozi, 2009: 2).

Simplisia daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) diekstraksi secara maserasi menggunakan cairan penyari etanol. Etanol adalah pelarut organik yang dapat menarik sebagian besar senyawa-senyawa bioaktif yang terdapat dalam simplisia, juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damogalad dkk (2013), metode maserasi dengan cairan penyari etanol 96% digunakan untuk menyari senyawa-senyawa fenolik khususnya flavonoid dan tanin.

Antioksidan diformulasi dalam bentuk sediaan topikal yang diharapkan mampu melindungi kulit dari efek buruk radikal bebas yang disebabkan oleh sinar matahari, untuk itu dibuatlah sediaan dalam bentuk krim yang lebih praktis (Ngozi, 2009). Krim adalah sediaan setengah padat, berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Sediaan krim digunakan karena sediaan ini merupakan sediaan yang menyenangkan, mudah menyebar rata, dan praktis digunakan (Ansel, 2008: 515).

Kemampuan ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) dapat dilihat dari berkurangnya intensitas warna ungu dari larutan DPPH yang telah ditambahkan dalam sampel. Berkurangnya intensitas warna larutan DPPH tersebut dapat menunjukkan bahwa terjadi reaksi antara atom hydrogen yang lepas oleh bahan uji dengan molekul radikal DPPH sehingga terbentuk senyawa 1,1 -difenil-2-pikrilhidrazin yang berwarna kuning. Semakin besar konsentrasi bahan uji, warna kuning yang dihasilkan akan semakin kuat. Pengurangan intensitas warna ungu larutan DPPH ini secara kuantitatif dapat dihitung dari berkurangnya absorbansi larutan tersebut. Semakin besar konsentrasi bahan uji maka absorbansi yang

terbaca semakin kecil, yang berarti aktivitas bahan uji dalam menangkap radikal DPPH semakin besar. Absorbansi yang terukur merupakan absorbansi sisa DPPH yang tidak bereaksi dengan larutan uji.

Hasil pengamatan dari uji aktivitas krim dari ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap DPPH di peroleh hasil bahwa formula I dengan konsentrasi ekstrak 0,0008% dengan rata-rata persen peredaman sebesar 15,07%; formula II dengan konsentrasi ekstrak 0,0016% dengan rata-rata persen peredaman sebesar 36,09%; formula III dengan konsentrasi ekstrak 0,0024% dengan rata-rata persen peredaman 41,62%; formula IV sebagai kontrol negatif dengan rata-rata persen peredaman sebesar 6,93%; dan formula V sebagai kontrol positif dengan rata-rata persen peredaman sebesar 48,06%.

Dari hasil pengujian aktivitas krim antioksidan terhadap DPPH untuk masing-masing formula F1, F2, F3, F4 dan F5 yang paling efektif sebagai krim antioksidan dari ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) adalah F3 yang mengandung ekstrak sebesar 0,0024% dengan rata-rata persen peredaman sebesar 41,62%. Hal ini dibuktikan setelah dilakukan penelitian yang sama terhadap DPPH dengan menggunakan krim yang mengandung bahan aktif vitamin C sebagai kontrol positif yaitu F5 dengan rata-rata persen peredaman sebesar 48,06%. Dalam hal ini, nilai persen penghambatan F3 adalah nilai yang paling mendekati rata-rata persen peredaman kontrol positif dari krim yang mengandung bahan aktif vitamin C. Penelitian ini juga dilakukan terhadap krim tanpa adanya kandungan bahan aktif dengan maksud apakah ada pengaruh dari masing-masing bahan yang digunakan dalam pembuatan krim sebagai antioksidan dan terlihat rata-rata persen peredamannya terhadap DPPH sebesar 6,93%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) pada sediaan krim memiliki aktivitas antioksidan terhadap terhadap DPPH.
2. Ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) pada sediaan krim yang paling efektif aktivitas antioksidannya yaitu pada F3 dengan konsentrasi ekstrak 0,12% memiliki persen penghambatan sebesar 41,62%.

B. Implikasi Penelitian

1. Sebaiknya dilakukan pengujian karakteristik sediaan sehingga nantinya memiliki kriteria fisik yang baik.
2. Sebaiknya uji kemampuan antioksidan sediaan dilanjutkan secara *in vivo* agar efikasinya sebagai antioksidan dapat diketahui pada kulit manusia.


KEPUSTAKAAN

- Adiatma, Tjandra. *Tahun 2013 Prevalensi Diabetes Mellitus di Indonesia Mencapai 21,3 juta Orang*. Sumatera: Universitas Sumatera Utara. 2010
- Afolabi C, Akinmoladun E.O, Ibukun and Dan-Ologe I A. *Phytochemical constituents and antioxidant properties of extracts from the leaves of Chromolaena odorata*. Scientific Research and Essay. 2007
- Al-Bukhariy, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardazbah al-Jafi. *Shahih al-Bukhari Jilid VII Maktabah wa Mathba'ah*. Semarang: Karya Toha Putra. 2014
- Al-Naisaburiy, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim Jilid I & IV Maktabah Dahlan*. Bandung: Indonesia. 2014
- Al-Nasa'iy, al-Hafidz Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syaib bin 'Ali bin Bahr bin Sinan bin Dinar. *Sunan al-Nasa'iy Jilid VIII Maktabah wa Mathba'ah*. Semarang: Toha Putra. 2014
- Anonim. *Farmakope Indonesia Edisi ketiga*. Jakarta: Depkes RI. 1979
- Anonim. <http://www.plantamor.com> diakses pada tanggal 5 februari 2014
- Ansel C, Howard. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi IV*. Jakarta: UI Press. 2008
- Benjamin, VT. *Phytochemical and Antibacterial Studies on The Essential Oil of Eupatorium Odoratum*. Pharmaceutical Biology. 2011
- Dalimartha S and Soediby M. *Awet Muda dengan Tumbuhan Obat dan Diet Suplemen*. Jakarta: Trubus Agriwidya. 1998
- Damogalag, V., Hosea Jaya Edy dan Hamida, Sri Supriadi. *Formulasi Krim Tabir Surya Ekstrak Kulit Nanas (Annona comosus L Merr) dan Uji in vitro Nilai Sun Protecting Factor (SPF)*. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi UNSTRAT, Vol 2 No 2. Manado: Program Studi Farmasi FMIPA UNSTRAT. 2013
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Gema Risalah Press. 2014


- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 1995
- Dirjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000
- Dyatmiko W.MH Santosa, and A.F Hafid. *Aktivitas Penangkapan Radikal Bebas dalam Sistem Molekuler dan Seluler Sari Air Rimpang Tanaman Obat Zingiberaceae*. Surabaya: Lembaga Pusat Penelitian Obat Tradisional UNAIR. 2010
- Edawati, Zulfa. *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanolascidia Didemnum Sp. Dari kepulauan Seribu dengan Metode DPPH dan Identifikasi Golongan Senyawa dari Fraksi teraktif*. Skripsi, Fakultas MIPA UI: Depok. 2012
- Fessenden, R.J, and Fessenden, J.S. *Kimia Organik jilid 1, Edisi ketiga. Terjemahan dari Organic Chemistry oleh Hadyana Pudjaatmaka*. Jakarta: Erlangga. 1992
- Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun, Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung: Institute Teknologi Bandung. 1987
- Hernani, Raharjo, M. *Tanaman Berkhasiat Antioksidan*. Jakarta: Penebar Swadya. 2013
- Kenneth, A., Connors, at al. *Stabilitas Kimiawi Sediaan Farmasi. Didik Gunawan, Penerjemah*. Semarang: Semarang Press. 1985
- Kibbe, AH. *Handbook of Pharmaceutical Excipients 3th Edition*. Pennsylvania: University of Pharmacy. 2000
- Khopkar, S,M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI-Press. 2007
- Lampe, JW. *Health Effect of Vegetables and fruit: assesing mechanisms of action in Human Experimental studies*. American journal of Clinical Nutrition, Vol. 70, No 3. 2010
- Ngozi, Igboh M., Jude, Ikewuchi C. and Catherine, Ikewuchi C. *Chemical Profile of Chromolaena odorata L. (King and Robinson) Leaves*. Pakistan Journal of Nutrition8. 2009
- Parameswari G, Suriyavathana M. *In-Vitro Antioxidant Activity Of Chromolaena odorata (L.) King & Robinson*. Tamilnadu India: Department of Biochemistry, Periyar University. 2012

- Phan TT, See J, Lee ST, Chan SY. *Antioxidant effects of the extracts from the leaves of Chromolaena odorata on human dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes against hydrogen peroxide and hypoxanthine-xanthine oxidase induced damage (Herbal Traditional Medicine)*. New York: Marcel Dekker. 2004
- Prakash, A. *Antioxidant Activity*. Medallion: Laboratories Analithycal Progres. 2011
- Pratiwi, Puspa Dewi, Mindarti Harapini. *Nilai Peroksida dan Aktivitas Anti Radikal bebas Diphenyl picril hidrazil hidrate (DPPH) Ekstrak Metanol Knea laurina*. Majalah Farmasi Indonesia Vol 17 No 1. 2006
- Prawiradiputra, Bambang R. *Ki Rinyuh (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Robinson): Gulma Padang Rumput Yang Merugikan*. Bogor: Balai Penelitian Ternak. 2006
- Rohman, Abdul. *Daya Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kemuning (Murayya paniculata L.) Secara in-vitro*. Majalah Farmasi Indonesia, 16 Vol. 3: 136-140. 2012
- Sarastani, D, Suwarna. *Aktivitas Antioksidan Ekstrak dan Fraksi Ekstrak Biji Atung*. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan Volume XIII, No.2*. 2002
- Setiati, S. *Radikal Bebas, Antioksidan dan Proses Menua*. Jakarta: Majalah Medika. 2013
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al- Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an Volume 12*. Jakarta: Lentera Hati. 2014
- Sunarni, T. *Aktivitas Antioksidan Penangkap Radikal Bebas bebrapa kecambah dari biji tanaman Familia Papilionaceae*. *Jurnal Farmasi Indonesia* 2. 2011
- Tiayu, Septi Intan. *Formulasi Krim Obat Jerawat Minyak Atsiri Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) dan uji Daya Antibakteri secara In vitro*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2009
- Tranggono, R.I, Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007
- Voight, Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995


- Wardiah, Nur. *Efek Bawang Putih (Allium sativum) dan Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl) terhadap jumlah limfosit pada tikus yang diberi suplemen kuning telur*. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 2010
- Watson, David G. *Analisis Farmasi, Buku Ajar untuk Mahasiswa Farmasi dan Praktisi Kimia Farmasi Edisi kedua. Terjemahan dari Analysis a Text book for Pharmacy Student and Pharmaceutical Chemist, 2nd oleh Winny R, Syarief*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 2009
- Widyastuti, N. *Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH, CUPRAC, dan FRAP serta kolerasinya dengan fenol dan flavonoid pada enam Tanaman*. Bogor: Institut Pertanian Bogor-Press. 2010
- Winarsi, Hery. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas*. Yogyakarta: Kanisius. 2013
- Yuliani, Dewi. *Kajian Aktivitas Antioksidan Fraksi Etanol Jintan Hitam (Nigella sativa L.)*. Malang: Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN. 2010

Lampiran 1. Skema proses penelitian**Gambar 2. Skema proses penelitian**

Lampiran 2. Skema ekstraksi daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)



Gambar 3. Skema ekstraksi daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

Lampiran 3. Skema pembuatan krim antioksidan**Gambar 4. Skema pembuatan krim**

Lampiran 4. Perhitungan bahan dan nilai HLB

1. Bahan krim

a. Ekstrak I	$= \frac{0,0008\%}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 0,0004 \text{ g}$
II	$= \frac{0,0016\%}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 0,0008 \text{ g}$
III	$= \frac{0,0024\%}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 0,0012 \text{ g}$
b. Vitamin C	$= \frac{0,05\%}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 0,025 \text{ g}$
c. Setil alkohol	$= \frac{5}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 2,5 \text{ g}$
d. Asam stearat	$= \frac{5}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 2,5 \text{ g}$
e. Gliserin	$= \frac{15}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 7,5 \text{ g}$
f. Parafin cair	$= \frac{5}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 2,5 \text{ g}$
g. Adeps lanae	$= \frac{5}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 2,5 \text{ g}$
h. Span 80		$= 0,934 \text{ g}$
i. Tween 80		$= 4,065 \text{ g}$
j. Metil paraben	$= \frac{0,18}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 0,09 \text{ g}$
k. Propil paraben	$= \frac{0,02}{100} \times 50 \text{ g}$	$= 0,01 \text{ g}$
l. Aqua	I $= 50 - 22,60$	$= 27,4 \text{ g}$
	II $= 50 - 22,62$	$= 27,4 \text{ g}$
	III $= 50 - 22,65$	$= 28,3 \text{ g}$

2. Konsentrasi emulgator

Tabel 2. Perhitungan HLB

Fase minyak	A (%)	B	A x B
Setil alkohol	5	15	3,75
Asam stearat	5	15	3,75
Parafin cair	5	12	3
Adeps lanae	5	10	2,5
JUMLAH	20	52	13

A = Konsentrasi fase minyak

B = Nilai HLB butuh (ketetapan)

Nilai HLB butuh minyak = 13

Tween 15 2

3

Span 4,3 8,7

+

10,7

Konsentrasi emulgator 10%

$$\frac{10}{100} \times 50 \text{ g} = 5 \text{ g}$$

$$\text{Tween} = \frac{2}{10,7} \times 5 = 0,934 \text{ g}$$

$$\text{Span} = \frac{8,7}{10,7} \times 5 = 4,065 \text{ g}$$

Lampiran 5. Perhitungan kurva baku DPPH

1. Konsentrasi untuk larutan stok = $\frac{10 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = 100 \text{ ppm}$

2. Konsentrasi untuk pengenceran

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$



a. $100 \text{ ppm} \times V = 10 \text{ ml} \times 15 \text{ ppm} = \frac{150 \text{ ml.ppm}}{100 \text{ ppm}} = 1,5 \text{ ml}$

b. $100 \text{ ppm} \times V = 10 \text{ ml} \times 20 \text{ ppm} = \frac{200 \text{ ml.ppm}}{100 \text{ ppm}} = 2,0 \text{ ml}$


c. $100 \text{ ppm} \times V = 10 \text{ ml} \times 25 \text{ ppm} = \frac{250 \text{ ml.ppm}}{100 \text{ ppm}} = 2,5 \text{ ml}$

d. $100 \text{ ppm} \times V = 10 \text{ ml} \times 30 \text{ ppm} = \frac{300 \text{ ml.ppm}}{100 \text{ ppm}} = 3,0 \text{ ml}$

e. $100 \text{ ppm} \times V = 10 \text{ ml} \times 35 \text{ ppm} = \frac{350 \text{ ml.ppm}}{100 \text{ ppm}} = 3,5 \text{ ml}$

Lampiran 6. Pembuatan kurva baku DPPH dan grafik kurva baku DPPH**Gambar 5. Pembuatan kurva baku DPPH****Gambar 6. Grafik kurva baku DPPH**

Lampiran 7. Skema pengujian krim ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) sebagai antioksidan



Gambar 7. Skema pengujian krim ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) sebagai antioksidan

Lampiran 8. Perhitungan persen peredaman krim ekstrak etanol daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.) terhadap DPPH

Tabel 3. Absorbansi masing-masing formula

Formula	Absorbansi			
	1	2	3	DPPH
I	0,552	0,554	0,522	0,639
II	0,399	0,436	0,390	0,639
III	0,389	0,368	0,362	0,639
IV	0,595	0,574	0,615	0,639
V	0,334	0,332	0,328	0,638

Rumus

$$\% \text{ peredaman} = \frac{A \text{ DPPH} - A \text{ sampel}}{A \text{ DPPH}} \times 100 \%$$

Formula I

$$1. \% \text{ peredaman} = \frac{0,639 - 0,552}{0,639} \times 100 \% = 13,61\%$$

$$2. \% \text{ peredaman} = \frac{0,639 - 0,554}{0,639} \times 100\% = 13,30\%$$

$$3. \% \text{ peredaman} = \frac{0,639 - 0,522}{0,639} \times 100\% = 18,30\%$$

$$\text{Rata-rata \% peredaman} = 15,07\%$$

Formula II

$$1. \% \text{ peredaman} = \frac{0,639 - 0,399}{0,639} \times 100\% = 37,55\%$$

$$2. \% \text{ peredaman} = \frac{0,639 - 0,436}{0,639} \times 100\% = 31,76\%$$

$$3. \% \text{ peredaman} = \frac{0,639 - 0,390}{0,639} \times 100\% = 38,96\%$$

$$\text{Rata-rata \% peredaman} = 36,09\%$$

Formula III

$$1. \% \text{ peredaman} = \frac{0,639 - 0,389}{0,639} \times 100\% = 39,12\%$$

$$2. \% \text{ peredaman} = \frac{0,639 - 0,368}{0,639} \times 100\% = 42,41\%$$

$$3. \% \text{ peredaman} = \frac{0,639 - 0,362}{0,639} \times 100\% = 43,34\%$$


$$\text{Rata-rata \% peredaman} = 41,62\%$$

Formula IV

1. % peredaman = $\frac{0,639-0,595}{0,639} \times 100\% = 6,88\%$
 2. % peredaman = $\frac{0,639-0,574}{0,639} \times 100\% = 10,17\%$
 3. % peredaman = $\frac{0,639-0,615}{0,639} \times 100\% = 3,75\%$
- Rata-rata % peredaman** = 6,93%

Formula V

1. % peredaman = $\frac{0,638-0,334}{0,638} \times 100\% = 47,64\%$
 2. % peredaman = $\frac{0,638-0,332}{0,638} \times 100\% = 47,96\%$
 3. % peredaman = $\frac{0,638-0,328}{0,638} \times 100\% = 48,58\%$
- Rata –rata % peredaman** = 48,06%



Lampiran 9. Gambar sediaan krim

**Gambar 8. Sediaan krim ekstrak etanol daun botto'-botto'
(*Chromolaena odorata* L.)**

Formula I (konsentrasi ekstrak 0,0008%); formula II (konsentrasi ekstrak 0,0016%); formula III (konsentrasi ekstrak 0,0024%); formula IV (kontrol negatif); dan formula V (kontrol positif vitamin C)

Lampiran 10. Dokumentasi sampel penelitian

Gambar 9. Tanaman daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

(A) gambar bentuk daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.); (B) gambar tanaman daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.); (C) gambar proses pengeringan daun botto'-botto' (*Chromolaena odorata* L.)

RIWAYAT HIDUP



IRNA UMAR lahir di Cakke, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang pada tanggal 5 Oktober 1992, merupakan dari pasangan suami-istri H. Umar (Alm) dan Hj. Maryam. Jenjang pendidikan pertama kali di TK Pertiwi pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 119 Belalang, Kab.

Enrekang pada tahun 1998 hingga menyelesaikan studi di Sekolah dasar pada tahun 2004 dan menjadi alumni. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Anggeraja hingga pada tahun 2007. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Anggeraja hingga pada tahun 2010. Pada tahun ini pula melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R