

POTENSI FITOREMEDIASI ECENG GONDOK (*Eichornia crassipes*) DALAM MEREDUKSI LOGAM BERAT SENGG (Zn) DARI PERAIRAN DANAU TEMPE KABUPATEN WAJO



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
NUR AZIZAH HASYIM
NIM. 60300112091

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Potensi fitoremediasi Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) dalam Mereduksi Logam Berat Seng (Zn) Dario Perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo ”, yang disusun oleh Nur Azizah Hasyim, NIM: 60300112091, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin/ 29 Agustus 2016, bertepatan dengan 1 Dzulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Agustus 2016 M.
26 Dzulqaidah 1437 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Ulfa Triyani Alatif, S. Si., M. Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Baiq Farhatul Wahidah, S. Si., M. Si.	(.....)
Munaqisy II	: Eka Sukmawaty, S. Si., M. Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi.	(.....)
Pembimbing I	: Fatmawati Nur, S. Si., M. Si.	(.....)
Pembimbing II	: Nurlailah Mappanganro, S. P., M. P.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad M. Ag.
NIP. 19710412 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah Hasyim
NIM : 60300112091
Tempat/Tgl.Lahir : Sengkang/30 Maret 1994
Jur/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Antang Raya Komp. Asindo
Judul :Potensi Fitoremediasi Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*)
Dalam Mereduksi Logam Berat Seng (Zn) Dari Perairan
Danau Tempe Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Makassar, 29 Agustus 2016

ALAUDDIN
M A K A S S A R
Penyusun

Nur Azizah Hasyim
NIM: 60300112091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Nur Azizah Hasyim**, NIM: 60300112091, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul, “**Potensi Fitoremediasi Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) Dalam Mereduksi Logam Berat Seng (Zn) Dari Perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo**”, memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 29 Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Fatmawati Nur, S.Si., M.Si

Nurlailah Mappanganro, S.P.,M.P



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala pemberian-Nya pada penulis, rahmat dan kasihNya bagi alam semesta serta rentetan kejadian yang membawa penulis pada tahap kehidupan ini. Shalwat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, Pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat.

Ucapan terima kasih yang tergambarakan penulis ucapkan kepada Almarhum Ayahanda Drs M Hasyim T dan Ibunda Dra Nurhayati M untuk kasih sayang dan ketulusan tanpa pamrih kepada anak-anaknya.

Dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Potensi Fitoremediasi Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) Dalam Mereduksi Logam Berat Seng (Zn) Dari Perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo”** ini dapat terselesaikan, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si), penulis sangat terbantu oleh banyak pihak, karenanya Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan

III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan sebagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

3. Bapak Dr. Mashuri Masri M.Si, selaku Ketua Jurusan Biologi dan Ibu Baiq Farhatul S.Si,M.Si selaku sekretaris jurusan Biologi.
4. Ibu Fatmawi Nur, S.Si.,M.Si, selaku pembimbing pertama yang dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Nur Lailah Mappanganro, S.P.,MP, selaku pembimbing kedua yang dengan sabar memberi arahan dan petunjuk dalam pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Baiq Farhatul, S.Si,M.Si, selaku Penguji/ Pembahas I
7. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si.,M.Si, selaku Penguji/ Pembahas II
8. Bapak Dr.M.Thahir Maloko, M.Hi, selaku Penguji/ Pembahas III
9. Ibu Nur Lailah Mappanganro, S.P.,MP, selaku penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis selama aktif menjalani proses perkuliahan.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Laboratorium Kimia Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang telah banyak memberikan bimbingan selama Penulis melakukan penelitian.
12. Saudara-saudariku: Muh Tabsyir H, Muh Afif H, Nur Athifah H, Muh Aljimli H dan Nurul Bahja H atas dukungan dan kebersamaan dalam tangis, canda dan tawa, dan perjuangan menjalani kesederhanaan hidup.

13. Saudari perjuanganku: Jung Nurshabah, Marwah, Hasnidar, Hartina, Resky Nurul Hakiki, Resky Yunita Nasrul, Nur Halima, Firdayana, Dewi Kartika, Nurmadinah, A. Nurul Azizah, Herfianti, Mashita dan Isni yang setia menemani, banyak memberikan masukan, semangat, dan segala kebersamaan dan kesediaan berbagi cerita serta pengalaman berharganya.
14. Teman-teman **RANVIER**, (Biologi angkatan 2012) yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dan menghadirkan cerita indah selama kurang lebih 4 tahun kebersamaan.
15. Semua Kanda Senior dan Adik Junior di jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
16. Teman-teman KKNP angkatan VI di Desa Bulu Ballea Pattapang Kabupaten Gowa atas canda tawanya selama kita bersama.
17. Semuanya Sahabat dan Karib Kerabat yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, untuk pelajaran hidup dalam ragam Bahasa dan ragam penyampaian.

Penulis menyadari masih ada terdapat kekurangan dan keterbatasan pada skripsi ini, karenanya kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua.

Makassar, 29 Agustus 2016

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTARK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1 - 8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9 - 41
A. Ayat dan Hadits yang Televan	9
B. Fitoremediasi	12
C. Eceng Gondok	17
D. Logam Berat seng (Zn)	24
E. Danau	36
F. Kerangka Pikir	41
G. Hipotesis	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42 - 48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel	42

C. Variabel Penelitian	43
D. Defenisi Operasional Variabel	43
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Instrument Penelitian	44
G. Prosedur Kerja.....	45
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49 - 58
A. Hasil penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	59 - 60
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
KEPUSTAKAAN.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jenis-jenis tanaman untuk aplikasi fitoremediasi	15
Tabel 4.1. Rata-rata jumlah konsentrasi logam seng (Zn)	49
Tabel 4.2. Perubahan Morfologi Tanaman Selama Fitoremediasi	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Morfologi Eceng Gondok (<i>Eichornia crassipes</i>)	18
Gambar 2.2.	Peta dan Lokasi Penelitian di Danau Tempe	39
Gambar 4.1.	Diagram batang penurunan Konsentrasi Logam Seng (Zn) dalam air limbah	50



ABSTRAK

Nama : Nur Azizah Hasyim
Nim : 60300112091
Judul Skripsi : **Potensi Fitoremediasi Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*)
Dalam Mereduksi Logam Berat Seng (Zn) Dari Perairan
Danau Tempe Kabupaten Wajo**

Pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga yang dilakukan secara langsung akan dapat menyebar ke air, udara dan tanah sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran, sehingga perlu dilakukan alternatif pengolahan dan pengaplikasian yang efektif untuk mengolah limbah, salah satunya dengan menggunakan fitoremediasi. Fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar baik senyawa organik maupun anorganik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hari seberapa tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) mampu mereduksi logam berat seng (Zn) dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan percobaan faktorial yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan ini meliputi perlakuan menggunakan satu jenis konsentrasi dan variasi waktu setelah penambahan logam seng (Zn). Konsentrasi yang dipilih adalah 10 ppm, sedangkan variasi waktu yang ditentukan adalah hari ke-3, hari ke-6 dan hari ke-9. Tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) diambil dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo kemudian diaklimatisasi selama 7 hari dalam baskom sebelum perlakuan. Untuk analisis kadar logam Zn digunakan metode *Spektrofotometri Serapan Atom* (AAS) di Laboratorium Kimia Kesehatan, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu eceng gondok (*Eichornia crassipes*) berpotensi fitoremediasi dalam mereduksi logam berat seng (Zn) dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo pada hari ke 3 dengan nilai 1,2541 ppm yang tidak berbeda nyata dengan hari ke 6 dan hari ke 9 dengan masing-masing nilai 1,1954 dan 0,6295 dan berbeda nyata dengan H0 dari konsentrasi awal 10 ppm. Dari hasil penelitian terbukti bahwa tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) berpotensi fitoremediasi dalam mereduksi logam berat seng (Zn) dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

Kata Kunci: Fitoremediasi, Eceng gondok, Seng (Zn).

ABSTRACT


Name : Nur Azizah Hasyim
Nim : 60300112091
Thesis Title : **Potential of Phytoremediation Water Hyacinth (*Eichornia crassipes*) in reducing Heavy Metal Zinc (Zn) Of Bodies Lake Tempe Wajo**

Disposal of industrial and household waste Performed Direct Operating be can be spread into the air, so that air and ground potential cause of liver pollution. It should be done so that alternative application of the Effective Treatment and processing waste for review, only prayers with using phytoremediation. Phytoremediation is a plant for a review eliminate USE, OR destroy stabilize pollutant Both organic and Inorganic Compounds. Singer Research conducted for the review knowing Plant Age hyacinth (*Eichornia crassipes*) The Best hearts metal reduce weight of zinc (Zn) on Lake Tempe Wajo. With singer research conducted using factorial experiment is composed hearts completely randomized design (CRD). Singer treatment includes treatment using Single Operates And Time-Varying concentrations of taxable income disposals metal zinc (Zn). The chosen concentration is 10 ppm, while Variation Time Being determined is day 3, day 6 and day 9. Water hyacinth plant (*Eichornia crassipes*) was taken from the waters of Lake Tempe Wajo then acclimatized for 7 days sesbelum treatment basin hearts. To review the levels of analysis used Method metal Zn *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS) in Medical Chemistry Laboratory, the Center for Health Laboratory Makassar. Research shows hyacinth plants absorb metal zinc (Zn) with Variation Time That amounted to 1.2541 day 3, day 6 of 1.1954 Dan day 9 of 0.6295. It was observed that the water hyacinth plants (*Eichornia crassipes*) Potential to reduce metal Heavy hearts phytoremediation of zinc (Zn) on the waters of Lake Tempe Wajo.

Kata Kunci: Phytoremidiasi, Hyacinth, Zink (Zn).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1a. Konsentrasi logam Zn dalam air limbah	68
Lampiran Tabel 1b. Sidik ragam konsentrasi logam Zn dalam air limbah.....	58
Lampiran Rumus menentukan konsentrasi media tumbuh	69
Lampiran 1. Proses Fitoremediasi	70
Lampiran 2. Alat-alat yang digunakan selama penelitian	71
Lampiran 3. Pembacaan Logam menggunakan AAS (<i>Atomic Absorbtion Spectofotometer</i>)	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas manusia di sekitar perairan dapat menghasilkan limbah dari pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga dan kegiatan masyarakat lainnya yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lingkungan nantinya berpotensi terhadap terjadinya pencemaran lingkungan air.

Seperti yang telah dijelaskan Allah swt dalam QS. Ar-Rum/ 30:41 yang berbunyi:

رَبِّمْ ظَلَّهِكَسَّ بَلْفَتَسَّ لِّلْدِدِ فِي النَّاسِ لِيَذِيقَهُمْ بِعَظْمِ الَّذِي عَمِلُوا لَعِبَاءَهُمْ حُرُونَ

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S Ar-Rum: 41) (Al-Quran dan terjemahnya, Kementerian Agama RI tahun 2002).

Menurut Ibnu Katsir bahwa ayat diatas manusia diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan berbuat baik dan dilarang berbuat kerusakan di muka bumi, salah satunya menghindari pencemaran lingkungan dalam bentuk apapun, karena Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Salah satu perairan yang merupakan objek masyarakat membuang limbah yaitu danau.

Danau mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung danau mensuplai kebutuhan air, mulai dari untuk keperluan minum, rumah tangga, pertanian, hingga pengembangan industri. Perairan danau juga memberikan sumber daya makanan, khususnya ikan yang relatif melimpah, terutama di danau tipe paparan banjir (Jorgensen, 1980). Disamping itu perairan danau dan waduk juga merupakan wahana budidaya perikanan jaring apung dengan produktivitas tinggi serta alternatif lahan pertanian musiman yang subur meskipun praktek ini kurang mendukung kelestarian lingkungan perairan danau. Danau juga menyediakan wahana untuk pengembangan kegiatan pariwisata berbasis keunikan lingkungan dan pemandangan danau yang indah, alur transportasi air, serta berbagai sarana aktivitas sosial-budaya.

Saat ini limbah rumah tangga bukan menjadi hal yang asing karena di setiap pemukiman akan menghasilkan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga umumnya berupa bahan-bahan organik dan bahan anorganik namun juga terdapat bahan-bahan lain yang berbahaya jika masuk ke perairan. Perairan yang banyak mengandung bahan organik dan anorganik dapat menyebabkan eutrofikasi atau penyuburan sehingga terjadi *blooming* alga tertentu. Umumnya alga yang mengalami *blooming* adalah alga yang beracun. *Blooming* tersebut sering kali menyebabkan kematian massal pada biota perairan misalnya ikan. Masalah lain yang disebabkan oleh limbah rumah tangga adalah pencemaran air sehingga kualitas air menjadi menurun. Akibatnya ketersediaan air bersih berkurang dan sulit untuk mendapatkan air bersih. Selain itu, limbah rumah tangga juga menyebabkan menurunnya estetika

lingkungan akibat bau dan warna air yang ditimbulkan oleh bahan-bahan yang larut atau tersuspensi dalam limbah tersebut.

Salah satu perairan yang tercemari oleh limbah adalah Danau Tempe. Danau Tempe yang merupakan salah satu danau terbesar di Sulawesi Selatan terletak di Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Soppeng dan Sidrap. Pada daerah tersebut terdapat berbagai kegiatan yang membuang limbah secara langsung atau tidak langsung ke danau dan waduk, antara lain limbah penduduk, pertanian, peternakan. Di danau ini terdapat kapal-kapal sebagai alat transportasi para nelayan, puluhan rumah terapung yang aktivitas sehari-hari seperti memasak, mandi dan lainnya dilakukan di atas danau dan banyak masyarakat yang bermukim di lahan sekitar danau dan sebagian besar air yang masuk ke danau adalah limbah rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amri (2012), di perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo bahwa logam berat terbanyak adalah seng (Zn) yaitu 1,126 mg/l. Hal ini disebabkan karena logam tersebut digunakan pada proses pewarnaan dan pencetakan seperti yang kita ketahui Danau Tempe terletak di Kabupaten Wajo yang merupakan kota Sutera dan di sekitar danau adalah sebagian besar masyarakat yang masih bertenun dan limbahnya dibuang ke sungai, sehingga logam tersebut masuk ke perairan Danau Tempe dan di danau ini juga terdapat puluhan rumah terapung dan banyak masyarakat yang bermukim di lahan sekitar danau dan sebagian besar air yang masuk ke danau adalah limbah rumah tangga, sehingga diperkirakan apabila logam seng (Zn) melebihi baku mutu air dapat mengakibatkan pencemaran di perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

Berbagai cara telah dilakukan untuk mengurangi dampak limbah tersebut namun mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang dialami adalah mahalnya alat atau instalasi pengolahan limbah sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat setempat. Selain itu, bagi daerah-daerah yang telah menggunakan instalasi pengolahan limbah seringkali menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses pengolahan limbah tersebut. Beberapa bahan kimia yang sering digunakan adalah $Al_2(SO_4)_3$, $FeSO_4Cl$, $Fe_2(SO_4)_3$ dan klorin serta penjernih lainnya yang berbahaya bagi tubuh manusia (Fauzi, 2011). Hal ini akan berdampak buruk bagi lingkungan karena bahan kimia yang digunakan dapat mengganggu ekosistem lingkungan perairan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan suatu metode untuk menanggulangi limbah yang ramah lingkungan serta murah dan sederhana.

Adanya sifat akumulatif dalam penyerapan logam berat tersebut oleh *hydrophyta* seperti eceng gondok (*Eichornia crassipes*) dapat dimanfaatkan sebagai penyerap logam berat untuk mengurangi pencemaran logam berat di perairan. Dengan demikian, eceng gondok (*Eichornia crassipes*) dapat digunakan sebagai alternatif pembersih logam berat di kawasan perairan tersebut yang aman, murah dan mudah.

Dengan demikian, terciptanya tumbuhan eceng gondok (*Eichornia crassipes*) merupakan suatu anugerah Tuhan. Dalam QS Asy-Syu'ara'/ 7 disebutkan bahwa Allah swt telah menciptakan berbagai tumbuhan yang bermanfaat.

الأَرْضِ رَضٍ كَمَّ ° أَنْبَاتِنَا فِيهَا مِمَّنْ كُلُّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementerian Agama RI tahun 2002).

Dengan terciptanya berbagai tumbuhan yang bermanfaat seperti pada tumbuhan eceng gondok maka manusia dengan mudah dapat memanfaatkannya. Seperti halnya memanfaatkan organ-organ yang dimiliki oleh eceng gondok (*Eichornia crassipes*) diantaranya yaitu organ akar, batang dan daun.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang berjudul “Potensi Fitoremediasi Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) dalam Mereduksi Logam Berat Seng (Zn) dari Perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo”, penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Pada hari keberapa tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) mampu mereduksi logam berat seng (Zn) dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui potensi fitoremediasi eceng gondok (*Eichornia crassipes*) dalam mereduksi logam berat seng (Zn) dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo melalui pengujian daya serap tanaman eceng gondok dalam penyisihan logam berat seng (Zn) pada air limbah.

Sampel air dan tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) diambil dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2016. Analisis konsentrasi logam berat Zn pada air limbah dilakukan di Laboratorium Kimia Kesehatan (LABKES) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

Eceng gondok merupakan tanaman yang tumbuh dan hidup di kawasan perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo dan juga merupakan salah satu bioindikator dalam mengakumulasi logam.

Logam berat Seng (Zn) merupakan bahan pencemar racun dan merugikan bagi semua organisme hidup yang berasal dari aktivitas kapal dan limbah rumah tangga yang terbawa air sungai dan mengalir ke perairan Danau Tempe.

Perairan Danau Tempe merupakan salah satu danau terbesar di Sulawesi Selatan yang terletak di Kabupaten Wajo dan juga sebagai wahana budidaya perikanan jaring apung dengan produktivitas tinggi serta alternatif lahan pertanian musiman yang subur.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut di atas sebagai berikut.

1. Pratomo (2004), dengan judul “Fitoremediasi Zn (seng) Menggunakan Tanaman Normal dan Transgenik *Solanum nigrum* L”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kinetika pertumbuhan tanaman *S. nigrum* L. baik tanaman normal maupun tanaman transgenik tidak terpengaruh oleh pemaparan Zn lebih dari 200 mg/kg media, sesuai model

persamaan Monod tanpa mengalami fase penyesuaian (*lag phase*) dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,9 minggu.

Dengan bertambahnya umur, kemampuan tanaman *S. nigrum* L. dalam menyerap Zn akan naik dan akan optimal pada umur antara 12 sampai dengan 14 minggu, kemudian menurun sampai berakhirnya daur hidupnya. Sehingga pada aplikasinya akan optimal bila dipanen pada umur tersebut.

Kemampuan tanaman transgenik *S. nigrum* L. dalam menyerap dan mengakumulasi logam berat Zn pada konsentrasi yang tidak berbeda dibandingkan dengan yang dapat diserap oleh tanaman normalnya.

Ada beda translokasi logam berat Zn, untuk tanaman *S. nigrum* L. transgenik cenderung ke akar sekitar 40%, sedangkan tanaman normalnya cenderung ke daun atau batang sekitar 42%

2. Setyawan, dengan judul “Pengaruh Padat Populasi Gulma Mata Ikan (*Lemna minor* L.) Terhadap Penyerapan Logam Timbal (Pb) Seng (Zn) dari Limbah Tekstil”

Aktivitas daya serap Pb oleh tumbuhan gulma mata ikan (*Lemna minor* L.) dari air limbah tekstil sebesar 0,50 mg/l (59,52%) pada padatan populasi 50% terjadi pada hari ke-4, sedangkan Zn sebesar 0,25 ml/l (67,5%) terjadi pada padatan populasi 12,5% pada hari ke-4.

Pada padatan populasi gulma mata ikan (*Lemna minor* L.) 50% penyerapan Pb optimal sedangkan untuk Zn pada 12,5%.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini mengkaji lebih lanjut potensi fitoremediasi eceng gondok dalam mereduksi logam seng (Zn) di tempat yang berbeda yaitu di perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hari keberapa tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) mampu mereduksi logam berat seng (Zn) dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) yang selama ini dianggap mencemari lingkungan untuk mengolah limbah sehingga mengurangi pencemaran.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan di bidang biologi lingkungan khususnya terkait dengan pencemaran pada danau oleh logam berat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Ayat dan Hadits yang Relevan

1. Ayat tentang tumbuhan

Allah berfirman dalam QS An Nahl/16:10-11.

أَمْ مَاءِ مَاءٍ لَكُمْ مِنْهُ شَرَّ آبٍ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ يَقْتَتِلُكُمْ بِهِ الذَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ
وَالنَّخِيلُ وَاللَّهُ الْأَرْعَابُونَ فِي مَنَازِلِكُمْ لَا يَأْكُلُونَ إِلَّا يَتَنَفَّكُونَ

Terjemahnya:

“Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menjadi (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (Kementerian Agama RI, 2002).

Maksud dari ayat tersebut bahwa betapa pentingnya nilai tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan, sehingga banyak ahli yang menandakan bahwa “tanpa tumbuh-tumbuhan tidak mungkin manusia dan hewan berada di muka bumi ini”. Oleh karena itu demikian penting dan bermanfaatnya mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan dalam jangkauan untuk tetap melestarikan yang telah ada dan daripadanya mengembangkan sedemikian rupa, sehingga kehidupan manusia dan hewan dapat selalu terjamin (Sutrian, 1992).

Ayat tersebut mengingatkan manusia dengan tujuan agar manusia mensyukuri nikmat Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya - bahwa Dia Yang Maha Kuasa itulah yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan air hujan untuk memanfaatkan. Sebagiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang padanya, yakni di tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternak kamu sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging dan bulu. Kemudian di ayat selanjutnya menjelaskan beberapa yang paling bermanfaat atau populer dalam masyarakat Arab tempat di mana turunnya al-Qur'an, dengan menyatakan bahwa Dia, yakni Allah swt. menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air hujan itu tanaman-tanaman; dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan, selain yang disebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang mengatur seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa (Shihab, 2002).

2. Hadis tentang lingkungan

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah saw mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya.

أَحْبَبُ رِزَالٍ جَدُّهُ نَسَمَةٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَائِشَةَ سَأَلَتْ بِعَنْ أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 م، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ
 سَدَرَ رَوْحًا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ» وَمَا وَجَّهِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَتَقَهَّلْنَا «الْحَدِيثُ
 فِي الْفَلَاحِ» رِيسَ يَعْطِلُ بِهِمَ ابْنُ السَّبِيلِ، وَابْنُ مَيْمُونٍ عِبْرَتًا، وَعَظِيمٌ لِحَبِيقٍ يَكُونُ لَهُ
 يَهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abu Sulaiman dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Abdullah bin Hubsyi ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka." Abu Dawud pernah ditanya tentang hadis tersebut, lalu ia menjawab, "Secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim; padahal itu adalah tempat berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka" (H.R. Sunan Abi Daud, h 361).

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ
 غَرَسَ سَلْيًا إِلَّا وَكَيْفَ كَانَ مِنْ نَابِ» مِنْهُ يَلَهُ صَدَقَةٌ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَنْ
 مَا أَكَلَتْ كَالطَّيْرِ فِي مَوْجِ لَيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرِزُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Atha` dari Jabir dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah

baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkah ia menjadi sedekah baginya" (H.R Shahih Muslim, h 1188).

Namun, ketika al-Qur'an dan Hadis mengajarkan tentang pelestarian, konservasi, dan pemeliharaan lingkungan hidup, di sisi lain pencemaran, perusakan bahkan berbagai penjarahan terhadap lingkungan itu sendiri semakin merajalela. Jumlah pencemaran yang sangat banyak yang diakibatkan oleh manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi seperti semula. Alam menjadi kehilangan kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi. Seperti pencemaran logam berat, sampah dan zat seperti plastik, DDT, detergen dan sebagainya yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi pengrusakan alam yang kian hari kian bertambah parah. Berbagai pencemaran seakan telah menjadi fenomena harian yang tidak tertinggal. Padahal, Allah swt telah banyak memperingatkan makhluk-Nya lewat kisah-kisah, ungkapan, peringatan, bahkan teguran dalam al-Qur'an untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi (*walaa tufsiduu fii al ardh*). Kisah banjir terhadap kaumnya Nabi Nuh merupakan salah satu dari sekian banyak peringatan bagi kaum-kaum lainnya.

B. Fitoremediasi

Fitoremediasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu nabati/tanaman, dan bahasa Latin yaitu *remedium* (memulihkan keseimbangan atau perbaikan); menggambarkan pengobatan masalah lingkungan (bioremediasi) melalui penggunaan tanaman yang mengurangi masalah lingkungan tanpa perlu menggali bahan kontaminan dan membuangnya di tempat lain. Fitoremediasi adalah penggunaan

tumbuhan untuk menghilangkan polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi (Rondonuwu, 2014).

Metode ini banyak dikembangkan dan dipilih untuk meremediasi dan memungut ulang polutan dari sistem tercemar karena mempunyai kelebihan diantaranya, ramah lingkungan, biaya operasional yang rendah dan dapat memelihara kualitas lingkungan menjadi lebih baik, sampai kini telah ada lebih dari 400 jenis tanaman yang dipelajari kemampuan mengakumulasi polutan logam dan senyawa organik (Volesky, 1998).

Fitoremediasi merupakan suatu teknik yang menjanjikan dapat mengatasi pencemaran dengan murah, efektif, dan dapat digunakan secara langsung di tempat yang tercemar, serta dapat digunakan secara langsung di tempat yang terkena pencemaran dengan menggunakan pepohonan, tanaman pangan dan tanaman berbunga (Fahrudin, 2010).

Keuntungan utama dari aplikasi teknik fitoremediasi dibandingkan dengan system remediasi lainnya adalah kemampuannya untuk menghasilkan buangan sekunder yang lebih rendah sifat toksiknya, lebih bersahabat dengan lingkungan serta lebih ekonomis. Kelemahan fitoremediasi adalah dari segi waktu yang dibutuhkan lebih lama dan juga terdapat kemungkinan masuknya kontaminan ke dalam rantai makanan melalui konsumsi hewan dari tanaman tersebut (Pratomo, 2004).

Metode remediasi yang dikenal sebagai fitoremediasi ini mengandalkan pada peranan tumbuhan untuk menyerap, mendegradasi, mentransformasi dan mengimobilisasi bahan pencemar, baik itu logam berat maupun senyawa organik.

Mekanisme kerja fitoremediasi terdiri dari beberapa konsep dasar yaitu: fitoekstraksi, fitovolatilisasi, fitodegradasi, fitostabilisasi, rhizofiltrasi dan interaksi dengan mikroorganisme pendegradasi polutan (Nurmitha dkk., 2013).

Menurut Youngman (1999) untuk menentukan tanaman yang dapat digunakan pada penelitian fitoremediasi dipilih tanaman yang mempunyai sifat:

1. Cepat tumbuh
2. Mampu mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak pada waktu yang singkat
3. Mampu meremediasi lebih dari satu polutan
4. Toleransi yang tinggi terhadap polutan.

Fitoremediasi, penggunaan tanaman untuk membenahi lingkungan tercemar, mulai dikenal sebagai suatu teknologi untuk pelestarian lingkungan. Tanaman memiliki sifat alamiah untuk menyerap logam. Beberapa jenis logam, seperti Cu, Co, Fe, Mo, Mn, Ni dan Zn, merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Akan tetapi beberapa logam lainnya seperti Cr, Cd dan Pb, tidak/belum diketahui manfaat fisiologisnya bagi tanaman. Oleh karena itu fitoremediasi awalnya ditunjukkan untuk menangani lingkungan tercemar logam (Cunningham, et al., 1995).

Sudah banyak hasil penelitian yang membuktikan keberhasilan penggunaan tumbuhan untuk remediasi dan tidak sedikit tumbuhan yang dibuktikan sebagai hiperakumulator adalah spesies yang berasal dari daerah tropis. Spesies tersebut diantaranya *Thlaspi calaminare* untuk seng (Zn), *Thlaspi caerulescens* untuk cadmium (Cd), *Aeolanthus biformifolius* untuk tembaga (Cu), *Phylanthus serpentines*

untuk nikel (Ni), *Haumaniastrum robertii* untuk kobalt (Co) *Astragalus racemosus* untuk sesium (Se), dan *Alyxia rubricaulis* untuk mangan (Mn) (Wise, et al., 2000). Selain itu *Brachiaria mutica* untuk air raksa (Hg) (Rondonuwu, 2014).

Soerjani, dkk., (1980) menyatakan bahwa tumbuhan air melalui proses fotosintesis dapat membantu peredaran udara di dalam air dengan menyerap kelebihan zat hara yang menyebabkan pencemaran air.

Proses fitoremediasi bermula dari akar tumbuhan yang menyerap bahan polutan yang terkandung dalam air. Kemudian melalui proses transportasi tumbuhan, air yang mengandung bahan polutan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan, sehingga air yang menjadi bersih dari polutan. Tumbuhan ini dapat berperan langsung atau tidak langsung dalam proses remediasi lingkungan yang tercemar (Surtikanti, 2011:145).

Surtikanti (2011), mendeskripsikan jenis-jenis tumbuhan yang digunakan dalam berbagai aplikasi fitoremediasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jenis-jenis Tanaman Untuk Aplikasi Fitoremediasi

No	Aplikasi	Media	Kontaminan	Jenis Tanaman
1	Fitoremediasi	Tanah, air tanah, <i>landfill leachate</i> , air limbah	a. Herbisida b. Aromatic (BTEX) c. Chlormate aphatics (TCE) d. Nutrient (NO_3^- , NH_4^+ , PO_4^{3-}) e. Limbah amunisi (TNT, RDX)	<i>Alfalfa</i> , <i>Poplar</i> , <i>Willow</i> , <i>Aspen</i> , gandum
2	Bioremediasi rhizosfer	Tanah, sedimen, air limbah	a. Kontaminan organik pestisida b. PAH	Murberry, apel, tumbuhan air
3	Fitostabilisasi	Tanah sedimen	a. Logam (Pb, Cd, Zn, As, Cu, Cr, Se, U) b. Hydrophobic organic (PAHs, dioxin, furans, pentachlorofenol, DDT, dieldrin)	Tanaman yang memiliki sistem akar yang padat Rumput yang memiliki serat akar yang banyak. Tanaman yang dapat melakukan transpirasi air yang lebih banyak. Bunga matahari, dandelion.
5	Rhizofiltrasi	Air tanah, dan air limbah di danau atau air sumur buatan	a. Logam metal (Pb, Cd, Zn, Ni dan Cu) b. Radioaktif (Cs, Sr dan U) c. Senyawa organik hidrofobik	Tanaman air

Fitoremediasi dapat dibagi menjadi fitoekstraksi, rizofiltrasi, fitodegradasi, fitostabilisasi, fitovolatilisasi. Rizofiltrasi yaitu fitoremediasi terjadi karena proses adsorpsi, pemekatan dan pengakumulasian polutan di daerah akar tanaman.

1. Fitoekstraksi yaitu proses ekstraksi dan akumulasi polutan dari lapisan tipis tanaman yang dapat dipanen untuk mendapatkan kembali (pungut ulang) polutan yang bernilai ekonomis.
2. Fitotransformasi atau Fitodegradasi yaitu proses remediasi polutan yang disebabkan terjadinya perubahan molekul organik yang kompleks menjadi molekul sederhana. Proses ini melibatkan metabolisme kontaminan di dalam jaringan tumbuhan, misalnya oleh enzim dehalogenase dan oksigenase
3. Fitostimulasi atau simbiosis tanaman dengan mikrobial (*plant-assisted bioremediation*) yaitu proses remediasi polutan yang disebabkan oleh adanya aktifitas mikroba pada daerah akar yang bekerja secara bersama sinergis.
4. Fitostabilisasi yaitu proses remediasi dikarenakan adanya penurunan mobilitas polutan melalui pembentukan senyawa yang lebih kompleks namun mudah untuk diadsorpsi oleh tumbuhan di daerah rizosfer.
5. Fitovolatilisasi terjadi ketika tumbuhan menyerap kontaminan dan melepaskannya ke udara lewat daun; dapat pula senyawa kontaminan mengalami degradasi sebelum dilepas lewat daun.

C. Eceng Gondok

Enceng gondok (*Eichornia crassipes*) adalah gulma air yang sangat cepat pertumbuhannya dan sangat susah pengendaliannya. Tetapi enceng gondok mampu


menyerap berbagai zat yang berbahaya yang mencemari perairan seperti logam beracun, cemaran organik, buangan industri, buangan pertanian dan buangan rumah tangga (Joedodibroto 1983 dalam Rahmawati, dkk., 2003).

Enceng gondok di Indonesia pada mulanya diperkenalkan oleh Kebun Raya Bogor pada tahun 1894 yang akhirnya berkembang di Sungai Ciliwung sebagai tanaman pengganggu. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air yang pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang ilmuwan bernama Karl Von Mortius pada tahun 1824 ketika sedang melakukan ekspedisi di Sungai Amazon Brazilia (Setyanto, 2011).

Enceng gondok (*Eichornia crassipes*) merupakan herba yang mengapung, menghasilkan tunas merayap yang keluar dari ketiak daun yang dapat tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru dengan tinggi 0,4-0,8 tumbuhan ini memiliki bentuk fisik berupa daun-daun yang tersusun dalam bentuk radikal (roset). Setiap tangkai pada helaian daun yang dewasa memiliki ukuran pendek dan berkerut. Helaian daun (*lamina*) berbentuk bulat telur lebar dengan tulang daun yang melengkung rapat panjang 7-25 cm, gundul dan warna daun hijau licin mengkilat (Hernowo, 1999 dalam Al-Ayubi, 2007).

Eceng gondok (*Eichornia crassipes*) merupakan tumbuhan yang hidup dalam perairan terbuka. Mengapung bila air dalam dan berakar di dasar bila air dangkal. Perkembangbiakan eceng gondok terjadi secara vegetatif maupun secara generatif. Perkembangan secara vegetatif terjadi bila tunas baru tumbuh dari ketiak daun, lalu membesar dan akhirnya menjadi tumbuhan baru. Setiap 10 tanaman eceng gondok

mampu berkembangbiak menjadi 600.000 tanaman baru dalam waktu 8 bulan. Hal ini membuat eceng gondok dimanfaatkan untuk pengolahan air limbah. Eceng gondok dapat mencapai ketinggian antara 40-80 cm dengan daun yang licin dan panjangnya 7-25 cm. Tumbuhan eceng gondok terdiri atas helai daun, pengapung, leher daun, ligula, akar, akar rambut, ujung akar, dan stolon yang dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan vegetatif (Muhtar, 2008)



Gambar 2.1. Morfologi eceng gondok (*Eichornia crassipes*) (Hanni Daylistio Rahmaningsih, 2006)

Keterangan:

B = Helai daun (*leaf blade*)

F = Pengapung (*float*)

I = Leher daun (*Isthmus*)

L = Ligula

R = Akar (*Root*)

S = Stolon

Rh = Akar rambut (*root hair*)

Rc = Ujung akar

Eceng gondok (*Eichornia crassipes*) merupakan tanaman yang berakar serabut dan tidak bercabang, mempunyai tudung akar yang mencolok. Akarnya memproduksi sejumlah besar akar lateral yaitu 70 buah/cm. Akar panjangnya bervariasi mulai dari

10-300 cm. Sistem perakaran eceng gondok pada umumnya lebih dari 50% dari seluruh biomassa tumbuhan, tetapi perakarannya kecil apabila tumbuh dalam lumpur (Muhtar, 2008).

Akar eceng gondok ditumbuhi dengan bulu-bulu akar yang berserabut. Berfungsi sebagai pegangan atau jangkar tanaman. Sebagian besar peranan akar untuk menyerap zat-zat yang diperlukan tanaman dari dalam air. Susunan akarnya dapat mengumpulkan lumpur atau partikel-partikel yang terlarut dalam air (Ardiwinata 1950 dalam Muhtar, 2008).

Tangkai eceng gondok berbentuk bulat menggelembung yang di dalamnya penuh dengan udara yang berperan untuk mengapungkan tanaman di permukaan air. Rongga udara dibatasi oleh dinding penyekat berupa selaput tipis berwarna putih (Pandey 1950 dalam Muhtar, 2008).

Eceng gondok dapat mencapai ketinggian antara 40-80 cm dengan daun yang licin dan panjangnya 7-25 cm. Tumbuhan eceng gondok terdiri atas helai daun, pengapung, leher daun, ligula, akar, akar rambut, ujung akar, dan stolon yang dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan vegetatif (Nursyakhia, 2014).

Daun eceng gondok tergolong dalam makrofit yang terletak di atas permukaan air. Di dalamnya terdapat lapisan rongga udara dan berfungsi sebagai alat pengapung tanaman. Zat hijau daun (klorofil) eceng gondok terdapat dalam sel epidemis. Di permukaan atas daun dipenuhi oleh mulut daun (stomata) Rongga udara yang terdapat dalam akar, batang, dan daun selain sebagai alat penampungan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan O_2 dari proses fotosintesis. Oksigen hasil dari

fotosintesis ini digunakan untuk respirasi tumbuhan di malam hari dengan menghasilkan CO₂ yang akan terlepas kedalam air (Pandey 1980 dalam Muhtar, 2008).

Daun enceng gondok memiliki asam amino sebagai senyawa aktif dalam proses adsorpsi, hal ini didukung dengan hasil analisa kimia dari Enceng gondok dalam keadaan segar diperoleh bahwa kadar N total 0,28 %, bahan organik 36,59 %, C organik 21,23 %, P total 0,0011 % dan K total 0,016 % (Hernowo, 1999 dalam Al-Ayubi, 2007).

Daun eceng gondok berbentuk bulat telur, berwarna hijau segar, dan mengkilap. Di perairan yang mengandung nitrogen tinggi, eceng gondok memiliki daun yang relatif lebar dan berwarna hijau tua. Sebaliknya di perairan yang mengandung nitrogen rendah, eceng gondok memiliki daun yang relatif kecil dan berwarna kekuning-kuningan, karena pertumbuhan eceng gondok tergantung dari nutrisi yang tersedia dan cahaya matahari untuk fotosintesis (Repley, 2006).

Lebih lanjut, Masan 1981 dalam Al-Ayubi (2007) menerangkan, bahwa kerangka bunga berbentuk bulir, bertangkai panjang, berbunga 10-35, tangkai dengan dua daun pelindung yang sangat dekat, yang terbawa dengan helaian 4 kecil dan pelepah yang berbentuk tabung dan bagian atas juga berbentuk tabung. Poros bulir sangat bersegi, tabung tenda bunga 1,5-2 cm panjangnya dengan pangkal hijau dan ujung pucat. Benang sari 6, bengkok, 3 dari benang sari tersebut lebih besar dari yang lain. Bakal buah beruang 3 dan berisi banyak. Tangkai daun pada enceng gondok bersifat mendangkalkan dan membangun spon yang membuat tumbuhan ini

mengambang. Enceng gondok berkembang biak dengan stolon (vegetatif) dan juga secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif mempunyai peranan penting dalam pembentukan koloni.

Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Pertumbuhan eceng gondok tersebut akan semakin baik apabila hidup pada air yang dipenuhi limbah pertanian atau pabrik. Oleh karena itu banyaknya eceng gondok di suatu wilayah sering merupakan indikator dari tercemar tidaknya wilayah tersebut (Nursyokia, 2014).

Faktor lingkungan yang menjadi syarat untuk pertumbuhan eceng gondok:

1. Cahaya matahari, suhu. Pertumbuhan eceng gondok sangat memerlukan cahaya matahari yang cukup, dengan suhu optimum antara 25°C-30°C, Hal ini dapat dipenuhi dengan baik di daerah beriklim tropis.
2. Derajat keasaman (pH) air. Eceng gondok dapat hidup di tempat yang mempunyai derajat keasaman (pH) air 3,5-10. Agar pertumbuhan eceng gondok menjadi baik, pH air optimum antara 4,5-7 (Muhtar, 2008).

Ketenangan air merupakan faktor yang sangat penting untuk memungkinkan pertumbuhan massal dari eceng gondok. Keadaan air yang bergolak karena mengalir atau bergelombang karena angin dapat menghambat pertumbuhan eceng gondok. Eceng gondok sangat memerlukan cahaya matahari yang cukup dan suhu optimum 25-30° C. Hal ini dapat dipenuhi dengan baik oleh iklim tropis, kecuali di rawa-rawa

yang terlindung oleh hutan. Perkecambahan biji eceng gondok sangat dipengaruhi oleh cahaya. Dalam keadaan gelap, biji eceng gondok tidak dapat berkecambah (Ratnani, 2010).

Beberapa kerugian akibat pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali antara lain:

1. Meningkatnya evapotranspirasi (penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman), karena daun-daunnya yang lebar dan serta pertumbuhannya yang cepat.
2. Menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air (DO: *Dissolved Oxygens*).
3. Tumbuhan eceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan.
4. Mengganggu lalu lintas (transportasi) air, khususnya bagi masyarakat yang kehidupannya masih tergantung dari sungai seperti di pedalaman Kalimantan dan beberapa daerah lainnya.
5. Meningkatnya habitat bagi vektor penyakit pada manusia.
6. Mengurangi keanekaragaman spesies yang tumbuh di perairan.

Selain memberikan dampak negatif eceng gondok juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos. Kandungan NPK yang dimiliki eceng gondok (dalam % berat kering) masing masing adalah 0,98 dan 1,52 N; 1,13 dan 1,945 P; 0,89 dan 1,39 K; 28,73 dan 15,36 C organik; serta rasio C/N 29,32 dan 10,11 (Agnesia, 2009).

Komposisi kimia eceng gondok tergantung pada kandungan unsur hara tempatnya tumbuh, dan sifat daya serap tanaman tersebut. Eceng gondok mempunyai sifat-sifat yang baik antara lain dapat menyerap logam-logam berat, senyawa sulfida, selain itu mengandung protein lebih dari 11,5% dan mengandung selulosa yang lebih besar dari non selulosanya seperti lignin, abu, lemak, dan zat-zat lain. Julhim (2012) menjelaskan, bahwa eceng gondok dapat digunakan untuk menghilangkan polutan, karena fungsinya sebagai sistem filtrasi biologis, menghilangkan nutrien mineral, untuk menghilangkan logam berat seperti cuprum, aurum, cobalt, strontium, timbal, timah, kadmium dan nikel.

Klasifikasi eceng gondok :

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Classis : Monocotyledoneae
 Ordo : Commelinales
 Familia : Pontederiaceae
 Genus : *Eichornia*
 Species : *Eichornia crassipes* (Mart) Solms (Suhono, 2010).

D. Logam Berat seng (Zn)

Hampir di setiap aktivitas yang kita lakukan, kita menghasilkan limbah, mulai dari proses metabolisme di dalam tubuh hingga proses-proses industri yang berbasis teknologi tinggi. Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengertian limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah

sisanya dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia baik berbentuk padat, cair ataupun gas yang dipandang sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang (Widyaningsih, 2011).

Menurut Widyaningsih (2011) terdapat tiga jenis limbah, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Berikut merupakan beberapa karakteristik limbah, yaitu:

- a. Berukuran mikro
- b. Dinamis
- c. Berdampak luas (penyebarannya)
- d. Berdampak jangka panjang (antar generasi)

Sumber polutan pada suatu perairan biasanya berasal dari pemukiman, pasar, peternakan, kendaraan bermotor, bengkel, industri kecil, pengetam kayu, dan limbah lainnya yang dialirkan ke perairan. Di antara jenis polutan yang masuk ke perairan adalah logam berat, yang pada konsentrasi tertentu akan bersifat toksik. Keberadaan senyawa organik dan anorganik yang tinggi di perairan dapat memicu peledakan pertumbuhan populasi organisme air, seperti eceng gondok (*Eichornia crassipes*) (Mart.) Solms (Bugis, dkk., 2010).

Menurut Qasim (1985), air limbah adalah cairan atau limbah yang dibawa melalui air yang berasal dari rumah tangga, komersial, atau proses industri, bersama dengan air permukaan, air hujan atau infiltrasi air tanah. Menurut Tjokrokusumo (1998), air limbah dapat juga diartikan sebagai suatu kejadian masuknya atau dimasukkannya benda padat, cair dan gas ke dalam air dengan sifat yang dapat

berupa endapan atau padat, padat tersuspensi, terlarut/koloid, emulsi yang menyebabkan air sehingga harus dipisahkan atau dibuang.

Sugiharto (1987) dalam Widyaningsih (2011) membagi klasifikasi sumber air limbah menjadi dua bagian, yaitu air limbah rumah tangga (*domestic wastewater*) dan air limbah industri. Limbah domestik mengandung bahan-bahan pencemar organik, non-organik dan bakteri yang sangat potensial untuk mencemari sumber-sumber air. Sumber utama air limbah domestik (rumah tangga) dari masyarakat adalah berasal dari daerah perumahan, perdagangan, kelembagaan dan rekreasi. Limbah non domestik adalah limbah yang berasal dari industri, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, dan sumber-sumber lain. Limbah ini sangat bervariasi terlebih lagi untuk limbah industri. Limbah pertanian biasanya terdiri atas bahan padat bekas tanaman yang bersifat organik, pestisida, bahan pupuk yang mengandung nitrogen dan sebagainya.

Widyaningsih (2011) limbah cair domestik terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Limbah cair domestik yang berasal dari air cucian, seperti sabun, deterjen, minyak dan pestisida.
2. Limbah cair yang berasal dari kakus, seperti sabun, shampoo, tinja dan air seni.

Limbah cair domestik menghasilkan senyawa organik berupa protein, karbohidrat, lemak dan asam nukleat. Bahan-bahan organik dalam limbah cair dapat terurai menjadi nitrat, fosfat dan karbonat, sedangkan deterjen dapat terurai menjadi fosfat. Limbah cair domestik dapat mencemari badan air dan mengakibatkan penurunan kualitas air bila dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan terlebih

dahulu. Hal ini terjadi terutama pada musim kemarau saat debit air turun. Penyebab penurunan kualitas air pada badan air dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertama, badan air memerlukan oksigen ekstra untuk menguraikan ikatan dalam senyawa organik (dekomposisi), akibatnya membuat badan air miskin oksigen, sehingga membuat jatah oksigen bagi biota air lainnya berkurang jumlahnya. Pengurangan kadar oksigen dalam air ini sering mengakibatkan peristiwa kematian massal pada ikan.
- b. Kedua, limbah organik mengandung padatan terlarut yang tinggi sehingga menimbulkan kekeruhan dan mengurangi penetrasi cahaya matahari bagi biota fotosintetik.
- c. Ketiga, puluhan ton padatan terlarut yang dibuang akan mengendap dan merubah karakteristik dasar badan air, akibatnya beberapa biota yang menetap di dasar badan air akan tereleminasi atau bahkan punah (Widyaningsih 2011).

Widyaningsih (2011) indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati yang dapat digolongkan menjadi:

- a. Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, dan adanya perubahan warna, bau dan rasa.
- b. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut dan perubahan pH.

- c. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen.

Komposisi limbah cair sebagian besar merupakan air, sisanya adalah partikel-partikel dari padatan terlarut (*dissolved solids*) dan partikel padat tidak terlarut (*suspended solids*). Limbah cair perkotaan mengandung lebih dari 99,9 % cairan dan 0,1 % padatan. Padatan dalam limbah cair ini terdiri dari padatan organik dan non organik. Zat organik terdiri dari protein (65%), karbohidrat (25%) dan lemak (10%). Sedangkan, padatan non-organik terdiri dari grit, garam-garam dan logam berat, zat ini merupakan bahan pencemar utama bagi lingkungan. Zat-zat tersebutlah yang memberi ciri kualitas air buangan dalam sifat fisik, kimiawi maupun biologis (Sugiharto, 1987).

Dewasa ini, banyak muncul industri rumah tangga seperti *laundry* yang banyak dijumpai di wilayah perkotaan. Akan tetapi pertumbuhan industri *laundry* ini memiliki efek samping yang kurang baik, sebab industri-industri kecil tersebut sebagian besar langsung membuang limbahnya ke selokan atau badan air tanpa pengolahan terlebih dulu. Dengan banyaknya usaha *laundry* di berbagai wilayah, maka deterjen yang digunakan atau dibuang juga semakin banyak (Hardiyanti dan Rahayu, 2007).

Pencemaran perairan tawar di Indonesia, 80 % disebabkan oleh limbah domestik baik dalam bentuk cair maupun padatan. Dari limbah domestik yang bersifat cair, 35 % berasal dari buangan limbah rumah tangga yang mengandung bahan detergen (Sitorus, 1997).

Detergen merupakan senyawa sabun yang terbentuk melalui proses kimia. Pada umumnya komponen utama penyusun detergen adalah Natrium Dodecyl Benzen Sulfonat (NaDBS) dan Sodium Tripolyphosphat (STPP) yang bersifat sangat sulit terdegradasi secara alamiah. Senyawa NaDBS dan STPP dapat membentuk endapan dengan logam-logam alkali tanah dan logam-logam transisi (Sumarno, dkk., 1996).

Detergen di dalam air mengganggu karena larutan sabun akan menaikkan pH air (Wardhana, 1995; Fardiaz, 1992). Detergen yang mengandung fosfat jika dilarutkan dalam air memiliki pH antara 9-10,5 (Fardiaz, 1992).

Limbah rumah tangga yang berasal dari penggunaan detergen menjadi salah satu penyebab pencemaran air karena dalam limbah tersebut mengandung fosfat yang tinggi (Yuliana, dkk., 2013).

Menurut Hera (2003) dalam Hardyanti dan Rahayu (2007) fosfat ini berasal dari Sodium Tripolyphosphate (STPP) yang merupakan salah satu bahan yang kadarnya besar dalam detergen. Detergen sebagai sumber polutan tersebut termasuk dalam kategori sumber tidak tentu (*non point source*), yaitu sumber pencemaran yang tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya misalnya buangan yang berasal dari rumah tangga, pertanian, sedimentasi dan bahan pencemar lain yang sulit dilacak sumbernya (Arms, 1990 dalam Susana dan Suyarso, 2008).

Menurut Connel dan Miller (1995) kegiatan manusia merupakan suatu sumber utama pemasukan logam ke dalam lingkungan perairan. Masuknya logam berasal dari buangan langsung berbagai jenis limbah yang beracun. Wittmann (1979) mengemukakan tentang masuknya logam ke lingkungan perairan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pertambangan

Pembongkaran permukaan batuan baru dan sejumlah besar sisa-sisa batu atau tanah untuk mempercepat kondisi pelapukan. Kegiatan proses pengambilan biji, peleburan dan penyulingan minyak dapat menyebabkan hamburan dan penimbunan sejumlah besar logam berat seperti Pb.

2. Limbah Rumah Tangga

Logam berat yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga berasal dari sampah-sampah metabolik, korosi pipa-pipa air (Cu, Pb, Zn dan Cd) dan produk-produk konsumen (misalnya, formula detergen yang mengandung Fe, Mn, Cr, Ni, Co, Zn, Cr, B dan As).

3. Limbah dan Buangan Industri

Beberapa logam runtuhan dibuang ke dalam lingkungan perairan melalui cairan limbah industri demikian juga dengan penimbunan dan pencucian lumpur industri. Kepekatan logam dalam air limbah industri seringkali dalam ranah milligram per liter.

4. Aliran Pertanian

Polutan dari pertanian/perkebunan dapat berupa:

a. Zat kimia

Misalnya : berasal dari penggunaan pupuk, pestisida

b. Mikrobiologi

Misalnya : virus, bakteri, parasit yang berasal dari kotoran ternak dan cacing tambang di lokasi perkebunan.

c. Zat Radioaktif

Berasal dari penggunaan zat radioaktif yang dipakai dalam proses pematangan buah, mendapatkan bibit unggul, dan mempercepat pertumbuhan tanaman.

Logam berat yang ada di perairan dapat masuk dalam sedimen dengan cara absorpsi. Adanya logam berat yang terendap dalam sedimen akan memberikan dampak negatif bagi organisme yang hidup di dasar sungai seperti kerang dan udang dan apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan (Palar, 2008).

Logam berat dapat masuk ke dalam lingkungan karena pelapukan batuan yang mengandung logam berat secara residual di dalam tanah, penggunaan bahan alami untuk pupuk dan pembuangan limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan kebanyakan berasal dari kegiatan manusia. Logam berat di lingkungan tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup tetapi logam berat membahayakan apabila masuk ke dalam sistem metabolisme makhluk hidup dalam jumlah melebihi ambang batas. Masuknya logam berat ke dalam sistem metabolisme manusia dan hewan dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Masuknya secara langsung pada manusia yaitu bersama air minum, udara yang dihirup atau lewat singgungan kulit, sedangkan secara tidak langsung terjadi bersama dengan bahan yang dimakan. Sumber logam berat berasal dari tanah, air dan udara. Dengan perantara tumbuhan yang menyerap logam berat dari sumber tersebut dan masuk ke dalam jaringan yang nanti dimakan manusia dan hewan (Young et al., 1992).

Menurut Darmono 1995 dalam Panjaitan (2009) faktor yang menyebabkan logam berat termasuk dalam kelompok zat pencemar adalah karena adanya sifat-sifat logam berat yang tidak dapat terurai (*non degradable*) dan mudah diabsorpsi.

Karakteristik logam berat yaitu berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat terbagi dalam dua jenis, yaitu logam berat esensial dan non esensial. Logam berat esensial adalah logam yang sangat membantu dalam proses fisiologi makhluk hidup dengan jalan membantu kerja enzim atau pembentukan organ dari makhluk hidup yang bersangkutan, seperti seng (Zn), tembaga (Cu), besi (Fe), kobalt (Co) dan lain-lain. Logam berat non esensial adalah logam yang perannya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui, kandungannya dalam jaringan hewan sangat kecil dan apabila kandungannya tinggi akan dapat merusak organ-organ tubuh makhluk hidup yang bersangkutan, seperti timbal (Pb), merkuri (Hg), kadmium (Cd), kromium (Cr) dan lain-lain (Darmono, 2001).

Ditinjau dari segi potensi pencemaran lingkungan, logam berat dapat dibedakan atas tiga golongan: (1) logam berat yang bersifat racun kritis, yaitu Na, K, Mg, Ca, Fe, S, C, P, Cl, Br, Li, Rb, Sr, Al dan Si. (2) logam berat beracun tetapi jarang ditemukan seperti, Ti, Zr, W, N, Ta, Ga, La, Os, Rh, Ir, Ru, dan Ba. (3) logam berat sangat beracun dan relatif sering ditemukan seperti, Be, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sc, Pd, Ag, Cd, Pt, Au, Hg, Pb, Sb dan Bi (Surtiningsih, 1999).

Logam berat merupakan bagian dari senyawa anorganik yang pada umumnya bersifat beracun (toksik). Logam berat dapat mengalami biokonsentrasi dan bioakumulasi dalam tubuh makhluk hidup yang berakibat kadar dalam tubuh

mahluk hidup lebih besar daripada kadarnya dalam lingkungan perairan. Selain itu logam berat juga mengalami biomagnifikasi, yaitu kadarnya semakin meningkat seiring dengan peningkatan posisi organism pada rantai makanan (Pratomo, 2004).

Sudarso (1997) mengemukakan bahwa logam berat merupakan toksikan yang umum berada di perairan Indonesia (sungai), yang meliputi timbal, nikel, kadmium, seng, tembaga dan merkuri. Dari beberapa jenis logam berat yang mencemari sungai-sungai Indonesia, menurut laporan penelitian Machbub dan Mulyadi (2000) logam seng (Zn) merupakan jenis logam berat yang kandungannya paling tinggi dibanding beberapa logam berat lainnya.

Menurut Mejare dan Bolow (2001), pada konsentrasi rendah logam berat termasuk Zn merupakan ion yang esensial bagi pertumbuhan sebagai unsur renik, tetapi pada konsentrasi lebih tinggi logam berat bersifat toksik. Sedangkan Yoga dan Sudarso (1998) mengemukakan bahwa logam berat Zn merupakan logam berat esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Seng berperan dalam penggabungan dua jenis protein yang *metalloenzim* (berperan dalam enzim *carbonic anhydrase* sebagai regulasi penggantian karbon dioksida dalam tubuh), di samping itu seng juga berkemampuan dalam membentuk ion kompleks protein logam yang berperan dalam mekanisme karier dan transport ion dalam sel.

Toksisitas logam berat Zn menurun dengan meningkatnya kesadahan, sebaliknya akan meningkat dengan meningkatnya suhu dan penurunan oksigen terlarut. Toksisitas terhadap organism akuatik (algae, avertebrata dan ikan) sangat variatif mulai dari $< 1 \text{ mg/l}$ hingga $> 100 \text{ mg/l}$. Menurut Moore dalam Effendi (2000),

toksisitas logam Zn dan Cu bersifat sinergik yaitu toksisitasnya meningkat, lebih toksik daripada penjumlahan keduanya. Menurut Sodiq (2004), logam berat Zn dan logam berat Cd mempunyai struktur yang mirip sehingga mempunyai beberapa kesamaan sifat. Untuk itu perlu dilakukan upaya dalam menangani masalah cemaran logam berat di Indonesia terutama untuk logam berat Zn (seng) tersebut.

Salah satu kasus pencemaran air oleh limbah logam berat adalah pencemaran seng (Zn). Logam seng dan berbagai macam bentuk persenyawaannya dapat masuk dan mencemari lingkungan. Pencemaran seng terutama merupakan efek samping dari aktivitas manusia. Faktanya, semua bidang industri yang melibatkan penggunaan seng dalam proses operasional produksi menjadi sumber paparan seng. Logam seng umumnya masuk ke tubuh organisme melalui makanan dan air yang mengandung seng, kemudian mengalami proses biotransformasi dan bioakumulasi (Palar, 2008).

Metallothionein merupakan golongan protein yang sering dikaitkan dengan logam berat. Sampai saat ini, *metallothionein* merupakan satu-satunya biomarker spesifik terhadap logam (Kagi dan Vallee, 1961). *Metallothionein* dapat ditemukan pada sel hewan, tumbuhan tinggi, mikroorganisme eukariotik dan prokariotik. Meskipun demikian, *metallothionein* lebih sering dijumpai di organ yang banyak terpapar oleh aktivitas senyawa logam seperti hati, ginjal, pembuluh darah, saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Secara langsung, *metallothionein* berperan penting pada mekanisme detoksifikasi, fasilitas distribusi, dan ekskresi berbagai senyawa logam (Soemirat, 2009).

Salah satu logam berat yang dapat berikatan dengan metallohionein adalah seng (Zn). Seng (Zn) merupakan logam berat yang esensial dengan sejumlah fungsi bagi sistem biologis. Ion seng (Zn^{2+}) berperan penting pada aktivitas enzimatis sebagai ko-faktor maupun terdapat pada gugus aktif (aktifator) berbagai enzim (NK Dewi, et al., 2012). Defisiensi seng mengakibatkan substitusi logam lain untuk menggantikan fungsi seng, terutama pada sistem kerja enzim. Masuknya ion-ion logam ditempati seng, dapat menyebabkan gangguan aktivitas hingga kerusakan struktur enzim (Palar, 2008). Demikian pula pada aktivitas kompleks Zn thionein terkait metabolisme seng. Keberadaan logam lain, terutama logam berat, sedikit banyak akan memperlihatkan pengaruh terhadap regulasi Zn thionein (Zhu, et al., 2010).

Adanya logam berat seng (Zn) di dalam air yang melampaui batas dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap manusia yang mengkonsumsinya, walaupun seng merupakan logam yang dibutuhkan oleh tubuh namun berbahaya jika melebihi ambang batas dan dapat menimbulkan rasa kesat pada air dan dapat menimbulkan gejala muntaber (Effendi, 2003).

Logam seng (Zn) cenderung membentuk ion jika berada dalam air. Ion seng (Zn) mudah terserap dalam sedimen dan tanah serta kelarutan logam berat seng (Zn) dalam air relatif rendah pada air, logam berat cenderung mengikuti aliran air dan pengaruh pengenceran ketika ada air masuk, seperti air hujan, turut mengakibatkan menurunnya konsentrasi logam berat tersebut di air. Konsentrasi logam berat pada air akan turut mempengaruhi konsentrasi logam berat yang ada pada sedimen.

Kecendrungan peningkatan konsentrasi logam berat di sedimen diakibatkan oleh tingginya konsentrasi logam berat tersebut di air. Selain itu terdapat parameter-parameter lain yang berpengaruh dalam kesetimbangan reaksi di sistem perairan, seperti pH, konsentrasi logam dan tipe senyawanya, kondisi reduksi-oksidasi perairan, dan bilangan oksidasi dari logam tersebut (Singh, 2005).

Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran logam berat di perairan adalah dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai bioakumulator terhadap logam berat. Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian diketahui bahwa banyak jenis tumbuhan memiliki potensi dalam menyerap logam berat, karena kemampuannya dalam mentoleransi tingginya konsentrasi suatu polutan pada daerah yang tercemar limbah, serta menyerap dan mengakumulasi logam dengan baik dalam waktu yang singkat (Yuliani, 2014).

Menurut Priyanto dan Prayitno (2007) dalam Henggar (2009), mekanisme penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tanaman dapat dibagi menjadi tiga proses yang sinambung, sebagai berikut :

1. Penyerapan oleh akar. Agar tanaman dapat menyerap logam, maka logam harus dibawa ke dalam larutan di sekitar akar (rizosfer) dengan beberapa cara bergantung pada spesies tanaman. Senyawa-senyawa yang larut dalam air biasanya diambil oleh akar bersama air, sedangkan senyawa-senyawa hidrofobik diserap oleh permukaan akar.
2. Translokasi logam dari akar ke bagian tanaman lain. Setelah logam menembus endodermis akar, logam atau senyawa asing lain mengikuti aliran transpirasi ke

bagian atas tanaman melalui jaringan pengangkut (xilem dan floem) ke bagian tanaman lainnya.

3. Lokalisasi logam pada sel dan jaringan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar logam tidak menghambat metabolisme tanaman. Sebagai upaya untuk mencegah peracunan logam terhadap sel, tanaman mempunyai mekanisme detoksifikasi, misalnya dengan menimbun logam di dalam organ tertentu seperti akar.

Logam berat yang diberikan pada tanaman dalam jumlah tertentu dapat membantu mempercepat pertumbuhan tanaman sebagai suatu respon positif, namun pada tingkatan tertentu justru dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan kematian tumbuhan sebagai bentuk respon negatif tumbuhan (Mangkoediharjo dan Samudro, 2010).

E. Danau

Danau adalah cekungan di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Di Indonesia terdapat 840 danau, 735 situ (danau kecil), dan sekitar 162 waduk, luas genangan air keseluruhannya mencapai 1,8 juta ha (Kartamihardja dan Purnomo, 2006) dengan menyimpan cadangan sumber daya air lebih dari 500 juta m³. Tipologi danau di Indonesia bervariasi tergantung dari faktor klasifikasinya. Menurut asal usul terbentuknya ada tiga tipe danau utama di Indonesia, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, dan danau paparan banjir. Contoh danau tektonik adalah Danau Matano dan Danau Limboto di Sulawesi, sedangkan yang termasuk danau vulkanik adalah Danau Maninjau di Sumatra dan Danau Batur di Bali, sementara Danau Semayang-Melintang di Kalimantan dan Danau Tempe di Sulawesi merupakan

tipologi danau paparan banjir. Disamping ketiga tipe utama tersebut terdapat juga beberapa tipe danau karst serta danau-danau buatan atau bendungan. Danau juga dapat diklasifikasikan dari tingkat kesuburan airnya, yaitu mulai dari danau dengan tingkat kesuburan rendah (oligotrofik), misalnya Danau Matano di Sulawesi Selatan, danau dengan tingkat kesuburan sedang (mesotrofik), misalnya Danau Maninjau di Sumatra Barat, danau yang subur (eutrofik) misalnya Danau Semayang-Melintang di Kalimantan Timur, dan danau yang sangat subur (hipertrofik), misalnya Waduk Saguling di Jawa Barat (Chrismadha, 2011).

Danau mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung danau mensuplai kebutuhan air, mulai dari untuk keperluan minum, rumah tangga, pertanian, hingga pengembangan industri. Misalnya Danau Limboto berfungsi sebagai sumber daya air penyangga pada saat musim kemarau untuk lahan pertanian di sekitarnya, sementara Danau Maninjau menyediakan sumber daya air untuk penggerak turbin yang memproduksi energi listrik hingga kapasitas 205 GWH setiap tahunnya (Puslit Limnologi LIPI, 2006 dalam Chrismadha, 2011).

Peran tidak langsung danau terutama dalam hal menyediakan jasa-jasa ekologis, meliputi fungsi habitat yang mendukung keragaman hayati dan produktivitas perairan, fungsi retensi air yang mengendalikan kontinuitas ketersediaan air dan resiko banjir di kawasan hilirnya, serta penyeimbang kondisi iklim mikro di kawasan sekitarnya. Fungsi-fungsi ini meskipun tidak secara langsung memberikan manfaat kepada manusia, namun sangat menentukan

keberlanjutan fungsi danau, khususnya yang memberikan manfaat-manfaat langsung seperti telah diuraikan. Danau juga mempunyai peran sebagai penahan material sedimentasi dan pencemaran, meskipun pada umumnya berdampak negatif terhadap integritas lingkungannya (Chrimadha, 2011).

Danau dibagi menjadi 3 zona atau wilayah, yaitu daerah pinggiran (litoral zone), zona tengah (limnetik zone) dan zona dasar:

1. Daerah pinggiran merupakan daerah tepi danau yang paling kaya akan penghuni-penghuni yang dekat dengan tepi danau, yaitu berupa tumbuhan tingkat tinggi yang akarnya menjangkau dasar tepian danau.
2. Zona tengah merupakan zona luas terbuka yang ditumbuhi oleh fitoplanktonk terdiri atas bangsa ikan dan predatornya dapat berupa ikan-ikan karnivora.
3. Zona dasar merupakan bagian danau yang sedikit jauh dari tepi danau dan berada di bawah zona tengah sampai ke dasar danau. Pada bagian ini dihuni oleh beberapa jenis jamur, bakteri dan ikan pemangsa sisa-sisa yang berupa zat organik dari tumbuhan maupun hewan yang hidup di zona atasnya (Dwidjosaputro, 1990).

Danau Tempe merupakan salah satu danau di Sulawesi Selatan yang termasuk tipe danau paparan banjir dengan letak geografis Danau Tempe pada kordinat antara $3^{\circ}39'$ – $4^{\circ}16'$ LS dan $119^{\circ} 53'$ – $120^{\circ} 27'$ BT. Danau Tempe yang mempunyai luas 14.406 hektar, terletak di tiga wilayah kabupaten: Wajo (8.510 ha), Soppeng (3.000 ha), Sidrap (2.896 ha). Pada musim hujan luas Danau Tempe sekitar 45.000 ha, musim kemarau sekitar 1.000 ha. Beban pencemaran dari berbagai sektor pada DTA

dan DAS akan meningkat terus sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu jumlah beban pencemaran yang masuk perairan danau termasuk limbah pakan ikan dari budidaya ikan perlu ditentukan alokasinya dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi serta konservasi sumber daya air jangka panjang (Hamzah, 2012).



Gambar 2.2 Peta dan lokasi penelitian di Danau Tempe (BKPMMD, 2015)

Danau Tempe secara topografi dan hidrologi tidak terpisah dari 2 (dua) danau di sekitarnya yaitu Danau Sidenreng dan Danau Buaya yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 6.138 Km², secara limnologi dan ekologi, danau ini termasuk tipe danau entropies, yaitu berbentuk cawan yang sangat datar dengan karakteristik tersedianya lahan pasang surut luas di sekitar danau. Pada umumnya Danau Tempe dalam setahun dapat menutupi areal seluas 10.000 ha dan pada musim kemarau dapat menurun menjadi 1000 ha. Tingginya produktifitas dan kesuburan Danau Tempe terlihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan gulma air pada perairan danau dimana luas penutupannya mencapai 40 %. Hal ini dapat menjadi


ancaman karena membantu mempercepat proses pendangkalan Danau Tempe. Tanaman air yang menjadi gulma di danau adalah didominasi oleh eceng gondok, akar tanaman ini dapat mencapai dasar danau dan menjadi perangkap sedimen kemudian mengendapkan di dasar danau (Hamzah, dkk., 2012).



Gambar 2.3. Danau Tempe

Danau tempe merupakan penghasil ikan tawar terbesar, selain itu danau tersebut juga dimanfaatkan sebagai tempat bermukim di atas air dengan sistem rumah mengapung, sebagai tempat tumbuhnya vegetasi terapung, tempat hidup berbagai jenis burung langka dan sebagai tujuan wisata terbesar kedua di Sulawesi Selatan selain Toraja. Potensi danau dengan berbagai jenis ikan yang hidup di dalamnya serta fungsi danau yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan manusia dan beberapa ekosistem lainnya, menjadikan Danau Tempe menjadi tujuan utama bagi masyarakat di sekitarnya dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, Danau Tempe disebut sebagai lokasi perairan potensial di Sulawesi Selatan (Naidah, 2009).

F. Kerangka Pikir



G. Hipotesis

Pada umur tertentu eceng gondok memiliki kemampuan mereduksi logam berat seng (Zn) dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo secara maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan eksperimental yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat validation atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah logam berat yang mencemari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

2. Sampel

Sampel penelitian ini yaitu logam berat seng (Zn) pada perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki dua macam variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah umur eceng gondok. Variabel terikat berupa kadar logam berat seng (Zn).

E. Definisi Operasional Variabel

1. Umur tanaman eceng gondok yaitu waktu yang menunjukkan lamanya tanaman sejak penambahan larutan logam berat seng (Zn) setelah aklimatisasi kemudian dipanen setiap umur 3, 6 dan 9 hari.
2. Kadar logam berat seng (Zn) yaitu besarnya kadar logam yang terdapat di air limbah dalam proses fitoremediasi tanaman eceng gondok yang diukur dengan AAS (*Atomic Absorbtion Spectofotometer*).
3. Fitoremediasi yaitu penggunaan tanaman untuk mengurangi logam dari lingkungan dengan memanfaatkan kemampuan alami tanaman eceng gondok dalam mengakumulasi logam berat yang terdapat pada perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) dan pengukuran. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dalam laboratorium. Pencatatan dan pengolahan hasil dilakukan dengan bantuan alat elektronik.

G. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah jirigen, baskom, mistar, timbangan, pipet tetes, tabung ukur 10 ml, pengaduk, kamera, *bulf*, gelas ukur, AAS (*Atomic Absorbtion Spectofotometer*), timbangan analitik, oven, *hotplate*, dan peralatan gelas kimia.


2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air yang diambil dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo, larutan induk Zn 10 ppm, asam nitrat (HNO_3 pekat), tanaman eceng gondok yang dikumpulkan dari Danau Tempe Kabupaten Wajo, air bersih dan aquadest.

H. Prosedur Kerja

Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor terdiri dari 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan sehingga terdapat 12 unit perlakuan.

Adapun perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah umur tanaman eceng gondok dalam pemberian logam berat seng (Zn) yang dilakukan selama 9 hari dengan 3 kali ulangan, dan pengambilan sampel dilakukan setiap 3 hari yang di tampilkan pada *lay out* berikut ini:



Keterangan:

H 0 = kontrol

H 3 = Umur 3 hari

H 6 = Umur 6 hari

H 9 = Umur 9 hari

1 = Ulangan 1

2 = Ulangan 2

3 = Ulangan 3

1. Uji fitoremediasi dengan menggunakan tanaman eceng gondok

Sebelum dilakukan uji fitoremediasi, terlebih dulu dilakukan uji kandungan logam berat Seng (Zn) pada air Danau Tempe Kabupaten Wajo.

a. Analisis kandungan logam berat seng (Zn) pada air danau

Sampel air yang diambil dari perairan Danau Tempe dengan menggunakan jirigen dituang ke dalam gelas kimia sebanyak 50 ml dan ditambahkan asam nitrat (HNO_3) sebanyak 10 ml dan didestruksi menggunakan *hotplate* selama 30 menit kemudian dianalisa dengan menggunakan AAS.

b. Persiapan tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) dan air limbah

Tanaman penyerap logam berat (akumulator) yang digunakan dalam proses fitoremediasi adalah tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) yang diambil di daerah perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo. Kriteria tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) yang digunakan yaitu diambil seluruh organ tubuhnya meliputi akar, batang dan daun dengan tinggi 32-58 cm sebanyak 107 pohon.

c. Aklimatisasi tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*)

Tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) yang telah terseleksi kemudian dibersihkan dari kotoran yang menempel untuk selanjutnya diaklimatisasi sebelum penelitian. Aklimatisasi tanaman dilakukan dengan mengadaptasikan tanaman pada media air dalam ember selama 7 hari. Aklimatisasi dimaksudkan agar tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tumbuhnya yang baru. Aklimatisasi selama 1 minggu mengacu pada penelitian Suryati Tuti dan Budhi Priyanto (2003) dalam Mahyatun (2014).

Setelah masa aklimatisasi selesai, maka tanaman tersebut siap untuk dipergunakan dalam penelitian.

d. Uji Fitoremediasi Tanaman Eceng gondok (*Eichornia crassipes*)

Setelah aklimatisasi selesai, maka tanaman akan dipindahkan ke baskom berisi air limbah artifisial dengan volume sebanyak 3 l untuk setiap perlakuan.

Pada setiap wadah yang digunakan ditempatkan tanaman dengan berat basah tanaman 15 gram yang memiliki ketinggian yang hampir sama. Penggunaan 15 gram tanaman mengacu pada ukuran baku tanaman eceng gondok dimana untuk meremediasi 1 liter cairan sampel dibutuhkan 5 gram berat basah (Permatasari, 2010).

Perbedaan banyaknya jumlah daun pada tanaman tidak diperhitungkan dalam penelitian ini tapi lebih disesuaikan dengan berat basah tanaman yang digunakan pada masing-masing wadah pada tanaman.

Berdasarkan hasil pengujian kadar Zn yang terukur pada air danau yang digunakan adalah $< 0,01$. Nilai tersebut dianggap tidak berpengaruh besar dan tidak layak digunakan untuk pembuatan air limbah. Sehingga, air limbah yang digunakan merupakan air limbah artifisial. Air limbah artifisial adalah air limbah yang dibuat dengan melarutkan sejumlah logam pencemar ke dalam air sehingga didapatkan konsentrasi yang diinginkan. Air limbah artifisial mengacu pada penelitian Suryati Tuti dan Budhi Priyanto (2003) dalam Wa Ode Mahyatun (2014).

Konsentrasi logam yang digunakan setiap perlakuan yaitu 10 ppm. Pada masing-masing baskom berisi 3 l air dan konsentrasi logam Zn 10 ppm dengan jumlah eceng gondok yang digunakan adalah 15 gr.

Perlakuan fitoremediasi dilakukan selama 9 hari. Dengan pengambilan sampel dilakukan setiap 3 hari sekali. Sampel air limbah diambil sebanyak 50 ml dari baskom menggunakan pipet, kemudian didestruksi.

Selanjutnya, kadar logam berat Zn dari sampel untuk masing-masing perlakuan diukur dengan menggunakan AAS (*Atomic Absorbtion Spectofotometer*). Cara pengujian kadar logam berat seng dilakukan berdasarkan SNI 6989.16:2009.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis logam berat seng (Zn) dilakukan dengan alat AAS untuk mengetahui besarnya kadar logam berat seng (Zn) yang tertinggal pada air limbah setelah fitoremediasi. Analisis data menggunakan sidik ragam dan bila hasil sidik ragam berbeda nyata ($F_{hitung} > F_{tabel} 5\%$) atau berbeda sangat nyata ($F_{hitung} > F_{tabel} 1\%$), maka untuk membandingkan dua rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjutan dengan uji beda nyata terkecil (BNT).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsentrasi Logam Seng (Zn) Dalam Air Limbah

Konsentrasi logam seng (Zn) dalam air limbah dengan waktu tinggal selama 0, 3, 6 dan 9 hari serta sidik ragamnya disajikan pada Tabel Lampiran 1a dan 1b. Sidik ragam menunjukkan bahwa dengan menanam eceng gondok pada media air limbah seng (Zn) berpengaruh sangat nyata dalam mengurangi logam seng (Zn) pada air limbah, dan berarti ada perlakuan yang pengaruhnya sangat menonjol jika dibandingkan dengan pengaruh kontrol dengan perlakuan lainnya.


Tabel 4.1. Rata-rata jumlah konsentrasi logam seng (Zn)

Perlakuan	Ulangan			Rata-rata	NP BNT _{0,05}
	I	II	III		
H0	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000 ^c	0.7585
H3	1.4984	1.6434	0.6206	1.2541 ^{ab}	
H6	2.0464	0.9826	0.5573	1.1954 ^a	
H9	0.9316	0.6033	0.3537	0.6295 ^a	

keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata. Dan apabila angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT $\alpha=0,05$ dan 0,01.

Tabel 4.1 terlihat bahwa semua sampel air dari baskom yang berisi tanaman eceng gondok pada H0 berbeda nyata dengan sampel air pada hari ke 3 (H3), hari ke 6 (H6) dan hari ke 9 (H9) yang ditunjukkan dengan huruf yang berbeda.

Penurunan konsentrasi seng (Zn) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1. Diagram batang penurunan konsentrasi logam seng (Zn) dalam air limbah

2. Hasil Pengamatan Morfologi Tanaman

Kondisi morfologi daun eceng gondok selama proses fitoremediasi ditunjukkan pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2. Perubahan morfologi tanaman selama Fitoremediasi Zn 10 ppm

Waktu tinggal (hari)	Ulangan		
	1	2	3
H0			
H3			
H6			
H9			

B. Pembahasan

1. Konsentrasi Logam Seng (Zn) Dalam Air Limbah

Kemampuan eceng gondok (*Eichornia crassipes*) dalam menyerap dan mengakumulasi logam berat dapat dilihat dari besarnya total konsentrasi seng (Zn) yang tertinggal dalam air limbah. Kemampuan eceng gondok dalam mengurangi logam berat telah diteliti oleh Puspita, dkk (2011) yang menggunakan tanaman air sebagai agen fitoremediator logam berat Cr pada air limbah batik, dan hasil yang didapatkan bahwa tanaman *Eichornia crassipes* merupakan tumbuhan yang paling mampu menurunkan kadar Cr air limbah batik.

Berdasarkan data hasil pengujian konsentrasi seng (Zn) dalam air limbah (Tabel 4.1.) terlihat semua sampel air dari baskom yang berisi tanaman sampai hari ke-9 menunjukkan konsentrasi seng (Zn) yang lebih kecil dibandingkan sampel air dari baskom yang tidak diisi tanaman, diperkirakan bahwa tanaman telah menyerap sebagian seng (Zn) dari air limbah artifisial. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konsentrasi seng (Zn) dalam baskom kontrol berbeda nyata dengan baskom berisi tanaman, hal ini menunjukkan bahwa tanaman telah nyata berpengaruh dalam menurunkan konsentrasi Zn dalam air limbah.

Data pengujian menunjukkan bahwa antara hari ke-0 dan hari lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan konsentrasi hari ke-0 dan hari lainnya adalah sama. Untuk baskom berisi tanaman, pengujian menunjukkan bahwa antara hari ke-0 dan hari lainnya berbeda secara nyata.

Pada hari ke-3 pengujian, konsentrasi seng (Zn) menunjukkan penurunan dengan konsentrasi awal 10 ppm pada H3.1 menjadi hingga 1.2541 ppm.

Penurunan konsentrasi seng (Zn) diduga disebabkan karena kemampuan tanaman awal percobaan dalam menyerap logam berat cenderung cukup tinggi. Penurunan kandungan seng (Zn) dalam air limbah mengindikasikan bahwa telah terjadi pemindahan logam dari air ke tanaman.

Selanjutnya kadar logam berat seng (Zn) pada air limbah cenderung semakin menurun sampai pada hari ke-6 untuk semua kelompok, tingkat penyerapan tanaman terhadap logam seng (Zn) mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan konsentrasi logam seng (Zn) dalam air limbah. Hal ini dapat terjadi karena dengan konsentrasi yang tinggi, akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang ditunjukkan dengan menguningnya daun sehingga tanaman ini tidak dapat menyerap secara optimal (Mahyatun, 2014).

Kemudian pada hari ke-9 kadar konsentrasi logam berat seng (Zn) pada air limbah semakin menurun di semua kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama pertumbuhan eceng gondok dalam air maka semakin tinggi logam seng (Zn) yang diserap dan diakumulasi oleh eceng gondok.

Dari semua perlakuan, penurunan konsentrasi terbesar terjadi pada hari ke-9 yaitu 1,8886 ppm. Tingkat penurunan konsentrasi seng (Zn) yang signifikan pada hari ke-9 dikarenakan semakin lama pertumbuhan eceng gondok dalam air maka semakin tinggi logam seng (Zn) yang diserap dan diakumulasi oleh eceng gondok.

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tanaman eceng gondok mampu menyerap logam Zn yaitu pada waktu tinggal 3 hari telah terjadi penyerapan logam seng (Zn), akan tetapi penyerapan optimum terjadi pada waktu tinggal 9 hari dengan konsentrasi awal seng (Zn) 10 ppm, dimana semakin lama tanaman ditanam semakin sedikit logam terdapat pada air limbah. Logam berat yang diberikan pada tanaman dalam jumlah tertentu dapat membantu mempercepat pertumbuhan tanaman sebagai suatu respon positif, namun pada tingkatan tertentu justru dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan kematian tanaman sebagai bentuk respon negatif tanaman (Mangkoedihardjo dan Samudro, 2010).

Secara biologi proses penyerapan unsur-unsur kimia oleh tanaman air dilakukan oleh membran sel. Kation dari unsur-unsur kimia tersebut terdapat di dalam molekul air dan dikelilingi oleh molekul air lainnya. Jadi jumlah ion yang berdifusi ke rambut-rambut akar pada jumlah molekul yang berdifusi ke membran sel. Semakin banyak molekul air yang diserap oleh tanaman, berarti semakin banyak ion-ion logam tersebut yang masuk ke dalam tubuh tanaman (Syahputra, 2005).

2. Morfologi Tanaman

Pencemaran logam berat menyebabkan kerusakan dan perubahan fisiologi tanaman yang diekspresikan dalam gangguan pertumbuhan hingga tingkat komunitas tanaman. Menurut Fontes (1995), pencemaran menyebabkan perubahan pada tingkatan biokimia sel kemudian diikuti perubahan fisiologi pada tingkat individu hingga tingkat komunitas tanaman.

Berdasarkan hasil pengamatan morfologi tanaman pada Tabel 4.2. dapat dilihat adanya perubahan morfologi pada tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) dari awal penelitian sampai pada hari ke-9.

Pada hari ke-0 tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) ketiga kelompok terlihat berwarna hijau dan masih segar. Seiring bertambahnya waktu, dimana konsentrasi Zn dalam air limbah semakin menurun (Tabel 4.1), warna tanaman pun berubah. Pada hari ke-3, tanaman eceng gondok sudah mulai menguning. Perubahan warna daun pada tanaman menunjukkan gejala klorosis yang diduga tanaman mengalami toksisitas logam seng (Zn) dari air limbah. Menurut Darmono (1995) klorosis adalah degenerasi klorofil (tidak terbentuk/ kurang berkembangnya klorofil) sehingga daun menjadi menguning atau mozaik dengan warna campuran hijau, kuning dan hitam. Selain klorosis, gejala lain yang terjadi pada tanaman yaitu nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel atau jaringan pada organ hidup sehingga timbul bercak dan warna kecoklatan pada tepi dan ujung daun (Darmono, 1995).

Pada hari ke-6 jumlah tanaman yang menguning semakin bertambah. Hal ini diakibatkan karena tanaman terpapar logam seng (Zn) dalam waktu yang semakin lama sehingga penghambatan sintesis klorofil juga semakin tinggi.

Pada hari ke-9, tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) semakin menguning dan layu tetapi masih terdapat beberapa daun yang masih berwarna hijau. Hal ini diakibatkan karena tanaman terpapar logam seng (Zn) dalam waktu yang semakin lama sehingga penghambatan sintesis klorofil juga semakin tinggi.

perubahan tersebut erat kaitannya dengan kemampuan tanaman dalam beradaptasi pada kondisi tertentu, walaupun menimbulkan gejala toksisitas pada tanaman.

Terjadinya perubahan fisik pada tanaman disebabkan adanya perpindahan logam dari limbah ke dalam tanaman, yaitu melalui mekanisme penyerapan dalam tanaman. Mekanisme fitoremediasi yang mungkin terjadi pada eceng gondok (*Eichornia crassipes*) adalah *fitoekstraksi* dan *rhizofiltrasi*.

Fitoekstraksi adalah proses absorpsi (penyerapan) kontaminan berupa logam berat oleh akar dan diikuti dengan translokasi melalui xylem dan diakumulasi di vakuola sel batang dan daun (Chaudary, 1998), berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman terlihat perubahan pada bagian batang dan daun baik pada tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) dimana daun yang berwarna kuning dan layu. Dan faktor lain yang mempengaruhi perubahan fisik pada tanaman eceng gondok (*Eichornia crassipes*) yaitu kemungkinan dari faktor eksternal yaitu kurang terpapar sinar matahari dan suhu. Menurut Muhtar (2008), Pertumbuhan eceng gondok sangat memerlukan cahaya matahari yang cukup, dengan suhu optimum antara 25° C - 30° C. Pertumbuhannya akan terganggu bila suhu di bawah 10° C atau di atas 40° C dan akan mati bila suhu perairan 45° C. Selain itu kemungkinan juga pengaruh dari wadah tanaman yang terbatas yang tidak ada aliran air yang membawa logam sehingga tanaman mengalami toksisitas logam seng (Zn).

Selanjutnya proses penting dalam fitoremediasi adalah *rhizofiltrasi*. *Rhizofiltrasi* adalah pengendapan zat kontaminan seperti logam berat oleh akar dengan bantuan zat penghelat (Lestari, dkk., 2011).

Menurut Siswoyo (2006), tanaman mempunyai mekanisme tertentu untuk mencegah keracunan logam terhadap sel salah satunya dengan menimbun logam dalam organ tertentu seperti akar. Selanjutnya, Salisbury dan Ross (1995) menyatakan bahwa spesies tanaman yang tumbuh di lingkungan tercemar logam akan mengalami stress metal dengan membentuk zat fitokhelatin khususnya di bagian akar sebagai mekanisme toleransi yang penting. Fitokhelatin merupakan peptide kecil yang kaya asam amino sistein yang mengandung belerang. Atom belerang dalam sistem ini yang akan mengikat logam berat dari media tumbuh. Senyawa fitokhelatin yang terdapat pada akar tanaman berfungsi untuk mengikat unsur logam dan membawanya ke dalam sel melalui proses transport aktif.

Kemampuan menyerap logam yang tinggi pada *Eichornia crassipes* dimungkinkan karena penyerapan yang terjadi dalam dua cara yaitu secara aktif dan pasif (Puspita, dkk., 2011). Penyerapan secara aktif melalui metabolisme tanaman dan secara pasif menggunakan gugus fungsional dalam jaringan tanaman (Mohammad, 2011). Penyerapan aktif tergantung pada anion dan kation yang terdapat pada tumbuhan. Proses inilah yang melibatkan zat khelat yang terdapat pada akar sehingga ion logam dapat terserap. *Eichornia crassipes* akan mendepositkan logam berat ke dinding sel dalam vakuola dan berikatan dengan senyawa organik lainnya. Struktur spons yang dimiliki oleh *Eichornia crassipes* juga mampu menyerap unsur-unsur pencemar dalam air limbah (Puspita, dkk., 2011).

Pada akar, tumbuhan ini mempunyai senyawa fitokhelatin yang berfungsi untuk mengikat unsur logam dan membawanya ke dalam sel melalui peristiwa transport

aktif. Selain logam berat terakumulasi pada akar, logam berat juga akan terakumulasi juga pada bagian jaringan tumbuhan lainnya terutama pucuk daun.

Tingginya akumulasi logam di akar disebabkan tumbuhan menyerap unsur hara beserta logam yang ada dari air melalui akar. Akar berfungsi sebagai organ penyerap dan penyalur unsur-unsur hara ke bagian lain. Sehubungan dengan fungsi tersebut maka akar akan banyak menyerap unsur hara sehingga akumulasi logam akan lebih tinggi di akar dibandingkan dengan batang dan daun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu eceng gondok (*Eichornia crassipes*) berpotensi fitoremediasi dalam mereduksi logam berat seng (Zn) dari perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo pada hari ke 3 dengan nilai 1,2541 ppm yang tidak berbeda nyata dengan hari ke 6 dan hari ke 9 dengan masing-masing nilai 1,1954 ppm dan 0,6295 ppm dan berbeda nyata dengan H₀ dari konsentrasi awal 10 ppm.

A. Saran

Hal yang perlu disarankan dari penelitian ini, antara lain:

1. Perlu dilakukan penelitian dari umur tanaman yang banyak hari untuk mendapatkan umur terbaik.
2. Sebaiknya sebelum dilakukan penelitian terlebih dulu dilakukan uji pendahulu agar mengetahui konsentrasi maksimum yang dapat digunakan untuk menanam eceng gondok (*Eichornia crassipes*).
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dilakukan uji pH dan suhu.
4. Sebaiknya para penduduk yang bermukim dan kegiatan masyarakat seperti pertanian dan peternakan di sekitar Danau Tempe Kabupaten Wajo yang

melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah berupa logam berat agar tidak membuang limbah secara langsung ke danau.

5. Disarankan juga agar melestarikan eceng gondok kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan yang bernilai ekonomis, karena eceng gondok selain digunakan sebagai tanaman untuk menghilangkan polutan dari perairan yang terkontaminasi. Eceng gondok juga dapat dijadikan berbagai jenis produk yang bernilai ekonomis seperti kompos karena eceng gondok mengandung kalium dan nutrisi yang tinggi. Kadar serat yang tinggi, akar batang dari eceng gondok dapat dimanfaatkan untuk bahan baku kerajinan seperti: keranjang, tali dan sebagainya.

KEPUSTAKAAN

- Amri. *Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan*. Program Studi Geofisika Jurusan Fisika FMIPA. UNHAS, Makassar, 2012.
- Ahmad, Hiskia. *Kimia Larutan*. Bandung: citra Aditya Bakti, 2001.
- Al-Ayubi, M.Ch. *Skripsi: Studi Kesetimbangan Adsorpsi Merkuri (II) pada biomassa daun enceng gondok (Eichhornia crassipes)*. UIN Malang, 2007.
- Al-Azdi, Sulaiman bin al-Asy'as Abu Daud al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Juz II. T.c. Dar al-Fikr.t.th.
- BKPM, “Kondisi Geografis wilayah Sulawesi Selatan”
<http://bkpm.sulselprov.go.id>, 2015.
- Bugis, H., Anwar, D., dan Agus, B. *Studi Kandungan Logam Berat Kromium Vi (CrVi) pada Air dan Sedimen Disungai Pangkajene Kabupaten Pangkep*. Bagian Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.
- Chrismadha, Tjandra Gadis Sri Haryani, M. Fakhrudin, Peter E Hehanussa. *Aplikasi ekohidrologi dalam pengelolaan danau*. Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Hal: 26-27, 2011.
- Chaudary, I. M. *Phenolic and other constituent of fresh water Fern Salvinia molesta*. *Phytochemistry*, 69: 1018-1023, Karachi Pakistan, 1998.
- Connell dan Miller. *Kimia dan etoksikologi pencemaran* diterjemahkan oleh Koestoer S. hal. 419. Indonesia University Press: Jakarta, 1995.
- Cunningham, S.D., W.R. Berti, dan J.W. Huang. *Remediation of contaminated soils and sludges by green plants*. Dalam R.E. Hinchee, J.L. Means, dan D.R. Burris (eds.) *Bioremediation of Inorganics*. Battelle Press, Ohio. Pp 33-54, 1995.
- Darmono. *Lingkungan Hidup Dan Pencemaran Hubungannya Dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Universitas Indonesia Press : Jakarta, 2001.

- Dery Diah, Santriyana et al. *Eksplorasi tanaman fitoremediator aluminium (al) yang ditumbuhkan pada limbah ipa pdam tirta khatulistiwa kota Pontianak*. 2Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2012.
- Dwidjosaputro. *Pengantar fisiologi tumbuhan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Darmono. *Logam dalam Sistem Biologi Hidup Makhluk Hidup*. UI-Press. Jakarta, 1995.
- Effendi, H. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta : Kanisius, 2003.
- Fontes, R.L.F and Cox, F, R. *Effect of Sulfur Supply on Soybean Plants Exposed To Zink Toxicity, Journal of Plant Nutrition*. 18, 1893-1906, 1995.
- Fahrudin, *Bioteknologi Lingkungan*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010.
- Fardiaz, S. *Polusi Air and Udara. Edisi ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Fauzi, Ahmad, Christian Halawa, Lella Herdiana. *Program Kreativitas Mahasiswa: Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Metode Irigation Memanfaatkan Eceng Gondok (Eichornia crassipes) di Bak Penampungan Sebagai Penyerap Polutan Untuk Mengurangi Limbah Organik dan Anorganik*. Institut Pertanian Bogor (IPB), 2011.
- Hamzah, Muh Alimuddin, Amri, Amiruddin. *Penentuan daya tampung beban pencemaran air danau tempe kabupaten wajo Sulawesi-selatan*. Program Geofisika jurusan fisika FMIPA Universitas Hasanuddin kampus UNHAS Tamalanrea, 2012.
- Henggar, Hardiani. *Potensi Tanaman Dalam Mengakumulasi Logam Cu Pada Media Tanah Terkontaminasi Limbah Padat Industri Kertas*. BS, Vol. 44, No. 1, Juni 2009 : 27-40, 2009.
- Hardiyanti N, Rahayu SS. *Fitoremediasi phospat dengan pemanfaatan eceng gondok (Eichornia crassipes) studi kasus pada limbah cair industry kecil laundry*. Jurnal Presipitasi Vol. 2 No. ISSN 1907-187X, 2007.
- Isa Ishak, Mohamad Jahja, Masayuki Sakakibara. Laporan penelitian kerja sama unghime univercity dana pnbp tahun 2014: *Potensi tanaman genjer (lammncharis*

flava) sebagai akumulator logam Pb dan Cu. Gorontalo: Fakultas matematika dan ipa lembaga penelitian universitas negeri gorontalo, 2014.

Jorgensen, S.E. *Lake Management*. Pergamon Press: USA, 1980.

Julhim S, Tangio. Laporan Penelitian Dosen Pemula: *Adsorpsi Logam Timbal (Pb) Dengan Menggunakan Biomassa Eceng Gondok (Echhornia crassipes)*. Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

Kagi JHR dan Valee BL. *Metallohionein: a cadmium and zinc-containing protein from equine renal cortex*. J Biol Chem 236 (9): 2435-2442, 1961.

Kartamihardja, E.S dan K. Purnomo. *Parameter Populasi. Kebiasaan makan dan total hasil tangkapan ikan dominan di waduk wadaslintang*. Jawa tengah. J. Lit. Perikanan. Ind 12 (1): 13-24, 2006.

Kementerian Agama RI. *Al-quran dan terjemahnya*. Jakarta, 2002.

Lestari Sri, slamet Santoso dan Sulastri A. *Efektifitas Eceng Gondok (Eichornia crassipes) dalam Penyerapan Kadmium (Cd) pada Leachete TPA Gunung Tugel*. Jurnal Molekul Vol. 6 No. 1. Fakultas Biologi, Unniversitas Jendral Soedirman. Purwokerto, 2011.

Mangkoedihardjo, S. dan Samudro, G. *Fitoteknologi Terapan. Edisi pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Mejare, M. dan L. Bulow. *Metal-binding proteins and peptides in bioremediation and phytoremediation of heavy metals*. Trends in Biotechnology 19 (2): 67-73, 2001.

Muhtar, Ahmad. Tugas Akhir: *Penggunaan tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes) sebagai pre-treatment pengolahan air minum pada air selokan mataram*. Jurusan teknik lingkungan fakultas teknik sipil dan perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Mohammad, erni. *Fitoremediasi Logam Berat Kadmium (Cd) pada Tanah dengan Menggunakan Bayam Dari Duri (Amarantus spinosus L)*. Kimia-Fakultas Matetatika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo, 2011.

Mulyadi, M. Machbub, B. *Kualitas air sungai alamiah sebagai standar kualitas sumber air*. Bulletin PUSAIR no. 34 tahun IX, April 2000; 31-38, 2000.

Naidah, Naing. "Kearifan Lokal Tradisional Masyarakat Nelayan Pada Pemukiman Mengapung Di Danau Tempe Sulawesi Selatan" Teknosains 1 no. 1. 2009.

- Nursyakia. Laporan Akhir: *Studi pemanfaatan eceng gondok Sebagai bahan pembuatan pupuk kompos Dengan menggunakan aktivator em4 dan Mol Serta prospek pengembangannya*. UNHAS Makassar, 2014.
- Nurmitha, Aulia A. ,Samang L, Zubair A. *Fitoremediasi pengolahan limbah cair rumah tangga dengan memanfaatkan eceng gondok*. Makassar: Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, 2013.
- Palar, H. *Pencemaran dan air media*. Penerbit ITB: Bandung, 2008.
- Palar, Heryando. *Pencemaran Dan Toksikologi Logam Berat*. Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Panjaitan, Yanti Grace. *Akumulasi Logam berat tembaga (Cu) dan timbale (Pb) pada pohon Avicenna marina di hutan mangrove*. Skripsi USU, 2009.
- Pratomo, Andi. *Belajar cepat dan mudah mikro. Controller PIC16F84*. PT elex Media Komputindo: Jakarta, 2004.
- Permatasari, A.A. *Fitoremediasi Logam Berat Cd Menggunakan Ki Ambang (Salvinia molesta) pada media modifikasi Lumpur Siduarjo*. Skripsi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya, 2010.
- Pratomo, S. *Tesis fitoremediasi Zn (seng) menggunakan tanaman normal dan transgenic Solanum nigrum L*. program megister ilmu lingkungan program pscasarjana universitas Diponegoro Semarang, 2004.
- Puspita, UR, A. S. Siregar dan N. V. Hidayanti. *Kemampuan Tumbuhan Air sebagai Agen Fitoremediator Logam Berat Kromium (Cr) yang terdapat pada Limbah Cair Industri Batik*. Jurnal Penelitian Berkala Perikanan Terubuk, Vol. 39 No. 1. Himpunan Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau, 2011.
- Qasim, S. R., Holt, Rinehart, Winston. *Waste Water Treatment Plant*. NewYork: CBS College Publishing, 1985.
- Rahmawati, F., Pranoto, dan Ita Aryunani, N. *Jurnal : Adsorpsi Zat warna tekstil Remazol Yellow FG pada limbah batik oleh eceng gondok dengan aktivator NaOH*. Alchemy, Vol 2, No. 2 F.MIPA UNJ. 2003.
- Repley B.S., Muller, E., and Behenna, M. *Biomass and Photosynthetic Productivity of Water Hyacinth as Effected by Nutrient Supply and Mirid Biocontrol*, *Biological Control* 39, 392-400. 2006.


- Ratnani, Dwi, Rita. *Laporan Penelitian Terapan: Pemanfaatan Eceng Gondok (Eichornia crassipes) untuk penurunan kandungan COD, PH, Bau, dan Warna pada Limbah Cair Air Tahu*. Universitas Wahid Hasyim: Semarang, 2010.
- Rondonuwu, S.B. *Fitoremediasi Limbah Merkuri Menggunakan Tanaman dan Sistem Reactor*. Vol. 14 (1): 52, 2014.
- Setyanto, Kris dan Warniningsih. *Pemanfaatan eceng gondok untuk membersihkan kualitas air sungai sungai gadjahwong Yogyakarta*. Vol 4 (1): 18, 2011.
- Singh, K. P., dkk. *Estimation of source of heavy metal contamination in sediments of gomti river (India) using Principal component analysis, water, air, and soil polition (springer)*. Vol 166, pp 321-341, 2005.
- Salisbury, FB dan CW. Ross. *Fisiologi Tanaman*. Universitas Gadjadara Press. Yogyakarta, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siswoyo, E. *Fitoremediasi Logam Berat Khrom (Cr) Menggunakan Tanaman Kiapu (Pistia stratiotes)*. Jurnal Teknik Lingkungan Edisi Khusus 1: 291-300, 2006.
- Soemirat J. *Toksikologi Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2009.
- Soerjani, M., S.W. Lusianty, U. Ishidayat, Kasno, T. Machmud, S.Kadarwan, K.A. Aziz, S. Haryanto, K.L.W. Esther, dan S.T. Sri. *Gulma Air Dalam Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas*. Bogor: DPU Dirjen Pengairan, 1980.
- Sudarso, Yoga. *Toksitas beberapa senyawa logam berat terhadap siput Hydropobia sp*. Limnotek Vol. V, No. 1 Hal 75-79, 1997.
- Sugiharto. *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.
- Suhono, Budi. *Ensiklopedia Flora* Cetakan pertama. PT Kharisma Ilmu: Bogor. 2010.
- Surtikanti, HK. *Toksikologi lingkungan dan metode uji hayati*. Bandung: Rizki press, 2011.

- Surtiningsih, T. *Penanganan Bahan dan Limbah Beracun Secara Hayati (Bioremediasi)*. Makalah disajikan dalam Pelatihan Pengendalian dan Pemantauan Logam Berat, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga Surabaya, 2-4 Desember, 1999.
- Susana, T dan Suyarso. *Penyebaran Fosfat Dan Detergen Di Perairan Pesisir dan Laut Sekitar Cirebon, Jawa Barat. Jurnal Oseanologi dan Limnologi di Indonesia* 34: 117-131. ISSN 0125-9830, 2008.
- Syahputra, Rudy. *Fitoremediasi Logam Cu dan Zn dengan Tanaman Eceng Gondok (Eichornia crassipes (Mart) Solms)*. LOGIKA, Vol. 2. No. 2, 2005.
- Sutrian, Yayan. *Pengantar Anatomi Tumbuh-tumbuhan (Tentang Sel dan Jaringan)*. Rineka Cipta : Jakarta, 1992.
- Tjokrokusumo, KRT, Ir. *Pengantar Environmental Engineering*. Yogyakarta: STTL. Yogyakarta, 1998.
- Volesky B, Kratochil D. *Advance in Biosorption of Heavy Metal, Biotechnol.* 16, 7, 291-300, 1998.
- Mahyatun, W.O. *Fitoremediasi logam Cd menggunakan kombinasi eceng gondok dan kayu apu dengan aliran kontinyu*. Program studi Teknik Lingkungan Jurusan Sipil Fakultas Teknik UNHAS, 2014.
- Wardhana, W.A. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Widyaningsih, vini. *Skripsi Pengolahan limbah cair kantin yongma fisip UI*. Fakultas teknik program studi teknik lingkungan Depok: Depok, 2011.
- Wise D.L, D.J Trantolo, E.J Cichon., H.I. Inyang, and U. Stottmeister (eds.) *Bioremediation of Contaminated Soils*. New York: Marcel Dekker Inc, 2000.
- Young, H. D. *University Physics*, USA: Addison Wesley Publishing Company, Inc, 1992.
- Youngman, L. *Physiological respon Of Switchgrass (Panicum Virgatum L) to Organic And Inorganic Amened Heavy-Metal Contaminated Chat Tailings. Phytoremediation of Soil and Water Contaminants*, American Chemical society Symposium. Washington, D.C, 1999.
- Yuliani, et. Al. *Analisis akumulasi timbal (pb) pada eceng gondok eichhornia crassipes (mart.) Solms dan perairan dari beberapa lokasi di kota Makassar*. Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Hasanuddin. Hal: 2, 2014.

Yuliana, Meta. Raza'i, Tengku Said. Zulfikar, Andi. *Efektivitas dan efisiensi fitoremediasi orthofosfat pada detergen dengan menggunakan eceng gondok (eichhornia crassipes)*. Programme Study Management of Aquatic Resources Faculty of Marine Science and Fisheries Maritim Raja Ali Haji of University. (Hal. 2).

Setyawan, Y.D, et al. *Pengaruh Padat Populasi Gulma Mata Ikan (Lemna minor L) Terhadap Penyerapan Logam Timbal (Pb) Seng (Zn) dari Limbah Tekstil*. Program Studi Kimia. Fakultas Sains dan Matematika. Universitas Kristen Satya Wacana.

Zhu J et al. *Reactivity of Zn, Cd, and apometallohionein with nitric oxide compounds; in vitro and cellular comparison*. Chem. Res Toxicol 23: 422-431, 2010.



LAMPIRAN

Tabel Lampiran 1a. Konsentrasi logam Zn dalam air limbah

Perlakuan	Kelompok			Total	Rata-rata
	I	II	III		
H0	10,0000	10,0000	10,0000	30,0000	10,0000
H3	1,4984	1,6434	0,6206	3,7624	1,2541
H6	2,0464	0,9826	0,5573	3,5863	1,1954
H9	0,9316	0,6033	0,3537	1,8886	0,6295
Total	14,4764	13,2293	11,5316	39,2373	3,2698

Tabel Lampiran 1b. Sidik ragam konsentrasi logam Zn dalam air limbah

SK	db	JK	KT	F _{Hitung}	F _{Tabel}	
					0,05	0,01
Kelompok	2	1,092441	0,546220	3,79 tn	5,14	10,92
Perlakuan	3	181,897528	60,632509	420,67 **	4,76	9,78
Galat	6	0,864791	0,144132			
Total	11	183,85476				
KK	=	11,61%				
FK	=	128,29714				

Keterangan :

tn = tidak nyata

** = Sangat nyata

Lampiran Rumus Untuk Menentukan Konsentrasi Dalam Media Tumbuh

Keterangan:

V_1 = jumlah volume yang mau diambil

M_1 = Konsentrasi awal

V_2 = Volume awal

M_2 = Konsentrasi yang diinginkan

Dik $V_2 = 3000$ ml

$M_1 = 1000$ ppm

$M_2 = 10$ ppm

Dit $V_1 = \dots?$


Penyelesaian:

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 1000 \text{ ppm} = 3000 \text{ ml} \cdot 10 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{30000}{1000}$$

$$V_1 = 30 \text{ ml}$$






Gambar Lampiran 1. Proses fitoremediasi.



Gambar Lampiran 2. Alat-alat yang digunakan selama penelitian.



Gambar Lampiran 3. Proses Destruksi.



Gambar Lampiran 5. Pembacaan Logam menggunakan AAS (*Atomic Absorbtion Spectrofotometer*).

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nur Azizah Hasyim dilahirkan di Kabupaten Wajo pada tanggal 30 Maret 1994, merupakan anak dari pasangan Ayahanda Drs. M. Hasyim T dan Ibunda Dra Nurhayati M. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) Bhayangkara Makassar tahun 2000-2001, kemudian penulis melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 1 Parepare pada tahun 2001-2006, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) PONPES Nahdlatul Ulum pada tahun 2006-2009 dan pada tahun 2009-2012 penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah (Ma) di PONPES Nahdlatul Ulum Soreang-Maros. Tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan mengikuti tes Ujian Masuk Mandiri.

Dalam penyelesaian studi di Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Potensi Fitoremediasi Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) Dalam Mereduksi Logam Berat Seng (Zn) Dari Perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo”.