

**HUBUNGAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN 7T DENGAN
JENIS PERSALINAN DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Uin Alauddin Makassar**

Oleh

OLEH

NAGA PURNAMASARI

NIM. 70300110066

**JURUSAN KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang begitu besar bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil skripsi yang berjudul “Hubungan Pemeriksaan Kehamilan “7T” dengan Jenis Persalinan” Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan yang terbaik, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada umat sekarang yang konsisten pada ajaran beliau.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis temui dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, namun berkat usaha keras dan campur tangan serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak pada akhirnya hasil skripsi ini dapat dirampungkan walaupun masih jauh dari nilai kesempurnaan, karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa hanya Allah lah sang pemilik kesempurnaan.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa menghiasi segala keluh kesah yang terucap dari keterbatasan penulis. Atas terselesainya hasil skripsi ini, maka izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan yang tulus kepada:

1. Prof. DR. H. Qadir Gassing HT,M.A. selaku Resktor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
2. Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.A. selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Keperawatan.
3. Fatmawati Mallapiang, SKM, M. Kes selaku Pembantu Dekan fakultas ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan motivasi dalam penyelesaian pendidikan program S1 keperawatan.
4. Ketua Jurusan Keperawatan Ibunda DR. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes. yang sekaligus selaku pembimbing I, yang selalu memberikan motivasi dan pengajaran akan wawasan keilmuan yang luas kepada kami selaku anak didiknya dan bimbingan yang tiada henti bagi peneliti dari Ibu selaku pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi.
5. dr. Azizah Nurdin, S.Ked selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dari persiapan proposal sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Hasnah, S. Sit. M.Kes. selaku penguji I dan atas pengajaran ilmu yang tiada henti, pengarahan dan bimbingan selama berlangsungnya penelitian serta telah banyak memberikan masukan baik kritik yang membangun dan berbagai saran dan solusi dalam perbaikan dan penyempurnaan daripada skripsi ini.

Ucapan terima kasih sekali lagi penulis haturkan.

7. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si selaku penguji II (Agama) yang telah memberikan koreksi dan masukan terkait keterkaitan agama dengan penelitian ini serta memberikan petunjuk dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Para dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajar dan mendidik penulis hingga penyelesaian studi ini.
9. Ucapan terima kasih dua orang tuaku, Ayahandaku Nasrul dan Ibundaku Megawati rahman sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidupku menggapai cita, sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Terima kasih pula tak lupa kepada kakak-kakakku; Nasti Fajriyani dan Wana Malahayati S.Pd, dan adikku tercinta Ahmad Mennassa Ali Tanreso, serta keluarga besarku yang juga tiada henti memberikan dukungan serta doa restu.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik serta niat ikhlas semua pihak yang telah memberi kesempatan, dukungan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini mungkin bukanlah hal yang begitu istimewa, namun upaya keras telah penulis lakukan demi kesempurnaan

hasil skripsi ini. Terlepas dari permasalahan bahwa keberadaan hasil skripsi ini merupakan tugas yang harus diselesaikan penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, penulis tetap berharap semoga keberadaan hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Karenanya itu, saran serta kritik yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis mengembalikan segalanya dan semoga proposal skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2014

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Hipotesis Penelitian..... | 5 |
| D. Definisi Operasional Variabel..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka..... | 7 |
| F. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1. Tujuan Umum | 8 |
| 2. Tujuan Khusus | 8 |
| G. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1. Bagi pihak institusi pendidikan..... | 8 |
| 2. Bagi rumah sakit | 8 |
| 3. Bagi peneliti | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan tentang persalinan | 10 |
| 1. Pengertian persalinan | 10 |

| | |
|--|----|
| 2. Bentuk persalinan..... | 11 |
| 3. Proses terjadinya persalinan..... | 12 |
| 4. Tanda persalinan | 14 |
| 5. Faktor-faktor penting dalam persalinan | 14 |
| 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan | 15 |
| 7. Proses persalinan..... | 17 |
| B. Tinjauan umum persalinan <i>sectio caesarea</i> | 17 |
| 1. Pengertian <i>Sectio caesarea</i> | 17 |
| 2. Indikasi Persalinan <i>Sectio caesarea</i> | 18 |
| 3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan persalinan <i>Sectio caesarea</i> | 19 |
| 4. Tipe-tipe <i>Sectio caesarea</i> | 20 |
| 5. Komplikasi <i>sectio caesarea</i> | 21 |
| C. Konsep dasar <i>antenatal care</i> (ANC)..... | 22 |
| 1. Pengertian <i>antenatal care</i> (ANC) | 24 |
| 2. Tujuan <i>antenatal care</i> | 24 |
| 3. Tenaga dan lokasi pelaksanaan <i>antenatal care</i> (ANC)..... | 26 |
| 4. Indikator pemantauan..... | 26 |
| 5. Standar pelayanan <i>antenatal</i> | 27 |
| 6. Jadwal kunjungan <i>antenatal care</i> | 29 |
| D. Gambaran umum tentang pemeriksaan kehamilan 7T..... | 32 |
| 1. Timbang berat badan..... | 32 |
| 2. Ukur tekanan darah | 33 |
| 3. Ukur tinggi fundus uteri | 33 |
| 4. Pemberian imunisasi tetanus toxoid (TT) lengkap..... | 34 |
| 5. Pemberian tablet besi, minimum 90 tablet selama kehamilan ... | 34 |
| 6. Tes terhadap penyakit menular seksual (PMS)..... | 35 |
| 7. Temu wicara..... | 35 |
| E. Dasar pemikiran variabel yang diteliti | 37 |
| F. Kerangka Konsep penelitian | 38 |

| | |
|--|-----------|
| G. Kerangka kerja | 40 |
| H. Variabel yang diteliti..... | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Desain Penelitian..... | 42 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 42 |
| C. Populasi dan Sampel | 42 |
| D. Instrumen Pengumpulan data..... | 44 |
| E. Pengolahan data | 45 |
| F. Analisa data..... | 46 |
| G. Etika Penelitian | 47 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. karakteristik Responden..... | 48 |
| B. Pembahasan..... | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | x |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Frekuensi/ Jadwal Pemeriksaan Kehamilan..... | 31 |
| Tabel 2.2 jadwal imunisasi tetanus toxoid dan lama perlindungan | 34 |
| Tabel 2.3 ringkasan penilaian klinik dan penanganan kehamilan..... | 36 |
| Tabel 4.1 karakteristik responden yang memeriksakan kehamilan dan melahirkan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014 | 49 |
| Tabel 4.2 Distribusi responden berdasarkan jenis komplikasi di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014 | 50 |
| Tabel 4.3 Distribusi responden berdasarkan pemeriksaan kehamilan 7T di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014 | 50 |
| Tabel 4.4 Distribusi responden berdasarkan jenis persalinan 7T di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014 | 51 |
| Tabel 4.5 Distribusi frekuensi pemeriksaan kehamilan 7T dengan jenis persalinan (normal dan <i>sectio caesarea</i>) di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014 | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konsep | 38 |
| Gambar 2.2 Kerangka Kerja | 40 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Master tabel

Lampiran 2 Hasil Penelitian

Lampiran 3 Surat permohonan data awal

Lampiran 4 Surat Izin penelitian

Lampiran 5 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian



ABSTRAK

Nama : Naga Purnamasari
NIM : 70300110066
Judul : Hubungan Pemeriksaan Kehamilan “7T” dengan Jenis Persalinan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar (Dibimbing oleh : Dr. Nur Hidayah, S. Kep. Ns. M. Kes dan dr. Azizah Nurdin, S. Ked)

Antenatal Care (ANC) adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi dan penanganan medik pada ibu hamil, untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Dalam memberikan pelayanan *antenatal* hendaknya menggunakan asuhan standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 1999 menjadi standar “7T” yang dahulunya hanya “5T”. Standar minimal ibu hamil “7T” tersebut yaitu timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi TT, pemberian tablet Fe, tes penyakit menular seksual serta temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. Jenis persalinan terbagi dua yaitu persalinan normal dan persalinan *Sectio caesarea*, persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 sampai dengan 42 minggu), persalinan *Sectio caesarea* adalah suatu tindakan untuk melahirkan bayi melalui dinding abdomen dan dinding uterus.

Untuk mengetahui hubungan pemeriksaan kehamilan “7T” dengan jenis persalinan di rumah sakit khusus daerah ibu dan anak siti Fatimah Makassar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Cross Sectional Studi*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Non probability sampling* jenis *Incidental Sampling*. Data yang dikumpul kemudian diolah dan di analisis menggunakan uji *Chi-Square* untuk melihat hubungan pemeriksaan kehamilan 7T dengan jenis persalinan.

Analisis data dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* dengan $P=0.012$, dimana nilai $p < 0.05$ yang berarti ada hubungan pemeriksaan kehamilan 7T dengan jenis persalinan. Dari penelitian ini ada hubungan pemeriksaan kehamilan 7T dengan jenis persalinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi (janin atau uri) yang telah cukup bulan atau hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Lailiyana, 2011) .

Setiap wanita menginginkan persalinannya berjalan lancar dan dapat melahirkan bayi dengan sempurna. Ada dua cara persalinan yaitu persalinan lewat *vagina* yang lebih dikenal dengan persalinan alami dan persalinan Caesar atau *sectio caearea* yaitu tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi dengan melalui insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram (Winknjosastro, 2007).

World Health Organization (WHO) menetapkan standar rata-rata *sectio caesarea* di sebuah Negara adalah berkisar antara 5 sampai dengan 15 % per 1000 kelahiran di dunia. Rumah sakit pemerintah kira-kira 11% sementara Rumah sakit swasta biasa lebih dari 30% (Gibbson L. et all, 2010). Menurut WHO peningkatan persalinan dengan *sectio caesarea* di seluruh Negara selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 yaitu 110.000 per kelahiran di seluruh Asia (Shinha Kounyeta, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Suryanti Tati (2012) bahwa angka tindakan operasi *caesarea* di Indonesia sudah melewati batas maksimal standar

WHO yaitu 5 sampai dengan 15 %. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RIKESDAS) tahun 2010, tingkat persalinan *sectio caesarea* di Indonesia 15,3% sampel dari 20.591 ibu yang melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang diwawancarai di 33 Provinsi. Gambaran adanya faktor resiko ibu saat melahirkan atau di operasi *caesarea* adalah 13,4% karena ketuban pecah dini, 5,49% preeklampsia, 5,14%, perdarahan, 4,40% karena jalan lahir tertutup, 2,3% karena rahim sobek.

Menurut Bensons dan Pemolls cit. Adjie (2005) angka kematian secara *sectio caesaria* adalah 40 sampai dengan 80 tiap 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan resiko 25 kali lebih besar dibanding persalinan *pervaginam*. Di Negara-negara sedang berkembang sebagian besar penyebab ini adalah perdarahan, infeksi, gestosis, dan abortus. Komplikasi tindakan *anastesi* sekitar 10% dari seluruh angka kematian ibu, angka kesakitan dan kematian lebih tinggi pada persalinan dengan *sectio caesaria* dibandingkan persalinan *pervaginam*, karena ada peningkatan resiko yang berhubungan dengan proses persalinan sampai pada keputusan dilakukan *sectio caesaria* (Steven L, 2008)

Penyebab kematian ini sebenarnya dapat dicegah dengan pemeriksaan kehamilan atau *Antenatal care* (ANC) yang mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai, pertolongan persalinan yang bersih dan aman, serta pelayanan rujukan kebidanan/*perinatal* yang terjangkau pada saat diperlukan. Menurut Depkes RI (2003) komplikasi-komplikasi yang disebutkan

diatas sebagian besar dapat dicegah, bila kesehatan ibu selama hamil selalu terjaga melalui pemeriksaan antenatal yang teratur (Lailiyana, 2011)

Antenatal Care (ANC) adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi dan penanganan medik pada ibu hamil, untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Tujuan *antenatal* yaitu untuk menjaga agar ibu sehat selama masa kehamilan, persalinan dan nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat, memantau kemungkinan adanya resiko-resiko kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan resiko tinggi, serta menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan perinatal (Mufdillah, 2009)

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010, hasil pencapaian indikator cakupan pelayanan K1 Indonesia tahun 2010 sebesar 95,26 % dan K4 sebesar 85,56%. Cakupan K1 Indonesia sudah sesuai dengan target *Millenium Development Goal's* (MDG'S) yaitu 95% sementara K4 masih belum sesuai dengan target MDG'S yaitu 90%. Dari angka pencapaian di atas terlihat ada kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 yang menunjukkan angka *drop out*, dengan kata lain ada ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal tidak meneruskan hingga kunjungan keempat pada trimester ketiga, sehingga kehamilannya tidak dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan.

Dengan cakupan pelayanan antenatal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Propinsi Sulawesi selatan dan kabupaten, Rumah sakit serta Puskesmas khususnya dapat membantu pemerintah dalam menurunkan AKI di

Indonesia melalui pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal diberikan oleh petugas kesehatan baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Pelayanan antenatal diberikan di Puskesmas-puskesmas yang tersebar di Indonesia. Saat ini dalam pelaksanaannya, Puskesmas menghadapi banyak masalah. Sejalan dengan otonomi daerah, puskesmas diupayakan direvitalisasi, antara lain lewat keputusan menteri kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat (Walujani M, 2009)

Dalam memberikan pelayanan antenatal hendaknya menggunakan asuhan standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 1999 menjadi standar “7T” yang dahulunya hanya “5T”. Standar minimal ibu hamil “7T” tersebut yaitu timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi TT, pemberian tablet Fe, tes penyakit menular seksual serta temu wicara dalam rangka persiapan rujukan.

Presentasi cakupan pelaksanaan pelayanan 7T, khusus untuk kunjungan ibu-ibu hamil yang keempat kali (K4) menurut dinas kesehatan Sulawesi selatantahun 2007 dari bulan Januari sampai Desember tercatat sebesar 147.053 jiwa (76%). Cakupan ini berada diatas rata-rata nasional (72,621%), sedangkan jumlah ibu hamil yang berisiko tinggi tercatat sebesar 38.684 jiwa (Profil dinas kesehatan Sulawesi Selatan).

Data statistik yang diperoleh dari RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar pemeriksaan *Antenatal Care*(ANC) (K4) dari 3 tahun terakhir pada tahun 2011 sampai dengan 2013, yaitu pada tahun 2011, berjumlah 3577 jiwa,

Tahun 2012 berjumlah 4032 jiwa, dan terakhir Tahun 2013 yaitu berjumlah 2879 jiwa (Profil RSKD Ibu dan Anak siti Fatimah Makassar).

Beberapa penelitian telah banyak menyebutkan tentang Hubungan *Antenatal Care*(ANC) dengan penolong persalinan dan Gambaran pelaksanaan 7T pada ibu hamil, di beberapa Rumah sakit juga telah mengaplikasikan jenis persalinan apa yang akan dilewati ibu bersalin selama ibu bersalin tersebut melakukan standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan. Tapi dalam proses kehamilan dan persalinan faktor yang sering dianggap remeh namun sebenarnya sangat berpengaruh, yaitu kondisi kehamilan Ibu, dan berhubungan dengan keteraturan yang dijalani ibu memeriksakan kehamilannya dan memilih persalinan yang aman dan nyaman.

Berdasarkan data dan tinjauan diatas, peneliti ingin melihat apakah ada hubungan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan dengan standar 7T terhadap Jenis Persalinan.

B. Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian, “Bagaimana Hubungan Antara Pemeriksaan Kehamilan Standar “7T” dengan Jenis persalinan”?

C. Hipotesis Penelitian

1. H_0 (Hipotesis Nol)

Tidak ada hubungan pemeriksaan kehamilan “7T” dengan jenis persalinan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014.

2. H_a (Hipotesis Alternatif)

Ada hubungan pemeriksaan kehamilan “7T” dengan jenis persalinan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Pemeriksaan kehamilan 7T

Pemeriksaan Kehamilan dengan standar “7T” yaitu, Timbang Berat Badan, Ukur Tekanan Darah, Ukur Tinggi Fundus Uteri, Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid (TT), Pemberian Tablet Fe, Tes Terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS), Temu wicara.

Kriteria objektif :

Lengkap : Pemeriksaan kehamilan memenuhi standar 7T

Tidak lengkap : Pemeriksaan kehamilan tidak memenuhi standar 7T

2. Jenis Persalinan

Persalinan adalah proses untuk mendorong keluar janin dan plasenta dari dalam saluran rahim oleh kontraksi otot-otot rahim (Forrer, 2001).

Kriteria Objektif :

Persalinan normal : Proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala (LBK) dengan tenaga ibu sendiri, tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam.

Persalinan Tindakan:

Persalinan *Sectio caesarea* adalah suatu persalinan dimana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh dan berat janin lebih dari 500 gram.

E. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kematian perinatal dengan frekuensi *antenatal care* di puskesmas gumarang kecamatan kedunggalar kabupaten ngawi (Septina Kurnia dewi, 2009) yaitu probabilitas $p=0,003$ lebih kecil dari $p=0,05$ yaitu bahwa ada hubungan yang bermakna antara kematian perinatal dengan frekuensi *Antenatal Care* (ANC). penelitian sebelumnya (Taguchi et al, 2003) *influence of socio-economic bacground and antenatal care programmes on maternal mortality in surabaya, Indonesia*, yaitu jumlah kunjungan antenatal kurang dari 4 kali meningkatkan resiko kematian ibu. Penelitian sebelumnya (Janson Simanjuntak, 2012) yaitu hasil analisis statistik menunjukkan ada hubungan antara jumlah pemeriksaan antenatal <4 kali dengan persalinan dengan tindakan ($p=0,001$). Ibu dengan jumlah pemeriksaan antenatal >4 kali lebih banyak melakukan persalinan spontan, sebaliknya ibu dengan jumlah pemeriksaan antenatal >4 kali lebih banyak melakukan persalinan dengan tindakan.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk diketahuinya Hubungan Pemeriksaan Kehamilan Standar “7T” dengan Jenis persalinan Di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahuinya hubungan pemeriksaan kehamilan standar “7T” dengan jenis persalinan Normal di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- b. Diketahuinya hubungan pemeriksaan kehamilan standar “7T” dengan jenis persalinan *Sectio Caesarea* di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak Institusi Pendidikan


Sebagai bahan bacaan di Perpustakaan mengenai pemeriksaan kehamilan dengan standar “7T” (Timbang Berat Badan, Ukur Tekanan Darah, Ukur Tinggi Fundus, Pemberian Imunisasi TT, Pemberian Tablet Fe, Tes PMS, Dan Temu wicara).

2. Bagi Rumah Sakit

Sebagai masukan guna meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan antenatal dengan menggunakan asuhan standar “7T” yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Bagi Peneliti

Sebagai penerapan mata kuliah Metodologi Penelitian dan menambah pengalaman dalam penulisan karya ilmiah serta sebagai masukan pengetahuan tentang pelayanan/asuhan standar “7T” (Timbang Berat Badan, Ukur Tekanan Darah, Ukur Tinggi Fundus, Pemberian Imunisasi TT, Pemberian Tablet Fe, Tes PMS, Dan Temu Wicara).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Persalinan

Persalinan atau proses kelahiran adalah peristiwa normal. Proses ini diawali dengan kandungan mengalami kontraksi kemudian menghasilkan penipisan dan pembukaan *serviks* atau jalan lahir. Perubahan pada *serviks* atau jalan lahir ini dibantu dorongan dari ibu dan janin dan akan menghasilkan keluarnya bayi dari kandungan ibu. Terdapat empat faktor yang berperan penting dalam proses kelahiran bayi. Keempat faktor ini bekerja secara bersama-sama untuk keberhasilan suatu proses kelahiran bayi. Jika salah satu faktor berkendala atau tidak sesuai dengan fungsi normalnya maka akan mengganggu proses kelahiran. Proses persalinan atau kelahiran akan terhambat atau bahkan tidak dapat berlangsung normal sehingga perlu pertolongan persalinan dengan cara lain, Misalnya dengan operasi atau persalinan dengan alat yaitu *ekstraksi vakum* (Nisman, Wenny Artanti, 2011)

1. Pengertian persalinan

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya *serviks* dan janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan ketuban di dorong keluar melalui jalan lahir. **Persalinan dan kelahiran normal** adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 sampai dengan 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada

janin (Prawirohardjo, 2006). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. QS.

Al- Imran /3:6

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ



Terjemahannya :

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada tuhan melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha Bijaksana.

Ayat diatas menjelaskan tentang Bagaimana tuhan menciptakan manusia sebagaimana diciptakan dengan kehendaknya dan dengan keinginannya dan didalam rahim ibu manusia diciptakan yaitu melalui proses yang dinamakan kehamilan.

2. Bentuk persalinan

Bentuk persalinan berdasarkan definisi adalah sebagai berikut :

- a. Persalinan spontan, bila persalinan seluruhnya berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri.
- b. Persalinan buatan, bila proses persalinan dengan bantuan tenaga dari luar.
- c. Persalinan anjuran, bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan umur kehamilan dan berat janin yang dilahirkan sebagai berikut:

- a. Abortus (terhentinya dan dikeluarkannya hasil konsepsi sebelum mampu hidup di luar kandungan).
- b. Persalinan prematuritas (persalinan sebelum umur hamil 28 sampai 36 minggu).
- c. Persalinan aterm (persalinan antara umur hamil 37 sampai 42 minggu).
- d. Persalinan serotinus (persalinan melampaui umur hamil 42 minggu).
- e. Persalinan presipitatus (persalinan berlangsung cepat kurang dari 3 jam).

3. Proses terjadinya persalinan

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui secara pasti, sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulai terjadinya kekuatan his (kontraksi otot rahim).

Perlu diketahui bahwa ada dua hormon yang dominan saat hami yaitu

- a. Estrogen yang berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas otot rahim dan memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, rangsangan prostaglanding, dan rangsangan mekanis.
- b. Progesterone yang berfungsi untuk menurunkan sensitivitas otot rahim, menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan

oksitosin, rangsangan prostaglandin, rangsangan mekanis dan juga menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksasi.

Terdapat beberapa teori yang menyatakan kemungkinan terjadinya proses persalinan :

1. Teori keregangan
2. Teori penurunan progesteron
3. Teori oksitosin internal
4. Teori prostaglandin
5. Teori hipotalamus-pituitari dan Glandula suprarenalis.

Bagaimana terjadinya persalinan masih belum dapat dipastikan, besar kemungkinan semua faktor bekerja bersama-sama, sehingga pemicu persalinan menjadi multifaktor. Berdasarkan teori yang dikemukakan, persalinan anjuran (induksi persalinan) dapat dilakukan dengan jalan :

- a. Memecahkan ketuban
- b. Induksi persalinan secara hormonal/kimiawi
- c. Induksi persalinan dengan mekanis
- d. Persalinan dengan tindakan operasi.

4. Tanda persalinan

Gejala persalinan sebagai berikut :

1. Kekuatan his makin sering terjadi dan teratur dengan jarak kontraksi yang semakin pendek.
2. Dapat terjadi pengeluaran pembawa tanda, yaitu berupa pengeluaran lendir, dan lendir bercampur darah.
3. Dapat disertai ketuban pecah.
4. Pada pemeriksaan dalam dijumpai perubahan serviks, dapat berupa per lunakan, pendataran maupun pembukaan serviks.

5. Faktor-faktor penting dalam persalinan

Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam persalinan yaitu :

1. *Power* (his, kontraksi otot dinding perut, kontraksi diafragma pelvis atau kekuatan mengejan, ketegangan dan kontraksi ligamentum rotundum).
2. *Passanger* (janin dan plasenta)
3. *Passange* (jalan lahir lunak dan jalan lahir tulang).

Dalam persalinan masih terdapat subfaktor yang mempengaruhi jalannya persalinan sehingga dapat terjadi kemungkinan (1) persalinan yang berlangsung dengan kekuatan sendiri yang disebut dengan persalinan etosia dan (2) persalinan yang berlangsung dan menyimpang dari kekuatan sendiri disebut persalinan persalinan distosia.

Persalinan letak belakang kepala dan berlangsung spontan terjadi paling banyak. Persalinan di Indonesia terutama dipedesaan sebagian besar ditolong oleh tenaga nonmedis yang disertai berbagai penyulit kelahiran sampai kematian. Penyebab kematian ibu adalah perdarahan, infeksi, pre-eklampsia dan eklampsia.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan

Periode kelahiran merupakan periode dengan angka kematian tertinggi dari seluruh periode kehidupan manusia. Hal ini karena banyak faktor yang turut menentukan lancar tidaknya suatu proses persalinan, yaitu faktor ibu, faktor keadaan *plasenta* dan tali pusat, faktor bayi dan faktor penolong persalinan.

a. Faktor Ibu

Kemampuan ibu dalam persalinan baik fisik maupun mental (tenaga, kontraksi *uterus*, semangat, sakit, tidak sadar), dan lain-lain. Keadaan jalan lahir, bila terdapat kelainan atau abnormalitas pada jalan lahir (panggul sempit, *tumordan* lain-lain) dapat menimbulkan kesulitan berupa kemacetan persalinan.

b. Faktor keadaan *Plasenta*

Bila terjadi *solusio plasenta* (pelepasan sebagian plasenta dari dinding rahim sebelum bayi lahir) dapat mengakibatkan gawat janin. Letak *plasenta* yang memungkinkan *plasenta* robek ketika selaput ketuban pecah dapat mengakibatkan perdarahan dan gawat janin.

c. Keadaan Tali pusat

Bila tali pusat tertanam diluar *plasenta* dapat menyebabkan terjadinya perdarahan ketika selaput janin robek dan mengenai pembuluh darah yang menghubungkan tali pusat dengan *plasenta*, janin bisa meninggal akibat perdarahan. Bila terdapat lilitan tali pusat yang sangat kuat atau tali pusat menumbung dan tertarik atau terjepit katika proses kelahiran dapat menimbulkan gawat janin.

d. Faktor Bayi

Besarnya bayi, posisi bayi ketika lahir yang normal adalah letak kepala (merupakan frekuensi terbanyak) yaitu presentasi kepala dengan ubun-ubun kecil sebagai bagian terdepan. Letak/posisi bayi yang tidak normal, misalnya: melintang presentasi muka, presentasi tangan/kaki dan lain-lain dapat menimbulkan *dystocia*. Trauma tindakan berupa penarikan-penarikan terhadap janin, dapat menimbulkan *fraktur* pada bagian tubuh tertentu, merusak jaringan termasuk jaringan saraf dan otak, bahkan kalau gagal dapat menimbulkan kematian janin.

e. Faktor Penolong Persalinan

Walaupun pada mulanya keadaan ibu dan janin baik, dapat saja tiba-tiba berubah menjadi tidak baik akibat kesalahan penolong. Kesalah tersebut dapat berupa tidak tepatnya memimpin persalinan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan misalnya memberi suntikan *uterotonika*

tidak tepat atau pada keadaan patologis salah mengambil sikap / tindakan atau tidak mampu melakukan pertolongan (Ilyas, 2007).

7. Proses persalinan

Persalinan terbagi atas 4 tahap, yaitu:

- a. Kala I dimulai dari saat persalinan mulai sampai pembukaan lengkap (10 cm).
- b. Kala II dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir.
- c. Kala III dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya *plasenta*.
- d. Kala IV yaitu dimulai dari saat lahirnya *plasenta* sampai 2 jam pertama *post partum* (Prawirohardjo, 2002).

B. Tinjauan Umum Persalinan *Sectio Caesarea*

1. Pengertian *Sectio caesarea* (SC)

Sectio caesarea (SC) adalah suatu tindakan untuk melahirkan bayi per abdominal dengan melalui insisi pada dinding abdomen dan dinding uterus interior, biasanya yang sering dilakukan insisi segmen bawah transversal (Farrer, 2001). *Sectio caesarea* (SC) adalah melahirkan janin melalui insisi pada dinding abdomen (laparotomy) dan dinding uterus (histeretomi). Indikasi SC antara lain : disproporsi janin-panggul, gawat janin *plasenta previa*, riwayat SC, kelainan letak partus tak maju, kehamilan dengan resiko tinggi, *pre-eklampsia* dan *hipertensi* (Cunningham, 2006).

2. Indikasi Persalinan *Sectio Caesarea*

Menurut Reeder, et.al. (2011), indikasi persalinan *sectio caesarea* terdiri atas faktor ibu, faktor janin, faktor plasenta atau kombinasi satu dengan yang lain. Faktor ibu terdiri atas penyakit ibu yang berat (seperti penyakit jantung berat, diabetes mellitus, preeklamsia berat atau eklampsia, dan kanker serviks) atau infeksi berat (virus herpes simpleks tipe II atau herpes genitalis dalam fase aktif atau dalam 2 minggu lesi aktif). Penyakit tersebut membutuhkan persalinan *sectio caesarea* karena beberapa alasan: (1) untuk mempercepat persalinan dalam suatu kondisi yang kritis; (2) karena ibu dan janinnya tidak mampu menoleransi persalinan; (3) janin akan terpajan dengan risiko bahaya yang meningkat saat melalui jalan lahir. Faktor ibu yang lain adalah pembedahan uterus sebelumnya, termasuk miomektomi, persalinan *sectio caesaria* sebelumnya dengan insisi klasik, rekonstruksi uterus, dan obstruksi jalan lahir karena adanya fibroid atau tumor ovarium.

Faktor janin terdiri atas gawat janin, seperti janin dengan kasus prolaps tali pusat, insufisiensi uteroplasenta berat, dan malpresentasi (seperti letak melintang, janin dengan presentasi dahi). Kehamilan ganda dengan bagian terendah janin kembar adalah pada posisi melintang bokong. Faktor plasenta berupa plasenta previa dan solusio plasenta (pemisahan plasenta sebelum waktunya). Faktor kombinasi antara faktor ibu dan janin pada umumnya adalah distosia (kemajuan persalinan abnormal) yang ditunjukkan sebagai suatu “kegagalan kemajuan” dalam persalinan. Hal ini kemungkinan berhubungan

dengan ketidaksesuaian antara ukuran panggul dan ukuran kepala janin (disproporsi sefalopelvik), kegagalan induksi, atau aksi kontraksi uterus yang abnormal.

3. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Persalinan *Sectio Caesarea*

a. Usia Ibu

Usia merupakan salah satu tolak ukur kesiapan seorang ibu untuk melahirkan, dimana usia ideal untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan adalah usia 20-35 tahun. Wanita berusia kurang dari 20 tahun biasanya memiliki kondisi psikis yang belum matang serta kemampuan finansial yang kurang mendukung, sementara wanita berusia lebih dari 35 tahun cenderung mengalami penurunan kemampuan reproduksi (Harnowo, 2013).

b. Paritas

Paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan. Paritas merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan kehamilan dan persalinan. Persalinan yang pertama sekali biasanya mempunyai risiko relatif tinggi terhadap ibu dan anak, kemudian risiko ini menurun pada paritas kedua dan ketiga, dan akan meningkat lagi pada paritas keempat dan seterusnya (Mochtar, 1998). Ibu yang sering melahirkan memiliki risiko mengalami komplikasi persalinan pada kehamilan berikutnya apabila tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi. Pada paritas lebih dari empat keadaan rahim biasanya sudah lemah yang

dapat menimbulkan persalinan lama dan pendarahan saat kehamilan (Depkes RI, 2003)

c. Kadar Hb

Kadar Haemoglobin (Hb) merupakan salah satu indikator status gizi seseorang. Selama kehamilan, anemia lazim terjadi dan biasanya disebabkan oleh defisiensi besi sekunder karena kebutuhan besi seorang ibu hamil akan meningkat sebagai suplai besi untuk janin. Kadar Hb menunjukkan status anemia. Ibu yang mempunyai kadar Hb < 11 gr % berarti menderita anemia.

d. Riwayat Persalinan

Persalinan *sectio caesarea* dengan irisan perut dan rahim secara vertikal membuat ibu hamil rentan mengalami perobekan pada rahim saat mengejan pada proses persalinan normal yang dapat berpotensi menyebabkan perdarahan. Oleh karena itu, untuk menghindari morbiditas dan mortalitas pada ibu dengan riwayat *sectio caesarea* terutama *sectio caesarea* dengan irisan vertikal, maka persalinan *sectio caesarea* menjadi pilihan (Anonim, 2009).

3. Tipe-tipe *Sectio caesarea*

Menurut Farrer (2001), tipe-tipe *Sectio caesarea* adalah :

a. Segmen bawah : insisi melintang

Pada bagian segmen bawah uterus dibuat insisi melintang yang kecil, luka ini dilebarkan ke samping dengan jari-jari tangan dan berhenti didekat daerah pembuluh-pembuluh darah uterus. Kepala janin yang pada sebagian

besar kasus terletak dibalik insisi diekstraksi atau didorong, diikuti oleh bagian tubuh lainnya dan kemudian plasenta serta selaput ketuban.

b. Segmen Bawah : Insisi Membujur

Cara membuka abdomen dan menyingkapkan uterus sama seperti pada insisi melintang. Insisi membujur dibuat dengan skapel dan dilebarkan dengan gunting tumpul untuk menghindari cedera pada bayi.

c. *Sectio caesarea* klasik

Insisi longitudinal digaris tengah dibuat dengan skapel ke dalam dinding anterior uterus dan dilebarkan ke atas serta ke bawah dengan gunting berujung tumpul. Diperlukan luka insisi yang lebar karena bayi dilahirkan dengan presentasi bokong dahulu, janin atau plasenta dikeluarkan dan uterus ditutup dengan jahitan tiga lapis.

d. *Sectio Caesarea* Ekstra Peritoneal

Pembedahan ekstra peritoneal dikerjakan untuk menghindari perlunya *histerektomi* pada kasus-kasus yang mengalami infeksi luas dengan mencegah *peritonitis generalisasi* yang sering bersifat fatal.

4. Komplikasi *Sectio caesarea*

Komplikasi *Sectio Caesarea* Menurut Farrer (2001) adalah :

- a. Nyeri pada daerah insisi
- b. Perdarahan primer sebagai akibat kegagalan mencapai *homeostatis* karena insisi rahim atau akibat *atonia uteri* yang dapat terjadi setelah pemanjangan masa persalinan.

- c. Sepsis setelah pembedahan, frekuensi dari komplikasi ini lebih besar bila *Sectio caesarea* dilaksanakan selama persalinan atau bila terdapat infeksi dalam rahim.
- d. Cidera pada sekeliling struktur usus besar, kandung kemih yang lebar dan *ureter*.
- e. Infeksi alibat luka pasca operasi.
- f. Bengkak pada ekstremitas bawah.
- g. Gangguan laktasi.
- h. Penurunan elastisitas otot perut dan otot dasar panggul, dan
- i. Potensi terjadinya penurunan kemampuan fungsional.

C. Konsep Dasar Antenatal Care(ANC)

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya lahir normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Proses kehamilan sampai kelahiran merupakan mata rantai satu kesatuan dari konsepsi, nidasi, pengenalan adaptasi ibu terhadap nidasi, pemeliharaan kehamilan, dimana kehamilan yang sehat dan kondisi fisik yang aman dan keadaan emosi yang memuaskan baik bagi ibu maupun janinnya. Hasil akhir yang diharapkan dari perawatan maternitas *supervise* dan pengawasan kesehatan yang konsisten sangat penting. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Hajj: 22/5

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^ج وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ^ط وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^ح

Terjemahannya :

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya.

Ayat diatas dapat dihubungkan pada wanita yang sedang hamil bahwa akan terlihat tanda-tanda pasti kehamilan. Seorang ibu dipastikan hamil apabila semua pemeriksaan kehamilan/*antenatal care*(ANC) dilakukan dan sangat penting untuk dapat memperoleh suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan atau mendeteksi secara dini adanya penyakit selama masa kehamilan.

Antenatal care (ANC) mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan perinatal. Dianjurkan, agar

pada setiap kehamilan, dilakukan *antenatal care*(ANC)secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang lazim berlaku.(Manuaba,2003)

1. Pengertian *Antenatal Care*(ANC)

Antenatal Care (ANC) adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditentukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim (Mannuaba Ibg, 2005 :93).

Asuhan antenatal (*antenatal care*) meliputi pengawasan terhadap kehamilan untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan umum ibu, menegakkan secara dini penyakit yang menyertai kehamilan, menegakkan secara dini komplikasi kehamilan, dan menetapkan resiko kehamilan (resiko tinggi, resiko meragukan, atau resiko rendah). Asuhan antenatal juga untuk menyiapkan persalinan menuju kelahiran bayi yang baik (*well born baby*) dan kesehatan ibu yang baik (*well health mother*), mempersiapkan pemeliharaan bayi dan laktasi, memfasilitasi pulihnya kesehatan ibu yang optimal pada saat akhir kala nifas. (Manuaba, 2008)

2. Tujuan *Antenatal Care*

Tujuan *Antenatal Care*(ANC) ini ialah untuk mengetahui data kesehatan ibu hamil dan perkembangan bayi *intrauterine* sehingga kesehatan yang optimal, dicapai dalam menghadapi persalinan, *puerperium*, dan *laktasi*, serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pemeliharaan bayinya (Manuaba,2003).

Derek Jones Liewellyn, 2001 mengemukakan bahwa tujuan perawatan *antenatal* adalah mengusahakan agar :

- 1) Ibu sampai pada akhir kehamilan sama sehatnya atau lebih sehat dari pada sebelum hamil.
- 2) Setiap problema fisik atau psikologi yang timbul semasa kehamilan dapat di deteksi dan diobati.
- 3) Setiap komplikasi kehamilan dapat dicegah atau dideteksi secara dini dan diberi penatalaksanaan secara adekuat.
- 4) Ibu dapat melahirkan anak yang sehat.
- 5) Ibu mempunyai kesempatan membahas kecemasan dan ketakutannya tentang kehamilan.
- 6) Ibu diberitahu tentang setiap tindakan, alasan dilakukan tindakan tersebut dan hasil yang mungkin dicapai.
- 7) Pasangan dipersiapkan untuk kelahiran dan membesarkan anak, termasuk mendapatkan informasi mengenai *diet*, perawatan anak dan keluarga berencana.

Hasil akhir kehamilan yang diharapkan adalah kelangsungan hidup ibu dan bayinya. Tujuan perawatan *antenatal* lebih dari itu bukan hanya kelangsungan hidup yang baik tetapi juga kualitas hidup yang baik. Dalam hubungannya dengan hasil akhir kehamilan kualitas yang baik berarti ibu yang sehat dengan bayi yang sehat dan ibu mengetahui cara merawat bayi serta dirinya (Hellen Farrer, 2005).

3. Tenaga dan Lokasi Pelaksanaan *Antenatal Care*(ANC)

Untuk melakukan *antenatal care*(ANC) ibu hamil dapat dibantu oleh tenaga kesehatan seperti: dokter spesialis ginekologi, dokter, perawat, bidan maupun tenaga terlatih seperti dukun bersalin terlatih. Pelayanan *antenatal care*(ANC) dapat diakses di Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah sakit maupun di klinik dokter praktek swasta (Depkes RI, 2001).

4. Indikator Pemantauan

Dalam Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) (Depkes RI, 2004) indikator pemantauan cakupan antenatal adalah:

1. Cakupan K1 (Akses Pelayanan Antenatal)

K1 adalah kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan, waktu terbaik untuk melakukan kunjungan awal pada kehamilan adalah saat wanita tersebut merasakan bahwa dirinya kemungkinan hamil. Biasanya terjadi pada 10 minggu kehamilan menurut Indrayani (2011).

Menurut Saifuddin (2002), ibu hamil sebaiknya mengunjungi bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ibu merasa dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal.

Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

2. Cakupan pelayanan ibu hamil (Cakupan K4)

K4 adalah ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke-empat untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, dengan syarat : minimal satu kali kontak pada triwulan I, minimal satu kali pada triwulan II dan minimal dua kali pada triwulan III.

Dengan indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan *antenatal* secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA.

Sedangkan target proses *Program Making Pregnancy Safer* untuk cakupan pelayanan antenatal yang ditetapkan pada tahun 2010 menurut Depkes (2001) adalah dengan meningkatkan cakupan pelayanan antenatal 1x (K1) menjadi 95% termasuk cakupan (Fe1, TT 1) dan meningkatkan cakupan pelayanan antenatal 4x (K4) menjadi 90% termasuk cakupan (Fe3 dan TT2 / TT ulang), Depkes (2001).

5. Standar Pelayanan Antenatal

a. Identifikasi Ibu Hamil

Melakukan kunjungan rumah dengan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami

dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur.

b. Pemeriksaan Dan Pemantauan Antenatal

Memberikan sedikitnya 4× pelayanan *antenatal*. Pemeriksaan meliputi *anamnesa* dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal.

c. Palpasi Abdominal

Melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperbaiki usia kehamilan, serta bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu.

d. Pengelolaan Anemia Pada Kehamilan

Melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pengelolaan Dini Hipertensi Pada Kehamilan

Menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda-tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya.

f. Persiapan Persalinan

Memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih, dan aman serta suasana yang menyenangkan, disamping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat (Ika Pantiawati, 2010).

6. Jadwal kunjungan Antenatal Care

a. Frekuensi Kunjungan Antenatal Care

Kunjungan ibu hamil adalah kontak antara ibu hamil dan petugas kesehatan yang memberi pelayanan antenatal untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Istilah kunjungan tidak mengandung arti bahwa selalu ibu hamil yang datang ke fasilitas pelayanan tetapi dapat juga sebaliknya yaitu ibu hamil yang dikunjungi petugas kesehatan di rumah.

Selama kehamilan keadaan ibu dan janin harus selalu di pantau jika terjadi penyimpangan dari keadaan normal dapat dideteksi secara dini dan diberikan penanganan yang tepat. Oleh karena itu ibu hamil diharuskan memeriksakan diri secara berkala selama kehamilannya. Menurut Manuaba (1999), berdasarkan standar pemeriksaan kehamilan dilakukan berulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah diketahui terlambat haid.
- b) Satu kali dalam sebulan sampai umur kehamilan 7 bulan
- c) Dua kali sebulan sampai umur kehamilan 8 bulan
- d) Setiap minggu sejak umur kehamilan 8 bulan sampai dengan bersalin.

Dalam pelaksanaan *Antenatal Care* (ANC) terdapat kesepakatan adanya standar adanya minimal yaitu dengan pemeriksaan *Antenatal care* (ANC) 4 kali selama kehamilan distribusi sebagai berikut:

a. Trimester I dan II

1. Sebulan sekali
2. Pengambilan data hasil pemeriksaan laboratorium
3. Pemeriksaan ultrasonografi
4. Nasihat diet : empat sehat lima sempurna, protein 0,5/ kg BB, ditambah satu telur/hari
5. Observasi : penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan, komplikasi kehamilan.
6. Rencana : mengobati penyakit, menghindari terjadinya komplikasi kehamilan I/II, imunisasi tetanus I

b. Trimester III

1. Setiap dua minggu, kemudian seminggu sampai tanda kelahiran tiba.
2. Evaluasi data laboratorium untuk melihat hasil pengobatan.
3. Diet empat sehat lima sempurna.
4. Pemeriksaan ultrasonografi.
5. Imunisasi tetanus II.
6. Observasi : penyakit yang menyertai kehamilan, komplikasi hamil trimester III, berbagai kelainan kehamilan trimester III.
7. Rencana pengobatan

8. Nasihat dan petunjuk tentang : tanda inpartu, kemana harus datang untuk melahirkan.

Berdasarkan uraian diatas berikut ini akan digambarkan jadwal/frekuensi antenatal care sebagai berikut :

Tabel 2.1
Frekuensi / Jadwal Pemeriksaan Kehamilan .

| Minimal | Frekuensi | Optimal | Frekuensi | Ideal | Frekuensi |
|-----------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| Triwulan I | 1 | Kehamilan 1-12 minggu kehamilan 12-28 minggu | 1 1 | sejak haid 1 bulan | 1 |
| Triwulan II | 1 | kehamilan 28 minggu | 2 | kehamilan 28 minggu (1 bulan 1 kali) | 5 |
| Triwulan III | 2 | kehamilan 32-40 minggu kehamilan 41-42 minggu | 3 2 | kehamilan 28-36 minggu (2 minggu 1 kali) kehamilan > 37 minggu 1 minggu 1 kali | 4 5 |
| Total | 4 | | 9 | | 15 |

Sumber : Dep. Kes RI, 2008 : 24, Jumiarni, 2008 : 34.

Dari tabel diatas dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Frekuensi pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali (Dep.Kes.RI, 2010)
Frekuensi pemeriksaan kehamilan dilakukan 4 kali yang terbagi dalam triwulan I, II, III. Frekuensi ini dapat terjadi bila segalanya normal tanpa

adanya resiko dan frekuensi lebih sering dilakukan pada triwulan III untuk deteksi dini terhadap kelainan.

2. Frekuensi pemeriksaan kehamilan optimal 9 kali (Jumiarni, 2011).

Pemeriksaan kehamilan dilakukan sejak haid terlambat sampai dengan usia kehamilan 12 minggu 1 kali. Pemeriksaan tiap 1 bulan sekali dilakukan sampai dengan usia kehamilan 36 minggu, sedangkan pemeriksaan kehamilan 36 – 40 minggu dilakukan 2 minggu sekali dan sampai dengan melahirkan pemeriksaan dilakukan 1 minggu sekali. Dengan frekuensi demikian adanya penyulit kehamilan dapat dideteksi dan diatasi sedini mungkin.

3. Frekuensi pemeriksaan kehamilan ideal (Manuaba, 2012)

Pemeriksaan kehamilan dilakukan sejak terlambat haid satu bulan sampai dengan usia kehamilan 28 minggu dilakukan satu bulan satu kali. Pada usia kehamilan 28 - 36 minggu sampai dengan melahirkan pemeriksaan dilakukan 1 minggu sekali. Pemeriksaan kehamilan ini yang paling ideal sehingga diharapkan dengan frekuensi seperti ini penyulit kehamilan dapat terdeteksi dan diatasi sedini mungkin. Menurut manuaba (2000), jadwal melakukan *Antenatal Care* (ANC) sebaiknya 4 kali sudah cukup (tercatat).

D. Gambaran Umum Tentang Pemeriksaan Kehamilan “7T”

Dalam pelayanan antenatal/asuhan kehamilan standar minimal yang harus dilaksanakan termasuk 7 T, antara lain :

1. Timbang berat badan

Kekurangan atau kelebihan nutrisi dapat menyebabkan kelainan yang tidak diinginkan ibu hamil tersebut, kekurangan makanan dapat menyebabkan anemia, abortus, partus prematurus, inersia uteri dan sebagainya. Sedangkan makanan secara berlebihan karena adanya salah persepsi bahwa ibu hamil makan untuk dua orang dapat pula mengakibatkan komplikasi antara lain preeklampsi, bayi terlalu besar dan sebagainya. Kenaikan berat badan wanita hamil rata-rata 6,5 sampai dengan 16 kg (anjuran kenaikan berat badan disesuaikan dengan Indeks Massa Tubuh). Bila berat badan naik lebih dari semestinya anjurkan untuk mengurangi karbohidrat, lemak jangan kurangi apalagi sayur mayur dan buah-buahan. Bila berat badan tetap saja atau menurun, semua makanan dianjurkan terutama makanan yang mengandung protein dan zat besi.

2. Ukur tekanan darah

Tekanan darah harus diperiksa secara tepat dan benar. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Posisi ibu saat dilakukan pemeriksaan sebaiknya posisi tidur (setengah duduk), jangan mengukur tekanan darah langsung saat ibu datang tapi persilahkan ibu untuk istirahat sebentar sebelum dilakukan pemeriksaan, karena aktivitas ibu akan menimbulkan kenaikan tekanan darah sehingga hasilnya menjadi tidak akurat.

3. Ukur Tinggi Fundus Uteri

Tinggi Fundus Uteri (TFU) dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin. Mengukur *Tinggi Fundus Uteri* (TFU) bisa menggunakan jari pada kehamilan kurang dari 22 minggu dan menggunakan sentimeter \geq 22 minggu.

4. Pemberian imunisasi Tetanus Toxoid (TT) lengkap

Imunisasi TT yang diberikan kepada ibu hamil sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya *neonatorum*. Program imunisasi TT yaitu :

Tabel 2.2
Jadwal Imunisasi Tetanus Toxoid Dan Lama Perlindungan

| Antigen | Interval (selang waktu minimal) | Lama perlindungan | % Perlindungan |
|---------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| TT1 | Pada kunjungan antenatal pertama | - | - |
| TT2 | 4 minggu setelah TT1 | 3 tahun | 80% |
| TT3 | 6 bulan setelah TT2 | 5 tahun | 95% |
| TT4 | 1 tahun setelah TT3 | 10 tahun | 99% |
| TT5 | 1 tahun setelah TT4 | 25 tahun/seumur hidup | 99% |

Sumber : Buku ajar Asuhan Kehamilan, 2011

Keterangan : apabila dalam waktu 3 tahun wanita usia subur tersebut melahirkan maka bayi yang dilahirkan akan terlindung dari *tetanus neonatorum*.

5. Pemberian tablet besi, minimum 90 tablet selama kehamilan

Dimulai dengan memberikan 1 tablet besi sehari sesegera mungkin setelah rasa mual hilang. Tiap tablet besi mengandung FeSO₄ 320 mg (zat

besi 60 mg) dan asam folat 500 mikrogram. Minimal masing-masing 90 tablet besi. Tablet besi sebaiknya tidak diminum bersama teh atau kopi karena akan mengganggu penyerapan. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C bersamaan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung tablet besi karena vitamin C dapat membantu penyerapan tablet besi sehingga tablet besi dikonsumsi dapat terserap sempurna oleh tubuh.

6. Tes Terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS)

Wanita termasuk yang sedang hamil merupakan kelompok resiko tinggi terhadap PMS. Penyakit Menular Seksual (PMS) dapat menimbulkan morbiditas dan mortalitas terhadap ibu maupun janin yang dikandung. Pada asuhan kehamilan dilakukan anamnesa kehamilan resiko terhadap PMS meliputi penapisan, konseling dan terapi PMS.

7. Temu Wicara

Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan ini melibatkan ibu, suami, keluarga dan masyarakat, meliputi : mengidentifikasi rencana atau rujukan dan bentuk transportasi untuk mencapai tempat tersebut, membuat rencana penyediaan donor darah, mengadakan rencana persiapan finansial, mengidentifikasi seorang pembuat keputusan kedua bila pembuat keputusan pertama tidak ada ditempat.

Komponen antenatal minimal menurut Riset Kesehatan Dasar(RISKESDAS) tahun 2010 yaitu pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi fundus, pemberian

imunisasi Tetanus Toxoid (TT), pemberian tablet tambah darah (tablet Fe) selama kehamilan. Pelayanan ini hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan dan tidak dapat dilakukan oleh dukun bayi. (Ika Pantikawati, 2010)

Tabel 2.3
Ringkasan Penilaian Klinik dan Penanganan Kehamilan

| Penilaian antenatal | Kunjungan I | Kunjungan II | Kunjungan III | Kunjungan IV |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Riwayat kehamilan | √ | √ | √ | √ |
| Riwayat kebidanan | √ | | | |
| Riwayat kesehatan | √ | | | |
| Riwayat social | √ | | | |
| Pemeriksaan keseluruhan (umum) | √ | Jika ada indikasi | Jika ada indikasi | Jika ada indikasi |
| Pemeriksaan kebidanan (luar) | √ | √ | √ | √ |
| Pemeriksaan kebidanan (dalam) | √ | Jika ada indikasi | Jika ada indikasi | Jika ada indikasi |
| Pemeriksaan laboratorium | √ | Jika ada indikasi | Jika ada indikasi | Cek kembali Hemoglobin, dan pemeriksaan laboratorium lain jika ada indikasi |
| Penanganan | | | | |
| Pemberian Tetanus Toxoid | TT1 (0,5 cc) | TT1 (0,05 cc) | | |
| Pemberian tablet tambah darah | 90 hari | | | |
| Konseling umum | √ | memperkuat | memperkuat | memperkuat |
| Konseling khusus | Jika ada indikasi | Jika ada indikasi | Jika ada indikasi | Jika ada indikasi |
| Perencanaan persalinan | | | √ | √ |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Perencanaan penanganan komplikasi | √ | √ | √ | √ |
|-----------------------------------|---|---|---|---|

Sumber; buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan Neonatal, 2002

Keterangan; √= dilakukan pemeriksaan

Adapun jadwal kunjungan ulang yaitu sebagai berikut :

1. Kunjungan I (16 minggu), dilakukan kunjungan pertama ini adalah untuk :
 - a. penapisan dan pengobatan
 - b. perencanaan persalinan
 - c. pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatan
2. Kunjungan II (24-28 minggu) dan kunjungan (32 minggu), dilakukan untuk :
 - a.pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatan
 - b. penapisan pre-eklampsia, *gemelli*, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan.
 - c. mengulang perencanaan persalinan.
3. Kunjungan IV 36 minggu sampai lahir
 - a. sama seperti kegiatan kunjungan II dan III
 - b. mengenali adanya kelainan letak dan presentasi
 - c. memantapkan rencana persalinan
 - d. mengenali tanda-tanda persalinan


E. Dasar pemikiran Variabel Yang Diteliti

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan Pemeriksaan Kehamilan 7T dengan Jenis Persalinan di Rumah Sakit Ibu dan

Anak Siti Fatimah Makassar. banyak faktor yang mempengaruhi tentang tingkat kepatuhan Ibu memeriksakan kehamilannya dengan kejadian persalinan yang tidak diinginkan. cara terbaik untuk menginginkan kehamilan dan persalinan yang sehat dan lancar yaitu dengan keteraturan *Antenatal Care*(ANC) yaitu kedisiplinan/kepatuhan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan sebelum anak lahir terutama ditujukan pada anak. kunjungan *Antenatal* untuk pemanfaatan dan pengawasan kesejahteraan ibu dan anak minimal empat kali selama kehamilan dalam waktu sebagai berikut: satu kali kunjungan selama trimester satu (<14 minggu), satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-28) dan Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36 dan sesudah minggu ke 36). (Saifuddin, 2002)

F. Kerangka konsep penelitian


Dalam penelitian ini akan di uraikan mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu hubungan pemeriksaan kehamilan “7T” dengan Jenis persalinan.



Keterangan:



: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Variabel yang diteliti




: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 2.1 kerangka Konsep

G. Kerangka Kerja





Gambar 2.2 Kerangka Kerja

H. Variabel Yang Diteliti

Variabel Penelitian :

1. Variabel dependen (terikat)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah semua k Ibu yang melahirkan dengan Jenis persalinan normal dan *Sectio Caesarea* di RSKD Ibu dan Anak siti Fatimah Makassar.

2. Variabel Independen (bebas)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ibu yang memeriksakan kehamilannya dengan standar “7T” di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan *Cross Sectional Study*. *Cross Sectional Study* adalah suatu rancangan penelitian untuk mengkaji dinamika hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan jenis pemeriksaan kehamilan “7T” dengan Jenis Persalinan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014 sampai 13 Juni 2014

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi merupakan seluruh subjek atau seluruh objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti dan bukan subjek atau objek yang di pelajari saja, tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek tertentu (Azis, 2008)

populasi dalam penelitian berjumlah 148 orang yaitu semua ibu yang melahirkan Di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar yang memiliki buku kesehatan ibu dan anak.

2. Sampel

Dalam penelitian ini pemilihan sampel dilakukan dengan cara *Non probability sampling* jenis *Incidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Setiadi, 2007)

Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pemeriksaan kehamilan 7T dengan jenis persalinan normal dan *Sectio caesarea* maka besar sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah sebanyak 50 sampel.

a. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti.

Pertimbangan ilmiah harus menjadi pedoman saat menentukan kriteria inklusi (Nursalam, 2008). Kriteria inklusi dalam sampel ini adalah :

- 1) Ibu yang melahirkan bayi dengan Persalinan normal yang memiliki buku kesehatan ibu dan anak dan bersedia menjadi responden di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- 2) Ibu yang melahirkan bayi dengan persalinan *Sectio Caesaria* yang memiliki buku kesehatan ibu dan anak dan bersedia menjadi responden di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

b. Kriteria Ekslusi

- 1) Ibu yang melahirkan bayi dengan persalinan normal yang tidak bersedia menjadi responden di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- 2) Ibu yang melahirkan bayi dengan persalinan *Sectio Caesaria* yang tidak bersedia menjadi responden di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- 3) Tidak berada di tempat saat penelitian berlangsung.

D. Instrument Pengumpulan Data

Instrument dalam penelitian ini menggunakan instrument observasi yaitu dengan cara melakukan observasi kepada Ibu yang melahirkan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dengan melakukan penilaian ibu yang bersalin normal dan *sectio caesarea* dengan melihat buku kesehatan ibu dan anak, dibuku pemeriksaan kehamilan dengan menilai dan menghubungkan apakah ibu betul-betul melakukan pemeriksaan *antenatal* dengan lengkap atau tidak lengkap.

E. Pengolahan Data

1. Penyuntingan data (*editing*)

Dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. Yakni upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan.

2. Pengkodean (*coding*)

Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data. *Coding* merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting, biasanya dibuat juga daftar kode untuk memudahkan kembali melihat lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel.

3. *Entri data*

Data entri adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel. Kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontingendi.

4. Melakukan teknik analisis

Dalam melakukan teknik analisis, khususnya terhadap data penelitian dengan menggunakan komputer program SPSS.

F. Analisa data

Data yang telah disunting kemudian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif berfungsi untuk meringkas, mengklasifikasi, dan menyajikan data. Analisis ini merupakan langkah awal untuk melakukan analisis dan uji statistik lebih lanjut.

1. Analisa Univariat

Analisis univariate dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil setiap penelitian. Analisa ini menghasilkan distribusi dan presentase dari setiap variabel yang diteliti.

2. Analisa Bivariate

Analisis bivariate dilaksanakan untuk mengetahui adanya hubungan variabel dependen terhadap variabel independen dengan menggunakan statistik. Dalam penelitian ini analisis bivariate dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan antenatal care dengan jenis persalinan. Uji statistik yang dipakai untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel

dependen yaitu dengan menggunakan sistem komputerisasi SPSS versi 18 dengan uji *chi-square* memiliki kemaknaan $\alpha=0,05$.

Chi square adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas dan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang dimaksud hipotesis deskriptif disini bisa merupakan estimasi terhadap ada tidaknya perbedaan frekuensi antara kategori satu dan kategori lain dalam sebuah sampel tentang suatu hal.

G. Etika penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung (Hidayat. A. A, 2007). Etika yang perlu dan harus diperhatikan adalah :

1. Lembar persetujuan (*Informed consent*)

Cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Hal tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian.

2. Tanpa nama (*Anonymity*)

Merupakan masalah etika dalam penelitian keperawatan dengan cara tidak memberi nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menandakan kode pada lembar pengumpul data.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar yaitu di ruang *post natal care* (PNC) dan pengambilan datanya dilakukan pada tanggal 26 sampai 13 juni 2014 dengan jumlah populasi 148 ibu yang melahirkan normal dan *sectio caesarea* jumlah sampel sebanyak 50 orang.

Hasil penelitian ini diperoleh dari buku kesehatan ibu dan anak dengan lembaran observasi dan merupakan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan komputer dengan menggunakan program SPSS sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Berikut ini peneliti akan menyajikan analisa univariat pada tiap variabel dalam bentuk tabel distribusi frekuensi serta analisa bivariat untuk mengetahui hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen dengan menggunakan uji *Chi-Square* dengan nilai $p < 0.05$.

1. Karakteristik responden

a. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan, pekerjaan, umur, jenis komplikasi.

Tabel 4.1

Karakteristik responden yang memeriksakan kehamilan dan melahirkan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2014

| Karakteristik | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------|-----------|----------------|
| Pendidikan | | |
| SD | 7 | 14.0 |
| SLTA | 7 | 14.0 |
| SMA | 13 | 26.0 |
| S1 | 23 | 46.0 |
| Total | 50 | 100.0 |
| Pekerjaan | | |
| IRT | 21 | 42.0 |
| WIRASWASTA | 15 | 30.0 |
| PNS | 14 | 28.0 |
| Total | 50 | 100.0 |
| Umur | | |
| < 20 Tahun | 12 | 24.0 |
| 20-35 Tahun | 27 | 54.0 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| >35 Tahun | 11 | 22.0 |
| Total | 50 | 100.0 |

Pada tabel menunjukkan bahwa karakteristik responden yang memeriksakan kehamilan dan melahirkan di RSKDIA Siti Fatimah Makassar tahun 2014 berdasarkan pendidikan SD sebanyak 7 orang (14%), SLTP sebanyak 7 orang (14%), SMA sebanyak 13 orang (26%), dan S1 sebanyak 23 orang (46%). Berdasarkan pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 21 orang (42%), Wiraswasta sebanyak 15 orang (30%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 14 orang (28%). Berdasarkan Umur < 20 Tahun sebanyak 12 orang (24%), 20-35 Tahun sebanyak 27 orang (54%), >35 Tahun sebanyak 11 orang (22%).

b. Jenis komplikasi

Tabel 4.2

Distribusi responden berdasarkan jenis komplikasi di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014

| Jenis Komplikasi | Frekuensi | Persentase(%) |
|----------------------|-----------|---------------|
| Tidak ada komplikasi | 37 | 74.0 |
| Preeklampsia | 5 | 10.0 |
| Plasenta Previa | 2 | 4.0 |
| Kelainan letak janin | 6 | 12.0 |
| Total | 50 | 100.0 |

Pada tabel berdasarkan Jenis Komplikasi adalah yang tidak ada komplikasi sebanyak 37 orang (74%), Preeklampsia sebanyak 5 orang (10%), Plasenta previa sebanyak 2 orang (4%), dan kelainan letak janin sebanyak 6 orang (12%).

2. Analisis Univariat

a. Pemeriksaan kehamilan 7T

Tabel 4.3

Distribusi responden berdasarkan pemeriksaan kehamilan 7T di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014

| pemeriksaan kehamilan 7T | Frekuensi | persentase(%) |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Lengkap 7T | 40 | 80.0 |
| Tidak lengkap 7T | 10 | 20.0 |
| Total | 50 | 100.0 |

Pada tabel menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan pemeriksaan kehamilan 7T lengkap dengan tidak lengkap yaitu ibu yang pemeriksaan kehamilan 7T lengkap sebanyak 40 orang (80%), sedangkan ibu yang pemeriksaan kehamilan 7T tidak lengkap sebanyak 10 orang (20%).

b. Jenis persalinan

Tabel 4.4

Distribusi responden berdasarkan jenis persalinan 7T di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014

| Jenis Persalinan | Frekuensi | Persentase(%) |
|------------------------|-----------|---------------|
| Normal | 36 | 72.0 |
| <i>Sectio caesarea</i> | 14 | 28.0 |
| Total | 50 | 100.0 |

Tabel menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis persalinan, yaitu jenis persalinan normal sebanyak 36 orang (72%), sedangkan jenis persalinan *sectio caesarea* sebanyak 14 orang (28%).

3. Analisa Bivariat

a. **Distribusi frekuensi pemeriksaan kehamilan 7T dengan Jenis Persalinan**

Tabel 4.5
Distribusi frekuensi pemeriksaan kehamilan 7T dengan Jenis Persalinan
(Normal dan *Sectio caesarea*) di Rumah Sakit Khusus Daerah
Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar
tahun 2014

| Pemeriksaan kehamilan 7T | Jenis persalinan | | | | Jumlah | | <i>p-value</i> |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|
| | Normal | | <i>Sectio caesarea</i> | | N | % | |
| | N | % | N | % | | | |
| Lengkap | 32 | 80.0 | 8 | 20.0 | 40 | 10.0 | 0.012 |
| Tidak lengkap | 4 | 40.0 | 6 | 60.0 | 10 | 10.0 | |
| Total | 36 | 72.0 | 14 | 28.0 | 50 | 100.0 | |

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dari 50 sampel yang diteliti, yaitu terdapat ibu yang memeriksakan kehamilan 7T lengkap memilih jenis persalinan normal adalah 32 responden (80%), dan yang memilih *seksio caesarea* adalah 8 responden (20%), sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan kehamilan 7T tidak lengkap yang memilih persalinan normal adalah 4 responden (40%), dan yang memilih *sectio caesarea* adalah 6 responden (60%), jadi total keseluruhan yang memilih persalinan normal adalah 36 responden (72%), dan yang memilih persalinan *sectio caesarea* yaitu 14 responden (28%).

Berdasarkan perhitungan analisis statistik *chi-Square* diperoleh nilai $P = 0,012$ atau < 0.05 , berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti ada hubungan antara jenis pemeriksaan kehamilan 7T dengan jenis persalinan.

B. Pembahasan

Antenatal care (ANC) mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan perinatal. Dianjurkan, agar pada setiap kehamilan, dilakukan *Antenatal care* (ANC) secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang berlaku (Manuaba. 2003).

Asuhan *Antenatal care* (ANC) meliputi pengawasan terhadap kehamilan untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan umum ibu, menegakkan secara dini penyakit yang menyertai kehamilan, menegakkan secara dini komplikasi kehamilan, dan menetapkan resiko kehamilan (resiko tinggi, resiko meragukan, atau resiko rendah). Dalam asuhan *Antenatal care* (ANC) ada standar pemeriksaan selama kehamilan yaitu standar 7T Timbang Berat Badan, Ukur Tekanan Darah, Ukur Tinggi Fundus Uteri, Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid

(TT), Pemberian Tablet Fe, Tes Terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS), Temu wicara (Manuaba, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hubungan pemeriksaan kehamilan 7T dengan jenis persalinan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2014 dengan menggunakan data sekunder dari buku kesehatan ibu dan anak jumlah populasi adalah 148 ibu yang bersalin normal dan *sectio caesarea*, dan sebanyak 50 responden dengan total *incidental sampling*.

Dari pengolahan data yang dilakukan didapatkan hasil analisis uji statistik menunjukkan bahwa ($p < 0.05$), dimana tingkat kemaknaan $p = 0.012$ atau < 0.05 Ini berarti H_0 gagal diterima dan H_1 gagal ditolak, yang artinya bahwa ada hubungan pemeriksaan kehamilan 7T dengan jenis persalinan, karena pemeriksaan *antenatal* yang teratur akan memberikan kesempatan untuk dapat mendiagnosis secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin selama kehamilan sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ibu-ibu hamil harus melakukan pemeriksaan *antenatal* secara teratur dan harus mengetahui akan pentingnya melakukan pemeriksaan *Antenatal Care* selama kehamilan agar dapat mengantisipasi kelainan dan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Sebagaimana dalam Q.S Fatir ayat 11, mengatakan bahwa :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ
إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرٌ

Terjemahan :

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lawh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Secara jelas ayat diatas menggambarkan bagaimana proses penciptaan manusia yang dikandung oleh ibunya sampai dilahirkan semuanya karena kekuasaan dari Allah SWT, dengan kehendak-Nya anak yang dikandung oleh seorang ibu dapat dilahirkan kedunia dan diberi umur yang panjang.

Dilihat dari 50 sampel yang diteliti tidak semua ibu yang pemeriksaan kehamilannya lengkap dikatakan bersalin dengan normal dan tidak semua ibu yang pemeriksaan kehamilannya tidak lengkap dikatakan bersalin secara *sectio caesarea*, tetapi setelah dianalisa secara garis besar yang memeriksakan kehamilan lengkap lebih cenderung melahirkan normal dan ibu yang memeriksakan kehamilan tidak lengkap lebih cenderung melahirkan secara *sectio caesarea*, Kecuali ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor umur ibu, faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan faktor komplikasi.

Menurut (Derek Jones Liewellyn 2010) mengemukakan bahwa tujuan perawatan *antenatal* adalah mengusahakan agar : ibu sampai pada akhir kehamilan sama sehatnya atau lebih sehat dari pada sebelum hamil, setiap problema fisik atau psikologi yang timbul semasa kehamilan dapat dideteksi dan diobati, setiap komplikasi kehamilan dapat dicegah atau dideteksi secara dini dan diberi penatalaksanaan secara adekuat, ibu dapat melahirkan anak yang sehat, ibu mempunyai kesempatan membahas kecemasan dan ketakutannya tentang kehamilan, ibu diberitahu tentang setiap tindakan, alasan dilakukan tindakan tersebut dan hasil yang mungkin dicapai, pasangan dipersiapkan untuk kelahiran dan membesarkan anak.

Distribusi responden berdasarkan pendidikan adalah ibu yang memeriksakan kehamilan 7T lengkap lebih banyak yang berpendidikan terakhir S1, sebaliknya ibu yang memeriksakan kehamilan 7T tidak lengkap lebih banyak yang berpendidikan terakhir SD. Berdasarkan hasil penelitian ada hubungan pemeriksaan kehamilan 7T dengan pendidikan, didapatkan hasil analisis uji statistik menunjukkan bahwa *p value* 0.001 atau < 0.05 .

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dalam hal ini, pengetahuan ibu hamil termasuk dalam tiga domain yaitu tahu, memahami dan aplikasi. Pengetahuan bisa didapat dari pendidikan formal (institusi resmi) ataupun informal (diluar institusi). Ketika ibu hamil memiliki pengetahuan yang cukup, mereka akan termotivasi memeriksakan kehamilannya karena mereka tahu dampak yang bisa saja

ditimbulkan ketika seseorang tidak teratur memeriksakan kehamilannya, selain itu seorang ibu hamil cenderung ingin tahu keadaan kehamilannya, sehingga akan terbentuk sikap positif pada diri ibu hamil, dengan rutin memeriksakan kehamilannya.

Perlu ibu hamil ketahui mengenai kunjungan *antenatal* adalah sebaiknya pemeriksaan dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan, yaitu satu kali pada trimester I, satu kali pada trimester II dan dua kali pada trimester III. Pelayanan/asuhan standar minimal “7T” : Timbang Berat Badan, Ukur Tekanan Darah, Ukur Tinggi Fundus Uteri, Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid (TT), Pemberian Tablet Fe, Tes Terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS), Temu wicara.

Hal ini sejalan dengan teori Manuaba, 2003 bahwa tingkat pendidikan dari ibu yang rendah dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan termasuk didalamnya tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Salah satu faktor yang banyak memberi pengetahuan pada manusia adalah pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Tidak adanya pendidikan pada seseorang dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan (Manuaba, 2003).

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan, yang memeriksakan kehamilan 7T lengkap lebih banyak ibu yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), sedangkan ibu yang memeriksakan kehamilan 7T tidak lengkap lebih banyak ibu yang bekerja sebagai Pegawai negeri sipil (PNS). Berdasarkan hasil

penelitian tidak ada hubungan pemeriksaan kehamilan 7T dengan pekerjaan, didapatkan hasil analisis uji statistik menunjukkan bahwa *p value* 0.304 atau > 0.05 .

Ibu yang bekerja mempunyai cara pandang yang lebih baik dari pada ibu yang tidak bekerja. Ibu yang bekerja lebih banyak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga lebih banyak peluang untuk mendapatkan informasi tentang kehamilan dan persalinan dibandingkan ibu yang tidak bekerja (Maulana, 2008). Walaupun pada penelitian ini sebagian besar responden ibu rumah tangga (IRT) yang lengkap pemeriksaan kehamilannya, akan tetapi pengetahuan dan perilaku tentang pemeriksaan kehamilan sudah cukup baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor eksternal yaitu lingkungan. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berbeda dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. Oleh karena itu, dengan pengetahuan yang baik maka frekuensi kunjungannya juga semakin baik, sehingga kelainan yang terjadi dalam kehamilan dan persalinan juga dapat dicegah sedini mungkin (Dewi PP, 2013).

Distribusi responden berdasarkan umur adalah ibu yang berumur 20-35 tahun lebih banyak yang bersalin normal, sedangkan ibu yang berumur >35 tahun lebih banyak yang bersalin *sectio caesarea*. Berdasarkan hasil penelitian ada hubungan umur dengan jenis persalinan, didapatkan hasil analisis uji statistik menunjukkan bahwa *p value* 0.001 atau > 0.05 .

Menurut teori Winkjosastro (2007) yang menyatakan bahwa dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20 sampai dengan 30 tahun. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata dua sampai dengan lima kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20 sampai dengan 30 tahun. Kematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30 tahun. Wanita yang melahirkan anak pada usia < 20 tahun atau >30 tahun merupakan faktor resiko terjadinya komplikasi persalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal.

Distribusi responden berdasarkan jenis komplikasi adalah yang tidak mempunyai komplikasi lebih banyak yang bersalin normal, sedangkan ibu yang memiliki komplikasi preeklampsia lebih banyak yang bersalin *sectio caesarea*. Berdasarkan hasil penelitian ada hubungan jenis komplikasi dengan jenis persalinan, didapatkan hasil analisis uji statistik menunjukkan bahwa *p value* 0.000 atau < 0.05 .

Syafrida, 2009 di dati II Bogor menemukan bahwa 48% persalinan merupakan persalinan abnormal dengan komplikasi. Syafrida juga menemukan bahwa risiko untuk terjadinya kematian perinatal adalah 2,6 kali pada ibu yang mengalami persalinan abnormal dibandingkan dengan ibu yang mengalami persalinan normal. Upaya yang dilakukan selama ini seperti deteksi dini kehamilan risiko tinggi perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar

komplikasi persalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal dan kematian perinatal dapat dicegah.

Penelitian yang sejalan dengan hubungan pemeriksaan kehamilan dengan jenis persalinan yaitu menunjukkan bahwa hubungan antara kematian perinatal dengan frekuensi *antenatal care* di puskesmas gumarang kecamatan kedunggalar kabupaten ngawi (Dewi S.K, 2009) yaitu probabilitas $p=0,003$ lebih kecil dari $p=0,05$ yaitu bahwa ada hubungan yang bermakna antara kematian perinatal dengan frekuensi *Antenatal Care* (ANC). penelitian sebelumnya (Taguchi et al, 2003) *influence of socio-economic bacground and antenatal care programmes on maternal mortality in surabaya, Indonesia*, yaitu jumlah kunjungan antenatal kurang dari 4 kali meningkatkan resiko kematian ibu. Penelitian sebelumnya (Simanjuntak J, 2012) yaitu hasil analisis statistik menunjukkan ada hubungan antara jumlah pemeriksaan antenatal <4 kali dengan persalinan dengan tindakan ($p=0,001$). Ibu dengan jumlah pemeriksaan antenatal >4 kali lebih banyak melakukan persalinan spontan, sebaliknya ibu dengan jumlah pemeriksaan antenatal <4 kali lebih banyak melakukan persalinan dengan tindakan.

Menurut asumsi peneliti, pemeriksaan kehamilan sebagai faktor penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam upaya pencegahan komplikasi kehamilan, persalinan dan pengobatan sedini mungkin. Kunjungan *antenatal* untuk pemantauan dan pengawasan kesejahteraan ibu dan anak minimal empat kali selama masa kehamilan.

Pada *antenatal care* ibu akan mendapatkan pelayanan kesehatan kehamilan melalui standar minimal 7T yaitu Timbang berat badan, mengukur Tekanan darah, mengukur Tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi Tetanus Toksoid, pemberian Tablet besi, Tes penyakit menular seksual, dan Temu wicara karena dengan pemeriksaan 7T ibu dapat memonitoring dan mendeteksi kehamilan, dan dapat mengantisipasi apakah ibu nantinya bersalin dengan normal atau bersalin dengan tindakan.



BAB V

PENUTUP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ibu yang pemeriksaan kehamilan 7T lengkap dengan persalinan normal sebanyak 32 orang, dan ibu yang pemeriksaan kehamilan lengkap 7T dengan persalinan *sectio caesarea* sebanyak 8 orang.
2. Berdasarkan hasil penelitian ibu yang pemeriksaan kehamilan 7T tidak lengkap dengan persalinan normal sebanyak 4 orang, dan ibu yang pemeriksaan kehamilan 7T lengkap dengan persalinan *sectio caesarea* sebanyak 6 orang.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan pemeriksaan kehamilan 7T dengan jenis persalinan yaitu $p=0.012$ atau < 0.05 .

B. Saran

1. Dapat berguna Sebagai bahan bacaan mengenai pemeriksaan kehamilan dengan standar “7T” (Timbang Berat Badan, Ukur Tekanan Darah, Ukur Tinggi Fundus, Pemberian Imunisasi TT, Pemberian Tablet Fe, Tes PMS, Dan Temu wicara).
2. Diharapkan kepada pihak Rumah sakit agar lebih Meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan antenatal dengan menggunakan asuhan standar “7T” yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Sebagai penerapan mata kuliah Metodologi Penelitian dan menambah pengalaman dalam penulisan karya ilmiah serta sebagai masukan pengetahuan tentang pelayanan/asuhan standar “7T” (Timbang Berat Badan, Ukur Tekanan Darah, Ukur Tinggi Fundus, Pemberian Imunisasi TT, Pemberian Tablet Fe, Tes PMS, Dan Temu Wicara).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2007. Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta, Yayasan Penyelenggara. Penerjemah/penafsir Al-Qur'an.
- Asrinah, 2010. *Asuhan Kebidanan Masa Persalinan*. Cetakan I. Yogyakarta : GRAHA ILMU.
- Azwar, A, 2004. *Pengantar Administrasi Kesehatan* . Binarupa aksar, Jakarta.
- Bandiyah S, 2009. *Kehamilan Persalinan & Gangguan Kehamilan* Cetakan I. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Carpenito LJ, 2000. *Idiagnosa keperawatan*. Edisi 6. Jakarta : EGC
- Departemen kesehatan RI. 2001. *Rencana Strategi Making Pregnancy Safer (MPS) di Indonesia 2001-2010*. Jakarta : dirjen binkesmas depkes RI
- Departemen kesehatan RI 2008. *Standar pelayanan minimal bidang kesehatan dikabupaten/kota : peraturan menteri kesehatan RI nomor 74/menkes/per/VII/2008*. Jakarta : Departemen Kemenkes RI.
- Dewi PP, 2013 *jurnal hubungan pengetahuan ibu hamil tentang ANC dengan frekuensi kunjungan ANC di rumah bersalin wikaden imogiri*.
- Dewi S.K, 2009. *Jurnal hubungan antara kematian perinatal dengan frekuensi ANC di puskesmas gumarang kecamatan kedunggalar kabupaten ngawi*.
- Dini K, 2003. *Operasi caesarea masalah dan solusinya*. Jakarta : Puspa swara.
- Farrer & hellen 2005. *Perawatan maternitas*. Jakarta : EGC
- Harry O dan William R. Forte, 2010. *Ilmu kebidanan, patologi dan fisiologi persalinan*. Yogyakarta : yayasan esentia medika.
- <http://drprima.com/kehamilan/kapan-pilih-lahir-norma-kapan-pilih-section-caesarea.html>
- Ilyas, jumiarni, dkk, 2007. *Asuhan keperawatan perinatal*. EGC, Jakarta.
- Lailiyana. 2011. *Buku ajar asuhan kebidanan persalinan*. Jakarta : EGC
- Manuaba IA. 2008. *Gawat darurat obstetric ginekologi social untuk profesi bidan*. Cetakan I. Jakarta : EGC

- Manuaba, 2003. *Penuntun kepaniteraan klinik obstetric dan ginekologi*. Edisi 2. Jakarta : EGC
- Mufdillah. 2009. *ANC focus antenatal care focused*. Yogyakarta : Nuha medika
- Nisman & Wenny Artanty. 2011. *Ternyata melahirkan itu mudah dan menyenangkan*. Edisi II. Yogyakarta : ANDI
- Pantiawati I & Saryono. 2010. *Asuhan Kebidanan I Kehamilan*, Cetakan I. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Prawirohardjo, 2006. *Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal*, cetakan 4. Yayasan bina pustaka: Jakarta.
- Progestian P, 2010. *Melahirkan normal & melahirkan operasi caesarea*.
- Pramono T.S, 2012. *101 masalah kehamilan & solusinya, cetakan I. tanaman bantu* Yogyakarta : IN Azna books
- Renia E 2004. *Distribusi karakteristik ibu dan pemanfaatan pelayanan antenatal care (ANC) di Indonesia tahun 2001* (skripsi). Depok : Fakultas kesehatan masyarakat universitas Indonesia.
- Salmah dkk, 2006. *Asuhan kebidanan antenatal*. Cetakan I. Jakarta : EGC
- Sembirang A. 2013. *Jurnal Kebidanan : Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan Dengan Kepatuhan Kunjungan ANC Diklinik Dina Bromo Ujung Lingkungan Xx Medan*.
- Simanjuntak J, 2012. *Jurnal : hubungan jumlah pemeriksaan antenatal < 4 kali dengan persalinan tindakan*.
- Steven L. 2008. *Jurnal internasional. Obstetrics : causes, prevention, and relationship, and relationship to caesarean delivery. Maternal death in the 21 pencegahan dan kematian Caesar terhadap kematian ibu*.
- Syafrida, 2009. *Hubungan pelayanan antenatal dengan kematian perinatal di Dati II bogor. Tesis bidang ilmu kesehatan masyarakat. Universitas Indonesia depok*.
- Taguchi N, 2003. *Influence of socio-economic background and antenatal care programmes on maternal mortality in Surabaya, Indonesia trop med int health*.
- William. 2007. *Obstetric dan ginekologi*. Jakarta : EGC

- Wibowo, 2009. *Pemanfaatan pelayanan antenatal dan factor-faktor yang mempengaruhi dan hubungannya dengan bayi berat lahir rendah 2009* (disertasi). Depok : fakultas kesehatan masyarakat universitas Indonesia.
- Winkjosastro. 2007. *Ilmu kebidanan*. Jakarta, yayasan bima pustaka sarwono prawiroharjo.
- Yunis A, 2011. *Jurnal Tingkat Kepatuhan Bidan Dalam Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir 0-6 Jam Di Kabupaten Karanganyar*.



RIWAYAT HIDUP



Naga Purnamasari. Lahir di Desa Pambusuang kec. Balanipa kel. Balanipa kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 12 Desember 1992. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Nasrul S.Ag dan Megawati Rahman S.Pd Aud. Mulai mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di SD Inpres 056 Lamasariang

pada tahun 1999 dan tamat pada tahun 2004, pada tahun yang sama pula melanjutkan pendidikan lanjutan pertama di SMP Negeri 1 Tinambung dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan lagi ke pendidikan lanjutan atas di SMA Negeri 1 Tinambung dan selesai tahun 2010. Terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun 2010 melalui jalur UMB-PTAIN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R