

**ISOLASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DARI EKSTRAK N-HEKSAN  
DAUN KAYU BITTI (*Vitex cofassus*) DAN UJI ANTIBAKTERI  
TERHADAP *Staphylococcus aureus* & *Esherichia coli***



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana ( S1 )

Sains Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

**Oleh :**

**NURUL AZISYAH**

**NIM: 60500111052**

**M A K A S S A R**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Azisyah  
NIM : 60500111052  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/14 Agustus 1993  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : BTN Nusa Indah Blok D22/16  
Judul : Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder dari Ekstrak *n*-Heksan Daun Kayu Bitti (*vitex cofassus*) dan Uji Antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* & *Esherichia coli*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Samata-Gowa, Maret 2016  
Penyusun

**NURUL AZISYAH**

**60500111052**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder dari Ekstrak N-Heksan Daun Kayu Bitti (*vitex cofassus*) dan Uji Antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* & *Esherichia coli***”. Tak lupa penulis kirimkan salam serta salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.) pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak penyusunan.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Halik Karim S. Sos dan Ibunda Suriyani Rahayu Syam atas doa dan dukungan morilnya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.

3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., PhD selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu Asriyani Ilyas, S.Si., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Iin Novianty, S. Si., M. Sc. selaku dosen pembimbing II atas kesedian dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
6. Kanda Nuraini, S.Si. selaku laboran organik yang selalu sabar dan memberikan dorongan untuk penulis agar menyelesaikan tugas akhir dengan cepat. Serta seluruh laboran kimia tanpa terkecuali.
7. Teman-teman khususnya Jurusan Kimia Angkatan 2011 umumnya seluruh mahasiswa Jurusan Kimia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Amin Ya Robbal 'alamin.

Samata-Gowa, Februari 2016

**NURUL AZISYAH**

**Nim. 60500111039**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-v
DAFTAR ISI .....	vi-viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>(1-7)</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>(8-38)</b>
A. Tinjauan Umum Kayu Bitti ( <i>Vitex cofassus</i> ).....	8
1) Deskripsi .....	9
2) Potensi Kimia.....	11
3) Pemanfaatan .....	12
B. Senyawa Metabolit Sekunder.....	12

1) Terpenoid.....	13
2) Steroid .....	17
3) Flavanoid.....	19
4) Alkaloid.....	21
C. Isolasi .....	24
1) Ekstraksi.....	24
2) Perkolasi.....	26
3) Fraksinasi .....	27
4) Pemurnian dan Identifikasi .....	31
D. Tinjauan Bakteri <i>Staphylococcus</i> .....	33
E. Tinjauan Bakteri <i>Escherichia coli</i> .....	36-38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>(38-44)</b>
A. Waktu dan Tempat.....	38
B. Alat dan Bahan.....	38
C. Prosedur Kerja.....	39
1. Preparasi Sampel.....	39
2. Ekstraksi.....	39
3. Identifikasi.....	39
4. Fraksinasi dengan KLT, KKCv dan KKG .....	41
5. Pemurnian .....	41
6. Identifikasi Menggunakan Spektrofotometer Infra Red (IR).....	42
7. Uji aktivitas Antibakteri .....	42-44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>(44-57)</b>
A. Hasil Pengamatan.....	44-50

B. Pembahasan.....	50-56
1. Ekstraksi.....	50-52
2. Fraksinasi.....	52-53
3. Pemurnian.....	54-55
4. Karakterisasi dengan FTIR.....	55-56
5. Uji Aktivitas Antibakteri.....	56-57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>(57)</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>(58-60)</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>(60-68)</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Daun Kayu Bitti ( <i>Vitex cofasuss</i> ) .....	8
Gambar 2.2 Struktur Terpenoid dan $\beta$ -sitosterol.....	10
Gambar 2.3 Struktur Unit Isopren.....	12
Gambar 2.4 Struktur Minyak Atsiri .....	13
Gambar 2.5 Struktur Gliberelin .....	13
Gambar 2.6 Struktur Triterpen .....	14
Gambar 2.7 Struktur Karotenoid.....	14
Gambar 2.8 Struktur Dasar Steroid.....	16
Gambar 2.9 Struktur Flavanoid .....	18
Gambar 2.10 Struktur Alkaloid.....	21
Gambar 2.11 Bakteri <i>Staphylococcus Aureus</i> .....	33
Gambar 2.12 Bakteri <i>Escherichia coli</i> .....	36

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1 Hasil Tabel Uji Fitokimia N-Heksan Daun Kayu Bitti.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 4.2 Hasil Tabel Pengamatan Fraksinasi.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4.3 Hasil Tabel Serapan Spektroskopi IR Ekstrak N-Heksan .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4.4 Hasil Tabel Antibakteri Ekstrak N-Heksan Daun Kayu Bitti .....</b>	<b>48</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Skema/Bagan Penelitian dan Identifikasi Senyawa Bioaktif Antibakteri dari Ekstrak N-Heksan Daun Kayu Bitti (<i>Vitex cofassus</i>).....</b>	<b>61</b>
<b>Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian Isolasi &amp; Identifikasi Senyawa Bioaktif Ekstrak N-Heksan Daun Kayu Bitti <i>Vitex cofassus</i>) .....</b>	<b>62</b>
<b>Lampiran 3. Hasil Pengamatan Bioaktivitas Ekstrak dan Kristal n-Heksan Daun Kayu Bitti (<i>Vitex cofassus</i>) .....</b>	<b>66</b>
<b>Lampiran 4. Tabel Hasil Uji Fitokimia Ekstrak N-Heksan Daun Kayu Bitti (<i>Vitex cofassus</i>) dan Hasil Uji Fitokimia Kristal .....</b>	<b>67</b>

## ABSTRAK

**Nama : Nurul Azisyah**

**Nim : 60500111052**

**Judul : Isolasi dan Identifikasi Senyawa Bioaktif Antibakteri dari Ekstrak**

***n*-Heksan Daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)**

---

Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) merupakan salah satu tumbuhan endemik di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan nama gofasa dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan kayu bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa yang terdapat dalam ekstrak *n*-heksan daun kayu bitti (*Vitex cofassus*) dan untuk menentukan nilai bioaktifitas senyawa antibakteri dari ekstrak *n*-heksan daun kayu bitti (*Vitex cofassus*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Isolasi senyawa yang terdapat dalam daun kayu bitti melalui proses maserasi, fraksinasi, pemurnian dan identifikasi dengan uji fitokimia dan FTIR. Senyawa hasil isolasi kemudian diuji bioaktifitas antibakterinya dengan menggunakan metode MHA. Hasil penelitian menunjukkan senyawa ekstrak *n*-heksan yang terdapat dalam daun kayu bitti adalah senyawa golongan alkaloid. Hasil uji antibakteri ekstrak *n*-heksan dan senyawa murninya tidak memiliki zona hambat pada aktivitas bakteri.

**Kata Kunci:** Alkaloid, Kayu Bitti (*Vitex cofassus*), *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.

## ABSTRACT

**Name : Nurul Azisyah**

**Nim : 60500111052**

**Title : Isolation and Identification of the Antibacterial Bioactive Compound  
Extract *n*-Hexane Leaf Wood Bitti ( *Vitex cofassus* )**

---

Wood Bitti ( *Vitex cofassus* ) is one of the endemic plants in Sulawesi Selatan known as Gofasa and used by the community as wood building materials. This study aimed to isolate and identify the compounds contained in *n*-hexane extract of leaves of wood bitti ( *Vitex cofassus* ) and to determine the bioactivity of antibacterial compounds from *n*-hexane extract of leaves of wood bitti ( *Vitex cofassus* ) against bacteria *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. Isolating compound found in the leaves of wood bitti through the process of maceration, fractionation, purification and identification with phytochemical test and FTIR. Isolated compounds were then tested the bioactivity of antibacterial using MHA. The results showed *n*-hexane extract substances contained in the wood leaves bitti are compounds alkaloids. The results of antibacterial tests *n*-hexane extracts and pure compounds have no inhibitory zone on bacterial activity.

**Keywords : Alkaloids , Wood Bitti ( *Vitex cofassus* ) , *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli* .**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Senyawa-senyawa organik biomolekul yang tidak terbatas jumlahnya bersumber dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman ini yang cukup banyak memberi potensi besar bagi obat-obatan.

Tumbuhan sebagai obat tradisional, biasanya digunakan secara tunggal (satu jenis tumbuhan) atau majemuk (campuran dari beberapa jenis tumbuhan). Bagian tumbuhan yang umum digunakan sebagai obat tradisional adalah daun, bunga, buah, kulit batang atau akarnya. Hampir semua bagian tumbuhan dapat dijadikan obat untuk mengobati penyakit tertentu sesuai dengan khasiat masing-masing. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya antara lain dalam Qs. Ar-Rad/13:4.

نُفِضْلُ وَحَدِيدِ مَاءٍ يُسْقَى صِنَوَانَ وَغَيْرِ صِنَوَانَ وَنَخِيلٍ مِّنْ زُرْعٍ أَعْتَبِ مِنْ وَجْنَتٍ مُّتَجَوِّرَاتٍ قَطِيعِ الْأَرْضِ وَفِي  
يَعْقِلُونَ لَقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ الْأَكْلِ فِي بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهَا

Terjemahnya:

*“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 250.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt juga yang menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dari langit, kemudian dengan air tersebut Allah mengeluarkan setiap jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam bentuk, ciri khas serta berbeda-beda tingkat kelebihan dan kekurangan (Al-maraghi, 1992). Meskipun semuanya tumbuh ditanah yang sama dan dialiri dengan air yang sama. Keanekaragaman yang Allah ciptakan menunjukkan tanda-tanda akan kekuasaan Allah yang jelas hanya diketahui bagi orang-orang yang mau berpikir.

Menurut Katsir, Allah swt telah mengingatkan atas tanda-tanda yang ada di langit, Dia mengingatkan atas apa yang Dia ciptakan di bumi, berupa benda-benda yang menakjubkan dan berbagai macam sesuatu, diantaranya tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam warna dan bentuknya termasuk kegunaan dan keistimewaannya. Kesemuanya itu sebagai bukti atas kekuasaan-Nya yang nyata dan kerajaannya yang agung bagi kaum yang memikirkan tentang Allah dan memahami bukti-buktiNya.<sup>2</sup>

Pada surah Al-Luqman juga menjelaskan bahwa, Allah swt banyak menciptakan segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik, halal dan bermanfaat dari penanamannya<sup>3</sup>. Salah satu tumbuhan yang berpotensi sebagai obat adalah Kayu Bitti (*Vitex cofassus*). Hal ini dipetegas dengan penjelasan QS. Luqman /31 : 10.

---

<sup>2</sup>Lubaabut tafsir min Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Al-Quran : Tafsir* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2005), h. 308.

<sup>3</sup> M. Quraish. Shihab. *Tafsir Al Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati. 2002). H. 695

لِّمَنْ فِيهَا وَبَثَّ لَكُمْ تَمِيدًا أَنْ رَوْسِيَ الْأَرْضِ فِي وَالْقَىٰ تَرَوْنَهَا عَمَدٍ بَغَيْرِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ  
 ﴿٥٦﴾ كَرِيمٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ فِيهَا فَأَنْبَتْنَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَأَنْزَلْنَا دَابَّةً ك

Terjemahannya:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (QS. Luqman /31 : 10)<sup>4</sup>.

Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) merupakan salah satu tumbuhan endemik di Sulawesi yang dikenal dengan nama gofasa. Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) ini dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bahan kayu bangunan. Potensi kimia Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) ini dapat dieksplorasi. Ini didukung dengan adanya hasil penelitian pada tumbuhan yang segenus dengan Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) yaitu tumbuhan Legundi (*V. trifolia*) dan tumbuhan laban (*Vitex pubescens* Vahl).

Legundi (*V. trifolia*) banyak diteliti dan memiliki beberapa efek farmakologi sebagai antibakteri, antifungi, antialergi, antipiretik dan sebagai antikanker. Penelitian Alam et.al juga melaporkan bahwa ekstrak n-heksan *Vitex trifolia* menunjukkan aktifitas dari senyawa-senyawa yang teridentifikasi<sup>5</sup>. Tumbuhan laban (*Vitex pubescens* Vahl) banyak digunakan oleh masyarakat sebagai obat yang dapat

<sup>4</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cv Jumanatul' Ali Art, 2005), QS. Luqman / 31 : 10, h. 411

<sup>5</sup> Agung Endro Nugroho dan Gemini Alam, “ *Review Tanaman Obat Legundi (Vitex Trifolia. L)*”. Makassar : Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin Makassar. 2010.

menyembuhkan penyakit, salah satu penyakit yang bisa disembuhkan yaitu penyakit sakit pinggang dan dan diare. Tumbuhan laban (*Vitex pubescens* Vahl) juga memiliki sifat antibakteri, beberapa senyawa-senyawa aktif dari tumbuhan yang sudah dapat diisolasi dan diidentifikasi. Penelitian yang ditemukan oleh Irmayanti (2014) bahwa ekstrak n-heksan kulit batang kayu bitti (*Vitex cofassus*) terdapat senyawa bioaktif antikanker dengan bahan uji larva *Artemia salina* Leach.<sup>6</sup> Penelitian lainnya juga ditemukan oleh Eva Ulina Sirait (2014) bahwa ekstrak buah laban dengan berbagai tingkat kematangan buah sebagai penghambat pertumbuhan *Salmonella thypi* dan *Staphylococcus aureus* (bersifat antibakteri).<sup>7</sup>

*Staphylococcus aureus* adalah bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning, bersifat aerob fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil, umumnya tumbuh ini berpasangan maupun berkelompok, dengan diameter sekitar 0,8-1,0  $\mu\text{m}$ . *Staphylococcus aureus* tumbuh dengan optimum pada suhu 37°C dengan waktu pembelahan 0,47 jam. *Staphylococcus aureus* merupakan mikroflora normal manusia. Bakteri ini biasanya terdapat pada saluran pernapasan atas dan kulit. Infeksi *Staphylococcus aureus* dapat menghemolisis darah dan plasma, pembentukan abses, infeksi piogenik, sampai septikimia yang fatal. Bakteri ini cepat menjadi resisten

---

<sup>6</sup>Irmayanti, "Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Bioaktif Antikanker Ekstrak N-Heksan Kulit Batang Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Makassar. 2014.

<sup>7</sup>Eva Ulina, "Ekstrak Buah Laban (*Vitex pubescens*) Sebagai Penghambat Pertumbuhan *Salmonella thypi* dan *Staphylococcus aureus*", *Jurnal Protobiont* 3, No. 3 (2014): h. 40.

terhadap banyak zat antijasad renik dan menyebabkan masalah pengobatan yang sulit<sup>8</sup>.

*Escherichia coli* adalah bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan. *Escherichia coli* dapat menyebabkan infeksi pada traktus urinarius, juga dapat menyebabkan meningitis pada bayi prematur dan neonatal. Strain entero patogenik *Escherichia coli* sering menyebabkan diare akut pada anak-anak di bawah umur 2 tahun<sup>9</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan suatu penelitian senyawa bioaktif ekstrak n-heksan daun kayu Bitti (*Vitex cofassus*). Oleh karena itu penelitian mengangkat judul isolasi dan identifikasi senyawa bioaktif antibakteri ekstrak n-heksan daun kayu Bitti (*Vitex cofassus*).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Golongan senyawa apa yang terdapat dalam ekstrak N-heksan daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)?
2. Bagaimana bioaktivitas senyawa antibakteri dari ekstrak N-heksandaun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *E-coli*?

---

<sup>8</sup>Muhammad Ali Faturrohman dan Peni Indrayudha, “Aktivitas Antibakteri Ekstrak N-Heksan Kelopak Rosella (*Hibiscus Sabdariffa*Linn) Terhadap *propionibacterium Acne* Sensitif, *Escherichia Coli*, dan *Staphylococcus Aureus* Multiresisten.” *Fakultas Farmasi, Universitas MuhammadiyahSurakarta*. (2012). h. 3.

<sup>9</sup>Muhammad Ali Faturrohman dan Peni Indrayudha, “Aktivitas Antibakteri Ekstrak N-Heksan Kelopak Rosella (*Hibiscus Sabdariffa*Linn) Terhadap *propionibacterium Acne* Sensitif, *Escherichia Coli*, dan *Staphylococcus Aureus* Multiresisten.” *Fakultas Farmasi, Universitas MuhammadiyahSurakarta*. (2012). h. 3.

### **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa yang terdapat dalam ekstrak n-heksan daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*).
2. Untuk menentukan nilai bioaktivitas senyawa antibakteri dari ekstrak n-heksan daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.

### **D. Manfaat**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kandungan senyawa bioaktif antibakteri pada daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*).
2. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kimia organik bahan alam.
3. Memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi penelitian tentang manfaat dan kandungan senyawa bioaktif antibakteri yang terdapat di dalam daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Tinjauan Umum Famili Verbenaceae**

*Verbenaceae* merupakan tumbuhan yang berupa semak, perdu atau pohon dan sering memanjat. Daunnya tunggal atau majemuk, tanpa daun penumpu. Kelopak berdaun lekat dan mahkota membentuk buluh yang nyata dengan tepian yang sering berbibir, bertaju 4-5. Bakal buah menumpang tersusun dari 2-4 daun buah yang tepinya melipat ke dalam membentuk sekat hingga bakal buah terbagi-bagi dalam 4-8 ruang. Pada setiap daun buah terdapat 2 bakal biji yang apotrop atau anatrop yang menempel pada tepi daun buah.<sup>10</sup>

Steenis (1992) mengungkapkan bahwa spesies-spesies yang termasuk dalam famili *Verbenaceae* dapat meliputi tipe pertumbuhan semak, perdu, pohon dan umumnya memiliki batang berkayu yang keras. Spesies tumbuhan obat yang termasuk dalam famili *Verbenaceae* banyak digunakan karena memiliki kandungan bahan kimiawi yang lebih baik untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan penyakit. Menurut Prosea (2003), kandungan bahan kimiawi untuk spesies-spesies dalam famili *Verbenaceae* mengandung pipertone oxide, callicaponen dan steroid.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Van Steenis, *Flora, ter. Moeso Soerjowinoto, Flora untuk Sekolah di Indonesia* (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2006), h. 345.

<sup>11</sup>Bastian Hara, "Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional oleh Masyarakat Suku Maybrat di Kampung Sire Distrik Mare Selatan Kabupaten Maybrat", *Skripsi* (Manokwari: Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, 2013), h. 38.

## B. Tinjauan Umum Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)

### 1. Deskripsi

Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) merupakan salah satu jenis tumbuhan yang termasuk dalam famili *Verbenaceae*. Menurut sistem klasifikasi suku tumbuhan, *Verbenaceae* termasuk dalam ordo *Lamiales*.<sup>12</sup>

Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) mempunyai ukuran pohon yang sedang hingga besar. Batangnya mempunyai diameter yang dapat mencapai 30-170 sentimeter, kayunya padat dan berwarna keputihan. Kayunya sedang hingga berat serta kuat dan tahan lama. Struktur daun bersilang dan memiliki susunan bunga terminal yang merupakan bunga berkelamin ganda. Mahkota bunga putih keunguan dan terdapat tangkai dan kepala sari di dalam rongga mahkota. Bakal buah berada di atas dasar bunga dan mempunyai buah yang berdaging yang berbentuk bulat sehingga lonjong. Buahnya berwarna ungu tua dan terdapat 1 sampai 4 biji dalam setiap buahnya.<sup>13</sup>



Gambar 2.1: Daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)

<sup>12</sup>Arter D. Muaja, Harry S. J. Koleangan dan Max R. J. Runtuwene, " Uji Toksisitas dengan Metode BSLT dan Analisis Kandungan Fitokimia Ekstrak Daun Soyogik (*Saurauia bracteosa* DC) dengan Metode Soxhletasi." *Jurnal MIPA Unsrat Online* 2(2) 115-118". (2013). h. 115.

<sup>13</sup>Anonim, "*Vitex cofassus* Reinw. Ex Blume", [http://www.pngplants.org/PNGtees/TreeDescription/Vitex\\_cofassus\\_Reinw\\_ex\\_Blume.html](http://www.pngplants.org/PNGtees/TreeDescription/Vitex_cofassus_Reinw_ex_Blume.html). (30 April 2015).

Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Class	: Angiospermae
Ordo	: Lamiales
Famili	: Verbenaceae
Genus	: Vitex
Spesies	: <i>Vitex cofassus</i>

Di Sulawesi spesies kayu Bitti (*Vitex cofassus*) yang paling banyak ditemukan yaitu spesies *Vitex cofassus* Reinw, *Vitex celebica* dan *Vitex pubescens*. Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) memiliki nama tersendiri di masing-masing daerah. Di Jawa terkenal dengan nama Gandaria atau jatake, suku Dayak mengenalnya dengan nama Barania sedangkan di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon dikenal dengan nama New Guinea Teak atau Jati Nugini. Terkhusus di daerah Sulawesi selatan dikenal sebagai nama Kalawasa, Rappo-Rappo Kebo', Buwa Malawe, Katondeng dan Aju Bitti.<sup>15</sup>

Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) tumbuh tersebar secara alami di Sulawesi selatan yang terbesar di beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Pangkep, Bone, Enrekang, Luwu, Barru, Jeneponto, Bantaeng, Soppeng, Sidrap, Bulukumba, Pinrang dan Selayar serta di Maluku, Papua Nugini, Kepulauan Bismarck dan Pulau Solomon.


<sup>14</sup>Anonim, "Pohon Gofasa, Gupasa, atau Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)", <http://alamendah.org/2011/05/15/pohon-gofasa-gupasa-atau-kayu-biti=vitex-cofassus/>. (30 April 2015).

<sup>15</sup>Anonim, "Sekilas Tentang Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) atau New Guinea Teak" <http://battalagumbang.blogspot.com/2012/03/sekilas-tentang-kayu-bitti-vitex.html>. (30 April 2015).

Habitat kayu Bitti (*Vitex cofassus*) adalah di hutan di dataran rendah sampai ketinggian 2000 meter dari permukaan laut namun pertumbuhannya lebih bagus jika ditanam di daerah di bawah ketinggian 800 meter. Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) memerlukan pencahayaan yang cukup dan tumbuh baik pada tanah berkapur dengan tekstur mulai lempung hingga pasir.<sup>16</sup>

## 2. Potensi Kimia

Famili yang sama *Vitex cofassus* yaitu genus *Duranta* dengan spesies *Duranta repens* L bahwa ekstrak methanol dan fraksi kloroform buahnya mempunyai kandungan senyawa metabolit sekunder yaitu flavanoid jenis flavanol dan senyawa-senyawa diterpenoid, dan  $\beta$ -sitosterol.



Dari sekian senyawa yang diduga bertanggung jawab terhadap aktivitas antimalaria dan merupakan senyawa utama dalam buah *Duranta repens* L adalah flavanol.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Anonim. "Pohon Gofasa, Gupasa, atau Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)".

<sup>17</sup>Nuri, et., al, "Aktivitas Antimalaria Ekstrak Metanol dan Fraksi Kloroform Buah *Duranta Repens* L. Pada Mencit yang diinfeksi *Plasmodium Berghei*" *Jurnal Sainstek*, vol. 8, no.1 (2009). h. 17.

### 3. Pemanfaatan

Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) telah dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bahan pembuat perahu pinisi. Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) juga banyak dimanfaatkan untuk kegunaan lain seperti kayu bangunan seperti tiang, kusen, pintu, jendela, atap, lantai dan dinding serta perabot rumah tangga seperti mangkok dan piring. Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) dipilih karena memiliki tekstur yang baik dan tahan terhadap rayap.<sup>18</sup>

#### C. Senyawa Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder merupakan molekul organik yang tidak terlibat secara langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan normal dari suatu organisme. Metabolit sekunder ditandai oleh keragaman kimia yang sangat besar dimana setiap karakteristik tersendiri dalam setiap kandungan senyawa metabolit sekundernya. Metabolit sekunder berperan dalam hubungan organisme dengan lingkungannya seperti perlawanan terhadap hama dan penyakit sebagai pengontrol penyerbuk. Senyawa metabolit sekunder sangat beragam yang telah disintesis oleh tumbuhan, hewan, jamur, bakteri serta alga.<sup>19</sup>

Senyawa-senyawa kimia yang merupakan hasil metabolisme sekunder pada tumbuhan sangat beragam. Beberapa senyawa obat dari tumbuhan tetap diperoleh dengan cara ekstrak dari bagian tumbuhan itu. Modifikasi kimia pada beberapa senyawa aktif dari tumbuhan menghasilkan berbagai senyawa dengan khasiat lebih

<sup>18</sup>Anonim, "Pohon Gofasa atau Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)".

<sup>19</sup>Sovia Lenny, "Senyawa Terpenoida dan Steroid", *Karya Ilmiah*. (2006). h. 6

kuat dan dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan senyawa bahan alam yaitu terpenoid, steroid, flavanoid dan alkaloid.

### 1. *Terpenoid*

Terpenoid merupakan komponen-komponen tumbuhan yang mempunyai bau dan dapat diisolasi dari bahan nabati dengan penyulingan dan disebut sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri yang berasal dari bunga pada awalnya dikenal dari penentuan struktur secara sederhana, yaitu dengan perbandingan atom hidrogen dan atom karbon dari suatu senyawa terpenoid yaitu 8 : 5 dan dengan perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut adalah golongan terpenoid.<sup>20</sup>



Gambar 2.4 Struktur Unit Isopren

#### a. **Klasifikasi Terpenoid**

Menurut J.B Harborne (1987)<sup>21</sup>, senyawa terpenoid diklasifikasikan ke dalam 4 senyawa, yaitu:


##### 1. Minyak Atsiri

Bagian utama dari minyak atsiri adalah terpenoid, biasanya terpenoid terdapat pada fraksi atsiri yang tersulip-uap. Zat inilah penyebab wangi, harum atau bau yang khas pada tumbuhan. Secara kimia, terpena minyak atsiri dapat dipilah

<sup>20</sup>Sovia Lenny, *Senyawa Terpenoida dan Steroida*(Medan: Jurusan MIPA Universitas Sumatera Utara, 2006), h. 15.

<sup>21</sup>J.B Harbone., *Metode Fitokimia* (Penerbit ITB: Bandung, 1987), h. 127-158.


menjadi dua golongan, yaitu monoterpena dan seskuiterpena, berupa isoprenoid  $C_{10}$  dan  $C_{15}$ .



Gambar 2.5 Struktur Minyak Atsiri

## 2. Diterpenoid dan gliberelin

Diterpenoid meliputi golongan senyawa yang secara kimia beraneka ragam, semuanya mempunyai kerangka karbon  $C_{20}$  yang berasal dari empat satuan isoprena, kebanyakan penyebaran sangat terbatas.




Gambar 2.6 Gliberelin

## 3. Triterpenoid dan steroid

Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam satuan isoprene dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon  $C_{30}$  asiklik, yaitu


skualena. Senyawa ini berstruktur siklik, kebanyakan berupa alkohol, aldehida atau asam karboksilat.



**Gambar 2.6 Triterpen**

#### 4. Karotenoid

Karotenoid yaitu tetraterpenoid C<sub>40</sub>, merupakan golongan pigmen yang larut dan terdapat dalam semua jenis tumbuhan. Melalui makanan, karotenoid juga merupakan sumber warna hewan yang cemerlang, seperti pada flamingo, binatang laut (asteroid).



**Gambar 2.7. Karotenoid**

## **b. Definisi Terpenoid**

Terpenoid memiliki beberapa nilai kegunaan bagi manusia, antara lain minyak atsiri sebagai dasar wewangian, rempah-rempah serta sebagai cita rasa dalam industri makanan. Fungsi terpenoid bagi tumbuhan adalah sebagai pengatur pertumbuhan (seskuitertenoid abisin dan giberelin), karotenoid sebagai pewarna dan memiliki peran membantu fotosintesis.<sup>22</sup>

## **c. Isolasi Terpenoid**

Usaha untuk menemukan senyawa isopren biologis yang sesungguhnya digunakan oleh organisme untuk sintesa terpenoid dilakukan oleh banyak peneliti selama bertahun-tahun. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan oleh J.W. Cornforth pada tahun 1959 dari penyelidikan-penyelidikannya dibidang steroid. Cornforth menemukan dua bentuk isoprene yang aktif, yakni isopentenil pirofosfat (IPP) dan dimetilalil pirofosfat (DMAPP). Kedua isopren aktif ini harus ada untuk keperluan sintesa terpenoid oleh organisme.

## **d. Biosintesis Terpenoid**

Biosintesis dari terpenoid pada tumbuhan mengikuti jalur asam asetatmevalonat. Asam asetat yang diaktifkan dengan koenzim A membentuk asetilCoA dan melakukan reaksi kondensasi dengan asetilCoA yang lain sehingga terbentuk asetoasetilCoA. AsetoasetilCoA yang terbentuk juga berkondensasi dengan

---


<sup>22</sup>M. Arifuddin, "Sitotoksitas Bahan Aktif Lamun dari Kepulauan Spermonde Kota Makassar Terhadap *Artemia Salina* (Linnaeus, 1758)", *Jurnal Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin* (2013), h. 15.

unit asetilCoA yang lain, sehingga terbentuk tiga unit gabungan dari asetilCoA yang selanjutnya diprotonasi membentuk asam mevalonat.<sup>23</sup>

## 2. Steroid

Sterol adalah triterpena yang kerangka dasarnya berupa sistem cincin siklopentana perhidrofenantrena. Dahulu sterol dianggap sebagai senyawa satwa (sebagai hormone kelamin, asam empedu dan lain-lain), tetapi pada tahun-tahun terakhir ini makin banyak senyawa tersebut ditemukan dalam jaringan tumbuhan. Steroid merupakan golongan dari senyawa triterpenoid. Adapun contohnya adalah sterol, sapogenin, glikosida jantung dan vitamin D.<sup>24</sup>

Percobaan-percobaan biogenetik menunjukkan bahwa steroid yang terdapat di alam berasal dari triterpenoid. Steroid yang terdapat dalam jaringan hewan berasal dari triterpenoid lanosterol sedangkan yang terdapat dalam jaringan tumbuhan berasal dari triterpenoid sikloartenol setelah triterpenoid ini mengalami serentetan perubahan tertentu.<sup>25</sup>



**Gambar 2.8. Struktur Dasar Steroid**

<sup>23</sup>Vina Juliana A dkk, "Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Turunan Terpenoid dari Fraksi n-Heksan *Momordica charantia L*" (2010), h 4.

<sup>24</sup>M. Arifuddin, "Sitotoksitas Bahan Aktif Lamun dari Kepulauan Spermonde Kota Makassar Terhadap *Artemia Salina* (Linnaeus, 1758)", h. 15.

<sup>25</sup>Sovie Lenny, "Senyawa Terpenoida dan Steroida", h. 16

### a. Klasifikasi steroid

Steroid alami berasal dari berbagai transformasi kimia dari triterpena yaitu lanosterol dan saikloartenol. Senyawa steroid dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat.<sup>26</sup>

Steroid terdiri atas beberapa kelompok senyawa dan pengelompokan ini didasarkan pada efek fisiologis yang diberikan oleh masing-masing senyawa. Kelompok-kelompok itu adalah sterol, asam-asam empedu, hormone seks, hormone adrenokortikod, aglikon kardiak dan sapogenin.<sup>27</sup>

Deteksi senyawa steroid hampir sama dengan deteksi senyawa terpenoid yaitu menggunakan pereaksi Lieberman-Burchard kemudian disemprotkan dengan asam sulfat pekat, anhidrida asetat dan kloroform. Pelarut yang paling sederhana yaitu air digunakan sebagai penyemprot untuk mendeteksi adanya senyawa steroid pada plat KLT.<sup>28</sup>

### b. Detinisi Steroid

Deteksi senyawa steroid hampir sama dengan deteksi senyawa terpenoid yaitu menggunakan pereaksi Lieberman-Burchard kemudian disemprotkan dengan asam sulfat pekat, anhidrida asetat dan kloroform. Pelarut yang paling sederhana yaitu air

---

<sup>26</sup>M. Arifuddin, "Sitotoksitas Bahan Aktif Lamun dari Kepulauan Spermonde Kota Makassar Terhadap *Artemia Salina* (Linnaeus, 1758)", h. 15.

<sup>27</sup>Sovie Lenny, *Senyawa Terpenoida dan Steroida*, h. 15.


<sup>28</sup>J.B Harbone., *Metode Fitokimia*, h. 152.

digunakan sebagai penyemprot untuk mendeteksi adanya senyawa steroid pada plat KLT.<sup>19</sup>

### 3. *Flavanoid*

Flavanoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang terbesar. Kira-kira 2% dari seluruh karbon yang difotosintesis oleh tumbuhan diubah menjadi flavanoid atau senyawa yang berkaitan erat dengannya. Senyawa flavanoid terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah dan biji.<sup>29</sup>

Flavonoid adalah sekelompok besar senyawa polifenol tanaman yang tersebar luas dalam berbagai bahan makanan dan dalam berbagai konsentrasi. Kandungan senyawa flavonoid dalam tanaman sangat rendah sekitar 0,25%. Komponen tersebut pada umumnya terdapat dalam keadaan terikat atau terkonjugasi dengan senyawa gula.<sup>30</sup>



Gambar 2.9. Struktur Flavanoid

<sup>19</sup>J.B Harbone., *Metode Fitokimia*, h. 152.

<sup>29</sup>Julianti eva, et., al, "Isolasi Senyawa Flavanoid dari Daun Tumbuhan Jati Putih (*Gmelina arborea* Roxb)", *Jurnal Saintia Kimia*. Vol. 1 no. 1 (2012), h, 29.

<sup>30</sup>M. Arifuddin, "Sitotoksitas Bahan Aktif Lamun dari Kepulauan Spermonde Kota Makassar Terhadap *Artemia Salina* (Linnaeus, 1758)", h. 15.

### a. Klasifikasi Flavanoid

Semua flavonoid dari strukturnya merupakan turunan senyawa induk flavon, terdapat pada tumbuhan *Primula* berupa tepung putih dan semuanya mempunyai sifat yang sama. Senyawa flavonoid diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Antosianin terdapat pada pigmen bunga merah marak, merah, merah senduduk dan biru, juga dalam daun dan jaringan lain.
2. Proantosianidin merupakan senyawa tanpa warna, terdapat dalam galih dan daun tumbuhan berkayu.
3. Flavonol, flavon dan glikoflavon merupakan ko-pigmen tanpa warna, terdapat dalam bunga sianik dan asianik dan tersebar luas dalam daun.
4. Bioflavonil merupakan senyawa tanpa warna, hampir seluruhnya terbatas pada gimnospermae.
5. Flavanon merupakan senyawa tanpa warna, terdapat dalam daun buah (terutama dalam citrus).
6. Isoflavon merupakan senyawa tanpa warna, seringkali dalam akar dan hanya terdapat dalam satu suku, leguminosae.

Flavonoid umumnya terdapat dalam tumbuhan sebagai glikosida. Flavonoid terdapat pada seluruh bagian tanaman termasuk pada buah, tepung sari dan akar. Flavonoid pada tanaman berikatan dengan gula sebagai glikosida dan ada pula yang berada dalam aglikon.<sup>31</sup>

Flavonoid merupakan senyawa yang terdiri dari C<sub>6</sub>-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>. Flavonoid umumnya terdapat pada tumbuhan sebagai glikosida dan umumnya terdapat pada

---

<sup>31</sup>M. Arifuddin, "Sitotoksitas Bahan Aktif Lamun dari Kepulauan Spermonde Kota Makassar Terhadap *Artemia Salina* (Linnaeus, 1758)", h. 15-16.

seluruh bagian tanaman termasuk pada buah, tepung sari dan akar. Flavonoid merupakan inhibitor kuat terhadap peroksidasi lipida, sebagai penangkap oksigen atau nitrogen yang reaktif dan juga mampu menghambat aktivitas enzim lipooksigenase dan siklooksigenase.<sup>32</sup>

#### **b. Deteksi flavonoid**

Flavonoid terdapat dalam tumbuhan sebagai campuran. Jarang sekali ditemukan flavonoid murni di dalam jaringan tumbuhan. Campuran yang sering ditemukan terdiri atas flavonoid yang berbeda kelas. Antosianin berwarna yang terdapat dalam bunga, hampir selalu disertai dengan flavon atau flavonol tanpa warna. Hasil penelitian terkini telah membuktikan bahwa flavon merupakan ko-pigmen penting, karena sangat diperlukan untuk menyatakan warna antosianin secara menyeluruh dalam jaringan bunga. Biasanya antosianin juga terdapat sebagai campuran, terutama dalam bunga tanaman hias.<sup>23</sup>

#### **4. Alkaloid**


Alkaloid merupakan senyawa organik terbanyak yang ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Secara organoleptik, daun-daunan yang berasa sepat dan pahit, biasanya

---

<sup>32</sup>M. Arifuddin, "Sitotoksitas Bahan Aktif Lamun dari Kepulauan Spermonde Kota Makassar Terhadap *Artemia Salina* (Linnaeus, 1758)", h. 16

<sup>23</sup>J.B Harbone., *Metode Fitokimia*, h. 71.

teridentifikasi mengandung alkaloid. Selain daun-daunan, senyawa alkaloid dapat ditemukan pada akar, biji, ranting dan kulit kayu.<sup>33</sup>



Gambar 2. 10. Struktur Alkaloid

Alkaloid biasanya tanpa warna, seringkali bersifat optis aktif, kebanyakan berbentuk kristal tetapi hanya sedikit yang berupa cairan (misalnya nikotina) pada suhu kamar. Alkaloid merupakan turunan yang paling umum dari asam amino. Secara kimia, alkaloid merupakan suatu golongan heterogen. Secara fisik, alkaloid dipisahkan dari kandungan tumbuhan lainnya sebagai garamnya dan sering diisolasi sebagai kristal hidroklorida atau pikrat.<sup>34</sup>

### 1) Klasifikasi alkaloid

Menurut Sovia lenny, Sistem klasifikasi yang paling banyak diterima adalah menurut Hegnauer, dimana alkaloida dikelompokkan atas:

<sup>33</sup>Sinly evan putra, "Alkaloid : Senyawa Terbanyak di Alam", *Situs Kimia Indonesia chem.-istry.org* (2012): h. 1. [http://www.chem-istry.org/artikel\\_kimia/biokimia/alkaloid\\_senyawa\\_organik\Terbanyak\\_di\\_alam](http://www.chem-istry.org/artikel_kimia/biokimia/alkaloid_senyawa_organik\Terbanyak_di_alam) (Diakses 30 April 2014).

<sup>34</sup>M. Arifuddin, "Sitotoksitas Bahan Aktif Lamun dari Kepulauan Spermonde Kota Makassar Terhadap *Artemia Salina* (Linnaeus, 1758)", h. 13-14.

**a) Alkaloida sesungguhnya**

Alkaloida ini merupakan racun, senyawa tersebut menunjukkan aktivitas fisiologis yang luas, hampir tanpa terkecuali bersifat basa, umumnya mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik, diturunkan dari asam amino, biasanya terdapat dalam tanaman sebagai garam asam organik. Beberapa pengecualian terhadap aturan tersebut adalah kolkhisin dan asam aristolokhat yang bersifat bukan basa dan tidak memiliki cincin heterosiklik dan alkaloida quartener yang bersifat agak asam daripada bersifat basa.

**b) Protoalkaloida**

Protoalkaloida merupakan amin yang relatif sederhana dimana nitrogen asam amino tidak terdapat dalam cincin heterosiklik. Protoalkaloida diperoleh berdasarkan biosintesa dari asam amino yang bersifat basa. Pengertian amin biologis sering digunakan untuk kelompok ini.

**c) Pseudoalkaloida**

Pseudoalkaloida tidak diturunkan dari precursor asam amino. Senyawa ini biasanya bersifat basa. Ada dua seri alkaloida yang penting dalam kelompok ini yaitu alkaloida steroidal dan purin.

**2) Deteksi alkaloid**

Secara kimia alkaloid banyak yang bersifat heterogen. Senyawanya tidak dapat diidentifikasi dalam ekstrak tumbuhan dengan menggunakan kromatografi tunggal. Pada umumnya sukar mengidentifikasi suatu alkaloid dari sumber tumbuhan

baru tanpa mengetahui kira-kira jenis alkaloid apa yang mungkin ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan tersebut.<sup>28</sup>

Kelarutan dan sifat lain alkaloid sangat berbeda-beda, cara penjarangan umum untuk alkaloid dalam tumbuhan mungkin tidak akan berhasil mendeteksi senyawa khas. Sebagai basa, alkaloid biasanya diekstraksi dari tumbuhan dengan pelarut alkohol yang bersifat asam lemah (HCl 1 M atau asam asetat 10%), kemudian diendapkan dengan amonia pekat. Pemisahan pendahuluan dari bahan tumbuhan lainnya dapat diulangi atau pemurnian selanjutnya dilaksanakan dengan ekstrak pelarut (ekstraksi cair-cair).<sup>29</sup>

#### **D. Isolasi Senyawa Bahan Alam**

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan substansi atau zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstraksi substansi yang diinginkan tanpa melautkan material lainnya.<sup>35</sup>

Proses ekstraksi untuk defenisi pemisahan kimia merupakan cara memisahkan zat terlarut melalui dua buah pelarut (biasanya cair) yang dapat melarutkan zat tersebut namun kedua pelarut ini tidak dapat saling melarutkan (*immiscible*). Sampel dilarutkan dalam rafinat yang berada dalam kontak dengan ekstrak sehingga terjadi perpindahan molekul zat terlarut karena perbedaan kelarutan di dalam kedua jenis

---

<sup>28</sup>J.B Harbone., *Metode Fitokimia*, h. 238.

<sup>29</sup>J.B Harbone., *Metode Fitokimia*, h. 238.

<sup>35</sup>Maria Bintang., *Teknik Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2010). h. 125

pelarut. Dengan demikian, pemisahan cara kimia terjadi secara alami dalam dua pelarut cair-cair. Pada pembahasan teoritis mengenai ekstraksi, biasanya zat terlarut diekstrak oleh pelarut organik dari fase air. Dapat juga terjadi sebaliknya dan dengan demikian, penjelasan mengacu pada fase organik sebagai ekstrak utama.<sup>36</sup>

Metode ekstraksi dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut.<sup>37</sup>

### **1. Cara Dingin**

Ekstraksi cara dingin memiliki keuntungan dalam proses ekstraksi total yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada senyawa termolabil yang terdapat pada sampel. Sebagian besar senyawa dapat terekstraksi dengan ekstraksi cara dingin, walaupun ada beberapa senyawa yang memiliki keterbatasan larutan terhadap pelarut pada suhu ruangan. Ekstraksi cara dingin ada dua macam yaitu:

#### **a. Maserasi**

Maserasi adalah proses pengestrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar atau ruangan.

---

<sup>36</sup>Suryani Wonorahardjo, *Metode-metode Pemisahan Kimia* (Jakarta: Kademia, 2013), h. 103.

<sup>37</sup>Istiqomah, "Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi dan Sokletasi terhadap Kadar Piperin Buah Cabe Jawa (*Piperisretrofracti fructus*), *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2013.h. 11-14.

### **b. Perkolasi**

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna (*Exhaustive extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori.

## **2. Cara panas**

### **a. Refluks**

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk ekstraksi sempurna.

### **b. Soxhletasi**

Soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Biomassa ditempatkan dalam wadah soxhlet yang dibuat dengan kertas saring, melalui alat ini pelarut akan terus direfluks. Alat soxhlet akan mengosongkan isinya ke dalam labu dasar bulat setelah pelarut mencapai kadar tertentu. Setelah pelarut segar melewati alat ini melalui pendingin refluks, ekstraksi berlangsung sangat efisien dan senyawa dari biomassa secara efektif ditarik ke dalam pelarut karena konsentrasi awalnya rendah dalam pelarut.

### c. Fraksinasi

Fraksinasi adalah proses pemisahan suatu kuantitas tertentu dari campuran (padat, cair, terlarut, suspensi atau isotop) dibagi dalam beberapa jumlah kecil (fraksi) komposisi perubahan menurut bidangnya. Pembagian atau pemisahan ini didasarkan pada bobot dari tiap fraksi, fraksi yang lebih berat akan berada paling dasar sedang fraksi yang lebih ringan akan berada diatas. Fraksinasi bertingkat biasanya menggunakan pelarut organik seperti eter, aseton, benzena, etanol, diklorometana, atau campuran pelarut tersebut. Asam lemak, asam resin, lilin, tanin, dan zat warna adalah bahan yang penting dan dapat diekstraksi dengan pelarut organik.<sup>38</sup>

### E. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik pemisahan komponen-komponen campuran senyawa-senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa di antara padatan penyerap (adsorbent) sebagai fasa diam dengan suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati adsorbent (padatan penyerapan). Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan oleh pelarut (elusi). Karena kesederhanaan dan kecepatan analisisnya, KLT mempunyai peranan penting dalam pemisahan senyawa-senyawa yang volatilitasnya relative rendah, baik senyawa organik maupun senyawa anorganik.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Nur Adijuwana, *Teknik Spektroskopi dalam Analisis Biologi*, h. 17-18.

<sup>39</sup>Firdaus Zenta, *Laporan Hibah Penulisan Buku Ajar Teknik dalam Laboratorium Kimia Organik* (Makassar: Unhas, 2011), h. 73

Kromatografi lapis tipis (KLT) telah banyak digunakan pada analisis pewarna sintetik. KLT merupakan metode pemisahan yang lebih mudah, cepat dan memberikan resolusi lebih baik dibandingkan kromatografi kertas. Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa seperti ion-ion organik, kompleks senyawa-senyawa organik dengan anorganik, dan senyawa-senyawa organik baik yang terdapat di alam dan senyawa organik sintetik. Pada hakikatnya KLT melibatkan dua fase yaitu fase diam (sifat lapisan) dan fase gerak (campuran larutan pengembang).<sup>40</sup>

Pemisahan senyawa dengan kromatografi lapis tipis dalam medium secara prinsip sama dengan kromatografi kertas, tetapi mempunyai beberapa keuntungan tambahan, misalnya lebih banyak campuran medium dan senyawa yang dapat digunakan. Senyawa fluoresen dapat digabungkan dalam medium untuk memudahkan identifikasi noda. Metode ini sangat cepat dan dapat dilakukan kurang dari 1 hari. Noda yang dihasilkan sangat rapat, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi senyawa dalam konsentrasi rendah. Senyawa yang dipisahkan dapat dideteksi dengan semprotan korosif pada suhu tinggi, di mana hal ini tidak dapat dilakukan pada kromatografi kertas.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Novie Retno Utami, "Uji Sensitivitas Kertas Saring untuk Identifikasi Pewarna Rhodamin B pada Makanan Jajanan," *UJHP*, vol.3 no.2 (Maret 2013), h. 2. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph> (Diakses 30 April 2015).

<sup>41</sup>Maria Bintang, *Biokimia Teknik Penelitian*, h. 148.

Adsorben yang digunakan pada kromatografi lapis tipis (KLT) biasanya terdiri dari silika gel atau alumina dapat langsung atau dicampur dengan bahan perekat misalnya kalsium sulfat untuk disalutkan (dilapiskan) pada plat. Sekarang telah tersedia berbagai lapis tipis pada plat kaca, lembaran aluminium atau lembaran sintetik yang langsung dapat dipakai. Pada pemisahannya, fase bergerak akan membawa komponen campuran sepanjang fase diam pada plat sehingga terbentuk kromatogram. Pemisahan yang terjadi berdasarkan adsorpsi dan partisi. Teknik kerja kromatografi lapis tipis (KLT) prinsipnya hampir sama dengan kromatografi kertas. Namun kromatografi lapis tipis (KLT) memiliki kelebihan dibandingkan dengan kromatografi kertas (KK) yaitu<sup>42</sup>:

1. Waktu pemisahan lebih cepat.
2. Sensitif, artinya meskipun jumlah cuplikan sedikit masih dapat dideteksi.
3. Daya resolusinya tinggi sehingga pemisahan lebih sempurna.

Jika senyawa yang dianalisis dengan KLT adalah senyawa yang tidak berwarna, maka diperlukan suatu prosedur untuk mendeteksi noda yang diamati. Senyawa-senyawa yang dapat menyerap sinar (fluorescence) dapat ditampakan melalui penyinaran plat dengan sinar ultraviolet (lampu ultraviolet) di dalam tempat yang gelap. Senyawa seperti itu akan memancarkan sinar yang diserap sehingga akan tampak sebagai noda yang terang pada pelat. Jika padatan penyerap pada pelat KLT telah mengandung indikator fluorescence, maka seluruh pelat akan menjadi

---

<sup>42</sup>Eztien Yazid, *Kimia Fisika untuk Paramedis*, h. 209.

terang bila disinari dengan lampu ultraviolet kecuali daerah dimana senyawa berada. Keberadaan senyawa ditandai dengan noda hitam pada saat penyinaran.<sup>43</sup>

#### **F. Kromatografi Kolom Cair Vakum (KKCV)**

Kromatografi kolom cair vakum merupakan salah satu metode kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Prinsip kerja dari kromatografi ini yaitu adsorpsi atau serapan, sedangkan pemisahannya didasarkan pada senyawa-senyawa yang akan dipisahkan terdistribusi diantara fase diam dan fase gerak dalam perbandingan yang berbeda-beda. Ukuran dari kolom yang digunakan tergantung pada banyaknya zat yang akan dipindahkan. Secara umum perbandingan panjang dan diameter kolom sekitar 8:1 sedangkan jumlah penyerapnya adalah 25-30 kali berat bahan yang akan dipisahkan. Untuk menahan penyerap (adsorben) di dalam kolom dapat digunakan gelas wool atau kapas. Adsorbennya dapat digunakan adsorben anorganik seperti alumina, bauksit, magnesium silikat, silika gel dan tanah diatom sedangkan adsorben organik seperti arang gula, karbon aktif paling sering digunakan.<sup>44</sup>

#### **G. Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG)**

Kromatografi kolom gravitasi (KKG) termasuk jenis teknik kromatografi yang paling awal dikembangkan dan termasuk kromatografi serapan yang sering disebut kromatografi elusi. Kolom kromatografi dapat berupa pipa gelas yang dilengkapi dengan kran dan gelas penyaring didalamnya. Ukuran kolom tergantung

---

<sup>43</sup>Firdaus, *Teknik dalam Laboratorium KimiaOrganik*, h. 77.

<sup>44</sup>Eztien Yazid, *Kimia Fisika untuk Paramedis*, h. 198.

pada zat yang akan dipisahkan. Untuk menahan penyerap yang diletakkan di dalam kolom dapat digunakan *glass woll* atau kapas. Aplikasi teknik banyak digunakan untuk pemurnian senyawa setelah melewati teknik KLT, misalnya untuk pemurnian karotenoid, klorofil serta senyawa bioaktif tumbuhan lainnya. Teknik ini dilengkapi dengan spektrometer yang secara otomatis dapat mengukur spektrum serapannya. Biasanya, pengambilan fraksi cairan dilakukan secara manual dan kemudian diukur dengan spektrometer.<sup>45</sup>

#### **H. Pemurnian dan Identifikasi**

Teknik yang paling sederhana dan efektif untuk pemurnian padatan senyawa organik adalah kristalisasi atau rekristalisasi yaitu suatu teknik untuk mendapatkan bahan murni suatu senyawa. Untuk mengkristalkan suatu senyawa, biasanya dilakukan terlebih dahulu penjenuhan larutan kemudian diikuti dengan penguapan pelarut secara perlahan-lahan sampai terbentuk kristal. Pengkristalan dapat pula dilakukan dengan mendinginkan larutan jenuh pada temperatur yang sangat rendah. Banyak hal yang menentukan keberhasilan rekristalisasi, diantaranya adalah kecocokan pelarut. Perlu ada usaha khusus untuk menentukan pelarut yang baik untuk rekristalisasi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Giner Maslebu, Dkk., "Kombinasi Teknik Kromatografi Kolom Gravitasi -Spektrometer Sederhana sebagai Permodelan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)", *Jurnal Sains dan Pendidikan Sains* 7 (2012), h. 89.

<sup>46</sup>Musyarrifah, "Identifikasi Metabolit Sekunder Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat (*Persea americana Mill.*) dan Uji Toksisitas Terhadap Larva Udang (*Artemia salina Leach*)" *Skripsi, Jurusan Kimia, UIN Alauddin Makassar* (2013), h. 22

a. Kristalisasi dan Rekrystalisasi

Senyawa yang terbentuk Kristal kemurniannya mudah diketahui. Teknik rekrystalisasi menggunakan pelarut yang sesuai. Pada proses kristalisasi terjadi kesetimbangan antara molekul dalam larutan dan dalam kesetimbangan dengan kisi-kisi kristalisasinya. Karena kisi-kisi Kristal lebih tertur, berbeda dengan molekul pengotor. Molekul pengotor akan dikeluarkan dari kisi-kisi Kristal dan kembali ke larutan. Dengan demikian hanya molekul senyawa-senyawa yang diinginkan tetap dalam kisi-kisi Kristal sedangkan pengotornya akan kembali ke larutan.<sup>47</sup>

b. Uji Pereaksi

Pendekatan skrining fitokimia meliputi analisis kualitatif kandungan kimia dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, buah dalam dan biji, terutama kandungan metabolit sekunder yang bioaktif, yaitu alkaloid, antrakuinon, flavonoid, glikosida jantung, kumarin, saponin (steroid dan triterpenoid), tannin (polifenolat), minyak atsir (terpenoid) dan sebagainya. Adapun tujuan pendekatan skrining fitokimia adalah mengetahui kandungan bioaktif atau kandungan yang berguna untuk pengobatan dalam tumbuhan.<sup>48</sup>

c. Uji Spektroskopi Infra Red

Identifikasi lengkap dalam golongan senyawa bergantung pada pengukuran sifat atau ciri lain, yang kemudian dibandingkan dengan data dalam pustaka. Salah

---

<sup>47</sup>Firdaus Zenta, Laporan Hibah Penulisan buku ajar Teknik dalam Laboratorium Kimia Organik, h. 53.

<sup>48</sup>Dyah Septyaningsih, "Isolasi dan Identifikasi Komponen Utama Ekstrak Biji Buah Merah (*Pandanus conoideus Lamk*) "Skripsi (2010). h. 10.

satu cara dengan mengidentifikasi ciri spektrumnya yaitu dengan menggunakan spektroskopi inframerah (IR).<sup>49</sup>

Spektrum inframerah senyawa tumbuhan dapat diukur dengan spektrofotometri inframerah yang merekam secara otomatis dalam bentuk larutan, bentuk gerusan dalam minyak nuyol atau bentuk padat yang dicampur dengan kalium bromide. Untuk padatan, sampel dibuat seperti cakram tipis dari campuran serbuk yang mengandung kira-kira 1 mg bahan dan 10-100 mg kalium bromida dalam kondisi tanpa air yang ditempa ke dalam cetakan. Jangka pengukuran mulai dari 4000 sampai 667  $\text{cm}^{-1}$  dan perekaman spektrum memakan waktu kira-kira tiga menit.<sup>50</sup>

### **I. Bakteri *Staphylococcus***

Bakteri *Staphylococcus* adalah sel berbentuk bulat, gram positif tersusun seperti buah anggur, kuman ini mudah tumbuh pada berbagai media dan metabolismenya aktif, meragikan banyak karbohidrat dan menghasilkan pigmen yang bervariasi dari warna putih hingga kuning tua. *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri pathogen penyebab keracunan yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang tercemar. Keracunan disebabkan kontaminasi enteroksin dari bakteri *Staphylococcus aureus*. Gejalanya yaitu ditandai oleh rasa mual, muntah-muntah kemudian diare hebat beserta demam. Bakteri *Staphylococcus aureus* bersifat resisten terhadap antibiotik dan resistensi sering terjadi karena penggunaan antibakteri yang tidak sesuai aturan, sehingga antibakteri yang digunakan menjadi

---

<sup>49</sup>J.B Harbone., *Metode Fitokimia.*, h. 24

<sup>50</sup>J.B Harbone., *Metode Fitokimia.*, h. 25

tidak efektif. Bakteri ini biasanya terdapat pada saluran pernapasan atas dan kulit. Keberadaan *Staphylococcus aureus* pada saluran pernapasan atas dan kulit pada individu jarang menyebabkan penyakit, individu sehat biasanya hanya berperan sebagai karier. Infeksi serius akan terjadi ketika resistensi inang melemah karena adanya perubahan hormon, adanya penyakit, luka, atau perlakuan menggunakan steroid atau obat lain yang memengaruhi imunitas sehingga terjadi pelemahan inang.<sup>51</sup>



**Gambar 2.13 : Bakteri *Staphylococcus aureus***

---

<sup>51</sup>Eva Ulina Sirat, Siti Khotimah dan Masnur Turnip, “ Ekstrak buah Laban (*Vitex pubescens Vahl*) sebagai penghambat pertumbuhan *Salmonella thypi* dan *Staphylococcus aureus*” *Jurnal Protobiont* (40-45). (2014). h. 40.

*Staphylococcus aureus* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>52</sup>

Divisi	: Protophyta
Kelas	: Schizomycetes
Bangsa	: Eubacteriales
Suku	: Micrococcaceae
Marga	: Staphylococcus
Jenis	: <i>Staphylococcus aureus</i>

*Staphylococcus aureus* tidak bergerak, tidak berspora dan positif Gram. Bakteri ini mulai tumbuh pada berbagai pembedihan atau metabolisme yang aktif, meragikan banyak karbohidrat yang lambat, menghasilkan asam laktat tetapi tidak menghasilkan gas dari meragikan pigmen yang bervariasi dari putih sampai kuning tua. *Staphylococcus* patogen sering menghemolisis darah dan mengkoagulasi plasma, beberapa diantaranya tergolong flora normal kulit dan selaput lendir manusia.<sup>53</sup>

Pertumbuhan terbaik dan khas pada bakteri ini adalah suasana aerob, bakteri ini pun bersifat anaerob fakultatif dan dapat tumbuh dalam udara yang hanya mengandung hidrogen dan pH optimum untuk pertumbuhan adalah 7,4. Warna khas ialah kuning keemasan, hanya intensitas warnanya dapat bervariasi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Asri Subekti, "Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Waru Landak (*Hibiscus Mutabilis* L.) Terhadap *Staphylococcus Aureus* dan *Escherichia Coli* Serta *Brine Shrimp Lethality Test*" Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta (2009). h. 11.

<sup>53</sup>Asri Subekti, "Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Waru Landak (*Hibiscus Mutabilis* L.) Terhadap *Staphylococcus Aureus* dan *Escherichia Coli* Serta *Brine Shrimp Lethality Test*" Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta (2009). h. 11.


## J. *Escherichia coli*

*Escherichia coli*, atau biasa disingkat *E. coli*, adalah salah satu jenis spesies utama bakterigram negatif. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodor Escherich ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Kebanyakan *E. coli* tidak berbahaya, tetapi beberapa, seperti *E. coli* tipe O157:H7, dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan bernama verotoksin. Bakteri ini membentuk koloni bundar, cembung, halus dengan tepi nyata. *E. coli* selama berada dalam usus tidak berbahaya, tetapi bila sudah berada di luar usus dan migrasi ke alat-alat tubuh lainnya, akan bersifat patogen. Media differensial untuk identifikasi *E. coli* digunakan Endo Agar dengan hasil warna koloni merah metalik, koloni kilap logam hasil warna koloni merah metalik, koloni kilap logam dan warna medium merah violet. Kandungan dari medium Endo Agar adalah pepton dari daging, laktosa, dikalium hidrogen fosfat, natrium sulfit anhidrat, fuchsin, dan agar. Warna medium sebelum digunakan adalah merah muda. Natrium sulfit dan fuchsin berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri Gram positif<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup>Asri Subekti, "Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Waru Landak (*Hibiscus Mutabilis* L.) Terhadap *Staphylococcus Aureus* dan *Escherichia Coli* Serta *Brine Shrimp Lethality Test*" Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta (2009). h. 11.

<sup>55</sup>Asri Subekti, "Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Waru Landak (*Hibiscus Mutabilis* L.) Terhadap *Staphylococcus Aureus* dan *Escherichia Coli* Serta *Brine Shrimp Lethality Test*" Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta (2009). h. 14.



**Gambar 2.13 : Bakteri *Escherichia coli***

Klasifikasi bakteri *Escherichia coli* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Divisi : Protophyta  
 Klas : Schizomycetes  
 Ordo : Eubacteriales  
 Famili : Enterobacteriaceae  
 Genus : *Escherichia*  
 Spesies : *Escherichia coli*

UNIVERSITAS ISLAM TERBUKA  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Oktober 2015 – Februari 2016 di Laboratorium Kimia Organik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan Laboratorium Organik Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar.

#### B. Alat dan Bahan

##### 1. Alat

Alat-alat yang digunakan adalah alat-alat gelas, *rotary evaporator*, chamber, corong *cintared* gelas, plat KLT, lampu UV 254-366 nm, kolom kromatografi cair vakum, neraca analitik, oven, alat penyemprot, pompa vakum, mikropipet, pipa kapiler, botol vial, pinset, pembakar spiritus dan alat spektrofotometer FTIR Prestige 21 merek Shimadzu.

##### 2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah daun kayu bitti (*Vitex cofassus*), akuades, etanol, N-heksan, etil-asetat, pereaksi Liebermann-Buchard, pereaksi Wagner, pereaksi Mayer, pereaksi Dragendroff, asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) 10%, asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) pekat, natrium hidroksida (NaOH) 10%, natrium klorida (NaCl), silika G<sub>60</sub> (230-400

mesh) Merck nomor katalog 7730, 7733 dan 7734, alumunium foil, kertas saring, bakteri *Staphylococcus aureus* dan *E. coli*.

### **C. Prosedur Kerja**

Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu:

#### **1. Preparasi Sampel**

Daun kayu bitti (*Vitex cofassus*) dibersihkan dari pengotor yang menempel pada permukaan daun kemudian dikeringkan kurang lebih selama 2 minggu dan dipotong kecil-kecil (serbuk) sampai diperoleh berat konstan, kemudian hasilnya digunakan sebagai sampel penelitian.

#### **2. Ekstraksi**

Ekstraksi komponen aktif dilakukan dengan metode maserasi atau perendaman. Serbuk daun kayu bitti (*Vitex cofassus*) ditimbang sebanyak 2 kg dan diekstraksi secara maserasi dengan pelarut n-heksan selama 1x24 jam sebanyak 3 kali. Kemudian filtrat yang dihasilkan ditampung dan dipekatkan dengan menggunakan *rotary evaporator*. Selanjutnya hasil pemekatan digunakan untuk uji fitokimia, uji antibakteri dan identifikasi dengan menggunakan alatspektrofotometer FTIR Prestige 21 merek Shimadzu.

#### **3. Identifikasi**

Identifikasi dilakukan dengan uji fitokimia kandungan senyawa aktif dengan uji reagen dari ekstrak pekat n-heksan daun kayu bitti dilarutkan dengan sedikit

masing-masing dengan pelarutnya. Kemudian dilakukan uji alkaloid, sterol, triterpen, uji saponin serta uji flavonoid.

**a. Uji Alkaloid**

1. Tes dengan Pereaksi Dragendorff

Ditambahkan dua tetes pereaksi Dragendorff pada sampel, jika terjadi warna jingga atau endapan coklat maka sampel tersebut mengandung alkaloid.

2. Tes dengan Pereaksi Wagner

Ditambahkan dua tetes pereaksi wagner pada sampel, jika terjadi endapan coklat maka sampel tersebut mengandung alkaloid.

3. Tes dengan Pereaksi Mayer

Ditambahkan dua tetes pereaksi Mayer pada sampel, jika terbentuk endapan menggumpal berwarna putih atau kuning yang larut dalam metanol maka ada kemungkinan terdapat alkaloid.

**b. Uji Sterol dan Triterpen**

***Tes dengan Pereaksi Lieberman-Bourchard***

Ditambahkan 3 tetes sampel pada kaca arloji, kemudian pereaksi Lieberman-Bourchard (asam asetat glasial-asam sulfat pekat) diteteskan ke dalamnya, bila positif terpenoid terbentuk warna merah hingga ungu dan bila positif steroid terbentuk warna biru atau hijau.

### c. Uji Flavonoid

Pemeriksaan golongan flavonoid dapat dilakukan uji yang dapat diketahui melalui perubahan warna, yaitu :

#### a) Tes dengan NaOH 10%

Beberapa tetes sampel ditambahkan ke dalam cawan petri, kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan NaOH 10%. Perubahan warna yang terjadi diamati dari kuning tua menjadi kuning muda.

#### b) Tes dengan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (pekat)

Ditambahkan beberapa tetes sampel dalam 2-4 tetes larutan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat. Perubahan warna yang terjadi diamati dari kuning tua menjadi merah tua.

#### c) Tes dengan FeCl<sub>3</sub>

Diteteskan pereaksi besi (III) klorida (FeCl<sub>3</sub>) pada sampel, perubahan warna yang terjadi biru hitam atau kompleks biru.

### 4. Fraksinasi dengan KLT, KKCV dan KKG

Ekstrak kental yang diperoleh di KLT kemudian diteruskan dengan kromatografi kolom cair vakum (KKCV). Fraksi yang menunjukkan adanya kristal dilanjutkan pada kromatografi kolom grafitasi (KKG), sehingga diperoleh fraksi yang lebih sederhana.

### 5. Pemurnian

Pemurnian dilakukan dengan cara kristalisasi dan rekristalisasi dengan pelarut n-heksan, sehingga diperoleh kristal murni yang berwarna putih kehijauan yang

ditandai dengan hasil KLT yang menunjukkan satu noda pada tiga sistem eluen dengan menggunakan eluen

## **6. Identifikasi Ekstrak N-heksan Daun Kayu Bitti dengan Menggunakan Spektrofotometer Infra Red (IR)**

Disiapkan isolat hasil pemurnian ditumbuk hingga memenuhi ukuran partikel kurang dari 2  $\mu\text{m}$ . Kemudian dimasukkan ke dalam pellet press secara merata. Pellet press dihubungkan ke pompa vakum selama 15 menit diusahakan pellet yang terbentuk mempunyai ketebalan 0,3 mm (transparan), selanjutnya dibuka pellet secara hati-hati dan dipindahkan ke dalam sel holder menggunakan spatula. Setelah itu diatur alat spektrometer Infra Merah (IR) dengan kecepatan kertas pada posisi “normal” dan ekspansi transmisi “100x”. Dicek skala kertas melalui pembuatan spektrum dari film polystiren. Apabila skala kertas sudah tepat, dengan cara yang sama dibuat spektrum Infra Red (IR) dari sampel yang sudah disiapkan, kemudian ditentukan gugus-gugus fungsinya.

## **7. Uji Aktifitas Antibakteri**

### **a) Pembuatan konsentrasi ekstrak dan kristal**

Ekstrak kental daun kayu bitti dibuat dalam beberapa konsentrasi yaitu konsentrasi 100%, 50% dan 20% dengan pelarut n-heksan. Begitupun dengan kristal murni.

### **b) Penyiapan bakteri uji**

Bakteri yang digunakan adalah isolat bakteri *staphylococcus aureus* dan *E. coli*.

**c) Peremajaan bakteri**

Bakteri uji diremajakan dengan menggosokkan bakteri menggunakan ose pada media agar miring NA dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

**d) Pembuatan suspensi bakteri**

Satu ose bakteri *staphylococcus aureus* dan *E. coli* dari medium NA diambil dan dicampurkan kedalam NaCl 0,9% kemudian dihomogenkan. Suspensi bakteri kemudian disamakan kekeruhannya dengan larutan standar 0,5 Mc Farlan dengan menggunakan alat Densicheck.

**e) Penyiapan media Muller Hinton Agar (MHA)**

Ditimbang 3,8 gram MHA dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 100 ml aquades, dipanaskan sampei mendidih dan diaduk. Ditutup dengan kapas yang dibungkus dengan kasa steril. Disterilkan media diautoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Setelah steril, tuang media MHA kedalam capet sebanyak 5 mL dan biarkan 15 menit, selanjutnya letakkan pencadang di atas permukaan media dan tuang media MHA sebanyak 15 mL dan biarkan selama 15 menit, cabut pencadang dari permukaan media sehingga terbentuk sumur/lubang.

**f) Pengujian aktivitas bakteri *staphylococcus aureus* dan *E. coli*.**

Inokulasikan suspensi bakteri *staphylococcus aureus* dan *E. coli* pada permukaan media MHA dengan swab steril hingga seluruh permukaan kontak dengan isolat bakteri, diamkan  $\pm$  15 menit hingga permukaan media kering.

Dengan menggunakan mikropipet, teteskan  $\pm 200 \mu\text{L}$  ekstrak pada sumur/pencadang, control obat yang digunakan yaitu disk ciprofloxacin, control negatifnya n-heksan. Inubasi 2x24 jam, amati dan ukur zona hambat yang dihasilkan pada setiap konsentrasi dengan jangka sorong, lakukan pengulangan sebanyak 3 kali.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hasil**

##### **1. Ekstraksi**

Sampel daun kayu bitti (*Vitex cofassus*) yang telah dipreparasi kemudian dimaserasi dengan menggunakan pelarut *n*-heksan selama 24 jam (3 hari) menghasilkan ekstrak *n*-heksan sebanyak 26,2497 gram. Kemudian ekstrak kental yang diperoleh di uji KLT untuk mengetahui eluen yang cocok untuk melakukan kromatografi kolom cair vakum dengan berbagai perbandingan pelarut. Hasil dari KLT menunjukkan eluen yang cocok yaitu eluen *n*-heksan:etil asetat (9:1)(Lampiran 2).

##### **2. Identifikasi**

Ekstrak kental dari *n*-heksan selanjutnya di uji fitokimia untuk mengetahui jenis metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya dengan berbagai pereaksi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak *n*-heksan positif mengandung senyawa metabolit sekunder alkaloid dan steroid. Hasil uji fitokimia terlihat pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.1 di bawah ini.

**Tabel 4.1.** Hasil Uji Fitokimia Ekstrak *n*-Heksan Daun Kayu Bitti

No	Jenis Pereaksi	Hasil	Keterangan
1	Mayer	Endapan Kuning	+ Alkaloid
2	Dragendorf	Endapan cokelat	+ Alkaloid
3	Wagner	Endapan cokelat	+ Alkaloid
4	Lieberman buchard	Endapan hijau	+Steroid
5	NaOH 10%	Endapan hijau	-Flavanoid
6	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Endapan hijau tua	-Flavanoid
7	FeCl <sub>3</sub>	Endapan cokelat	-Flavanoid

**Keterangan :**

(+) : ada senyawa

(-) : tidak ada senyawa


**3. Fraksinasi dan Pemurnian**

Ekstrak *n*-heksan yang diperoleh difraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom cair vakum (KKCV) dengan eluen *n*-heksan: etil asetat yang diketahui kepolarannya yaitu pelarut 100% *n*-heksan (dua kali), *n*-heksan:etil asetat (9,5:0,5 dua kali, 9:1 dua kali, 8:2 tiga kali, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9) dan 100% etil asetat sehingga menghasilkan 17 fraksi, seperti pada tabel 4.2.


**Tabel 4.2.** Tabel hasil pengamatan fraksinasi

Fraksi	Eluen	Karakteristik fraksi
1	n-heksan 100%	Larutan hijau
2	n-heksan 100%	Larutan hijau
3	n-heksan: etil asetat (9,5: 0,5)	Larutan coklat
4	n-heksan: etil asetat (9,5: 0,5)	Larutan coklat kekuningan
5	n-heksan: etil asetat (9:1)	Larutan kuning muda
6	n-heksan: etil asetat (9:1)	Larutan kuning muda
7	n-heksan: etil asetat (8:2)	Larutan kuning kehijauan
8	n-heksan: etil asetat (8:2)	Larutan hijau
9	n-heksan: etil asetat (8:2)	Larutan hijau pekat
10	n-heksan: etil asetat (7:3)	Larutan hijau pekat
11	n-heksan: etil asetat (6:4)	Larutan hijau kekuningan
12	n-heksan: etil asetat (5:5)	Larutan hijau kekuningan
13	n-heksan: etil asetat (4:6)	Larutan hijau kekuningan
14	n-heksan: etil asetat (3:7)	Larutan hijau kekuningan
15	n-heksan: etil asetat (2:8)	Larutan kuning
16	n-heksan: etil asetat (1:9)	Larutan hijau muda
17	100% Etil asetat	Larutan hijau muda

Fraksi-fraksi di KLT untuk mengetahui pemisahan komponen-komponen dan selanjutnya fraksi dengan noda dan nilai R<sub>f</sub> yang sama digabung.

**Gambar 4.2.** Kromatografi Lapis Tipis setelah KKC


Setelah digabung diperoleh 6 fraksi yang diantaranya fraksi A (fraksi 1-3), fraksi B (fraksi 4 - 6), fraksi C (fraksi 7), fraksi D (fraksi 8), fraksi E (fraksi 9-12) dan fraksi F (fraksi 13-17).



**Gambar 4.3.** Kromatografi Hasil KLT fraksi Gabungan

Fraksi A menunjukkan tanda-tanda kristal, sehingga dilanjutkan dengan proses kristalisasi dan rekristalisasi dengan menggunakan pelarut aseton. Hasilnya berupa kristal yang berwarna putih. Kristal kemudian dianalisis dengan uji KLT menggunakan eluen n-heksan:etil asetat (7:3) dan menunjukkan satu noda. Kemudian kemurnian kristal dilakukan melalui uji KLT 3 sistem eluen yaitu menggunakan eluen kloroform: n-heksan (8:2), n-heksan: metanol (9:1) dan etil asetat:kloroform (4:6) dan masing-masing menunjukkan satu noda. Kristal murni yang diperoleh sebesar 4,4128 gram.

M A K A S S A R



**Gambar 4.3 : Kromatografi Hasil KLT uji Sistem tiga Eluen (a) eluen klororofm: n-heksan (8:2) Rf 0,2 (b) eluen n-heksan: metanol (9:1) Rf 0,6 dan (c) eluen etil asetat: kloroform (4:6) Rf 0,8**

#### 4. Karakterisasi dengan Spektrofotometer IR

Selanjutnya adalah karakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer IR. Hasil identifikasi pada spektrofotometer IR di lihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4.** Hasil Serapan Spektoskopi IR ekstrak n-heksan

No	Daerah serapan (cm <sup>-1</sup> )	Pada Pustaka <sup>56</sup>	Gugus Fungsi
1	3446,89 – 3130,47	3500-3200	N - H
2	2918,3 – 2848,86	2936-2916	C -H
3	2337,72 – 2019,47	2400-2300	C= C
4	1467,83	1465	CH <sub>2</sub>
5	1377,17	1450	CH <sub>3</sub>

#### 5. Uji Antibakteri

Hasil uji antibakteri pada ekstrak dan kristal dengan metode sumuran terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *E-coli*.

<sup>56</sup>Stephen Indra dkk, “Ekstraksi Antioksidan dari Kulit Buah Manggis (*Garchinia mangistana L*)” *Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Khatolil Parahyangan, Bandung* (2011)., h. 34.

**Tabel 4.5.** Tabel Antibakteri Ekstrak n-Heksan Daun Kayu Blitti

No	Sampel	Konsentrasi	Zona Hambat	Zona Hambat <i>Staphylococcus aureus</i>	Zona Hambat <i>E.Coli</i>
1.	Ekstrak	100%	Negatif	(-)	(-)
		50%	Negatif		
		20%	Negatif		
		Kontrol (+)	Positif		
		Kontrol (-)	Negatif		
2.	Kristal	100%	Negatif	(-)	(-)
		50%	Negatif		
		20%	Negatif		
		Control (+)	Positif		
		Control (-)	Negatif		

Keterangan:

K (-) : Kontrol (-) yaitu pelarut

K (+) : Kontrol (+) yaitu kontrol obat (ciprofloxacin)

- : Tidak terjadi pertumbuhan bakteri

+ : Terjadi pertumbuhan bakteri

## B. Pembahasan

### 1. Ekstraksi

Daun kayu blitti dikeringkan pada suhu kamar tanpa terkena cahaya sinar matahari langsung, karena jika terkena sinar matahari langsung maka hampir sebagian besar senyawa metabolit sekunder dalam sampel akan rusak oleh panas matahari secara langsung. Tujuan pengeringan untuk mempermudah membuat serbuk dan mengurangi kadar air dari dalam sampel sehingga tidak ditumbuhi jamur. Sampel yang dikeringkan dihancurkan dengan menggunakan blender sampai berbentuk

serbuk bertujuan untuk memperluas permukaan yang berkontak langsung dengan pelarut sehingga proses ekstraksi berlangsung lebih sempurna.

Ekstraksi adalah teknik pemisahan secara kimia atau fisika dengan sejumlah bahan padat atau bahan cair yang terdapat pada jaringan tumbuhan. Ekstraksi yang dilakukan dalam penelitian yaitu ekstraksi dengan metode maserasi. Maserasi merupakan teknik dengan cara perendaman menggunakan pelarut tertentu pada temperatur kamar. Dalam teknik ekstraksi maserasi memiliki beberapa keuntungan yaitu pengerjaannya mudah, sangat cocok untuk senyawa metabolit sekunder yang tidak tahan panas dan dapat melarutkan banyak senyawa metabolit sekunder kecuali bahan yang mudah mengembang. Didalam pemilihan pelarut yang digunakan dalam maserasi harus pelarut yang ideal yaitu pelarut yang menunjukkan selektivitas maksimal yang mempunyai kapasitas terbaik yang ditinjau dari sifat-sifat bahan yang diekstraksi. Senyawa polar dapat larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dapat larut dalam pelarut nonpolar. Pelarut yang dipakai dalam proses maserasi adalah pelarut n-heksan. Pelarut n-heksan dipilih karena n-heksan merupakan pelarut yang dapat melarutkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang nonpolar. Maserasi dilakukan selama 3x24 jam dan menghasilkan maserat yang berwarna hijau pekat sebanyak 26,2497 gram. Maserat selanjutnya dievaporasi yang bertujuan untuk memekatkan maserat sehingga menghasilkan ekstrak kental n-heksan dari daun kayu bitti (*Vitex cofassus*).

## 2. Identifikasi

Ekstrak kental yang didapatkan selanjutnya, dilakukan uji fitokimia pada ekstrak yang menunjukkan hasil bahwa n-heksan positif mengandung senyawa metabolit sekunder alkaloid dan steroid (Tabel 4.1). kemudian ekstrak n-heksan dianalisis dengan KLT yang merupakan identifikasi awal untuk menentukan jumlah senyawa dari ekstrak kental. KLT bertujuan untuk mengetahui eluen yang bagus untuk proses fraksinasi awal dengan kromatografi kolom cair vakum (KKCV), eluen yang dipakai di uji dengan beberapa perbandingan pelarut mulai dari yang kepolaran rendah sampai yang kepolarannya tinggi. Eluen boleh dikatakan bagus apabila memiliki pola pemisahan yang paling baik dari pada eluen lain, karena memberikan noda terbanyak dan terpisah baik serta jarak antara noda cukup terpisah. Eluen yang dipakai adalah n-heksan:etil asetat (9:1). Selain uji KLT ekstrak kental juga dilakukan uji fitokimia yang bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak.

## 3. Fraksinasi dan Pemurnian


Fraksinasi adalah proses pemisahan komponen-komponen senyawa dalam ekstrak kental menjadi fraksi. Fraksinasi awal dilakukan dengan kromatografi kolom cair vakum (KKCV). Fase diam yang dipakai adalah silika G<sub>60</sub> PF 254 tipe 7730 dan eluen n-heksan : etil asetat (9:1) sebagai fase gerak untuk memisahkan senyawa-senyawa pada ekstrak berdasarkan tingkat polaritasnya. Ekstrak kental yang dipakai adalah sebanyak 3 gram kemudian diimpregasi dengan silika tipe 7730. Pengemasan kolom harus betul-betul rapat yang bertujuan agar proses elusi dan pemisahan

senyawanya sempurna. Eluen yang dipakai adalah 100% n-heksan, n-heksan:etil asetat (9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9) dan 100 etil asetat. Hal ini bertujuan agar senyawa yang nonpolar dan polar semuanya turun terelusi bersama dengan eluen kromatografi kolom cair vakum dibantu dengan tekanan dari pompa vakum sehingga laju aliran fase gerak meningkat. Fraksi yang terelusi bersama dengan eluen ditampung kedalam mangkok kaca dan menghasilkan warna fraksi masing-masing. Fraksi yang diperoleh dari hasil kromatografi kolom cair vakum adalah sebanyak 17 fraksi dapat dilihat pada (tabel 4.2), fraksi-fraksi yang didapat selanjutnya di KLT dengan eluen n-heksan:etil asetat (9:1) yang bertujuan agar senyawa-senyawa yang memiliki penampakan noda yang sama pada KLT digabung. Hasil fraksi gabungan terdiri dari fraksi A, fraksi B, fraksi C, fraksi D, fraksi E dan Fraksi F yang terdiri dari 6 fraksi. Fraksi yang menunjukkan tanda-tanda kistal adalah fraksi A.

Fraksi A yang didapat dari kromatografi cair vakum dilakukan dengan uji pemurnian. Jika senyawa tersebut telah murni akan memberikan noda tunggal dalam eluen lainnya dan apabila kristal belum murni maka dilanjutkan pemurnian dengan cara kristalisasi dan rekristalisasi. Teknik rekristalisasi menggunakan pelarut yang sesuai. Proses pemurnian kistal dilakukan dengan pelarut aseton. Kristal yang diperoleh dari hasil rekristalisasi adalah kristal berwarna putih kekuningan yang selanjutnya dilakukan kembali uji 3 sistem eluen. Eluen yang digunakan adalah eluen kloroform: n-heksan (8:2), n-heksan: metanol (9:1) dan etil asetat:kloroform (4:6). Satu noda dari 3 sistem eluen yang membuktikan bahwa kristal diperoleh telah murni.

#### 4. Karakterisasi dengan Spektrofotometer IR

Tampilan spektrum menunjukkan bahwa puncak yang menunjukkan gugus fungsi dengan grafik perbandingan serapan bilangan gelombang terdapat transmittan (%T) terlihat pada (Gambar 4.4 dan Tabel 4.4).



Hasil karakterisasi IR terhadap kristal murni memperlihatkan adanya serapan-serapan yang khas untuk beberapa gugus fungsi diantaranya ialah pada daerah bilangan gelombang pada peak 3446,89  $\text{cm}^{-1}$  sedangkan serapan pada bilangan gelombang 3606,89  $\text{cm}^{-1}$  yang menunjukkan adanya gugus N-H tetapi dengan intensitas sangat lemah sehingga hasil serapan tidak terdeteksi, pada bilangan 2918,3  $\text{cm}^{-1}$  - 2848,86  $\text{cm}^{-1}$  memberi petunjuk adanya vibrasi alifatik, pada bilangan 2337,72  $\text{cm}^{-1}$  - 2019,47  $\text{cm}^{-1}$  menunjukkan gugus C=C, pada bilangan 1467,83  $\text{cm}^{-1}$  merupakan CH<sub>2</sub>, sedangkan pada daerah serapan 1377,17  $\text{cm}^{-1}$  adalah CH<sub>3</sub>. Menurut

(Fessenden 1986) gugus OH pada bilangan gelombang 3446,89  $\text{cm}^{-1}$  sedangkan serapan pada bilangan gelombang 3606,89  $\text{cm}^{-1}$  menunjukkan vibrasi ulur N-H. alkohol dan amina menunjukkan absorpsi uluran OH atau N-H yang jelas pada bilangan gelombang 3000-3700  $\text{cm}^{-1}$  disebelah kiri absorpsi CH. Berdasarkan data spektroskopi IR dapat diketahui bahwa senyawa yang terdapat dalam kristal mempunyai gugus N-H yang teridentifikasi sebagai senyawa alkaloid. Uji titik leleh kristal alkaloid menggunakan alat *melting point* hasil analisa menunjukkan bahwa titik leleh yang diperoleh yaitu 77,1°C.

#### 5. Uji Antibakteri *Staphylococcus aureus* dan *E-coli*

Uji aktivitas antibakteri bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak n-heksan pada daun kayu bitti (*Vitex cofassus*) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *E. coli*. Uji terhadap kontrol menunjukkan hasil bahwa kontrol negatif dari ekstrak n-heksan tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri atau tidak menghambat. terlihat pada (Tabel 4.4) dan (Gambar 4.4).



**Gambar 4.4** :Uji antibakteri ekstrak N-Heksan dengan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.



**Gambar 4.5** Uji antibakteri Kristal dengan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.

Kontrol pertumbuhan menunjukkan hasil bahwa bakteri *S. Aureus* dan *E. coli* dapat tumbuh dengan baik. Uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan daun kayu bitti tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *S. Aureus* dan *E. coli* pada konsentrasi 100%, 50% dan 20% tidak menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena senyawa-senyawa aktif yang tersari dalam masing-masing ekstrak mempunyai tingkat kepolaran yang berbeda serta senyawa aktif yang berpotensi sebagai antibakteri tidak bisa tersari dalam pelarut non polar seperti n-heksan.

Dalam prespektif islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah dimuka bumi ini pasti memiliki manfaat dan kegunaannya. Demikian pula Allah menciptakan manusia dengan banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Manusia diberi akal dan pikiran dengan tujuan untuk memikirkan dan mengungkap segala sesuatu yang ada di dunia, seperti firman Allah dalam surat at Thaha ayat 53.

*"Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam".*

Allah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Allah menempatkan manusia di bumi dengan menghamparkannya agar mereka dapat menikmati hidup dan berakal guna meraih kehidupan yang lebih mulia dan tinggi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Senyawa ekstrak n-heksan daun kayu Bitti (*Vitex cofassus*) berupa kristal putih yang diduga merupakan senyawa golongan alkaloid.
2. Dari ekstrak n-heksan daun kayu bitti (*Vitex cofassus*) pada konsentrasi 100%, 50% dan 20% dan senyawa murninya tidak memiliki zona hambat pada uji aktivitas bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.

#### B. Saran

Saran pada penelitian ini yaitu sebaiknya perlu dilakukan pengujian senyawa ekstrak n-heksan lebih lanjut dengan menggunakan perbandingan fase gerak yang lebih tepat dan sebaiknya perlu dilakukan juga aktivitas antibakteri dengan senyawa non polar yang lain atau dengan memilih bagian tanaman yang lain dari tanaman daun kayu bitti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R


## DAFTAR PUSTAKA

- Adjuwana, Nur. *Teknik Spektroskopi dalam Analisis Biologi*. Bandung: 2013.
- Ali Faturrohman, Muhammad dan Peni Indrayudha, “Aktivitas Antibakteri Ekstrak N-Heksan Kelopak Rosella (*Hibiscus Sabdariffa* Linn) Terhadap *propionibacterium Acne* Sensitif, *Escherichia Coli*, dan *Staphylococcus Aureus* Multiresisten.” *Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. (2012).
- Anonim. “*Vitex cofassus* Renw, ex Blu
- Anonim. “*Pohon Gofasa, Gupasa, atau Kayu Bitti (Vitex cofassus)*”.
- Anonim. “*Sekilas Tentang kayu Bitti (Vitex cofassus) atau New Guinea Teak*”.
- Anonim, “*Bakteri Penyebab Bau Badan Tidak Sedap*”.
- Al Anshori, Jamaluddin. *Penuntun Praktikum Kimia Organik*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2007.
- Al- Maraghi, A. M. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 7*. Semarang: CvToha Putra Semarang 1992.
- Al- Misbah, M. Quraish Shihab. *Tafsir Al- Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Arifuddin. M. “*Sitotoksitas Bahan Aktif Lamun dari Kepulauan Spermonde Kota Makassar Terhadap Artemia Salina (Linnaeus, 1758)*”, *Jurnal Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin* (2013): h. 15.
- Bintang, Maria. *Biokimia Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Departemen Agama. *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Eva, Julianti. “*Isolasi Senyawa Flavonoida dari Daun Tumbuhan Jati Putih (Gmelina arborea Roxb)*”. *Jurnal Saintia Kimia* 1, (2012): h. 29.
- Evan putra. Sinly “*Alkaloid : Senyawa Terbanyak di Alam*”, *Situs Kimia Indonesia chem.-is-try.org* (2012): h. 1. [http://www.chemistry.org/artikel\\_kimia/biokimia/alkaloid\\_senyawa\\_organik\Terbanyak\\_di\\_alam](http://www.chemistry.org/artikel_kimia/biokimia/alkaloid_senyawa_organik\Terbanyak_di_alam) (Diakses 30 April 2014).
- Hara. Bastian”*Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional oleh Masyarakat Suku Melayu di Kampung Sire Distrik Mare Selatan Kabupaten Maybrat*”, *Skripsi* (Manokwari: Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, 2013)
- Harbone J.B. *Metode Fitokimia*. Bandung: ITB, 1987.

- Irmayanti. "Identifikasi dan Karakterisasi Senyawa Bioaktif Antikanker dari Ekstrak N-Heksan Kulit Batang Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)". Skripsi (2014): h. 38-41.
- Istiqomah, "Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi dan Sokletasi terhadap Kadar Piperin Buah Cabe Jawa (*Piperis retrofracti fructus*), Skripsi. Jakarta: Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2013.h. 11-14.
- Laboratorium Kimia Organik. *Penuntun Praktikum Kimia Organik*. Bandung: ITB, 2010.
- Lenny, Sovia. "Senyawa Terpenoida dan Steroida". *Kaya Ilmiah*, (2006).
- Maslebu, Giner, Dkk. "Kombinasi Teknik Kromatografi Kolom Gravitasi - Spektrometer Sederhana sebagai Permodelan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)". *Jurnal Sains dan Pendidikan Sains* 7, (2012): h. 89.
- Muaja D. Arter Harry S. J. Koleangandan Max R. J. Runtuwene," Uji Toksisitas dengan Metode BSLT dan Analisis Kandungan Fitokimia Ekstrak Daun Soyogik (*Saurauia bracteosa* DC) dengan Metode Soxhletasi." *Jurnal MIPA Unsrat Online* 2(2) 115-118". (2013).
- Musyarrifah, "Identifikasi Metabolit Sekunder Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat (*Persea americana* Mill.) dan Uji Toksisitas Terhadap Larva Udang (*Artemia salina* Leach)" Skripsi, Jurusan Kimia, UIN Alauddin Makassar (2013)
- Nugroho, Agung Endro dan Gemini Alam. "Review Tanaman Obat Legundi (*Vitex trifolia* L.)".
- Nuraini. "Identifikasi dan Karakterisasi Senyawa Bioaktif Antikanker dari Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)". (2014).
- Nuri, *et al.*, "Aktivitas Antimalaria Ekstrak Metanol dan Fraksi Kloroform Buah Duranta Repens L. Pada Mencit yang Diinfeksi *Plasmodium berghei*" *Jurnal Sains* 8, no.1 (2009).
- Nursiyah. "Studi Deskriptif Tanaman Obat Tradisional yang Digunakan Orang tua untuk Kesehatan Anak Usia Dini di Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo". (2003): h. 6.
- Retno, Novie Utami, "Uji Sensitivitas Kertas Saring untuk Identifikasi Pewarna Rhodamin B pada Makanan Jajanan," *UJHP*, vol.3 no.2 (Maret 2013), h. 2. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph> (Diakses 30 April 2015).
- Septyaningsih, Dyah. "Isolasi dan Identifikasi Komponen Utama Ekstrak Biji Buah Merah (*Pandanus conoideus* Lamk.)." (2010): h. 11.

- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keseharian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti. Asri “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Waru Landak (*Hibiscus Mutabilis* L.) Terhadap *Staphylococcus Aureus* dan *Escherichia Coli* Serta *Brine Shrimp Lethality Test*” *Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta (2009).
- Sudibyo, Retno Sumarnimingsih. “Metabolit Sekunder: manfaat dan Perkembangannya dalam Dunia Farmasi”, UGM (2002): h.5.
- Steenis. Van *Flora*, ter. MoesoSoerjowinoto, *Flora untuk Sekolah di Indonesia* (Jakarta, PT. PradnyaParamita, 2006),
- Swantara, I M. Dira dan Yenni Ciawi. “Identifikasi Senyawa Antibakteri pada Daun Kecapi”. *Jurnal Kimia* 3, No. 2 (2009): h. 62.
- Ulina, Eva. “Ekstrak Buah Laban (*Vitex pubescens*) Sebagai Penghambat Pertumbuhan *Salmonella thypi* dan *Staphylococcus aureus*”. *Jurnal Protobiont* 3, No. 3 (2014): h. 40.
- Yazid.Eztien.*Kimia Fisika untuk Paramedis*.h. 194.
- Zenta, Firdaus. *Laporan Hisbah Penulisan Buku Ajar Teknik dalam Laboratorium Kimia Organik*. Makassar: Unhas, 2011.

**Lampiran 1. Skema/Bagan Penelitian Isolasi dan Identifikasi Senyawa Bioaktif Antibakteri dari Ekstral N-Heksan Daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)**



## LAMPIRAN II DOKUMENTASI PENELITIAN



### 1. PREPARASI SAMPEL

Pohon sampel daun Kayu Bitti

(*Vitex cofassus*)



Pengambilan sampel daun Kayu Bitti

(*Vitex cofassus*)



Proses pengeingan sampel tanpa



Sampel ditimbang sebanyak 1000 gram terkena sinar matahari langsung.



**2. EKSTRAKSI**

Proses maserasi dengan pelarut n-heksan

Hasil maserasi (Maserat)

Selama 1x24 jam (3 kali)



Ekstrak kental

**3. FRAKSINASI**



Silika


Ekstrak

Hasil impek silika  
dan ekstrak



Kromatografi kolom cair vakum

Hasil Fraksi KKCV



Fraksi Gabungan

Fraksi A  
(1-3)

Fraksi B  
(4-6)

Fraksi C  
(7)

Fraksi D  
(8)


Fraksi E  
(9-12)

Fraksi F  
(13-17)




Kristal

#### 4. UJI SPEKTROFOTOMETER INFRA RED (IR)




M A K A S A R Spektrofotometer FTIR


### 5. UJI ANTIBAKTERI



Hasil uji Antibakteri



Ekstrak dengan bakteri *Staphylococcus aureus*



Ekstrak dengan bakteri *Escherichia coli*




Ekstrak dengan bakteri *Staphylococcus aureus*



Ekstrak dengan bakteri *Escherichia coli*



*Escherichia coli*



Kristal dengan bakteri *Staphylococcus aureus*



Kristal dengan bakteri *Escherichia coli*



Kristal dengan bakteri *Staphylococcus aureus*



Kristal dengan bakteri *Escherichia coli*

## LAMPIRAN TABEL

### 1. Tabel Uji Fitokimia N-Heksan Daun Kayu Bitti

No	Jenis Pereaksi	Hasil	Keterangan
1	Mayer	Endapan Kuning	+ Alkaloid
2	Dragendorf	Endapan coklat	+ Alkaloid
3	Wagner	Endapan coklat	+ Alkaloid
4	Lieberman buchard	Endapan hijau	+Steroid
5	NaOH 10%	Endapan hijau	-Flavanoid
6	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Endapan hijau tua	-Flavanoid
7	FeCl <sub>3</sub>	Endapan coklat	-Flavanoid

### 2. Tabel Pengamatan Fraksinasi

Fraksi	Eluen	Karakteristik fraksi
1	n-heksan 100%	Larutan hijau
2	n-heksan 100%	Larutan hijau
3	n-heksan: etil asetat (9,5: 0,5)	Larutan coklat
4	n-heksan: etil asetat (9,5: 0,5)	Larutan coklat kekuningan
5	n-heksan: etil asetat (9:1)	Larutan kuning muda
6	n-heksan: etil asetat (9:1)	Larutan kuning muda
7	n-heksan: etil asetat (8:2)	Larutan kuning kehijauan
8	n-heksan: etil asetat (8:2)	Larutan hijau
9	n-heksan: etil asetat (8:2)	Larutan hijau pekat

10	n-heksan: etil asetat (7:3)	Larutan hijau pekat
11	n-heksan: etil asetat (6:4)	Larutan hijau kekuningan
12	n-heksan: etil asetat (5:5)	Larutan hijau kekuningan
13	n-heksan: etil asetat (4:6)	Larutan hijau kekuningan
14	n-heksan: etil asetat (3:7)	Larutan hijau kekuningan
15	n-heksan: etil asetat (2:8)	Larutan kuning
16	n-heksan: etil asetat (1:9)	Larutan hijau muda
17	100% Etil asetat	Larutan hijau muda

### 3. Tabel Serapan Spektroskopi IR Ekstrak N-Heksan

No	Daerah serapan ( $\text{cm}^{-1}$ )	Gugus Fungsi
1	3446,89 – 3130,47	N - H
2	2918,3 – 2848,86	C -H
3	2337,72 – 2019,47	C= C
4	1467,83	CH <sub>2</sub>
5	1377,17	CH <sub>3</sub>


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

#### 4. Tabel Antibakteri Ekstrak N-Heksan Daun Kayu Bitti


No	Sampel	Konsentrasi	Zona Hambat	Zona Hambat <i>Staphylococcus aureus</i>	Zona Hambat <i>E. Coli</i>
1.	Ekstrak	100%	Negatif	(-)	(-)
		50%	Negatif		
		20%	Negatif		
		Kontrol (+)	Positif		
		Kontrol (-)	Negatif		
2.	Kristal	100%	Negatif	(-)	(-)
		50%	Negatif		
		20%	Negatif		
		Control (+)	Positif		
		Control (-)	Negatif		

**LAMPIRAN III****1. Hasil KLT Ekstrak Daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*)**

Hasil KLT ekstrak daun Kayu Bitti (*Vitex cofassus*) dari (9:1), (8:2), (7:3), (6:4) dan (5:5)

**2. Hasil KLT Kromatografi kolom cair vakum (KKCV)**

KLT Hasil dari 17 fraksi



KLT Hasil Fraksi Gabungan dari KKCVC

### 3. Kromatografi Hasil KLT satu noda Kristal



Hasil KLT Satu Noda Kristal

### 4. Kromatografi Uji Sistem Tiga Eluen



Hasil KLT uji sistem Tiga Eluen Kloroform: n-heksan (8:2), eluen n-heksan: metanol (9:1) dan etil asetat: Kloroform (4:6)

## RIWAYAT HIDUP



Nama: NurulAzisyah

TTL : Ujung Pandang, 14 Agustus 1993

NIM : 60500111052

Alamat :BTN. Nusa Indah Blok D22/16

Email : [nurulazisyah@rocketmail.com](mailto:nurulazisyah@rocketmail.com)

Penulis mengenal pendidikan formal pertama pada tahun 2000 di SD INPRES Bonto-Bontoa, yang merupakan tempat penulis dibesarkan. Dan kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di sekolah tersebut di tahun 2006 penulis melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SMPN 2 Sungguminasa. 3 (tiga) tahun kemudian menyelesaikan SMP tepatnya pada tahun 2009. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni Sekolah Menengah Atas MA. Sultan Hasanuddin 3 (tiga) tahun pula penulis menyelesaikan pendidikan di MA.Sultan Hasanuddin di tahun 2011. Dalam penimbaan ilmu di tiga tahun terakhir sebelum masuk ke perguruan tinggi, penulis banyak mendapat pengalaman atau pelajaran hidup. Di tahun yang sama penulis mendaftar di satu perguruan tinggi UINAlauddin Makassar dan lulus di perguruan tinggi tepatnya jurusan Sains Kimia. Rasa syukur tak henti penulis ucapkan karena diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi di UIN Alauddin Makassar dan berharap dikemudian hari ilmu yang diberikan oleh dosen, maupun teman seperjuangan Jurusan Sains Kimia dapat menjadi bekal dunia dan akhirat.