

**Pengaruh Meditasi Dzikir terhadap Perubahan Tekanan Darah
Pada Lansia dengan Hipertensi Di Kelurahan
Romang Polong Kabupaten Gowa**



Skripsi
**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

OLEH:

ISLAMIYAH

70300110050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R**

**JURUSAN KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Islamiyah
NIM : 70300110050
Tempat/Tgl. Lahir : Romang Polong, 21 Juni 1992
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Mustafa Dg Bunga, Romang Polong
Judul : Pengaruh Meditasi Dzikir terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Desember 2014

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Islamiyah
NIM : 70300110050

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Meditasi Dzikir terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa”, yang disusun oleh Islamiyah, NIM : 70300110050, Mahasiswa Jurusan Keperawatan, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M, bertepatan dengan 23 Safar 1436 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan.

Makassar, 16 Desember 2014 M

23 Safar 1436 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	()
Sekretaris	: Drs. Wahyuddin G, M.Ag	()
Munaqisy I	: Risnah, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes	()
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	()
Pembimbing I	: Nuurhidayat Djafar, S.Kep.,Ns.,M.Kep	()
Pembimbing II	: Musdalifah, S.Kep.,Ns.,M.Kes	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc

NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dan terima kasih kehadiran Allah SWT, karena dengan segala rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Meditasi Dzikir terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa”**, dan proses penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. DR. H. A. Qadir Gassing, HT, MS selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Fatmawati Mallapiang, SKM.,M.Kes selaku Wakil Dekan 1, Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt selaku Wakil Dekan 2 dan Drs. Wahyuddin G, M.Ag selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Kesehatan yang memberi izin penelitian dan dedikasinya sebagai pemimpin.
4. Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

5. Nuurhidayat Jafar, S.Kep.,Ns.,M.Kep dan Musdalifah, S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai pembimbing 1 dan 2 yang telah memberikan waktu, arahan, pengetahuan dan bimbingannya selama penyusunan karya ilmiah ini.
6. Ibu Risnah, SKM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku penguji 1 dan Bapak Dr. H. Muh Saleh Ridwan M.Ag selaku penguji 2 yang memberikan banyak masukan pada penulisan karya ilmiah ini.
7. Arbiansih, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Keperawatan dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar, atas bantuan dan dedikasinya.
9. Lurah Kelurahan Romang Polong beserta staf Kelurahan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di wilayahnya.
10. Seluruh anggota keluarga yang penulis sayangi. Khusus kepada orangtua Penulis, Ayahanda H. Ambo Dg Siala dan Ibunda Salmah serta kedua adik penulis Iqbal dan Zaenalyang selalu memberikan semangat, dukungan, dan juga doa-doanya.
11. Seluruh sahabat : Haerul Wahyudi S.Pd., M.Pd. Randy Alam, S.Kep. Nurhidayat, S.Kep. Nurcahyani, S.Kep. Kurniati Sukri, S.Kep. Sulkifli Syam S. Meri Handriati, S.E. Dan Yuliana Hasan, Amd.Kep. KKN Desa Pattalassang Bantaeng serta seluruh teman-teman angkatan 2010 di

Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah membantu dan memberikan dukungan moril dalam pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Semoga semua karya kita bernilai ibadah disisi-Nya. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.



Makassar, Desember 2014

Penyusun

Islamiyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRISI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	6
C. Hipotesis	6
D. DefenisiOperasional	7
E. TujuanPenelitian	9
1. TujuanUmum.....	9
2. TujuanKhusus.....	10
F. ManfaatPenelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. TinjauanUmumTentangTekananDarah	12
1. PengertianTekananDarah.....	12
2. Mekanisme Pemeliharaan Tekanan Darah	14
3. PengukuranTekananDarah.....	16
4. PengertianHipertensi.....	18
5. KlasifikasidanPengebabHipertensi	19
6. PatofisiologiHipertensi	24

7. Manifestasi Klinik Hipertensi	27
8. Penatalaksanaan Hipertensi	28
B. Tinjauan Umum Tentang Meditasi Dzikir	38
1. Pengertian Meditasi	38
2. Klasifikasi Meditasi	38
3. Manfaat Meditasi	39
4. Meditasi Dzikir	41
C. Pengaruh Meditasi Dzikir Terhadap Penurunan Tekanan Darah	49
D. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi Pada Lansia	51
1. Pengertian Hipertensi Pada Lansia	51
2. Patofisiologi Hipertensi Pada Lansia	52
3. Komplikasi Hipertensi	52
4. Penatalaksanaan Hipertensi Pada Lansia	54
E. Tinjauan Umum Tentang Lansia	55
1. Pengertian Lansia	55
2. Proses Penuaan	55
3. Teori Proses Penuaan	56
4. Tipe Kepribadian Lansia	58
5. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada lanjut Usia	60
F. Kerangka Konseptual	64
G. Kerangka Kerja	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	66
1. Jenis Penelitian	66
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	66
B. Populasi dan Sampel	66
1. Populasi	67
2. Sampel	67
C. Teknik Pengambilan Sampel	67
D. Metode Pengumpulan Data	68
E. Pengelolaan dan Analisa Data	69

F. Etika Penelitian.....	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
B. Hasil Penelitian.....	72
1. Analisa Univariat.....	72
2. Analisa Bivariat.....	76
C. Pembahasan.....	78
D. Keterbatasan Peneliti.....	83
E. Rekomendasi.....	83
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Pola Makan dan Aktifitas Fisik.....	74
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Tekanan Darah Pre Meditasi Dzikir	75
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Tekanan Darah post Meditasi	75
Tabel 4.4	Distribusi Pengaruh Pemberian Meditasi Dzikir Terhadap Perubahan Tekanan Darah	76

DAFTAR GRAFIK

Grafik

Grafik 4.1 Perubahan Tekanan Darah Sistol Pre-Post Meditasi Dzikir	77
Grafik 4.2 Perubahan Tekanan Darah Diastol Pre-Post Meditasi Dzikir ..	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Pernyataan Persetujuan Responden

Lampiran 2 : Informed Consent

Lampiran 3 : Kuesioner

Lampiran 4 : Lembar Observasi

Lampiran 5 : Standar Operasional Prosedur (SOP)

Lampiran 6 : Master Tabel

Lampiran 7 : Tabel Perubahan Tekanan Darah

Lampiran 8 : Hasil Data SPSS Penelitian

Lampiran 9 : Surat Izin Meneliti

Lampiran 10 : Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Islamiyah

NIM :70300110050

Judul Skripsi: Pengaruh Meditasi Dzikir Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa.

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang di bawah oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa pada tanggal 03 Desember sampai 07 Desember 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *pre eksperiment design* dengan rancangan "*pretest-posttest one group design*". Jumlah sampel adalah 15 orang menggunakan teknik *purposive sampling*. Datayang dikumpulkan menggunakan kuesioner dan lembar observasi dianalisis dengan uji *Paired t-test*.

Hasil penelitian didapatkan *value* = 0,008 sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya ada pengaruh meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Kesimpulan pada penelitian didapatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara meditasi dzikir dengan perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa.

Saran penelitian ini diperuntukkan bagi berbagai pihak terutama instansi pendidikan demi meningkatkan keilmuan dan pendidikan keperawatan, diharapkan perlu diperhatikan pengembangan informasi dan keterampilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 H Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Pembangunan kesehatan haruslah dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain suatu komponen utama untuk pendidikan dan ekonomi serta kesehatan yang juga memiliki peran dalam penanggulangan kemiskinan (Santoso, 2011).

Transisi epidemiologi yang parallel dengan transisi demografi dan transisi teknologi di Indonesia dewasa ini telah mengakibatkan perubahan pola penyakit dari penyakit infeksi kepenyakit tidak menular (PTM) meliputi penyakit degeneratif yang merupakan faktor utama masalah morbiditas dan mortalitas (Ekawati, 2009).

Transisi epidemiologi ini disebabkan terjadinya perubahan sosial ekonomi, lingkungan dan perubahan struktur penduduk, saat masyarakat telah mengadopsi gaya hidup tidak sehat, misalnya merokok, kurang aktivitas fisik, makanan tinggi lemak dan kalori, serta konsumsi alkohol yang diduga merupakan faktor risiko PTM. Pada abad ke-21 ini diperkirakan terjadi peningkatan insidens dan prevalensi PTM secara cepat, yang merupakan tantangan utama masalah kesehatan dimasa yang akan datang. WHO memperkirakan, pada tahun 2020

PTM akan menyebabkan 73% kematian dan 60% seluruh kesakitan di dunia. Diperkirakan negara yang paling merasakan dampaknya adalah Negara berkembang termasuk Indonesia (Ekawati, 2009).

Penyakit hipertensi tahun demi tahun terus mengalami peningkatan. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Sebanyak 1 milyar orang di dunia atau 1 dari 4 orang dewasa menderita penyakit ini. Diperkirakan jumlah penderita hipertensi di seluruh dunia sekitar 982 juta orang atau 26,4% penghuni bumi mengidap hipertensi dengan perbandingan 26,6% pria dan 26,1% wanita (WHO, 2012). Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 29,2% atau 1,6 milyar di tahun 2025. Di Amerika hipertensi ditemukan pada satu dari setiap tiga orang. 60% dari penderita serangan jantung, 77% dari penderita stroke, dan 74% dari penderita gagal jantung di Amerika mengidap hipertensi (AHA, 2010).

Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah stroke dan tuberkulosis, dengan PMR (*proportional Mortality Rate*) mencapai 6,70% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Kenaikan prevalensi hipertensi sejalan dengan bertambahnya usia terutama pada usia lanjut. Di Kabupaten Gowa Prevalensi hipertensi di kalangan usia lanjut cukup tinggi sekitar 40 % dengan kematian 50 % diatas umur 60 tahun.

Data dari hasil Survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013) jumlah penderita hipertensi di Indonesia sebesar 1.327.287 atau 26,5% berdasarkan hasil wawancara dan pengukuran langsung pada usia > 18 tahun. Berdasarkan data Bidang Bina P2PL Dinkes Kabupaten Gowa tahun 2012, hipertensi adalah penyebab kedua kematian setelah, asthma yaitu sebanyak 574 orang.

Data Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Kota Makassar sebanyak 65.253 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, jumlah penduduk lansia di Kabupaten Gowa berjumlah 27.856 dari 702.433 penduduk Kabupaten Gowa.

Pada prinsipnya ada tiga macam terapi yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit hipertensi, yaitu terapi farmakologi merupakan terapi dengan pemberian obat antihipertensi, terapi nonfarmakologi merupakan terapi alternatif tanpa menggunakan obat antihipertensi dengan memodifikasi pola hidup sehari-hari dan kembali ke produk alami, dan perawatan diri adalah aktivitas individu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tubuh dalam mempertahankan kondisi sehat dari penyakit (Lailatul dkk, 2007).

Terapi farmakologis merupakan terapi pemberian obat anti hipertensi kepada pasien. Pemberian obat anti hipertensi yang biasa dijumpai masyarakat yaitu diuretik, *ACE inhibitor*, *beta blocker*, *angiotensin reseptorbloker*, dan *calcium antagonist*. Terapi farmakologis menggunakan obat-obatan diatas selain membantu menurunkan tekanan darah pada pasien ternyata memiliki efek samping yang bervariasi pada masing-masing jenis obatnya. Efek samping yang tidak sedikit pada pemberian terapi farmakologis membuat pasien hipertensi menggunakan cara selain mengkonsumsi obat. Terapi nonfarmakologis merupakan terapi alternatif yang sering digunakan oleh pasien hipertensi dalam membantu menurunkan tekanan darah dan gejala lainnya (Renatasari, 2009).

Departemen Kesehatan (2006), menyatakan bahwa pengobatan nonfarmakologis yang dapat diberikan pada pasien hipertensi yaitu berupa

pengurangan asupan garam dan penurunan berat badan bagi pasien gemuk dan olahraga. Aktivitas fisik seperti olahraga, senam, aerobik, atau jalan kaki 30 menit/hari dalam beberapa hari/minggu merupakan kebiasaan yang baik dalam mengontrol hipertensi.

Terapi nonfarmakologi lain yang dapat menurunkan tekanan darahnya itu dengan menerapkan terapi komplementer (Hadibrotoet *al*, 2006). Terapi komplementer adalah terapi pelengkap dari terapi konvensional untuk penyembuhan. Beberapa contoh terapi komplementer keperawatan yang dapat diberikan untuk pasien hipertensi yaitu; terapi herbal, musik, yoga, akupresur dan meditasi (Snyder, 2007).

Salah satu terapi komplementer keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi keluhan dan menurunkan tekanan darah pasien hipertensi adalah melalui meditasi (Keliat, 2010). Meditasi merupakan suatu teknik untuk mengkonsentrasikan pikiran agar lebih waspada dan bijaksana, serta dapat digunakan untuk mencegah maupun menyembuhkan penyakit (Kushartanti, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Fuad pada tahun (2012), bahwa dengan pemberian meditasi terdapat perubahan yang signifikan terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi (Fuad, 2012). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kusmanto (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian teknik meditasi terhadap penurunan tekanan darah baik tekanan darah sistolik dan diastolic secara signifikan pada lansia (Kusmanto, 2012).

Dzikir merupakan mengingat dan menyebut Allah SWT. Misalnya dengan membaca: tahlil/tauhid, tasbih, istighfar, atau sholawat, dan juga berdoa kepada Allah SWT. Dengan berdoa manusia menyadari bahwa alam semesta dan seluruh isinya ini milik Allah SWT. Oleh karena itu, untuk mewujudkan segala keinginan, dan cita-citanya, manusia butuh pertolongan-Nya (Abatasa, 2010).

Dzikir merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab ayat 41-42 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan menyebut (nama-Nya) sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang"(Q.S Al-Ahzab ayat 41-42).

Menurut tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dzikir secara harfiah berarti "mengingat". Kegiatan "mengingat" memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Ketika ingat sesuatu, maka ia akan mengingat pula pada rangkaian-rangkaian yang terkait dengannya. Ingatan bisa muncul karena kita punya keinginan, kepentingan, harapan, dan kerinduan terhadap apa yang kita ingat. Kegiatan "mengingat" juga bisa memicu lahirnya ide-ide dan kreativitas baru.

Kalau hanya dengan mengingat sesuatu yang ada di alam ini bisa memicu munculnya bentuk kreativitas, bagaimana dengan mengingat Allah yang Maha kreatif dan kekuasaan-Nya tak terbatas. Secara logika tentu akan memberikan dampak positif luar biasa bagi kehidupan. Kita sebagai seorang perawat dapat mengingatkan pada klien agar terus berdzikir dan selalu mengingat Allah karena sesungguhnya tiada penyakit yang diturunkan selain ada obatnya.

Meditasi dengan dzikir merupakan pemusatan pikiran kepada Allah agar dapat lebih dekat dengan sang pencipta dan menyadari bahwa segala penyakit datangnya dari Allah dan obatnya pun dari Allah (Budi priyato, 2011).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Samata, jumlah lansia adalah 110 orang dan yang menderita hipertensi di Kelurahan Romang Polong adalah 40%. Data puskesmas menunjukkan bahwa selama tahun 2014 sudah ada 1,4% kasus kematian akibat hipertensi pada lansia.

Berdasarkan uraian di atas bahwa meditasi dzikir merupakan terapi nonfarmakologi yang dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan darah, maka peneliti tertarik untuk membuktikan secara langsung, "apakah ada pengaruh meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa?".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Apakah ada pengaruh meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa”?

C. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi

Ho : Tidak ada pengaruh meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi.

D. Definisi Operasional

1. Tekanan Darah

Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh darah terhadap pembuluh darah.

Definisi Operasional:

Hipertensi Ringan : 140/90 – 159/99

Hipertensi Sedang : 160/100 – 179/109

2. Perubahan Tekanan Darah

Definisi Operasional :

Perubahan tekanan darah adalah terjadinya perbedaan tekanan darah pada saat sebelum dan setelah dilakukan perlakuan pada lansia (Tekanan Darah Normal: 130/85 mmHg).

kriteria Objektif:

Menurun : Jika tekanan darah pre lebih besar dari tekanan darah post setelah diberikan meditasi dzikir.

Tetap : jika tekanan darah pre sama dengan tekanan darah post setelah diberikan meditasi dzikir.

Meningkat : Jika tekanan darah pre lebih kecil dari tekanan darah post setelah diberikan meditasi dzikir.

3. Pemberian Meditasi Dzikir

Definisi Operasional :

Tehnik olah nafas dan pemusatan fikiran dengan dzikir terdiri dari 2 fase yaitu: fase pembinaan dan fase pendinginan. Durasi 10-30 menit, frekuensi dilakukan selama 5 hari pada jam 08:00 pagi.

- a. Fase pembinaan seseorang akan melakukan dzikir dengan membaca doa dzikir yaitu:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ (3X)

Astaghfirullaah Al'Adziim (3X)

سُبْحَانَ اللَّهِ (33X)

Subhanallah (33x)

الْحَمْدُ لِلَّهِ (33X)

Alhamdulillah (33x)

اللَّهُ أَكْبَرُ (33X)

Allahu Akbar (33x)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1X)

La ilaaha illallaahu wahdaahu laasyariikalalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kullisyain qadiir (1x)

- b. Fase pendinginan seseorang akan dianjurkan bernafas melalui hidung dan menghitung dalam hati sampai 5 dan anjurkan kembali

klien untuk menghembuskan nafas melalui mulut. Fase ini dilakukan selama 10-15 menit.

4. Pola Makan

Pola Makan adalah frekuensi makan lansia dalam sehari/24 jam

Definisi Operasional:

- a. < 3 kali sehari
- b. 3 kali sehari
- c. > 3 kali sehari

5. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh lansia sehari-hari.

Definisi Operasional:

Aktivitas Ringan : Menyapu & memasak

Aktivitas Sedang : Menyetrika, kerja kantor + aktivitas ringan

Aktivitas Berat : Mencuci, berdagang, menyangkul, berkebun +
aktivitas ringan dan aktivitas sedang

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh dari meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa.

2. Tujuan khusus

- a. Diketahui perbedaan antara tekanan darah sebelum dan setelah meditasi dzikir pada penderita hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa.
- b. Diketahui pengaruh meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai manfaat dari meditasi dzikir yang dapat berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah.

2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai sumbangsi peneliti untuk institusi pendidikan sekolah menengah atas, departemen kesehatan, sekolah tinggi ilmu kesehatan dan institut lainnya bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk kegiatan penelitian sejenis di kemudian hari.

3. Manfaat Bagi Profesi Keperawatan

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan keperawatan di masa mendatang, serta memberikan masukan khususnya bagi ilmu keperawatan medikal bedah tentang pengobatan nonfarmakologis bagi penderita hipertensi.

4. Manfaat Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi masyarakat Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa, khususnya petugas pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk menjadi masukan pengobatan nonfarmakologi bagi penderita hipertensi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tekanan Darah (Hipertensi)

1. Pengertian Tekanan Darah

Tekanan darah berarti daya yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding pembuluh. Bila seseorang mengatakan bahwa tekanan dalam pembuluh adalah 50 mmHg, hal itu berarti bahwa daya yang dihasilkan cukup untuk mendorong kolom air raksa melawan gravitasi sampai setinggi 50 mm. Bila tekanan darah 100 mmHg, kolom air raksa akan didorong setinggi 100 milimeter (Guyton & Hill, 2007).

Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Tekanan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah jantung, ketegangan arteri, volume, laju serta kekentalan (viskositas) darah. Tekanan sistolik adalah tekanan yang terjadi saat ventrikel berkontraksi, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan terendah yang terjadi saat jantung relaksasi. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik, dengan nilai dewasa normalnya berkisar 100/60 sampai 140/90. Rata-rata tekanan darah normal biasanya 120/80 mmHg (Santoso, 2011).

Tekanan darah yang paling rendah terjadi saat tubuh dalam keadaan istirahat atau tidur dan akan naik sewaktu latihan atau berolahraga. Hal ini disebabkan dalam latihan dan olahraga diperlukan aliran darah dan oksigen yang lebih banyak untuk otot-otot. Jika terdapat hambatan misalnya karena

penyempitan pembuluh arteri, tekanan darah akan meningkat. Meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara :

- a. Jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya.
- b. Arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit dan menyebabkan naiknya tekanan. Inilah yang terjadi pada usia lanjut, dimana dinding arterinya telah menebal dan kaku.
- c. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini terjadi jika terjadi kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh (Roadhah, 2012).

Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah dari pada dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, dimana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Adapun klasifikasi tekanan darah adalah sebagai berikut (Smeltzer, Suzanne C, 2002):

Klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa berusia diatas 18 tahun keatas		
Kategori	Tekanan Darah Sistolik	Tekanan Darah Diastolik
Normal	< 130 mmHg	< 85 mmHg
Normal Tinggi	130-139 mmHg	85-89 mmHg
Hipertensi Stadium 1	140-159 mmHg	90-99 mmHg
Hipertensi Stadium 2	160-179 mmHg	100-109 mmHg
Hipertensi Stadium 3	180-209 mmHg	110 -119 mmHg
Hipertensi Stadium 4	\geq 210 mmHg	\geq 120 mmHg

Klasifikasi tekanan darah menurut WHO

Kategori	Sistol (mmHg)	Diastol (mmHg)
Optimal	< 120	< 80
Normal	< 130	< 85
Tingkat 1 (hipertensi ringan)	140-159	90-99
Sub grup : perbatasan	140-149	90-94
Tingkat 2 (hipertensi sedang)	160-179	100-109
Tingkat 3 (hipertensi berat)	\geq 180	\geq 110
Hipertensi sistol terisolasi	\geq 140	< 90
Sub grup : perbatasan	140-149	< 90

2. Mekanisme Pemeliharaan Tekanan Darah

Menurut Wajan Juni Udijati (2010) terdapat empat sistem kontrol yang berperan dalam mempertahankan tekanan darah antara lain sistem baroreseptor areteri, pengaturan volume cairan tubuh, sistem renin-angiotensin dan autoregulasi vaskuler.

a. Baroreseptor Arteri

Baroreseptor arteri banyak ditemukan disinus carotid, tapi juga terdapat dalam aorta dan dinding ventrikel kiri. Baroreseptor ini memonitor derajat tekanan arteri. Sistem baroreseptor meniadakan peningkatan tekanan arteri melalui mekanisme perlambatan jantung oleh respons vegal (stimulasi parasimpatis) dan vasodilatasi dengan penurunan tonus simpatis. Oleh karena itu, refleks kontrol sirkulasi meningkatkan tekanan arteri sistemik bila tekanan baroreseptor meningkat.

b. Pengaturan volume cairan tubuh

Perubahan volume cairan mempengaruhi tekanan arteri sistemik. Bila tubuh mengalami kelebihan garam dan air, tekanan darah meningkat melalui mekanisme fisiologi kompleks yang mengubah aliran balik vena ke jantung dan mengakibatkan peningkatan curah jantung (CO). Bila ginjal bekerja secara adekuat, peningkatan tekanan arteri mengakibatkan diuresis dan penurunan tekanan darah. Kondisi patologis yang mengubah ambang tekanan pada ginjal dalam mengekskresikan garam dan air akan meningkatkan tekanan arteri sistemik.

c. Autoregulasi Vaskuler

Autoregulasi vaskuler merupakan mekanisme lain yang terlibat dalam hipertensi. Autoregulasi vaskuler adalah suatu proses yang mempertahankan perfusi jaringan dalam tubuh relatif konstan. Jika aliran berubah, proses autoregulasi akan menurunkan tahanan vaskuler sebagai akibat dari peningkatan aliran. Autoregulasi vaskuler nampak mekanisme penting dalam menimbulkan hipertensi berkaitan dengan overload garam dan air.

d. Sistem Renin-Angiotensin

Renin dan angiotensin memegang peranan dalam pengaturan tekanan darah. Ginjal memproduksi renin yaitu suatu enzim yang bertindak pada substrat protein plasma untuk memisahkan angiotensin I, yang kemudian diubah oleh *converting enzim* dalam paru menjadi angiotensin II. Angiotensin II mempunyai aksi vasokonstriksi yang kuat pada pembuluh darah dan merupakan mekanisme kontrol terhadap pelepasan aldosteron. Melalui peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, angiotensin II juga mempunyai efek inhibiting atau pengahambatan pada sekresi natrium dengan akibat peningkatan tekanan darah (Nurwahyuni, 2011)

3. Pengukuran Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan menggunakan sfigmomanometer dan stetoskop. Sfigmomanometer tersusun atas manset yang dapat dikembangkan dan alat pengukur tekanan yang berhubungan dengan rongga dalam manset. Manset dibalutkan dengan kencang dan lembut pada lengan atas dan dikembangkan dengan pompa. Tekanan dalam manset dinaikan sampai denyut radial atau brakial menghilang. Hilangnya denyutan menunjukkan bahwa tekanan sistolik darah telah dilampaui dan arteri brakhialis telah tertutup. Manset di kembangkan lagi sebesar 20-30 mmHg diatas titik hilangnya denyutan radial. Manset kemudian dikempiskan perlahan dan dilakukan pembacaan secara auskultasi maupun palpasi (Brunner & Suddart, 2002)

a. Secara Auskultasi

- 1) Pastikan responden duduk atau berbaring dengan nyaman.

- 2) Pasang manset di lengan atas kanan, sekitar 3 cm di atas fossa cubiti (jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar).
- 3) Menentukan *arteri brachialis dextra* secara palpasi pada *fossa cubiti* dan meletakkan stetoschope di atas *arteri brachialis dextra* tersebut.
- 4) Memompakan udara kedalam manset, maka akan terdengar suara bising *arteri brachialis dextra* melalui *stetoschope* sampai suara bising tersebut akan menghilang.
- 5) Memompakan terus udara kedalam manset sampai tinggi Hg pada manometer sekitar 20 mmHg lebih tinggi dari titik dimana suara bising *arteri brachialis dextra* tadi menghilang.
- 6) Mengeluarkan udara dalam manset secara pelan dan berkesinambungan, maka akan terdengar lagi suara bising tersebut. Kemudian melihat tinggi Hg pada manometer, didapatkan tekanan darah sistolik. Dan setelah diturunkan lagi suara bising tersebut kembali lagi menghilang, itulah tekanan darah diastolik.

b. Secara Palpasi

- 1) Pastikan responden duduk atau berbaring dengan nyaman.
- 2) Pasang manset di lengan atas kanan, sekitar 3 cm di atas fossa cubiti (jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar).
- 3) Meraba serta merasakan denyut *arteri radialis dextra*.
- 4) Memompakan udara kedalam manset sampai tinggi Hg pada manometer 20 mmHg lebih tinggi dari titik dimana denyut *arteri radialis dextra* tidak teraba.

- 5) Mengeluarkan udara dalam manset secara pelan dan berkesinambungan. Mencatat tinggi Hg pada manometer dimana arteri radialis pertama kali teraba kembali. Nilai ini menunjukkan besarnya tekanan sistolik secara palpasi.

4. Pengertian Hipertensi

Hipertensi adalah gejala peningkatan tekanan darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang di bawah oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Dikatakan tekanan darah tinggi jika tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, atau tekanan diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih atau keduanya (Khasanah, 2012).

Hipertensi merupakan penyakit degenerative yang banyak diderita bukan hanya oleh usia lanjut saja, bahkan saat ini sudah menyerang orang dewasa muda. Bahkan diketahui bahwa 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab kematiannya. Itulah sebabnya hipertensi di juluki sebagai “Pembunuh Diam-Diam” (*Silent Killer*) (Zauhani, Zainal 2012). Penyakit ini dikenal juga sebagai *heterogeneous group of disease* karena dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok umur dan kelompok sosial ekonomi (Lailatul dkk, 2007).

Menurut *World Health Organization* (batasan tekanan darah masih dianggap normal adalah kurang dari 130/85 mmHg, bila tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg dinyatakan hipertensi (batasan tersebut untuk orang dewasa diatas 18 tahun) (Lailatul dkk, 2007).

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh (Sustrani 2006). Sedangkan menurut Smeltzer dan bare (2002) hipertensi adalah tekanan darah dalam batas tidak normal dimana tekanan sistolik diatas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg.

Hipertensi adalah salah satu faktor resiko terpenting pada penyakit jantung koroner dan *Cerebrovascular Accidents*, selain itu hipertensi juga dapat menyebabkan hipetrofi jantung dan gagal jantung (penyakit jantung hipertensif), diseksi aorta dan gagal ginjal.

5. Klasifikasi dan Penyebab Hipertensi

Hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hipertensi Primer (Esensial) atau idiopatik

Hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya (terdapat pada kurang lebih 90 % dari seluruh hipertensi) (Roadhah, 2012). Hipertensi esensial biasanya dimulai sebagai proses labil (intermiten) pada individu pada akhir 30-an dan awal 50-an dan secara bertahap “menetap”. Pada suatu saat juga dapat terjadi mendadak dan berat, perjalanannya dipercepat (maligna) yang menyebabkan kondisi pasien memburuk dengan cepat (Brunner & Suddarth, 2002).

Beberapa faktor yang pernah dikemukakan relevan terhadap mekanisme penyebab hipertensi adalah sebagai berikut:

1) Genetik

Peran faktor genetik terhadap timbulnya hipertensi terbukti dengan ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar monozigot (satu sel telur) daripada heterozigot (berbeda sel telur). Seorang penderita yang mempunyai sifat genetik hipertensi primer (esensial) apabila dibiarkan secara alamiah tanpa intervensi terapi, bersama lingkungannya akan menyebabkan hipertensinya berkembang dan dalam waktu sekitar 30-50 tahun akan timbul tanda dan gejala.

2) Geografi dan lingkungan

Terdapat perbedaan tekanan darah yang nyata antara populasi kelompok daerah kurang makmur dengan daerah maju, seperti bangsa indian amerika selatan yang tekanan darahnya rendah dan tidak banyak meningkat sesuai *dengan penambahan usia dibandingkan dengan masyarakat barat.*

3) Jenis Kelamin

Jenis kelamin mempunyai pengaruh penting dalam regulasi tekanan darah. Sejumlah fakta menyatakan hormon sex mempengaruhi sistem retina angiotensin. Secara umum tekanan darah pada laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Pada perempuan risiko hipertensi akan meningkat setelah masa menopause yang menunjukkan adanya pengaruh hormon. Menurut Arif Mansjoer, dkk, pria dan wanita menopause mempunyai pengaruh yang sama untuk terjadinya hipertensi (Mansjoer, Arif, 2008).

4) *Umur*

Beberapa penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa semakin tua usia seseorang maka semakin tinggi tekanan darahnya. Hal ini disebabkan elastisitas dinding pembuluh darah semakin menurun dengan bertambahnya usia.

Dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi di kalangan usia lanjut cukup tinggi yaitu sekitar 40% (Santoso, 2011)

5) *Stress dan pola hidup yang tidak seimbangan*

Sikap yang dapat menyebabkan hipertensi seperti konsumsi tinggi lemak, garam, aktifitas yang rendah, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dan kafein. Namun sebagian besar juga disebabkan karena faktor stress.

6) *Makanan*

Seseorang yang mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan garam akan beresiko tinggi menyebabkan hipertensi. Asupan natrium yang terlalu tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan keseimbangan natrium terganggu. Hal ini terjadi jika terjadi kelainan fungsi ginjal, dimana ginjal tidak mampu lagi membuang sejumlah air dan garam dari dalam tubuh. Pada kondisi ini, natrium tidak dapat atau hanya sedikit dikeluarkan, sehingga kadar natrium dalam darah menjadi tinggi. Penurunan pengeluaran natrium akan diikuti dengan penambahan

air. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan volume darah dalam tubuh meningkat, sehingga tekanan darah juga meningkat.

Pola makan penderita hipertensi harus stabil, penderita hipertensi yang tidak menjaga polanya akan berakibat penumpukan lemak pada tubuh sehingga terjadi obesitas. Seseorang yang makan yang ≥ 3 kali sehari beresiko terjadi penumpukan lemak pada tubuhnya sehingga kadar lemak tinggi dalam darah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, sehingga mengganggu suplai oksigen dan zat makanan ke organ tubuh. Jumlah lemak dan kolesterol yang tinggi dalam darah juga akan menempel pada dinding pembuluh darah. Jika kadar lemak dan kolesterol terus menerus tinggi, maka lemak yang menempel dalam dinding pembuluh darah akan semakin banyak dan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Penyempitan dan sumbatan lemak ini kemudian memacu jantung untuk memompa darah lebih kuat lagi agar dapat memasok kebutuhan darah ke jaringan. Akibatnya, tekanan darah pun menjadi meningkat (Santoso, 2011).

b. Hipertensi Sekunder

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan/sebagai akibat dari adanya penyakit lain. Beberapa hal yang menjadi penyebab hipertensi sekunder, yaitu:

1. Penyakit ginjal

Penyakit pada ginjal yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi sekunder seperti: stenosis arteri renalis, pielonefritis, glomerulonefritis,

tumor ginjal, penyakit ginjal polikista (biasanya diturunkan), trauma pada ginjal (luka yang mengenai ginjal), dan terapi penyinaran yang mengenai ginjal.

2. Kelainan Hormonal

Penyakit kelainan hormonal juga dapat mengakibatkan penyakit hipertensi sekunder seperti: hiperaldosteronisme, sindrom chusing dan feokromositoma.

3. Obat-Obatan

Obat-obatan juga dapat berefek samping menimbulkan hipertensi sekunder, obat-obatan yang dapat menimbulkan hipertensi sekunder adalah pil KB, kortikosteroid, siklosporin, eritropoetin, kokain, penyalahgunaan alkohol, dan kayu manis (dalam jumlah sangat besar).

4. Penyebab Lainnya

Penyakit seperti koartasio aorta, preeklamsia pada kehamilan, porfiria intermiten akut, dan keracunan timbal akut.

Adapun klasifikasi hipertensi menurut WHO berdasarkan tekanan diastolik, yaitu:


- a) Hipertensi ringan, yaitu jika tekanan diastoliknya 95-109 mmHg.
- b) Hipertensi sedang, yaitu jika tekanan diastoliknya 110-119 mmHg.
- c) Hipertensi berat, yaitu jika tekanan diastoliknya lebih dari 120 mmHg

6. Patofisiologi Hipertensi

Tugas utama darah adalah mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh, serta membawa sisa-sisa metabolisme tubuh untuk dikeluarkan melalui kulit, paru-paru dan ginjal. Agar jaringan tubuh dapat berfungsi secara normal, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan sistem peredaran darah dalam tubuh.

- a. Sirkulasi darah harus normal sehingga zat-zat gizi dan oksigen dapat diantarkan ke seluruh jaringan tubuh tepat waktu.*
- b. Harus ada keseimbangan cairan dalam pembuluh darah (darah tidak terlalu pekat).*
- c. Adanya kadar normal komponen dalam darah, seperti jumlah sel darah merah, oksigen, zat gizi, dan komponen lainnya. Dengan begitu kebutuhan jaringan tubuh juga akan tercukupi.*

Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi karena adanya gangguan dalam sistem peredaran darah. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan peredaran darah. Atau komponen dalam darah yang tidak normal. Adanya gangguan tersebut mengakibatkan darah tidak dapat disalurkan ke seluruh tubuh dengan lancar. Agar darah tetap sampai ke seluruh tubuh, jantung akan memompa darah lebih keras. Dampaknya, tekanan darah pembuluh darah meningkat dan disebut sebagai tekanan darah tinggi atau hipertensi.



Gambar 2.1 Proses terjadinya hipertensi

(Price & Wilson, 2002 dalam Khasanah Nur, 2012)

Berikut penjabaran dari mekanisme terjadinya hipertensi :

a. Gangguan Keseimbangan Natrium

Natrium adalah salah satu komponen yang ada dalam darah. Kadar natrium dalam darah harus seimbangan, tidak boleh terlalu tinggi atau rendah. Pengaturan keseimbangan natrium dalam darah diatur oleh peran ginjal. Ketika kadar natrium dalam darah terlalu tinggi, ginjal akan mengeluarkannya melalui urin, bersamaan dengan air. Ketika kadar natrium dalam darah rendah, ginjal akan menahan natrium agar tidak keluar melalui urin.

Mekanisme pengaturan keseimbangan natrium sebenarnya bertujuan untuk mengontrol tekanan darah. Ginjal mengendalikan tekanan darah melalui beberapa cara. Jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran natrium dan air, sehingga akan mengakibatkan berkurangnya volume darah dan mengembalikan tekanan darah kembali ke normal. Jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan garam dan air, sehingga volume darah bertambah dan volume darah kembali normal.

Asupan natrium yang terlalu tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan keseimbangan natrium terganggu. Hal ini terjadi jika terjadi kelainan fungsi ginjal, dimana ginjal tidak mampu lagi membuang sejumlah air dan garam dari dalam tubuh. Pada kondisi ini, natrium tidak dapat atau hanya sedikit dikeluarkan, sehingga kadar natrium dalam darah menjadi tinggi. Penurunan pengeluaran natrium akan diikuti dengan penambahan air. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan volume darah dalam tubuh meningkat, sehingga tekanan darah juga meningkat.

b. Kelenturan atau Elastisitas Pembuluh Darah Berkurang (Menjadi Kaku)

Pembuluh darah normalnya bersifat elastis, dimana diameternya bisa menyempit dan mengembang. Elastisitas ini bermanfaat dalam mempermudah proses pendistribusian darah ke seluruh tubuh. Pada usia lanjut, elastisitas pembuluh darah mulai berkurang, pembuluh darah pun kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku. Akibatnya pembuluh darah tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah. Hal ini akan memicu jantung untuk meningkatkan denyutnya agar aliran darah dapat mencapai seluruh bagian tubuh. Darah pada

setiap denyutan jantung seolah dipaksa untuk melalui pembuluh yang lebih sempit. Inilah yang menyebabkan naiknya tekanan darah.

c. Penyempitan Pembuluh Darah

Kadar lemak tinggi dalam darah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, sehingga mengganggu suplai oksigen dan zat makanan ke organ tubuh. Jumlah lemak dan kolesterol yang tinggi dalam darah juga akan menempel pada dinding pembuluh darah. Jika kadar lemak dan kolesterol terus menerus tinggi, maka lemak yang menempel dalam dinding pembuluh darah akan semakin banyak dan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Penyempitan dan sumbatan lemak ini kemudian memacu jantung untuk memompa darah lebih kuat lagi agar dapat memasok kebutuhan darah ke jaringan. Akibatnya, tekanan darah pun menjadi meningkat dan terjadilah hipertensi.

7. Manifestasi Klinik Hipertensi

Penderita tekanan darah kadang merupakan satu-satunya gejala pada hipertensi esensial dan tergantung dari tinggi rendahnya tekanan darah. Gejala yang timbul dapat berbeda-beda. Kadang berjalan tanpa gejala dan baru timbul keluhan setelah menjadi komplikasi yang spesifik pada organ-organ tertentu. (Roadhah, 2012).

Perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan. Penderita hipertensi mungkin tidak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Masa laten ini menyelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerusakan organ yang bermakna. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati maka dapat menimbulkan gejala seperti berikut, sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak

napas, gelisah, pandangan menjadi kabur, mata berkunang-kunang dan telinga berdengung

Terkadang penderita hipertensi berat juga dapat mengalami penurunan kesadaran, bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut *ensefalopati Hipertensif*, yang memerlukan penanganan medis segera (EI Manan M, 2011).

8. Penatalaksanaan Hipertensi

Dalam menghadapi persoalan hidup, kita semestinya tidak menunjukkan sikap pesimis dalam hal apapun. Termasuk dalam persoalan penyakit yang menimpa diri kita ataupun keluarga kita. Karena telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa setiap penyakit itu ada obatnya kecuali kematian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ شِفَاءً

Artinya:

“Tidakalah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya” (HR.Bukhari & Muslim).

Maksud dari hadis diatas adalah sebagai hamba yang percaya akan janji dan kebesaran Allah Subahahu Wa Ta'ala. Maka haruslah kita harus tetap optimis untuk senantiasa mencari sebab-sebab kesembuhan dari setiap penyakit yang kita derita seperti pergi ke pelayanan kesehatan ataupun melalui pengobatan-pengobatan alamiah disamping rasa harap dan optimis dalam menantikan pertolongan Allah Subahanahu Wa Ta'ala.

Pada prinsipnya penanggulangan hipertensi meliputi dua cara, antara lain:

a. Penatalaksanaan Farmakologis

Tahap ini memberikan terapi berupa obat antihipertensi. Menurut Arif Mansjoer, penatalaksanaan dengan obat antihipertensi bagi sebagian besar pasien dimulai dengan dosis rendah kemudian ditingkatkan secara titrasi sesuai umur dan ketentuan.

1) Obat yang Mengubah Keseimbangan Natrium dan Air

a) Diuretik thiazide, biasanya merupakan obat pertama yang diberikan untuk mengobati hipertensi. Diuretik membantu ginjal membuang garam dan air, yang akan mengurangi volume cairan diseluruh tubuh sehingga menurunkan tekanan darah. Diuretik juga menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Diuretik menyebabkan hilangnya natrium melalui air kemih sehingga kadang diberikan tambahan kalium atau obat penahan kalium.

(1) Penghambat Carbonic Anhydrase, menyakat reabsorpsi natrium bikarbonat, menyebabkan diuresis natrium bikarbonat dan penurunan simpanan bikarbonat tubuh total. Penghambat *Carbonic Anhydrase* diabsorpsi dengan baik setelah pemberian oral. Peningkatan PH urine karena diuresis bikarbonat terjadi dalam 30 menit, maksimal pada 2 jam, dan menetap selama 12 jam setelah pemberian dosis tunggal.

(2) Diuretik Ansa (Loop), secara selektif menghambat reabsorpsi NaCl pada cabang meningkat yang tebal dari ansa Henle. Dua prototipe obat dari kelompok ini adalah *Furosemide* dan *ethacrynic acid*. Masa kerja *furosemide* biasanya 2-3 jam. Waktu paruhnya bergantung pada fungsi

ginjal. Karena agen ansa bekerja pada sisi luminal tubulus, respon diuretic berkaitan secara positif dengan ekskresi urine.

(3) Thiazide, menghambat reabsorpsi NaCl dari sisi luminasi epitel dalam tubulus berbelit distalis. Semua thiazide di reabsorpsi dalam pemberian oral. Tetapi terdapat perbedaan dalam metabolismenya. *Cholorothiazide*, induk dari kelompok tersebut kurang, kurang dapat larut dalam lipid, dan harus diberikan pada dosis yang relatif besar. *Cholortalidone*, diabsorpsi lambat dan mempunyai masa kerja yang lebih panjang.

(4) Diuretik Hemat-Kalium, menurunkan absorpsi Na⁺ pada tubulus dan duktus pengumpul. *Sprinolactone* adalah suatu sintesis steroid yang bekerja sebagai antagonis kompetitif aldosterone. Mula dan lama kerjanya ditentukan oleh kinetic dari respon *aldosterone* pada jaringan target. Hasil keseluruhan merupakan mula kerja yang agak lambat, membutuhkan beberapa hari sebelum efek terapeutik lengkap tercapai. *Triamterene* di metabolisme di hati, tetapi ekskresi ginjal adalah jalur utama eliminasi bentuk aktif dan metaboliknya. Karena dimetabolismenya secara luas, waktu paruhnya lebih pendek sehingga harus diberikan lebih sering dari pada *amiloride*.

2) Obat yang Mengubah Sistem Saraf Simpatis

a) Obat Simpatoplegik yang bekerja secara sentral

(1) *Methyldopa*, berguna untuk pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. *Methyldopa* dapat menurunkan tekanan darah terutama dengan cara menurunkan tahanan vaskuler perifer, dengan variasi dalam

penurunan curah jantung dan denyut jantung. Methyldopa memasuki otak melalui molekul yang secara aktif membawa asam-asam amino aromatic, dosis oral methyldopa menghasilkan efek antihipertensi maksimal dalam 4-6 jam, dan efek tersebut dapat bertahan sampai dengan 24 jam.

(2) *Clonidine*. Pada orang-orang sehat, bioavailabilitas *clonidine* sekitar 75 % dan waktu paruhnya adalah 8-12 jam. Karena waktu paruhnya relatif pendek dan kenyataan bahwa efek antihipertensi nya secara langsung berhubungan dengan konsentrasinya di dalam darah, *clonidine* oral harus diberikan 2 kali / hari untuk mempertahankan keteraturan tekanan darah. Dosis terapeutik lazimnya adalah antara 0,2 dan 1,2 mg/hari.

b) Obat-Obat Penyekat Ganglion

Trimethaphan Camsylate diberikan secara intravena untuk mendapatkan reaksi cepat dalam penanganan krisis hipertensi, pembedahan aorta akut, dan untuk menginduksi hipertensi yang terkontrol pada operasi saraf.

c) Obat Penyekat Saraf Adrenergik

(1) *Guanethidine* dapat menyebabkan simpatoplegi yang besar. Efektifitas maksimal yang tinggi dari obat tersebut menjadikanya bertahan sebagai pengobatan utama bagi pasien hipertensi rawat jalan yang parah selama bertahun-tahun. Dengan alasan sama, *Guannethidine* dapat mengakibatkan toksisitas yang diduga dapat terjadi pada “simpatektomi farmakologis” termasuk hipotensi postural yang parah, diare dan hambatan ejakulasi. Karena efek samping tersebut, *guanethidine*

sekarang jarang dipakai. Waktu paruh *guanethidine* panjang (5 hari). Jadi, dengan dosis yang tetap setiap hari, efek simpatoplegi terjadi secara bertahap (efek maksimal dalam 1-2 minggu) dan simpatoplegi menetap dalam waktu yang sebanding setelah pemberhentian terapi.

(2) *Reserpine*, adalah salah satu obat efektif yang pertama kali digunakan dalam skala besar untuk pengobatan hipertensi. Sekarang *reserpine* dianggap efektif dan obat yang relatif aman untuk pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. Obat menghilang dari sirkulasi dengan cepat, akan tetapi efeknya bertahan lebih lama. Akibat dari inaktivasi ireversibel pada pembawa di granula penyimpanan *catecholamine*. Dosis harian yang lazim digunakan adalah kurang dari 1 mg (tepatnya 0,25 mg) dan diberikan secara oral sebagai dosis tunggal.

b) Antagonis Adrenoreseptor Beta

Pranolol, obat penyakit adrenoreseptor β , sangat berguna untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi ringan sampai sedang. Pada hipertensi parah, pranolol berguna khususnya untuk mencegah reflex takikardi yang sering terjadi akibat pengobatan dengan vasodilator langsung. Waktu paruhnya 3-6 jam.

d) Penyekat Adenoreseptor Alfa

Prozasin dapat direabsorpsi dengan baik di dalam hati, akan tetapi mengalami metabolisme lintas pertama yang sangat besar, hampir semua prozasin dieliminasi melalui metabolisme, dengan waktu paruh plasma 3-4 jam, meskipun masa kerja antihipertensinya lebih panjang. *Terazosin*

dimetabolisme pula secara luas, tetapi metabolisme lintas pertamanya sangat kecil dan mempunyai waktu paruh 12 jam. *Doxazosin* mempunyai bioavailabilitas sedang dengan waktu paruhnya 22 jam.

e) Vasodilator

- (1) Hydralazine, dapat digunakan dengan lebih efektif, terutama pada hipertensi yang parah. Waktu paruh *hydralazine* dalam rentang 2-4 jam, akan tetapi efek vaskulernya lebih panjang dari pada konsentrasinya di dalam darah. Rentang dosis lazimnya 40 mg – 200 mg / hari.
- (2) Minoxidil merupakan vasodilator oral yang sangat bermanfaat. Minoxidil seyogyanya menggantikan hidralazine bilamana dosis maksimal tidak efektif atau untuk digunakan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal dan hipertensi parah, yaitu mereka yang tidak memberi respon *hydralazine* dengan baik. Waktu paruhnya rata-rata 4 jam, akan tetapi, efek hipotensinya pada dosis tunggal bertahan lebih dari 24 jam.
- (3) Natrium Nitroprusside merupakan vasodilator parenteral yang sangat kuat yang digunakan dalam pengobatan kedaruratan hipertensi seperti juga dengan pengobatan gagal jantung parah. Nitroprusside secara cepat menurunkan tekanan darah dan efeknya menghilang dalam 1-10 menit setelah penghentian obat. Obat diberikan dengan cara infus intravena.
- (4) Fenoldopam merupakan areeol perifer yang digunakan untuk pengobatan kedaruratan hipertensi dan hipertensi pasca operasi. Waktu paruhnya 5 menit. Obat tersebut diberikan dengan infus intravena secara terus-menerus.

f) Penghambat Enzim Pengkonversi Angiotensin (ACE)

- (1) Captopril dan obat lain dalam kelas ini menghambat enzim penkonversi peptidyl dideptidase yang menghidrolis angiotensin I ke angiotensin II dan menyebabkan inaktivasi bardiakinin, sesuatu vasodilator kuat, yang paling sedikit sebagian, bekerja dengan cara menstimulasi rilis nitric oxide dan prostacylin. Captopril pada awalnya diberikan pada dosis 25 mg, 2 atau 3 kali sehari, 1-2 jam sebelum makan. Respon pada tekanan darah maksimal terjadi 2-4 jam setelah pemberian obat.
- (2) Enalapril adalah suatu produg yang dikonversi dengan desterifikasi menjadi penghambat enzim pengkonversi. Enalaprilat hanya tersedia untuk penggunaan secara intravena, terutama pada kedaruratan hipertensi. Konsentrasi puncak terjadi 3-4 jam setelah pemberian enalapril. Waktu paruh sekitar 11 jam. Dosis enalapril yang lazim adalah 10-20 mg / hari atau 2 kali sehari.

b. Penatalaksanaan Nonfarmakologis

Pendekatan nonfarmakologis merupakan penanganan awal sebelum penambahan obat-obatan hipertensi. Disamping perlu diperhatikan oleh seorang yang sedang dalam terapi obat. Sedangkan pasien hipertensi yang terkontrol, pendekatan nonfarmakologis ini dapat membantu pengurangan dosis obat pada sebagian penderita. Oleh karena itu, modifikasi gaya hidup merupakan hal yang penting diperhatikan, karena berperan dalam keberhasilan penanganan hipertensi.

Menurut beberapa ahli, pengobatan nonfarmakologis sama pentingnya dengan pengobatan farmakologis, terutama pada pengobatan hipertensi derajat I,

jika obat antihipertensi diperlukan, pengobatan nonfarmakologis dapat dipakai sebagai pelegkap untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik (Roadhah, 2012).

1. Menurunkan berat badan bila status gizi berlebih. Peningkatan berat badan di usia dewasa sangat berpengaruh terhadap tekanan darah. Oleh karena itu, manajemen berat badan sangat penting dalam prevensi dan kontrol hipertensi.
2. Meningkatkan aktifitas fisik. Orang yang aktifitasnya rendah berisiko terkena hipertensi 30-50% daripada yang aktif. Oleh karena itu, aktifitas fisik selama 30-45 menit sebanyak $> 3x$ / hari penting sebagai pencegahan primer dari hipertensi. Ada 3 tipe aktivitas fisik yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh yaitu:
 - a) Ketahanan (*endurance*)

Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan, dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit (4-7 hari per minggu). Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti: Berjalan kaki 20 menit, lari ringan, berenang, senam, bermain tenis dan berkebun dan kerja di taman.
 - b) Kelenturan (*flexibility*)

Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas (lentur) dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan maka aktivitas fisik

yang dilakukan selama 30 menit (4-7 hari per minggu). Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti: Peregangan 10-30 detik, bisa mulai dari tangan dan kaki, senam *taichi*, yoga, mencuci pakaian, mobil, dan mengepel lantai.

c) Kekuatan (*strength*)

Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban yang diterima, tulang tetap kuat, dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan kelenturan maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit (2-4 hari per minggu). Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti: Push-up, membawa belanjaan, naik turun tangga,

Aktivitas fisik tersebut akan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi (pembakaran kalori), misalnya: berjalan kaki (5,6-7 kkal/menit), berkebun (5,6 kkal/menit), menyetrika (4,2 kkal/menit), menyapu rumah (3,9 kkal/menit), membersihkan jendela (3,7 kkal/menit), mencuci baju (3,56 kkal/menit), mengemudi mobil (2,8 kkal/menit).

Aktivitas fisik dibagi atas 3 yaitu:

Aktivitas Ringan : Menyapu, memasak,

Aktivitas Sedang : Menyetrika, kerja kantor, dan mengepel lantai

Aktivitas Berat : Mencuci, berdagang, menyangkul, berkebun, *push up*

(Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI 2006).

3. Mengurangi asupan natrium. Apabila diet tidak membantu selama dalam 6 bulan, maka perlu pemberian obat anti hipertensi oleh dokter.
4. Berhenti Merokok dan Hindari Konsumsi Alkohol Berlebih. Nikotin dalam tembakau adalah penyebab meningkatnya tekanan darah. Nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah di dalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Dalam beberapa detik nikotin mencapai ke otak. Otak bereaksi kepada nikotin dengan memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin (adrenalin), sehingga dengan pelepasan hormon ini akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan yang lebih tinggi.

Demikian juga dengan alkohol, semakin banyak mengonsumsi alkohol maka semakin tinggi tekanan darah, sehingga peluang terkena hipertensi semakin tinggi. Alkohol dalam darah merangsang pelepasan epinefrin (adrenalin dan hormon-hormon lain yang membuat pembuluh darah menyempit atau menyebabkan penumpukan lebih banyak natrium dan air.

5. Terapi Herbal

Ada beberapa tanaman obat yang dapat dipercaya dan sudah diteliti dapat menurunkan tekanan darah, diantaranya bawang putih, buah belimbing, murbei, seledri, mengkudu, dan mentimun (El Manna M, 2011).

6. Terapi komplementer

Terapi komplementer adalah terapi pelengkap dari terapi konvensional untuk penyembuhan. Beberapa contoh terapi komplementer keperawatan yang dapat diberikan untuk pasien hipertensi yaitu: musik, yoga, akupresur dan meditasi (Keliat, 2010).

B. Tinjauan Umum Tentang Meditasi Dzikir

1. Pengertian Meditasi

Meditasi merupakan suatu teknik untuk mengkonsentrasikan pikiran agar lebih waspada dan bijaksana, serta dapat digunakan untuk mencegah maupun menyembuhkan penyakit (Kushartanti, 2008). Meditasi adalah menunggu. Menunggu berarti bersungguh-sungguh membiarkan sebuah proses berlangsung secara lengkap. Seseorang yang dapat menunggu adalah orang yang mempunyai kepercayaan dan oleh karena itu dia mempunyai kesabaran untuk menunggu. Jadi, kemampuan untuk menunggu menggambarkan kesabaran dan kepercayaan. Meditasi sangat membantu membersihkan pikiran kita dan meningkatkan konsentrasi (Keliat, 2010). Meditasi adalah latihan jiwa yang menyeimbangkan fisik, emosi, mental, dan spiritual seseorang (Budi prayitno, 2011).

2. Klasifikasi Meditasi

Menurut Endi Novianto (2008), meditasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu:

a. Meditasi dengan Usaha Sendiri

Meditasi dengan usaha sendiri tanpa bantuan siapa pun. Semua yang dilakukan bertujuan agar masuk dalam keadaan meditasi. Ada beberapa cara yang biasa digunakan yaitu: pemusatan pikiran yang dimaksud disini adalah membuang segala pikiran lain yang dianggap mengganggu dan hanya memikirkan atau melakukan hal tertentu saja. Ada beberapa cara yang digunakan oleh seseorang yang mendali metode ini yaitu: melalui doa, mantra, dzikir, olah pernapasan, visualisasi dan gerakan.

b. Mediasi dengan Proses Inisiasi

Pada metode ini, sebelum melakukan meditasi, seseorang harus mendapatkan inisiasi atau penyelarasan. Fungsi dari inisiasi adalah untuk mengaktifkan cakra, jalur energi, dan menyelaraskan hubungan dengan alam semesta. Adapun cara yang digunakan dalam meditasi ini adalah dengan melaksanakan ritual maupun tanpa ritual. Meditasi dengan ritual contohnya dalam agama islam adalah seseorang melakukan shalat untuk memperoleh pencerahan, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.

3. Manfaat Meditasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan meditasi bermanfaat dalam menurunkan kecemasan (Affandi, 2006). Pendapat Stanley (2006) juga mendukung pernyataan diatas bahwa meditasi berhubungan positif dengan gangguan psikologi yang diantaranya adalah kecemasan. Hasil penelitian dari Holroyd (2005) juga menyatakan bahwa manfaat lain dari meditasi adalah dapat

menurunkan sensasi tubuh dan pasien lebih menjadi tidak reaktif terhadap sensasi tersebut.

Penelitian Kushartanti (2008) menunjukkan bahwa terapi meditasi hening dapat menurunkan tekanan darah. Meditasi juga dapat meningkatkan kualitas manusia yang diasosiasikan dengan peningkatan intelegensi, peningkatan kinerja dan *recall* dalam bidang pendidikan, peningkatan kreativitas, peningkatan aktualisasi diri dan dapat menurunkan keluhan fisik (Prabowo, 2005). Menurut Benson & Stark (1998) meditasi, doa atau fokus pada keyakinan, dapat membangkitkan kesehatan yang teringat (*remembered wellness*). Kebangkitan *remembered wellness* dalam diri seseorang dihubungkan dengan penurunan aktifitas gelombang otak.

Penurunan aktivitas gelombang otak dan stres psikologis yang dirasakan dapat menstimulasi hipotalamus untuk menurunkan sekresi hormon *kortison*, *epinefrin* dan *norepinefrin* dalam peredaran darah (Guyton&Hall, 2006). Penurunan sekresi dari ketiga hormon diatas kemudian akan menurunkan aktivitas simpatis dalam pembuluh darah dan penurunan aktivitas simpatis ini diikuti dengan efekvasodilatasi pembuluh darah. Efek vasodilatasi pembuluh darah akan menurunkan tahanan pembuluh darah perifer yang kemudian diikuti dengan penurunan tekanan darah (Watson, 2006).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fuad (2012) yang menunjukkan bahwa meditasi dzikir dapat menurunkan tekanan darah dan gejala tekanan darah pada lansia yang diberikan selama 5x berturut-turut karena dengan meditasi dzikir lansia dapat menenangkan pikiran dan lebih dekat dengan Allah. Lansia seringkali

cemas dan ketakutan akan kematian itu sebabnya lansia mudah stress dan gangguan psikologi yang diikuti tekanan darah meningkat tetapi dengan meditasi dzikir lansia dapat lebih dekat dan memasrahkan diri kepada sang pencipta.

4. Meditasi Dzikir

Salah satu yang diterapkan dimasyarakat adalah meditasi dzikir. Meditasi dengan dzikir merupakan pemusatan fikiran kepada Allah SWT agar dapat lebih dekat dengan sang pencipta dan menyadari bahwa segala penyakit datangnya dari Allah dan obatnya pun dari Allah Ta'ala (Budi priyato, 2011).

Kata Dzikir berasal dari bahasa Arab, *adz-dzikh* yang berarti mengingat, mengucapkan atau menyebut, dan berbuat baik (Abataza, 2010). Dzikir merupakan salah satu yang disunahkan Rasulullah SAW. Dengan berdzikir kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan membatasi diri, meninggalkan keduniawian, dan menyerahkan seluruh hidup berbakti di jalan kebenaran. Dzikir dengan setulus hati akan membawa seseorang mencapai suatu getaran tertentu yang membuat orang tersebut masuk akan ketenangan pikiran dan perasan, sebagai awal keadaan meditasi (Budi Prayitno, 2011).

Dzikir berarti berbuat baik (beramal saleh) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beberapa di antaranya adalah: berbakti kepada orang-tua, berlaku jujur, objektif, dan adil, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, sekalipun kita tidak mengenalnya dengan baik, serta mengajak kepada kebaikan, dan melarang terjadinya kemungkaran.

Mengingat Allah (Dzikrullah) merupakan salah satu anjuran yang sangat ditekankan dalam Islam dan merupakan bentuk nyata dari penghambaan kita kepada Allah SWT. Dzikrullah (mengingat Allah) merupakan amalan yang sangat agung. Ia merupakan sebab diturunkannya berbagai nikmat, penolak segala bala' dan musibah. Dzikir juga merupakan sebab kuatnya hati dan penyejuk hati manusia.

Aktifitas ini mempunyai manfaat yang sangat besar. Baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Begitu juga sebaliknya, seorang yang lalai dalam mengingat Allah tentu akan meraih kerugian yang tak terhitung. Allah SWT menggolongkan orang-orang yang lalai dalam mengingat-Nya sebagai kelompok yang rugi.

Dzikir merupakan kewajiban umat islam karena dengan berdzikir dapat mendekatkan kita kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab ayat 41-42:

وَأَصِيلاً بُكْرَةً كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ ذِكْرًا آلَهُ ادْكُرُوا آمَنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan menyebut (nama-Nya) sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang"(Q.S Al-Ahzab ayat 41-42).

Menurut tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dzikir secara harfiah berarti "mengingat". Kegiatan "mengingat" memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Ketika ingat sesuatu, maka ia akan mengingat pula pada rangkaian-rangkaian yang terkait dengannya. Ingatan Bisa muncul karena kita

punya keinginan, kepentingan, harapan, dan kerinduan terhadap apa yang kita ingat. Kegiatan "mengingat" juga bisa memicu lahirnya ide-ide dan kreativitas baru.

Kalau hanya dengan mengingat sesuatu yang ada di alam ini bisa memicu munculnya bentuk kreativitas, bagaimana dengan mengingat Allah yang Maha kreatif dan kekuasaan-Nya tak terbatas. Secara logika tentu akan memberikan dampak positif luar biasa bagi kehidupan. Kita sebagai seorang perawat dapat mengingatkan pada klien agar terus berdzikir dan selalu mengingat Allah karena sesungguhnya tiada penyakit yang diturunkan selain ada obatnya.

Menurut Yusuf Mansyur (2009), dzikir menurut para ulama, dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu:

- a. Dzikir dengan lisan (dzikr bil al-lisan), yakni membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat takbir, tasbih, tahlil dan lain sebagainya dengan bersuara.
- b. Dzikir dalam hati (dzikr bi al-cjorb), yakni membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat takbir, tasbih, tahlil dan lain sebagainya dengan membatin.

Tanpa mengeluarkan suara. Sebagian ulama menafsirkan dzikir dalam hati ini, adalah bertafakkur (memikirkan/merenungi) berbagai ciptaan Allah SWT dan kenikmatannya dengan penuh keyakinan, dan perasaan tulus. Inilah dzikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah sebaik-baik dzikir kepada Allah SWT.

- c. Dzikir dengan panca indra atau anggota badan (dzikr bi al-jawarih), yakni menundukkan seluruh anggota badan kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan segala perintah dan meninggalkan seluruh larangan-Nya.

Tentang dzikir panca indra ini, sebagian ulama tasawuf memiliki pengertian dan konsep yang berbeda. Yakni melalui tujuh penjurur panca indra.

- a. Dzikir kedua mata dengan menangis
- b. Dzikir kedua telinga dengan mendengarkan hal-hal yang baik, dan menghindari mendengarkan pembicaraan yang tiada guna
- c. Dzikir lidah dan mulut dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT
- d. Dzikir hati dengan penuh rasa takut dan harap kepada Allah SWT
- e. Dzikir ruh dengan tawakkal (berserah diri) kepada Allah SWT dan rela atas segala keputusannya
- f. Dzikir badan dengan memenuhi berbagai kewajiban dan
- g. Dzikir kedua tangan dengan bersedekah.

Dzikir dengan panca indra ini disebut juga dzikir fi'il, yaitu mengingat Allah dengan perbuatan. Misalnya, melaksanakan ibadah (shalat, puasa, dan lain-lainnya), menuntut ilmu, menengok orang sakit, bekerja mencari rezeki yang halal, mencegah kemungkaran, menyuruh orang berbuat baik, dan lain sebagainya.

Menurut Ansyarian (2011) Dzikrullah merupakan aktifitas mulia yang menyimpan segudang manfaat. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Menerangi hati dan pikiran

Mengingat Allah atau Dzikrullah dapat menerangi hati dan akal pikiran.

Terkait hal ini Imam Ali As, berkata,

مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ، اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَحْيَا قَلْبَهُ وَنَوَّرَ عَقْلَهُ

Artinya :

"barang siapa yang berdzikir dan mengingat Allah, Allah SWT akan menghidupkan hatinya serta menerangi akal dan pikirannya".

b. Kemenangan dan kekuatan

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا فَاثْبُتُوا فِتْنَةً لَقَيْتُمْ إِذَا آمَنُوا مِنَ الَّذِي أَهْمَهَا يَا

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung". (QS. Al-Anfaal ayat 45)

Dalam ayat ini Allah Taala memerintahkan kepada kaum muslimin apabila mereka menjumpai segolongan dari pasukan musuh supaya meneguhkan hati dan selalu menyebut nama Allah dengan banyak berdzikir agar mereka mencapai kejayaan dan kemenangan. Hal ini merupakan suatu pokok kekuatan yang menyebabkan kemenangan dalam setiap perjuangan. Dengan mengingat Allah yang maha besar serta meyakini bahwa kemenangan itu berada di tangannya dan Allah akan menolong kaum muslimin, maka seorang muslim akan optimis dan mengerahkan segala kemampuannya dalam menaklukkan musuhnya.

Dalam kitab Mizanul-hikmah, Imam Ali bin Abi Thalib menyuruh kita untuk sedikit berbicara dan banyak mengingat Allah SWT dalam duel melawan musuh.

c. Allah SWT akan mengingat kita

تَكْفُرُونَ وَلَا لِي وَاشْكُرُوا أَذْكُرْكُمْ فَادْكُرُونِي

Terjemahannya:

"Ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku". (QS. Al-Baqarah:152)

Arti ayat diatas menjelaskan salah satu dari manfaat dzikir. Apabila kita senantiasa mengingat Allah, maka tentu Allah SWT senantiasa mengingat kita dan apabila kita dilanda musibah, maka Allah SWT tidak akan lupa untuk menolong kita selaku hambanya yang lemah.

Dalam kitab Biharul-anwar, Imam Ja'far al-Sadiq As mengatakan bahwa Allah SWT bersabda kepada hamba-hambanya demikian, "wahai anak adam, ingatlah aku dalam hati dan jiwamu sehingga aku juga mengingatmu dalam hati dan jiwaku, ingatlah aku dalam keramaian sehingga aku mengingatmu dalam keramaian".

d. Penyucian Jiwa

Mengingat Allah merupakan perantara penyucian jiwa. Oleh karena itu, hati manusia yang selalu terkontaminasi oleh berbagai keburukan dapat dibersihkan melalui berdzikir. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ali bin Abi Thalib As dalam nasehatnya kepada putranya Imam Hasan Mujtaba berkata, " putraku, aku menasehatimu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan membersihkan jiwamu melalui Dzikrullah".

e. Mencegah tipu daya syaitan

نَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya" (Q.S Al-A'raaf ayat 201).

Menurut tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab dalam Q.S Al-A'raaf ayat 201 menyatakan bahwa pada dasarnya syaitan itu takut kepada orang yang bertakwa dan selalu menyebut nama Allah. Hendaknyalah kita sebagai umat muslim selalu mengingat Allah karena dengan mengingat Allah kita akan terhindar dari kejahatan dan tipu daya syaitan.

Pada meditasi dzikir terbagi atas 2 fase yaitu fase pembinaan dan fase pendinginan.

a. Fase Pembinaan

Pada fase pembinaan merupakan pada fase ini seseorang akan melakukan dzikir dengan cara membaca bacaan dzikir.

Adapun cara melakukan fase pembinaan adalah:

- 1) Mempersilahkan klien untuk duduk bersila di tempat bersih dan nyaman
- 2) Bimbing klien untuk melakukan peregangan selama 2-3 menit
- 3) Jika telah siap, bimbing klien dengan aba-aba untuk melakukan persiapan dzikir
- 4) Anjurkan klien untuk memejamkan mata, agar klien dapat berkonsentrasi melakukan dzikir dan dapat memusatkan pikiran pada bacaan dzikir.

Dalam Hadist riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa bacaan-bacaan dzikir adalah sebagai berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ (3X)

Astaghfirullaah (3X)

Artinya :

“*Aku minta ampun kepada Allah*”.

سُبْحَانَ اللَّهِ (33X)

Subhanallah (33x)

Artinya:

“*Maha Suci Allah*”

الْحَمْدُ لِلَّهِ (33X)

Alhamdulillah (33x)

Artinya:

“*Segala puji bagi Allah*”

اللَّهُ أَكْبَرُ (33X)

Allahu Akbar (33x)

Artinya:

“*Allah Maha Besar*”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1X)

La ilaaha illallaahu wahdaahu laasyariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kullisyain qadiir (1x)

Artinya:

“*Tidak ada Tuhan selain Allah, sendiri-Nya; tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala-galanya*”.

b. Fase Pendinginan

Fase pendinginan merupakan tahap dimana seseorang melakukan 3 hal yaitu; pemusatan pikiran, pengosongan pikiran dan pengaturan irama pernafasan. Fase pendinginan dalam meditasi dzikir secara empiris dilakukan selama 10 menit. Teknik meditasi merupakan teknik latihan fisik yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menurunkan tekanan darah.

Kushartanti (2008) menyatakan bahwa teknik meditasi hening dan pengaturan nafas dapat menurunkan rata-rata tekanan darah sistole responden yaitu dari 163 mmHg sebelum melakukan meditasi menjadi 136 mmHg setelah melakukan meditasi. Rata-rata tekanan diastole responden juga turun yaitu dari 96 mmHg menjadi 88 mmHg setelah melakukan meditasi. Berdasarkan perhitungan tersebut maka metode meditasi hening dan pengaturan nafas terbukti secara signifikan dapat menurunkan tekanan darah pasien hipertensi.

Pada fase pendinginan, adapun cara untuk melakukannya adalah:

- 1) Anjurkan klien bernafas melalui hidung dan menghitung dalam hati sampai 5 dan anjurkan kembali klien untuk menghembuskan nafas melalui mulut. Pada tahap ini klien diharapkan dapat mengatur irama pernafasan klien agar klien tampak rileks.
- 2) Fase ini dapat dilakukan selama 10-15 menit agar klien dapat betul-betul merasa nyaman dan rileks.

C. Pengaruh Meditasi Dzikir Terhadap Perubahan Tekanan Darah

Meditasi dzikir terdiri dari 2 fase yaitu fase pembinaan dan fase pendinginan. Pada fase pembinaan seseorang akan melakukan dzikir pengosongan sementara pikiran terhadap masalah psikososial, pemusatan pikiran pada kepasrahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pengosongan sementara pikiran terhadap masalah psikososial memungkinkan terjadinya penurunan rangsang terhadap stresor. Penurunan rangsang terhadap stresor kemudian direspon oleh

hipotalamus dengan menurunkan pengaturan sekresi hormone *kortison*, *epinefrin* dan *norepinefrin* dalam pembuluh darah (Guyton&Hall, 2006).

Penurunan sekresi hormon-hormon tersebut mengakibatkan penurunan aktivitas *simpatis* sehingga terjadi efek vasodilatasi pembuluh darah diseluruh tubuh. Efek vasodilatasi ini menurunkan tahanan perifer sehingga terjadilah penurunan tekanan darah dan nadi. Efek relaksasi dihasilkan oleh dua kegiatan lain dari fase pendinginan yaitu pengelolaan nafas (Prabowo, 2005). Relaksasi dalam tubuh ini menimbulkan dua hal juga yaitu peningkatan kesadaran dan kepekaan terhadap penginderaan diri dan respon hipotalamus mensekresi hormon analgesik tubuh yaitu *endorphin* dan *melatonin* (Kushartanti, 2008).

Peningkatan kesadaran dan kepekaan terhadap penginderaan diri memungkinkan seseorang berada pada gelombang *alpha* dalam aktivitas otaknya dan hal ini membantu penurunan rangsang terhadap stresor yang efeknya nanti akan menurunkan tekanan darah dan nadi (Afandi, 2006).

Fase pendinginan melakukan pengolahan nafas. Pengolahan nafas yang dimaksudkan yaitu seperti nafas dalam. Dengan pengolaan nafas memungkinkan terjadinya peningkatan maksimal ekspansi dari paru sehingga terjadi peningkatan volume inspirasi dan oksigenasi dalam sirkulasi melalui pembuluh darah keseluruh tubuh (Wuryaningsih, 2011).

Hal tersebut memungkinkan suplai oksigen dan sirkulasi ke organ target termasuk pembuluh darah di jantung menjadi lebih adekuat. Suplai oksigen dan sirkulasi yang adekuat menuju jantung memungkinkan terjadinya peningkatan kontraktilitas jantung. Peningkatan kontraktilitas jantung akan meningkatkan

volume sekuncup. Bersamaan dengan efek vasodilatasi pembuluh darah akibat penurunan rangsang *simpatis* maka peningkatan volume sekuncup ini diikuti dengan penurunan frekuensi jantung. Penurunan frekuensi jantung akan menurunkan curah jantung (Guyton & Hall, 2006).

Suplai oksigen dan sirkulasi juga meningkat ke area perifer ketika fase pendinginan. Hal tersebut memungkinkan sirkulasi perifer lebih adekuat dan bersamaan dengan efek vasodilatasi pembuluh darah akibat penurunan rangsang *simpatis* terjadilah penurunan tahanan perifer (Watson, 2006). Penurunan tahanan perifer disertai dengan penurunan curah jantung mengakibatkan penurunan tekanan darah dan nadi (Potter & Perry, 2005).

D. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi Pada Lansia

1. Pengertian Hipertensi Pada Lansia

Menurut *Joint National Committee* (JNC VI 1997), Hipertensi pada lanjut usia didefinisikan sebagai tekanan sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan atau tekanan diastolik lebih besar dari 90 mmHg di temukan dua kali atau lebih pada dua atau lebih pemeriksaan yang berbeda (JNC VI, 1997). Hipertensi pada lanjut usia di bedakan menjadi dua macam yaitu hipertensi pada tekanan sistolik sama atau lebih besar dari 140 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih 90 mmHg serta hipertensi sistolik terisolasi lebih besar dari 160 mmHg dan tekanan diastolik lebih rendah dari 90 mmHg (Nugroho, 2008). Sedangkan menurut Kaplan (1990), pada pria usia lebih dari 45 tahun dikatakan hipertensi

bila tekanan darah diatas 145/95 mmHg, sedangkan pada wanita dikatakan hipertensi bila tekanan darah di atas sama dengan 160/95 mmHg (Syarif, 2012).

2. Patofisiologi Hipertensi Pada Lansia

Mekanisme dasar peningkatan tekanan sistolik sejalan dengan peningkatan usia terjadinya penurunan elastisitas dan kemampuan meregang pada arteri besar. Tekanan aorta meningkat sangat tinggi dengan penambahan volume intravaskuler yang sedikit menunjukkan kekakuan pembuluh darah pada lanjut usia. Secara hemodinamik hipertensi sistolik ditandai dengan penurunan kelenturan pembuluh darah aretri besar, resistensi perifer yang tinggi, pengisian diastolik abnormal dan bertambahnya massa ventrikel kiri. Penurunan volume darah dan output jantung disertai kekakuan arteri besar menyebabkan penurunan tekanan diastolik.

Lanjut usia mengalami kerusakan struktural dan fungsional pada arteri besar yang membawa darah dari jantung menyebabkan semakin parahnya pengerasan pembuluh darah dan tingginya tekanan darah (Tuty, 2006).

3. Komplikasi Hipertensi

a. Stroke

Stroke merupakan manifestasi gangguan saraf umum yang timbul mendadak dalam waktu singkat akibat gangguan aliran darah ke otak karena penyumbatan (*ischemic stroke*) atau perdarahan (*hemoragic stroke*). Dengan kata lain, menurut cara terjadinya, stroke dibedakan menjadi dua macam, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke hemoragik inilah yang biasanya merupakan komplikasi hipertensi.

Hipertensi dapat menyebabkan tekanan yang lebih besar pada dinding pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah menjadi lemah dan pembuluh darah akan mudah pecah. Pecahnya pembuluh darah di otak dapat menyebabkan sel-sel otak yang seharusnya mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi yang dibawah melalui pembuluh darah tersebut kekurangan nutrisi dan akhirnya mati. Darah yang keluar dari pembuluh darah yang pecah juga dapat merusak sel-sel otak yang berada disekitarnya.

b. Penyakit Jantung

Peningkatan tekanan darah secara sistemik meningkatkan resistensi terhadap pemompaan darah dari ventrikel kiri sehingga beban jantung bertambah. Sebagai akibatnya, terjadi hipertrofi ventrikel kiri untuk meningkatkan kontraksi. Akan tetapi kemampuan ventrikel untuk mempertahankan curah jantung dengan hipertrofi kompensasi akhirnya terlampaui dan terjadi dilatasi dan payah jantung. Jantung semakin terancam seiring parahnya aterosklerosis koroner. Angina pectoris juga dapat terjadi karena gabungan penyakit arterial koroner yang cepat dan kebutuhan oksigen miokard yang bertambah akibat penambahan massa miokard.

c. Gagal Ginjal

Gagal ginjal merupakan suatu keadaan klinis kerusakan ginjal yang progresif dan tidak dapat diperbaiki dari berbagai penyebab. Salah satunya pada bagian yang menuju ke kardiovaskuler. Mekanisme terjadinya hipertensi pada gagal ginjal kronis karena penimbunan garam dan air atau sistem renin angiotensin aldosteron (RAA).

d. Ensefalopati Hipertensi

Ensefalopati hipertensi merupakan suatu keadaan peningkatan parah tekanan arteri disertai dengan mual, muntah dan nyeri kepala yang berlanjut ke koma dan disertai tanda klinik defisit neurologi.

4. Penatalaksanaan Hipertensi Pada Lanjut Usia

Menurut Mansjoer (2008), kategori penatalaksanaan di kategorikan dalam kelompok risiko menjadi :

- a. Pasien tekanan darah perbatasan atau tingkat 1, 2, atau 3 tanpa gejala penyakit kardiovaskuler, kerusakan organ, atau faktor risiko lainnya. Bila dengan modifikasi gaya hidup tekanan darah belum dapat diturunkan, maka harus diberikan obat antihipertensi.
- b. Pasien tanpa penyakit kardiovaskuler atau kerusakan organ lainnya, tapi memiliki satu atau lebih faktor risiko, namun bukan diabetes mellitus dapat diberikan terapi nonfarmakologi seperti pemberian terapi herbal atau terapi komplementer seperti olahraga, yoga, akupresur dan meditasi. Jika terdapat beberapa faktor maka harus langsung diberikan obat antihipertensi.
- c. Pasien dengan gejala klinis penyakit kardiovaskuler atau kerusakan organ yang jelas.

Anderson (2011) menjelaskan mengenai pemakaian obat pada lanjut usia perlu diperkirakan kemungkinan adanya gangguan absorpsi dalam alat pencernaan, interaksi obat, efek samping obat dan gangguan akumulasi obat terutama obat-obatan yang ekskresinya melalui ginjal. Melaksanakan terapi

ntihipertensi perlu penetapan jadwal rutin harian minum obat, mencatat obat-obatan yang diminum dan keefektifan informasi untuk tindak lanjut (Tuty, 2006).

E. Tinjauan Umum Tentang Lansia

1. Pengertian Lansia

Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang di derita.

Batasan orang dikatakan lanjut usia berdasarkan UU No 13 Tahun 1998 adalah 60 tahun. Menurut WHO, usia lanjut dibagi menjadi 4 kriteria yaitu:

- a. Usia pertengahan (middle age) ialah 55-59 tahun
- b. Lanjut usia (elderly) ialah 60-74 tahun
- c. Lanjut usia tua (old) ialah 75-90 tahun
- d. Usai sangat tua (very old) ialah diatas 90 tahun.

2. Proses Penuaan

Menua didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia (Aru, dkk, 2009)

Penuaan adalah proses normal yang ditandai dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan dan terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usai tahap perkembangan kronologis tertentu.

Proses penuaan merupakan suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap orang. Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan (gradual) kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri tua mengganti serta mempertahankan struktur dan fungsi secara normal, ketahanan terhadap cedera, termasuk adanya infeksi. Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara biologis, mental maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun, sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosial (Tamher, 2009).

3. Teori Proses Penuaan

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan proses penuaan yaitu:

a. Teori Biologis

- 1) Teori Genetik dan Mutasi. Menurut teori genetik dan mutasi, semua terprogram secara genetik untuk spesies-spesies tertentu. Menua terjadi sebagai akibat dari perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul-molekul DNA dan setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi.
- 2) *Immunology Slow Theori*. Menurut teori ini, sistem imun menjadi kurang efektif dengan bertambahnya usia dan masuknya virus ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh.
- 3) Teori Stres. Teori ini mengatakan semua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internal, kelebihan usaha dan stres yang menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai.

- 4) Teori Radikal Bebas. Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas, tidak stabilnya radikal bebas (kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini menyebabkan sel-sel tidak dapat melakukan regenerasi.
- 5) Teori Rantai Silang. Teori ini mengatakan bahwa reaksi kimia sel-sel yang tua menyebabkan ikatan yang kuat, khususnya jaringan kolagen. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastisitas kekacauan, dan hilangnya fungsi sel.

b. Teori Psikologi

- 1) Teori Kebutuhan manusia menurut Hirarki Maslow. Menurut teori ini, setiap individu memiliki hirarki dari dalam diri, kebutuhan yang memotivasi seluruh perilaku manusia. Kebutuhan ini memiliki urutan prioritas yang berbeda. Ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, mereka berusaha menemukannya pada tingkat selanjutnya sampai urutan yang paling tinggi dari kebutuhan tersebut tercapai.
- 2) Teori individual jung. Carl Jung (1960) Menyusun sebuah teori perkembangan kepribadian dari seluruh fase kehidupan yaitu mulai dari masa kanak-kanak, masa muda dan masa dewasa muda, usia pertengahan sampai lansia. Kepribadian individu terdiri dari Ego, ketidaksadaran seseorang dan ketidaksadaran bersama. Menurut teori ini kepribadian digambarkan terhadap dunia luar atau ke arah subyektif. Pengalaman-pengalaman dari dalam diri (introvert). Keseimbangan antara kekuatan ini dapat dilihat pada setiap individu, dan merupakan hal yang paling

penting bagi kesehatan mental

c. Teori Sosial

- 1) Teori Aktifitas. Lanjut usia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial.
- 2) Teori Pembebasan. Dengan bertambahnya usia, seseorang secara berangsur angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lanjut usia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga terjadi kehilangan ganda yakni: kehilangan peran, hambatan kontrol sosial dan berkurangnya komitmen.
- 3) Teori Kesenambungan. Teori ini mengemukakan adanya kesinambungan dalam siklus kehidupan lansia. Dengan demikian pengalaman hidup seseorang pada usatu saat merupakan gambarannya kelak pada saat ini menjadi lansia.

d. Teori Spritual

Komponen spritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian hubungan individu dengan alam semesta dan persepsi individu dengan arti kehidupan.

4. Tipe Kepribadian Lansia

a. Tipe Kepribadian Konstruktif

Orang ini memiliki integritas baik, menikmati hidupnya, toleransi tinggi dan fleksibel. Biasanya tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, tenang, bisa menerima fakta proses menua dan menghadapi masa pensiun dengan bijaksana dan

menghadapi kematian dengan penuh kesiapan fisik dan mental.

b. Tipe Kepribadian Mandiri

Pada tipe ini ada kecenderungan *post power syndrom*, apalagi jika pada masa lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi.

c. Tipe Kepribadian Tergantung

Tipe ini biasanya sangat dipengaruhi kehidupan keluarga, apabila kehidupan keluarga selalu harmonis maka pada lansia tidak bergejolak, tapi jika pasangan hidup meninggal maka pasangan yang ditinggalkan akan mengalami sedih yang mendalam. Tipe lansia ini senang mengalami pensiun, tidak punya inisiatif, pasif tapi masih tau diri dan masih dapat diterima oleh masyarakat.

d. Tipe Kepribadian Bermusuhan

Lanjut usia pada tipe ini, setelah memasuki lanjut usia tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya, banyak keinginan yang tidak diperhitungkan sehingga menyebabkan kondisi ekonominya menurun. Mereka menganggap orang lain yang mengalami kegagalan, selalu mengeluh dan curiga. Menjadi tua tidak ada yang dianggap baik, takut mati dan iri hati dengan yang muda.

e. Tipe Kepribadian Defensive

Tipe ini selalu menolak bantuan, emosinya tidak terkontrol, bersifat kompulsif aktif. Mereka takut menjadi tua dan tidak menyenangi masa pensiun.

f. Tipe Kepribadian Kritik Diri

Pada lansia tipe ini umumnya terlihat sengsara, karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain atau cenderung membuat susah dirinya. Selalu menyalahkan diri, tidak memiliki ambisi dan merasa korban dari keadaan.

5. Perubahan-Perubahan yang terjadi pada Lanjut Usia

a. Perubahan-Perubahan Fisik

- 1) Sel. Pada lansia ukuran sel akan membesar, jumlah sel lebih sedikit, jumlah cairan intraseluler berkurang, maka bisa menjadi penurunan proporsi protein di otak, ginjal darah dan hati serta jumlah sel otak menurun. Karena tergantungnya mekanisme perbaikan sel otak menjadi atropis dimana beratnya berkurang 5-10%.
- 2) Sistem Persarafan. Lansia mengalami penurunan koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Koordinasi keseimbangan, kekuatan otot, refleks, perubahan postur tubuh dan peningkatan waktu reaksi, kurang sensitif terhadap sentuhan.
- 3) Sistem Pendengaran. Presbiakusis (gangguan pada pendengaran), hilangnya kemampuan (daya) mendengar pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas sulit mengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia diatas 65 tahun, membran timpani atrofi menyebabkan oterosklerosis, pendengaran bertambah menurun pada lanjut usia yang mengalami ketegangan jiwa/stress.
- 4) Sistem Penglihatan. Sfingter pupil timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar, kornea lebih berbentuk sferis (bola), kekeruhan pada lensa, hilangnya daya koordinasi, menurunnya lapangan pandang (berkurang luas pandang), menurunnya daya membedakan warna biru atau hijau pada skala.

- 5) Sistem Kardiovaskuler. Elastisitas dinding aorta menurun, katub jantung menebal dan menjadi kaku, kehilangan elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer.
- 6) Sistem Pengaturan Temperatur Tubuh. Temperatur tubuh menurun secara fisiologis kurang lebih 35°C , ini akibat metabolisme menurun, keterbatasan refleks, menggigil dan tidak dapat memproduksi panas yang banyak, sehingga terjadi rendahnya aktifitas otot.
- 7) Sistem Respirasi. Otot-otot pernafasan kehilangan kekutaan dan menjadi kaku, menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas, kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih berat, kapasitas pernapasan maksimum menurun dan kedalaman bernafas menurun, alveoli ukuranya melebar dari biasa dan jumlahnya berkurang, kemampuan untuk batuk menurun.
- 8) Sistem Gastrointestinal. Pada lanjut usia perlahan akan kehilangan gigi, pengecap menurun, esopagus melebar, rasa lapar menurun karena kebutuhan nutrisi pada lansia lebih rendah dari pada anak-anak atau orang dewasa, peristaltik lemah dan biasanya timbul konstipasi. Pada wanita payudara menjadi atrofi, pada laki-laki usia diatas 65 tahun, terjadi pembesaran prostat kurang lebih 75%.
- 9) Sistem Muskuloskeletal. Tulang kehilangan cairan dan makin rapuh, penurunan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot, kesulitan bergerak dari duduk ke berdiri, jongkok, berjalan, dan hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

b. Perubahan-Perubahan Mental

1) Perubahan Kognitif

- a) Memori (daya ingat, ingatan). Kenangan jangka panjang, beberapa jam sampai beberapa hari yang lalu dan mencakup beberapa perubahan.
- b) IQ (Intellectual Quation). Tidak berubah dengan informasi matematika dan perkataan verbal, penampilan, persepsi dan keterampilan psikomotor berkurang, terjadi perubahan pada daya membayangkan karena tekanan faktor waktu.

c. Perubahan-Perubahan Psikososial

- 1) Terjadi gangguan identitas akibat perubahan kondisi fisik, usia dan kekuatan (bekerja).
- 2) Ekonomi akibat pemberhentian dari pekerjaan atau pensiun
- 3) Penyakit kronis dan ketidak mampuan
- 4) Perubahan dalam peran sosial di masyarakat.

d. Lansia Dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa menjadi tua merupakan suatu keniscayaan bagi setiap manusia yang di panjangkan usianya oleh Allah Subhana huawatala, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Mu'Min/40: 67.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا
وَلِتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ كُمْ ثُمَّ لِيَكُونُوا شُيُوخًا أُشَدَّ
وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahannya:

“Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian itu dari nuthfah, kemudian itu dari ‘alaqa, kemudian itu dia mengeluarkan kamu jadi anak kecil (bayi), kemudian supaya sampailah kedewasaan kamu, kemudian supaya jadilah kamu orang tua. Maka setengah diantara kamu ada yang diwafatkan dari sebelumnya dan supaya sampai kamu kepada ajal yang telah ditentukan dan supaya kamu berfaham”. (QS Al-Mu’Min/40: 67).

Menurut Prof.Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, di jelaskan bahwa ketika Allah berkehendak maka ada sebagian manusia yang dimatikan sebelum sampai pada usia tua, dan ada juga sebagian dimatikan ketika sampai pada usia tua. Ini menunjukkan bahwa menjadi tua sudah merupakan ketentuan yang diatur oleh Allah dan sebagian manusia akan berada pada tahap ini, yaitu menjadi tua (Hamka, 1983).

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah di bawah ini, yang menjelaskan bahwa ada satu penyakit yang tidak bisa di obati yaitu menjadi tua.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ
نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ : أَنْتَدَاوَى؟ فَقَالَ
الْهَرَمُ : مَا هُوَ؟ قَالَ : قَالُوا . لَهُ شِفَاءٌ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ

Artinya :


Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk tetap berobat ketika sakit karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan pula obatnya dan hanya satu penyakit yang tidak ada

obatnya yaitu penyakit tua. Dalam hal ini, menjadi tua merupakan suatu keniscayaan bagi setiap manusia yang dipanjangkan usianya oleh Allah SWT, namun tidak berarti bahwa penyakit yang di derita lansia juga tidak bisa di obati. Semua penyakit yang ada pada lansia bisa di obati sebagaimana dalam penjelasan Hadis Rasulullah bahwa semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Sehingga kita harus tetap berusaha untuk mengobati penyakit-penyakit yang terjadi pada lansia.

F. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Konseptual Penelitian




Keterangan :

- : Variabel Independen
- : Variabel Depende
- : Variabel yang tidak diteliti

Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi variabel independen adalah terapi hipertensi non farmakologi, yaitu pemberian Meditasi

dzikir, sedangkan variabel dependennya adalah tekanan darah. ini merupakan landasan atau sumber dilaksanakannya penelitian ini.

G. Kerangka Kerja




BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *pre experiment design* dengan menggunakan rancangan *pretest-posttest one group design*, dalam desain ini satu kelompok objek diukur sebelum dan sesudah mendapat perlakuan dengan meditasi dzikir. Bagan penelitian ini adalah sebagai berikut.



Pengaruh adanya perlakuan adalah apabila ada perubahan hasil pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan (Suryabrata, 2011).

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa pada 03-07 Desember 2014.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (A Azis Alimul Hidayat, 2009).

Dalam penelitian ini populasinya adalah lansia yang menderita hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa berjumlah 42 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (A Azis Alimul Hidayat, 2009). Dalam penelitian ini, besar sampel adalah 15 orang. Pada penelitian eksperimen maka jumlah anggota sampel masing-masing 10 s/d 20 orang (Wartoyo, 2008).

C. Teknik Pengambilan Sampel

1. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dengan cara *nonprobability sampling*, jenis *Purposive sampling*.

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2008).

- 1) Bersedia diteliti dengan menandatangani surat persetujuan.
- 2) Lansia dengan hipertensi ringan dan sedang. (Sistolik $140- \geq 179$ mmHg dan diastolik $90- \geq 109$ mmHg)
- 3) Lansia dengan usia 60-74 tahun

- 4) Tidak dalam keadaan sakit.
- 5) Beragama islam

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah mengeluarkan atau menghilangkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2008).

- 1) Responden yang pada saat dilakukan intervensi tidak berada di tempat.
- 2) Responden dengan hipertensi Berat (sistolik :180 - \geq 210 mmHg & diastolik : 120 - \geq 130 mmHg).

D. Metode Pengumpulan Data

1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi (inisial responden, tekanan darah pre, tekanan darah post mulai H1-H5 perlakuan), kuesioner, dan satu set alat untuk mengukur tekanan darah (*sfigmomanometer dan stetoskop*).

2. Pengumpulan Data

a. Data Primer, diperoleh dengan cara:

Pengukuran tekanan darah post test pada kelompok eksperimen dengan menggunakan alat set pengukur tekanan darah (*sfigmomanometer dan stetoskop*).

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud disini adalah berupa jumlah peserta meditasi dzikir di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan lansia yang merupakan kelompok perlakuan yang akan mengikuti meditasi dzikir.
- b. Memperkenalkan diri, maksud dan tujuan penelitian.
- c. Meditasi dzikir 5 hari dengan durasi 10-30 menit.
- d. Melakukan pengukuran tekanan darah pada kelompok eksperimen dengan menggunakan set alat pengukur tekanan darah (*sfigmomanometer dan stetoskop*) setelah meditasi dzikir.

E. Pengelolaan dan Analisa Data

1. Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari hasil pengukuran tekanan darah, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. *Editing*

Proses *editing* dilakukan setelah data terkumpul, dengan memeriksa kelengkapan dan keseragaman data.

b. *Koding*

Koding dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua hasil pemeriksaan data perlu disederhanakan dengan simbol-simbol tertentu.

Pengkodean dilakukan dengan memberi nomor variabel, nama variabel dan kode.

c. Tabulasi data

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki.

2. Analisa Data

a. Analisa Univariat

Analisa univariat untuk menganalisis variabel yang ada secara dekriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsi untuk mengetahui karakteristik subjek dari penelitian.

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap dependen dengan menampilkan tabel silang. Untuk mengetahui pengaruh meditasi dzikir terhadap penurunan tekanan darah, maka dilakukan uji statistik T test sample paired untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat kemaknaan ditentukan $\leq 0,05$. Artinya jika hasil uji statistik menunjukkan $p \leq 0,05$ maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisa data menggunakan komputersasi.

F. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung (Azis Alimul Hidayat, 2009). Etika yang perlu dan harus diperhatikan adalah :

1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Tujuannya adalah lansia mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Jika lansia bersedia untuk menjadi maka harus menandatangani lembar persetujuan dan jika lansia menolak untuk menjadi responden maka tidak akan memaksa dan tetap menghormati haknya.

2. Tanpa Nama (*Anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas lansia, peneliti tidak akan mencantumkan inisial pada lembar observasi. Lembar tersebut hanya diberi kode nomor tertentu.

3. Kerahasiaan (*Confidentiallity*)

Kerahasiaan informasi yang telah didapat oleh peneliti dari responden akan dijamin kerahasiaanya, hanya data tertentu saja yang berhubungan dengan apa yang akan disajikan sebagai hasil dari penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Romang Polong adalah salah satu wilayah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah Kabupaten Gowa. Luas wilayah sekitar 3,71 km². Berdasarkan letak geografis wilayah Kelurahan Romang Polong berada pada posisi 5^o12'01" Lintang Selatan dan 119^o28'57" Bujur Timur dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hertasning
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paccinongan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samata
- Sebelah Barat berbatasan dengan Paccinongan

B. Hasil Penelitian

1. Analisa Univariat

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dilihat berdasarkan distribusi responden menurut usia, pendidikan, pekerjaan, pola makan dan aktifitas fisik. Dalam penelitian ini karakteristik responden menurut usia digolongkan dalam usia 60-65 tahun

sebanyak 7 orang (46.7%), usia 66-70 tahun sebanyak 5 orang (33.3%) dan tergolong dalam usia 71-75 sebanyak 3 orang (20%) dan karakteristik responden berdasarkan pendidikan adalah SMA sebanyak 2 orang (13.3%), SMP sebanyak 4 orang (26.7%), SD sebanyak 5 orang (33.3%) dan tidak tamat SD sebanyak 4 orang (26.7). Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah wiraswasta sebanyak 2 orang (13.3%) dan lansia dengan pekerjaan IRT sebanyak 13 orang (86.7%). Dan distribusi frekuensi responden berdasarkan pola makan adalah 3 kali sehari sebanyak 13 orang (87%) dan > 3 kali sehari adalah 2 orang (13%). Sedangkan frekuensi responden aktifitas fisik adalah ringan sebanyak 9 orang (60%) dan berat sebanyak 6 orang (40%).

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan, Pola Makan dan Aktifitas Fisik

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Pendidikan,
Pekerjaan, Pola Makan dan Aktifitas Fisik
di Kelurahan Romang Polong Kab. Gowa
Tahun 2014

Karakteristik	<i>f</i>	%	Total
usia			
60-65 Tahun	7	46.7	7
66-70 Tahun	5	33.3	5
71-75 Tahun	3	20.0	3
Total	15	100	15
Pendidikan			
SMA	2	13.3	2
SMP	4	26.7	4
SD	5	33.3	5
Tidak Tamat SD	4	26.7	4
Total	15	100	15
Pekerjaan			
Wiraswasta	2	13.3	2
IRT	13	86.7	13
Total	15	100	15
Pola Makan			
3 kali sehari	13	86.7	13
> 3 kali sehari	2	13.3	2
Total	15	100	15
Aktifitas Fisik			
Ringan	9	60	9
Berat	6	40	6
Total	15	100	15

Sumber: Data Primer 2014

2) Distribusi Frekuensi Tekanan Darah Pre Meditasi Dzikir

Distribusi responden berdasarkan frekuensi tekanan darah pre meditasi dzikir adalah hipertensi ringan sebanyak 8 orang (53.3%) dan hipertensi sedang sebanyak 7 orang (46.7%). Dari hasil pengelolaan data dapat dilihat di tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tekanan Darah Pre Meditasi Dzikir di Kelurahan Romang Polong Kab. Gowa Tahun 2014

Tekanan Darah	<i>f</i>	%	Total
Hipertensi ringan	8	53.3	8
Hipertensi Sedang	7	46.7	7
Total	15	100	15

Sumber: Data Primer 2014

3) Distribusi Frekuensi Tekanan Darah Post Meditasi Dzikir

Distribusi responden berdasarkan frekuensi tekanan darah post meditasi dzikir adalah yang mengalami hipertensi ringan sebanyak 13 orang (87%) dan yang mengalami hipertensi sedang sebanyak 2 orang (13%).

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tekanan Darah Post Meditasi Dzikir di Kelurahan Romang Polong Kab. Gowa Tahun 2014

Tekanan darah	<i>f</i>	%	Total
Hipertensi Ringan	13	87	13
Hipertensi Sedang	2	13	2
Total	15	100	15

Sumber: Data Primer 2014

2. Analisa Bivariat

a. Pengaruh Pemberian Meditasi Dzikir Terhadap Perubahan Tekanan Darah

Setelah dianalisa dengan menggunakan uji *T Test Sample Paired*, untuk melihat efektifitas dari pemberian meditasi dzikir pada responden menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap perubahan tekanan darah dengan tingkat signifikansi $p: 0,008$. Karena nilai $p: < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa adanya efek dari pemberian meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah. Perubahan tekanan darah menurun sebanyak 10 orang (66.7%), tekanan darah tetap sebanyak 2 orang (13.3%) dan tekanan darah yang meningkat sebanyak 3 orang (20%). Hasil pengelolaan data dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi pengaruh meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa Tahun 2014


Perubahan Tekanan Darah	<i>f</i>	%	Total	<i>P</i>
Menurun	10	66.7	10	
Tetap	2	13.3	2	0.008
Meningkat	3	20.0	3	
Total	15	100	15	

Sumber: Data Primer 2014

b. Grafik Perubahan Tekanan Darah Sistol Pre-Post Meditasi Dzikir

Berdasarkan grafik dibawah ini menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah sistol sebelum diberikan perlakuan adalah 156 mmHg. Setelah diberikan perlakuan H1-H3 terjadi penurunan rata-rata tekanan darah sistol tetapi pada H4 perlakuan terjadi peningkatan tekanan darah dengan rata-rata 155 mmHg kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan pola makan yang tidak teratur dan aktivitas fisik ringan. H5 perlakuan tekanan darah rata-rata responden menurun menjadi 151 mmHg.

Grafik 4.1
Perubahan Tekanan Darah Sistol Pre-Post
Meditasi Dzikir Di Kelurahan Romang Polong
Kab. Gowa Tahun 2014




c. Grafik Perubahan Tekanan Darah Diastol Pre-Post Meditasi Dzikir

Berdasarkan grafik dibawah ini menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah diastol sebelum diberikan perlakuan adalah 92 mmHg. Setelah diberikan perlakuan H1-H3 terjadi penurunan rata-rata tekanan darah diastole adalah 92 mmHg tetapi pada H4 perlakuan terjadi peningkatan tekanan darah dengan rata-

rata 93 mmHg kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan pola makan yang tidak teratur dan aktivitas fisik ringan. H5 perlakuan tekanan darah rata-rata responden menurun menjadi 91 mmHg.

Grafik 4.2
Perubahan Tekanan Darah Diastol Pre-Post
Meditasi Dzikir Di Kelurahan Romang Polong
Kab. Gowa Tahun 2014



C. Pembahasan

Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia yang menderita hipertensi. Dengan nilai signifikansi 0,008. Karena nilai $p < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dari pemberian meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah. Dilihat secara deskriptif pun terdapat perubahan tekanan darah dari hari pertama post perlakuan sampai pada hari ke lima post perlakuan, di temukan bahwa ada pengaruh dari pemberian meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah. Hal ini digambarkan pada perubahan yang terjadi pada tekanan darah hari pertama post perlakuan dengan hari kelima post perlakuan. Dimana pada hari pertama post perlakuan responden dengan hipertensi ringan sebanyak 8 orang (53.3%),

responden dengan hipertensi sedang sebanyak 7 orang (46.7%) dan pada hari ke lima post perlakuan responden dengan hipertensi ringan naik sebanyak 13 orang (87%) sedangkan responden dengan hipertensi sedang menurun sebanyak 2 orang (13%).

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Fuad pada tahun 2012, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penurunan tekanan darah dan gejala hipertensi yang ditimbulkan oleh pemberian meditasi dzikir. Dalam penelitian menggunakan *randomized with control group pretest posttest* terdapat 2 kelompok yaitu perlakuan dan kontrol. Jumlah responden sebanyak 30 orang lansia yang menderita hipertensi tanpa komplikasi (seperti diabetes militus, dll) selama 5 hari berturut-turut. Dalam penelitian ini penentuan tekanan darah pre perlakuan hanya diambil satu kali yaitu pada hari pertama sebelum perlakuan, pengukurannya yaitu pada pagi hari untuk mengetahui tekanan darah pre perlakuan. Selama 5 hari lansia kelompok perlakuan mendapat meditasi dzikir selama 20-30 menit dan diberikan sekali sehari pada jam 08:00 pagi. Kemudian tekanan darah lansia diukur setelah meditasi dzikir. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terbukti secara signifikan pemberian meditasi dzikir terhadap penurunan tekanan darah. Dan penurunan yang paling bermakna terjadi pada hari ke-4 dan hari ke-5 perlakuan (Fuad, 2012).

Terjadi perubahan tekanan darah secara signifikan karena kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor disamping pemberian meditasi dzikir itu sendiri, diantaranya kondisi tempat tinggal lansia yang berada di satu unit pelayanan

kesehatan, yang memungkinkan lansia dapat berobat dan mendapatkan pelayanan yang sama di unit pelayanan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2012) tentang pengaruh terapi meditasi dengan kombinasi dzikir terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Dari 30 lansia yang menjadi responden, terbukti bahwa ada penurunan tekanan darah selama dilakukan lima hari perlakuan. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmanto (2012) tentang pengaruh pemberian teknik meditasi terhadap penurunan tekanan darah baik tekanan darah sistolik dan diastolik. Desain yang digunakan adalah *Pretest-posttest control group*. Terbukti bahwa ada perbedaan tekanan darah antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, dimana pada kelompok eksperimen terjadi penurunan tekanan darah sedangkan pada kelompok kontrol tekanan darahnya senantiasa meningkat.

Pengosongan sementara pikiran terhadap masalah psikososial memungkinkan terjadinya penurunan rangsang terhadap stresor. Penurunan rangsang terhadap stresor kemudian direspon oleh hipotalamus dengan menurunkan pengaturan sekresi hormone *kortison*, *epinefrin* dan *norepinefrin* dalam pembuluh darah. Penurunan sekresi hormon-hormon tersebut mengakibatkan penurunan aktivitas *simpatis* sehingga terjadi efek vasodilatasi pembuluh darah diseluruh tubuh. Efek vasodilatasi ini menurunkan tahanan perifer sehingga terjadilah penurunan tekanan darah dan nadi (Guyton&Hall, 2006).

Relaksasi dalam tubuh ini menimbulkan dua hal juga yaitu peningkatan kesadaran dan kepekaan terhadap penginderaan diri dan respon hipotalamus mensekresi hormon analgesik tubuh yaitu *endorphin* dan *melatonin*. Peningkatan kesadaran dan kepekaan terhadap penginderaan diri memungkinkan seseorang berada pada gelombang *alpha* dalam aktivitas otaknya dan hal ini membantu penurunan rangsang terhadap stresor yang efeknya nanti akan menurunkan tekanan darah dan nadi (Afandi, 2006).

Lauralee (2001) dalam Rahmadani (2011) menyatakan bahwa faktor penyebab hipertensi masih belum diketahui dengan pasti namun beberapa kondisi dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi pada seseorang. Jenis kelamin, genetik, usia, lingkungan, sistem *renin angiotensin*, sistem saraf otonom dan faktor lainnya merupakan beberapa contoh kondisi yang mengakibatkan seseorang mengalami hipertensi. Merokok, konsumsi garam berlebih, alkohol, obesitas, stres, medikasi dan kurang berolahraga/aktivitas fisik merupakan faktor yang juga berpengaruh pada kondisi hipertensi seseorang.

Aktivitas fisik, dapat meningkatkan aliran darah yang bersifat bergelombang yang mendorong produksi nitrit oksida (NO) serta merangsang pembentukan dan pelepasan endothelial derive relaxing factor (EDRF), yang merileksi dan melebarkan pembuluh darah. NO berperan sebagai mediator dalam terjadinya relaksasi otot polos pada pembuluh darah. Aliran darah koroner dalam keadaan istirahat sekitar 200 ml per menit (4 persen dari total curah jantung). Penelitian dilaboratorium menunjukkan bahwa peningkatan aliran darah 4 ml per

menit sudah mampu menghasilkan nitrit oksida untuk merangsang perbaikan fungsi endotel atau lapisan dinding pembuluh darah.

Endothelium mempunyai peran kunci pada vasodilatasi. Berbagai stimulus yang berbeda pada sel endotel dapat menyebabkan endotel memproduksi EDRF, salah satunya adalah NO. Dari pengamatan tentang peranan fisiologis NO adalah ketika beberapa derivat dari arginin yang bersifat menghambat enzim NOS (nitrit oxide sintetase) diberikan pada binatang coba, maka segera terjadi peningkatan tekanan darah. Hal ini membuktikan bahwa pelapasan NO dapat menjaga tekanan darah pada keadaan normal.

Konsentrasi NO yang tinggi mungkin dapat menolong untuk mempertahankan suplai darah yang cukup dan secara simultan melindungi pembuluh darah dari thrombosis. Nitrit Oksida (NO) baik yang dihasilkan oleh endotel pembuluh darah, makrofag, maupun NO donor yang lain akan menstimulasi *soluble guanylate cyclase* (SGC) yang menyebabkan peningkatan sintesa siklik GMP dari guanosin triphosphat (GTP). Peningkatan siklik GMP ini akan menyebabkan otot polos pembuluh darah tersebut relaksasi. Hasil dari relaksasi ini akan menyebabkan diameter pembuluh darah bertambah sehingga tahanan pembuluh darah menjadi berkurang diiringi dengan penurunan aliran darah yang menyebabkan tekanan darah turun (Ganon 1995 dalam Dede, 2008).

Pola makanan yang kurang baik seperti pengonsumsi sumber natrium yang lebih, khususnya garam dapur yang berlebihan menyebabkan natrium di dalam cairan meningkat. Peningkatan volume cairan tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah naik, sehingga berdampak pada timbulnya hipertensi (Nuryudania, 2010)

D. Keterbatasan Penelitian

Selama penelitian ini dilakukan peneliti mengalami keterbatasan dan hambatan terkait pelaksanaan intervensi pemberian meditasi dzikir. Keterbatasan yang di hadapi peneliti adalah peneliti belum dapat secara maksimal mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah antara lain : genetik, umur, jenis kelamin, pola hidup, obesitas, dan stress. Selain itu juga peneliti mempunyai keterbatasan dalam menemukan jumlah sampel yang lebih banyak, sehingga mungkin akan mempunyai nilai yang lebih bermakna ketika diuji secara statistik.

E. Rekomendasi

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti manfaat meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah, peneliti merekomendasikan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dan intervensi yang harus lebih lama dan juga harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa pada bulan Desember 2014 disimpulkan bahwa :

1. Terdapat nilai yang signifikan dari pemberian meditasi dzikir terhadap perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa.
2. Terjadi perubahan tekanan darah pada hari ke lima setelah pemberian meditasi dzikir, yakni lebih berkurangnya persentasi hipertensi sedang menjadi hipertensi ringan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dalam melaksanakan penelitian ini, sebaiknya peneliti mengambil sampel yang lebih banyak dan mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Demi meningkatkan keilmuan dan pendidikan keperawatan, diharapkan perlu diperhatikan pengembangan informasi dan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abatasa. 2010. *Manfaat Dzikir Setelah Shalat Wajib*. Jogjakarta: Fash Book.
- Afandi. 2006. *Efektifitas Pelatihan Mediasi Mindfulness Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Survivor Gempa Bumi di Bantul*. <http://isjd.lipi.go.id/admin/jurnal/51082033.pdf>. Diakses tanggal 02 September 2014.
- AHA. 2010. <http://www.binawaluya.com/article/hipertensi>. Diakses tanggal 04 September 2014.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2009. *Departemen Agama RI*. Bandung: Diponegoro
- Anderson. 2011. *Panduan Klinik Ilmu Penyakit Dalam Edisi 3*. Jakarta: EGC.
- Ansyarian. 2011. *Rahasia Dzikir*. <http://www.erfan.ir/53475.html>. Diakses tanggal 5 November 2014.
- Aru, dkk. 2009. *Menganalisis Proses Penuaan Pada Lansia*. http://jurnal.pdi.lipi.go.id/admin/jurnal/21103136_2085-8930.pdf. Diakses tanggal 09 September 2014.
- Budi Praytno. 2011. *Meditasi Penyembuhan Dari Dalam Sembuhkan Ragam Penyakit Mental Dan Fisik*. Jogjakarta: Fash Book.
- Dede. 2008. *Kendalikan Tekanan Darah dengan Bergerak*. <http://www.surabaya.post.2008.com>. Diakses tanggal 20 Oktober 2014.
- Dinas kesehatan kota makassar. <http://dinkeskotamakassar.net/download/884makassar-10>. Diakses tanggal 20 Oktober 2014.
- Departemen Kesehatan. 2006. <http://departemenkesehatan.com/24-09-2-1>. Diakses tanggal 20 Oktober 2014.
- Edi, Novanto. 2008. *Mediated & Growrich: Sehat, Kaya, dan Bahagia Duniawi-Spiritual*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Ekawati, Sulistyowati. 2009. *Menganalisis Penyebab Hipertensi Dan Gejala Hipertensi Pada Lansia*. <http://nursinglibrary.org/vhl/handle/10755/156129>. Diakses tanggal 04 September 2014.

- El Manna M. 2011. *Basmi Keluhan-Keluhan Kesehatan Harian Dengan Obat-Obatan Alami*. Yogyakarta : Flash Books.
- Fuad, Moch Nuril. 2012. *Pengaruh Meditasi Garuda Terhadap Penurunan Tekanan Darah Dan gejala Hipertensi Pada Pasien Hipertensi Usia Pertengahan di Desa Bulung Lor di Kecamatan Bulung Kabupaten Jember*. <http://digilib.unej.ac.id/> . Diakses tanggal 02 Oktober 2014
- Furi, Syaikh Syafiyur Al-Mubarak. 2006. *TAFSIR Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir
- Gunawan, Lani. 2008. *Hubungan Stress Berkepanjangan Dapat Mengakibatkan Hipertensi*. <http://repository.usu.ac.id/293001/24/014>. Diakses tanggal 21 September 2014.
- Guyton, Hall. 2007. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta : EGC
- Hadibroto *et al*, 2006. *Hipertensi: Informasi Lengkap Untuk Penderita dan Keluarga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamka. 1988. *Tafsil Alazhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas
- Hidayat, A.Aziz Alimul. 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*. Jakarta : Salemba Medika
- Holroyd. 2005. *Berbagai Manfaat Dari Meditasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keliat, B.A. 2010. *Buku Saku Standart Asuhan Keperawatan Teknik Manajemen Stress*. Program Magister Keperawatan: FIK UI.
- Khasanah Nur. 2012. *Waspada Beragam Penyakit Degeneratif Akibat Pola Makan*. Jakarta : Laksana
- Kushartanti, W. 2008. *Pengaruh Terapi Meditasi Bagi Penderita Hipertensi*. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2120797108.pdf>. Diakses tanggal 02 september 2014.
- Kusmanto. 2012. *Menganalisis Pengaruh Pemberian Tehnik Meditasi Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di RSUD Jombang*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21596/4/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 21 Oktober 2014.

- Lailatul, dkk. 2007. *Pengaruh Pemberian Jus Buah Belimbing & Mentimun Terhadap Penurunan Tekanan Darah Sistolik & Diastolik Penderita Hipertensi*. Bagian Gizi fakultas kesehatan masyarakat dan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.
- Mansyur, Yusuf. 2009. *Keajaiban Dalam Dzikir*. Jakarta: PT Utama Book.
- Nugroho, Wahjudi. 2008. *Keperawatan Gerontik*. Jakarta : EGC
- Nursalam. 2008. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Pedoman skripsi, tesis dan instrumen instrumen penelitian keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Nurwahyuni, Eka. 2011. *Efek Refleksi Kaki Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Di Panti Sosial Tersna Werdah*. Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
- Prabowo, H. 2005. *Beberapa Manfaat Meditasi dan Pengalaman Altered Stated of Consciousness*. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2120797108.pdf>. Diakses 16 September 2014.
- Potter & Perry, 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses dan Praktik*, vol.1 edisi 4. Jakarta: EGC.
- Price, Sylvia Anderson. 2006. *Patofisiologi; Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. Jakarta: EGC.
- Renatasari. 2009. *Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Penderita Hipertensi Dengan Diabetes Mellitus di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang*. <http://etd.eprints.ums.ac.id/5230/1/K100050242.pdf>. Diakses tanggal 9 oktober 2014.
- Roadhah, Sitti. 2012. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Risiko dan Pencegahannya*. Makassar: Alauddin University Press.
- Riset Kesehatan Daerah. 2013. *Profil Kesehatan Sulsel*. <http://datinkessulsel.com>. Diakses tanggal 19 oktober 2014.
- Santosa, Iducuq. 2011. *Hipertensi pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Kabupaten Gowa*. UIN Alauddin Makassar.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-n Qur'an / M. Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati

Snyder & Lindquist, 2007 (Eds). *Complementary Alternative Therapy in Nursing*, 4th Edition. New York: Springer Publishing Company, Inc.

Stanley, M Beare. 2006. *Buku Ajar Gerontik Edisi 2*. Jakarta: EGC.

Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syarif. 2012. *Panduan Klinik Pada Penyakit Hipertensi*. Jakarta: Medika Salemba.

Tamher. 2009. *Ilmu Keperawatan Gerontik*. Jakarta: EGC

Tuty, Kuswardhani RA. 2006. *Menganalisis Hipertensi Akibat Stress Pada Lansia*. <http://repository.eprints.ums.ac.id/5230/1/K100050242.pdf>. Diakses tanggal 30 September 2014.

Wajan, Juni Udjianti. 2010. *Keperawatan kardiovaskuler*. Jakarta : Salemba Medika.

Wartoyo. 2008. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Salemba Medika

Watson, R. 2006. *Anatomi dan Fisiologi Untuk Perawat*. Jakarta: EGC.

WHO. 2012. <http://internasional.kompas.com/read/2013/04/05/04100945/Tahun.2025.30.Persen.Penduduk.Dunia.Hipertensi>. Diakses tanggal 04 September 2014.

Wuryaningsih, et al, 2011. *Keperawatan Jiwa 2, Panduan Praktikum & Logbook Mahasiswa*. Tidak dipublikasikan. Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember.

Lampiran 1
(Lembar Pernyataan
Persetujuan Responden)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN

Inisial :

Usia :

Jenis Kelamin :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia dan tidak keberatan menjadi responden di dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari islamiyah dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Judul *“Pengaruh Meditasi Dzikir Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa”*. Pernyataan ini saya buat dengan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Desember 2014

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(_____)
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Lampiran 2
(Informed Consent)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2

INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Inisial :

Umur :

Alamat:

Setelah mendapatkan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian bahwa segala informasi tentang penelitian ini akan dirahasiakan dan hanya untuk penelitian, maka saya (bersedia/tidak bersedia)* untuk menjadi responden penelitian berjudul *Pengaruh Meditasi Dzikir Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa*". Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari saya akibat ini, maka saya akan bertanggung jawab dan tidak akan menuntut dikemudian hari

Makassar, Desember 2014

Responden

(_____)

Catatan:

*Coret yang tidak perlu



Lampiran 3

(Kuesioner)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Lampiran 3

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH MEDITASI DZIKIR TERHADAP PERUBAHAN
TEKANAN DARAH PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI
DI KELURAHAN ROMANG POLONG KABUPATEN GOWA
2014

A. Data Responden

1. Inisial :

2. Jenis Kelamin :

a. Laki-laki

b. Perempuan

3. Umur : Tahun

4. Agama :

5. Pendidikan :

a. Tidak sekolah/tidak tamat SD

b. SD

c. SLTP/SMP

d. SLTA/SMA

e. S1

f. Lainnya....

6. Pekerjaan :

7. Berapa kali anda mengkonsumsi makanan dalam sehari?

a. < 3 kali sehari

b. 3 kali sehari

c. > 3 kali sehari

8. Apakah anda sering makan makanan yang asing?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah yang Anda lakukan/kebiasaan sehari-hari?

a. Menyapu, memasak (aktifitas ringan)

b. Menyetrika, kerja kantor + aktifitas ringan (aktifitas sedang)

c. Mencuci, berdagang, menyangkul, berkebun + aktifitas sedang
(aktifitas berat)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Lampiran 4
(Lembar Observasi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4

LEMBAR OBSERVASI

PENGARUH MEDITASI DZIKIR TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH
PADA LANSIA

DENGAN HIPERTENSI DI KELURAHAN ROMANG POLONG KABUPATEN
GOWA

Nama Peneliti :

Hari/Tanggal Penelitian:

Tempat :

No.	Nama Responden (Inisial)	TD Pre	Tekanan Darah Post Perlakuan (mmHg)				
			H1	H2	H3	H4	H5
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Lampiran 5
(Standar Operasional
Prosedur (SOP))

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R




Standar Operasional Prosedur (SOP)

Meditasi Dzikir

1.	PENGERTIAN	Pemusata fikiran kepada Allah agar dapat lebih dekat dengan sang pencipta dan menyadari bahwa segala penyakit datangnya dari Allah dan obatnya pun dari Allah SWT.
2.	TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui perbedaan antara tekanan darah sebelum dan setelah meditasi dzikir2. Mengetahui gambaran perubahan antara tekanan darah sebelum dan setelah meditasi dzikir3. Mengetahui berapa besar pengaruh meditasi dzikir pada penderita hipertensi
3.	INDIKASI	Pada lansia dengan hipertensi
4.	PERSIAPAN KLIEN	<ol style="list-style-type: none">1. Berikan salam, perkenalkan diri anda, dan identifikasi klien dengan memeriksa identitas klien dengan cermat.2. Atur posisi klien sehingga merasakan aman dan nyaman.3. Uku tekanan darah klien.
5.	PERSIAPAN ALAT	<ol style="list-style-type: none">1. Tensimeter2. Stetoskop
CARA KERJA		
	FASE ORIENTASI	<ol style="list-style-type: none">1. Beritahu klien bahwa tindakan akan segera dimulai2. Cek alat-alat yang akan digunakan3. Melakukan kontrak waktu untuk tindakan yang akandilakukan.

<p>FASE KERJA</p>	<p style="text-align: center;">Fase Pembinaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina hubungan saling percaya kepada klien 2. Mempersilahkan klien untuk duduk bersila di tempat bersih dan nyaman 3. Bimbing klien untuk melakukan peregangan selama 2-3 menit 4. Jika telah siap, bimbing klien dengan aba-aba untuk melakukan persiapan dzikir 5. Anjurkan klien untuk memejamkan mata, agar klien dapat berkonsentrasi melakukan dzikir dan dapat memusatkan pikiran pada bacaan dzikir. <p>Dalam Hadist riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa bacaan-bacaan dzikir adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • سَفَعْفَرُ اللَّهِ الْعَظِيمِ (3x) <i>Astaghfirullaah Al a'dzim(3x)</i> • سُبْحَانَ اللَّهِ (33x) <i>Subhanallah (33x)</i> • الْحَمْدُ لِلَّهِ (33x) <i>Alhamdulillah (33x)</i> • اللَّهُ أَكْبَرُ (33x) <i>Allahu Akbar (33x)</i> • لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1x) <i>La ilaaha illallaahu wahdaahu laa syariikalah, laahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kullisyain qadiir (1x)</i> <p style="text-align: center;">Fase Pendinginan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan klien bernafas melalui hidung dan menghitung dalam hati sampai 5 dan anjurkan kembali klien untuk menghembuskan nafas melalui mulut. Pada tahap ini klien diharapkan dapat mengatur irama pernafasan klien agar klien tampak rileks. 2. Fase ini dapat dilakukan selama 10-15 menit agar klien dapat betul-betul merasa nyaman dan rileks.
-------------------	--

	FASE TERMINASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji respon klien setelah mengungkapkan perasaannya 2. Ukur tekanan darah klien 3. Buat kontrak selanjutnya 4. Akhiri kegiatan dengan baik dan beri reinforcement positif.
	HASIL	Dokumentasikan nama tindakan, tanggal, jam tindakan, hasil yang diperoleh, respon klien selama tindakan nama dan paraf perawat.
	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	Kenyamanan dan kekuatan kondisi fisik klien harus selalu dikaji untuk mengetahui keadaan klien selama prosedur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



Lampiran 6
(Master Tabel)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 6

Master Tabel

No	Inisial	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	TD pre Sistol	TD pre Diastol	TD post Sistol	TD post Diastol	Pola Makan	Aktifitas Fisik
1	p	1	4	2	150	95	150	80	2	3
2	N	2	3	3	160	110	155	100	2	1
3	M	2	4	3	160	95	150	80	2	1
4	S	3	4	3	175	100	165	100	2	1
5	Sn	3	5	3	160	95	150	80	2	3
6	I	1	5	3	150	90	140	95	2	3
7	F	3	4	3	150	90	150	90	2	3
8	L	2	3	3	160	100	155	90	2	1
9	C	1	5	3	170	100	160	90	3	1
10	J	1	2	2	150	90	155	90	3	1
11	Sy	1	3	3	155	90	140	95	2	1
12	Nn	2	3	3	160	110	150	100	2	1
13	P	1	2	3	145	90	150	85	2	1
14	T	2	4	3	155	90	140	90	2	3
15	Mi	1	5	3	150	90	155	85	2	3

Keterangan:

Umur : 1 = 60 – 65 Tahun

2 = 66 – 70 Tahun

3 = 71 – 75 Tahun

Pendidikan : 1 = S1 3 = SMP 5 = Tidak Tamat SD

 2 = SMA 4 = SD

Pekerjaan : 1 = PNS 2 = Wiraswasta 3 = IRT

Pola Makan : 1 = < 3 kali sehari


 2 = 3 kali sehari

 3 = > 3 kali sehari

Aktifitas Fisik : 1 = Ringan

 2 = Sedang

 3 = Berat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Lampiran 7

(Tabel Perubahan Tekanan
Darah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 7

LEMBAR OBSERVASI

PENGARUH MEDITASI DZIKIR TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA
DENGAN HIPERTENSI DI KELURAHAN ROMANG POLONG KABUPATEN GOWA

Nama Peneliti : Islamiyah

Hari/Tanggal Penelitian:

Tempat : Kelurahan Romang Polong

No.	Nama Responden (Inisial)	TD Pre	Tekanan Darah Post Perlakuan (mmHg)				
			H1	H2	H3	H4	H5
1.	Ny "S"	175/100	175/100	170/100	172/100	165/100	165/100
2.	Ny "D.M"	150/90	150/90	145/90	145/90	145/95	140/95

3.	Ny”N”	160/95	160/90	155/90	155/90	150/80	150/80
4.	Ny”P”	150/90	150/90	150/100	160/100	165/100	165/100
5.	Ny”Sn”	160/95	160/95	155/90	150/80	150/80	150/80
6.	Ny”I”	150/90	150/90	140/90	140/90	140/90	140/90
7.	Ny”F”	150/90	150/90	150/90	150/90	150/90	150/90
8.	Ny”L”	160/100	160/100	160/100	155/100	155/100	155/100
9.	Ny”C”	170/100	170/100	170/100	160/90	160/90	160/90
10.	Ny”J”	150/90	150/90	150/90	155/90	155/90	155/90

11.	Ny "Sy"	155/90	155/90	150/90	140/90	140/95	140/95
12.	Ny"Nm"	160/110	160/100	161/100	156/100	150/100	150/100
13.	Ny"p"	145/90	145/90	145/90	150/90	150/90	150/89
14.	Ny"T"	155/90	150/90	150/90	140/90	140/90	140/90
15.	Ny"M"	150/90	150/90	150/90	150/90	155/85	155/85

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



Lampiran 8

(Hasil Data SPSS

Penelitian)

Lampiran 8

umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60-65 tahun	7	46.7	46.7	46.7
	66-70 tahun	5	33.3	33.3	80.0
	71-75 tahun	3	20.0	20.0	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	2	13.3	13.3	13.3
	SMP	4	26.7	26.7	40.0
	SD	5	33.3	33.3	73.3
	TidakTamatSekolah	4	26.7	26.7	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	WIRASWASTA	2	13.3	13.3	13.3
	IRT	13	86.7	86.7	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	TDPreSistol - TDPoSistol	5.66667	7.03732	1.81703	1.76953	9.56380	3.119	14	.008

Tests of Normality


	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TDPreSistol	.208	15	.079	.894	15	.078
TDPostSistol	.244	15	.016	.900	15	.097

a. Lilliefors Significance Correction

Test Statistics ^b	
	TDPostDiastol - TDPreDiastol
Z	-2.520 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.012

a. Based on positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test



Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TDPreDiastol	.256	15	.009	.783	15	.002
TDPostDiastol	.185	15	.180	.879	15	.046

a. Lilliefors Significance Correction

PerubahanTD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menurun	10	66.7	66.7	66.7
	Tetap	2	13.3	13.3	80.0
	Meningkat	3	20.0	20.0	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

Pola Makan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3 kali sehari	13	86.7	86.7	86.7
> 3 kali sehari	2	13.3	13.3	100.0
Total	15	100.0	100.0	

aktifitasfisik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid aktifitas ringan	9	60.0	60.0	60.0
aktifitas berat	6	40.0	40.0	100.0
Total	15	100.0	100.0	



Lampiran 9
(Surat Izin Meneliti)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Lampiran 10
(Riwayat Hidup)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Islamiyah 21 juni 1992, Lahir dari pasang suami istri H.Ambo Dg siala dan Salmah . Anak pertama dari 3 bersaudara. Kakak dari Iqbal dan Zaenal. Menempuh pendidikan sejak Tk di Taman kanak-kanak Mawar Romang Polong pada tahun 1997, dan melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar di SDN. Romang Polong pada tahun 1998 selesai pendidikan Sekolah Dasar, di lanjutkan di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Sungguminasa pada tahun 2004. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Makassar. Setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMA Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Jurusan Keperawatan pada tahun 2010 dan Alhamdulillah selama 4 tahun menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar pada Jurusan Keperawatan akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidika Strata 1 dengan Gelar Sarjana Keperawatan. Berkat Doa dan kerja keras penulis dapat menyelesaikan study S1 dengan judul skripsi “Pengaruh Meditasi Dzikir terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa”.