

DEKOLAGENASI LIMBAH TULANG PAHA AYAM BROILER (*Gallus domesticus*) OLEH NATRIUM HIDROKSIDA (NaOH) UNTUK PENENTUAN KADAR KALSIMUM (Ca) DAN FOSFAT (PO₄)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Sains Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SITTI MUSDALIFAH
NIM: 60500111065

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Musdalifah
NIM : 60500111065
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta/ 12 Maret 1993
Jurusan/Prodi : Kimia
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi/ S1
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Dekolagenasi Limbah Tulang Paha Ayam Broiler (*Gallus domesticus*) oleh Natrium Hidroksida (NaOH) untuk Penentuan Kadar Kalsium (Ca) dan Fosfat (PO₄)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R A

Samata-Gowa, Februari 2016

Penyusun


Sitti Musdalifah
NIM: 60500111065

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Dekolagenasi Limbah Tulang Paha Ayam Broiler (*Gallus domesticus*) oleh Natrium Hidroksida (NaOH) untuk Penentuan Kadar Kalsium (Ca) dan Fosfat (PO₄)**”, yang disusun oleh Sitti Musdalifah, NIM: 60500111065, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 bertepatan tanggal 9 Jumadil Ula 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 18 Februari 2016 M
9 Jumadil Ula 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	()
Sekretaris	: Sjamsiah, S.Si.,M.Si.,Ph.D	()
Munaqisy I	: Aisyah, S.Si.,M.Si	()
Munaqisy II	: Dra. St. Chadijah, M.Si	()
Munaqisy III	: Hasyim Haddade, S.Ag.,M.Ag	()
Pembimbing I	: Syamsidar HS, S.T.,M.Si	()
Pembimbing II	: Suriani, S.Si.,M.Si	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi


UIN Alauddin Makassar, 



Prof. Dr. M. Arifuddin, M.Ag

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta ridho-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Dekolagenasi Limbah Tulang Paha Ayam Broiler (*Gallus domesticus*) oleh Natrium Hidroksida (NaOH) untuk Penentuan Kadar Kalsium (Ca) dan Fosfat (PO₄)**”. Shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sains pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari arahan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suardi dan Ibunda Hasniati yang selalu memberikan motivasi, bimbingan serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si.,M.Si.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

4. Ibu Syamsidar, S.Si.,M.Si dan Ibu Suriani, S.Si.,M.Si selaku dosen pembimbing atas kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Segenap kakak laboran Ahmad Yani, S.Si, Awaluddin IP, S.Si.,M.Si, Fitria Azis, S.Si.,S.Pd, Andi Nurahma, S.Si, Ismayanti, S.Si dan Nuraini, S.Si.
7. Kakakku tercinta Wahyuni, Adikku tersayang Nur Adilah dan segenap keluarga yang senantiasa mendukung, menyemangati dan menghibur.
8. Rekan penelitianku Rizky Cynthia Shandra dan teman-teman khususnya Kimia angkatan 2011.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan-kesalahan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amiin Ya Robbal ‘Alamin....

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, Februari 2016

SITTI MUSDALIFAH
NIM. 60500111065

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	(1-6)
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	(7-28)
A. Hewan Ternak dalam Perspektif Al-Quran	7
B. Ayam Broiler	10
1. Pengertian dan Klasifikasi.....	10
2. Limbah Tulang Ayam	12
C. Kalsium (Ca).....	14
1. Definisi Kalsium (Ca)	14
2. Fungsi Kalsium	15
3. Sumber Kalsium.....	16
4. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Kalsium.....	17
D. Fosfor (P).....	18
1. Definisi Fosfor (P).....	18
2. Fungsi Fosfor.....	19
3. Sumber Fosfor	20

4. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Fosfor	20
E. Kolagen	21
F. Dekolagenasi	23
G. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	24
H. Spektrofotometer UV-Vis	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	(29-33)
A. Waktu dan Tempat	29
B. Alat dan Bahan	29
1. Alat	29
2. Bahan	29
C. Prosedur Kerja	30
1. Proses Dekolagenasi dan Pembuatan Tepung Tulang	30
2. Destruksi Basah dan Pembuatan Larutan Sampel	31
3. Penentuan Kadar Kalsium (Ca)	31
4. Penentuan Kadar Fosfat (PO ₄)	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	(34-41)
A. Hasil Penelitian	34
1. Tabel dan Grafik Kalsium (Ca)	34
2. Tabel dan Grafik Fosfat (PO ₄)	36
B. Pembahasan	38
1. Proses Dekolagenasi	38
2. Destruksi Basah	40
BAB V PENUTUP	(42-43)
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	(44-47)
LAMPIRAN	(48-76)

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1.Klasifikasi Ayam Broiler	10
2.2.Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Menurut Provinsi	11
2.3.Komposisi Tulang Ayam Kerangka Binatang	13
2.4.Kandungan Kalsium (Ca) dan Fosfor (P) pada Beberapa Bahan.....	17
4.1.Absorbansi Larutan Standar Kalsium (Ca)	34
4.2.Kadar Kalsium (Ca) pada Tulang Paha Ayam Broiler.....	35
4.3.Absorbansi Larutan Standar Fosfat (PO ₄).....	36
4.4.Kadar Fosfat (PO ₄) pada Tulang Paha Ayam Broiler	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1.Tulang Ayam Broiler	13
2.2.Struktur Prolin, Glysine dan Alanin	21
2.3.Reaksi Pemecahan Gelatin.....	23
4.1.Grafik Larutan Standar Kalsium (Ca).....	35
4.2.Grafik Larutan Standar Fosfat (PO ₄).....	37
4.3.Reaksi Pembentukan Kalsium Fosfat	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Penelitian.....	48
2. Proses Dekolagenasi dan Pembuatan Tepung Tulang Ayam Broiler	49
3. Destruksi Basah dan Pembuatan Larutan Sampel.....	50
4. Penentuan Kadar Kalsium (Ca).....	51
5. Penentuan Kadar Fosfat (PO ₄)	52
6. Pembuatan Larutan Induk Kalsium (Ca) 1000 mg/L.....	53
7. Pembuatan Larutan Standar Kalsium (Ca).....	54
8. Penentuan Nilai Slope, Intersep, Persamaan Garis Lurus, Konsentrasi dan Nilai Regresi pada Kalsium (Ca)	56
9. Pembuatan Larutan Induk Fosfat (PO ₄) 1000 mg/L	61
10. Pembuatan Larutan Baku 100 mg/L dan Larutan Baku 10 mg/L	62
11. Pembuatan Larutan Standar Fosfat (PO ₄)	63
12. Penentuan Nilai Slope, Intersep, Persamaan Garis Lurus, Konsentrasi dan Nilai Regresi pada Fosfat (PO ₄).....	65
13. Dokumentasi Penelitian	70

ABSTRAK

Nama : Sitti Musdalifah

NIM : 60500111065

Judul : Dekolagenasi Limbah Tulang Paha Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)
oleh Natrium Hidroksida (NaOH) untuk Penentuan Kadar Kalsium
(Ca) dan Fosfat (PO₄)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar kalsium (Ca), fosfat (PO₄) dan pengaruh perendaman tulang paha ayam oleh NaOH terhadap kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO₄). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekolagenasi pada tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*). Parameter yang diamati yaitu uji kimia meliputi kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO₄). Perlakuan dekolagenasi dilakukan dengan 3 variasi waktu yaitu 48, 72 dan 96 jam untuk masing-masing penentuan kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO₄). Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu perendaman tulang oleh NaOH tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO₄).

Kata Kunci: limbah tulang ayam broiler, dekolagenasi, NaOH, Kalsium, Fosfat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Sitti Musdalifah
NIM : 60500111065
Title : **Decollagenation of the Waste of Broilers (*Gallus domesticus*)
Femur by Sodium Hydroxide (NaOH) to Determine
Calcium (Ca) and Phosphate (PO₄) Level**

This research aims to determine the level of Calcium (Ca) and Phosphate (PO₄), and the influence of broilers femur submersion in NaOH toward Calcium (Ca) and Phosphate (PO₄) levels. The method used in this research is decollagenation of broilers (*Gallus domesticus*) femur. Then, the parameters observed are chemical tests of Calcium (Ca) and Phosphate (PO₄) levels. Decollagenation treatment was carried out in three soaking-time variation such as 42 hours, 72 hours, and 96 hours to respectively determine the Calcium and Phosphate levels. The result shows that soaking-time of femur does not give significant effect to increased levels of Calcium (Ca) and Phosphate (PO₄).

Keywords: broiler femur waste, decollagenation, NaOH, Calcium, Phosphate.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Banyaknya jumlah penduduk ini sangat mempengaruhi peningkatan kebutuhan akan makanan. Kebutuhan makanan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, terutama makanan yang kaya akan gizi. Salah satu makanan yang mengandung gizi yang cukup yaitu daging, baik itu daging sapi, kambing ayam dan lain-lain. Namun saat ini, daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat yaitu daging ayam potong (broiler). Selain dagingnya yang enak, harganya pun relatif murah dan mudah dijumpai. Terlepas dari itu, daging yang dikonsumsi akan menyisakan tulang yang nantinya menjadi limbah. Hal ini tentunya menimbulkan masalah lingkungan akibat sisa tulang yang tidak memiliki nilai ekonomi. Tulang juga sulit terurai sehingga hanya dapat mencemari lingkungan. Untuk itu diperlukan alternatif agar limbah tulang dapat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Limbah tulang ayam berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai tepung tulang yang kaya akan kalsium dan fosfor karena dalam tulang ayam terdapat sekitar 28,0-56,3% zat anorganik termasuk di dalamnya kalsium dan fosfor.¹ Selain zat anorganik juga terdapat zat organik salah satunya yaitu kolagen. Namun keberadaan kolagen kurang efektif dalam pembuatan tepung tulang sebab sulit dicerna oleh enzim yang terdapat dalam usus sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk menghilangkan kolagen.

¹Dyah Tri Retno, "Pembuatan Gelatin dari Tulang Ayam dengan Proses hidrolisa", *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi (SNAST) Periode III* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2012): h. 251.

Cara yang dapat ditempuh dalam penghilangan kolagen yaitu dengan proses deprotenasi atau dekolagenasi.

Proses dekolagenasi dapat dilakukan dengan metode hidrolisis menggunakan asam atau basa. Menurut Yunita Ermawati, “basa yang banyak digunakan yaitu natrium hidroksida (NaOH) sebab selain lebih efektif, bahan ini juga relatif murah dan mudah didapatkan”.² Berdasarkan penelitian tersebut maka dalam penelitian ini digunakan natrium hidroksida (NaOH).

Berdasarkan penelitian Intan Mayasaroh dkk (2012), dalam penelitiannya menggunakan larutan KOH untuk merendam tulang ayam dengan konsentrasi 2% dan 4% serta waktu perendaman yaitu 24 jam dan 48 jam. Kadar kalsium dan fosfor terbanyak diperoleh pada waktu perendaman 48 jam dan konsentrasi 4% dimana kadar kalsium sebesar 24,73% dan kadar fosfor sebesar 9,81%.

Berdasarkan penelitian Wiwin Winarsih dkk (2012), dalam penelitiannya menggunakan larutan NaOH untuk merendam tulang ayam dengan konsentrasi 2% dan 4% serta waktu perendaman yaitu 24 jam dan 48 jam. Kadar kalsium dan fosfor terbanyak diperoleh pada waktu perendaman 48 jam dan konsentrasi 4% dimana kadar kalsium sebesar 25,59% dan kadar fosfor sebesar 12,57%.

Sehubungan dengan hal di atas, ternyata tulang ayam dapat dimanfaatkan dan memiliki banyak fungsi dimana Allah swt. berfirman dalam surah al-Nahl/16/5 yang berbunyi:

وَاللَّائِمَةَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

²Yunita Ermawati dkk, “Pemanfaatan Kitosan dari Limbah Rajungan (*Portunus pelagicus*) sebagai Antimikroba pada Obat Kumur”, *Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009); h. 9.

Terjemahnya:

“Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”.³

Ayat di atas menjelaskan mengenai manfaat yang dapat diperoleh pada binatang ternak dimana dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Dan binatang ternak) yakni unta, sapi dan kambing. Lafal *al-an`aam* dibaca *nashab* karena dinashabkan oleh *fi`il* yang diperkirakan keberadaannya lalu *fi`il* tersebut ditafsirkan atau dijelaskan oleh lafal berikut ini, yaitu: (Dia telah menciptakan-Nya untuk kalian) sebagian dari manusia (padanya ada kehangatan) yaitu bulu dan kulitnya dapat dibuat pakaian dan selimut untuk penghangat tubuh kalian (dan berbagai manfaat) yaitu dari anak-anaknya, air susunya dan dapat dijadikan sebagai kendaraan (dan sebahagiannya kalian makan) *zharaf* didahulukan karena untuk tujuan *fashilah*.⁴

Selain tafsir di atas, terdapat juga tafsir lain yang menyatakan bahwa kalimat *al-an`am khalaqaha lakum/ dan binatang ternak telah Dia ciptakan untuk kamu* dapat dipahami bahwa Allah swt. telah menciptakan binatang ternak, Dia telah menciptakan-Nya memiliki keistimewaan antara lain memiliki bulu yang dapat menghangatkan kamu. Dengan demikian penggalan ayat ini merupakan uraian menyangkut sebagian nikmat Allah kepada manusia, yakni nikmat-Nya melalui binatang ternak yang diciptakan-Nya. Yang dimaksud dengan *al-an`am* adalah unta, sapi, domba dan kambing. Kata *dif`un* adalah nama bagi sesuatu yang

³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007).

⁴Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain* (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010), h. 104.

menghangatkan. Ia adalah pakaian atau kemah yang terbuat dari bulu atau rambut binatang.⁵

Penafsiran ayat di atas menjelaskan bahwa selain bulu dan kulit dari binatang ternak untuk menghangatkan tubuh terdapat pula berbagai manfaat diantaranya yaitu tulang dari hewan ternak dapat dijadikan sebagai tepung yang bermanfaat sebagai sumber mineral diantaranya yaitu kalsium (Ca) dan fosfor (P).

Dari hadis Riwayat Muslim no. 450 dijelaskan pula bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَّ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ
بَعْرَةٍ عَافٍ لِدَوَابِّكُمْ

Artinya:

*“Makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil, akan penuh dengan daging. Sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian”.*⁶

Sehubungan dengan hadis di atas, jelas dikatakan bahwa tulang halal untuk dimakan. Maka dari itu, pemanfaatan tepung tulang dapat dijadikan produk-produk makanan yang kaya akan kalsium dan fosfor.

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan tentang manfaat dan senyawa yang terdapat dalam tulang ayam maka perlu dilakukan penelitian tentang dekolagenasi limbah tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) oleh natrium hidroksida (NaOH) untuk penentuan kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO₄).

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.188.

⁶Ikmal Ikmal Muallim, *Shahih Muslim Jus II Cet. 1* (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1415 H/ 1994 M), h.342-344.

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Berapa kadar kalsium (Ca) yang terdapat dalam limbah tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dengan menggunakan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)?
2. Berapa kadar fosfat (PO_4) yang terdapat dalam limbah tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dengan menggunakan metode Spektrofotometer UV-Vis?
3. Bagaimana pengaruh variasi waktu perendaman tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) oleh natrium hidroksida (NaOH) terhadap kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO_4)?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menentukan kadar kalsium (Ca) yang terdapat dalam limbah tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dengan menggunakan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).
2. Menentukan kadar fosfat (PO_4) yang terdapat dalam limbah tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dengan menggunakan metode Spektrofotometer UV-Vis.
3. Mengetahui pengaruh variasi waktu perendaman tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) oleh natrium hidroksida (NaOH) terhadap kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO_4).

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai:

1. Kadar kalsium (Ca) yang terdapat dalam limbah tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dengan menggunakan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).
2. Kadar fosfat (PO₄) yang terdapat dalam limbah tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dengan menggunakan metode Spektrofotometer UV-Vis.
3. Pengaruh variasi waktu perendaman tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) oleh natrium hidroksida (NaOH) terhadap kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO₄).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hewan Ternak dalam Perspektif Al-Quran

Dahulu pada zaman Nabi Muhammad saw. hewan ternak tidak hanya untuk dimakan saja melainkan hewan ternak juga digunakan sebagai kendaraan atau angkutan di padang-padang yang luas.¹ Sebagaimana dicantumkan dalam al-Quran surah al-An'am/6/142 yang berbunyi:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.²

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. menciptakan hewan ternak memiliki berbagai tujuan masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa (Dan) Dia menjadikan (di antara binatang ternak itu sebagai kendaraan angkutan) yaitu layak untuk mengangkut barang-barang, seperti unta yang sudah dewasa (dan sebagai binatang sembelihan) yang tak layak untuk dijadikan angkutan, seperti unta yang masih muda dan kambing. Ia dinamakan *farsy*/hamparan karena ia mirip dengan hamparan tanah mengingat ia sangat dekat dengannya. (Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan

¹Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 285.

²Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al-Qur'an Edisi Revisi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2014), h. 307.

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan) jalan setan di dalam masalah pengharaman dan penghalalan. (Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu) yang jelas permusuhannya.³

Hewan ternak yang diciptakan oleh Allah swt. untuk dijadikan sebagai angkutan diantaranya adalah unta, kuda, keledai dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah swt. berfirman dalam surah al-Nahl/16/8 yang berbunyi:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَتَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal^{*}) dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”.⁴

Berdasarkan ayat dan terjemahnya di atas, maka dalam tafsir Jalalain menyatakan bahwa (Dan) Dia telah menciptakan (kuda, bighal dan keledai agar kalian menungganginya dan menjadikannya sebagai perhiasan) lafal *ziinatan* menjadi *maf'ul lah*. Disebutkannya kedua `illat itu, yaitu untuk ditunggangi dan dianggap sebagai perhiasan hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan manfaat lain yang ada padanya. Seperti halnya pada kuda, selain dapat ditunggangi dan dijadikan perhiasan dagingnya dapat dimakan, hal ini telah ditetapkan berdasarkan hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim. (Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya) berupa hal-hal yang aneh dan menakjubkan.⁵

Selain hewan ternak yang dijelaskan dalam surah al-Nahl/16/8 terdapat pula hewan ternak lain seperti hewan ternak unggas diantaranya ayam, itik atau bebek dan

³Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, h. 50.

⁴Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al-Qur'an Edisi Revisi*, h. 307.

⁵Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, h. 104.

lain sebagainya. Hewan unggas tersebut ditenakkan untuk diambil daging dan telurnya.

Manusia diciptakan oleh Allah swt. dengan akal dan pikiran untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini sebab diantara ciptaan-Nya yang lain, manusialah yang sangat sempurna yang diberi akal. Sepatutnya kita bersyukur atas nikmat tersebut dan menggunakan akal dan pikiran kita untuk sesuatu yang bersifat positif. Terdapat berbagai macam ciptaan Allah swt. baik di langit maupun di bumi untuk dipetik pengetahuan dan manfaatnya. Hal ini ditegaskan Allah swt. dalam al-Quran surah al-Jaatsiyah/45/13 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

*“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.*⁶

Ayat di atas menjelaskan mengenai penciptaan Allah swt. baik yang ada di langit dan di bumi sebagaimana dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Dan Dia menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit) berupa matahari bulan bintang-bintang, air hujan dan lain-lainnya (dan apa yang ada di bumi) berupa binatang-binatang, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai dan lain-lainnya. Maksudnya, Dia menciptakan kesemuanya itu untuk dimanfaatkan oleh kalian (semuanya) lafal *Jamii'an* ini berkedudukan menjadi *Taukid*, atau mengukuhkan makna lafal sebelumnya (dari-Nya) lafal *Minhu* ini menjadi hal atau kata keterangan

⁶Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007).

keadaan, maksudnya semuanya itu ditundukkan oleh-Nya. (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi kaum yang berpikir) mengenainya, karena itu lalu mereka beriman.⁷

Ayat-ayat di atas jelas menggambarkan betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah swt. kepada manusia. Dialah yang telah menundukkan segalanya sehingga mudah untuk dimanfaatkan. Daratan, lautan dan udara, semua ada dalam kuasa-Nya dan semua tunduk patuh kepada titah-Nya. Maka, tidak ada yang patut dilakukan oleh manusia selain memanfaatkan semua karunia untuk mengabdikan kepada-Nya dengan mengikuti jalan yang telah Dia tunjukkan. Manusia dituntut untuk mengkaji apa yang terdapat dalam kitab al-Quran dengan melakukan penelitian-penelitian seperti kandungan gizi yang terdapat dalam tulang ayam dan berbagai penelitian lain.

B. Ayam Broiler

1. Pengertian dan Klasifikasi

Ayam broiler merupakan jenis hewan ternak kelompok unggas yang tersedia sebagai sumber makanan, terutama sebagai penyedia protein hewani.⁸

Tabel 2.1. Klasifikasi ayam broiler

Kingdom	<i>Animalia</i>
Sub kingdom	<i>Philum cordata</i>
Kelas	<i>Aves</i>
Ordo	<i>Galliformes</i>
Famili	<i>Phasianidae</i>
Genus	<i>Gallus</i>
Spesies	<i>Gallus domesticus</i>

(Sumber: Charoen Pokphand, 2004)

⁷Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, h. 245.

⁸Suwarta dkk, "Struktur Biaya dan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Broiler di Kabupaten Sleman", *Agrika* 6, no. 1 (Mei, 2012): h. 66.

Data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, menunjukkan perkiraan populasi ayam pedaging di Indonesia selama 5 tahun secara nasional berturut-turut 892 juta ekor (2007), 902 juta ekor (2008), 1 milyar ekor (2009), 987 juta ekor (2010) dan 1 milyar ekor (2011). Meski demikian, jumlah tersebut masih belum bisa menutupi permintaan pasar daging asal unggas.⁹

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nilai impor sub-sektor peternakan pada tahun 2011 sekitar 63% berasal dari hasil ternak dan sekitar 10% dari ternak.¹⁰

Tabel 2.2. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Menurut Provinsi (Ton/Tons)

N o.	Provinsi/Province	Tahun/Year					Pertumbuhan/ Growth 2015 over 2014 (%)
		2011	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	
1	Aceh	6.439	8.567	4.045	4.421	4.642	5,00
2	Sumatera Utara	47.051	35.168	37.836	38.752	39.146	1,02
3	Sumatera Barat	16.441	17.434	16.704	19.493	20.077	3,00
4	Riau	34.910	37.021	42.557	40.732	41.937	2,96
5	Jambi	13.360	30.677	15.861	13.793	16.583	20,22
6	Sumatera Selatan	31	28.185	30.447	29.997	32.579	8,61
7	Bengkulu	2.358	1.996	2.079	1.706	1.871	9,70
8	Lampung	27.149	31.453	41.623	32.237	47.358	46,91
9	Kepulauan Bangka Belitung	13.368	13.033	14.194	16.714	18.386	10,00
10	Kepulauan Riau	6.155	7.347	7.291	8.633	9.193	6,49
11	D.K.I. Jakarta	108.642	117.913	129.206	102.794	102.794	0,00
12	Jawa Barat	492.413	498.862	563.529	543.765	566.559	4,19
13	Jawa Tengah	104.774	114.178	123.726	130.357	132.563	1,69
14	D.I. Yogyakarta	31.295	5.640	32.581	37.367	52.064	39,33
15	Jawa Timur	159.822	162.845	162.892	198.016	202.967	2,50
16	Banten	114.568	111.159	109.029	96.554	98.973	2,51
17	Bali	23.750	22.469	7.826	8.888	8.977	1,00
18	Nusa Tenggara Barat	15.176	3.432	4.553	8.562	10.752	25,57
19	Nusa Tenggara Timur	525	567	631	650	644	-0,98
20	Kalimantan Barat	19.284	41.008	18.595	31.690	33.366	5,29
21	Kalimantan Tengah	4.463	15.566	7.338	10.912	11.309	3,64
22	Kalimantan Selatan	39.319	36.177	55.032	46.511	45.358	-2,48
23	Kalimantan Timur	27.943	30.212	35.772	43.641	45.310	3,82

⁹Roni Fadilah, *Beternak Ayam Broiler* (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2013), h. 2.

¹⁰Roni Fadilah, *Beternak Ayam Broiler*, h. 2.

24	Kalimantan Utara				3.393	3.562	5,00
25	Sulawesi Utara	5.164	5.216	5.468	5.489	5.725	4,30
26	Sulawesi Tengah	5.952	8.035	8.070	8.177	9.404	15,00
27	Sulawesi Selatan	11.594	11.073	11.368	50.829	53.370	5,00
28	Sulawesi Tenggara	948	1.002	4.486	3.559	3.928	10,36
29	Gorontalo	218	485	577	1.450	1.735	19,61
30	Sulawesi Barat	786	795	1.678	1.683	1.684	0,02
31	Maluku	125	112	8	10	15	47,54
32	Maluku Utara	1.021	244	65	374	308	-17,62
33	Papua Barat	588	313	525	1.025	1.102	7,54
34	Papua	2.277	2.284	2.284	2.204	2.866	30,06
	Indonesia	1.337.911	1.400.470	1.497.873	1.544.379	1.627.106	5,36

(Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan, 2015)

2. Limbah Tulang Ayam

Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah.¹¹

Tulang ayam adalah limbah padat yang dalam kehidupan sehari-hari dapat diasumsikan sebagai sampah atau sisa makanan yang sampai saat ini pemanfaatannya masih minim. Secara kimia komposisi utamanya adalah garam-garam terutama kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Serbuk tulang ayam memiliki potensi sebagai adsorben. Pemanfaatan ini memberikan dampak positif terhadap penanggulangannya sebagai sampah mengingat konsumsi daging ayam di restoran-restoran umum atau cepat saji serta dalam industri catering cukup besar.¹²

¹¹Aninda Rahma Astrina dkk, "Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) Sebagai Bakso Berkalsium Tinggi", *Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2010): h. 6.

¹²Darmayanto, "Penggunaan Serbuk Tulang Ayam Sebagai Penurun Intensitas Warna Air Gambut", *Tesis* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009): h. 21-22.



Gambar 2.1. Tulang Ayam Broiler

(Sumber: <http://succ.oomph.co.id/index.php/news/detail/7724/0>)

Tulang merupakan sumber utama fosfor dan kalsium, tetapi sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas untuk campuran pupuk, makanan ternak, lem dan gelatin. Akibatnya banyak tulang yang terbuang begitu saja sebagai limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Penyusun tulang terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik.¹³

Secara umum susunan kimia pada tulang-tulang kerangka binatang, seperti di bawah ini:

Tabel 2.3. Komposisi tulang ayam kerangka binatang¹⁴

Komponen	Kandungan (%)
Air	1,8 – 44,3
Lemak	1,2 – 26,9
Kolagen	15,8 – 32,8
Zat anorganik	28,0 – 56,3

Tulang dibentuk dalam dua proses yang terpisah, yaitu pembentukan matriks dan penempatan mineral ke dalam matriks tersebut. Tiga jenis komponen seluler terlibat di dalamnya dengan fungsi yang berbeda yaitu osteoblas dalam pembentukan tulang, osteosit dalam pemeliharaan tulang dan osteoklas dalam

¹³Rina Mulyaningsih, “Pemanfaatan Tepung Tulang Ayam (TTA) untuk Meningkatkan Kadar N, P dan K pada Pupuk Organik Cair Industri Limbah Tahu”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013): h.11.

¹⁴Dyah Tri Retno, “Pembuatan Gelatin dari Tulang Ayam dengan Proses hidrolisa”, h. 251.

penyerapan kembali tulang. Osteoblas membentuk kolagen tempat mineral melekat. Mineral utama di dalam tulang adalah kalsium dan fosfor, sedangkan mineral lain dalam jumlah kecil adalah natrium, magnesium dan fluor.¹⁵

C. Kalsium (Ca)

1. Definisi Kalsium (Ca)

Kalsium adalah unsur kimia yang memiliki lambang Ca dan mempunyai nomor atom 20. Kalsium berupa logam dengan titik lebur 842°C dan titik didih 1480°C. Kalsium berguna untuk kepentingan kelangsungan hidup karena kalsium merupakan unsur penting dalam organisme hidup terutama dalam kulit, tulang dan gigi. Kurang lebih 2% tubuh manusia tersusun dari kalsium.¹⁶

Kalsium (Ca) merupakan elemen ke-5 terbanyak sekaligus kation terbanyak dalam tubuh manusia dan hewan. Sekitar 99% elemen tersebut berada dalam bentuk *hydroxyapatit* ($3\text{Ca}(\text{PO}_4)_2\text{Ca}(\text{OH})_2$). Kepadatan tulang dan deposisi Ca bervariasi menurut umur. Pada awal pertumbuhan sampai setengah masa hidup kandungan mineral tubuh mengalami peningkatan, akan tetapi seiring bertambahnya umur kandungan kalsium juga menurun.¹⁷

Kalsium dibutuhkan untuk proses pembentukan dan perawatan jaringan rangka tubuh serta beberapa kegiatan penting dalam tubuh seperti membantu dalam pengaturan transport ion-ion lainnya ke dalam maupun ke luar membran, berperan dalam penerimaan dan interpretasi pada impuls saraf, pembekuan darah

¹⁵Muhammad Nabil, "Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Tuna (*Thunnus* sp.) sebagai Sumber Kalsium dengan Metode Hidrolisis Protein", *Skripsi* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005): h. 6-7.

¹⁶Syarfaini, *Dasar-Dasar Ilmu Gizi* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 192.

¹⁷Muhammad Nur Hidayat, *Ilmu Dasar Nutrisi Ternak* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 164.

dan pemompaan darah, kontraksi otot, menjaga keseimbangan hormon dan katalisator pada reaksi biologis.¹⁸

2. Fungsi Kalsium

Kalsium mempunyai berbagai fungsi dalam tubuh, antara lain:¹⁹

a. Pembentukan tulang dan gigi

Kalsium dan mineral lain memberi kekuatan dan bentuk pada tulang dan gigi. Kalsium di dalam tulang mempunyai dua fungsi yaitu sebagai bagian integral dari struktur tulang dan sebagai tempat menyimpan kalsium. Mineral yang membentuk dentil dan email yang merupakan bagian tengah dan luar dari gigi adalah mineral yang sama dengan yang membentuk tulang yaitu kristal mineral yang terdiri dari kalsium fosfat atau kombinasi kalsium fosfat dan kalium hidroksida yang dinamakan hidroksiapatit. Akan tetapi, kristal dalam gigi lebih padat dan kadar airnya lebih rendah.

b. Mengatur pembekuan darah

Ion kalsium di dalam darah merangsang pembebasan fosfolipida tromboplastin dari platelet darah yang terluka bila terjadi luka. Tromboplastin ini mengkatalisis perubahan protrombin, bagian darah normal, menjadi thrombin. Thrombin kemudian membantu perubahan fibrinogen, bagian lain dari darah, menjadi fibrin yang merupakan gumpalan darah.

¹⁸Wini Trilaksani dkk, "Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Tuna (*Thunnus* sp.) sebagai Sumber Kalsium dengan Metode Hidrolisis Protein", *Buletin Teknologi Hasil Perikanan* 9, no. 2 (2006): h. 34.

¹⁹Sunita Almitsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 235-238.

c. Katalisator reaksi-reaksi biologik

Kalsium berfungsi sebagai katalisator berbagai reaksi biologik, seperti absorpsi vitamin B₁₂, tindakan enzim pemecah lemak, lipase pankreas dan ekskresi insulin oleh pankreas, pembentukan dan pemecahan asetilkolin, yaitu bahan yang diperlukan dalam memindahkan (transmisi) suatu rangsangan dari suatu serabut saraf ke serabut saraf lain.

d. Kontraksi otot

Pada waktu otot berkontraksi kalsium berperan dalam interaksi protein di dalam otot yaitu aktin dan miosin. Bila darah kalsium kurang dari normal, otot tidak bisa mengendur sesudah kontraksi. Tubuh akan kaku dan dapat menimbulkan kejang.

e. Meningkatkan fungsi transport membran sel

Kemungkinan dengan bertindak sebagai stabilisator membran dan transmisi ion melalui membran organel sel.

3. Sumber Kalsium

Sumber kalsium terbagi dua yaitu sumber hewani dan nabati. Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil olahan susu seperti keju. Ikan kering, tulang-tulang ikan lunak, sereal, kacang-kacangan, tahu, tempe dan sayuran hijau merupakan sumber kalsium yang baik, tetapi bahan makanan ini mengandung banyak zat yang menghambat penyerapan kalsium seperti serat, fitat, oksalat dan kandungan protein yang tinggi.²⁰

Sebagian besar bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman mengandung kadar kalsium yang rendah. Sumber kalsium yang baik umumnya berasal dari produk hewani seperti: tepung ikan, daging dan tulang, tepung tulang,

²⁰Syarfaini, *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*, h. 192.

suplemen kalsium fosfat dan kapur dari kulit kerang. Namun pada dasarnya sumber kalsium yang baik pada manusia maupun hewan adalah makanan atau pakan yang telah mengalami pencernaan di dalam saluran pencernaan.

Tabel 2.4. Kandungan kalsium (Ca) dan fosfor (P) pada beberapa bahan²¹

Bahan	Kalsium (%)	Fosfor (%)
Tepung tulang (diup dan kering)	29,0	13,6
Dikalsiumfosfat	26,5	20,5
Fosfat bebas fluor	29,0	18,0
Kapur (digiling)	33,8	-
Tepung tulang (dibakar)	22,0	13,0
Kalsiumfosfat	17,0	21,0
Natriumfosfat	-	22,4
Diamoniumfosfat	-	20,0
Kulit kerang digiling	35,0	-

4. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Kalsium

Dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan dan kelebihan kalsium antara lain:

a. Kekurangan Kalsium

Kekurangan asupan kalsium dalam tubuh manusia menyebabkan abnormalitas metabolisme terutama pada usia dini, gangguan pertumbuhan seperti tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan rapuh. Pada orang dewasa dengan usia di atas 50 tahun, akan kehilangan kalsium dari tulangnya sehingga menjadi rapuh dan mudah patah yang dikenal sebagai osteoporosis.²²

²¹Muhammad Nur Hidayat, *Ilmu Dasar Nutrisi Ternak*, h. 166.

²²Ni Luh Cicik Fitriani dkk, "Penentuan Kadar Kalium (K) dan Kalsium (Ca) dalam Labu Siam (*Sechium Edule*) serta Pengaruh Tempat Tumbuhnya", *Jurnal Akademika Kimia* 1, no. 4 (2012): h. 175.

b. Kelebihan Kalsium

Konsumsi kalsium hendaknya tidak melebihi 2500 mg sehari. Kondisi kebalikan dari hipokalsemia adalah hiperkalsemia. Hiperkalsemia ini dapat menyebabkan hiperkalsiuria yaitu kondisi dimana kadar kalsium di dalam urin melebihi 300 mg/hari. Kelebihan kalsium dapat menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal. Di samping itu, dapat menyebabkan konstipasi (susah buang air besar).²³

D. Fosfor (P)

1. Definisi Fosfor

Fosfor adalah unsur kimia yang termasuk golongan nitrogen, banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya.²⁴ Fosfor yang terdapat bebas di alam, terutama di air, dominan berada di dalam bentuk senyawa PO_4^{3-} (*phosphate*; fosfat). Karena itu penggunaan istilah '*fosfat*' lebih umum digunakan.²⁵

Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh setelah kalsium, yaitu 1% dari berat badan. Kurang lebih 85% fosfor di dalam tubuh terdapat sebagai garam kalsium fosfat, yaitu bagian dari Kristal hidroksiapatit di dalam tulang dan gigi yang tidak dapat larut.²⁶

²³Sunita Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, h. 243.

²⁴Syarfaini, *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*, h. 197.

²⁵Devina Fitrika Dewi dan Ali Masduqi, "Penyisihan Fosfat Dengan Proses Kristalisasi Dalam Reaktor Terfluidisasi Menggunakan Media Pasir Silika", *Jurnal Purifikasi* 4, no.4 (Oktober 2003): h. 152.

²⁶Syarfaini, *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*, h. 197.

2. Fungsi Fosfor

Fosfor dalam tubuh memiliki beberapa fungsi di antaranya:²⁷

a. Klasifikasi Tulang dan Gigi

Klasifikasi tulang dan gigi diawali dengan pengendapan fosfor pada matriks tulang. Kekurangan fosfor menyebabkan peningkatan enzim fosfatase yang diperlukan untuk melepas fosfor dari jaringan tubuh ke dalam darah agar diperoleh perbandingan kalsium terhadap fosfor yang sesuai untuk pertumbuhan tulang.

b. Mengatur Pengalihan Energi

Melalui proses fosforilasi fosfor mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam pengalihan energi pada metabolisme karbohidrat, lemak dan protein.

c. Absorpsi dan Transportasi Zat Gizi

Fosfor berperan sebagai alat angkut untuk membawa zat-zat gizi menyeberangi membran sel atau di dalam aliran darah dalam bentuk fosfat. Proses ini dinamakan fosforilasi dan terjadi pada absorpsi di dalam saluran cerna.

d. Bagian dari Ikatan Tubuh Esensial

Fosfat merupakan bagian esensial dari DNA dan RNA, bahan pembawa kode gen/ keturunan yang terdapat di dalam inti sel hidup. DNA dan RNA dibutuhkan untuk reproduksi sel.

e. Pengatur Keseimbangan Asam dan Basa

Fosfat memegang peranan penting sebagai buffer untuk mencegah perubahan tingkat keasaman cairan tubuh. Ini terjadi karena kemampuan fosfor mengikat tambahan ion hidrogen.

²⁷ Syarfaini, *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*, h. 199-200.

3. Sumber Fosfor

Fosfor terdapat di dalam semua makanan karena fosfor ada di semua sel makhluk hidup. Fosfor dapat ditemukan pada makanan terutama makanan kaya protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu dan hasilnya, kacang-kacangan dan hasilnya serta sereal.²⁸

4. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Fosfor

Kekurangan dan kelebihan fosfor dapat menimbulkan dampak sebagai berikut:²⁹

a. Kekurangan Fosfor

Kekurangan fosfor biasa terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin. Kekurangan fosfor menyebabkan kerusakan tulang. Gejalanya adalah rasa lelah, lemah otot dan kurang nafsu makan. Bayi prematur juga dapat menderita kekurangan fosfor karena cepatnya pembentukan tulang sehingga kebutuhan fosfor tidak bisa dipenuhi oleh ASI. Selain itu, kekurangan fosfor dapat menyebabkan hipofosfatemia.

b. Kelebihan Fosfor


Kelebihan fosfor karena makanan jarang terjadi. Bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Kelebihan fosfor dapat menyebabkan Hiperfosfatemia (kadar fosfat yang tinggi dalam darah) adalah suatu keadaan dimana konsentrasi fosfat dalam darah lebih dari 4,5 mg/dL darah.

²⁸Syarfaini, *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*, h. 198.

²⁹Syarfaini, *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*, h. 200-201.

E. Kolagen

Kolagen merupakan protein fibriler/skleroprotein yang struktur molekulnya serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer baik larutan garam, asam, basa ataupun alkohol.³⁰ Hampir sepertiga protein dalam tubuh manusia dan hewan berada sebagai kolagen tulang, gigi, lapisan kulit dalam (dermis), tendon (urat daging) dan tulang rawan.³¹ Kolagen secara nutrisi bukanlah protein yang baik. Komposisi asam amino kolagen tidak ideal (terlalu banyak Prolin, Glysin, Alanin) selain itu kolagen pada kondisi alami sulit dicerna oleh tripsin dan kemotripsin. Kolagen menjadi lebih mudah dicerna dalam bentuk yang sudah terdenaturasi. Struktur asam amino pada kolagen seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Struktur Prolin, Glysin dan Alanin

(Sumber : Abdul Rohman dan Sumantri, 1979)

Pemanasan serat kolagen dalam air sampai 60°-70° C dapat memperpendek sampai 1/3-1/4 dari panjang asalnya. Jika suhu dinaikkan sampai 80°C, kolagen akan berubah menjadi gelatin.³²

³⁰F.G Winarno, *Kimia Pangan dan Gizi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 61.

³¹Antony C. Wilbraham dan Michael S. Matta, *Pengantar Kimia Organik dan Hayati*, terj. Suminar Achmadi, *Introduction to Organic and Biological Chemistry* (Bandung: ITB, 1992), h. 230.

³²John M. Deman, *Kimia Makanan*, terj. Kokasih Padmawinata, (Bandung: ITB, 1997), h. 147.

Sifat-sifat umum dan khusus kolagen adalah sebagai berikut:³³

1. Jika dididihkan di dalam air kolagen akan mengalami transformasi dari bentuk untaian tidak larut dan tidak tercerna menjadi gelatin, yaitu campuran polipeptida yang larut yang merupakan dasar pembentukan gelatin. Perubahan ini melibatkan hidrolisis beberapa ikatan kovalen pada kolagen, karena kolagen pada jaringan pengikat dan pembuluh yang menjadikan daging berbentuk liat.
2. Kolagen mengandung kira-kira 35% glisin dan kira-kira 11% alanin, persentase asam amino ini agak luar biasa tinggi. Yang lebih menonjol adalah kandungan prolin dan 4-hidroksiprolin yang tinggi, yaitu asam amino yang jarang ditemukan pada protein selain pada kolagen dan elastin. Bersama-sama prolin dan hidroksiprolin mencapai kira-kira 21% dari residu asam amino pada kolagen.
3. Komposisi asam amino kolagen tersebut mengandung empat jenis asam amino, tetapi rendah dalam hampir semua jenis asam amino lainnya yang merupakan dasar bagi kualitas gizi, gelatin relatif rendah sebagai sumber protein pangan. Protein pangan yang paling baik adalah mengandung 20 jenis asam amino, terutama golongan 10 yang disebut asam amino esensial.

Hidrolisa merupakan proses masuknya air (H_2O) ke dalam suatu senyawa. Pada proses hidrolisa kolagen, air akan menyerang ikatan amino dan menghasilkan gelatin atau glue. Hidrolisa kolagen menjadi gelatin dilakukan dalam kisaran suhu antara 60-90°C. Semakin tinggi suhu pada proses hidrolisa, maka reaksi akan semakin cepat, tetapi apabila direaksikan pada suhu yang terlalu tinggi maka warna

³³Abubakar Sidik Katili, "Struktur dan Fungsi Protein Kolagen", *Jurnal Pelangi Ilmu* 2, no. 5 (Mei 2009): h. 22-23.

gelatin yang dihasilkan akan semakin gelap karena protein dalam kolagen rusak. Reaksi yang dijalankan lebih dari 95°C, akan memecah gelatin menjadi semiglutin dan hemikolin. Reaksinya adalah sebagai berikut:³⁴



Gambar 2.3. Reaksi Pemecahan Gelatin

F. Dekolagenasi

Dekolagenasi adalah proses pelepasan kolagen dari ikatannya. Kolagen yang terikat dapat didegradasi dengan perlakuan kimia yaitu pelarutan dalam larutan basa kuat atau dengan perlakuan biologis. Pada prinsipnya, dekolagenasi dilakukan dengan pemberian kondisi basa yang diikuti pemanasan selama rentang waktu tertentu. Sebagai basa, banyak dipilih NaOH sebab selain lebih efektif bahan ini juga relatif murah dan mudah didapatkan. Pemberian basa dimaksudkan untuk mendenaturasi protein menjadi bentuk primernya yang akan mengendap.³⁵ Metode lain dalam proses deproteinasi adalah dengan menggunakan mikroorganisme yaitu melalui proses fermentasi dengan *Bacillus licheniformis* dan *Aspergillus niger*. *Bacillus licheniformis* dan *Aspergillus niger* ini akan mendegradasi protein melalui reaksi enzimatik.³⁶

Prinsip penghilangan protein dari suatu bahan dapat dilakukan dengan cara hidrolisis menggunakan pelarut tertentu. Protein akan terhidrolisis apabila dicampur

³⁴Dyah Tri Retno, "Pembuatan Gelatin dari Tulang Ayam dengan Proses hidrolisa", h. 251-252.

³⁵Yunita Ermawati dkk, "Pemanfaatan Kitosan dari Limbah Rajungan (*Portunus pelagicus*) sebagai Antimikroba pada Obat Kumur", h. 9.

³⁶R. Roostita L. Balia, "Bioprocessed Of Tiger Prawn (*Penaeus monodon*) Waste Product By Deproteinization And Demineralization On Nutrient Product", *Lucrari Stiintifice Seria Zootehnie* 54, no. 2: h. 60.

dengan asam atau alkali kuat atau enzim proteolitik melalui proses pemecahan protein secara bertahap menjadi molekul-molekul peptida dan asam-asam amino.³⁷

Tujuan lain dari perebusan dengan NaOH atau zat alkalis (proses deproteinasi) pada percobaan pembuatan tepung tulang ikan Kuniran (*Upeneus moluccensis*) adalah untuk membersihkan dari zat-zat organik yang terkandung dalam limbah tulang ikan seperti protein, lemak, maupun zat lain yang bisa terdegradasi melalui perlakuan ini. Metode deproteinasi bukan hanya terbatas pada perebusan dengan NaOH saja akan tetapi ada metode deproteinasi yang lain. Misalnya pada penelitian yang dilakukan R Murugan dan kawan-kawan, R. Murugan menggunakan proses perlakuan panas dan menggunakan NaCl . Sampel tulang direbus dengan NaCl dan selanjutnya dipanaskan suhu tinggi antara 300 °C-900°C.³⁸

Menurut penelitian Fitri Apriani Noor (2012: 2), dekolagenasi pada prinsipnya menghilangkan semaksimal mungkin bagian bukan mineral atau bahan organik yang terkandung dalam tulang ayam dan memutuskan ikatan antara protein non kolagenous-kolagen-mineral. Kolagen mudah mengembang dalam asam atau basa. Pengolahan dilakukan menggunakan larutan alkali, salah satu alkali alami yang dapat digunakan yaitu filtrat abu sekam padi (FASP).

G. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Spektrofotometer merupakan alat untuk mempelajari interaksi sinar elektromagnetik dengan materi. Gelombang elektromagnetik yang digunakan berkisar 180-800 nm. Energi elektromagnetik akan diubah menjadi besaran listrik dan melalui

³⁷Ralp J. Fessenden dan Joan S. Fessenden, *Kimia Organik Jilid 2* (Jakarta: Erlangga,1986), h. 399-400.

³⁸R. Murugan dkk, "Heat-Deproteinized Xenogeneic Bone from Slaughterhouse Waste:Physico-Chemical Properties", *Jurnal Bull. Mater. Sci., Indian Academy of Sciences* 26, no. 5 (Agustus 2003): h. 524.

amplifier akan diubah menjadi besaran yang dapat diamati. Radiasi elektromagnetik adalah energi yang digunakan untuk penyerapan dan emisi radiasi magnetik yang diteruskan melalui ruang dengan kecepatan luar biasa.³⁹

Metode SSA berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Misalkan natrium menyerap pada 589 nm, uranium pada 358,5 nm, sedang kalium pada 766,5 nm. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom. Transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik. Dengan absorpsi energi berarti memperoleh lebih banyak energi, suatu atom pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi.⁴⁰

Metode Spektrofotometri Serapan Atom memiliki beberapa kelebihan yaitu kecepatan analisisnya, ketelitiannya, umumnya tidak memerlukan pemisahan pendahuluan logam-logam yang diperiksa dan dapat menentukan konsentrasi unsur dalam jumlah yang sangat rendah.⁴¹ Selain kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan diantaranya yaitu membutuhkan lampu khusus untuk setiap unsur yang akan ditentukan, SSA tidak dapat digunakan secara efektif untuk unsur yang menghasilkan oksida bila terkena nyala dan ketika larutan garam-garam logam dibuat dalam larutan berair, adanya anion dalam jumlah yang dominan akan mempengaruhi sinyal yang dihasilkan.⁴²

³⁹Maria Bintang, *Biokimia Teknik Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 189.

⁴⁰S.M.Khopkar, *Konsep Dasar Kimia Analitik* (Jakarta: UI-Press, 2010), h. 288.

⁴¹Salbiah, dkk, "Analisis Logam Pb, Cd, Cu, dan Zn dalam Ketam Batu, dan Lohan Segar yang Berasal dari Perairan Belawan Secara Spektrofotometri Serapan Atom", *Majalah Kedokteran Nusantara* 42, no. 1(Maret 2009): h. 21.

⁴²Nursalam Hamzah, *Analisis Kimia Metode Spektroskopi* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 91-92.

Sistem peralatan spektrofotometer serapan atom terdiri atas:⁴³

1. Sumber Sinar

Sumber sinar yang lazim dipakai adalah lampu katoda berongga (*hollow cathode lamp*). Lampu ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang mengandung suatu katoda dan anoda. Katoda sendiri berbentuk silinder berongga yang terbuat dari logam atau dilapisi dengan logam tertentu. Tabung logam ini diisi dengan gas mulia (neon atau argon) dengan tekanan rendah (10-15 torr).

2. Burner dan Atomizer

Dalam analisis dengan spektrofotometri serapan atom, sampel yang akan di analisis harus diuraikan menjadi atom-atom netral yang masih dalam keadaan asas. Ada berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk mengubah suatu sampel menjadi uap atom-atom yaitu dengan nyala (*flame*) dan dengan tanpa nyala (*flameless*).⁴⁴

3. Monokromator

Monokromator dimaksudkan untuk memisahkan dan memilih panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Di samping sistem optik, dalam monokromator juga terdapat suatu alat yang digunakan untuk memisahkan radiasi resonansi dan kontinyu yang disebut dengan *chopper*.

4. Detektor

Detektor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengamatan. Ada 2 cara yang dapat digunakan dalam sistem deteksi yaitu:

⁴³Ibnu Gholib Gandjar dan Abdul Rohman, *Kimia Farmasi Analisis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 305-312.

⁴⁴Ibnu Gholib Gandjar dan Abdul Rohman, *Kimia Farmasi Analisis*, h. 298.

- (a) yang memberikan respon terhadap radiasi resonansi dan radiasi kontinyu dan
- (b) yang hanya memberikan respon terhadap radiasi resonansi.

5. Read Out

Read Out merupakan suatu alat petunjuk atau dapat juga diartikan sebagai sistem pencatatan hasil. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu *recorder* yang menggambarkan absorbansi atau intensitas emisi.

H. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud dapat berupa cahaya visible, ultra violet dan inframerah sedangkan materi dapat berupa atom dan molekul namun yang lebih berperan adalah elektron valensi.⁴⁵

Spektrofotometer yang sesuai untuk pengukuran di daerah spektrum ultraviolet dan sinar tampak terdiri atas suatu sistem optik dengan kemampuan menghasilkan sinar monokromatis dalam jangkauan panjang gelombang 200-800 nm.⁴⁶

⁴⁵Andi Haidir, "Pengukuran Kandungan Fe dalam Paduan AlFeNi Menggunakan Pengompleks Amonium Tiosianat dengan Metode Spektrofotometer UV-Vis", *Seminar Nasional IX SDM Teknologi Nuklir* (Yogyakarta: Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir, 2013): h.133

⁴⁶Ibnu Gholib Gandjar dan Abdul Rohman, *KimiaFarmasi Analisis*, h.261.

Komponen-komponen peralatan spektrofotometer UV-Vis adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Sumber Cahaya

Secara umum radiasi yang dihasilkan oleh material berupa sumber listrik bertegangan tinggi atau pemanasan listrik. Tegangan listrik akan menyebabkan eksitasi elektron pada benda dan waktu elektron kembali ke tingkat energi yang lebih rendah akan membebaskan radiasi berupa emisi sejumlah energi tertentu tergantung tingkat eksitasinya dan energi radiasi emisi inilah yang digunakan sebagai sumber radiasi. Sumber radiasi UV yang digunakan adalah lampu Hidrogen (H) atau lampu Deuterium (D).

2. Monokromator

Radiasi yang diperoleh dari berbagai sumber radiasi adalah sinar polikromatis. Monokromator berfungsi untuk mengurai sinar tersebut menjadi monokromatis sesuai yang diinginkan.

3. Tempat Sampel

Tempat sampel dikenal juga dengan istilah kuvet. Kuvet ada yang berbentuk tabung (silinder) tapi ada juga yang berbentuk kotak. Untuk sinar UV digunakan Quarts, sedangkan untuk sinar tampak dapat digunakan gelas biasa namun Quarts lebih baik.

4. Detektor

Detektor berfungsi untuk mengubah tenaga radiasi menjadi arus listrik atau peubah panas lainnya dan biasanya terintegrasi dengan pencatat (printer).

⁴⁷Marham Sitorus, *Spektroskopi Elusidasi Struktur Molekul Organik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 26-27.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 07 September – 18 Desember 2015 di Laboratorium Anorganik, Analitik dan Riset Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Alat

Adapun alat-alat yang digunakan yaitu Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) Varian AA240ES, Spektrofotometer UV-Vis Varian Cary 50 Conc, ayakan 100 mesh, autoklaf, oven, neraca analitik, pH meter, hot plate, blender, alat-alat gelas, termometer 100°C, toples kaca, statif dan klem, corong, botol pereksi, rak tabung, kasa, kain blacu, spatula, batang pengaduk dan saringan.

2. Bahan

Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu aluminium foil, ammonium molibdat ($(\text{NH}_4)_6\text{MoO}_{24}\cdot 4\text{H}_2\text{O}$), asam nitrat (HNO_3) p.a., asam perklorat (HClO_4) p.a, asam sulfat (H_2SO_4) p.a, aquabides (H_2O), aquades (H_2O), besi sulfat hidrat ($\text{FeSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$), kalium dihidrogen fosfat (KH_2PO_4), kertas whatman no. 42, larutan induk kalsium (Ca) 1000 mg/L, natrium hidroksida (NaOH) 4% dan tulang paha ayam broiler.

C. *Prosedur Kerja*

Prosedur kerja dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Proses Dekolagenasi dan Pembuatan Tepung Tulang**

Tulang paha ayam broiler direbus dan dibersihkan untuk menghilangkan sisa daging yang masih menempel. Setelah dibersihkan, dilakukan proses penghilangan lemak (degreasing) dengan cara dimasak selama 30 menit pada suhu 80°C kemudian tulang ditiriskan dan dijemur di bawah sinar matahari selama 1 jam. Tulang dipotong dengan ukuran ± 2 cm. Tulang ditimbang sebanyak 100 g dan direndam dengan larutan natrium hidroksida (NaOH) 4% dengan perbandingan berat terhadap volume basa (1:4) selama 48 jam kemudian disaring. Tulang kemudian dicuci dengan menggunakan aquabides sampai pH-nya netral. Perendaman dengan natrium hidroksida (NaOH) 4% bertujuan untuk melunakkan tulang dan memisahkan kolagen dari tulang. Proses selanjutnya tulang dimasukkan ke dalam autoklaf (121°C, 1 atm) selama 3 jam. Fungsi dari proses ini untuk mensterilkan tulang dari mikroba. Tulang dikeringkan dalam oven dengan suhu 80°C selama 24 jam. Tahap akhir proses pembuatan tepung tulang adalah pengayakan. Tulang ditepungkan menggunakan blender. Tepung yang dihasilkan diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 100 mesh agar diperoleh tepung tulang yang halus. Mengulangi perlakuan yang sama dengan variasi waktu perendaman 72 jam dan 96 jam.¹

¹A. Thalib, "Pemanfaatan Tepung Tulang Ikan Madidihang (*Thunnus albacares*) sebagai Sumber Kalsium dan Fosfor untuk Meningkatkan Nilai Gizi Makron Kenari", *Tesis* (Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB, 2009).

2. Destruksi Basah dan Pembuatan Larutan Sampel

Timbang 1 gram tepung tulang ayam kemudian tambahkan 2 mL aquabides dan 5 mL asam nitrat (HNO_3) p.a, tambahkan aquabides hingga volumenya 50 mL. Sampel dipanaskan di atas hotplate sampai volumenya 40 mL. Setelah volumenya mencapai 40 mL dan timbul asap berwarna putih, tambahkan asam perklorat (HClO_4) p.a. sebanyak 1 mL hingga larutan berwarna kuning jernih. Panaskan kembali hingga volumenya 20 mL. Saring larutan sampel ke dalam labu takar 100 mL dengan kertas whatman no. 42 kemudian volumenya ditepatkan sampai tanda batas dengan aquabides dan homogenkan. Simpan dalam botol gelap. Melakukan secara duplo. Mengulangi perlakuan yang sama pada tepung tulang ayam broiler hasil perendaman dengan variasi waktu 72 dan 96 jam.

3. Penentuan Kadar Kalsium (Ca)

a. Pembuatan Larutan Induk Kalsium (Ca) 1000 mg/L

Menimbang kalsium karbonat (CaCO_3) sebanyak 0,25 g kemudian dimasukkan dalam labu takar 100 mL lalu diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas dan dihomogenkan.

b. Pembuatan Larutan Deret Standar Kalsium (Ca) 0,0; 10; 20; 40; 80 dan 160 mg/L

Sebanyak 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 dan 8,0 mL larutan induk kalsium (Ca) 1000 mg/L dimasukkan dalam labu takar 50 mL lalu diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas dan dihomogenkan. Kemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom pada panjang gelombang 239,9 nm.

c. Penetapan Kadar Kalsium (Ca) dalam Sampel

Larutan sampel hasil destruksi sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan diencerkan dengan aquabides hingga tanda batas (Faktor Pengenceran = $100 \text{ mL}/10 \text{ mL} = 10$ kali untuk kalsium). Larutan diukur absorbansinya dengan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 239,9 nm.

4. Penentuan Kadar Fosfat (PO_4)

a. Pembuatan Larutan Induk Fosfat 1000 mg/L

Menimbang 0,1463 g kalium dihidrogen fosfat (KH_2PO_4) dan dilarutkan dalam 100 mL aquabides. Simpan dalam botol gelap.

b. Pembuatan Larutan Baku Fosfat 100 mg/L

Memipet 5 mL larutan induk fosfat (PO_4) 1000 mg/L ke dalam labu takar 50 mL lalu diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas dan dihomogenkan.

c. Pembuatan Larutan Baku Fosfat 10 mg/L

Memipet 5 mL larutan baku fosfat (PO_4) 100 mg/L ke dalam labu takar 50 mL lalu diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas dan dihomogenkan.

d. Pembuatan Larutan A

Menimbang ammonium molibdat $\{(\text{NH}_4)_6\text{MoO}_{24}\cdot 4\text{H}_2\text{O}\}$ sebanyak 10 g ditambah 60 mL aquabides kemudian ditambahkan 28 mL asam sulfat (H_2SO_4) p.a dan 5,0001 g besi sulfat hidrat ($\text{FeSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$) lalu dijadikan 100 mL dengan aquabides.

e. Pembuatan Larutan Deret Standar Fosfat 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1,0 mg/L

Sebanyak 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 dan 5,0 mL larutan baku fosfat 10 mg/L dipipet dan masing-masing volume tersebut ditambahkan 2 mL larutan A serta aquabides hingga 50 mL. Kemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 660 nm.

f. Penetapan Kadar Fosfat (PO_4) dalam Sampel

Sebanyak 0,3 mL sampel hasil destruksi dipipet ke dalam tabung reaksi lalu ditambahkan 2,7 mL aquabides dan 2 mL larutan A kemudian dihomogenkan (Faktor Pengenceran $100 \text{ mL}/2,5 \text{ mL} = 40$ kali untuk fosfat). Larutan dipipet sebanyak 3 mL ke dalam kuvet dan dibaca pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 660 nm.²



²Reggy Raisa Tangalayuk dkk, “Kadar Kalsium dan Fosfor pada Tulang Tikus Betina yang diberi Tepung Tempe Rendah Lemak”, *Buletin Veteriner Udayana* 7, No. 1 (Februari 2015): h. 61.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan selama 4 bulan dengan mengukur kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO_4) pada tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) menggunakan variasi waktu perendaman 42, 72 dan 96 jam. Berikut ini disajikan tabel dan grafik absorbansi kalsium (Ca) dan fosfat (PO_4).


1. Tabel dan Grafik Kalsium (Ca)

Absorbansi deret standar kalsium (Ca) diukur dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) dengan panjang gelombang 239,9 nm. Berikut disajikan tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Absorbansi Larutan Standar Kalsium (Ca)

No.	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	0	0
2	10	0,0078
3	20	0,0156
4	40	0,0280
5	80	0,0561
6	160	0,1376

Berdasarkan tabel pengukuran absorbansi larutan standar kalsium (Ca) di atas, maka diperoleh grafik sebagai berikut:



Gambar 4.1. Grafik Absorbansi Larutan Standar Kalsium (Ca)

Analisis kadar kalsium (Ca) pada larutan sampel terhadap tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dilakukan secara duplo. Berikut disajikan tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Kadar Kalsium (Ca) pada Tulang Paha Ayam Broiler

No.	Waktu Perendaman (Jam)	Absorbansi	Absorbansi Rata-rata	Kadar Kalsium (mg/L)	Kadar Kalsium (mg/kg)	%Kadar Kalsium
1	48 AB ₁	0,1303	0,1316	168,25	168165,92	16,8166
2	48 AB ₂	0,1329				
3	72 AB ₁	0,1323	0,1333	170,375	170323,90	17,0324
4	72 AB ₂	0,1343				
5	96 AB ₁	0,1352	0,1348	172,25	172215,56	17,2216
6	96 AB ₂	0,1343				

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh kadar kalsium (Ca) tepung tulang paha ayam mengalami peningkatan seiring lamanya waktu perendaman oleh larutan NaOH. Peningkatan ini disebabkan karena semakin lama waktu perendaman dalam larutan NaOH memungkinkan banyaknya kalsium yang mengendap dalam matriks-matriks tulang sehingga semakin tinggi pula kalsium (Ca) yang dihasilkan. Pada penelitian ini, waktu maksimal untuk memperoleh kadar kalsium (Ca) tertinggi yaitu dengan perendaman tulang ayam selama 96 jam.


2. Tabel dan Grafik Fosfat (PO_4)

Absorbansi deret standar fosfat (PO_4) diukur dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 660 nm. Berikut disajikan tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Absorbansi Larutan Standar Fosfat (PO_4)

No.	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	0	0
2	0,2	0,024
3	0,4	0,0423
4	0,6	0,0602
5	0,8	0,0753
6	1,0	0,0967

Berdasarkan tabel pengukuran absorbansi larutan standar fosfat (PO_4) di atas, maka diperoleh grafik sebagai berikut:



Gambar 4.2. Grafik Absorbansi Larutan Standar Fosfat (PO₄)

Analisis kadar fosfat (PO₄) pada larutan sampel terhadap tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dilakukan secara duplo. Berikut disajikan tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Kadar Fosfat (PO₄) pada Tulang Paha Ayam Broiler

No.	Waktu Perendaman (Jam)	Absorbansi	Absorbansi Rata-rata	Kadar Fosfat (mg/L)	Kadar Fosfat (mg/kg)	%Kadar Fosfat
1	48 AB ₁	0,0332	0,0335	0,3269	1306,95	0,1307
2	48 AB ₂	0,0338				
3	72 AB ₁	0,0326	0,0343	0,3355	1341,60	0,1342
4	72 AB ₂	0,0360				
5	96 AB ₁	0,0380	0,0370	0,3643	1456,91	0,1457
6	96 AB ₂	0.0360				

Hasil penelitian pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa lama perendaman tulang paha ayam mempengaruhi peningkatan kadar fosfat (PO_4). Pada tabel 4.4 jelas bahwa pengaruh waktu perendaman dengan lama waktu perendaman 48, 72 dan 96 jam menghasilkan kadar fosfat (PO_4) yang berbeda dimana semakin lama perendaman maka kadar fosfat (PO_4) semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa lama perendaman 96 jam merupakan waktu yang maksimal untuk menghasilkan kadar fosfat (PO_4) yang dihasilkan melalui dekolagenasi tulang ayam dengan menggunakan larutan NaOH.

B. Pembahasan

Tulang ayam merupakan salah satu limbah padat yang dapat dimanfaatkan sebagai tepung tulang yang kaya akan kalsium (Ca) dan fosfat (PO_4). Tulang ayam terdiri dari senyawa organik maupun senyawa anorganik yang memiliki banyak manfaat. Komponen organik yang utama yaitu protein sedangkan komponen anorganik yaitu kalsium, karbonat, potassium, sodium, magnesium, fosfor dan lain-lain. Tulang ayam yang digunakan pada penelitian ini yaitu tulang ayam broiler (*Gallus domesticus*) bagian paha yang diperoleh dari limbah domestik.

1. Proses Dekolagenasi

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) sebanyak 300 gram. Tulang tersebut direbus dan dibersihkan untuk menghilangkan sisa daging yang masih menempel pada tulang dan untuk menghilangkan lemak yang terdapat pada tulang. Selanjutnya dipotong dengan ukuran kecil untuk memperluas permukaan tulang agar saat proses dekolagenasi, protein yang terdapat dalam tulang mudah keluar. Proses dekolagenasi ini menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) dengan perbandingan (1:4)

dengan variasi waktu perendaman yaitu 48, 72 dan 96 jam. Saat perendaman tulang akan terjadi proses hidrolisis dimana larutan natrium hidroksida (NaOH) akan menghidrolisis protein dan komponen kolagen yang terdapat dalam tulang.

Penggunaan basa kuat yaitu natrium hidroksida (NaOH) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melarutkan protein dalam tulang karena pada suasana basa, kalsium dalam tulang bersama dengan fosfor membentuk kalsium fosfat. Kalsium fosfat adalah kristal mineral yang memiliki sifat tidak larut pada pH alkali (Almatsier, 2004). Kalsium yang tidak larut selama perendaman akan tertinggal dan mengendap dalam matriks-matriks tulang sehingga mampu meningkatkan proporsi kalsium dalam tepung tulang. Berikut reaksi hidrolisis untuk kalsium fosfat:



Gambar 4.4. Reaksi Pembentukan Kalsium Fosfat

(Sumber: Darmayanto, 2009)

Selanjutnya tulang dicuci dengan menggunakan air suling. Pencucian ini bertujuan untuk menetralkan tulang agar saat pembacaan pada alat instrumen tidak merusak alat. Proses penetralan ini berlangsung selama ± 1 bulan. Lamanya penetralan ini dipengaruhi oleh larutan NaOH yang digunakan merupakan basa kuat sehingga untuk mencapai pH netral (6,5-7,5) dibutuhkan waktu yang cukup lama. Tahap selanjutnya yaitu autoklaf selama 3 jam ($T=121^\circ\text{C}$, $P=1\text{ atm}$) untuk mensterilkan tulang dari mikroba dan melunakkan tulang. Pengeringan tulang dalam oven selama 24 jam pada suhu 80°C berfungsi untuk menghilangkan kadar air yang terdapat dalam tulang. Tahap akhir yaitu pembuatan tepung tulang

dimana tulang diblender untuk memudahkan saat proses pengayakan dan diayak dengan ayakan ukuran 100 mesh agar tepung tulang yang dihasilkan halus.

2. Destruksi Basah

Destruksi merupakan suatu perlakuan pemecahan senyawa menjadi unsur-unsurnya sehingga dapat dianalisis. Istilah destruksi ini disebut juga perombakan, yaitu dari bentuk organik logam menjadi bentuk logam-logam anorganik. Pada penelitian ini, asam-asam pengoksidasi yang digunakan untuk mendestruksi tepung tulang yaitu asam nitrat (HNO_3) dan asam perklorat (HClO_4). Tujuan dari proses destruksi ini yaitu untuk memutuskan ikatan unsur logam dengan komponen lain dalam matriks sehingga unsur tersebut berada dalam keadaan bebas sebab kandungan matriks atau ion-ion lain dapat mengganggu proses analisis logam dengan spektroskopi serapan atom. Hal ini mengakibatkan akurasi hasil analisis menjadi rendah. Oleh karena itu, sebelum analisis dilakukan destruksi untuk menghilangkan/memisahkan kandungan ion lain, dengan perlakuan awal diharapkan kesalahan pada saat analisis dapat dikecilkan seminimal mungkin (Kristianingrum, 2012: 96). Penambahan asam nitrat (HNO_3) berfungsi sebagai pengoksidasi logam yang terdapat dalam sampel tepung tulang. Selain asam nitrat (HNO_3) juga digunakan asam lain yaitu asam perklorat (HClO_4) yang merupakan oksidator yang sangat kuat. Fungsi dari asam ini yaitu untuk menyempurnakan penguraian dan menghilangkan zat-zat pengotor pada ion logam yang terdapat dalam sampel sehingga tidak ada lagi zat-zat pengotor yang mengganggu saat proses analisis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yaitu kadar kalsium (Ca) pada perendaman 48 jam sebesar 168165,92 mg/kg, pada

perendaman 72 jam sebesar 170323,90 mg/kg dan pada perendaman 96 jam sebesar 172215,56 mg/kg. Sedangkan kadar fosfat (PO_4) yang diperoleh yaitu pada perendaman 48 jam sebesar 1306,95 mg/kg, pada perendaman 72 jam sebesar 1341,60 mg/kg dan pada perendaman 96 jam sebesar 1456,91 mg/kg.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kadar kalsium (Ca) yang terdapat dalam limbah tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dengan menggunakan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) yaitu pada perendaman 48 jam menghasilkan kadar kalsium (Ca) sebesar 168165,92 mg/kg, pada perendaman 72 jam sebesar 170323,90 mg/kg dan pada perendaman 96 jam sebesar 172215,56 mg/kg.
2. Kadar fosfat (PO_4) yang terdapat dalam limbah tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) dengan menggunakan metode Spektrofotometer UV-Vis yaitu pada perendaman 48 jam menghasilkan kadar fosfat (PO_4) sebesar 1306,95 mg/kg, pada perendaman 72 jam sebesar 1341,60 mg/kg dan pada perendaman 96 jam sebesar 1456,91 mg/kg.
3. Waktu perendaman tulang paha ayam broiler (*Gallus domesticus*) oleh natrium hidroksida (NaOH) berpengaruh terhadap kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO_4) karena semakin lama tulang ayam broiler (*Gallus domesticus*) direndam semakin tinggi pula kadar kalsium (Ca) dan fosfat (PO_4) yang diperoleh.

B. *Saran*

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meningkatkan variasi waktu perendaman lebih dari 96 jam untuk mendapatkan waktu perendaman yang optimal.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menganalisis kadar kalsium karbonat (CaCO_3) dalam limbah tulang ayam broiler (*Gallus domesticus*).



DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, Sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Astrina, Aninda Rahma dkk. "Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) sebagai Bakso Berkalsium Tinggi". *Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2010): h. 1-9.
- Asy-Syuyuthi, Jalaluddin dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. *Tafsir Jalalain* (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010).
- Balia, R. Roostita L. "Bioprocessed Of Tiger Prawn (*Penaeus monodon*) Waste Product By Deproteination And Demineralization On Nutrient Product". *Lucrari Stiintifice Seria Zootehnie* 54, no. 2: h. 60-62.
- Bintang, Maria. *Biokimia Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Darmayanto. "Penggunaan Serbuk Tulang Ayam Sebagai Penurun Intensitas Warna Air Gambut". *Tesis* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009): h. 1-63.
- Demam, John M. *Kimia Makanan*. Terj. Kokasih Padmawinata. Bandung: Penerbit ITB, 1997.
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007.
- Dewi, Devina Fitrika dan Ali Masduqi. "Penyisihan Fosfat dengan Proses Kristalisasi dalam Reaktor Terfluidisasi Menggunakan Media Pasir Silika". *Jurnal Purifikasi* 4, no.4 (Oktober 2003): h. 151-156.
- Ermawati, Yunita dkk. "Pemanfaatan Kitosan dari Limbah Rajungan (*Portunus pelagicus*) sebagai Antimikroba pada Obat Kumur". *Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Fakultas Farmasi, UGM, 2009): h. 1-24.
- Fadilah, Roni. *Beternak Ayam Broiler*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2013.
- Fessenden, Ralp J. dan Joan S, Fessenden. *Kimia Organik Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 1986.

- Fitriani, Ni Luh Cicik dkk. "Penentuan Kadar Kalium (K) dan Kalsium (Ca) dalam Labu Siam (*Secbium Edule*) serta Pengaruh Tempat Tumbuhnya". *Jurnal Akademika Kimia* 1, no. 4 (2012): h. 174-180.
- Gandjar, Ibnu Gholib dan Abdul Rohman. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Haidir, Andi. "Pengukuran Kandungan Fe dalam Paduan AlFeNi Menggunakan Pengompleks Amonium Tiosianat dengan Metode Spektrofotometer UV-Vis" *Seminar Nasional IX SDM Teknologi Nuklir* (Yogyakarta: Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir, 2013).
- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Ayat-Ayat Al-Qur'an Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2014.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamzah, Nursalam. *Analisis Kimia Metode Spektroskopi*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Hidayat, Muhammad Nur. *Ilmu Dasar Nutrisi Ternak*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Katili, Abubakar Sidik. "Struktur dan Fungsi Protein Kolagen". *Jurnal Pelangi Ilmu* 2, no. 5 (Mei 2009): h. 19-29.
- Khopkar, S.M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Kristianingrum, Susila. "Kajian Berbagai Proses Destruksi Sampel dan Efeknya". *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta* (Juni 2012): h. 195-202.
- Mayasaroh, Intan dkk. "Dekolagenasi, Kandungan Kalsium dan Fosfor Limbah Tulang Ayam oleh Larutan KOH". *Jurnal Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran* (2012): h. 3.
- Muallim, Ikmal Ikmal. *Shahih Muslim Jus II Cet. 1*. Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1415 H/ 1994 M.
- Mulyaningsih, Rina. "Pemanfaatan Tepung Tulang Ayam (TTA) untuk Meningkatkan Kadar N, P dan K pada Pupuk Organik Cair Industri Limbah Tahu", *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013): h.1-78.

- Murugan, R. dkk. "Heat-Deproteinated Xenogeneic Bone from Slaughterhouse Waste: Physico-Chemical Properties". *Jurnal Bull. Mater. Sci., Indian Academy of Sciences* 26, no. 5 (Agustus 2003): h. 523-528.
- Nabil, Muhammad. "Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Tuna (*Thunnus* sp.) sebagai Sumber Kalsium dengan Metode Hidrolisis Protein". *Skripsi* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005): h. 6-7.
- Retno, Dyah Tri. "Pembuatan Gelatin dari Tulang Ayam dengan Proses hidrolisa". *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi (SNAST) Periode III* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2012): h. 250-256.
- Salbiah dkk. "Analisis Logam Pb, Cd, Cu, dan Zn dalam Ketam Batu dan Lohan Segar yang Berasal dari Perairan Belawan Secara Spektrofotometri Serapan Atom". *Majalah Kedokteran Nusantara* 42, no. 1 (Maret 2009): h. 20-25.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sitorus, Marham. *Spektroskopi Elusidasi Struktur Molekul Organik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Suwarta dkk. "Struktur Biaya dan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Broiler di Kabupaten Sleman". *Agrika* 6, no. 1 (Mei, 2012): h. 65-85.
- Syarfaini. *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Tangalayuk, Reggy Raisa dkk. "Kadar Kalsium dan Fosfor pada Tulang Tikus Betina yang diberi Tepung Tempe Rendah Lemak". *Buletin Veteriner Udayana* 7, no. 1 (Februari 2015): h. 59-65.
- Thalib, A. "Pemanfaatan Tepung Tulang Ikan Madidihang (*Thunnus albacares*) sebagai Sumber Kalsium dan Fosfor untuk Meningkatkan Nilai Gizi Makron Kenari". *Tesis* (Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB, 2009).
- Trilaksana, Wini dkk. "Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Tuna (*Thunnus* sp.) sebagai Sumber Kalsium dengan Metode Hidrolisis Protein". *Buletin Teknologi Hasil Perikanan* 9, no. 2 (2006): h. 34-43.
- Wilbraham, Antony C. dan Michael S. Matta. *Pengantar Kimia Organik dan Hayati*. Terj. Suminar Achmadi. *Introduction to Organic and Biological Chemistry*. Bandung: ITB, 1992.

Winarno, F.G. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.


Winarsih, Wiwin dkk. “Pengaruh Perendaman Limbah Tulang Ayam Menggunakan NaOH terhadap Tingkat Dekolagenasi, Kandungan Kalsium dan Fosfor”. *Jurnal Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran* (2012): h. 3.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian



Lampiran 2. Pembuatan Tepung Tulang Ayam Broiler



Catatan: dilakukan pengulangan yang sama dengan variasi waktu perendaman 72 dan 96 jam.

Lampiran 3. Destruksi Basah dan Pembuatan Larutan Sampel

Tepung tulang
ayam broiler

- Ditimbang 1 gram.
- Ditambahkan 2 mL aquabides dan 5 mL asam nitrat (HNO_3) p.a.
- Ditambahkan aquabides hingga volumenya 50 mL.
- Sampel dipanaskan sampai volumenya 40 mL.
- Ditambahkan asam perklorat (HClO_4) p.a. sebanyak 1 mL.
- Dipanaskan kembali hingga volumenya 20 mL.
- Larutan sampel disaring ke dalam labu takar 100 mL dengan kertas whatman no. 42 kemudian volumenya ditepatkan sampai tanda batas dengan aquabides dan dihomogenkan.
- Filtrat ditempatkan dalam botol gelap.
- Melakukan secara duplo.
- Mengulangi perlakuan yang sama pada tepung tulang ayam broiler hasil perendaman dengan variasi waktu 72 dan 96 jam.

Hasil

Lampiran 4. Penentuan Kadar Kalsium (Ca)

Larutan sampel
(hasil destruksi)

- Dipipet 10 mL dan dimasukkan dalam labu takar 100 mL.
- Ditambahkan aquabides dan dihipitkan sampai tanda batas.
- Diencerkan dengan faktor pengenceran $100 \text{ mL}/10 \text{ mL} = 10$ kali untuk kalsium.
- Diukur absorbansinya dengan Spektrofotometer Serapan Atom pada panjang gelombang 239,9 nm.

Hasil

Lampiran 5. Penentuan Kadar Fosfat (PO_4)

Larutan sampel hasil destruksi

- Dipipet sebanyak 0,3 mL.
- Ditambahkan 2,7 mL aquabides.
- Ditambahkan 2 mL larutan A.
- Larutan dihomogenkan.
- Diencerkan dengan faktor pengenceran $100 \text{ mL}/2,5 \text{ mL} = 40$ kali untuk fosfat.
- Larutan dipipet sebanyak 3 mL ke dalam kuvet.
- Diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 660 nm.

Hasil

Lampiran 6. Pembuatan Larutan Induk Kalsium (Ca) 1000 mg/L

$$\begin{aligned}\text{Mr CaCO}_3 &= [(1 \times \text{Ar Ca}) + (1 \times \text{Ar C}) + (3 \times \text{Ar O})] \text{ g/mol} \\ &= [(1 \times 40) + (1 \times 12) + (3 \times 16)] \text{ g/mol} \\ &= (40 + 12 + 48) \text{ g/mol} \\ &= 100 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

$$\text{ppm} = \frac{\text{Ar Ca}}{\text{Mr CaCO}_3} \times \frac{\text{Berat Sampel}}{\text{Volume Sampel}}$$

$$1000 \text{ mg/L} = \frac{40 \text{ g/mol}}{100 \text{ g/mol}} \times \frac{\text{Berat Sampel}}{0,1 \text{ L}}$$

$$1000 \text{ mg/L} = \frac{40 \times \text{Berat Sampel}}{10 \text{ L}}$$

$$\text{Berat Sampel} = \frac{1000 \text{ mg/L} \times 10 \text{ L}}{40}$$

$$\text{Berat Sampel} = 250 \text{ mg}$$

$$\text{Berat Sampel} = 0,25 \text{ g}$$

Keterangan:

Mr : Massa molekul relatif (g/mol)

Ar : Massa atom relatif (g/mol)

Lampiran 7. Pembuatan Larutan Standar Kalsium (Ca)

a. Larutan 10 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 10 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 10 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} = 0,5 \text{ mL}$$

b. Larutan 20 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 20 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 20 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} = 1,0 \text{ mL}$$

c. Larutan 40 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 40 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 40 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} = 2,0 \text{ mL}$$

d. Larutan 80 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 80 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 80 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} = 4,0 \text{ mL}$$

e. Larutan 160 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 160 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 160 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} = 8,0 \text{ mL}$$

Keterangan:

V_1 : Volume awal (mL)

C_1 : Konsentrasi awal (ppm)

V_2 : Volume akhir (mL)

C_2 : Konsentrasi akhir (ppm)

Lampiran 8. Penentuan Nilai Slope, Intersep, Persamaan Garis Lurus, Konsentrasi dan Nilai Regresi Pada Kalsium (Ca)

No.	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x ²	y ²	xy
1	0	0	0	0	0
2	10	0,0078	100	0,00006084	0,078
3	20	0,0156	400	0,00024336	0,312
4	40	0,0280	1600	0,000784	1,12
5	80	0,0561	6400	0,00314721	4,488
6	160	0,1376	25600	0,01893376	22,016
∑n=6	∑x=310	∑y=0,2451	∑x ² =34100	∑y ² =0,02316917	∑xy=28,014

1. Penentuan Nilai Slope (a)

Diketahui: n = 6

$$\sum x = 310$$

$$\sum y = 0,2451$$

$$\sum x^2 = 34100$$

$$\sum xy = 28,014$$

$$a = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$= \frac{6 (28,014) - (310) (0,2451)}{6 (34100) - (310)^2}$$

$$= \frac{168,084 - 75,981}{204600 - 96100}$$

$$= \frac{92,103}{108500}$$

$$= 0,0008488756$$

$$= 0,0008$$

2. Penentuan Nilai Intersep (b)

$$\begin{aligned} b &= \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \\ &= \frac{(0,2451)(34100) - (310)(28,014)}{6(34100) - (310)^2} \\ &= \frac{8357,91 - 8684,34}{204600 - 96100} \\ &= \frac{-326,43}{108500} \\ &= -0,0030086 \\ &= -0,003 \end{aligned}$$

3. Penentuan Persamaan Garis Lurus

Diketahui: $a = 0,0008$

$$b = -0,003$$

$$y = ax + b$$

$$y = 0,0008x - 0,003$$

4. Perhitungan Konsentrasi Kalsium (Ca) dalam Sampel

$$y = ax + b$$

Keterangan: y = absorban

a = slope

x = konsentrasi

b = intersep

a. Sampel 48 AB

$$y_1 = ax_1 + b$$

$$0,1316 = 0,0008x_1 - 0,003$$

$$x_1 = \frac{0,1316 + 0,003}{0,0008} = 168,25 \text{ mg/L}$$

$$Ca = \frac{C \times V \times fp}{B}$$

$$= \frac{168,25 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L} \times 10}{1,0005 \text{ g}}$$

$$= \frac{168,25 \text{ mg}}{0,0010005 \text{ kg}}$$

$$= 168165,92 \text{ mg/kg}$$

$$Ca = 168165,92 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10000 \text{ mg}} \%$$

$$= 16,8166\%$$

b. Sampel 72 AB

$$y_2 = ax_2 + b$$

$$0,1333 = 0,0008x_2 - 0,003$$

$$x_2 = \frac{0,1333 + 0,003}{0,0008} = 170,375 \text{ mg/L}$$

$$Ca = \frac{C \times V \times fp}{B}$$

$$= \frac{170,375 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L} \times 10}{1,0003 \text{ g}}$$

$$= \frac{170,375 \text{ mg}}{0,0010003 \text{ kg}}$$

$$= 170323,90 \text{ mg/kg}$$

$$\text{Ca} = 170323,90 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10000 \text{ mg}} \%$$

$$= 17,0324\%$$

c. Sampel 96 AB

$$y_3 = ax_3 + b$$

$$0,1348 = 0,0008x_3 - 0,003$$

$$x_3 = \frac{0,1348 + 0,003}{0,0008} = 172,25 \text{ mg/L}$$

$$\text{Ca} = \frac{C \times V \times fp}{B}$$

$$= \frac{172,25 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L} \times 10}{1,0002 \text{ g}}$$

$$= \frac{172,25 \text{ mg}}{0,0010002 \text{ kg}}$$

$$= 172215,56 \text{ mg/kg}$$

$$\text{Ca} = 172215,56 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10000 \text{ mg}} \%$$

$$= 17,2216\%$$

Keterangan:

C : Konsentrasi (mg/L)

V : Volume sampel (L)

fp : Faktor pengenceran

B : Berat sampel (kg)

5. Perhitungan Nilai Regresi

$$\begin{aligned} R &= \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{\{(n \sum x^2) - (\sum x)^2\} \{(n \sum y^2) - (\sum y)^2\}}} \\ &= \frac{6,28,014 - 310,0,2451}{\sqrt{\{[6(34100)] - (310)^2\} \{[6(0,02316917)] - (0,2451)^2\}}} \\ &= \frac{168,084 - 75,981}{\sqrt{\{(204600) - (96100)\} \{(0,13901502) - (0,06007401)\}}} \\ &= \frac{92,103}{\sqrt{(108500) (0,078941)}} \\ &= \frac{92,103}{\sqrt{8565,0985}} \\ &= \frac{92,103}{92,5478} \\ &= 0,9951938 \end{aligned}$$

$$R^2 = 0,9904107$$

$$= 0,9904$$

Lampiran 9. Pembuatan Larutan Induk Fosfat (PO₄) 1000 mg/L

$$\begin{aligned}\text{Mr PO}_4 &= [(1 \times \text{Ar P}) + (4 \times \text{Ar O})] \text{ g/mol} \\ &= [(1 \times 31) + (4 \times 16)] \text{ g/mol} \\ &= (31 + 64) \text{ g/mol} \\ &= 95 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Mr KH}_2\text{PO}_4 &= [(1 \times \text{Ar K}) + (2 \times \text{Ar H}) + (1 \times \text{Ar P}) + (4 \times \text{Ar O})] \text{ g/mol} \\ &= [(1 \times 39) + (2 \times 1) + (1 \times 31) + (4 \times 16)] \text{ g/mol} \\ &= (39 + 2 + 31 + 64) \text{ g/mol} \\ &= 139 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

$$\text{ppm} = \frac{\text{Ar PO}_4}{\text{Mr KH}_2\text{PO}_4} \times \frac{\text{Berat Sampel}}{\text{Volume Sampel}}$$

$$1000 \text{ mg/L} = \frac{95 \text{ g/mol}}{139 \text{ g/mol}} \times \frac{\text{Berat Sampel}}{0,1 \text{ L}}$$

$$1000 \text{ mg/L} = \frac{95 \times \text{Berat Sampel}}{13,9 \text{ L}}$$

$$\text{Berat Sampel} = \frac{1000 \text{ mg/L} \times 13,9 \text{ L}}{95}$$

$$\text{Berat Sampel} = 146,3158 \text{ mg}$$

$$\text{Berat Sampel} = 0,1463 \text{ g}$$

Lampiran 10. Pembuatan Larutan Baku 100 mg/L dan Larutan Baku 10 mg/L

1. Larutan Baku 100 mg/L

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 100 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 100 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} = 5 \text{ mL}$$

2. Larutan Baku 10 mg/L

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 10 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 10 \text{ ppm}}{100 \text{ ppm}} = 5 \text{ mL}$$

Lampiran 11. Pembuatan Larutan Standar Fosfat (PO₄)

a. Larutan 0,2 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 0,2 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 0,2 \text{ ppm}}{10 \text{ ppm}} = 1 \text{ mL}$$

b. Larutan 0,4 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 0,4 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 0,4 \text{ ppm}}{10 \text{ ppm}} = 2 \text{ mL}$$

c. Larutan 0,6 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 0,6 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 0,6 \text{ ppm}}{10 \text{ ppm}} = 3 \text{ mL}$$

d. Larutan 0,8 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 0,8 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 0,8 \text{ ppm}}{10 \text{ ppm}} = 4 \text{ mL}$$

e. Larutan 1,0 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 1,0 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 1,0 \text{ ppm}}{10 \text{ ppm}} = 5 \text{ mL}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 12. Penentuan Nilai Slope, Intersep, Persamaan Garis Lurus, Konsentrasi dan Nilai Regresi pada Fosfat (PO₄)

No.	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x ²	y ²	xy
1	0	0	0	0	0
2	0,2	0,024	0,04	0,000576	0,0048
3	0,4	0,0423	0,16	0,001789	0,01692
4	0,6	0,0602	0,36	0,003624	0,03612
5	0,8	0,0753	0,64	0,00567	0,06024
6	1	0,0967	1	0,009351	0,0967
n=6	Σx=3	Σy=0,2985	Σx ² =2,2	Σy ² =0,02101	Σxy=0,21478

1. Penentuan Nilai Slope (a)

Diketahui: n = 6

$$\Sigma x = 3$$

$$\Sigma y = 0,2985$$

$$\Sigma x^2 = 2,2$$

$$\Sigma xy = 0,21478$$

$$a = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{6 (0,21478) - (3) (0,2985)}{6 (2,2) - (3)^2}$$

$$= \frac{1,28868 - 0,8955}{13,2 - 9}$$

$$= \frac{0,39318}{4,2}$$

$$= 0,0936143$$

$$= 0,0936$$

2. Penentuan Nilai Intersep (b)

$$\begin{aligned} b &= \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \\ &= \frac{(0,2985)(2,2) - (3)(0,21478)}{6(2,2) - (3)^2} \\ &= \frac{0,6567 - 0,64434}{13,2 - 9} \\ &= \frac{0,01236}{4,2} \\ &= 0,0029429 \\ &= 0,0029 \end{aligned}$$

3. Penentuan Persamaan Garis Lurus

Diketahui: $a = 0,0936$

$b = 0,0029$

$$y = ax + b$$

$$y = 0,0936x + 0,0029$$

4. Perhitungan Konsentrasi Fosfat (PO_4) dalam Sampel

$$y = ax + b$$

Keterangan: y = absorban

a = slope

x = konsentrasi

b = intersep

a. Sampel 48 AB

$$y_1 = ax_1 + b$$

$$0,0335 = 0,0936x_1 + 0,0029$$

$$x_1 = \frac{0,0335 - 0,0029}{0,0936} = 0,3269 \text{ mg/L}$$

$$PO_4 = \frac{C \times V \times fp}{B} \times 100\%$$

$$= \frac{0,3269 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L} \times 40}{1,0005 \text{ g}}$$

$$= \frac{1,3076 \text{ mg}}{0,0010005 \text{ kg}}$$

$$= 1306,95 \text{ mg/kg}$$

$$PO_4 = 1306,95 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10000 \text{ mg}} \%$$

$$= 0,1307\%$$

b. Sampel 72 AB

$$y_2 = ax_2 + b$$

$$0,0343 = 0,0936x_2 + 0,0029$$

$$x_2 = \frac{0,0343 - 0,0029}{0,0936} = 0,3355 \text{ mg/L}$$

$$PO_4 = \frac{C \times V \times fp}{B} \times 100\%$$

$$= \frac{0,3355 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L} \times 40}{1,0003 \text{ g}}$$

$$= \frac{1,342 \text{ mg}}{0,0010003 \text{ kg}}$$

$$= 1341,60 \text{ mg/kg}$$

$$\text{PO}_4 = 1341,60 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10000 \text{ mg}} \%$$

$$= 0,1342\%$$

c. Sampel 96 AB

$$y_3 = ax_3 + b$$

$$0,0370 = 0,0936x_3 + 0,0029$$

$$x_3 = \frac{0,0370 - 0,0029}{0,0936} = 0,3643 \text{ mg/L}$$

$$\text{PO}_4 = \frac{C \times V \times fp}{B}$$

$$= \frac{0,3643 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L} \times 40}{1,0002 \text{ g}}$$

$$= \frac{1,4572 \text{ mg}}{0,0010002 \text{ kg}}$$

$$= 1456,91 \text{ mg/kg}$$

$$\text{PO}_4 = 1456,91 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10000 \text{ mg}} \%$$

$$= 0,1457\%$$

5. Perhitungan Nilai Regresi

$$\begin{aligned} R &= \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[(n \sum x^2) - (\sum x)^2][(n \sum y^2) - (\sum y)^2]}} \\ &= \frac{6(0,21478) - (3)(0,2985)}{\sqrt{[6(2,2) - (3)^2][6(0,02101) - (0,2985)^2]}} \\ &= \frac{1,28868 - 0,8955}{\sqrt{[(13,2) - (9)][(0,12606) - (0,0891023)]}} \\ &= \frac{0,39318}{\sqrt{(4,2)(0,0369577)}} \\ &= \frac{0,39318}{\sqrt{0,1552223}} \\ &= \frac{0,39318}{0,3939826} \\ &= 0,9979629 \\ R^2 &= 0,9959299 \end{aligned}$$

= 0,9959 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian

A. Preparasi Sampel



1) Pengumpulan sampel limbah tulang ayam



2) Perebusan sampel untuk menghilangkan kaldu dan minyak



3) Proses pelepasan sisa-sisa daging yang menempel



4) Perebusan tulang pada suhu 80°C



5) Penjemuran tulang di bawah terik matahari selama 1 jam



6) Pemotong dan penghilangan sum-sum tulang



7) Penimbang sampel sebanyak 100 gram



8) Sampel tulang untuk tiga variasi waktu

B. Pembuatan Pereaksi Natrium Hidroksida (NaOH) 4%



1) Penimbangan padatan NaOH p.a



2) Proses melarutkan NaOH dengan aquabides



3) Pereaksi NaOH 4%

C. Proses Dekolagenasi



1) Perendaman tulang dengan pereaksi NaOH 4%



2) Proses pemisahan kolagen dan tulang (48 jam)



3) Pemisahan kolagen dan tulang (72 jam)



4) Pemisahan kolagen dan tulang (96 jam)



5) Kolagen yang terbentuk



6) Penetrasi sampel (48 jam)



7) Penetrasi sampel (72 jam)



8) Penetrasi sampel (96 jam)

D. Pengeringan dan Pengayakan Sampel



1) Proses autoklaf selama 3 jam



2) Proses pengeringan dengan oven selama 24 jam



3) Proses menghaluskan sampel dengan blender



4) Pengayakan sampel dengan ayakan 100 mesh




5) Sampel yang telah di ayak untuk tiga variasi waktu

E. Proses Destruksi (secara Duplo untuk Tiap Variasi Waktu)




1) Penimbangan sampel
(48 AB)




2) Proses destruksi sampel
(48 AB)



3) Penyaringan sampel
(48 AB)




4) Penimbangan sampel
(72 AB)




5) Proses destruksi sampel
(72 AB)



6) Penyaringan sampel
(72 AB)



7) Penimbangan sampel
(96 AB)



8) Proses destruksi sampel
(96 AB)



9) Penyaringan sampel
(96 AB)



10) Sampel hasil destruksi yang telah disaring dihimpitkan dalam labu takar 100 mL

F. Analisis Kalsium (Ca)



1) Larutan sampel kalsium (Ca) tulang ayam broiler untuk tiga variasi siap dianalisis dengan SSA



2) Larutan standar kalsium (Ca) siap dianalisis dengan SSA




3) Proses analisis larutan standar dan sampel kalsium (Ca) dengan alat SSA

G. Analisis Fosfat (PO_4)



1) Penimbangan KH_2PO_4 sebanyak 0,4485 gram



2) Larutan induk 1000 ppm



3) Larutan baku 100 ppm



4) Larutan baku 10 ppm



5) Penimbangan ammonium molibdat sebanyak 10 gram




6) Penimbangan besi sulfat anhidrat sebanyak 5,0001 gram

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



7) Campuran bahan yang telah ditimbang



8) Bahan di telah dicampur dihipitkan sebagai larutan A



9) Larutan standar fosfat (PO_4) siap dianalisis dengan alat spektrofotometer UV-VIS



10) Larutan sampel fosfat (PO_4) tulang ayam broiler



11) Larutan sampel fosfat (PO_4) hasil pengenceran 40 siap dianalisis dengan alat Spektrofotometer UV-VIS



12) Proses analisis larutan standar dan sampel fosfat (PO_4) dengan alat Spektrofotometer UV-VIS

RIWAYAT HIDUP



Sitti Musdalifah yang biasa dipanggil Ifah lahir di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1993 anak dari pasangan Suardi dan Hasniati. Penulis memulai jenjang pendidikan dari TK di As-Adiyah Kec. Belawa Kab. Wajo, kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di MIA 148 Tippulu Kec.

Belawa Kab. Wajo dan lulus pada tahun 2005, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Burau Kec. Burau Kab. Luwu Timur dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2008, penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMA Negeri 1 Burau Kec. Burau Kab. Luwu Timur dan berhasil lulus pada tahun 2011.

Pada pertengahan tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia. Alhamdulillah pada tahun 2016 penulis telah menyelesaikan studi Kimianya dan berhasil meraih gelar sarjana sains (S.Si).