

**FAKTOR RISIKO PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SITI RAHMA JUNI SARI

NIM: 70200113060

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Faktor risiko penyakit jantung koroner pada pegawai negeri sipil UIN Alauddin Makassar tahun 2017", yang disusun oleh Siti Rahma Juni Sari, NIM: 70200113060, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Juli 2017 bertepatan dengan 2 Dzul-Qa'idah 1438 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 26 Juli 2017 M
2 Dzul-Qa'idah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Hasbi Ibrahim, SKM.,M.Kes (.....)

Pembimbing I : Azriful, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing II : Muhammad Rusmin, SKM.,MARS (.....)

Penguji I : Dr. dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Penguji II : Dr. H. Supardin, M.HI (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.

NIP: 19550203 198312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa (i) yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahma Juni Sari
NIM : 70200113060
Tempat/Tgl Lahir : Merauke/ 15 Juni 1996
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/ Epidemiologi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : jl.Skarda (9 Residence no.4) Makassar
Judul :Faktor risiko penyakit jantung koroner pada pegawai negeri sipil UIN Alauddin Makassar tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Juli 2017

Penyusun,

Siti Rahma Juni Sari
NIM. 70200113035

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, berkah, karunia dan hidayah yang senantiasa tercurahkan kepada penulis. Segala kemudahan, kenikmatan, kesehatan dan jiwa semangat yang senantiasa dilimpahkan olehnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa, shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat ibadah kepada ummatnya terutama penulis serta keluarga Rasulullah sahabat dan sahabiyah dan untuk orang yang senantiasa berada di jalan adinul Islam. Dalam penelitian ini penulis menyadari banyak pihak yang telah berperan dan membantu serta memberikan dukungan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dr.dr.H.A.Armyn Nurdin.,M.sc selaku dekan FKIK UIN Alauddin Makassar, Dr. Nurhidayah S.Kep.,Ns.,M.Kep, Dr. Andi Susilawaty. SKM.,M.Kes dan Prof.Mukhtar Lutfi selaku wakil dekan FKIK UIN Alauddin Makassar.
2. Hasbi Ibrahim,SKM.,M,Kes selaku ketua jurusan program studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Alauddin Makassar.
3. Azriful.,SKM.,M.Kes selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan motivasi, ilmu dan semangat.
4. Muh.Rusmin SKM.,MARS selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan saran dan kritik membangun untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
5. Dr.dr.H.A.Armyn Nurdin.,M.sc dan Dr.H. Supardin selaku penguji Akademik dan integrasi Keislaman yang telah memberikan banyak saran membangun terhadap Karya tulis ini.

6. Rosdianti selaku Mama, bapak Amiruddin, Evi Wahyuni, Siti Irianti, Ainun Afifah dan Alya atas doa, dukungan, semangat, motivasi dan saran yang tidak pernah berhenti diberikan untuk penulis di segala waktu.
7. Nur Rahmah Wahyuddin dan Nurihwani sebagai sahabat disegala waktu serta selalu ada untuk memberi dukungan dan semangat yang tiada henti.
8. Suriyanti T dan Ina Eriana yang bersedia membantu selama penelitian serta semua kawan DIMENSION, Kesmas B dan seperjuangan Peminatan EPIDEMIOLOGI yang tak bisa penulis sebut satu demi satu, terima kasih karena senantiasa saling memberi motivasi agar dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Murobbiyah Rezky Damayanti Mutmainnah dan teman teman halaqah serta kawan sepengurusan dakwah yang senantiasa memberi doa untuk kemudahan penelitian ini.
10. Mujahidah, Hasriati Hasti, Nur Atika, Kordes Muhammad Irfan, Irvan Jaya, Syamsul Rijal selaku teman yang menemani selama 2 bulan dilokasi KKN, pula teruntuk Muh Fahry, Ibu dan bapak Posko, sarjana pendamping desa bangkit sejahtera yayasan haji Kalla serta semua kawan-kawan garassi yang telah banyak mendoakan untuk kelancaran penelitian ini .
11. Muh.Yusuf ST, Irham S.Arch, Presiden Aksi Indonesia Muda Adryan yudistira S.Psi, Ma'rifatun Qamaryah S.sos dan teman seperjuangan di Aksi Indonesi Muda untuk dangko serta untuk Rahmadani Lasenang S.Psi yang bersedia meminjamkan benda yang sangat berguna untuk penulis menyelesaikan penelitian ini.
12. Sepupu dan sahabat setia Dinda Astari S.M, Andi arfina Dewi,.SH, Adelia irianty dan Intan permatasari jayanti yang senantiasa menanyakan kapan ujian, sehingga penulis termotivasi menyelesaikannya segera.

Penulis sadar Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik demi kebaikan dikemudian hari. Demikian laporan penelitian ini penulis susun semoga dapat memberikan manfaat didunia dan akhirat.

Makassar,13 juni 2017

Siti Rahma Juni Sari



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Patofisiologi PJK	28
Bagan 2.2 Kerangka teori.....	41
Bagan 2.3 Kerangka konsep.....	43



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Patofisiologi PJK	28
Bagan 2.2 Kerangka teori.....	41
Bagan 2.3 Kerangka konsep.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kadar lipid serum.....	20
Tabel 2.2	Klasifikasi kategori IMT untuk Asia.....	21
Tabel 2.3	Kusioner <i>framingham risk score</i>	30
Tabel 4.1	Karakteristik responden berdasarkan usia.....	53
Tabel 4.2	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	54
Tabel 4.3	Sebaran faktor risiko berdasarkan jumlah kolesterol total.....	54
Tabel 4.4	Sebaran faktor risiko berdasarkan tekanan darah sistolik.....	56
Tabel 4.5	Sebaran faktor risiko berdasarkan tekanan darah diastol	57
Tabel 4.6	Sebaran faktor risiko berdasarkan status diabetes mellitus tipe 2.....	58
Tabel 4.7	Sebaran faktor risiko berdasarkan status merokok.....	59
Tabel 4.8	Sebaran faktor risiko berdasarkan status obesitas sentral.....	59
Tabel 4.9	Sebaran faktor risiko berdasarkan riwayat penyakit jantung dalam keluarga....	60
Tabel 4.10	Sebaran faktor risiko berdasarkan keluarga yang menderita PJK.....	61
Tabel 4.11	Sebaran frekuensi puasa sunnah PNS UIN	61
Tabel 4.12	Sebaran frekuensi shalat tahajjud PNS UIN	62
Tabel 4.13	Gambaran tingkatan risiko penyakit jantung koroner	63
Tabel 4.14	Hubungan antara usia dan tingkatan risiko PJK.....	64
Tabel 4.15	Hubungan antara jenis kelamin dan tingkatan risiko PJK.....	66
Tabel 4.16	Hubungan antara kolesterol total dan tingkatan risiko PJK.....	67
Tabel 4.17	Hubungan antara tekanan darah dan tingkatan risiko PJK.....	68
Tabel 4.18	Hubungan antara diabetes mellitus dan tingkatan risiko PJK.....	69
Tabel 4.19	Hubungan antara status merokok dan tingkatan risiko PJK.....	70
Tabel 4.20	Hubungan antara status obesitas sentral dan tingkatan risiko PJK.....	71
Tabel 4.21	Hubungan antara riwayat penyakit jantung dalam keluarga dan tingkatan risiko PJK.....	72
Tabel 4.22	Hubungan antara puasa sunnah dan tingkatan risiko PJK.....	73
Tabel 4.23	Hubungan antara shalat tahajjud dan tingkatan risiko PJK.....	73

ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuisioner penelitian
- Lampiran 2 Daftar Singkatan
- Lampiran 3 Surat izin meneliti
- Lampiran 4 Surat telah menyelesaikan penelitian
- Lampiran 5 Variabel view data SPSS
- Lampiran 6 Hasil uji statistik
- Lampiran 7 Dokumentasi
- Lampiran 8 Daftar riwayat hidup



ABSTRAK

Nama : Siti Rahma Juni Sari

NIM : 70200113060

Judul : Faktor Risiko penyakit jantung koroner pada pegawai negeri sipil UIN Alauddin Makassar tahun 2017

Penyakit Jantung Koroner merupakan kelainan pada satu atau lebih pembuluh darah arteri koroner dimana terdapat penebalan dalam dinding pembuluh darah disertai adanya plak yang mengganggu aliran darah ke otot jantung yang akibatnya dapat mengganggu fungsi jantung. Mengetahui beberapa faktor risiko yang mendorong terjadinya Penyakit Jantung Koroner dapat menjadikan usaha pencegahan yang efektif salah satunya dengan mengukur tingkatan risiko penyakit jantung koroner melalui prediktor-prediktor PJK yang diutarakan dalam *framingham risk score* seperti usia, jenis kelamin, kadar kolesterol, tekanan darah, status diabetes dan status merokok. PNS dalam kehidupan sehari-hari masih kurang memperhatikan kesehatannya sehingga peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sebaran faktor risiko dan tingkatan risiko PJK pada PNS UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional* dengan responden sejumlah 89 orang yang terbagi berdasarkan lokasi kerja atau *proporsional sampling*. Responden mengisi kuisioner dan dilakukan pemeriksaan kolesterol total, tekanan darah dan lingkaran pinggang serta untuk mengetahui status diabetes, status merokok dan riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang merupakan prediktor PJK. Sehingga didapatkan hasil sebaran faktor risiko yang tinggi adalah kolesterol total dan obesitas sentral, sedangkan tingkatan risiko sebesar 14.6% sampel yang berisiko tinggi menderita PJK, 19.1% sampel berisiko sedang menderita PJK serta sampel berisiko rendah untuk menderita PJK. Hasil analisis *chi-square* didapatkan adanya hubungan bermakna antara usia, jenis kelamin, kolesterol total, tekanan darah, status merokok dan obesitas sentral dengan tingkatan risiko penyakit jantung koroner dengan nilai $p = < 0.05$.

Kata kunci : penyakit jantung koroner, tingkatan risiko, *framingham risk score*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit Jantung koroner adalah penyakit pembuluh darah yang menyuplai makanan dan oksigen untuk otot jantung mengalami sumbatan (Kurniadi, 2013). Penyakit Jantung koroner merupakan kelainan pada satu atau lebih pembuluh darah koroner dimana terdapat penebalan dalam dinding pembuluh darah disertai adanya plak yang mengganggu aliran darah ke otot jantung yang akibatnya dapat mengganggu fungsi jantung (AHA, 2015). Pada umumnya faktor risiko PJK dipengaruhi oleh merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik dan tekanan darah tinggi atau hipertensi (WHO, 2011).

Diperkirakan bahwa sekitar 17.5 juta orang pada tahun 2012 meninggal akibat Kardiovaskuler, terutama PJK dengan 7.4 juta orang (WHO,2015). Menurut American Heart Association, diwilayah Asia prevalensi penyakit paling banyak akibat jantung dan pembuluh darah adalah hipertensi 21.0% penduduk, selanjutnya 6.1% penduduk yang memiliki penyakit jantung, 3.7% penduduk dengan Penyakit Jantung koroner dan 1.9% penduduk dengan stroke (AHA, 2011).

Pada tahun 2010, PJK merupakan penyebab kematian tertinggi ke-enam dengan proporsi 4% dari seluruh kematian di Indonesia (CDC, 2013). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi PJK menurut hasil wawancara terdiagnosis dokter sebesar 0.5% dan berdasarkan diagnosis dokter dan atau gejala sebesar 1.5% (Kemenkes RI, 2013).

Disulawesi selatan proporsi cakupan penyakit tidak menular didominasi oleh penyakit kardiovaskuler yakni sebanyak 60.89% (Dinas kesehatan Prov. Sulsel, 2014). Dan menurut Riskesdas di Sulawesi selatan Estimasi berdasarkan gejala atau diagnosa dokter sebanyak 2.9 % atau berada di peringkat ke 3 tertinggi setelah NTT dan Sulawesi Tengah (Riskesdas, 2013). Di Kota Makassar dijelaskan oleh kepala promosi kesehatan, Kementerian Kesehatan Dr. Lily S. Sulistyowati prevalensi penyakit jantung koroner sebanyak 4.2% lebih tinggi dibanding prevalensi nasional sebanyak 1.5 % (Antara news Makassar, 2014).

Dalam kehidupan sehari-hari, para PNS ini masih kurang memperhatikan kesehatannya karena kesibukan sehingga mereka tidak memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi, merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan hipertensi yang tidak terkontrol. Jika hal ini terus dibiarkan, maka risiko terserang penyakit jantung koroner akan meningkat seiring dengan pertambahan usia.

Framingham Heart Study memiliki suatu model untuk memprediksi risiko terjadinya penyakit jantung koroner dalam waktu 10 tahun ke depan yang dinamakan *framingham risk score*. Model ini memprediksi kejadian kardiovaskuler berdasarkan prediktor-prediktor seperti gender, usia, kadar kolesterol, HDL, tekanan darah, pengobatan hipertensi dan status merokok (NHLBI, 2013).

Beberapa penelitian di Indonesia pernah menggunakan *framingham risk score* tersebut untuk memprediksi penyakit jantung koroner pada suatu kelompok masyarakat. Menurut penelitian untuk melihat faktor risiko kejadian penyakit jantung koroner yang dilakukan pada pegawai di Serpong pada tahun 2013

dimana tingkat faktor risiko pada kategori sedang sebanyak 11.6% dan yang berisiko tinggi sebanyak 0.2% (Rizky Kautsar, 2013). Menurut penelitian yang sama yang dilakukan di masyarakat binaan FKIK UIN Jakarta di buaran bahwa tingkatan risiko pada kategori tinggi sebanyak 8.6%, dan 30.5% berisiko sedang terkena penyakit jantung koroner (Melia Fatrani, 2015).

Sampai saat ini belum terdapat penelitian pada PNS di kota Makassar untuk melihat risiko jantung koroner sehingga peneliti juga bermaksud untuk melakukan penelitian bagaimana *faktor risiko penyakit jantung koroner pada PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang didapat adalah:

1. Bagaimana sebaran faktor risiko dan tingkatan risiko penyakit jantung koroner pada PNS UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017?
2. Bagaimana hubungan antara tingkatan risiko penyakit jantung koroner dengan faktor risiko usia, jenis kelamin, kolesterol total, tekanan darah, diabetes mellitus, status merokok, obesitas sentral, riwayat penyakit jantung dalam keluarga pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017?
3. Bagaimana hubungan antara puasa sunnah dan shalat tahajjud dengan tingkatan risiko Penyakit Jantung koroner pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Positif (H_a)

- a. H_a =Terdapat proporsi yang tinggi dalam sebaran faktor risiko dan tingkatan risiko penyakit jantung koroner Pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017.
- b. H_a = Terdapat hubungan bermakna antara tingkatan risiko PJK dengan faktor usia, jenis kelamin,kolesterol total, tekanan darah, diabetes mellitus, status merokok, obesitas sentral, riwayat penyakit jantung dalam keluarga pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017.
- c. H_a =Terdapat hubungan bermakna antara puasa sunnah dan shalat tahajjud dengan tingkatan risiko PJK pada PNS UIN Alauddin Makassar.

2. Hipotesis Noll (H_o)

- a. H_o = Tidak terdapat proporsi yang tinggi dalam sebaran faktor risiko dan tingkatan risiko penyakit jantung koroner Pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017.
- b. H_o =Tidak Terdapat hubungan bermakna antara tingkatan risiko PJK dengan faktor risiko usia, jenis kelamin,kolesterol total, tekanan darah, diabetes mellitus, status merokok, obesitas sentral, riwayat penyakit jantung dalam keluarga pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017.
- c. H_o = Tidak terdapat hubungan bermakna antara puasa sunnah dan shalat tahajjud dengan tingkat risiko PJK pada PNS UIN Alauddin Makassar

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Penggunaan definisi operasional (*Indicator Empiric*) untuk mengukur konsep, dan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian. Untuk mengukur suatu konsep, maka yang harus diukur adalah makna atau konsepsi dari konsep tersebut, yang harus diungkap lewat definisi yang jelas.



No.	Variabel	Defenisi Operasional	Pengukuran			
			Alat Ukur	Cara Ukur	Skala Ukur	Hasil Ukur
1.	Faktor risiko PJK	Faktor risiko adalah hal hal yang dapat menyebabkan orang menderita penyakit jantung koroner.	Kuisisioner	Mengisi kuisisioner	Ordinal	Menderita beberapa Faktor risiko Penyakit jantung koroner.
2.	PNS	PNS adalah mereka yang bekerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar dan mempunyai Nomor Induk Pegawai / NIP				Mempunyai Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil.
3.	Jantung	Jantung adalah organ tubuh yang berdetak dan dengannya manusia dapat terus hidup.				Manusia yang dapat hidup dan bernafas dengannya dapat dikatakan memiliki Jantung
4.	Usia	Usia adalah jumlah tahun umur sejak lahir hingga tahun terakhir yang tertera pada KTP Responden. Batas usia di atas 35 tahun	Kuesioner	Mengisi kuisisioner	Ordinal	0.usia 25-29 tahun 1.usia 30-34 tahun 2. Usia 35-39 tahun 3. usia 40-44 tahun 4.usia 45-49 tahun 5.usia 50-54 tahun 6.usia 55-59 tahun 7.usia 60-64 tahun
5.	Jenis kelamin	Karakteristik responden yang dibedakan antara	Kuisisioner	Mengisi kuisisioner	Nominal	1. Laki-laki 2. perempuan

		laki-laki dan perempuan.				
6.	Merokok	Apabila responden menghisap rokok lebih dari 3 batang perhari di setiap harinya.	Kuesioner	Mengisi kuisisioner	Nominal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak
7.	Riwayat keluarga	Garis keturunan dalam keluarga yang menderita penyakit jantung . seperti orangtua,kakek,nenek dan saudara kandung.	Kuisisioner	Mengisi kuisisioner	Nominal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 0. tidak ada
8.	Hiperlipidemia	Tingginya kadar kolesterol total darah yaitu di atas 200 mg/dl yang merupakan batas tinggi tinggi kadar kolesterol menurut ATP III.	Data Kuisisioner formulir pengukuran .	Mengisi kuisisioner	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak hiperlipidemia < 200 mg/dl 2. Ya, hiperlipidemiia > 200 mg/dl
9.	Hipertensi	Istilah kedokteran untuk tekanan darah tinggi diatas normal yaitu tekanan sistolik >140 mmHg dan atau diastol >90 mmHg .	Data kuisisioner formulir pengukuran fisik dan laboratorium	Mengisi kuisisioner	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normotensi 2. hipertensi

10.	Diabetes mellitus	Keadaan dimana terjadi gangguan metabolisme akibat kelainan sekresi insulin sehingga terjadi hiperglikemia disertai gejala klasik diabetes dan pernah di diagnosis oleh dokter.	Kuisisioner	Mengisi kuisisioner	Nominal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak
11.	Obesitas	Keadaan dimana ukuran lingkar pinggang seseorang melebihi batas. Untuk perempuan > 80 cm dan laki-laki > 90 cm	Meteran lingkar pinggang.	Mengukur lingkar pinggang responden.	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. > 90 cm untuk laki laki dan > 80 cm untuk perempuan. 2. <90 cm untuk laki-laki dan < 80cm untuk perempuan
12.	Tingkatan risiko untuk mengalami PJK dalam 10 Tahun.	Tingkatan risiko ini untuk memprediksi risiko terjadinya PJK dalam 10 tahun kedepan.	Instrumen framingham risk score	Hasil kuisisioner dan pemeriksaan yang sesuai dengan pertanyaan pada <i>framingham risk score</i> di skoring sesuai instrumen	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko tinggi > 20% 2. Risiko sedang 10-20% 3. Risiko rendah < 10%

13.	Shalat tahajjud	Shalat yang dilakukan di malam hari setelah tidur mulai jam 11- setengah 5 dini hari.	Kuisisioner tambahan	Mengisi kuisisioner	Ordinal	<p>1.ya : sering (5-7x perminggu)</p> <p>2.kadang (3-4x perminggu)</p> <p>3.jarang (1-2x perminggu)</p> <p>4.tidak pernah</p>
14.	Puasa sunnah	Ibadah puasa yang dimaksud adalah tidak makan dan minum mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari di hari selain bulan ramadhan seperti puasa senin-kamis,puasa ayyamul bidh dan puasa daud .	Kuisisioner tambahan	Mengisi kuisisionere	Ordinal	<p>1.ya: rutin (tiap minggu untuk senin kamis,tiap bulan untuk ayyamul bidh)</p> <p>2. kadang (tiap 2 minggu untuk puasa senin kamis,tiap du bulan untuk ayyamul bidh)</p> <p>3. jarang (tiap 2 bulan untuk puasa senin kamis, tiap 6 bulan sekali untuk ayyamul bidh)</p> <p>4.tidak pernah</p>

E. Kajian Pustaka

No.	Nama	Tahun	Judul	Tempat	Hasil
1.	Erlin Kurnia, BambaFng Prayogi	2015	Faktor Jenis Kelamin, Genetik, Usia, Tingkat Stress Dan Hipertensi Sebagai Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner	Kediri	Hasil penelitian diperoleh sebagian besar pasien memiliki faktor risiko genetika (88.4%), mengkonsumsi makan berkolesterol dalam batas sedang (86.1%), memiliki hipertensi (86.0%), lebih dari 50% terjadi pada laki-laki (53.5%), berusia 60-74 tahun (60.5%), memiliki indeks masa tubuh normal (53.5%), tidak merokok (58.2%), lebih dari 50% tidak mengalami diabetes mellitus (67.4%), sebagian besar responden mengalami stres ringan (76.7%), serta berolahraga cukup (72.1%).
2.	Melia Fatrani	2013	Penilaian tingkat risiko dan faktor faktor yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner pada masyarakat binaan KPKM Buaran FKIK UIN Syarif hidayatullah	Jakarta	Penelitian dengan desain cross sectional dengan 128 responden ini mendapatkan hasil bahwa yang berisiko tinggi mengalami PJK dalam 10 tahun sebanyak 8.6%, berisiko sedang 30.5% dan berisiko rendah

					adalah 60.9%.
3	M. Nadzir A.		Prediksi Penyakit Jantung Koroner Pada Pns Yang Melakukan Medical Checkup Di Rsud Dr. Soebandi Jember Dengan Metode Framingham Risk Score	Jember	Hasil perhitungan dari framingham risk score menunjukkan bahwa 76.2% pegawai negeri sipil eselon II dan III berisiko rendah, 17.5% berisiko sedang, dan 6,3% berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar pegawai negeri sipil eselon II dan III di Kabupaten Jember memiliki risiko rendah terkena penyakit jantung koroner dalam waktu 10 tahun kedepan
4.	Kautsar Rizky	2013	Analisis tingkat Risiko penyakit jantung koroner dengan metode perhitungan Framingham pada pegawai di batan tahun 2011-2013	Serpong	Hasil yang didapatkan dari penelitiang cross sectional bahwa yang berisiko rendah terkena PJK pada pegawai dibatan serpong sebanyak 88.2% dan berisiko sedang sebanyak 11.6% dan berisiko tinggi 0.2%
5.	Herawaty N,dkk	2012	Uji Sensitivitas Skor Riskesdas Coronary Heart Disease Terhadap Rasio Ldl/Hdl Pada Pasien Rawat Jalan Rsud Kabupaten Pangkep	Pangkep	Hasil penelitian dengan nilai sensitivitas dari variabel prediktor Riskesdas CHD yaitu umur sebesar 92.8% ($p=0.001$), jenis kelamin sebesar 52.3% ($p=0.17$), tekanan darah

					sebesar 85.7% ($p=0.03$), obesitas sentral sebesar 88.1% ($p=0.01$), status merokok sebesar 38.1% ($p=0.61$) dan untuk variabel Skor Riskesdas Coronary Heart Disease yaitu sebesar 83.3% ($p=0.03$) yang berarti skor tersebut cukup baik digunakan sebagai skrining untuk deteksi dini penyakit jantung koroner.
6.	Kemal Al Fajar	2013	Hubungan aktivitas Fisik dan Kejadian Jantung Koroner di Indonesia : Analisis data riskesdas tahun 2013	Jakarta	Risiko PJK pada individu yang beraktifitas tinggi lebih rendah meskipun memiliki faktor risiko lain seperti usia, gender dan status merokok.
7.	Jeini Ester Nelwan	2011	Karakteristik Individu Penderita Penyakit Jantung Koroner Di Sulawesi Utara Tahun 2011	Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan kelompok umur paling banyak berumur > 59 tahun sebanyak 79%, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 73% dan tidak memiliki riwayat keluarga sebanyak 51%. Perlu adanya tindakan promosi dari tenaga kesehatan terhadap masyarakat khususnya masyarakat dewasa tentang peningkatan kualitas hidup melalui perilaku hidup sehat dan menghindari

					faktor risiko PJK.
8.	Supanee Putadechakum , Venus Leelahakul,dkk	2014	Meteran lingkaran pinggang.	Mengukur lingkar pinggang responden.	
9.	Sonal Parikh, Manish Patel, Hemant Tiwari,dkk	2013	penilaian risiko penyakit kardiovaskular dengan menggunakan framingham risiko persamaan kalangan atas warga dari ahmedabad city	ahmedabad city,india	Ordinal
10.	<i>Syed S Mahmood, Daniel Levy</i>	2013	Framingham Heart Study dan epidemiologi penyakit kardiovaskular: perspektif sejarah	Study literature	

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan populasi penelitian adalah semua pegawai yang berstatus PNS baik pegawai administratif ataupun tenaga pendidik serta belum terdiagnosa menderita penyakit jantung koroner sebelumnya .

G. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui sebaran faktor risiko dan tingkatan risiko penyakit jantung koroner pada PNS UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

Secara spesifik tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui hubungan antara tingkatan risiko penyakit jantung koroner dengan faktor risiko usia, jenis kelamin, kolesterol total, tekanan darah, diabetes mellitus, status merokok, obesitas sentral, riwayat penyakit jantung dalam keluarga pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara puasa sunnah dan shalat tahajjud dengan tingkatan risiko Penyakit Jantung koroner pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017.

H. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Bagi penelitian

Mengetahui faktor risiko penyakit jantung koroner dan bagaimana prediksi terkena penyakit jantung koroner dalam waktu 10 tahun kedepan pada kalangan pegawai negeri sipil lingkungan UIN Alauddin Makassar setelah dilakukan skrining berdasarkan *framingham risk score*.

2. Bagi masyarakat

Agar masyarakat khususnya kalangan PNS lingkungan UIN Alauddin Makassar mengetahui faktor risiko penyakit jantung koroner dan prediksi

terjadinya penyakit jantung koroner dalam 10 tahun mendatang, sehingga dapat sedini mungkin mengambil sikap dengan cara mengubah gaya hidup dan melakukan pemeriksaan jantung seperti EKG, ekokardiografi, angiografi koroner untuk mencegah peningkatan risiko penyakit tersebut.

3. Bagi pelayanan kesehatan

Agar pelayanan kesehatan primer memberikan edukasi sedini mungkin guna mengurangi kejadian penyakit jantung koroner karena mencegah lebih baik daripada mengobati.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penyakit Jantung Koroner

Jantung manusia berukuran segenggam tangan kirinya. Jantung berdenyut rata rata 80x permenit, 100.000x per hari dan 40 juta kali pertahun. Jantung memompa darah dan melalui arteri didistribusikan ke seluruh tubuh untuk kemudian kembali ke jantung (Rilantono,2013:29).

Sistem kardiovaskuler sering disebut sistem sirkulasi merupakan sistem yang kompleks dengan banyak fungsi. Jantung, pembuluh darah, pembuluh limfe dan darah adalah komponennya. Tugas sistem sirkulasi adalah membawa oksigen dan nutrien serta hormon dan lain lain ke sel sel tubuh serta mengambil karbondioksida dan sisa produk metabolisme keluar sel (Rilantono,2013:29).

Definisi Penyakit Jantung Koroner merupakan kelainan pada satu atau lebih pembuluh darah arteri koroner dimana terdapat penebalan dalam dinding pembuluh darah disertai adanya plak yang mengganggu aliran darah ke otot jantung yang akibatnya dapat mengganggu fungsi jantung (AHA, 2015).

Penyakit jantung koroner disebabkan karena sumbatan plak ateroma pada arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri yang memasok nutrisi dan oksigen ke ke otot jantung atau miokard (Rilantono,2013:121).

B. Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner

Berbagai faktor Risiko ditengarai mendorong terjadinya Penyakit Jantung Koroner, sebagian dapat dimodifikasi dan sebagaianya lagi tidak dapat dimodifikasi.

1. Faktor Risiko yang tidak dapat dimodifikasi

a. Usia

Banyak yang telah membuktikan adanya hubungan antara usia dan kematian akibat Penyakit jantung koroner. Sebab seiring peningkatan usia, kejadian aterosklerotik semakin mudah terjadi. Sekitar 82% kejadian PJK pada usia lebih dari 65 tahun akan menyebabkan angka mortalitas pada individu tersebut meningkat karena jantung mengalami perubahan fisiologis bahkan tanpa ada penyakit sebelumnya (AHA,2014).

b. Jenis Kelamin

Wanita usia paruh baya mungkin lebih sering mengalami PJK dibandingkan pria. Perbedaan ini berkurang secara progresif setelah menopause dan ini terjadi terutama dalam peran estrogen. Kerja estrogen yang berpotensi menguntungkan adalah sebagai antioksidan, menurunkan LDL dan meningkatkan HDL, menstimulasi ekspresi dan aktivitas oksida nitrat sintase, serta menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan produksi plasminogen (Philip I dkk,2008:75).

c. Riwayat Keluarga Menderita penyakit Jantung Koroner

Berbagai survei epidemiologi telah menunjukkan adanya predisposisi familial terhadap penyakit jantung koroner .hal ini disebabkan karena banyak faktor risiko Penyakit Jantung koroner misalnya hipertensi memiliki dasar genetik multifaktorial (akibat gen abnormal multipel yang berinteraksi dengan pengaruh lingkungan). Pengaruh genetik tambahan yang membahayakan mungkin juga terlibat karena predisposisi familial tetap ada bila data epidemiologis dikoreksi terhadap faktor risiko yang telah diketahui. Angka kejadian meningkat pada pasien dengan riwayat infark miokard pada

ayah atau saudara laki laki sebelum usia 55 tahun dan ibu atau saudara perempuan sebelum usia 65 tahun (Philip I dkk,2008:75).

Menurut data dari AHA, angka kejadian mortalitas juga meningkat pada pasien yang memiliki African American. Selain itu, risiko PJK juga lebih tinggi pada beberapa orang America Meksiko, Indian American, Hawaii dan beberapa orang America Asia (AHA,2014).

d. Ras

Pada kelompok masyarakat kulit putih maupun kulit berwarna, laki laki mendominasi kematian akibat PJK, tetapi lebih nyata pada kulit putih dan lebih sering pada usia muda daripada usia lebih tua. Omset PJK pada kulit putih umumnya 10 tahun lebih lambat dibanding pria kulit berwarna dan pada wanita kulit berwarna lebih lambat sekitar 7 tahun (AHA,2014). Insidensi kematian dini akibat PJK pada orang Asia yang tinggal di Inggris lebih tinggi dibandingkan dengan populasi lokal dan juga angka rendah pada Ras Afri-Karibia (AHA,2014).

2. Faktor Risiko yang dapat dimodifikasi

a. Pendidikan

Menurut Apriadji 1986 seorang tamatan Sekolah dasar belum tentu kurang mampu menyusun makanan yang memenuhi syarat gizi di bandingkan dengan orang lain yang pendidikannya lebih tinggi. Namun, factor Pendidikan dapat menentukan mudah tidaknya seseorang dalam memahami dan memenuhi kebutuhan diri untuk hidup sehat.

b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat aktivitas fisik seseorang. Pekerjaan atau profesi yang lebih menuntut penggunaan aktivitas fisik, misalnya tukang bangunan, tukang becak dan sebagainya, selalu memacu

denyut jantung lebih dan tidak memacu seseorang untuk berpeluang kegemukan. Sebaliknya pada pekerjaan atau profesi yang banyak menuntut optimalisasi mental atau bekerja dibelakang meja akan memacu peluang kegemukan serta aktivitas jantung lebih kurang. Aktivitas kerja dikantor yang hanya berputar putar dari satu rapat ke rapat lain sepanjang hari mengakibatkan minimnya keluaran energi sehingga dapat meningkatkan kejadian kegemukan yang menjadi pemicu kejadian jantung koroner.

c. Pola Makan

Faktor makanan memegang peranan penting terhadap gaya hidup di Indonesia, terutama diperkotaan. Pengetahuan akan kesehatan yang minimberakibat pada perilaku konsumsi yang tidak sehat. Salah satunya makan makanan berlemak baik dari jenis *fastfood* ataupun *junkfood*. Makanan berlemak mengandung lebih banyak kalori dibandingkan dengan protein dan akan memberikan sumbangan energi yang lebih besar, hal ini tentu menjadi pemicu untuk mengalami obesitas dan hiperlipidemia sehingga menjadi pemicu terjadinya penyakit jantung koroner.

d. Diabetes Mellitus

Merupakan penyakit metabolik yang terdapat pada kira-kira 5% populasi. Orang dengan diabetes kekurangan insulin secara keseluruhan atau menjadi resisten terhadap kerjanya. Kondisi resistensi insulin yang terjadi biasanya pada usia dewasa di sebut diabetes meliitus tipe 2. Diabetes menyebabkan kerusakan progresif terhadap susunan mikrovaskuler yang lebih besar selama bertahun tahun. Kira kira 75% pasien diabetik akhirnya meninggal dengan penyakit jantung koroner.

Terdapat bukti bahwa pasien DM tipe 2 mengalami kerusakan endotel maupun peningkatan kadar LDL teroksidasi. Kedua efek tersebut mungkin

merupakan akibat dari mekanisme yang terkait dengan hiperglikemia yang khas pada kondisi ini. Selain itu koagulabilitas darah meningkat pada DM2 karena peningkatan plasminogenaktivator inhibitor dan peningkatan kemampuan agregasi trombosit (Philip I dkk, 2008:75).

e. Hipertensi

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 mmHg, terjadi pada 25% populasi. Hipertensi memacu adanya aterosclerosis. Kemungkinan dengan merusak endotel dan menyebabkan efek berbahaya lain pada dinding arteri besar. Hipertensi merusak pembuluh darah otak dan ginjal. Semakin tinggi beban kerja jantung yang ditambah dengan tekanan arteri yang meningkat juga menyebabkan penebalan dinding ventrikel kiri, hal ini disebut hipertrofi ventrikel kiri merupakan penyebab sekaligus penanda kerusakan kardiovaskuler yang lebih serius. Hipertrofi ventrikel kiri menjadi predisposisi bagi biokardium untuk mengalami aritmia dan iskemia dan merupakan kontributor utama terjadinya gagal jantung, infark miokard dan kematian mendadak (Philip I dkk, 2008:75).

f. Merokok

Merokok tembakau menyebabkan penyakit jantung koroner dengan menurunkan kadar HDL, meningkatkan koagulabilitas darah dan merusak endotel sehingga memacu terjadinya aterosclerosis. Selain itu, terjadi pula stimulasi jantung yang diinduksi nikotin serta penurunan kapasitas darah pengangkut oksigen yang dimediasi oleh karbon monoksida. Efek ini bersamaan dengan peningkatan kejadian spasme koroner, menentukan tingkatan iskemia jantung dan infark miokard. Bukti epidemiologis menyebutkan bahwa risiko kardiovaskuler tidak menurun dengan rokok yang memiliki kadar tar rendah (Philip I dkk, 2008:75).

Orang yang merokok lebih dari 20 batang perhari dapat mempengaruhi atau memperkuat efek faktor utama risiko lainnya. Penelitian *framingham* mendapatkan kematian mendadak akibat PJK pada laki laki perokok 10 kali lebih berisiko dari pada laki laki bukan perokok.

Efek rokok terhadap peningkatan risiko PJK sering dijumpai apabila telah mengkonsumsi rokok lebih dari 25 batang perhari dan risiko tersebut akan semakin meningkat apabila konsumsi dari rokok tersebut juga meningkat. Zat zat kimia dari rokok yang paling kuat efeknya untuk menyebabkan penyakit jantung adalah nikotin, karbon monoksida (CO) dan gas oxidant (Dept. Health human, 2010).

g. Hiperlipidemia

Hiperlipidemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan lipid serum di atas batas normal. Lipid plasma yaitu kolesterol, trigliserida, fosfolipidan asam lemak bebas berasal dari makanan (eksogen) dan dari sintesis lemak (endogen). Dalam aterogenesis, kolesterol dan trigliserida adalah lipid yang paling berperan. Lipid plasma tidak dapat beredar bebas dalam darah sehingga dibutuhkan protein yang disebut lipoprotein. Lipoprotein terbagi menjadi empat kelas didalam darah ,yaitu:

- 1) Kilomikron yang mengandung banyak trigliserida
- 2) Lipoprotein densitas sangat rendah (VLDL) yang kandungannya sama seperti kilomikron
- 3) Lipoprotein densitas Rendah yang kandungan kolesterolnya sangat rendah.
- 4) Lipoprotein densitas tinggi (HDL) yang kandungan proteinnya lebih tinggi dari kolesterol.

Tabel 2.1 Kadar Lipid Serum

Lipid	Optimal (mg/dl)	Borderline (mg/ dl)	Tinggi/sangat tinggi (mg/ dl)
Kolesterol total	<200	200-239	>240
Kolesterol HDL	Laki laki : >40 Perempuan >50		
Kolesterol LDL	<100	100-129	>130
Trigliserida	<150	150-199	>200

Peningkatan kolesterol memiliki hubungan dengan kejadian PJK. Satu pertiga dari penyakit jantung iskemik dikarenakan oleh tingginya kolesterol. secara umum, 2.6 juta kematian didunia disebabkan oleh tingginya kolesterol (Philipi dkk,2008:75).

h. Obesitas

Obesitas adalah keadaan dimana kelebihan kandungan lemak di jaringan adipose sehingga dampaknya adalah peningkatan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang, obesitas dipicu oleh asupan kalori yang keluar sehingga terjadi penumpukan karbohidrat, lemak dan protein pada sel sel adiposit sebagai trigliserida. Untuk obesitas sentral diukur dari lingkar pinggang yang diinterpretasikan jika lingkar pinggang > 90 cm untuk laki laki dan 80 cm untuk perempuan. Obesitas sering menjadi faktor pemicu dari diabetes mellitus, hipertensi, hiperlipidemia sehingga menjadi faktor risiko PJK. Menurut WHO 58% dari diabetes mellitus dan 21% dari penyakit jantung (AHA,2014).

Tabel 2.2 Klasifikasi Kategori IMT untuk Asia (AHA,2014)

IMT (kg/m ²)	Klasifikasi
<18.5	Berat badan kurang
18.5-22.9	Berat badan normal
23.0-24.9	Berat badan lebih dengan risiko
25.0-29.9	Obesitas I
>30.0	Obesitas II

i. Aktivitas Fisik

Olahraga mempunyai banyak efek terhadap beberapa faktor risiko PJK yang dapat diubah. Beberapa contohnya yaitu olahraga dapat menurunkan angka kejadian obesitas, hipertensi, kolesterol total dan LDL, serta meningkatkan kolesterol HDL dan sensitivitas insulin pada orang dengan diabetes (Jonathan Myers,2003).

Manfaat fisiologis dari olahraga adalah perbaikan fungsi dan kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen sehingga ketika kemampuan ini sudah membaik maka ketika melakukan pekerjaan sehari hari hanya akan sedikit merasa kelelahan (Jonathan Myers,2003).

Terdapat beberapa bukti bahwa olahraga dapat meningkatkan kapasitas pembuluh darah untuk dilatasi sehingga dinding pembuluh darah lebih konsisten dan kemampuan untuk memberikan oksigen ke otot lebih baik. menurut penelitian, pasien serangan jantung yang berpartisipasi dalam program olahraga, angka mortalitasnya berkurang dari 20% menjadi 25% (Jonathan Myers,2003).

j. Stress

Stress adalah suatu hal yang membuat anda tegang, marah, frustrasi atau tidak bahagia. Terlalu banyak stress akan mempengaruhi kesehatan dan kesejateraan kita banyak anggota tubuh bisa berpengaruh akibat stress, sehingga rentan menderita fisik ataupun mental. Meningkatnya produksi hormon adrenalin dan kortisol yang merupakan efek stress sehingga hormon itu pula yang menyebabkan perubahan dalam jantung, tekanan darah dan metabolisme tubuh .

C. Shalat tahajjud dan puasa sunnah terhadap faktor risiko Penyakit Jantung Koroner

1. Shalat tahajjud

Desertasi dengan judul “Pengaruh Sholat Tahajjud terhadap Peningkatan Perubahan Respon Ketahanan Tubuh Imunologik: Suatu Pendekatan Psikoneuroimunologi” oleh Prof.Dr.Muhammad Sholeh, dosen IAIN Surabaya yang melibatkan 41 responden siswa SMU Luqman Hakim Pondok Pesantren Hidayatullah, Surabaya. Dari 41 siswa, hanya 23 yang sanggup menjalankan sholat tahajjud selama 1 bulan penuh. Setelah diuji lagi, tinggal 19 siswa yang bertahan sholat tahajjud selama 2 bulan. Sholat tahajjud dimulai pukul 2.00 – 3.00 WIB sebanyak 11 roka’at, dengan dua roka’at sebanyak 4 kali dan ditutup sholat witr sebanyak 3 roka’at.

Selanjutnya, hormon kortisol (hormon stress) dari 19 siswa tersebut diperiksa di 3 laboratorium di Surabaya (Pramitha, Prodia, dan Klinika). Apa yang terjadi? Para siswa yang sholat tahajjud dengan rutin dan ikhlas berbeda dengan siswa yang tidak melaksanakan sholat tahajjud. Mereka yang melaksanakan sholat tahajjud tersebut memiliki kadar hormon kortisol yang rendah. Hal ini menandakan mereka memiliki ketahanan tubuh yang kuat dan

kemampuan individu yang tangguh sehingga mampu menanggulangi masalah-masalah sulit dengan lebih stabil.

Hormon kortisol adalah salah satu hormon stress. Kadar hormon ini semakin tinggi ketika kita dalam keadaan stress. Dengan kadar hormon yang tinggi kita lebih mudah berbuat salah, sulit berkonsentrasi, dan daya ingat kita kurang baik. Hormon ini oleh pakar kesehatan dijadikan tolak ukur untuk tingkat/derajat stress seseorang. Makin stress seseorang, maka hormon kortisol semakin tinggi dalam darahnya. Hormon kortisol memiliki kadar tertinggi di waktu tengah malam hingga waktu pagi, terutama pagi-pagi sekali (normal di pagi hari berkisar 38-690 mmol/liter, sedangkan malamnya 69-345 mmol/liter).

Stress dan depresi menjadi penyakit yang lazim di zaman sekarang ini. Stress sebenarnya keadaan yang positif bagi kita jika digunakan dalam keadaan yang masih wajar. Jika berlebihan, maka kadar hormon adrenalin dan hormon kortisol akan meningkat sehingga mengganggu sistem kekebalan tubuh yang akhirnya kita mudah terkena infeksi, penyakit maag, asma, dan memperburuk penyakit degeneratif kronis salah satunya adalah penyakit jantung sebab hormon adrenalin menyebabkan aliran darah akan lebih cepat yang secara otomatis membuat kerja jantung lebih cepat.

2. Puasa sunnah

Secara bahasa puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Pengertian lain menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, satu hari lamanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Dalam islam puasa dilakukan pada bulan Ramadhan maupun puasa sunnah di luar Ramadhan membuat kita bisa

menjadi lebih takwa dan lebih sabar. Bila yang halal saja dapat kita tahan dengan puasa, apalagi yang haram (musfah, 2004).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah ra, katanya Rasullullah bersabda:

“Setiap amal anak Adam teruntut baginya kecuali puasa, puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku akan memberinya pahala. Puasa itu periasi apabila kamu puasa janganlah merusak puasa mu itu dengan senggama dan jangan menghina orang. Apabila kamu yang dihina atau dipukul, maka katakanlah “aku puas. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada ditangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum disisi Allah di hari kiamat kelak daripada bau kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada sua kegembiraan. Apabila dia berbuka dia berbahagia dengan bukaannya dan apabila dia menemui Tuhannya (meninggal) dia gembira dengan puasanya” (Muslim:hadis 1117).

Dengan menjalankan puasa, berarti suatu aktivitas fisik dan biologis, usaha untuk mengatur dan memperbaiki metabolisme tubuh. Hal ini dapat dimengerti, karena pelaksanaan puasa mengajarkan dan melatih tubuh secara disiplin untuk makan dan minum secara tidak berlebihan dan mengatur kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Dengan demikian, maka puasa akan memberi manfaat kesehatan bagi orang yang menjalankannya.

Berpuasa akan melatih seseorang untuk hidup teratur dan disiplin serta mencegah kelebihan makan. Menurut penelitian, puasa akan menyehatkan tubuh, sebab makanan berkaitan erat dengan proses metabolisme tubuh. Saat berpuasa, karena ada fase istirahat setelah fase pencernaan normal, yang diperkirakan 6 sampai 8 jam, maka pada fase tersebut terjadi degradasi dari lemak dan glukosa darah.

Pada umumnya munculnya berbagai macam penyakit yang menimpa banyak manusia, lebih-lebih di zaman modern sekarang ini, lebih banyak disebabkan oleh keresahan, kegelisahan, ketegangan jiwa, stres berat, dan juga akibat pola makan yang tidak baik dan tidak benar. Apalagi makan dan minum yang berlebih-lebihan. Sedang keresahan, kegelisahan, ketegangan

jiwa, stres berat akan menyebabkan saraf menjadi tegang dan meningkatnya kekalutan, kemudian mempengaruhi saraf-saraf lambung, dan seringkali menyebabkan sulitnya pencernaan, luka lambung (maag), denyut jantung tidak normal, sukar tidur, dan pusing-pusing (Djufri., 2010).

Demikian pula dengan peningkatan *High Density Lipoprotein* (HDL) dan *lipoprotein alfa 1*, dan penurunan *Low Density Lipoprotein* (LDL), hal ini sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sebab, HDL berefek baik bagi *kardiovaskuler*, sedangkan LDL berefek negatif bagi kesehatan pembuluh darah (Ikrar, 2012).

Penelitian *endokrinologi* menunjukkan bahwa pola makan saat puasa yang bersifat *roratif* menjadi beban dalam akumulasi makanan di dalam tubuh. Keadaan ini mengakibatkan pengeluaran hormon sistem pencernaan, seperti *amylase*, *pangkrease*, dan *insulin* dalam jumlah besar, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan tubuh. Dengan demikian, puasa bermanfaat menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah. Itulah sebabnya, puasa sangat dianjurkan bagi perawatan mereka yang menderita penyakit diabetes, kolesterol tinggi, kegemukan, dan hipertensi (Ikrar, 2012)

D. Patofisiologi Penyakit Jantung Koroner

Ateroklerosis pada arteri koroner jantung merupakan awal mula terjadinya penyakit jantung koroner. Proses pembentukan aterosklerosis tersebut dimulai dengan terjadinya endotel pembuluh darah yang disebabkan oleh hipertensi, zat nikotin pada pembuluh darah dan diabetes mellitus (LS, 2011).

Setelah cedera endotel, terjadi beberapa proses antara lain:


1. Akumulasi Lipoprotein pada tunika intima pembuluh darah. LDL yang masuk akan teroksidasi didalamnya.
2. Stress oksidatif, termasuk konstituen dari LDL – teroksidasi menginduksi sitokin lokal.
3. Sitokin tersebut meningkatkan ekspresi dari molekul adhesi yang mengikat leukosit pada endotel dan molekul kemoatrakan yang secara langsung membantu migrasi leukosit ke dalam tunika intima.
4. Setelah masuk dinding arteri, monosit darah mendapatkan stimulus dari macrophage colony stimulating faktor yang meningkatkan ekspresi dari reseptor scavenger.
5. Reseptor scavenger membantu makrofag untuk fagositosis LDL- terosidasi dan nantinya membentuk sel busa.
6. Migrasi sel otot ke tunika intima dari tunika media. Terjadi penebalan dinding pembuluh darah.
7. Sel otot polos mengalami proliferasi dan terjadi pembentukan matriks ekstraseluler.
8. Pada tahap berikutnya, klasifikasi dapat terjadi dan fibrosis dapat terus berlanjut, kadang disertai dengan kematian sel otot polos yang nantinya terbentuk kapsul fibrosa atau disebut plak fibrosa.

Plak yang terbentuk pada arteri koroner membuat lumen pembuluh darah menyempit sehingga asupan oksigen otot jantung untuk berkontraksi menurun dan menimbulkan rasa tidak nyaman yang sering disebut sebagai nyeir dada dan biasanya muncul saat beraktivitas dan stress emosional. Keadaan tersebut sering disebut juga stable angina pectoris sebagai manifestasi dari penyakit iskemik (LS, 2011).

Plak fibrosa yang bisa terbentuk adalah plak yang stabil dan yang rentan. Plak fibrosa yang stabil mengandung lipid yang sedikit dan kapsul fibrosa yang tebal, sedangkan plak yang rentan mengandung lipid yang banyak dan kapsul fibrosa yang tipis sehingga lebih rentan pula untuk mengalami ruptur. Ruptur plak yang aterosklerotik akan mengaktifkan agregasi platelet yang nantinya aktivasi faktor pembekuan darah dan membentuk trombus di dalam lumen pembuluh darah (LS, 2011).

Sumbatan trombus yang terdapat dalam pembuluh darah akan menyebabkan ketidak seimbangan suplai oksigen dan kebutuhannya. Bentuk dari sindrom koroner akut bergantung derajat obstruksi koroner. Sindrom koroner akut adalah sekumpulan gejala klinis yang sesuai dengan iskemia miokard akut dan yang termasuk ke dalam SKA adalah unstable angina non ST-segment elevation myocardial infarction dan *ST-segment elevation myocardial infarction*.

Obstruksi trombus yang parsial akan menimbulkan gejala dari UAP, sedangkan obstruksi trombus yang timbul akan menyebabkan infark pada miokard. STEMI dan NSTEMI termasuk kedalam infark miokard tetapi hanya dapat dibedakan jika sudah dilakukan pemeriksaan EKG yaitu didapatkan elevasi dari ST-Segment. NSTEMI dan UAP dapat dibedakan dengan terdapat biomarker jantung, pada NSTEMI didapatkan biomarker jantung (Creatine Kinase-MB, troponinT, troponin I) yang meningkat (Kumar A, 2009).

Patofisiologi

Bagan 2.1 Patofisiologi PJK

E. Framingham Risk Score

1. Framingham risk score

Framingham risk score adalah salah satu skoring yang digunakan untuk mengetahui faktor risiko klasik penyakit kardiovaskuler seperti usia jenis kelamin, kadar kolesterol, tekanan darah, diabetes mellitus, merokok, obesitas.

Parameter-parameter diatas diberikan *score/poin* sesuai kriteria *Framingham risk score*, kemudian dijumlahkan. Total poin dari penjumlahan tersebut dapat menunjukkan besarnya tingkatan risiko penyakit jantung koroner dalam jangka waktu 10 tahun kedepan. Faktor risiko tersebut dapat dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi (De Ruijter,dkk 2009).

2. Perhitungan Framingham Risk Score

Dalam jangka waktu 2 dekade terakhir, sangat mungkin untuk memprediksi risiko penyakit jantung koroner dengan menggunakan perhitungan yang berdasarkan studi observasi. Perhitungan tersebut menggunakan usia, jenis kelamin, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, merokok dan diabetes berdasarkan tabel dibawah. Individu dengan *score* $\leq 10\%$ memiliki risiko rendah, *score* antara 10%-20% memiliki risiko sedang dan $\geq 20\%$ memiliki risiko tinggi terkena penyakit jantung koroner (De Ruijter,dkk 2009).

Tabel 2.3 Lembar risiko penyakit jantung koroner

FRAMINGHAM RISK SCORE (FRS)				
Estimation of 10-year Cardiovascular Disease (CVD) Risk				
Step 1¹				
<i>In the "points" column enter the appropriate value according to the patient's age, HDL-C, total cholesterol, systolic blood pressure, and if they smoke or have diabetes. Calculate the total points.</i>				
Risk Factor	Risk Points		Points	
	Men	Women		
Age				
30-34	0	0		
35-39	2	2		
40-44	5	4		
45-49	7	5		
50-54	8	7		
55-59	10	8		
60-64	11	9		
65-69	13	10		
70-74	14	11		
75+	15	12		
HDL-C (mmol/L)				
>1.6	-2	-2		
1.3-1.6	-1	-1		
1.2-1.3	0	0		
0.9-1.2	1	1		
<0.9	2	2		
Total Cholesterol				
<4.1	0	0		
4.1-5.2	1	1		
5.2-6.2	2	3		
6.2-7.2	3	4		
>7.2	4	5		
Systolic Blood Pressure (mmHg)	Not Treated	Treated	Not Treated	Treated
<120	-2	0	-3	-1
120-129	0	2	0	2
130-139	1	3	1	3
140-149	2	4	2	5
150-159	2	4	4	6
160+	3	5	5	7
Diabetes	Yes	3	4	
	No	0	0	
Smoker	Yes	4	3	
	No	0	0	
Total Points				

¹ Adapted from: D'Agostino RB et al. (1). General cardiovascular risk profile for use in primary care. The Framingham Heart Study. *Circ* 2008;117:743-53.

² Adapted from: Genest J et al. (2). 2009 Canadian Cardiovascular Society/Canadian guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease in the adult. *Can J Cardiol*. 2009;25(10):987-979.

³ Adapted from: Anderson T et al. (3). 2012 Update of the Canadian Cardiovascular Society guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia for the prevention of cardiovascular disease in the adult. *Can J Cardiol*. 2013;29(2):151-167.

Step 2¹

Using the total points from Step 1, determine the 10-year CVD risk* (%).

Total Points	10-Year CVD Risk (%) ²	
	Men	Women
-3 or less	<1	<1
-2	1.1	<1
-1	1.4	1.0
0	1.6	1.2
1	1.9	1.5
2	2.3	1.7
3	2.8	2.0
4	3.3	2.4
5	3.9	2.8
6	4.7	3.3
7	5.6	3.9
8	6.7	4.5
9	7.9	5.3
10	9.4	6.3
11	11.2	7.3
12	13.3	8.6
13	15.8	10.0
14	18.4	11.7
15	21.6	13.7
16	25.3	15.9
17	29.4	18.5
18	>30	21.5
19	>30	24.8
20	>30	27.9
21+	>30	>30

* Double cardiovascular disease risk percentage for individuals between the ages of 30 and 55 without diabetes if the presence of a positive history of premature cardiovascular disease is present in a first-degree relative before 55 years of age for men and before 65 years of age for women. This is known as the modified Framingham Risk Score.³

Step 4^{2,3}

Using 10-year CVD risk from Step 2, determine if patient is Low, Moderate or High risk.⁴

Indicate Lipid and/or Apo B targets

Risk Level ⁴	Initiate Treatment If:	Primary Target (LDL-C)	Alternate Target
High FRS $\geq 20\%$	• Consider treatment in all (Strong, High)	• ≤ 2 mmol/L or $\geq 50\%$ decrease in LDL-C (Strong, Moderate)	• Apo B ≤ 0.8 g/L or • Non-HDL-C ≤ 2.6 mmol/L (Strong, High)
Intermediate FRS 10-19%	• LDL-C ≥ 3.5 mmol/L (Strong, Moderate) • For LDL-C < 3.5 mmol/L, consider if: • Apo B ≥ 1.2 g/L • OR Non-HDL-C ≥ 4.3 mmol/L (Strong, Moderate)	• ≤ 2 mmol/L or $\geq 50\%$ decrease in LDL-C (Strong, Moderate)	• Apo B ≤ 0.8 g/L or • Non-HDL-C ≤ 2.6 mmol/L (Strong, Moderate)
Low FRS $< 10\%$	• LDL-C ≥ 5.0 mmol/L • Familial hypercholesterolemia (Strong, Moderate)	• $\geq 50\%$ decrease in LDL-C (Strong, Moderate)	N/A
Lipid targets LDL-C: _____ or Apo B: _____			

⁴ Consider moving some patients with metabolic syndrome up a risk level based on their 'load' of metabolic risk factors or the 'severity' of

Step 3¹

Using the total points from Step 1, determine heart age (in years).

Heart Age, y	Men	Women
<30	<0	<1
30	0	
31		1
32	1	
34	2	2
36	3	3
38	4	
39		4
40	5	
42	6	5
45	7	6
48	8	7
51	9	8
54	10	
55		9
57	11	
59		10
60	12	
64	13	11
68	14	12
72	15	
73		13
75	16	
79		14
>80	≥ 17	15+

F. Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner dalam Pandangan Islam

Pada hakikatnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik baik bentuk dan fungsi, hal ini tertera QS Al-Tin (95) : 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٢﴾
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ﴿٤﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:598).

Profesor Doktor Hamka telah menjelaskan dalam Tafsir Al-Azhar bahwa diantara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, baik bentuk lahir maupun bentuk batin, bentuk tubuh dan bentuk nyawa. Maka dengan keseimbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada akalnya itu dapatlah di bumi ia hidup sebagai pengatur (Prof Hamka, 1985:206).

Tafsir diatas menegaskan bahwasanya manusia diciptakan dalam bentuk sebaik baiknya termasuk bentuk tubuh serta telah diciptakan di muka bumi sebagai pengatur, dalam hal ini bentuk dan fungsi jantung telah Allah ciptakan secara sempurna sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas

dengan keadaan sehat wal afiat. Hal ini pula terdapat dalam Qalam Allah swt di Qs. Al-Israa (17): 70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Terjemahnya:

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:290).

Telah dijelaskan oleh Profesor Doktor Hamka dalam tafsir Al-Azhar bahwa banyak sekali kemuliaan yang telah Allah berikan kepada anak Adam yang terutama ialah diberikan akal pikiran. Ad-Dhahak berkata “manusia pandai berkata kata dan membedakan” (Prof Hamka, 1985:101).

Jadi segala kemuliaan yang telah Allah berikan harus di jaga dengan baik apalagi manusia telah diberi akal dan pikiran sehingga dapat membedakan yang baik atau yang buruk. Begitu pula tentang perilaku yang harus dilakukan dan harus dihindari agar terhindar dari penyakit jantung koroner salah satunya dengan menjauhi faktor risiko penyakit jantung koroner. Akan tetapi tidak sedikit manusia yang mendzolimi diri sendiri dengan melakukan perkara yang merupakan faktor risiko PJK sehingga menjadi penyebab terjadinya penyakit jantung koroner, seperti:

a. Kolesterol/hiperlipidemia dan obesitas

Kolesterol merupakan kadar lemak dalam darah yang bila berlebih disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri yang tak dapat menahan hawa

nafsunya sehingga mengkonsumsi makanan atau minuman secara berlebih, sedangkan Allah swt sudah melarangnya dalam Qalamnya di Qs. Al' Araf (7); 31

﴿ يَبْنِي ۚءَادَمَ حُدُوا زَيْتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا

تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksud dari ayat di atas “ janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan” sebab tubuh mempunyai batas / kadar kemampuan dalam mencerna makanan” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:155).

Dijelaskan dari Ibnu Abbas dalam Asbabun Nuzul Al-Qur’an bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang perempuan di zaman jahiliah yang melakukan tawaf dengan tanpa pakaian kecuali secarik kain yang menutupi kemaluannya lalu berteriak bahwa hari ini kuhalalkan semua yang ada ditubuhku kecuali yang kututupi ini (HR.Muslim, Al-Qur’an dan terjemahan, 2013:155).

Dalam tafsir oleh Profesor Doktor Hamka terdapat penjelasan oleh Ibnu abbas yang menjelaskan bahwa ”Makanlah apa yang kau suka, minumlah apa yang kau suka, tetapi jangan memakan yang dua yakni sombong dan boros”. Berlebih-lebihan atau boros ialah melampaui batas yang patut. Makanlah sampai kenyang, setelah kenyang berhentilah, jangan diteruskan juga karena selera selalu terbuka (Prof Hamka, 1985:250).

Disini telah di jelaskan bahwa makanlah tetapi berhentilah apabila tubuh sudah merasakan kenyang, sebab tubuh mempunyai kadar atau batas yang dapat dicerna sama halnya zat makanan.

Dan mengenai kadar suatu zat yang sebaiknya masuk dalam tubuh pun sebelumnya sudah terdapat dalam hadist Rasulullah yang berbunyi :

الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيُّ قَالَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ « مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَرًّا
 مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكَلَتْ (و
 اللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَةَ "لُقَيْمَاتٌ") يُقِمْنَ
 صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٍ
 وَثُلُثُ شَرَابٍ وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ »

Artinya :

Al-Miqdam bin Ma'dikarib al-Kindi berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seorang anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah anak Adam makanan (dalam redaksi Ibn Majah "suapan-suapan kecil") yang menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih dari itu maka sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga udara." (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Hibban dan al-Hakim).

Hadis ini dicantumkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Jâmi' al 'Ulûm wa al-Hikam, hadis ke-47, melengkapi Arba'un an-Nawawiyah menjadi 50 hadis. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini di dalam as-Sunan pada bab Mâ Jâ'a fî Karâhiyati Katsrah al-Akli (Riwayat Tentang Kemakruhan Banyak Makan). At-Tirmidzi berkata, "Hadis ini hasan shahih."

Ibn Majah meriwayatkan hadis ini dalam as-Sunan pada bab al-Iqtishâd fî al-Akli wa Karâhiyati asy-Syiba' (Sederhana dalam Makan dan Kemakruhan Kenyang). Hadis ini merupakan salah satu pokok adab dalam makan. Hadis ini secara garis besar memberikan tiga pelajaran *Pertama*: Rasul saw. menyatakan, “Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut.” Rasul saw. menyerupakan perut sebagai *wi'â'un*, yaitu tempat meletakkan sesuatu. Seburuk-buruk wadah yang dipenuhi adalah perut. Sebab dalam hal itu ada *at-tukhmah* (pencernaan yang buruk) dan menjadi sebab terjadinya bermacam penyakit; juga karena mewariskan kemalasan, lemah dan ingin rehat terus.

Pengarang *Bariqah Mahmûdiyyah fî Syarh Thariqah Muhammadiyyah wa Syari'ah Nabawiyyah* menjelaskan, “Rasul menjadikan perut seburuk-buruk wadah sebab sering digunakan pada yang tidak seharusnya untuknya. Perut diciptakan untuk menguatkan punggung dengan makanan, sementara memenuhi perut akan menyebabkan kerusakan agama dan dunia sehingga menjadi keburukan. Kenyang itu (bisa) menyimpangkan dari kebenaran, didominasi oleh kemalasan sehingga menghalangi pemiliknya dari beribadah, memperbanyak materi-materi yang lebih, banyak kemarahan, syahwatnya dan ambisinya meningkat sehingga menjerumuskan dirinya mencari apa yang melebihi kebutuhan.”

Kedua, Rasul saw. menyatakan, “Cukuplah untuk anak Adam sekadar makanan yang menegakkan tulang punggungnya.” Penyebutan *tulang punggung* menggunakan *uslub* menyebut sebagian yang dimaksudkan keseluruhan. Jadi, yang dimaksudkan adalah punggung seluruhnya, atau lebih umum lagi seluruh badan, sebab punggung adalah penopang badan.

Dalam hadis ini, Rasul saw. menganjurkan untuk sedikit makan, yakni makan sekadarnya saja untuk bisa menopang badan agar tetap bisa tegak dan melakukan aktivitas yang diperintahkan syariah. Anjuran ini juga tampak dalam redaksi Ibn Majah yang menggunakan kata “*luqaymât*” yang merupakan kata plural dengan bentuk isim *tashghîr* dari *luqmatun*. Makna sabda Rasul saw. itu, bahwa cukuplah untuk anak Adam makanan yang dengan itu ia tetap hidup sehat untuk menjalankan aktivitas ketaatan. Itulah makna sabda beliau “*yuqimna shulbahu* (menegakkan tulang punggungnya).” Yang demikian itu merupakan dorongan agar sedikit makan dan tidak banyak makan. Dengan begitu manusia itu ringan, tangkas, giat dan selamat dari bermacam penyakit yang muncul dari banyak makan.

Ketiga: Rasul saw menyatakan, “Jika harus lebih dari itu maka sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga untuk udara.” Maksudnya, jika orang tidak cukup dengan makanan yang cukup menegakkan punggungnya dan harus tambah dari kadar itu maka hendaklah ia mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiganya dengan minuman dan sepertiganya untuk udara yang memungkinkan dirinya bernafas dengan mudah.

Kenyang hukumnya mubah. Dalam beberapa riwayat, Rasul saw. pernah makan hingga kenyang dan membiarkan para sahabat makan hingga kenyang. Namun, bagi Rasul saw. dan para sahabat, kenyang tidak menjadi kebiasaan. Mereka sering tidak sampai kenyang, meski juga tidak kelaparan.

Dalam hadist diatas telah mengatur bahwa tubuh memiliki batas kadar yang dapat diterima untuk dimetabolisme adalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas yang apabila berlebih akan mengakibatkan

efek negatif bagi tubuh salah satunya adalah menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner yakni obesitas ataupun kolesterol.

b. Hipertensi

Gejala Hipertensi sering juga diawali amarah, sedangkan amarah sangat dilarang dalam agama sebagaimana yang tertera dalam Qs.Al-Imran(3): 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya :

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2013; 68).

Dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dalam dari ayat diatas yakni apabila marah mereka berusaha menahan dan menutupinya, tidak melampiaskannya. Mereka memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya (Ibnu Katsir, 2009: 727). Menahan amarah memang sulit namun bukankah Rasulullah telah bersabda bahwa orang yang paling kuat bukanlah orang yang pandai bergulat atau hal yang semisalnya, namun orang yang kuat menurut Rasulullah adalah orang yang mampu menahan amarahnya.

c. Merokok

Dipahami dari penjelasan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mizbah tentang makanan yang batil dalam ayat ini adalah makanan yang dapat merugikan diri sendiri salah satu di antaranya adalah Rokok. Dan hal ini didukung dalam ayat QS. Al-fathir(35):32

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ^ط فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
 وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ^ج بإِذْنِ اللَّهِ ^ح ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
 الْكَبِيرُ

Terjemahnya :

“Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebajikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:439).

Menurut imam Ibnu Kasir, kalimat mendzalimi diri sendiri pada ayat di atas adalah mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan keburukan, tidak perhatian dalam melaksanakan kewajiban serta melakukan sesuatu yang diharamkan (Ibnu kasir, 2009:190).

Sama halnya dengan rokok yang mengandung banyak racun yang dapat merusak tubuh sehingga secara tidak langsung mereka mendzalimi tubuh mereka yang sehat dengan mengkonsumsi rokok yang mengandung sangat banyak racun sehingga dapat dengan mudahnya racun penyebab PJK masuk kedalam tubuh yang sebelumnya sehat sehingga seseorang dapat menderita penyakit jantung koroner.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial. Melalui Ijtima Ulama komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III, 24-26 januari 2009, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil dan merokok ditempat umum. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Peran fatwa MUI tentang pengharaman rokok, merupakan implementasi kepedulian islam akan arti pentingnya kesehatan bagi warga yang berada di wilayah indonesia walaupun akan berdampak langsung bagi ekonomi dan sosial bangsa indonesia.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penyakit Jantung Koroner

Jantung manusia berukuran segenggam tangan kirinya. Jantung berdenyut rata rata 80x permenit, 100.000x per hari dan 40 juta kali pertahun. Jantung memompa darah dan melalui arteri didistribusikan ke seluruh tubuh untuk kemudian kembali ke jantung (Rilantono,2013:29).

Sistem kardiovaskuler sering disebut sistem sirkulasi merupakan sistem yang kompleks dengan banyak fungsi. Jantung, pembuluh darah, pembuluh limfe dan darah adalah komponennya. Tugas sistem sirkulasi adalah membawa oksigen dan nutrien serta hormon dan lain lain ke sel sel tubuh serta mengambil karbondioksida dan sisa produk metabolisme keluar sel (Rilantono,2013:29).

Definisi Penyakit Jantung Koroner merupakan kelainan pada satu atau lebih pembuluh darah arteri koroner dimana terdapat penebalan dalam dinding pembuluh darah disertai adanya plak yang mengganggu aliran darah ke otot jantung yang akibatnya dapat mengganggu fungsi jantung (AHA, 2015).

Penyakit jantung koroner disebabkan karena sumbatan plak ateroma pada arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri yang memasok nutrisi dan oksigen ke ke otot jantung atau miokard (Rilantono,2013:121).

B. Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner

Berbagai faktor Risiko ditengarai mendorong terjadinya Penyakit Jantung Koroner, sebagian dapat dimodifikasi dan sebagaianya lagi tidak dapat dimodifikasi.

1. Faktor Risiko yang tidak dapat dimodifikasi

a. Usia

Banyak yang telah membuktikan adanya hubungan antara usia dan kematian akibat Penyakit jantung koroner. Sebab seiring peningkatan usia, kejadian aterosklerotik semakin mudah terjadi. Sekitar 82% kejadian PJK pada usia lebih dari 65 tahun akan menyebabkan angka mortalitas pada individu tersebut meningkat karena jantung mengalami perubahan fisiologis bahkan tanpa ada penyakit sebelumnya (AHA,2014).

b. Jenis Kelamin

Wanita usia paruh baya mungkin lebih sering mengalami PJK dibandingkan pria. Perbedaan ini berkurang secara progresif setelah menopause dan ini terjadi terutama dalam peran estrogen. Kerja estrogen yang berpotensi menguntungkan adalah sebagai antioksidan, menurunkan LDL dan meningkatkan HDL, menstimulasi ekspresi dan aktivitas oksida nitrat sintase, serta menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan produksi plasminogen (Philip I dkk,2008:75).

c. Riwayat Keluarga Menderita penyakit Jantung Koroner

Berbagai survei epidemiologi telah menunjukkan adanya predisposisi familial terhadap penyakit jantung koroner .hal ini disebabkan karena banyak faktor risiko Penyakit Jantung koroner misalnya hipertensi memiliki dasar genetik multifaktorial (akibat gen abnormal multipel yang berinteraksi dengan pengaruh lingkungan). Pengaruh genetik tambahan yang membahayakan mungkin juga terlibat karena predisposisi familial tetap ada bila data epidemiologis dikoreksi terhadap faktor risiko yang telah diketahui. Angka kejadian meningkat pada pasien dengan riwayat infark miokard pada

ayah atau saudara laki laki sebelum usia 55 tahun dan ibu atau saudara perempuan sebelum usia 65 tahun (Philip I dkk,2008:75).

Menurut data dari AHA, angka kejadian mortalitas juga meningkat pada pasien yang memiliki African American. Selain itu, risiko PJK juga lebih tinggi pada beberapa orang America Meksiko, Indian American, Hawaii dan beberapa orang America Asia (AHA,2014).

d. Ras

Pada kelompok masyarakat kulit putih maupun kulit berwarna, laki laki mendominasi kematian akibat PJK, tetapi lebih nyata pada kulit putih dan lebih sering pada usia muda daripada usia lebih tua. Omset PJK pada kulit putih umumnya 10 tahun lebih lambat dibanding pria kulit berwarna dan pada wanita kulit berwarna lebih lambat sekitar 7 tahun (AHA,2014). Insidensi kematian dini akibat PJK pada orang Asia yang tinggal di Inggris lebih tinggi dibandingkan dengan populasi lokal dan juga angka rendah pada Ras Afri-Karibia (AHA,2014).

2. Faktor Risiko yang dapat dimodifikasi

a. Pendidikan

Menurut Apriadji 1986 seorang tamatan Sekolah dasar belum tentu kurang mampu menyusun makanan yang memenuhi syarat gizi di bandingkan dengan orang lain yang pendidikannya lebih tinggi. Namun, factor Pendidikan dapat menentukan mudah tidaknya seseorang dalam memahami dan memenuhi kebutuhan diri untuk hidup sehat.

b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat aktivitas fisik seseorang. Pekerjaan atau profesi yang lebih menuntut penggunaan aktivitas fisik, misalnya tukang bangunan, tukang becak dan sebagainya, selalu memacu

denyut jantung lebih dan tidak memacu seseorang untuk berpeluang kegemukan. Sebaliknya pada pekerjaan atau profesi yang banyak menuntut optimalisasi mental atau bekerja dibelakang meja akan memacu peluang kegemukan serta aktivitas jantung lebih kurang. Aktivitas kerja dikantor yang hanya berputar putar dari satu rapat ke rapat lain sepanjang hari mengakibatkan minimnya keluaran energi sehingga dapat meningkatkan kejadian kegemukan yang menjadi pemicu kejadian jantung koroner.

c. Pola Makan

Faktor makanan memegang peranan penting terhadap gaya hidup di Indonesia, terutama diperkotaan. Pengetahuan akan kesehatan yang minimberakibat pada perilaku konsumsi yang tidak sehat. Salah satunya makan makanan berlemak baik dari jenis *fastfood* ataupun *junkfood*. Makanan berlemak mengandung lebih banyak kalori dibandingkan dengan protein dan akan memberikan sumbangan energi yang lebih besar, hal ini tentu menjadi pemicu untuk mengalami obesitas dan hiperlipidemia sehingga menjadi pemicu terjadinya penyakit jantung koroner.

d. Diabetes Mellitus

Merupakan penyakit metabolik yang terdapat pada kira-kira 5% populasi. Orang dengan diabetes kekurangan insulin secara keseluruhan atau menjadi resisten terhadap kerjanya. Kondisi resistensi insulin yang terjadi biasanya pada usia dewasa di sebut diabetes meliitus tipe 2. Diabetes menyebabkan kerusakan progresif terhadap susunan mikrovaskuler yang lebih besar selama bertahun tahun. Kira kira 75% pasien diabetik akhirnya meninggal dengan penyakit jantung koroner.

Terdapat bukti bahwa pasien DM tipe 2 mengalami kerusakan endotel maupun peningkatan kadar LDL teroksidasi. Kedua efek tersebut mungkin

merupakan akibat dari mekanisme yang terkait dengan hiperglikemia yang khas pada kondisi ini. Selain itu koagulabilitas darah meningkat pada DM2 karena peningkatan plasminogenaktivator inhibitor dan peningkatan kemampuan agregasi trombosit (Philip I dkk, 2008:75).

e. Hipertensi

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 mmHg, terjadi pada 25% populasi. Hipertensi memacu adanya aterosclerosis. Kemungkinan dengan merusak endotel dan menyebabkan efek berbahaya lain pada dinding arteri besar. Hipertensi merusak pembuluh darah otak dan ginjal. Semakin tinggi beban kerja jantung yang ditambah dengan tekanan arteri yang meningkat juga menyebabkan penebalan dinding ventrikel kiri, hal ini disebut hipertrofi ventrikel kiri merupakan penyebab sekaligus penanda kerusakan kardiovaskuler yang lebih serius. Hipertrofi ventrikel kiri menjadi predisposisi bagi biokardium untuk mengalami aritmia dan iskemia dan merupakan kontributor utama terjadinya gagal jantung, infark miokard dan kematian mendadak (Philip I dkk, 2008:75).

f. Merokok

Merokok tembakau menyebabkan penyakit jantung koroner dengan menurunkan kadar HDL, meningkatkan koagulabilitas darah dan merusak endotel sehingga memacu terjadinya aterosclerosis. Selain itu, terjadi pula stimulasi jantung yang diinduksi nikotin serta penurunan kapasitas darah pengangkut oksigen yang dimediasi oleh karbon monoksida. Efek ini bersamaan dengan peningkatan kejadian spasme koroner, menentukan tingkatan iskemia jantung dan infark miokard. Bukti epidemiologis menyebutkan bahwa risiko kardiovaskuler tidak menurun dengan rokok yang memiliki kadar tar rendah (Philip I dkk, 2008:75).

Orang yang merokok lebih dari 20 batang perhari dapat mempengaruhi atau memperkuat efek faktor utama risiko lainnya. Penelitian *framingham* mendapatkan kematian mendadak akibat PJK pada laki laki perokok 10 kali lebih berisiko dari pada laki laki bukan perokok.

Efek rokok terhadap peningkatan risiko PJK sering dijumpai apabila telah mengkonsumsi rokok lebih dari 25 batang perhari dan risiko tersebut akan semakin meningkat apabila konsumsi dari rokok tersebut juga meningkat. Zat zat kimia dari rokok yang paling kuat efeknya untuk menyebabkan penyakit jantung adalah nikotin, karbon monoksida (CO) dan gas oxidant (Dept. Health human, 2010).

g. Hiperlipidemia

Hiperlipidemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan lipid serum di atas batas normal. Lipid plasma yaitu kolesterol, trigliserida, fosfolipidan asam lemak bebas berasal dari makanan (eksogen) dan dari sintesis lemak (endogen). Dalam aterogenesis, kolesterol dan trigliserida adalah lipid yang paling berperan. Lipid plasma tidak dapat beredar bebas dalam darah sehingga dibutuhkan protein yang disebut lipoprotein. Lipoprotein terbagi menjadi empat kelas didalam darah ,yaitu:

- 1) Kilomikron yang mengandung banyak trigliserida
- 2) Lipoprotein densitas sangat rendah (VLDL) yang kandungannya sama seperti kilomikron
- 3) Lipoprotein densitas Rendah yang kandungan kolesterolnya sangat rendah.
- 4) Lipoprotein densitas tinggi (HDL) yang kandungan proteinnya lebih tinggi dari kolesterol.

Tabel 2.1 Kadar Lipid Serum

Lipid	Optimal (mg/dl)	Borderline (mg/ dl)	Tinggi/sangat tinggi (mg/ dl)
Kolesterol total	<200	200-239	>240
Kolesterol HDL	Laki laki : >40 Perempuan >50		
Kolesterol LDL	<100	100-129	>130
Trigliserida	<150	150-199	>200

Peningkatan kolesterol memiliki hubungan dengan kejadian PJK. Satu pertiga dari penyakit jantung iskemik dikarenakan oleh tingginya kolesterol. secara umum, 2.6 juta kematian didunia disebabkan oleh tingginya kolesterol (Philipi dkk,2008:75).

h. Obesitas

Obesitas adalah keadaan dimana kelebihan kandungan lemak di jaringan adipose sehingga dampaknya adalah peningkatan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang, obesitas dipicu oleh asupan kalori yang keluar sehingga terjadi penumpukan karbohidrat, lemak dan protein pada sel sel adiposit sebagai trigliserida. Untuk obesitas sentral diukur dari lingkar pinggang yang diinterpretasikan jika lingkar pinggang > 90 cm untuk laki laki dan 80 cm untuk perempuan. Obesitas sering menjadi faktor pemicu dari diabetes mellitus, hipertensi, hiperlipidemia sehingga menjadi faktor risiko PJK. Menurut WHO 58% dari diabetes mellitus dan 21% dari penyakit jantung (AHA,2014).

Tabel 2.2 Klasifikasi Kategori IMT untuk Asia (AHA,2014)

IMT (kg/m ²)	Klasifikasi
<18.5	Berat badan kurang
18.5-22.9	Berat badan normal
23.0-24.9	Berat badan lebih dengan risiko
25.0-29.9	Obesitas I
>30.0	Obesitas II

i. Aktivitas Fisik

Olahraga mempunyai banyak efek terhadap beberapa faktor risiko PJK yang dapat diubah. Beberapa contohnya yaitu olahraga dapat menurunkan angka kejadian obesitas, hipertensi, kolesterol total dan LDL, serta meningkatkan kolesterol HDL dan sensitivitas insulin pada orang dengan diabetes (Jonathan Myers,2003).

Manfaat fisiologis dari olahraga adalah perbaikan fungsi dan kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen sehingga ketika kemampuan ini sudah membaik maka ketika melakukan pekerjaan sehari hari hanya akan sedikit merasa kelelahan (Jonathan Myers,2003).

Terdapat beberapa bukti bahwa olahraga dapat meningkatkan kapasitas pembuluh darah untuk dilatasi sehingga dinding pembuluh darah lebih konsisten dan kemampuan untuk memberikan oksigen ke otot lebih baik. menurut penelitian, pasien serangan jantung yang berpartisipasi dalam program olahraga, angka mortalitasnya berkurang dari 20% menjadi 25% (Jonathan Myers,2003).

j. Stress

Stress adalah suatu hal yang membuat anda tegang, marah, frustrasi atau tidak bahagia. Terlalu banyak stress akan mempengaruhi kesehatan dan kesejateraan kita banyak anggota tubuh bisa berpengaruh akibat stress, sehingga rentan menderita fisik ataupun mental. Meningkatnya produksi hormon adrenalin dan kortisol yang merupakan efek stress sehingga hormon itu pula yang menyebabkan perubahan dalam jantung, tekanan darah dan metabolisme tubuh .

C. Shalat tahajjud dan puasa sunnah terhadap faktor risiko Penyakit Jantung Koroner

1. Shalat tahajjud

Desertasi dengan judul “Pengaruh Sholat Tahajjud terhadap Peningkatan Perubahan Respon Ketahanan Tubuh Imunologik: Suatu Pendekatan Psikoneuroimunologi” oleh Prof.Dr.Muhammad Sholeh, dosen IAIN Surabaya yang melibatkan 41 responden siswa SMU Luqman Hakim Pondok Pesantren Hidayatullah, Surabaya. Dari 41 siswa, hanya 23 yang sanggup menjalankan sholat tahajjud selama 1 bulan penuh. Setelah diuji lagi, tinggal 19 siswa yang bertahan sholat tahajjud selama 2 bulan. Sholat tahajjud dimulai pukul 2.00 – 3.00 WIB sebanyak 11 roka’at, dengan dua roka’at sebanyak 4 kali dan ditutup sholat witr sebanyak 3 roka’at.

Selanjutnya, hormon kortisol (hormon stress) dari 19 siswa tersebut diperiksa di 3 laboratorium di Surabaya (Pramitha, Prodia, dan Klinika). Apa yang terjadi? Para siswa yang sholat tahajjud dengan rutin dan ikhlas berbeda dengan siswa yang tidak melaksanakan sholat tahajjud. Mereka yang melaksanakan sholat tahajjud tersebut memiliki kadar hormon kortisol yang rendah. Hal ini menandakan mereka memiliki ketahanan tubuh yang kuat dan

kemampuan individu yang tangguh sehingga mampu menanggulangi masalah-masalah sulit dengan lebih stabil.

Hormon kortisol adalah salah satu hormon stress. Kadar hormon ini semakin tinggi ketika kita dalam keadaan stress. Dengan kadar hormon yang tinggi kita lebih mudah berbuat salah, sulit berkonsentrasi, dan daya ingat kita kurang baik. Hormon ini oleh pakar kesehatan dijadikan tolak ukur untuk tingkat/derajat stress seseorang. Makin stress seseorang, maka hormon kortisol semakin tinggi dalam darahnya. Hormon kortisol memiliki kadar tertinggi di waktu tengah malam hingga waktu pagi, terutama pagi-pagi sekali (normal di pagi hari berkisar 38-690 mmol/liter, sedangkan malamnya 69-345 mmol/liter).

Stress dan depresi menjadi penyakit yang lazim di zaman sekarang ini. Stress sebenarnya keadaan yang positif bagi kita jika digunakan dalam keadaan yang masih wajar. Jika berlebihan, maka kadar hormon adrenalin dan hormon kortisol akan meningkat sehingga mengganggu sistem kekebalan tubuh yang akhirnya kita mudah terkena infeksi, penyakit maag, asma, dan memperburuk penyakit degeneratif kronis salah satunya adalah penyakit jantung sebab hormon adrenalin menyebabkan aliran darah akan lebih cepat yang secara otomatis membuat kerja jantung lebih cepat.

2. Puasa sunnah

Secara bahasa puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Pengertian lain menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, satu hari lamanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Dalam islam puasa dilakukan pada bulan Ramadhan maupun puasa sunnah di luar Ramadhan membuat kita bisa

menjadi lebih takwa dan lebih sabar. Bila yang halal saja dapat kita tahan dengan puasa, apalagi yang haram (musfah, 2004).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah ra, katanya Rasulullah bersabda:

“Setiap amal anak Adam teruntut baginya kecuali puasa, puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku akan memberinya pahala. Puasa itu periasi apabila kamu puasa janganlah merusak puasa mu itu dengan senggama dan jangan menghina orang. Apabila kamu yang dihina atau dipukul, maka katakanlah ‘aku puas. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada ditangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum disisi Allah di hari kiamat kelak daripada bau kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada sua kegembiraan. Apabila dia berbuka dia berbahagia dengan bukaannya dan apabila dia menemui Tuhannya (meninggal) dia gembira dengan puasanya” (Muslim:hadis 1117).

Dengan menjalankan puasa, berarti suatu aktivitas fisik dan biologis, usaha untuk mengatur dan memperbaiki metabolisme tubuh. Hal ini dapat dimengerti, karena pelaksanaan puasa mengajarkan dan melatih tubuh secara disiplin untuk makan dan minum secara tidak berlebihan dan mengatur kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Dengan demikian, maka puasa akan memberi manfaat kesehatan bagi orang yang menjalankannya.

Berpuasa akan melatih seseorang untuk hidup teratur dan disiplin serta mencegah kelebihan makan. Menurut penelitian, puasa akan menyehatkan tubuh, sebab makanan berkaitan erat dengan proses metabolisme tubuh. Saat berpuasa, karena ada fase istirahat setelah fase pencernaan normal, yang diperkirakan 6 sampai 8 jam, maka pada fase tersebut terjadi degradasi dari lemak dan glukosa darah.

Pada umumnya munculnya berbagai macam penyakit yang menimpa banyak manusia, lebih-lebih di zaman modern sekarang ini, lebih banyak disebabkan oleh keresahan, kegelisahan, ketegangan jiwa, stres berat, dan juga akibat pola makan yang tidak baik dan tidak benar. Apalagi makan dan minum yang berlebih-lebihan. Sedang keresahan, kegelisahan, ketegangan

jiwa, stres berat akan menyebabkan saraf menjadi tegang dan meningkatnya kekalutan, kemudian mempengaruhi saraf-saraf lambung, dan seringkali menyebabkan sulitnya pencernaan, luka lambung (maag), denyut jantung tidak normal, sukar tidur, dan pusing-pusing (Djufri., 2010).

Demikian pula dengan peningkatan *High Density Lipoprotein* (HDL) dan *lipoprotein alfa 1*, dan penurunan *Low Density Lipoprotein* (LDL), hal ini sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sebab, HDL berefek baik bagi *kardiovaskuler*, sedangkan LDL berefek negatif bagi kesehatan pembuluh darah (Ikrar, 2012).

Penelitian *endokrinologi* menunjukkan bahwa pola makan saat puasa yang bersifat *roratif* menjadi beban dalam akumulasi makanan di dalam tubuh. Keadaan ini mengakibatkan pengeluaran hormon sistem pencernaan, seperti *amylase*, *pangkrease*, dan *insulin* dalam jumlah besar, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan tubuh. Dengan demikian, puasa bermanfaat menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah. Itulah sebabnya, puasa sangat dianjurkan bagi perawatan mereka yang menderita penyakit diabetes, kolesterol tinggi, kegemukan, dan hipertensi (Ikrar, 2012)

D. Patofisiologi Penyakit Jantung Koroner

Ateroklerosis pada arteri koroner jantung merupakan awal mula terjadinya penyakit jantung koroner. Proses pembentukan aterosklerosis tersebut dimulai dengan terjadinya endotel pembuluh darah yang disebabkan oleh hipertensi, zat nikotin pada pembuluh darah dan diabetes mellitus (LS, 2011).

Setelah cedera endotel, terjadi beberapa proses antara lain:


1. Akumulasi Lipoprotein pada tunika intima pembuluh darah. LDL yang masuk akan teroksidasi didalamnya.
2. Stress oksidatif, termasuk konstituen dari LDL – teroksidasi menginduksi sitokin lokal.
3. Sitokin tersebut meningkatkan ekspresi dari molekul adhesi yang mengikat leukosit pada endotel dan molekul kemoatrakan yang secara langsung membantu migrasi leukosit ke dalam tunika intima.
4. Setelah masuk dinding arteri, monosit darah mendapatkan stimulus dari macrophage colony stimulating faktor yang meningkatkan ekspresi dari reseptor scavenger.
5. Reseptor scavenger membantu makrofag untuk fagositosis LDL- terosidasi dan nantinya membentuk sel busa.
6. Migrasi sel otot ke tunika intima dari tunika media. Terjadi penebalan dinding pembuluh darah.
7. Sel otot polos mengalami proliferasi dan terjadi pembentukan matriks ekstraseluler.
8. Pada tahap berikutnya, klasifikasi dapat terjadi dan fibrosis dapat terus berlanjut, kadang disertai dengan kematian sel otot polos yang nantinya terbentuk kapsul fibrosa atau disebut plak fibrosa.

Plak yang terbentuk pada arteri koroner membuat lumen pembuluh darah menyempit sehingga asupan oksigen otot jantung untuk berkontraksi menurun dan menimbulkan rasa tidak nyaman yang sering disebut sebagai nyeir dada dan biasanya muncul saat beraktivitas dan stress emosional. Keadaan tersebut sering disebut juga stable angina pectoris sebagai manifestasi dari penyakit iskemik (LS, 2011).

Plak fibrosa yang bisa terbentuk adalah plak yang stabil dan yang rentan. Plak fibrosa yang stabil mengandung lipid yang sedikit dan kapsul fibrosa yang tebal, sedangkan plak yang rentan mengandung lipid yang banyak dan kapsul fibrosa yang tipis sehingga lebih rentan pula untuk mengalami ruptur. Ruptur plak yang aterosklerotik akan mengaktifkan agregasi platelet yang nantinya aktivasi faktor pembekuan darah dan membentuk trombus di dalam lumen pembuluh darah (LS, 2011).

Sumbatan trombus yang terdapat dalam pembuluh darah akan menyebabkan ketidak seimbangan suplai oksigen dan kebutuhannya. Bentuk dari sindrom koroner akut bergantung derajat obstruksi koroner. Sindrom koroner akut adalah sekumpulan gejala klinis yang sesuai dengan iskemia miokard akut dan yang termasuk ke dalam SKA adalah unstable angina non ST-segment elevation myocardial infarction dan *ST-segment elevation myocardial infarction*.

Obstruksi trombus yang parsial akan menimbulkan gejala dari UAP, sedangkan obstruksi trombus yang timbul akan menyebabkan infark pada miokard. STEMI dan NSTEMI termasuk kedalam infark miokard tetapi hanya dapat dibedakan jika sudah dilakukan pemeriksaan EKG yaitu didapatkan elevasi dari ST-Segment. NSTEMI dan UAP dapat dibedakan dengan terdapat biomarker jantung, pada NSTEMI didapatkan biomarker jantung (Creatine Kinase-MB, troponinT, troponin I) yang meningkat (Kumar A, 2009).

Patofisiologi

Bagan 2.1 Patofisiologi PJK

E. Framingham Risk Score

1. Framingham risk score

Framingham risk score adalah salah satu skoring yang digunakan untuk mengetahui faktor risiko klasik penyakit kardiovaskuler seperti usia jenis kelamin, kadar kolesterol, tekanan darah, diabetes mellitus, merokok, obesitas.

Parameter-parameter diatas diberikan *score/poin* sesuai kriteria *Framingham risk score*, kemudian dijumlahkan. Total poin dari penjumlahan tersebut dapat menunjukkan besarnya tingkatan risiko penyakit jantung koroner dalam jangka waktu 10 tahun kedepan. Faktor risiko tersebut dapat dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi (De Ruijter,dkk 2009).

2. Perhitungan Framingham Risk Score

Dalam jangka waktu 2 dekade terakhir, sangat mungkin untuk memprediksi risiko penyakit jantung koroner dengan menggunakan perhitungan yang berdasarkan studi observasi. Perhitungan tersebut menggunakan usia, jenis kelamin, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, merokok dan diabetes berdasarkan tabel dibawah. Individu dengan *score* $\leq 10\%$ memiliki risiko rendah, *score* antara 10%-20% memiliki risiko sedang dan $\geq 20\%$ memiliki risiko tinggi terkena penyakit jantung koroner (De Ruijter,dkk 2009).

Tabel 2.3 Lembar risiko penyakit jantung koroner

FRAMINGHAM RISK SCORE (FRS)			
Estimation of 10-year Cardiovascular Disease (CVD) Risk			
Step 1¹			
<i>In the "points" column enter the appropriate value according to the patient's age, HDL-C, total cholesterol, systolic blood pressure, and if they smoke or have diabetes. Calculate the total points.</i>			
Risk Factor	Risk Points		Points
	Men	Women	
Age			
30-34	0	0	
35-39	2	2	
40-44	5	4	
45-49	7	5	
50-54	8	7	
55-59	10	8	
60-64	11	9	
65-69	13	10	
70-74	14	11	
75+	15	12	
HDL-C (mmol/L)			
>1.6	-2	-2	
1.3-1.6	-1	-1	
1.2-1.3	0	0	
0.9-1.2	1	1	
<0.9	2	2	
Total Cholesterol			
<4.1	0	0	
4.1-5.2	1	1	
5.2-6.2	2	3	
6.2-7.2	3	4	
>7.2	4	5	
Systolic Blood Pressure (mmHg)	Not Treated	Treated	Not Treated
			Treated
<120	-2	0	-3
120-129	0	2	0
130-139	1	3	1
140-149	2	4	2
150-159	2	4	4
160+	3	5	5
Diabetes	Yes	3	4
	No	0	0
Smoker	Yes	4	3
	No	0	0
Total Points			

¹ Adapted from: D'Agostino RB et al. (1). General cardiovascular risk profile for use in primary care. The Framingham Heart Study. *Circ* 2008;117:743-53.

² Adapted from: Genest J et al. (1). 2009 Canadian Cardiovascular Society/Canadian guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease in the adult. *Can J Cardiol*. 2009;25(10):587-579.

³ Adapted from: Anderson T et al. (1). 2012 Update of the Canadian Cardiovascular Society guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia for the prevention of cardiovascular disease in the adult. *Can J Cardiol*. 2013;29(2):151-167.

Step 2¹

Using the total points from Step 1, determine the 10-year CVD risk* (%).

Total Points	10-Year CVD Risk (%) ¹	
	Men	Women
-3 or less	<1	<1
-2	1.1	<1
-1	1.4	1.0
0	1.6	1.2
1	1.9	1.5
2	2.3	1.7
3	2.8	2.0
4	3.3	2.4
5	3.9	2.8
6	4.7	3.3
7	5.6	3.9
8	6.7	4.5
9	7.9	5.3
10	9.4	6.3
11	11.2	7.3
12	13.3	8.6
13	15.8	10.0
14	18.4	11.7
15	21.6	13.7
16	25.3	15.9
17	29.4	18.5
18	>30	21.5
19	>30	24.8
20	>30	27.9
21+	>30	>30

* Double cardiovascular disease risk percentage for individuals between the ages of 30 and 59 without diabetes if the presence of a positive history of premature cardiovascular disease is present in a first-degree relative before 50 years of age for men and before 65 years of age for women. This is known as the modified Framingham Risk Score.¹

Step 3¹

Using the total points from Step 1, determine heart age (in years).

Heart Age, y	Men	Women
<30	<0	<1
30	0	
31		1
32	1	
34	2	2
36	3	3
38	4	
39		4
40	5	
42	6	5
45	7	6
48	8	7
51	9	8
54	10	
55		9
57	11	
59		10
60	12	
64	13	11
68	14	12
72	15	
73		13
76	16	
79		14
>80	≥17	15+

Step 4^{2,3}

Using 10-year CVD risk from Step 2, determine if patient is Low, Moderate or High risk.¹

Indicate Lipid and/or Apo B targets

Risk Level ¹	Initiate Treatment If:	Primary Target (LDL-C)	Alternate Target
High FRS ≥20%	• Consider treatment in all (Strong, High)	• ≤2 mmol/L or ≥50% decrease in LDL-C (Strong, Moderate)	• Apo B ≤0.8 g/L or • Non-HDL-C ≤2.6 mmol/L (Strong, High)
Intermediate FRS 10-19%	• LDL-C ≥3.5 mmol/L (Strong, Moderate) • For LDL-C <3.5 mmol/L, consider if: > Apo B ≥1.2 g/L • OR Non-HDL-C ≥4.3 mmol/L (Strong, Moderate)	• ≤2 mmol/L or ≥50% decrease in LDL-C (Strong, Moderate)	• Apo B ≤0.8 g/L or • Non-HDL-C ≤2.6 mmol/L (Strong, Moderate)
Low FRS <10%	• LDL-C ≥5.0 mmol/L • Familial hypercholesterolemia (Strong, Moderate)	• ≥50% decrease in LDL-C (Strong, Moderate)	N/A
Lipid targets LDL-C: _____ or Apo B: _____			

¹ Consider moving some patients with metabolic syndrome up a risk level based on their 'load' of metabolic risk factors or the 'severity' of

F. Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner dalam Pandangan Islam

Pada hakikatnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik baik bentuk dan fungsi, hal ini tertera QS Al-Tin (95) : 4




Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?”
(Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:598).

Profesor Doktor Hamka telah menjelaskan dalam Tafsir Al-Azhar bahwa diantara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, baik bentuk lahir maupun bentuk batin, bentuk tubuh dan bentuk nyawa. Maka dengan keseimbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada akal nya itu dapatlah di bumi ia hidup sebagai pengatur (Prof Hamka, 1985:206).

Tafsir diatas menegaskan bahwasanya manusia diciptakan dalam bentuk sebaik baiknya termasuk bentuk tubuh serta telah diciptakan di muka bumi sebagai pengatur, dalam hal ini bentuk dan fungsi jantung telah Allah

cuptakan secara sempurna sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas dengan keadaan sehat wal afiat. Hal ini pula terdapat dalam Qalam Allah swt di Qs. Al-Israa (17): 70



Terjemahnya:

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:290).

Telah dijelaskan oleh Profesor Doktor Hamka dalam tafsir Al-Azhar bahwa banyak sekali kemuliaan yang telah Allah berikan kepada anak Adam yang terutama ialah diberikan akal pikiran. Ad-Dhahak berkata “manusia pandai berkata kata dan membedakan” (Prof Hamka, 1985:101).

Jadi segala kemuliaan yang telah Allah berikan harus di jaga dengan baik apalagi manusia telah diberi akal dan pikiran sehingga dapat membedakan yang baik atau yang buruk. Begitu pula tentang perilaku yang harus dilakukan dan harus dihindari agar terhindar dari penyakit jantung koroner salah satunya dengan menjauhi faktor risiko penyakit jantung koroner. Akan tetapi tidak sedikit manusia yang mendzolimi diri sendiri dengan melakukan perkara yang merupakan faktor risiko PJK sehingga menjadi penyebab terjadinya penyakit jantung koroner, seperti:

a. Kolesterol/hiperlipidemia dan obesitas

Kolesterol merupakan kadar lemak dalam darah yang bila berlebih disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri yang tak dapat menahan hawa nafsunya sehingga mengkomsumsi makanan atau minuman secara berlebih, sedangkan Allah swt sudah melarangnya dalam Qalamnya di Qs. Al' Araf (7); 31



Terjemahnya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksud dari ayat di atas “ janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan” sebab tubuh mempunyai batas / kadar kemampuan dalam mencerna makanan” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:155).

Dijelaskan dari Ibnu Abbas dalam Asbabun Nuzul Al-Qur’an bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang perempuan di zaman jahiliah yang melakukan tawaf dengan tanpa pakaian kecuali secarik kain yang menutupi kemaluannya lalu berteriak bahwa hari ini kuhalalkan semua yang ada ditubuhku kecuali yang kututupi ini (HR.Muslim, Al-Qur’an dan terjemahan, 2013:155).

Dalam tafsir oleh Profesor Doktor Hamka terdapat penjelasan oleh Ibnu abbas yang menjelaskan bahwa ”Makanlah apa yang kau suka, minumlah apa yang kau suka, tetapi jangan memakan yang dua yakni sombong dan boros”.

Berlebih-lebihan atau boros ialah melampaui batas yang patut. Makanlah sampai kenyang, setelah kenyang berhentilah, jangan diteruskan juga karena selera selalu terbuka (Prof Hamka,1985:250).

Disini telah di jelaskan bahwa makanlah tetapi berhentilah apabila tubuh sudah merasakan kenyang, sebab tubuh mempunyai kadar atau batas yang dapat dicerna sama halnya zat makanan.

Dan mengenai kadar suatu zat yang sebaiknya masuk dalam tubuh pun sebelumnya sudah terdapat dalam hadist Rasulullah yang berbunyi :

المِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٌ (و اللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهٍ "لَقِيمَاتٌ") يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلْتُ طَعَامٍ وَتُلْتُ شَرَابٍ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ »

Artinya :

Al-Miqdam bin Ma'dikarib al-Kindi berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seorang anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah anak Adam makanan (dalam redaksi Ibn Majah "suapan-suapan kecil") yang menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih dari itu maka sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga udara." (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Hibban dan al-Hakim).

Hadis ini dicantumkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Jâmi' al 'Ulûm wa al-Hikam, hadis ke-47, melengkapi Arba'un an-Nawawiyah menjadi 50 hadis. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini di dalam as-Sunan pada bab Mâ Jâ'a fî Karâhiyati Katsrah al-Akli (Riwayat Tentang Kemakruhan Banyak Makan). At-Tirmidzi berkata, "Hadis ini hasan shahih."

Ibn Majah meriwayatkan hadis ini dalam as-Sunan pada bab al-Iqtishâd fî al-Akli wa Karâhiyati asy-Syiba' (Sederhana dalam Makan dan Kemakruhan Kenyang). Hadis ini merupakan salah satu pokok adab dalam makan. Hadis ini secara garis besar memberikan tiga pelajaran *Pertama*: Rasul saw. menyatakan, “Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut.” Rasul saw. menyerupakan perut sebagai *wi'â'un*, yaitu tempat meletakkan sesuatu. Seburuk-buruk wadah yang dipenuhi adalah perut. Sebab dalam hal itu ada *at-tukhmah* (pencernaan yang buruk) dan menjadi sebab terjadinya bermacam penyakit; juga karena mewariskan kemalasan, lemah dan ingin rehat terus.

Pengarang *Bariqah Mahmûdiyyah fî Syarh Thariqah Muhammadiyyah wa Syari'ah Nabawiyyah* menjelaskan, “Rasul menjadikan perut seburuk-buruk wadah sebab sering digunakan pada yang tidak seharusnya untuknya. Perut diciptakan untuk menguatkan punggung dengan makanan, sementara memenuhi perut akan menyebabkan kerusakan agama dan dunia sehingga menjadi keburukan. Kenyang itu (bisa) menyimpangkan dari kebenaran, didominasi oleh kemalasan sehingga menghalangi pemiliknya dari beribadah, memperbanyak materi-materi yang lebih, banyak kemarahan, syahwatnya dan ambisinya meningkat sehingga menjerumuskan dirinya mencari apa yang melebihi kebutuhan.”

Kedua, Rasul saw. menyatakan, “Cukuplah untuk anak Adam sekadar makanan yang menegakkan tulang punggungnya.” Penyebutan *tulang punggung* menggunakan *uslub* menyebut sebagian yang dimaksudkan keseluruhan. Jadi, yang dimaksudkan adalah punggung seluruhnya, atau lebih umum lagi seluruh badan, sebab punggung adalah penopang badan.

Dalam hadis ini, Rasul saw. menganjurkan untuk sedikit makan, yakni makan sekadarnya saja untuk bisa menopang badan agar tetap bisa tegak dan melakukan aktivitas yang diperintahkan syariah. Anjuran ini juga tampak dalam redaksi Ibn Majah yang menggunakan kata “*luqaymât*” yang merupakan kata plural dengan bentuk isim *tashghîr* dari *luqmatun*. Makna sabda Rasul saw. itu, bahwa cukuplah untuk anak Adam makanan yang dengan itu ia tetap hidup sehat untuk menjalankan aktivitas ketaatan. Itulah makna sabda beliau “*yuqimna shulbahu* (menegakkan tulang punggungnya).” Yang demikian itu merupakan dorongan agar sedikit makan dan tidak banyak makan. Dengan begitu manusia itu ringan, tangkas, giat dan selamat dari bermacam penyakit yang muncul dari banyak makan.

Ketiga: Rasul saw menyatakan, “Jika harus lebih dari itu maka sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga untuk udara.” Maksudnya, jika orang tidak cukup dengan makanan yang cukup menegakkan punggungnya dan harus tambah dari kadar itu maka hendaklah ia mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiganya dengan minuman dan sepertiganya untuk udara yang memungkinkan dirinya bernafas dengan mudah.

Kenyang hukumnya mubah. Dalam beberapa riwayat, Rasul saw. pernah makan hingga kenyang dan membiarkan para sahabat makan hingga kenyang. Namun, bagi Rasul saw. dan para sahabat, kenyang tidak menjadi kebiasaan. Mereka sering tidak sampai kenyang, meski juga tidak kelaparan.


Dalam hadist diatas telah mengatur bahwa tubuh memiliki batas kadar yang dapat diterima untuk dimetabolisme adalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas yang apabila berlebih akan mengakibatkan

efek negatif bagi tubuh salah satunya adalah menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner yakni obesitas ataupun kolesterol.

b. Hipertensi

Gejala Hipertensi sering juga diawali amarah, sedangkan amarah sangat dilarang dalam agama sebagaimana yang tertera dalam Qs.Al-

Imran(3): 134




Terjemahannya :

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013; 68).

Dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dalam dari ayat diatas yakni apabila marah mereka berusaha menahan dan menutupinya, tidak melampiaskannya. Mereka memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya (Ibnu Katsir, 2009: 727). Menahan amarah memang sulit namun bukankah Rasulullah telah bersabda bahwa orang yang paling kuat bukanlah orang yang pandai bergulat atau hal yang semisalnya, namun orang yang kuat menurut Rasulullah adalah orang yang mampu menahan amarahnya.

c. Merokok

Dipahami dari penjelasan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mizbah tentang makanan yang batil dalam ayat ini adalah makanan yang dapat merugikan diri sendiri salah satu di antaranya adalah Rokok. Dan hal ini didukung dalam ayat QS. Al-fathir(35):32



Terjemahnya :

“Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:439).

Menurut imam Ibnu Kasir, kalimat mendzalimi diri sendiri pada ayat di atas adalah mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan keburukan, tidak perhatian dalam melaksanakan kewajiban serta melakukan sesuatu yang diharamkan (Ibnu kasir, 2009:190).

Sama halnya dengan rokok yang mengandung banyak racun yang dapat merusak tubuh sehingga secara tidak langsung mereka mendzalimi tubuh mereka yang sehat dengan mengkonsumsi rokok yang mengandung sangat banyak racun sehingga dapat dengan mudahnya racun penyebab PJK masuk kedalam tubuh yang sebelumnya sehat sehingga seseorang dapat menderita penyakit jantung koroner.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial. Melalui Ijtima Ulama komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III, 24-26 januari 2009, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil dan merokok ditempat umum. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Peran fatwa MUI tentang pengharaman rokok, merupakan implementasi kepedulian islam akan arti pentingnya kesehatan bagi warga yang berada di wilayah indonesia walaupun akan berdampak langsung bagi ekonomi dan sosial bangsa indonesia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitik.

3. Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan UIN Alauddin Makassar pada pegawai yang berstatus PNS di semua fakultas yang ada di UIN Alauddin Makassar.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai bulan April-Mei tahun 2017.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah pegawai negeri sipil UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 dan belum pernah didiagnosa menderita penyakit jantung sebelumnya .

2. Sampel

Untuk menentukan besaran sampel dalam penelitian ini digunakan rumus slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

n= jumlah sampel

N= besar populasi

d^2 = Tingkat kepercayaan yang diinginkan

Berdasarkan rumus diatas diperoleh jumlah sampel minimal untuk pegawai negeri sipil UIN Alauddin Makassar sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{806}{1 + 806 (0.1^2)}$$

$$n = \frac{694}{1 + 8.06}$$

$$n = 88.96 \text{ (dibulatkan menjadi 89)}$$

Pengambilan sampel minimal Pegawai Negeri Sipil UIN Alauddin Makassar adalah 89 responden dan jumlah sampel minimal pegawai Negeri Sipil UIN Alauddin Makassar adalah 89 responden.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dibagi kedalam 10 kategori berdasarkan gedung yang ada di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yakni 8 fakultas dan 1 Rektorat serta 1 perpustakaan. Jumlah sampel tiap unit ruangan untuk Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah sebagai berikut :

$$\text{Sampel gedung atau tempat (n)} = \frac{\text{populasi PNS tiap gedung}}{\text{populasi total PNS UIN}} \times n$$

$$\text{Sampel fakultas Ushuluddin(n)} = \frac{62}{806} \times 89 = 6.84$$

$$\text{Sampel fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan(n)} = \frac{74}{806} \times 89 = 8.17$$

$$\text{Sampel fakultas Sains dan Teknologi(n)} = \frac{86}{806} \times 89 = 9.49 = 10$$

$$\text{Sampel fakultas Ekonomi Bisnis Islam (n)} = \frac{47}{806} \times 89 = 5.18 = 5$$

$$\text{Sampel fakultas Syariah dan Hukum(n)} = \frac{81}{806} \times 89 = 8.94 = 9$$

$$\text{Sampel fakultas Dakwah dan Komunikasi(n)} = \frac{72}{806} \times 89 = 7.95 = 8$$

$$\text{Sampel fakultas Adab dan Humaniora(n)} = \frac{67}{806} \times 89 = 7.39 = 7$$

$$\text{Sampel fakultas Tarbiyah dan Keguruan(n)} = \frac{132}{806} \times 89 = 14.5 = 15$$

$$\text{Sampel Rektorat UIN alauddin(n)} = \frac{179}{806} \times 89 = 19.7 = 20$$

$$\text{Sampel gedung perpustakaan (n)} = \frac{6}{806} \times 89 = 0.66 = 1$$

Jumlah sampel di gedung fakultas ushuluddin sebanyak 7 responden. Di gedung fakultas ilmu kesehatan sebanyak 8 responden, di gedung sains dan teknologi sebanyak 10 responden, di gedung fakultas Ekonomi Bisnis Islam sebanyak 5 responden, sedangkan di fakultas syariah dan hukum sebanyak 9 responden, di gedung fakultas dakwah dan komunikasi sebanyak 8 responden, di gedung fakultas adab dan humaniora sebanyak 7 responden, lalu di fakultas tarbiyah dan keguruan sebanyak 15 responden, di gedung rektorat sebanyak 20 responden dan terakhir di perpustakaan UIN sebanyak 1 responden dengan total keseluruhan responden sebanyak 89 responden.

D. Cara pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan *accidental sampling* yakni Pegawai Negeri Sipil UIN Alauddin Makassar yang ditemui dan bersedia menjadi responden pada waktu penelitian.

1. Kriteria Inklusi
 - Pegawai Negeri Sipil UIN Alauddin Makassar
 - Belum pernah menderita penyakit Jantung Sebelumnya
2. Kriteria eksklusi
 - Pegawai negeri sipil yang menolak menjadi responden
 - PNS yang telah menderita penyakit jantung sebelumnya

E. Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner .
2. Data sekunder adalah data yang tidak di ambil secara langsung oleh peneliti melainkan dari pihak kedua. Sumber data sekunder yang di ambil dalam penelitian ini adalah dari administrasi rektorat UIN Alauddin Makassar.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan untuk menggali beberapa informasi dari responden.

Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner paten oleh *American Hearth Association* ditambah dengan pertanyaan tambahan berisi 4 variabel dependen untuk mengetahui faktor risiko penyakit jantung koroner pada pegawai negeri sipil UIN Alauddin Makassar .

G. Teknik pengolahan dan Analisis data

1. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang telah diperoleh dianalisis melalui pengolahan data dengan menggunakan program *Microsoft Excel versi 2010* dan *Statistic package for social science (SPSS) versi 22* yang mencakup kegiatan sebagai berikut :

- a. *Editing*, penyuntingan data yang dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kemungkinan adanya kuesioner yang belum terisi.
- b. *Coding*, pemberian kode dan scoring pada tiap jawaban untuk memudahkan proses entry data dan scoring berdasarkan Framingham risk score.
- c. *Entry data*, setelah proses coding dilakukan pemasukan data ke komputer.
- d. *Cleaning*, sebelum analisis data dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap data yang sudah masuk.

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisa univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari variable independen dependen keseluruhan data yang ada dalam kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi .

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat yang tujuannya untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan analisis uji *chi-square* hipotesis kategorik tidak berpasangan. Syarat uji *chi square* adalah sel yang mempunyai nilai *expected* kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Bila syarat uji *chi-square* tidak terpenuhi maka akan digunakan lagi uji *fisher* untuk tabel 2x2 dan uji *Kolmogorov smirnov* untuk tabel 2xK (Sopiyuddin,2009).

Melalui uji statistik *chi-square* antara dua variabel dikatakan bermakna apabila mempunyai nilai $p \leq 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dan dikatakan tidak bermakna jika mempunyai nilai $p > 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum lokasi penelitian

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di berdampingan jalur lalu lintas arah selatan dan utama dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada di koordinat 119° BT dan $5,8^{\circ}$ LS dengan ketinggian yang bervariasi antara 1 - 25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai datar dengan kemiringan $0 - 5^{\circ}$ ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan Kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih $175,77 \text{ km}^2$ daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km^2 .

Secara geografis kota Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat $119^{\circ}24'17'38''$ BT dan $5^{\circ}8'6'19''$ LS yang berbatasan sebelah utara dengan kabupaten Maros, sebelah timur kabupaten Maros, sebelah selatan kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas wilayah kota Makassar tercatat $175,77 \text{ km}^2$, yang secara administrasi kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan dan 142 kelurahan dengan 885 RW dan 4.446 RT. Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara $0 - 25$ meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota Makassar dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota Makassar.

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo. Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Penyebaran penduduk kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah kecamatan Biringkanaya sebanyak 211.199 jiwa dari total penduduk, disusul kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 205.280, kecamatan Rappocini sebanyak 177.049 jiwa, kecamatan Panakkukang sebanyak 161.511 jiwa, kecamatan Tallo sebanyak 153.138 jiwa, selanjutnya kecamatan Tamalanrea sebanyak 125.335 jiwa. kecamatan Makassar sebanyak 98.880 jiwa, disusul Kecamatan Bontoala 70.698 jiwa, kecamatan Ujung Tanah sebanyak 63.330 jiwa dan kecamatan Wajo sebanyak 45.151 jiwa (Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, 2015).

Sedangkan kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar, 42.701 jiwa, kecamatan Mamajang 75.236 jiwa, dan kecamatan Mariso 73.265 jiwa (Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, 2015). Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama ditiga Kecamatan yaitu Ujung Pandang, Mamajang dan Mariso.

B. Analisis Univariat

Variabel variabel yang terdapat pada penelitian ini terlebih dahulu akan dideskripsikan dengan analisis univariat yang hasilnya nanti memberi gambaran umum mengenai responden. Variabel bebas pada penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir dan faktor-faktor risiko PJK. Sedangkan variabel terikatnya adalah risiko tinggi, rendah dan sedang dari PJK

tersebut. Penelitian ini dilakukan pada 89 responden dan jumlah tersebut memenuhi batas minimal sampel penelitian.

1. Karakteristik responden

a. Usia

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
pada PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Usia	frekuensi	(%)
26-35 tahun	19	21.3
36-45 tahun	18	20.2
46-55 tahun	20	22.5
56-65 tahun	32	36
Total	89	100

Sumber : data primer 2017

Tabel 4.1 diatas tentang karakter responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa yang berusia 26-35 tahun berjumlah 19 responden (21.3%) selanjutnya berusia 36-45 tahun sebanyak 18 responden (20.2%), berusia 56-55 tahun sebanyak 20 responden (22.5%) dan berusia 46-65 tahun sebanyak 32 responden (36%).

b. Jenis kelamin

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
pada PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Jenis kelamin	Frekuensi	%
Laki-laki	45	50.6
Perempuan	44	49.4
Total	89	100

Sumber : Data primer 2017

Tabel 4.2 tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden laki laki sebanyak

45 responden (50.6%) dan responden wanita kurang lebih sebanding dengan laki-laki yakni sebanyak 44 responden (49.4%).

Sama halnya dengan jenis kelamin yang tertera dalam tabel 4.2 yang tergambar bahwa hampir sebanding antara responden laki-laki dan perempuan, hal ini sama sekali tidak terencana sebab sedari awal memang yang ingin menjadi responden yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini.

2. Sebaran faktor risiko penyakit jantung koroner

a. Kolesterol total

Tabel 4.3
Sebaran Faktor Risiko PJK Berdasarkan Jumlah Kolesterol Total
pada Responden PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Kolesterol Total	Frekuensi	%
<160 mg/dl	13	14.6
160-199 mg/dl	24	27
200-239 mg/dl	17	19.1
240-279 mg/dl	24	27
>280 mg/dl	11	12.4
Total	89	100

Sumber : Data primer 2017

Tabel 4.3 di atas tentang salah satu faktor risiko PJK yakni kadar kolesterol total dalam darah menunjukkan bahwa kadar <160 mg/dl dialami oleh responden sebanyak 13 responden (14.6%) selanjutnya kadar 160-199 mg/dl dialami sebanyak 24 responden (27%), kemudian kadar 200-239 mg/dl sebanyak 17 responden (19.1%), kadar 240-279 mg/dl di alami oleh 24 responden (27%) dan yang terakhir kadar > 280 mg/dl di alami oleh sebanyak 11 responden (12.4%).

Dalam tabel 4.3 menunjukkan bahwa kadar kolesterol di atas 200 mg/dl yang mendominasi yakni sebanyak 53 responden (58.5%) yang jika

dicrosstabilisasi sendiri kebanyakan responden yang mempunyai kadar kolesterol tinggi >200 mg/dl berusia di atas 40 tahun, hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Farahdika tentang faktor risiko yang berhubungan dengan PJK usia madya 41-60 tahun bahwa dari 78 responden 39 (50%) responden memiliki kadar kolesesterol yang tinggi(Farahdika,2015).

b. Tekanan darah sistolik

Tabel 4.4
Sebaran Faktor Risiko PJK Pada Responden Berdasarkan Tekanan Darah Sistolik Pada PNS UIN Alauddin Makassar Tahun 2017

Tekanan darah sistolik	Frekuensi	(%)
<120 mmHg	29	32.6
120-129 mmHg	21	23.6
130-139 mmHg	15	16.9
140-159 mmHg	18	20.2
>160 mmHg	5	6.7
Total	89	100

Sumber : Data Primer 2017

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa responden dengan tekanan darah <120 mmHg sebanyak 29 responden (32.6%), kemudian tekanan darah 120 -129 mmHg dialami oleh sebanyak 21 responden (23.6%). Selanjutnya tekanan darah 130-139 mmHg di alami oleh sebanyak 15 responden (16.9%), tekanan darah 140-159 dialami oleh sebanyak 18 responden (20.2%) dan yang mengalami di atas >160 mmHg yakni sebanyak 5 responden (6.7%).

Berdasarkan tentang sebaran faktor risiko dalam hal ini tekanan darah termasuk baik sebab yang memiliki tekanan darah sistolik <120 mmHg sebanyak 29 responden dan 120-139 mmHg, sebanyak 36 responden yang ini termasuk normotensi dan prehipertensi sehingga masih dapat di imbangi dengan pola hidup sehat, sedangkan yang termasuk hipertensi hanya sebanyak 23 orang (27%). Hal

ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia tentang faktor risiko yang berhubungan dengan PJK usia madya 41-60 tahun bahwa lebih banyak yang terkena hipertensi yakni 41 dari 78 responden (60%) (Farahdika,2015). Namun sama dengan penelitian oleh Kautzar Rizky bahwa dari 611 responden hanya 60 responden (9.8%) yang menderita hipertensi (Kautzar,2014).

c. Tekanan darah diastol

Tabel 4.5
Sebaran Faktor Risiko PJK Pada Responden Berdasarkan Tekanan
Darah Diastol Pada PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Tekanan darah diastol	Frekuensi	(%)
<80 mmHg	51	57.3
85-89 mmHg	25	28.1
90-99 mmHg	6	6.7
>100 mmHg	7	7.9
Total	89	100

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.5 diatas tentang sebaran faktor risiko PJK dalam hal ini tekanan darah diastol menunjukkan bahwa sebanyak 51 responden (57.3%) yang memiliki tekanan darah diastol <80 mmHg, selanjutnya sebanyak 25 responden (28.1%) yang memiliki tekanan darah diastol 85-89 mmHg, kemudian sebanyak 6 responden (6.7%) yang memiliki tekanan darah diastol 90-99 mmHg dan sebanyak 7 responden yang memiliki tekanan darah diastole > 100 mmHg.

Dari tabel tentang sebaran faktor risiko berdasarkan tekanan darah diastol yang menunjukkan bahwa dari 89 responden terdapat 51 responden (57.3%) yang memiliki tekanan darah diastol yang normal dan hanya 13 responden (14.6%) yang memiliki tekanan darah diastol yang tinggi hal ini termasuk baik

dari segi frekuensi namun hal ini tidak sebanding dengan tekanan darah sistoliknya bahwa yang menderita hipertensi sebanyak 23 responden.

d. Diabetes mellitus

Tabel 4.6
Sebaran Faktor Risiko PJK Pada Responden Berdasarkan Status
Diabetes Mellitus Pada PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Status Diabetes mellitus	Frekuensi	(%)
Ya	4	4.5
Tidak	85	95.5
Total	89	100

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.6 di atas tentang sebaran faktor risiko PJK dalam hal ini status diabetes mellitus menunjukkan bahwa sebanyak 4 responden menderita penyakit diabetes mellitus (4.5%). Dominan yang tidak menderita diabetes mellitus yakni sebanyak 85 responden (94.5%).

Dari tabel tentang status diabetes mellitus bahwa yang menderita diabetes mellitus dari 89 responden hanya 4 responden, hal ini memungkinkan adanya bias sebab responden hanya ditanyai tentang pernah di diagnosis diabetes mellitus sebelumnya, sedangkan bisa jadi ada yang terkena diabetes namun tidak pernah memeriksakan diri sebelumnya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang dan Erlin tentang faktor jenis kelamin, genetik, usia, tingkat stress, hipertensi sebagai faktor risiko PJK yang mendapati bahwa dari 43 responden, 29 responden (67.4%) menderita diabetes hal ini disebabkan peneliti melihat langsung rekam medis rumah sakit tentang informasi responden (Prayogi dkk,2015).

e. Status merokok

Tabel 4.7
Sebaran Faktor Risiko PJK Pada Responden Berdasarkan
Status Merokok Pada PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Status merokok	Frekuensi	(%)
Ya	9	10.1
Tidak	80	89.9
Total	89	100

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.7 diatas tentang sebaran faktor risiko PJK yakni status merokok menunjukkan bahwa sebanyak 9 responden (10.1%) yang merokok, dan sebanyak 80 responden (89.9%) yang tidak merokok.

Dari tabel tentang sebaran faktor risiko PJK dalam hal ini adalah merokok menunjukkan bahwa dari 89 responden hanya 9 responden yang berstatus merokok, frekuensinya lebih sedikit di bandingkan dengan yang tidak merokok, hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang dan Erlin tentang faktor jenis kelamin, genetik, usia, tingkat stress, hipertensi sebagai faktor risiko PJK bahwa dari 43 responden hanya 18 responden yang berstatus merokok.

f. Obesitas sentral

Tabel 4.8
Sebaran Faktor Risiko PJK Pada Responden Berdasarkan Status
Obesitas Sentral Pada PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Status obesitas sentral	Frekuensi	(%)
Ya	50	56.2
Tidak	39	43.7
Total	89	100

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.8 di atas tentang sebaran faktor risiko PJK dalam hal ini status obesitas sentral menunjukkan bahwa sebanyak

50 responden (56.2%) berstatus obesitas sentral dan 39 responden (43.7%) yang tidak berstatus obesitas sentral.

Dari tabel tentang sebaran faktor risiko PJK berdasarkan status obesitas sentral di mana hal ini dari 89 responden, terdapat 50 responden yang berstatus obesitas sentral, tingginya yang menderita obesitas sentral dapat memicu tingginya kejadian PJK dengan mekanisme hipoadiponektinemia hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Aryana yang menyebutkan prevalensi obesitas sentral pada pasien PJK cukup tinggi yakni 51.1% (Aryana dkk,2011).

g. Riwayat penyakit jantung koroner dalam keluarga

Tabel 4.9

Sebaran Faktor Risiko PJK Pada Responden Berdasarkan Riwayat PJK Dalam Keluarga Pada PNS UIN Alauddin Makassar Tahun 2017

Riwayat PJK dalam Keluarga	Frekuensi	(%)
Ya	12	13.5
Tidak ada	77	86.5
Total	89	100

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa 12 responden (13.5%) yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner dan 77 responden (86.5%) tidak memiliki riwayat penyakit jantung koroner dalam keluarga.

Dari tabel di atas tentang sebaran risiko berdasarkan riwayat PJK dalam keluarga bahwa terdapat 12 responden (13.5%) yang memiliki riwayat PJK dalam keluarga. Riwayat PJK dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap kejadian PJK selain karena genetik kesamaan pola hidup menjadi pemeran penting terhadap kolerasi antara riwayat PJK dengan kejadian PJK terhadap seseorang, dari 12 responden yang memiliki riwayat PJK dalam keluarga dalam hal ini lebih mendominasi dari ayah responden yakni sebanyak 7 responden (58.4%), hal ini

berbeda dengan gambaran riwayat PJK dalam keluarga pada penelitian yang dilakukan oleh Jeini dengan judul karakteristik individu penderita PJK di Sulawesi utara bahwa dari 110 responden 56 responden (51%) mempunyai riwayat penyakit jantung dalam keluarga (Ester Jeini,2011).

h. Keluarga yang menderita Penyakit jantung koroner

Tabel 4.10
Sebaran Faktor Risiko PJK Pada Responden Berdasarkan Riwayat PJK
Dalam Keluarga Pada PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Keluarga yang menderita PJK	Frekuensi	(%)
Ayah	7	58.4
Ibu	2	16.7
Saudara	1	8.3
Kakek	1	8.3
Nenek	1	8.3
Total	12	100

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa dari 12 responden yang memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga sebanyak 7 responden (58.4%) yang anggota keluarga yang menderita adalah ayah, ibu sebanyak 2 responden (16.7%) dan saudara sebanyak 1 responden (8.3%), kakek 1 responden (8.3%) dan terakhir nenek sebanyak 1 responden (8.3%).

3. Gambaran frekuensi puasa sunnah dan shalat tahajjud

Sebagaimana yang diketahui bahwa puasa yang telah di atur dalam agama akan membantu mencegah PJK sebab dapat mengurangi kadar lemak dalam darah dan gula darah dalam tubuh sehingga mengurangi tingkat risiko PJK pada seseorang.

a. Puasa sunnah

Tabel 4.11
Sebaran Frekuensi Puasa Sunnah Pada PNS UIN Alauddin
Makassar Tahun 2017

Puasa sunnah	Frekuensi	(%)
Rutin	33	37.1
Kadang	21	23.6
Jarang	35	39.3
Total	89	100

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa 33 responden (37.1%) yang rutin melakukan puasa sunnah, kemudian sebanyak 21 responden (23.6%) kadang melakukan puasa sunnah dan terakhir sebanyak 35 responden (39.3%) jarang melakukan puasa sunnah.

Frekuensi melakukan ibadah puasa sunnah, hal ini menunjukkan bahwa dari 89 responden 33 responden yang melakukan puasa rutin, seperti diketahui puasa adalah ibadah menahan lapar dan dahaga serta menjaga diri dari hawa nafsu sehingga hal ini sangat berarti bagi kesehatan sehingga peneliti tertarik untuk menanyakan hal ini pada responden namun yang namanya ibadah adalah urusan hamba dengan Tuhannya sehingga tidak sedikit yang responden seolah berat untuk menjawabnya dengan alasan takut riya' atau malu untuk mengungkapkannya namun peneliti mencoba untuk memberitahu bahwa ini hanya untuk melihat keterkaitan antara indahnya manfaat dari segala ibadah yang Allah perintahkan sehingga responden pun tetap menjawab pertanyaan ini dan dari semua jenis puasa sunnah, seluruh responden biasa melakukan jenis puasa senin kamis.

b. Shalat tahajjud

Tabel 4.12
Sebaran Frekuensi Shalat Sunnah Tahajjud Pada PNS UIN Alauddin
Makassar Tahun 2017

Shalat sunnah tahajjud	Frekuensi	(%)
Rutin	36	40.4
Kadang	23	25.8
Jarang	30	33.7
Total	89	100

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 36 responden (40.4%) rutin melaksanakan shalat tahajjud, kemudian sebanyak 23 responden (25.8%) kadang melakukan shalat tahajjud dan sebanyak 30 responden (33.7%) jarang melakukan shalat tahajjud.

4. Gambaran tingkatan faktor risiko berdasarkan *framingham risk score*

Gambaran tingkatan faktor risiko dibawah berdasarkan hasil *scoring* dari instrument penelitian kuesioner paten *Framingham risk score*.

Tabel 4.13
Gambaran Tingkatan Risiko Penyakit Jantung Koroner
Pada Responden PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Tingkatan risiko	Frekuensi	(%)
Tinggi	13	14.6
Sedang	17	19.1
Rendah	59	66.3
Total	89	100

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa 13 responden (14.6%) berisiko tinggi untuk menderita PJK, selanjutnya 17 responden (19.1%) yang berisiko sedang untuk menderita PJK dan sebanyak 59 responden berisiko rendah untuk menderita PJK.

Tentang tingkatan faktor risiko PJK yang telah di jumlahkan peneliti dari angket atau kuesioner responden dalam hal *scoring framingam risk score*, berdasarkan itu diketahui bahwa yang berisiko tinggi sebanyak 13 responden (14.6%) dan berisiko sedang sebanyak 17 responden (19.1%) yang mana hal ini sejalan dengan peneitian yang dilakukan oleh Melia Fatrani bahwa dari 128 responden terdapat 11 responden (8.6%) berisiko untuk terkena PJK (Fatrani,2016). Namun hal ini bebeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kautsar Rizky dengan judul yang sama bahwa dari 611 responden hanya 1 responden (0.2%) PNS yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner di Batan-Serpong (Rizky dkk,2014).

B. Analisis bivariat

Uji yang akan dilakukan dalam analisis bivariat ini adalah *Chi-Square* karena semua variabel distribusinya tidak normal dan syarat penggunaan uji ini terpenuhi kecuali pada variabel diabetes mellitus yang menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Variabel bebas yaitu jenis kelamin, usia, dan faktor risiko PJK akan dianalisis terhadap variabel terikat yaitu tingkatan risiko mengalami PJK dalam 10 tahun. *Jika p value* ≤ 0.05 maka terdapat hubungan yang bermakna dari variabel-variabel yang bermakna dari variabel variabel yang diteliti dengan derajat kepercayaan 95%.

a. Usia

Tabel 4.14
 Hubungan Antara Usia Dan Tingkatan Risiko Responden
 Terhadap PJK PNS UIN Alauddin Makassar
 Tahun 2017

Usia	Tingkatan faktor risiko						Total		Hasil uji analisis
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah		n	%	
	n	%	N	%	n	%			
25-29 tahun	0	0	0	0	2	2.2	20	22.5	<i>p</i> <i>value</i> 0.000
30-34 tahun	0	0	0	0	6	6.7	6	6.7	
35-39 tahun	0	0	1	1.1	12	15.5	13	14.6	
40-44 tahun	0	0	3	3.4	13	14.6	16	18	
45-49 tahun	4	4.5	8	9	12	13.5	24	27	
50-54 tahun	3	6.7	4	4.5	10	11.2	20	22.5	
55-60 tahun	6	3.4	1	1.1	4	4.5	8	9	
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.14 diatas bahwa yang berusia 25-29 tahun tidak ada responden yang berisiko tinggi maupun berisiko sedang untuk terkena PJK, berisiko rendah sebanyak 2 responden (100%) dan pada usia 30-34 tahun tidak ada yang berisiko tinggi dan sedang namun yang berisiko rendah sebanyak 6 responden. Untuk berusia 35-39 sebanyak 1 responden (7.7%), yang berisiko rendah sebanyak 12 responden(92.3%). Untuk berusia 40-44 tahun yang berisiko sedang sebanyak 3 responden dan berisiko rendah sebanyak 13 responden. Untuk yang berusia 45-49 sebanyak 4 responden berisiko tinggi, sebanyak 8 responden berisiko sedang dan 12 responden berisiko rendah. Untuk yang berusia 50-54 tahun sebanyak 6 responden berisiko tinggi, 4 responden yang berisiko sedang dan 10 berisiko rendah, untuk yang berusia 55-60 tahun sebanyak 3 responden yang berisiko tinggi, 1 responden berisiko sedang dan 4 responden yang berisiko rendah. Sehingga berdasarkan hasil uji analisis menggunakan SPSS menunjukkan adanya hubungan antara usia dengan tingkatan risiko dengan nilai $p = 0.000$ ($p < 0.05$)

Tentang hubungan antara usia dengan tingkat risiko kejadian PJK, dari uji analisis data yang dilakukan didapati nilai $p=0.000$ ($p<0.05$) hal ini berarti keterkaitan ini memiliki hubungan bermakna. Dan usia yang memiliki rentan risiko yang tinggi adalah umur di atas 45 tahun dimana di usia ini diungkapkan dalam buku Dourman untuk laki-laki berusia di atas 45 tahun dan wanita di atas 50 tahun berisiko untuk menderita PJK (Dourman, 2013).

b. Jenis kelamin

4.15
Hubungan Antara Jenis Kelamin Dan Tingkatan Risiko Responden
Terhadap PJK PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Jenis Kelamin	Tingkatan faktor risiko						Total		Hasil uji analisis
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Laki-laki	11	12.4	11	12.4	23	25.8	45	50.6	<i>p value</i> 0.005
Perempuan	2	2.2	6	6.7	36	40.5	44	49.4	
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa berjenis kelamin laki-laki berisiko tinggi sebanyak 11 responden (12.4%), berisiko sedang sebanyak 11 responden (12.4%) dan berisiko rendah sebanyak 23 responden (28.5%). Sedangkan perempuan yang berisiko tinggi sebanyak 2 responden (2.2%), berisiko sedang sebanyak 6 responden (6.7%) dan berisiko rendah sebanyak 36 responden (40.5%). Hasil uji analisis SPSS nilai $p=0.005$ ($p<0.05$) yang berarti adanya hubungan bermakna antara jenis kelamin dengan tingkatan faktor risiko PJK.

Dari penelitian di dapat bahwa yang memiliki faktor risiko tinggi adalah laki-laki dibanding wanita sebab wanita mempunyai hormon estrogen yang bersifat protektif namun apabila telah mencapai menopause laki-laki dan perempuan memiliki risiko yang sama (Lewiss, 2007). Hal ini pun tidak sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Farahdika yang mendapatkan nilai $p=0.81$ $p>0.05$ bahwa tak ada hubungan bermakna antara jenis kelamin dengan tingkat risiko PJK (Farahdika,2015).

c. Kolesterol Total

Tabel 4.16
Hubungan Antara Kolesterol Total Dan Tingkatan Risiko Responden
Terhadap PJK PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Total Kolsterol	Tingkatan faktor risiko						Total		Hasil uji analisi <i>p</i> <i>value</i> <i>0.003</i>
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
<239 mg/dl	4	4.5	8	9	42	47.2	37	60.7	
>239 mg/dl	9	10.1	9	10.1	17	19.1	52	39.3	
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa yang mempunyai kolesterol <239 mg/dl berisiko tinggi sebanyak 4 responden (4.5%), berisiko sedang sebanyak 8 responden (9%) dan berisiko rendah 42 responden (47.2%). Sedangkan yang memiliki kolesterol > 239 mg/dl sebanyak 9 responden (10.1%) berisiko tinggi, berisiko sedang sebanyak 9 responden (10.1%) dan berisiko rendah sebanyak 17 responden (19.1%). Hasil uji analisis SPSS 22 menunjukkan nilai $p=0.003$ ($p<0.05$) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan bermakna antara kadar kolesterol total dengan tingkatan faktor risiko PJK.

Tabel tentang hubungan antara total kolesterol dan tingkatan risiko PJK yang didapati bahwa dari 13 responden memilki risiko tinggi 9 diantaranya memilki kadar total kolesetrol yang tinggi yakni >239 mg/dl. Hasil analisis data terdapat hubungan bermakna antara total kolesterol dengan tingkat risiko PJK. Seperti diketahui kadar kolesetrol terdapat LDL atau kolesetrol jahat dimana jika kolesetrol dalam tubuh lebih banyak dari yang dibutuhkan ,maka koleseterol jahat tu akan beredar ke aliran darah dan akhirnya akan berakumulasi di dinding arteri

yang mengakibatkan adanya plak yang membuat dinding arteri menjadi kaku dan sempit. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh Amelia bahwa jika responden dengan dislipidemia akan berisiko $OR=6,479$ kali lebih tinggi di banding yang tidak dislipidemia dengan nilai $p=0.0001$ (Farahdika,2015).

d. Tekanan darah

4.17
Hubungan Antara Tekanan Darah Dan Tingkatan Risiko Responden
Terhadap PJK PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Tekanan Darah	Tingkatan faktor risiko						Total		Hasil uji analisis
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah		N	%	p
	N	%	n	%	n	%			
Normal	6	6.7	10	11.2	50	56.2	66	74.2	0.004
Hipertensi	7	7.9	7	7.9	9	10.1	23	25.8	
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa yang memiliki tekanan darah normal dan prehipertensi berisiko tinggi sebanyak 6 responden (6.7%), berisiko sedang sebanyak 10 responden (11.2%) dan berisiko rendah sebanyak 50 responden (56.2%). Sedangkan untuk penderita hipertensi yang berisiko tinggi sebanyak 7 responden (7.9%), berisiko sedang sebanyak 7 responden (7.9%) dan berisiko rendah sebanyak 9 responden (10.1%) sehingga menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kejadian hipertensi dengan tingkatan faktor risiko PJK dengan hasil uji analisis SPSS 22 nilai $p= 0.004$ ($p<0.05$) pada PNS UIN Alauddin Makassar.

Hubungan antara tekanan darah sistolik dan tingkatan risiko PJK didapati bahwa dari 13 responden yang berisiko tinggi 7 diantaranya menderita hipertensi dengan nilai hasil uji yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Melia fatrani dengan nilai

$p=0.0001$ pada penelitiannya dengan judul yang sama dan $p=0.004$ pada penelitian Amelia tentang keterkaitan antara hipertensi dengan faktor risiko PJK.

e. Status diabetes Mellitus

Tabel 4.18
Hubungan antara status diabetes Mellitus dan tingkatan Risiko Responden Terhadap PJK pada PNS UIN Alauddin Makassar Tahun 2017

Status Diabetes	Tingkatan faktor risiko						Total	Hasil uji analisis	
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah				
	n	%	n	%	n	%			
Ya	1	1.1	0	0	3	3.4	4	4.5	<i>p</i> value 0.516
Tidak	12	13.5	11	19.1	56	62.9	85	95.5	
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa yang menderita diabetes mellitus serta berisiko tinggi terkena PJK sebanyak 1 responden (1.1%), berisiko sedang tidak ada dan berisiko rendah sebanyak 3 responden (3.4%). Sedangkan yang tidak menderita Diabetes mellitus terdapat 12 responden (13.5%), berisiko tinggi menderita PJK, berisiko sedang sebanyak 17 responden (19.1%) dan berisiko rendah sebanyak 56 responden (62.9%). Hasil uji analisis SPSS 22 nilai p 0.516 yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara diabetes mellitus dengan tingkatan risiko PJK pada PNS UIN Alauddin Makassar.

Tabel tentang hubungan status diabetes mellitus dengan tingkatan faktor risiko PJK, yang dari hasil analisis berarti tak ada hubungan bermakna antara diabetes mellitus dengan tingkatan risiko PJK. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Farahdika bahwa terdapat nilai bermakna dari hasil uji analisis penelitiannya dengan nilai $p=0.0001$ ($p<0.05$, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlin dkk bahwa terdapat 29 responden (67.4%) dari 43 responden tidak berstatus Diabetes Mellitus (Kurnia,2015).

f. Status merokok

Tabel 4.19
Hubungan Antara Status Merokok Dan Tingkatan Risiko Responden
Terhadap PJK PNS UIN Alauddin Makassar
Tahun 2017

Status Merokok	Tingkatan faktor risiko						Total		Hasil uji analisi
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah		N	%	
	n	%	N	%	n	%			
Ya	6	6.7	0	0	3	3.4	9	10.1	<i>p</i> <i>value</i> 0.000
Tidak	7	7.9	17	19.1	56	62.9	80	89.9	
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa responden merokok berisiko tinggi sebanyak 6 responden (6.7%) dan berisiko rendah sebanyak 3 responden (3.34%). Sedangkan responden non-perokok yang berisiko tinggi sebanyak 7 responden (7.9%), berisiko sedang sebanyak 17 responden (19.1%) dan berisiko rendah sebanyak 56 responden (62.9%). Hasil uji analisis SPSS 22 menunjukkan nilai $p=0.00$ ($p<0.05$) yang berarti adanya hubungan bermakna antara merokok dengan tingkatan faktor risiko PJK pada PNS UIN Alauddin Makassar.

Hubungan antara status merokok dan tingkatan risiko PJK didapati bahwa hasil uji analisis didapatkan nilai $p=0.000$ yang berarti terdapat hubungan bermakna antara status merokok dan tingkatan Risiko bahwa dari 9 responden yang bersatatus merokok, 6 diantaranya memiliki risiko tinggi menderita PJK. Hal ini dikarenakan rokok merupakan pemicu utama kejadian beberapa penyakit seperti hipertensi yang merupakan pemicu atau faktor risiko penyakit jantung koroner hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melia Fatrani yang mendapatkan nilai $p=0.0001$ dari hasil uji analisis Hubungan antara status merokok dan tingkatan Risiko yang dilakukan pada masyarakat binaan FKIK Syarif hidayatullah (Fatrani,2016).

g. Status obesitas sentral

Tabel 4.20

Hubungan antara status obesitas sentral dan tingkatan Risiko
Responden Terhadap PJK PNS UIN Alauddin
Makassar Tahun 2017

Status Obesitas sentral	Tingkatan faktor risiko						Total	Hasil uji analisi	
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah				
	n	%	n	%	n	%	N	%	<i>p</i>
Ya	10	11.2	9	10.1	31	34.8	50	56.2	<i>value</i>
Tidak	3	3.4	8	9	28	31.5	39	43.8	<i>0.005</i>
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa yang berstatus obesitas sentral yang berisiko tinggi sebanyak 10 responden (11.2%), berisiko sedang sebanyak 9 responden (10.1%) dan berisiko rendah sebanyak 31 responden (34.8%). Sedangkan yang tidak berstatus obesitas sentral berisiko tinggi sebanyak 3 responden (3.4%), berisiko sedang sebanyak 8 responden (9%) dan berisiko rendah sebanyak 28 responden (31.5%). Hasil uji analisis SPSS 22 menunjukkan adanya hubungan bermakna dengan nilai $p=0.005$ ($p<0.05$) antara status obesitas sentral dengan tingkatan faktor risiko PJK UIN Alauddin Makassar.

Hubungan antara obesitas sentral dan tingkatan Risiko PJK memiliki kemaknaan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia bahwa dari 39 responden 29 responden (63%) menderita obesitas dengan nilai $p=0.0011$, pun hal ini didukung oleh melia fatrani dalam penelitiannya dengan judul yang sama bahwa obesitas sentral memiliki hubungan bermakna dengan nilai $p=0.0004$.

h. Riwayat penyakit jantung koroner dalam keluarga

Tabel 4.21

Hubungan Antara Riwayat Penyakit Jantung Koroner Pada Keluarga Dan Tingkat Risiko Responden Terhadap PJK PNS UIN Alauddin Makassar Tahun 2017

Riwayat Penyakit jantung Dalam keluarga	Tingkatan faktor risiko						Total		Hasil uji analisis <i>p</i> <i>value</i>
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Ada	1	1.1	1	1.1	10	11.2	12	13.1	0.241
Tidak ada	12	13.5	16	18	49	55.1	77	86.5	
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa yang memiliki riwayat PJK dalam keluarga berisiko tinggi sebanyak 1 responden (1.1%), berisiko sedang sebanyak 1 responden (1.1%) dan berisiko rendah sebanyak 10 responden (11.2%). Sedangkan yang tidak memiliki riwayat PJK dalam keluarga berisiko tinggi sebanyak 12 responden (13.5%), berisiko sedang sebanyak 16 responden (19.1%) dan berisiko rendah sebanyak 49 responden (55.1%) sehingga hasil uji analisis menunjukkan tidak bermaknanya hubungan antara riwayat PJK dalam keluarga dengan tingkatan risiko PJK dengan nilai $p = 0.241$ ($p > 0.05$).

Hal hasil penelitian di atas menunjukkan tak ada hubungan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Erlin kurnia bahwa dari 43 responden hanya 5 responden yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner dalam keluarga.

i. Frekuensi puasa sunnah

Tabel 4.22
 Hubungan antara frkuensi puasa sunnah dan tingkatan Risiko Responden
 Terhadap PJK PNS UIN Alauddin
 Makassar Tahun 2017

Frekuensi Puasa sunnah	Tingkatan faktor risiko						Total		Hasil uji analisi <i>p</i> <i>value</i>
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Rutin	5	5.6	3	3.4	25	28.1	33	37.1	0.176
Kadang	8	9	14	15.7	34	38.2	56	62.9	
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.22 di atas responden yang rutin melakukan puasa sunnah yang berisiko tinggi sebanyak 5 responden (5.6%), berisiko sedang sebanyak 3 responden (3.4%) dan berisiko rendah sebanyak 25 responden (28.1%). Sedangkan yang kadang melakukan puasa sunnah berisiko tinggi sebanyak 8 responden (9%), berisiko sedang sebanyak 14 responden (15.7%) dan berisiko rendah sebanyak 34 responden (38.2%), dari hasil uji analisis data menunjukkan tidak bermaknanya hubungan antar puasa sunnah terhadap tingkatan faktor risiko PJK dengan nilai $p=0.176$ ($p>0.05$).

j. Frekuensi shalat tahajjud

Tabel 4.23
 Hubungan antara frekuensi shalat tahajjud dan tingkatan
 Risiko Responden Terhadap PJK PNS UIN Alauddin
 Makassar Tahun 2017

Frekuensi Shalat tahajjud	Tingkatan faktor risiko						Total		Hasil uji analisis <i>p</i> <i>value</i>
	Risiko tinggi		Risiko sedang		Risiko rendah		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Rutin	5	5.6	8	9	23	25.8	36	40.4	0.859
Kadang	8	9	9	10.1	36	40.5	53	59.6	
Total	13	14.6	17	19.1	59	66.3	89	100	

Sumber : data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.23 di atas menunjukkan bahwa frekuensi shalat tahajjud rutin dilakukan yang berisiko tinggi sebanyak 5 responden (5.6%), berisiko sedang sebanyak 8 responden (9%) dan berisiko rendah sebanyak 23 responden (25.8%). Sedangkan yang kadang melakukan shalat tahajjud dan berisiko tinggi sebanyak 8 responden (9%), berisiko sedang sebanyak 9 responden (10.1%) dan berisiko rendah sebanyak 36 responden (40.5%). Hasil uji analisis nilai $p=0.859$ ($p>0.05$) menunjukkan bahwa tidak bermaknanya hubungan antara shalat tahajjud dengan tingkatan faktor risiko PJK pada PNS UIN Alauddin Makassar.

Tabel 4.22 dan 4.23 tentang Hubungan antara puasa sunnah dan shalat tahajjud dengan tingkatan Risiko PJK yang sama-sama tidak memiliki hubungan bermakna dari hasil uji analisis puasa sunnah nilai $p=0.176$ ($p>0.05$) shalat tahajjud $p=0.859$ ($p>0.05$). Namun jika dilihat secara data frekuensi yang kadang melakukan shalat sunnah tahajjud berisiko lebih tinggi untuk menderita PJK yakni 8 responden dibanding dengan yang rutin hanya 5 responden, menurut sopiyuddin hal ini memiliki hubungan namun kurangnya power atau jumlah sampel dalam penelitian membuat secara analisis data tidak memiliki hubungan yang bermakna (sopiyuddin, 2007).

C. Pembahasan

1. Tingkatan faktor risiko berdasarkan *framingham risk score*

Berdasarkan hasil skoring yang digunakan untuk mengetahui faktor risiko klasik penyakit kardiovaskuler seperti jenis kelamin, hipertensi, diabetes, mellitus, merokok, obesitas, aktivitas fisik dan kadar kolesterol melalui perhitungan *framingham risk score* untuk memprediksi risiko penyakit jantung koroner dengan menggunakan perhitungan yang berdasarkan studi observasi. Individu dengan $score \leq 10\%$ memiliki risiko rendah, $score$ antara 10%-20% memiliki risiko

sedang, dan $\geq 20\%$ memiliki risiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. (De Ruijter,dkk., 2009).

Untuk responden pegawai Negeri Sipil UIN Alauddin Makassar diperoleh hasil bahwa yang berisiko tinggi sebanyak 13 responden (14.6%), yang berisiko sedang sebanyak 17 responden (19.1%) dan yang berisiko rendah sebanyak 59 responden (66.3%) .

2. Distribusi berdasarkan Orang, tempat dan waktu

a. Orang

1) Usia

Tabel 4.14 tentang karakteristik responden berdasarkan usia, dijumpai bahwa usia yang mendominasi berisiko tinggi dan sedang untuk menderita penyakit jantung koroner adalah usia 46-65 tahun yakni sebanyak, hal ini berarti bahwa tingkat risiko lebih tinggi terkena untuk usia lebih dari 40 tahun. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sorrentino dalam penelitian Fadma Yuliani yakni risiko PJK terjadi pada pria berusia >45 tahun dan pada wanita berusia >55 jika telah menopause, hal ini dikarenakan pengaruh hormon estrogen yang ada dalam tubuh sebab hormon estrogen yang bersifat protektif (Yuliani,2014).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlin dan Bambang tentang faktor risiko Penyakit Jantung Koroner pada pasien PJK di RS Baptis Kediri bahwa keseluruhan responden yakni 43 responden PJK berusia di atas 45 tahun (Kurnia dan Prayogi,2015).

Namun dari hasil penelitian ini pun tidak menutup kemungkinan jika yang berusia di atas 45 tahun bisa berisiko rendah menderita PJK sebab hal ini ditunjang dengan pola hidup sehat dan teratur risiko itu dapat berubah sebab gaya hidup yang mempengaruhi banyak faktor risiko seseorang terkena PJK.

2) Jenis kelamin

Untuk kategori jenis kelamin berdasarkan penelitian bivariat yang mendapatkan nilai $p = 0.005$, dapat dilihat yang berisiko tinggi menderita Penyakit Jantung Koroner adalah laki-laki, sebab diantara 13 responden yang berisiko tinggi 11 responden diantaranya berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang hanya 2 responden. Secara teoritis, pada laki-laki morbiditas akibat PJK adalah 2 kali lebih besar daripada wanita dan terjadi hampir 10 tahun lebih dini dibandingkan wanita, sebab hormon estrogen yang bersifat protektif namun apabila seorang wanita telah menopause tingkat risiko antara laki-laki dan wanita sama.

3) Riwayat penyakit dalam keluarga

Hasil analisa bivariat pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara riwayat PJK dengan tingkat risiko Penyakit jantung koroner. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatrani yang mendapatkan hasil penelitian $p = 0.746$. Hasil tersebut dikarenakan riwayat penyakit jantung koroner dalam keluarga bukan sebagai faktor utama seseorang untuk terkena Penyakit jantung Koroner namun riwayat penyakit jantung koroner akan lebih menunjang seseorang untuk menderita penyakit jantung koroner apabila telah terpapar faktor risiko utama yang sebagai pemicu Penyakit jantung koroner itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh *framingham study* yang menetapkan bahwa prediktor yang dapat menjadi penyebab kardiovaskuler seperti jenis kelamin, hipertensi, diabetes mellitus, merokok, obesitas, aktivitas fisik dan kadar kolesterol (de Ruijter, dkk 2009).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mamat Supriyono dalam tesisnya dengan judul faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap

kejadian penyakit jantung koroner pada kelompok usi <45 tahun bahwa tidak terdapat hubungan bermakna dari hasil analisis multivariat dengan nilai $p = 0.0271$ (Supriyono,2008).

4) Tekanan darah

Hasil analisa bivariat pada penelitian ini menunjukkan kemaknaan hubungan antara hipertensi dengan tingkatan risiko PJK dengan nilai $p=0.004$. secara teoritis memang hipertensi sangat mempengaruhi kejadian PJK sebab hipertensi merusak pembuluh darah otak dan ginjal. Semakin tinggi beban kerja jantung yang ditambah dengan tekanan arteri yang meningkat juga menyebabkan penebalan dinding ventrikel kiri, hal ini disebut hipertrofi ventrikel kiri merupakan penyebab sekaligus penanda kerusakan kardiovaskuler yang lebih serius (philip l dkk, 2008 hal-75).

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Amelia yang mendapati keterkaitan antara hipertensi dengan PJK pada pasien PJK di RSUD kota semarang bahwa dari 39 responden PJK 28 di antaranya menderita Hipertensi dan hasil analisi dari penelitiannya mendapatkan nilai $p=0.002$,pun oleh penelitian melia yang mendapatkan hasil analisis bivariat dengan nilai $p = 0.0001$.

5) Kolesterol total

Dari hasil analisis bivariat didapatkan nilai $p=0.003$ yang menunjukkan adanya hubungan bermakna bahwa 13 responden yang berisiko tinggi 9 di antaranya memiliki kolesterol lebih dari 239 mg/dl. Secara teoritis, timbunan lemak khususnya akibat kolesterol yang disebut plak,terbentuk pada dinding pembuluh nadi. Hal ini yang membuat makin sempit sehingga menghambat aliran darah yang jika plak ini pecah maka akan membentuk gumpalan darah pada daerah yang terkena maka akan menghambat aliran darah ke jantung,inilah yang

akan mengakibatkan serangan jantung, hal inilah kenapa kolesterol tinggi sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit jantung koroner.

Kebanyakan dari responden dalam hal ini ketika di beritahu hasil pengukuran kolesterolnya tinggi sebagian besar menjawab bahwa gorengan menjadi salah satu makanan yang selalu dikonsumsi tiap harinya, faktor kesibukan menjadi alasan untuk sulit menyediakan makanan sehat untuk dikonsumsi tiap harinya.

6) Status merokok

Dari hasil analisis bivariat didapatkan hasil nilai $p=0.000$ yang berarti antara merokok dan tingkatan faktor risiko PJK memiliki hubungan yang sangat bermakna.

Merokok adalah salah satu penyebab mayor untuk timbulnya aterosklerosis. Merokok secara sigergis ditambah faktor faktor risiko lainnya akan meningkatkan kejadian PJK, interaksi sinergistik yang kuat timbul antara hiperkolesterolemia dan genesis infark miokard, dua efek utama dari merokok yang berperan penting dalam perkembangan PJK adalah efek nikotin dan desaturasi hemoglobin oleh carbon monoksida. Nikotin berperan penting untuk terjadinya aterosklerosis koroner dan trombosis dengan mekanisme menaikkan asam lemak bebas serta meningkatkan keletakan dan agregasi trombosit melalui stimulasi katekolamin (Dept Health Human Service, 2010).

7) Diabetes mellitus

Dari hasil analisa bivariat yang dilakukan mendapatkan nilai $p=0.516$ yang berarti tidak adanya hubungan antara diabetes mellitus dengan tingkatan risiko Penyakit jantung koroner. Namun secara teori diabetes mellitus sangat berpengaruh sebab dalam penelitian supriyono oleh Penderita diabetes mellitus cenderung untuk mengalami atherosclerosis pada usia yang lebih dini dan penyakit yang ditimbulkan lebih cepat dan lebih berat pada penderita diabet dari

pada nondiabet. Insulin memainkan peran utama dalam metabolisme lipid dan kelainan-kelainan pada lipid seringkali ditemukan pada penderita diabetes.

Kolesterol serum dan kolesterol lipoprotein berdensitas rendah sering lebih tinggi pada pasien diabetes dan juga lipoprotein berdensitas tinggi lebih rendah pada pasien diabetes. Namun adanya bias dikhawatirkan dalam penelitian ini sebab responden hanya ditanyai riwayat diabetes mellitus tipe 2.

8) Obesitas sentral

Dari hasil penelitian bivariat yang dilakukan, obesitas sentral dengan faktor risiko Penyakit Jantung Koroner menunjukkan adanya hubungan yang bermakna dengan nilai $p=0.005$ bahwa dari 13 responden yang berisiko tinggi menderita Penyakit jantung koroner 10 di antaranya berstatus obesitas sentral. Hasil penelitian ini membuktikan teori gotera dkk(2006) dalam penelitian Amelia yang menyatakan bahwa obesitas merupakan kunci penting dari terjadinya peningkatan kejadian PJK. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Amelia bahwa ada hubungan bermakna antara obesitas dengan Penyakit jantung koroner dengan nilai $p= 0.0011$.

b. Tempat

Lingkungan pekerjaan

Jika tempat dalam epidemiologi suatu penyakit sering digunakan untuk mengetahui tempat atau lokasi kejadian luar biasa ataupun penyakit endemis semisal malaria (Masriadi,2011). Namun penyakit tidak menular pun dapat diidentifikasi melalui tempat. Contohnya suatu institusi, seperti halnya lingkungan pekerjaan sinkron dengan penelitian kali ini, dengan latar tempat kantor dalam hal ini lokasi pekerjaan pegawai negeri sipil

Seperti halnya yang kita ketahui Pegawai negeri sipil atau aparatur negara adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan disertai tugas dalam jabatan pemerintah dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan (UUD RI,2014). Dengan jam kerja masuk tempat kerja mulai pukul 07.00 sampai

dengan 08.30, dan jadwal keluar kantor mulai 15.30 sampai paling lambat pukul 17.00 (Permenhub,2014).

Sehingga dengan aturan diatas para pegawai negeri sipil yang jadi responden dalam penelitian ini ketika diberitahu perihal kondisi kesehatan dalam hal ini variabel yang diukur seperti hipertensi,kolesterol dan obesitas sentral yang jumlah atau hasil pengukuran menunjukkan angka yang di atas normal dengan spontan mempertanyakan obat apa yang diminum biar bisa normal. Namun peneliti mencoba memberi implikasi untuk mengimbangi dengan pola hidup sehat seperti olahraga,makan dan buah dan sayur serta mengurangi konsumsi makanan yang akan memacu pada kondisi yang tidak normal.

Dengan spontan para PNS mengatakan bagaimana dapat kami jalan kan pola hidup sehat sedangkan pagi kami sudah harus untuk berada disini dan saat pulang langit sudah gelap. Hal ini pun berkaitan dengan penyediaan makanan sehat yang sulit mereka penuhi tersebut tuntutan pekerjaan sehingga mengharuskan mereka untuk mengkomsumsi apa yang tersedia dilingkungan kerja mereka yang katanya hampir setiap hari mengkomsumsi gorengan sehingga dari hasil pengukuran kolesetrol sebanyak 52 responden (58.5%) memiliki kolesterol yang tinggi >200 mg/dl hal ini pun telah dilarang dalam QS. Abasa : 24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ

Terjemahan :

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”
(Kemenag RI,Al-Qur’an dan Terjemahan,2013:586).

Dijelaskan oleh Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azhar bahwa maksud dan tujuan ayat di atas adalah manusia di perintahkan untuk melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana pertalian hidupnya dengan bumi tempat ia berdiam (Prof Hamka,1985:51). Ayat diatas bermaksud bahwa Manusia di tuntutan untuk memperhatikan makanannya sebab makanan sangat berpengaruh terhadap

kesehatan manusia itu sendiri, jika seorang manusia mampu menghindarkan diri dari makanan yang merupakan pemicu terjadinya kejadian suatu penyakit seperti contohnya penyakit jantung koroner.

Tempat kerja atau ruangan pegawai negeri sipil baik yang struktural atau fungsional yang menjadi tempat kerja responden penelitian kali ini memiliki pendingin ruangan yang hal ini jika ditambah dengan aktivitas yang banyak dihabiskan di depan meja kerja sehingga kurangnya pembakaran lemak yang terjadi sehingga angka status obesitas sentral pun menunjukkan angka yang tinggi yakni dari 89 responden 50 responden (56.2%). Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia bahwa dari 39 responden dengan PJK 29 responden diantaranya (63%) berstatus obesitas sentral (Farahdika,2015).

Sehingga benar apa yang dikatakan Kurniadi dalam bukunya bahwa dalam kehidupan sehari-hari masih kurang memperhatikan kesehatannya karena kesibukan sehingga tidak memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi, kurangnya aktivitas fisik serta hipertensi yang tidak terkontrol (Kurniadi,2013).

3. Waktu

Mempelajari morbiditas berdasarkan waktu digunakan untuk mengetahui hubungan antara waktu dan insiden penyakit (Masriadi,2011). Walaupun waktu dalam epidemiologi sering dikaitkan dengan penyakit menular semisal demam berdarah ataupun kusta. Namun lain kali ini peneliti ingin mengaitkan antara waktu dengan kejadian Penyakit jantung koroner walaupun secara spesifik tak dapat disebutkan antara keterpaparan faktor risiko dengan kejadian Penyakit jantung koroner.

Aktivitas tubuh merupakan hal penting dalam kejadian penyakit jantung koroner sehingga jika dikaitkan dengan waktu adalah frekuensi aktifitas tubuh itu sendiri. Walaupun kali ini tidak masuk dalam instrumen penelitian namun secara

umum seperti yang kita ketahui bahwa PNS merupakan seorang yang frekuensi aktivitas tubuhnya kurang sebab pekerjaan dan lingkungan kerja seringkali memaksakan banyak waktu yang dihabiskan didalam ruangan sehingga kurangnya pembakaran lemak dalam waktu yang panjang kurang lebih 7-8 jam tiap harinya. Dalam penelitian Kemal Alfajar bahwa risiko PJK lebih rendah pada individu yang beraktivitas sedang dan tinggi dibandingkan dengan individu yang beraktivitas fisik rendah, aktivitas fisik sedang memberikan sifat proteksi terhadap PJK terlebih lagi aktivitas tinggi (Alfajar,2015).

Sedangkan dengan frekuensi lama merokok responden walaupun peneliti tidak memasukkan dalam kuesioner penelitian sebab menggunakan kuesioner paten sehingga dalam data tak ada frekuensi lama merokok namun peneliti secara vokal tetap menanyakan lama merokok yang jawabannya rerata adalah perokok berat sejak bertahun-tahun lamanya sehingga dalam hasil analisis bahwa yang merokok sebanyak 9 responden dari 89 responden 6 di antaranya berisiko tinggi untuk menderita PJK,dalam penelitian Kemal Alfajar bahwa risiko PJK pada individu yang berusia lanjut, pernah merokok dan memiliki risiko hipertensi serta diabetes mellitus lebih rendah pada individu yang beraktivitas tinggi dibanding dengan yang beraktivitas rendah (Alfajar,2015).

Sehingga seringkali peneliti menganjurkan untuk berhenti merokok dengan pertimbangan risiko mungkin dengan perlahan, akan tetapi mereka akan mengatakan hal ini akan sulit terjadi sebab kebiasaan yang sudah lama walaupun dari segi pengetahuan mereka cenderung sudah mengetahui akan tetapi hawa nafsu dalam hal ini keinginan untuk berubah memang tidak ada sehingga akan menjadi jauh lebih sulit untuk berhenti merokok, bukankah Allah swt telah berfirman dalam QS Al-rad (13):11

لَهُمْ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:351).

Diterangkan dalam tafsir Quran Karim oleh professor Dr Mahmud Yunus bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika mereka sendiri tidak mengubah budi pekertinya, umpamanya seorang fakir dan miskin, ia tak akan langsung kaya hanya dengan berdoa, kecuali ia mampu menghilangkan rasa pemalasnya dan berusaha mencari rezeki Allah untuk keluar dari garis miskin (Prof. Dr Mahmud Yunus, 2004:351).

Sama halnya dengan seorang perokok tidak akan serta merta dapat berhenti untuk merokok kecuali dengan tekad dan usaha yang kuat agar dapat menghindari perilaku merokok.

3. Hubungan antara shalat tahajjud dengan puasa terhadap tingkatan risiko PJK

a. Puasa sunnah

Dari hasil analisis bivariat didapatkan memang tidak ada hubungan antara puasa dengan tingkatan risiko penyakit jantung koroner dengan nilai $p=0.176$. Namun seperti yang diketahui puasa sunnah menurut penelitian akan menyehatkan tubuh, sebab makanan berkaitan erat dengan proses metabolisme tubuh. Saat berpuasa, karena ada fase istirahat setelah fase pencernaan normal, yang diperkirakan 6 sampai 8 jam, maka pada fase tersebut terjadi degradasi dari lemak dan glukosa darah sehingga kadar gula dan lemak akan di minimalisir dengan berpuasa (Djufri,2010).

Demikian pula dengan peningkatan *High Density Lipoprotein* (HDL) *andapoprotein alfa 1*, dan penurunan *Low Density Lipoprotein* (LDL), hal ini sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sebab, HDL berefek baik bagi *kardiovaskuler*, sedangkan LDL berefek negatif bagi kesehatan pembuluh darah (Ikrar, 2012).

Secara analisis memang tak ada hubungan namun secara frekuensi data dari 13 responden yang berisiko tinggi yang jarang melakukan puasa lebih berisiko tinggi yakni 8 responden dibandingkan dengan yang rutin melakukan puasa sunnah.

b. Shalat tahajjud

Dari hasil analisa bivariat didapatkan memang tak ada hubungan antara shalat tahajjud dengan tingkat risiko penyakit jantung koroner dengan nilai $p=0.859$. secara teori shalat tahajjud akan mengurangi hormon kortisol, Hormon

kortisol adalah salah satu hormon stress. Kadar hormon ini semakin meninggi ketika kita dalam keadaan stress. Dengan kadar hormon yang meninggi kita lebih mudah berbuat salah, sulit berkonsentrasi, dan daya ingat kita kurang baik. Hormon ini oleh pakar kesehatan dijadikan tolak ukur untuk tingkat/derajat stress seseorang. Makin stress seseorang, maka hormon kortisol semakin meninggi dalam darahnya. Hormon kortisol memiliki kadar tertinggi di waktu tengah malam hingga waktu pagi, terutama pagi-pagi sekali (normal di pagi hari berkisar 38-690 mmol/liter, sedangkan malamnya 69-345 mmol/liter).

Jika berlebihan, maka kadar hormon adrenalin dan hormon kortisol akan meningkat sehingga mengganggu sistem kekebalan tubuh yang akhirnya kita mudah terkena infeksi, penyakit maag, asma, dan memperburuk penyakit degeneratif kronis salah satunya adalah penyakit jantung sebab hormon adrenalin menyebabkan aliran darah akan lebih cepat yang secara otomatis membuat kerja jantung lebih cepat.

Hal diataslah yang membuat shalat tahajjud berpengaruh terhadap PJK dan jika dilihat secara statistik seseorang yang rutin melakukan shalat tahajjud lebih berisiko rendah terbukti dari 13 responden 8 di antaranya jarang melakukan shalat tahajjud dan 5 responden yang rutin melakukan shalat tahajjud walaupun tak ada hubungan dari segi analisis data sebab menurut sopiyuddin kurangnya power atau jumlah sampel dalam penelitian membuat secara analisis data tidak memiliki hubungan yang bermakna (Sopiyuddin,2007).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017, sebaran faktor risiko yang tinggi adalah kolesterol total dan obesitas sentral. Sedangkan tingkatan risiko penyakit jantung koroner berdasarkan *framingham risk score* bahwa pada PNS UIN Alauddin Makassar yang berisiko tinggi untuk menderita PJK dalam 10 tahun yakni 14.6%, berisiko sedang sebanyak 19.1% dan yang berisiko rendah sebanyak 66.3%.
2. Pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017, Hubungan antara tingkat risiko penyakit jantung koroner dengan faktor risiko jenis kelamin, usia, status merokok, tekanan darah, kolesterol total serta obesitas sentral memiliki hubungan yang bermakna dengan kesimpulan H_a diterima dan H_0 ditolak, sedangkan hubungan antara tingkatan risiko PJK dengan faktor risiko diabetes mellitus dan riwayat penyakit jantung koroner dalam keluarga tidak memiliki hubungan dengan kesimpulan H_0 diterima H_a ditolak.
3. Pada PNS UIN Alauddin Makassar tahun 2017, Hubungan antara tingkatan risiko PJK dengan frekuensi puasa sunnah dan shalat tahajjud tidak memiliki hubungan.

B. Saran

1. Bagi instansi tempat penelitian

Diharapkan agar Rektor mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh pegawai ditambah dengan penyuluhan yang bersifat preventif agar para Pegawai sadar dan peduli akan pentingnya kesehatan sehingga dapat sedini mungkin mengubah gaya hidup dengan pola hidup sehat.

2. Bagi Penelitian

Setelah mengetahui tingkatan risiko penyakit jantung koroner dikalangan PNS UIN alauddin Makassar, diharapkan jika penelitian ingin dilanjutkan agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan EKG pada sampel yang sama atau yang berisiko tinggi dan sedang untuk menderita Penyakit Jantung Koroner.

3. Bagi pelayanan kesehatan

Agar pelayanan kesehatan primer memberikan edukasi sedini mungkin kepada masyarakat luas guna mengurangi kejadian penyakit jantung koroner karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

C. Implikasi penelitian

1. Diharapkan kepada pegawai negeri sipil UIN Alauddin Makassar agar mengurangi konsumsi berlemak tinggi seperti gorengan.
2. Diharapkan agar Rektor memberlakukan senam rutin dan wajib tiap minggu pada pegawai negeri sipil UIN Alauddin Makassar agar dapat mengurangi kalori berlebih pada PNS UIN Alauddin Makassar.
3. Diharapkan agar sampel yang hasil penelitian berisiko tinggi menderita penyakit jantung koroner agar sedini mungkin melakukan pemeriksaan EKG dan menjalankan pola hidup sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya, 2013. Departemen Agama RI.
- Association, American Heart. (2015). *Coronary artery diseases*. Retrieved januari, 2017, from: <http://www.heart.org/HEARTORG/Conditionon/More/myheartandstrokerNews/Coronary-artery-disease>.
- Association, American Heart. (2014). *Obesity information*. Retrieved januari 2017, from http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/weightmanagement/Obesity/Obesity-information_UCM_307908_Article.jsp.
- CDC. (2013). *Top 10 causes of death in indonesia*. Retrieved januari 2017, from <http://www.cdc.gov/globalhealth/countries/indonesia/pdf/indonesia.pdf>.
- Sopiyuddin M, 2009. *Statistik untuk kedokteran dan kesehatan : deskriptif, bivariat, dan multivariat*. Jakarta: salemba medika.
- De Ruijter, dkk, 2009. *Use of framingham risk score and biomarkers to predict cardiovascular mortality in older people*. population based observational cohort study.
- Dept of Health Human Service, p. h, 2010. *How to tobacco smoke causse disease the biolgy and behavioral basis for smoking*.
- Dinkes Provinsi Sulawesi selatan, d. k 2014. *Profil kesehatan provinsi sulawesi selatan*. Makassar,.
- Fatrani, M, 2015. *Penilaian tingkat risiko dan faktor faktor yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner pada masyarakat binaan KPKM Buaran FKIK UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Kautzar Rizky, 2013. *Analisis tingkat risiko penyakit jantung koroner dengan metode framingham pada pegawai di batan*. Serpong.
- Kemkes RI, 2013. *Riset kesehatan dasar. Riskesdas*. badan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- Kurniadi, H, 2013. *Stop gejala penyakit jantung koroner*. Yogyakarta: familia.
- Kumar A, C, 2009. *Acute Coronary Syndrom: diagnosis management* Mayo clinic Proceeding.
- LS, L. P, 2011. *Pathophysiology of heart disease: Atherosclerosis* Philadelphia: Lippincott.

- (NHLBI),H,2013. *Risk assesment Tool for estimating your 10 year Risk of having a heart attack*. Retrieved january 2017, from <http://www.cvdrisk.nhlbi.nih.gov/calculator.asp>.
- Organization, WH. (2011). *Cardiovascular diseases fact sheets (internet)*. Retrieved january 2017, from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/>.
- Philip I, dkk, 2008.*At A Glance Edisi Ketiga Sistem Kardivaskuler* . Jakarta: Erlangga.
- Rilantono, L. 2015. *Penyakit kardiovaskuler(PKV)*. Jakarta: FK UI.
- Djufri., K. R. (2010). *Hikmah Puasa Bagi Kesehatan Manusia*. kesamben : jelajah ilmu.
- Ikrar, T. (2012). *Puasa dan Kesehatan Otak*. republica.
- Musfah, j.2004. *Risalah puasa ; menjadikan puasa penuh pahala*. yogyakarta: yogyakarta hijrah.
- Katsir Ibnu,2009.Tafsir ibnu katsir*. Pustaka Imam syafi'i. Jakarta .
- Hamka, Prof.1985.*Tafsir al Azhar*. Pustaka Panji Mas. Jakarta.
- Tahrir,h.(2017).*Adab makan*.www.Hizbut-Tahrir.or.id diakses pada tanggal 18 April 2017 : <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/adab-makan-makan-sekadarnya/http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/adab-makan-makan-sekadarnya/>
- Dourman,Karel,2013.*Waspadalah jantung anda rusak*.jakarta : cerdas sehat .
- aryana, dkk,2011. *Kolerasi antara obesitas sentral dengan adiponektin pada lansia dengan penyakit jantung Koroner*.
- AlFajar,Kemal.2013. *Hubungan aktivitas fisik dengan kejadian PJK di indonesia: analisis data risikesdas*,jakarta: skripsi.
- Masriadi,2014.*Pengantar epidemiologi* . Yogyakarta : leutika books.
- Farahdika, .Azam. 2014.*Faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner pada usia madya*.Semarang: Journal unnes.
- Kurnia,Prayogi.2015.*Faktor jenis kelamin, genetik, usia, tingkat stress dan hipertensi sebagai faktor risiko penyakit jantung koroner*.kediri : Stikes RS Baptis:

Prayogi, Mamat.2008. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit jantung koroner pada kelompok usia < 45 tahun 2008*. Semarang: tesis

Ester,Jeini.2011. *Karakteristik individu penderita penyakit jantung koroner di Sulawesi Utara tahun 2011*.Sulawesi Utara: unsrat journal.



LAMPIRAN 1

Kuisiener Penelitian

FAKTOR RISIKO PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA PEGAWAI

NEGERI SIPIL UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017

Nama Responden :

Usia :

Jenis Kelamin :

Risk Factor	Risk Points		Points	
	Men	Women		
Age				
30-34	0	0		
35-39	2	2		
40-44	5	4		
45-49	7	5		
50-54	8	7		
55-59	10	8		
60-64	11	9		
65-69	13	10		
70-74	14	11		
75+	15	12		
HDL-C (mmol/L)				
>1.6	-2	-2		
1.3-1.6	-1	-1		
1.2-1.3	0	0		
0.9-1.2	1	1		
<0.9	2	2		
Total Cholesterol				
<4.1	0	0		
4.1-5.2	1	1		
5.2-6.2	2	3		
6.2-7.2	3	4		
>7.2	4	5		
Systolic Blood Pressure (mmHg)				
	Not Treated	Treated	Not Treated	Treated
<120	-2	0	-3	-1
120-129	0	2	0	2
130-139	1	3	1	3
140-149	2	4	2	5
150-159	2	4	4	6
160+	3	5	5	7
Diabetes	Yes	3		4
	No	0		0
Smoker	Yes	4		3
	No	0		0
Total Points				

No	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Apakah ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit kantung koroner ?	-Tidak ada -ya,ada yaitu :	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah • Ibu • Saudara kandung • Nenek • kakek
2.	Berat Badankg	
3.	Tinggi Badancm	
4.	Lingkar Perutcm	
5.	Apakah anda sering melaksanakan puasa sunnah?	-ya,yaitu : -kadang -jarang -tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> • puasa senin kamis • puasa ayyamul bidh
6.	Apakah anda sering melakukan ibadah shalat sunnah tahajjud ?	-ya -kadang -jarang -tidak pernah	
No	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Apakah ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit kantung koroner ?	-Tidak ada -ya,ada yaitu :	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah • Ibu • Saudara kandung • Nenek • kakek
2.	Berat Badankg	
3.	Tinggi Badancm	
4.	Lingkar Perutcm	
5.	Apakah anda sering melaksanakan puasa sunnah?	-ya,yaitu : -kadang -jarang -tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> • puasa senin kamis • puasa ayyamul bidh
6.	Apakah anda sering melakukan ibadah shalat sunnah tahajjud ?	-ya -kadang -jarang -tidak pernah	

lampiran data view

FKIK	hasl	35-39 tahun	laki laki	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko Rendah	ya	ayah	tidak <90 cm	jarang	jarang
FKIK	siti r	40-44 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	kadang	kadang
FKIK	surr	35-39 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	ya	kakek	tidak < 80 cm	jarang	jarang
FKIK	fatin	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		ya >80 cm	jarang	kadang
FKIK	suar	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko sedang	ya	ayah	ya >80 cm	jarang	jarang
FKIK	andi	35-39 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	kadang	kadang
FKIK	hari	45-49 tahun	laki laki	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		tidak <90 cm	jarang	rutin
FKIK	syar	35-39 tahun	laki laki	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	jarang	jarang
FKIK	saha	35-39 tahun	laki laki	tidak	tidak	150-159	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		tidak <90 cm	jarang	jarang
Tarbiyah	syah	50-54 tahun	laki laki	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		ya > 90 cm	kadang	rutin
Tarbiyah	sukr	30-34 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	jarang	kadang
Tarbiyah	ibu j	40-44 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	jarang	rutin
Tarbiyah	h.Ta	45-49 tahun	laki laki	tidak	ya	140-149	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		ya > 90 cm	rutin	jarang
Tarbiyah	Nur	50-54 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	rutin	rutin
Tarbiyah	Wal	40-44 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	rutin	kadang
Tarbiyah	andi	50-54 tahun	laki laki	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		ya > 90 cm	jarang	kadang
Tarbiyah	Dr.S	50-54 tahun	laki laki	tidak	ya	>160	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		ya > 90 cm	rutin	rutin
Tarbiyah	Hadi	55-60 tahun	laki laki	tidak	tidak	>160	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		ya > 90 cm	jarang	jarang
Tarbiyah	ilyas	50-54 tahun	laki laki	tidak	tidak	140-149	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya > 90 cm	rutin	rutin
Tarbiyah	siti :	50-54 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	jarang	rutin
Tarbiyah	ulfi	40-44 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	ya	ibu	tidak < 80 cm	rutin	rutin
Tarbiyah	mav	55-60 tahun	laki laki	tidak	tidak	120-129	<200 mg/dl	risiko sedang	tidak ada		tidak <90 cm	jarang	rutin
Tarbiyah	muh	45-49 tahun	laki laki	tidak	ya	140-149	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		ya > 90 cm	rutin	rutin
Tarbiyah	ham	50-54 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	kadang	rutin
Tarbiyah	Dr.si	50-54 tahun	perempuan	tidak	tidak	140-149	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	jarang	jarang
syariahhukum war		45-49 tahun	perempuan	ya	tidak	140-149	>200 mg/d;	risiko Rendah	ya	ayah	tidak < 80 cm	jarang	jarang
syariahhukumSabi		45-49 tahun	laki laki	tidak	tidak	150-159	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		tidak <90 cm	rutin	rutin
syariahhukum sifa		45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	>160	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	rutin	rutin
syariahhukum basy		<30 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	rutin	kadang
syariahhukum mus		35-39 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	jarang	jarang
syariahhukum nur :		<30 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	rutin	rutin

syariah hukum sum	50-54 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	kadang	rutin
syariah hukum irfar	45-49 tahun	laki laki	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		tidak <90 cm	kadang	rutin
syariah hukum rahr	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	ya	ayah	ya >80 cm	rutin	rutin
syariah hukum elmi	55-60 tahun	perempuan	tidak	tidak	130-139	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	jarang	jarang
sainsteknologi aska	40-44 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	rutin	rutin
sainsteknologi gaza	35-39 tahun	laki laki	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	rutin	rutin
sainsteknologi a.m	30-34 tahun	laki laki	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	kadang	jarang
sainsteknologi agus	50-54 tahun	laki laki	tidak	tidak	150-159	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		tidak <90 cm	kadang	rutin
sainsteknologi Hasr	50-54 tahun	perempuan	ya	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	ya	ayah	ya >80 cm	jarang	jarang
sainsteknologi Justi	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	150-159	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		ya >80 cm	kadang	kadang
sainsteknologi ansa	40-44 tahun	laki laki	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko Rendah	ya	saudara	tidak <90 cm	rutin	rutin
sainsteknologi adn	40-44 tahun	laki laki	tidak	tidak	150-159	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		ya > 90 cm	jarang	rutin
sainsteknologi wah	35-39 tahun	perempuan	tidak	tidak	130-139	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	kadang	rutin
sainsteknologi nurr	40-44 tahun	laki laki	tidak	tidak	120-129	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	kadang	rutin
ekonomi bisnis: kurn	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	jarang	rutin
ekonomi bisnis: hasa	45-49 tahun	laki laki	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko sedang	tidak ada		tidak < 80 cm	jarang	jarang
ekonomi bisnis: amir	50-54 tahun	laki laki	tidak	ya	140-149	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya > 90 cm	kadang	rutin
ekonomi bisnis: muh	30-34 tahun	laki laki	ya	tidak	120-129	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	rutin	kadang
ekonomi bisnis: urba	55-60 tahun	laki laki	tidak	tidak	140-149	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya > 90 cm	rutin	rutin
ekonomi bisnis: sukr	40-44 tahun	perempuan	tidak	tidak	>160	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		ya >80 cm	kadang	kadang
ushuluddin suria	35-39 tahun	perempuan	tidak	tidak	130-139	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	kadang	jarang
ushuluddin nurv	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	rutin	kadang
ushuluddin sant	45-49 tahun	laki laki	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		ya > 90 cm	rutin	kadang
ushuluddin dew	50-54 tahun	perempuan	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		ya >80 cm	kadang	jarang
ushuluddin Dr.Ir	50-54 tahun	perempuan	tidak	tidak	>160	<200 mg/dl	risiko sedang	tidak ada		ya >80 cm	rutin	rutin
rah dan komu: hj.h	45-49 tahun	perempuan	ya	tidak	140-149	>200 mg/d;	risiko tinggi	ya	ibu	ya >80 cm	jarang	jarang
rah dan komu: bah	45-49 tahun	laki laki	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	kadang	kadang
rah dan komu: imra	40-44 tahun	laki laki	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	rutin	rutin
rah dan komu: hida	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	jarang	kadang
rah dan komu: khai	40-44 tahun	laki laki	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya > 90 cm	rutin	rutin
rah dan komu: muh	55-60 tahun	laki laki	tidak	ya	140-149	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		ya > 90 cm	jarang	kadang
rah dan komu: mur	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	rutin	rutin
dab humanior mak	50-54 tahun	laki laki	tidak	tidak	140-149	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya > 90 cm	jarang	jarang

dab humanior jauh	50-54 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	jarang	rutin
dab humanior muli	30-34 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	jarang	jarang
dab humanior dr.w	55-60 tahun	laki laki	tidak	tidak	140-149	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya > 90 cm	kadang	kadang
dab humanior Nisw	55-60 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	kadang	kadang
dab humanior Dr,Ir	50-54 tahun	laki laki	tidak	tidak	130-139	<200 mg/dl	risiko sedang	tidak ada		tidak <90 cm	jarang	kadang
rektorat And	35-39 tahun	laki laki	tidak	tidak	140-149	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	rutin	jarang
rektorat kurn	35-39 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	jarang	jarang
rektorat a.jar	35-39 tahun	laki laki	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya > 90 cm	rutin	jarang
rektorat suria	40-44 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	rutin	jarang
rektorat nur	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	rutin	kadang
rektorat st,kr	40-44 tahun	perempuan	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak < 80 cm	rutin	jarang
rektorat Ratr	55-60 tahun	perempuan	tidak	tidak	140-149	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		tidak < 80 cm	jarang	jarang
rektorat M.lk	50-54 tahun	laki laki	tidak	tidak	>160	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		tidak <90 cm	rutin	rutin
rektorat aufa	45-49 tahun	laki laki	tidak	ya	130-139	>200 mg/d;	risiko Rendah	ya	ayah	ya > 90 cm	kadang	kadang
rektorat ibral	35-39 tahun	laki laki	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	rutin	kadang
rektorat Nasi	40-44 tahun	laki laki	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko sedang	tidak ada		ya > 90 cm	kadang	rutin
rektorat Sup:	45-49 tahun	laki laki	tidak	ya	120-129	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		ya > 90 cm	jarang	kadang
rektorat Fath	50-54 tahun	laki laki	tidak	ya	120-129	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		ya > 90 cm	jarang	jarang
rektorat Mus	50-54 tahun	laki laki	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko tinggi	tidak ada		tidak <90 cm	rutin	rutin
rektorat umn	45-49 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	jarang	jarang
rektorat Rudi	30-34 tahun	laki laki	tidak	ya	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	rutin	jarang
rektorat muh	30-34 tahun	laki laki	tidak	tidak	130-139	>200 mg/d;	risiko Rendah	ya	nenek	ya > 90 cm	jarang	jarang
rektorat Kus:	45-49 tahun	laki laki	tidak	tidak	<120	<200 mg/dl	risiko Rendah	ya	ayah	tidak <90 cm	rutin	rutin
rektorat mu.:	40-44 tahun	laki laki	tidak	tidak	<120	>200 mg/d;	risiko Rendah	tidak ada		tidak <90 cm	kadang	kadang
rektorat nurf	40-44 tahun	perempuan	tidak	tidak	120-129	<200 mg/dl	risiko Rendah	tidak ada		ya >80 cm	jarang	jarang

1. ANALISIS UNIVARIAT

usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <30 tahun	2	2,2	2,2	2,2
30-34 tahun	6	6,7	6,7	9,0
35-39 tahun	13	14,6	14,6	23,6
40-44 tahun	16	18,0	18,0	41,6
45-49 tahun	24	27,0	27,0	68,5
50-54 tahun	20	22,5	22,5	91,0
55-60 tahun	8	9,0	9,0	100,0
Total	89	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki laki	45	50,6	50,6	50,6
perempuan	44	49,4	49,4	100,0
Total	89	100,0	100,0	

Status Diabetes

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	4	4,5	4,5	4,5
tidak	85	95,5	95,5	100,0
Total	89	100,0	100,0	

Status Merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	9	10,1	10,1	10,1
tidak	80	89,9	89,9	100,0
Total	89	100,0	100,0	

tekanan darah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<120	29	32,6	32,6	32,6
	120-129	21	23,6	23,6	56,2
	130-139	15	16,9	16,9	73,0
	140-149	13	14,6	14,6	87,6
	150-159	5	5,6	5,6	93,3
	>160	6	6,7	6,7	100,0
	Total	89	100,0	100,0	

Total Kolesterol;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<200 mg/dl	36	40,4	40,4	40,4
	>200 mg/d;	53	59,6	59,6	100,0
	Total	89	100,0	100,0	

Tingkatan Risiko

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	risiko tinggi	13	14,6	14,6	14,6
	risiko sedang	17	19,1	19,1	33,7
	risiko Rendah	59	66,3	66,3	100,0
	Total	89	100,0	100,0	

Riwayat penyakit jantung

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	12	13,5	13,5	13,5
	tidak ada	77	86,5	86,5	100,0
	Total	89	100,0	100,0	

Keluarga yang menderita

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ayah	7	7,9	58,3	58,3
	ibu	2	2,2	16,7	75,0
	saudara	1	1,1	8,3	83,3
	nenek	1	1,1	8,3	91,7
	kakek	1	1,1	8,3	100,0
	Total	12	13,5	100,0	
Missing	System	77	86,5		
	Total	89	100,0		

Status Obesitas Sentral

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya >80 cm	29	32,6	32,6	32,6
	tidak < 80 cm	15	16,9	16,9	49,4
	ya > 90 cm	21	23,6	23,6	73,0
	tidak <90 cm	24	27,0	27,0	100,0
	Total	89	100,0	100,0	

Puasa Sunnah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rutin	33	37,1	37,1	37,1
	kadang	21	23,6	23,6	60,7
	jarang	35	39,3	39,3	100,0
	Total	89	100,0	100,0	

Jenis puasa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	senin kamis	89	100,0	100,0	100,0
-------	-------------	----	-------	-------	-------

Shalat tahajjud

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rutin	36	40,4	40,4
	kadang	23	25,8	66,3
	jarang	30	33,7	100,0
	Total	89	100,0	

2. ANALISIS BIVARIAT

usia * Tingkatan Risiko Crosstabulation

			Tingkatan Risiko			
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	Total
usia	25-44 tahun	Count	0	4	33	37
		% within usia	0.0%	10.8%	89.2%	100.0%
	45-60 tahun	Count	13	13	26	52
		% within usia	25.0%	25.0%	50.0%	100.0%
Total		Count	13	17	59	89
		% within usia	14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.537 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	21.331	2	.000
Linear-by-Linear Association	16.254	1	.000
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,40.

Jenis Kelamin * Tingkatan Risiko Crosstabulation

			Tingkatan Risiko			
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	Total
Jenis Kelamin	laki laki	Count	11	11	23	45
		% within Jenis Kelamin	24.4%	24.4%	51.1%	100.0%

perempuan	Count	2	6	36	44
	% within Jenis Kelamin	4.5%	13.6%	81.8%	100.0%
Total	Count	13	17	59	89
	% within Jenis Kelamin	14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.556 ^a	2	.005
Likelihood Ratio	11.229	2	.004
Linear-by-Linear Association	10.397	1	.001
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,43.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Status Merokok * Tingkatan Risiko	89	100.0%	0	0.0%	89	100.0%

Status Merokok * Tingkatan Risiko Crosstabulation

		Tingkatan Risiko			Total
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
Status Merokok	ya	Count 6	0	3	9
		% within Status Merokok 66.7%	0.0%	33.3%	100.0%
tidak	Count	7	17	56	80
	% within Status Merokok	8.8%	21.3%	70.0%	100.0%
Total	Count	13	17	59	89
	% within Status Merokok	14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.131 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	16.640	2	.000

Linear-by-Linear Association	13.206	1	.000
N of Valid Cases	89		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,31.

tekanan darah * Tingkatan Risiko Crosstabulation

		Tingkatan Risiko			Total	
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah		
tekanan darah	normal dan prehipertensi	Count	6	10	50	66
		% within tekanan darah	9.1%	15.2%	75.8%	100.0%
	hipertensi derajat 1 dan 2	Count	7	7	9	23
		% within tekanan darah	30.4%	30.4%	39.1%	100.0%
Total		Count	13	17	59	89
		% within tekanan darah	14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.857 ^a	2	.004
Likelihood Ratio	10.333	2	.006
Linear-by-Linear Association	10.460	1	.001
N of Valid Cases	89		

Total Kolesterol; * Tingkatan Risiko Crosstabulation

		Tingkatan Risiko			Total	
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah		
Total Kolesterol;	optimal dan borderline <239 mg/dl	Count	4	8	42	54
		% within Total Kolesterol;	7.4%	14.8%	77.8%	100.0%
	tinggi dan sangat tinggi >240 mg/dl	Count	9	9	17	35
		% within Total Kolesterol;	25.7%	25.7%	48.6%	100.0%
Total		Count	13	17	59	89
		% within Total Kolesterol;	14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.926 ^a	2	.012
Likelihood Ratio	8.880	2	.012
Linear-by-Linear Association	8.748	1	.003
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,11.

Riwayat penyakit jantung * Tingkatan Risiko Crosstabulation

		Tingkatan Risiko			Total
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
Riwayat penyakit jantung	ya	Count 1	1	10	12
		% within Riwayat penyakit jantung 8.3%	8.3%	83.3%	100.0%
tidak ada	Count	12	16	49	77
	% within Riwayat penyakit jantung	15.6%	20.8%	63.6%	100.0%
Total	Count	13	17	59	89
	% within Riwayat penyakit jantung	14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.823 ^a	2	.402
Likelihood Ratio	2.037	2	.361
Linear-by-Linear Association	1.376	1	.241
N of Valid Cases	89		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,75.

Status Obesitas Sentral * Tingkatan Risiko Crosstabulation

		Tingkatan Risiko			Total
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
Status Obesitas Sentral	ya >80 cm >90cm	Count 10	9	31	50
		% within Status Obesitas Sentral 20.0%	18.0%	62.0%	100.0%
tidak < 80 cm <90 cm	Count	3	8	28	39

	% within Status Obesitas Sentral	7.7%	20.5%	71.8%	100.0%
Total	Count	13	17	59	89
	% within Status Obesitas Sentral	14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.662 ^a	2	.264
Likelihood Ratio	2.825	2	.244
Linear-by-Linear Association	1.953	1	.162
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

Puasa Sunnah * Tingkatan Risiko Crosstabulation

		Tingkatan Risiko			Total	
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah		
Puasa Sunnah	Rutin	Count	5	3	25	33
		% within Puasa Sunnah	15.2%	9.1%	75.8%	100.0%
	kadang dan jarang	Count	8	14	34	56
		% within Puasa Sunnah	14.3%	25.0%	60.7%	100.0%
Total		Count	13	17	59	89
		% within Puasa Sunnah	14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.471 ^a	2	.176
Likelihood Ratio	3.788	2	.150
Linear-by-Linear Association	.762	1	.383
N of Valid Cases	89		

Shalat tahajjud * Tingkatan Risiko Crosstabulation

		Tingkatan Risiko			Total	
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah		
Shalat tahajjud	rutin	Count	5	8	23	36

	% within Shalat tahajjud	13.9%	22.2%	63.9%	100.0%
kadang dan jarang	Count	8	9	36	53
	% within Shalat tahajjud	15.1%	17.0%	67.9%	100.0%
Total	Count	13	17	59	89
	% within Shalat tahajjud	14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.382 ^a	2	.826
Likelihood Ratio	.378	2	.828
Linear-by-Linear Association	.031	1	.859
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5.

Status Diabetes * Tingkatan Risiko Crosstabulation

		Tingkatan Risiko			Total
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
Status Diabetes	ya	Count 1	0	3	4
		% within Status Diabetes 25.0%	0.0%	75.0%	100.0%
	tidak	Count 12	17	56	85
		% within Status Diabetes 14.1%	20.0%	65.9%	100.0%
Total		Count 13	17	59	89
		% within Status Diabetes 14.6%	19.1%	66.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.158 ^a	2	.561
Likelihood Ratio	1.867	2	.393
Linear-by-Linear Association	.002	1	.963
N of Valid Cases	89		

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30 tahun	2	2.2	2.2	2.2
	30-34 tahun	6	6.7	6.7	9.0
	35-39 tahun	13	14.6	14.6	23.6
	40-44 tahun	16	18.0	18.0	41.6
	45-49 tahun	24	27.0	27.0	68.5
	50-54 tahun	20	22.5	22.5	91.0
	55-60 tahun	8	9.0	9.0	100.0
	Total	89	100.0	100.0	

		Total Kolesterol;		Total	
		<200 mg/dl	>200 mg/d;		
usia	<30 tahun	Count	2	0	2
		% within usia	100.0%	0.0%	100.0%
	30-34 tahun	Count	3	3	6
		% within usia	50.0%	50.0%	100.0%
	35-39 tahun	Count	6	7	13
		% within usia	46.2%	53.8%	100.0%
	40-44 tahun	Count	6	10	16
		% within usia	37.5%	62.5%	100.0%
	45-49 tahun	Count	7	17	24
		% within usia	29.2%	70.8%	100.0%
	50-54 tahun	Count	9	11	20
		% within usia	45.0%	55.0%	100.0%
	55-60 tahun	Count	3	5	8
		% within usia	37.5%	62.5%	100.0%
Total		Count	36	53	89
		% within usia	40.4%	59.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.874 ^a	6	.560
Likelihood Ratio	5.595	6	.470
Linear-by-Linear Association	1.051	1	.305
N of Valid Cases	89		

a. 6 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81.

usia * Tingkatan Risiko Crosstabulation

			Tingkatan Risiko			Total
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
usia	25-44 tahun	Count	0	4	33	37
		% within usia	0,0%	10,8%	89,2%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	0,0%	23,5%	55,9%	41,6%
		% of Total	0,0%	4,5%	37,1%	41,6%
	45-60 tahun	Count	13	13	26	52
		% within usia	25,0%	25,0%	50,0%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	100,0%	76,5%	44,1%	58,4%
		% of Total	14,6%	14,6%	29,2%	58,4%
Total		Count	13	17	59	89
		% within usia	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,537 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	21,331	2	,000
Linear-by-Linear Association	16,254	1	,000
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,40.

usia * Tingkatan Risiko

Crosstab

			Tingkatan Risiko			Total
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
usia	25-44 tahun	Count	0	4	33	37
		% within usia	0,0%	10,8%	89,2%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	0,0%	23,5%	55,9%	41,6%
		% of Total	0,0%	4,5%	37,1%	41,6%
	45-60 tahun	Count	13	13	26	52
		% within usia	25,0%	25,0%	50,0%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	100,0%	76,5%	44,1%	58,4%
		% of Total	14,6%	14,6%	29,2%	58,4%
Total		Count	13	17	59	89
		% within usia	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	16,537 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	21,331	2	,000
Linear-by-Linear Association	16,254	1	,000
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,40.

Jenis Kelamin * Tingkatan Risiko

Crosstab

			Tingkatan Risiko			Total
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
Jenis Kelamin	laki laki	Count	11	11	23	45
		% within Jenis Kelamin	24,4%	24,4%	51,1%	100,0%

	% within Tingkatan Risiko	84,6%	64,7%	39,0%	50,6%
	% of Total	12,4%	12,4%	25,8%	50,6%
perempuan	Count	2	6	36	44
	% within Jenis Kelamin	4,5%	13,6%	81,8%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	15,4%	35,3%	61,0%	49,4%
	% of Total	2,2%	6,7%	40,4%	49,4%
Total	Count	13	17	59	89
	% within Jenis Kelamin	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,556 ^a	2	,005
Likelihood Ratio	11,229	2	,004
Linear-by-Linear Association	10,397	1	,001
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,43.

Status Diabetes * Tingkatan Risiko

Crosstab

		Tingkatan Risiko			Total	
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah		
Status Diabetes	ya	Count	1	0	3	4
		% within Status Diabetes	25,0%	0,0%	75,0%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	7,7%	0,0%	5,1%	4,5%
		% of Total	1,1%	0,0%	3,4%	4,5%
tidak	Count	12	17	56	85	
	% within Status Diabetes	14,1%	20,0%	65,9%	100,0%	
	% within Tingkatan Risiko	92,3%	100,0%	94,9%	95,5%	
	% of Total	13,5%	19,1%	62,9%	95,5%	
Total	Count	13	17	59	89	
	% within Status Diabetes	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%	
	% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
------------	-------	-------	-------	--------

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,158 ^a	2	,561
Likelihood Ratio	1,867	2	,393
Linear-by-Linear Association	,002	1	,963
N of Valid Cases	89		

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,58.

Status Merokok * Tingkatan Risiko

Crosstab

			Tingkatan Risiko			Total
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
Status Merokok	ya	Count	6	0	3	9
		% within Status Merokok	66,7%	0,0%	33,3%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	46,2%	0,0%	5,1%	10,1%
		% of Total	6,7%	0,0%	3,4%	10,1%
tidak		Count	7	17	56	80
		% within Status Merokok	8,8%	21,3%	70,0%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	53,8%	100,0%	94,9%	89,9%
		% of Total	7,9%	19,1%	62,9%	89,9%
Total		Count	13	17	59	89
		% within Status Merokok	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	22,131 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	16,640	2	,000
Linear-by-Linear Association	13,206	1	,000
N of Valid Cases	89		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5

tekanan darah * Tingkatan Risiko

Crosstab

			Tingkatan Risiko			Total
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
tekanan darah normal dan prehipertensi	Count	6	10	50	66	
	% within tekanan darah	9,1%	15,2%	75,8%	100,0%	
	% within Tingkatan Risiko	46,2%	58,8%	84,7%	74,2%	
	% of Total	6,7%	11,2%	56,2%	74,2%	
hipertensi derajat 1 dan 2	Count	7	7	9	23	
	% within tekanan darah	30,4%	30,4%	39,1%	100,0%	
	% within Tingkatan Risiko	53,8%	41,2%	15,3%	25,8%	
	% of Total	7,9%	7,9%	10,1%	25,8%	
Total	Count	13	17	59	89	
	% within tekanan darah	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%	
	% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,857 ^a	2	,004
Likelihood Ratio	10,333	2	,006
Linear-by-Linear Association	10,460	1	,001
N of Valid Cases	89		

Total Kolesterol; * Tingkatan Risiko

Crosstab

			Tingkatan Risiko			Total
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
Total Kolesterol; optimal dan borderline <239 mg/dl	Count	4	8	42	54	
	% within Total Kolesterol;	7,4%	14,8%	77,8%	100,0%	
	% within Tingkatan Risiko	30,8%	47,1%	71,2%	60,7%	
	% of Total	4,5%	9,0%	47,2%	60,7%	
tinggi dan sangat tinggi >240 mg/dl	Count	9	9	17	35	
	% within Total Kolesterol;	25,7%	25,7%	48,6%	100,0%	

	% within Tingkatan Risiko	69,2%	52,9%	28,8%	39,3%
	% of Total	10,1%	10,1%	19,1%	39,3%
Total	Count	13	17	59	89
	% within Total Kolestero;	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,926 ^a	2	,012
Likelihood Ratio	8,880	2	,012
Linear-by-Linear Association	8,748	1	,003
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,11.

tekanan darah diastol * Tingkatan Risiko

Crosstab

		Tingkatan Risiko			Total
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
tekanan darah diastol <90 mmHg	Count	10	13	52	75
	% within tekanan darah diastol	13,3%	17,3%	69,3%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	76,9%	76,5%	88,1%	84,3%
	% of Total	11,2%	14,6%	58,4%	84,3%
tekanan darah diastol >90 mmHg	Count	3	4	7	14
	% within tekanan darah diastol	21,4%	28,6%	50,0%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	23,1%	23,5%	11,9%	15,7%
	% of Total	3,4%	4,5%	7,9%	15,7%
Total	Count	13	17	59	89
	% within tekanan darah diastol	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,975 ^a	2	,373
Likelihood Ratio	1,888	2	,389
Linear-by-Linear Association	1,620	1	,203
N of Valid Cases	89		

Riwayat penyakit jantung * Tingkatan Risiko

Crosstab

		Tingkatan Risiko			Total	
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah		
Riwayat penyakit jantung	ya	Count	1	1	10	12
		% within Riwayat penyakit jantung	8,3%	8,3%	83,3%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	7,7%	5,9%	16,9%	13,5%
		% of Total	1,1%	1,1%	11,2%	13,5%
tidak ada		Count	12	16	49	77
		% within Riwayat penyakit jantung	15,6%	20,8%	63,6%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	92,3%	94,1%	83,1%	86,5%
		% of Total	13,5%	18,0%	55,1%	86,5%
Total		Count	13	17	59	89
		% within Riwayat penyakit jantung	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Test

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,823 ^a	2	,402
Likelihood Ratio	2,037	2	,361
Linear-by-Linear Association	1,376	1	,241
N of Valid Cases	89		

Status Obesitas Sentral * Tingkatan Risiko

Crosstab

			Tingkatan Risiko			Total
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
Status Obesitas Sentral	ya >80 cm >90cm	Count	10	9	31	50
		% within Status Obesitas Sentral	20,0%	18,0%	62,0%	100,0%
	tidak < 80 cm <90 cm	Count	3	8	28	39
		% within Status Obesitas Sentral	7,7%	20,5%	71,8%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	76,9%	52,9%	52,5%	56,2%
		% of Total	11,2%	10,1%	34,8%	56,2%
Total	Count		13	17	59	89
	% within Status Obesitas Sentral		14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total		14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,662 ^a	2	,264
Likelihood Ratio	2,825	2	,244
Linear-by-Linear Association	1,953	1	,162
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,70.

Puasa Sunnah * Tingkatan Risiko

Crosstab

			Tingkatan Risiko			Total
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	
Puasa Sunnah	rutin	Count	5	3	25	33
		% within Puasa Sunnah	15,2%	9,1%	75,8%	100,0%
	kadang dan jarang	Count	8	14	34	56
		% within Puasa Sunnah	38,5%	17,6%	42,4%	37,1%
		% of Total	5,6%	3,4%	28,1%	37,1%

	% within Puasa Sunnah	14,3%	25,0%	60,7%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	61,5%	82,4%	57,6%	62,9%
	% of Total	9,0%	15,7%	38,2%	62,9%
Total	Count	13	17	59	89
	% within Puasa Sunnah	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,471 ^a	2	,176
Likelihood Ratio	3,788	2	,150
Linear-by-Linear Association	,762	1	,383
N of Valid Cases	89		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,82.

Shalat tahajjud * Tingkatan Risiko

Crosstab

		Tingkatan Risiko			Total	
		risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah		
Shalat tahajjud	rutin	Count	5	8	23	36
		% within Shalat tahajjud	13,9%	22,2%	63,9%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	38,5%	47,1%	39,0%	40,4%
		% of Total	5,6%	9,0%	25,8%	40,4%
kadang dan jarang		Count	8	9	36	53
		% within Shalat tahajjud	15,1%	17,0%	67,9%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	61,5%	52,9%	61,0%	59,6%
		% of Total	9,0%	10,1%	40,4%	59,6%
Total		Count	13	17	59	89
		% within Shalat tahajjud	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,382 ^a	2	,826
Likelihood Ratio	,378	2	,828
Linear-by-Linear Association	,031	1	,859
N of Valid Cases	89		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,26.

usia * Tingkatan Risiko Crosstabulation

			Tingkatan Risiko			
			risiko tinggi	risiko sedang	risiko Rendah	Total
usia	<30 tahun	Count	0	0	2	2
		Expected Count	,3	,4	1,3	2,0
		% within usia	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	0,0%	0,0%	3,4%	2,2%
		% of Total	0,0%	0,0%	2,2%	2,2%
30-34 tahun	Count	Count	0	0	6	6
		Expected Count	,9	1,1	4,0	6,0
		% within usia	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	0,0%	0,0%	10,2%	6,7%
		% of Total	0,0%	0,0%	6,7%	6,7%
35-39 tahun	Count	Count	0	1	12	13
		Expected Count	1,9	2,5	8,6	13,0
		% within usia	0,0%	7,7%	92,3%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	0,0%	5,9%	20,3%	14,6%
		% of Total	0,0%	1,1%	13,5%	14,6%
40-44 tahun	Count	Count	0	3	13	16
		Expected Count	2,3	3,1	10,6	16,0
		% within usia	0,0%	18,8%	81,3%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	0,0%	17,6%	22,0%	18,0%
		% of Total	0,0%	3,4%	14,6%	18,0%
45-49 tahun	Count	Count	4	8	12	24
		Expected Count	3,5	4,6	15,9	24,0
		% within usia	16,7%	33,3%	50,0%	100,0%
		% within Tingkatan Risiko	30,8%	47,1%	20,3%	27,0%

	% of Total	4,5%	9,0%	13,5%	27,0%
50-54 tahun	Count	6	4	10	20
	Expected Count	2,9	3,8	13,3	20,0
	% within usia	30,0%	20,0%	50,0%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	46,2%	23,5%	16,9%	22,5%
	% of Total	6,7%	4,5%	11,2%	22,5%
55-60 tahun	Count	3	1	4	8
	Expected Count	1,2	1,5	5,3	8,0
	% within usia	37,5%	12,5%	50,0%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	23,1%	5,9%	6,8%	9,0%
	% of Total	3,4%	1,1%	4,5%	9,0%
Total	Count	13	17	59	89
	Expected Count	13,0	17,0	59,0	89,0
	% within usia	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%
	% within Tingkatan Risiko	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	14,6%	19,1%	66,3%	100,0%

LAMPIRAN 7
DOKUMENTASI



Saat melakukan pemeriksaan kolesterol total pada pegawai negeri sipil yang menjadi sampel dalam penelitian



Saat melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pegawai negeri sipil yang menjadi sampel dalam penelitian

