

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR
DENGAN IKTERUS NEONATORUM
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Pendidikan
Ahli Madya Kebidanan Jurusan D III Kebidanan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

HARTINA
70400114043

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartina
Nim : 70400114043
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 25 Mei 1996
Jurusan/Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/ Diploma
Alamat : Perumahan Patri Abdullah Permai
Judul : “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Ikterus Neonatorum Di RSUD Syekh Yusuf Gowa “

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar adalah hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 22 Agustus 2017

Penyusun



Hartina

70400114043

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Hartina

Nim : 70400114043

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Ikterus Neonatorum di
RSUD Syekh Yusuf Gowa


Karya Tulis Ilmiah ini Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing I



Arteq Mumtiah Alkautsar, S.SiI.,M.Keb

Pembimbing II



dr. Nadyah Haruna, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”**, yang disusun oleh **Hartina NIM: 70400114043**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 31 Agustus 2017 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 31 Agustus 2017 M

09 Dzul-Hijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Firdayanti, S.Si.T., M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **dr. Nadyah, M.Kes** (.....)

Penguji I : **dr. Syahtirah Jalaluddin, Sp. A., M.Kes** (.....)

Penguji II : **Dr. Firdaus Muhammad, M. Ag** (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa” dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya karya tulis ilmiah ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Karya tulis ilmiah ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang telah tulus ikhlas memberikan nasihat, kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dan dukungan moral dan materil. Terima kasih telah mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb selaku pembimbing I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar, ikhlas dan senantiasa memberikan semangat.
5. Ibu dr Nadyah Haruna., M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbingku dan mengajarku untuk disiplin dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
6. Ibu dr Syatirah Jalaluddin., Sp.A., M.Kes selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.
7. Bapak ustadz Dr. Firdaus Muhammad M.Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar
9. Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.

10. Kepada sahabatku tercinta, Rosnani, Nurjannah, Zuhriani, Miftahul
Khair Wahid, Geni Liskantari dan Ira Ayu Lestari.

11. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan
saran dan masukan khususnya angkatan 2014.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunianya dan
membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu
penulis dalam penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan
manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Samata-Gowa, 22 Agustus 2017

Penulis

Hartina

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir	
1. Pengertian Bayi Baru Lahir	9
2. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir Normal	9
3. Penilaian Bayi Baru Lahir.....	10
4. Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir	12
5. Inisiasi Pernapasan Spontan.....	13
6. Stabilitas Temperatur Tubuh Bayi.....	13

B. Tinjauan Khusus Tentang Ikterus	
1. Pengertian	14
2. Klasifikasi	15
3. Manifestasi Klinik.....	17
4. Etiologi.....	18
5. Patofisiologi Ikterus	20
6. Faktor Resiko	21
7. Komplikasi.....	22
8. Penilaian Bayi Ikterus	22
9. Penanganan Bayi Ikterus	24
10. Mencegah Ikterus Pada Bayi	33
11. Standar Operasional Prosedur Fototerapi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	34
C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan.....	35
2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan.....	35
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Perawatan Bayi Baru Lahir Dalam Islam	
1. Pemberian ASI.....	41
2. Mengadzani Bayi	43
3. Pemberian Nama.....	44
4. Aqiqah.....	45

BAB III STUDI KASUS

A. Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Dengan Ikterus Patologi

Di Rsud Syekh Yusuf Gowa

1. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	47
2. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual	53
3. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial	56
4. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi	57
5. Langkah V. Rencana tindakan	57
6. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	59
7. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	61
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 28 April 2017	62
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 29 April 2017	69
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 30 April 2017	73
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 02 Mei 2017	77

BAB IV PEMBAHASAN

A. Identifikasi data dasar.....	81
B. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual	87
C. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	92
D. Tindakan segera/ kolaborasi.....	93

E. Rencana tindakan	94
F. Tindakan asuhan kebidanan	96
G. Evaluasi asuhan kebidanan.....	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	Penilaian APGAR Score.....	11
Tabel 2.2 :	Rumus Kramer.....	23
Tabel 2.3 :	Petunjuk Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia Berdasarkan Berat Badan Dan Bayi Baru Lahir Yang Relatif Sehat.....	27
Table 2.4 :	Petunjuk Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia Pada Bayi Sehat Cukup Bulan.....	28
Tabel 2.5 :	Indikasi Transfusi Tukar Berdasarkan TSB (WHO).....	31
Tabel 2.6 :	Indikasi Transfusi Tukar Pada BBLR.....	32
Tabel 2.7 :	Standar Operasional Prosedur (SOP) Fototerapi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	34
Tabel 3.1 :	Riwayat Persalinan Ibu Pasien Terdahulu.....	49
Tabel 3.2 :	Riwayat Persalinan Ibu Pasien Terdahulu.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Penilaian Bayi Ikterus.....	22
Gambar 2.2 : Grafik Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia Pada BBLR	30



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2017

Hartina,

Pembimbing I: Anieq Mumthiah Alkautsar, S.SiT, M.Keb

Pembimbing II: dr. Nadyah Haruna, M.Kes

“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP yaitu langkah I identifikasi data dasar, langkah II identifikasi masalah aktual, langkah III identifikasi masalah potensial, langkah IV tindakan segera/kolaborasi, langkah V intervensi, langkah VI implementasi, dan langkah VII evaluasi.

Hasil studi kasus yang telah dilakukan pada By “N” setelah dilakukan asuhan, tidak ditemukannya hambatan selama asuhan yang diberikan. Pemantauan dilakukan sebanyak 4 kali selama kurang lebih 1 bulan. Selama dilakukannya asuhan ibu didapatkan kulit dan sklera bayi berwarna kuning, refleks isap dan menelan bayi lemah sejak tanggal 27 April 2017 dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB tanggal 27 April 2017 hasil bilirubin total 13,9 gr/dl dan asuhan terakhir tanggal 02 Mei 2017 kulit dan sklera bayi sudah tidak kuning dan kadar bilirubin sudah kembali normal.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada kasus By “N” dengan ikterus neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017 dan dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan terhadap By “N” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan dan tidak terjadi kern ikterus.

Daftar Pustaka: 31 (2010-2017)

Kata Kunci: Bayi Baru Lahir, Ikterus Neonatorum

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAKASSAR
RESEARCH PAPER, AUGUST 2017

Hartina,

Supervisor I: Anieq Mumthiah Alkautsar, S.SiT, M.Keb

Supervisor II: dr. Nadyah Haruna, M.Kes

"Midwifery Care on a Newborn with Neonatal Jaundice in Regional Public Hospital Syekh Yusuf Gowa 2017"

This study aims to implement a midwifery care on newborns with neonatal jaundice in Regional Public Hospital Syekh Yusuf Gowa 2017 in accordance with 7 steps Varney and SOAP which include identification of basic data in step I, identification of actual problem in step II, identification of a potential problem in step III, immediate/collaborative treatment in step IV, interventions in step V, implementation in step VI, and evaluation in step VII.

The result of case study done on baby "N" after the care shows no obstacle found during the treatment. Monitoring was carried out 4 times for approximately 1 month. During the mother's care, the baby's skin and sclera were yellow, the baby's suction reflex and swallowing were weak since April 27, 2017 and during the LAB examination on 27 April 2017, total bilirubin result was 13.9 gr / dl and in the last care on 02 May 2017, the baby's sclera and skin were not yellow and the bilirubin level had returned to normal.

The conclusion of the case study of 7 steps Varney and SOAP used for the process of obstetrics problem solving is that an assessment and data analysis on the case of baby "N" with neonatal jaundice in Regional public hospital Sheikh Yusuf 2017 have been conducted and documentation of all findings and actions that have been made on baby " N "with the result of no findings of either any gap or kern jaundice.

References: 31 (2010-2017)

Keywords: Newborn Baby, Neonatal Jaundice



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (Shetty dan Sraddha, 2014: 49). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) tidak hanya menggambarkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, tetapi juga terkait langsung dengan angka rata-rata harapan hidup penduduk disuatu daerah (Mala, 2015: 1).

Angka Kematian Bayi (AKB) pada Negara ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) seperti di Singapura sebanyak 3 per 1000 kelahiran hidup, Malaysia 5,5 per 1000 kelahiran hidup, Thailand 17 per 1000 kelahiran hidup, Vietnam 18 per 1000 kelahiran hidup, dan Indonesia 27 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di Indonesia masih tinggi dari negara ASEAN lainnya, jika dibandingkan dengan target dari MDGs (*Millenium Development Goals*) pada tahun 2015 yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup (*World Health Organization*, 2015: 6).

Beberapa penyelidikan kematian neonatal di beberapa rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kematian neonatal adalah adalah faktor ibu yang mempertinggi kematian neonatal atau perinatal (*High Risk Mother*) dan faktor bayi yang mempertinggi kematian

neonatal atau perinatal (*High Risk Infant*) diantaranya adalah BBLR, asfiksia dan ikterus neonatorum (Herawati dan Indriati, 2017: 68).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2015 menunjukkan angka ikterus neonatoum pada bayi baru lahir di Indonesia sebesar 51,47%, dengan faktor penyebabnya antara lain Asfiksia 51%, BBLR 42,9%, *Sectio Cesaria* 18,9%, Prematur 33,3%, kelainan kongenital 2,8%, dan sepsis 12% (RISKESDAS, 2015: 12).

Ikterus Neonatorum merupakan salah satu fenomena klinis yang paling sering ditemukan pada bayi baru lahir. Lebih dari 85% bayi cukup bulan yang kembali dirawat dalam minggu pertama kehidupan disebabkan oleh keadaan ini. Bayi dengan hiperbilirubinemia tampak kuning akibat akumulasi pigmen bilirubin yang berwarna kuning pada sklera dan kulit (Mathindas, dkk, 2014: S4). Bilirubin adalah produk dari pemecahan sebagian hemoglobin yang terjadi saat darah merah sel-sel hancur. Biasanya, bilirubin diekskresikan melalui tubuh setelah melewati hati, limpa, ginjal dan saluran gastrointestinal (CMNRP, 2015: 5). Pengobatan ikterus neonatorum pada umumnya dilakukan dengan fototerapi dan minoritas kecil memerlukan transfusi tukar (Shetty dan Binoop, 2014: 1289).

Ikterus neonatorum tidak selamanya fisiologis, akan tetapi bila tidak segera ditangani dengan baik akan menimbulkan cacat seumur hidup atau bahkan kematian. Demikian juga ikterus patologi yaitu ikterus yang timbul apabila kadar bilirubin total melebihi 12 mg/dl, apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan karena

bilirubin dapat menumpuk di otak yang disebut dengan kern ikterus yang merupakan komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat. Selain memiliki angka mortalitas yang tinggi, juga dapat menyebabkan gejala sisa berupa cerebral palsy, tuli nada tinggi, paralisis dan displasia dental yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. (Herawati dan Indriati, 2017: 68).

Angka Kematian Bayi menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 adalah 8,33 per 1000 kelahiran hidup (Dinkes, 2016). Data rekam medik di RSUD Syekh Yusuf Gowa, didapatkan pada tahun 2015 sebanyak 5 bayi yang mengalami ikterus, pada tahun 2016 sebanyak 2 bayi mengalami ikterus, dan pada tahun 2017 bulan januari sampai mei 2017 sebanyak 5 bayi yang mengalami ikterus.

Walaupun angka kejadian ikterus neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa hanya sedikit, namun mengingat komplikasi yang dapat ditimbulkan apabila bayi ikterus tidak segera ditangani dan kadar bilirubinnya semakin tinggi, maka dapat menyebabkan kern ikterus dimana bayi dengan keadaan ini mempunyai resiko terhadap kematian atau jika dapat bertahan hidup akan mengalami gangguan perkembangan neurologis. Selain itu, untuk melihat penatalaksanaan di RSUD Syekh Yusuf Gowa itu sudah sesuai Standar Pelayanan Medis (SPM) atau belum, maka dari itu penulis tertarik menerapkan prinsip – prinsip manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan ikterus neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

B. Ruang Lingkup

Pembahasan penulisan karya tulis ini mencakup Penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Dilaksanakannya Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengumpulan data dasar pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- b. Dirumuskannya diagnosa/maslah aktual bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.

- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- g. Diketuinya hasil tindakan yang telah dilakukan pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah:

1. Manfaat Praktis

Adapun sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan pada bayi baru lahir dengan ikterus.

2. Manfaat Institusi

Untuk menambah wacana bagi pembaca di perpustakaan dan informasi mengenai asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan ikterus.

3. Manfaat ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang bayi baru lahir dengan ikterus.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan bayi baru lahir dengan ikterus.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan emergency/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan. Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

a. Anammnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenec digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Studi Dokumentasi

Yaitu studi yang mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter dan bidan.

d. Diskusi

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan diskusi dengan bidan, dokter asisten anak, pembimbing karya tulis dan rekan-rekan seprofesi lainnya.

F. *Sistematika Penulisan*

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu: pada bab I pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang bayi baru lahir, tinjauan khusus tentang ikterus, proses manajemen asuhan kebidanan dan tinjauan umum tentang perawatan bayi baru lahir dalam islam.

Pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan atau intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan ikterus neonatorum.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, serta semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir*

1. Pengertian Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari usia kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan lahirnya 2500 gram sampai dengan 4000 gram, lahir langsung menangis, dan tidak ada kelainan kongenital (cacat bawaan) yang berat (Sondakh, 2013: 150).

Neonatal adalah bayi berumur 0 (baru lahir) sampai dengan usia 28 hari, disebut juga bayi baru lahir. Pada masa neonatal, bayi rentan sekali terhadap penyakit yang berpengaruh untuk kelangsungan hidup kedepannya (Ahmad, dkk, 2012: 144).

2. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir Normal

Bayi yang baru lahir normal dan sehat memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram.
- b. Panjang badan bayi 48-50 cm.
- c. Lingkar dada bayi 32-34 cm.
- d. Lingkar kepala bayi 33-35 cm.
- e. Bunyi jantung dalam menit pertama 180 kali/menit kemudian turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bayi berumur 30 menit.

- f. Pernapasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 kali/menit disertai pernapasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan *intrkostal*, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit.
- g. Kulit kemerah-merahan, licin karena jaringan subkutan cukup terbentuk dan dilapisi *vernix caseosa*.
- h. Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik.
- i. Kuku telah agak panjang dan lemas.
- j. Genetalia: tetis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayora telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan).
- k. Reflex isap, menelan dan moro telah terbentuk.
- l. Eliminasi urin dan mekonium normalnya keluar pada 24 jam pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan lengket (Sondakh, 2013: 150).

3. Penilaian Bayi Baru Lahir

Segera setelah lahir letakkan bayi diatas kain bersih dan kering yang disiapkan diatas perut ibu (bila tidak memungkinkan, letakkan didekat ibu misalnya diantara kedua kaki ibu atau disebelah ibu) pastikan area tersebut bersih dan keringkan bayi terutama muka dan permukaan tubuh dengan kain kering, hangat dan bersih. Kemudian lakukan 2 penilaian awal sebagai berikut:

- a. Apakah menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan ?
- b. Apakah bergerak dengan aktif atau lemas ?

Jika bayi tidak bernafas atau megap-megap atau lemah maka segera lakukan resusitasi bayi baru lahir (Rukiyah dan Yulianti, 2013: 6).

Tabel 2.1 Penilaian APGAR Score

Aspek pengamatan bayi baru lahir	Skor		
	0	1	2
<i>Appearance</i> (warna kulit)	Seluruh tubuh bayi berwarna kebiruan	Warna kulit tubuh normal, tetapi tangan dan kaki berwarna kebiruan	Warna kulit seluruh tubuh normal
<i>Pulse</i> (denyut jantung)	Denyut jantung tidak ada	Denyut jantung < 100 kali permenit	Denyut jantung > 100 kali per menit
<i>Grimace</i> (respons refleks)	Tidak ada repon terhadap stimulasi	Wajah meringis saat distimulasi	Meringis, menarik, batuk atau bersin saat stimulasi
<i>Activity</i> (tonus otot)	Lemah, tidak ada pergerakan	Lengan dan kaki dalam posisi fleksi dengan sedikit gerakan	Bergerak aktif dan spontan
<i>Respiration</i> (pernapasan)	Tidak bernapas, pernapasan lambat dan tidak teratur	Menangis lemah, terdengar seperti merintih	Menangis kuat, pernapasan baik dan teratur

(Sumber : Walyani, 2015: 142)

Klasifikasi klinik nilai APGAR :

1. Asfiksia berat (nilai APGAR 0-3)
2. Asfiksia ringan sedang (nilai APGAR 4 - 6)

3. Bayi normal atau sedikit asfiksia (nilai APGAR 7-9)
4. Bayi normal dengan nilai APGAR 10 (Intart, dkk, 2016: 3).

4. Penatalaksanaan Awal Bayi Baru Lahir

- a. Persalinan bersih dan aman

Prinsip : penerapan upaya yang PI yang baku (standar) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan / indikasi yang tepat.

- b. Inisiasi / Memulai pernafasan spontan

Sebagai dasar bayi baru lahir akan menunjukkan usaha pernafasan spontan dengan sedikit bantuan.

- c. Stabilitasi temperature tubuh bayi / menjaga agar bayi tetap hangat

- d. ASI dini dan eksklusif

Pemberian ASI dilakukan sejak awal, dimulai dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. ASI diberikan secara eksklusif tanpa makanan pendampng lain sampai umur 6 bulan.

- e. Pencegahan infeksi

Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi. Saat melakukan penanganan bayi baru lahir, pastikan untuk melakukan tindakan infeksi, seperti : cuci tangan, pakai sarung tangan, semua peralatan di disinfeksi tingkat tinggi atau steril, pakaian, handuk, dan selimut serta kain yang akan digunakan dalam keadaan bersih.

f. Pemberian imunisasi

Pemberian imunisasi Vit K untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir, dan imunisasi Hepatitis B untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis (Elmedia, 2015: 1-2).

5. Inisiasi Pernafasan Spontan

Sebagian besar bayi baru lahir akan menunjukkan usaha pernafasan spontan dengan sedikit bantuan atau gangguan. Segera setelah bayi baru lahir, maka perlu dilakukan upaya inisiasi pernafasan spontan (0-30 detik) secara cepat dan tepat, dengan langkah-langkah :

- a. Melakukan penilaian kondisi bayi baru lahir secara cepat dan tepat, bayi diletakkan diatas perut ibu yang dilapisi dengan handuk.
- b. Evaluasi data yang terkumpul, buat diagnosa dan tentukan rencana untuk asuhan bayi baru lahir.
- c. Melakukan rangsangan taktil untuk mengaktifkan refleks pada tubuh bayi baru lahir. Rangsangan taktil berguna untuk mengaktifkan berbagai refleks pada tubuh bayi baru lahir. Salah satu teknik dalam melakukan rangsangan adalah dengan mengeringkan bayi. Cara ini dapat merangsang pernafasan spontan pada bayi yang sehat (Elmeida, 2015: 3-4).

6. Stabilitas Temperatur Tubuh Bayi

Pengaturan suhu pada bayi baru lahir masih belum baik selama beberapa waktu. Akibat ketidakmatangan *hipotalamus*, pengaturan suhu tidak berjalan efisien dan bayi masih tetap rentan terhadap hipotermi

terutama ketika bayi dibiarkan diudara dingin atau diterpa angin, jika dalam keadaan basah, jika tidak tidak mampu bergerak dengan bebas atau pada saat kekurangan gizi. Seorang bayi yang kedinginan, kebutuhan kalori dan oksigennya akan meningkat sehingga dapat mengalami gangguan dalam waktu singkat.

Seorang bayi yang cukup bulan yang sehat dan berpakaian akan mempertahankan suhu tubuh sebesar 36°C – 37°C asalkan suhu lingkungan dipertahankan antara 18 – 21°C , gizinya cukup dan gerakannya tidak terhambat oleh bedong yang ketat. Laju metabolisme bayi berbeda-beda, tetapi masing-masing bayi harus diawasi tidak boleh terlalu panas. Bayi yang mengalami kehilangan panas (hipotermi), beresiko tinggi untuk jatuh sakit atau meninggal. Jika bayi dalam keadaan basah atau tidak diselimuti, mungkin akan mengalami hipotermi, meskipun dalam ruangan yang relatif hangat (Elmeida, 2015: 4-5).

B. Tinjauan Khusus Tentang Ikterus

1. Pengertian

- a. Ikterus adalah gambaran klinis berupa pewarnaan kuning pada kulit dan mukosa karena adanya deposisi produk akhir katabolisme heme yaitu bilirubin (Pholman, dkk, 2015: 97).
- b. Ikterus sering kali muncul pada bayi yang baru lahir karena penumpukan bilirubin yang berlebihan di dalam darah dan jaringan, yaitu 60% pada bayi cukup bulan (aterem) dan 80% pada bayi tidak cukup bulan (prematuur) (Ranuh, 2013: 81).

- c. Ikterus berarti gejala kuning karena penumpukan bilirubin dalam aliran darah yang menyebabkan pigmentasi kuning pada plasma darah yang menimbulkan perubahan warna pada jaringan yang memperoleh banyak aliran darah tersebut. Ikterus biasanya baru dapat dilihat kalau kadar bilirubin serum mencapai 2-3 mg/dl, sedangkan kadar bilirubin serum normal 0,3-1 mg/dl (Anggraini, 2014: 110).
- d. Ikterus merupakan salah satu penyebab kematian pada bayi. Ikterus adalah manifestasi klinis dari hiperbilirubinemia. Sekitar 25-50 % bayi baru lahir menderita ikterus pada minggu pertama (Faiqah, Syajaratuddur, 2014: 1355).
- e. Hiperbilirubinemia merupakan salah satu fenomena klinis yang paling sering ditemukan pada bayi baru lahir. Hiperbilirubinemia dapat disebabkan oleh proses fisiologi atau patologi atau kombinasi keduanya (Lubis, Mardina Bugis, dkk, 2013: 292).

2. Klasifikasi

a. Ikterus fisiologi

Ikterus fisiologi adalah warna kekuningan pada kulit yang timbul yang timbul pada hari ke-2 sampai ke-3 setelah lahir yang tidak mempunyai dasar patologis dan akan menghilang dengan sendirinya pada hari ke-10 (Susilaningsih, 2013).

Ikterus fisiologi memiliki tanda-tanda, antara lain sebagai berikut

- 1) Warna kuning akan timbul pada hari kedua atau ketiga setelah bayi lahir dan tampak jelas pada hari ke-5 sampai ke-6 dan menghilang sampai hari ke-10.
- 2) Bayi tampak bias, minum baik, berat badan naik biasa.
- 3) Kadar bilirubin serum pada bayi cukup bulan tidak lebih dari 12 mg/dl dan pada BBLR 10 mg/dl dan akan hilang pada hari ke-14 (Maulida, 2014: 39).

4) Ikterus patologi

Ikterus Patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2012: 277).

Ikterus patologi memiliki tanda-tanda, antara lain sebagai berikut :

- a) Ikterus timbul dalam 24 jam pertama kehidupan, serum bilirubin total lebih dari 12 mg/dl.
- b) Peningkatan bilirubin 5 mg/dl atau lebih dari 24 jam.
- c) Konsentrasi bilirubin serum melebihi 10 mg/dl pada bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan.
- d) Ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatibilitas darah, defisiensi enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD) dan sepsis.

- e) Ikterus yang disebabkan oleh bayi kurang dari 2000 gram yang disebabkan karena usia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun dan kehamilan pada remaja, masa gestasi kurang dari 36 minggu, asfiksia, hipoksia, syndrome gangguan pernapasan, infeksi, hipoglikemia, hiperkopnia dan hiperosmolitas darah sepsis (Maulida, 2014: 40).

3. Manifestasi Klinik

Adapun tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia adalah:

- a. Kulit jaundice (kuning)
- b. Sklera ikterik
- c. Peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg % pada neonatus yang cukup bulan dan 12,5 mg% pada neonatus yang kurang bulan
- d. Kehilangan berat badan sampai 5% dalam 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori
- e. Asfiksia
- f. Hipoksia
- g. Sindrom gangguan pernapasan
- h. Pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit
- i. Feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejang
- j. Epistotonus (posisi tubuh bayi melengkung)
- k. Terjadi pembesaran hati

- l. Tidak mau minum ASI
- m. Letargi
- n. Reflex moro lemah atau tidak ada sama sekali (Maryunani, 2014: 104).

4. Etiologi

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut

- a. Produksi yang berlebihan lebih dari pada kemampuan bayi untuk mengeluarkannya misalnya hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6PD, *pyruvate kinase*, perdarahan tertutup dan sepsis.
- b. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukoronil transferasi (*cringler najjar syndrome*). Penyebab lain ialah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel hepar.
- c. Gangguan dalam transfortasi bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut kehepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya *salsilitas*, *sulfatfurazole*. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak

- terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang kemudian melekat ke sel otak.
- d. Gangguan dalam sekresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain.
 - e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat meningkatkan hiperbilirubinemia unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterahepatik.
 - f. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI). Ikterus akibat asi merupakan *unconjugated* hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Dapat dibedakan dari penyakit lain dengan reduksi kadar bilirubin yang cepat bila disubstitusi dengan susu formula selama 1-2 hari. Hal ini unruk membedakan pada bayi disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagai bahan yang terkandung dalam Air Susu Ibu (ASI) adalah (*beta glucoronidase*) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus. Bayi yang mendapatkan ASI bila dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan asupan beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya bukan dengan menghentikan pemberian ASI

melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberian (Marmi dan Rahardjo, 2012: 278-280).

5. Patofisiologi Ikterus

Sel-sel darah merah yang telah tua dan rusak akan dipecah menjadi bilirubin, yang oleh hati akan dimetabolisme dan dibuang melalui feses. Didalam usus juga terdapat banyak bakteri yang mampu mengubah bilirubin sehingga mudah dikeluarkan oleh feses. Hal ini terjadi secara normal pada orang dewasa. Pada bayi baru lahir, jumlah bakteri pemetabolisme bilirubin ini masih belum mencukupi sehingga ditemukan bilirubin yang masih beredar dalam tubuh tidak dibuang bersama feses. Begitu pula dalam usus bayi terdapat enzim *glukorinil transferase* yang mampu mengubah bilirubin dan menyerap kembali bilirubin kedalam darah sehingga makin memperparah akumulasi bilirubin dalam badannya. Akibatnya pigmen tersebut akan disimpan dibawah kulit, sehingga kulit bayi menjadi kuning. Biasanya dimulai dari wajah, dada, tungkai dan kaki menjadi kuning. Biasanya hiperbilirubinemia dan sakit kuning akan menghilang setelah minggu pertama. Kadar bilirubin yang sangat tinggi biasanya disebabkan pembentukan yang berlebihan atau gangguan pembuangan bilirubin. Kadang pada bayi cukup umur yang diberi susu ASI, kadar bilirubin meningkat secara progresif pada minggu pertama, keadaan ini disebut *jaundice* ASI. Penyebabnya tidak diketahui dan hal ini tidak berbahaya, jika kadar bilirubin sangat tinggi mungkin

perlu dilakukan terapi yaitu terapi sinar dan transfusi tukar (Maryunani, 2014: 103-104).

6. Faktor Resiko

a. Air Susu Ibu (ASI) yang kurang

Bagi yang mendapat ASI yang cukup saat menyusui dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi prematur yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI.

b. Peningkatan jumlah sel darah merah

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh, bayi yang memiliki jenis golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit atau mendapat transfusi darah, kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

c. Infeksi/inkompabilitas ABO-Rh

Berbagai infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin didalam rahim dapat meningkatkan resiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella dan sepsis (Maulida, 2014: 39).

7. Komplikasi

- a. Kern ikterus
- b. Kerusakan hepar
- c. Gagal ginjal (Maryunani, 2014: 107).

8. Penilaian bayi ikterus

- a. Pengamatan ikterus kadang-kadang agak sulit apalagi dalam cahaya buatan. Paling baik pengamatan dilakukan dalam cahaya matahari dan dengan menekan sedikit kulit yang akan diamati untuk menghilangkan warna karena pengaruh sirkulasi darah. Ada beberapa cara untuk menentukan derajat ikterus yang merupakan resiko terjadinya kern ikterus dengan cara klinis (Kramer) yang dilakukan dibawah sinar biasa (*daylight*) (Marmi dan Rahardjo, 2012: 280).



Gambar 2.1

(Sumber: Marmi dan Rahardjo, 2012: 280)

Tabel 2.2 Rumus Kramer

Daerah Gambar	Luas ikterus	Kadar bilirubin
1	Kepala dan leher	5
2	Daerah 1 (+) Badan bagian atas	9
3	Badan 1,2 (+) Badan bagian bawah dan tungkai	11
4	Daerah 1,2,3 (+) Lengan dan kaki dibawah dengkul	12
5	Daerah 1,2,3,4 (+) Tangan dan kaki	>12,5

(Sumber: Marmi dan Rahardjo, 2012: 280)

b. Pemeriksaan diagnostic

- 1) Test coombs pada tali pusat baru lahir : hasil positif test coombs indirek menandakan adanya antibody Rh-positif, anti A atau anti B dalam darah ibu. Hasil positif dari test coombs direk menandakan adanya sensitasi (Rh-positif, anti A, anti B) SDM dari neonatus.
- 2) Golongan darah bayi dan ibu : mengidentifikasi inkompatibilitas ABO.
- 3) Bilirubin total : kadar direk (terkonjugasi) bermakna jika melebihi 1,0-1,5 mg/dL, yang mungkin dihubungkan dengan sepsis. Kadar indirek (tidak terkonjugasi) tidak boleh melebihi peningkatan 5 mg/dL dalam 24 jam atau tidak boleh lebih dari

20 mg/dL pada bayi cukup bulan atau 15 mg/dL pada bayi preterm (tergantung pada berat badan).

- 4) Protein serum total : kadar kurang dari 3,0 mg/dL menandakan penurunan kapasitas ikatan, terutama pada bayi preterm.
- 5) Hitung dalam darah lengkap : hemoglobin (HB) mungkin rendah (kurang dari 14 mg/dL) karena hemolisis hematokrit (HT) mungkin meningkat (kurang dari 45%) dengan hemolisis dan anemia berebihan.
- 6) Glukosa : kadar dextrosit mungkin kurang dari 45% glukosa darah lengkap kurang dari 30 mg/dL atau tes glukosa serum kurang dari 40 mg/dL bila bayi baru lahir hipoglikemia dan mulai menggunakan simpanan lemak dan melepaskan asam lemak. (Marmi dan Rahardjo, 2012: 280-281).

9. Penanganan Bayi Ikterus

a. Ikterus fisiologi

- 1) Pemberitahuan kepada keluarga tentang kondisi bayi.
- 2) Jemur bayi tiap pagi dibawah sinar matahari dengan menutup mata dan genitalia bayi memakai kertas karbon yang dilapisi kain kassa, dan tubuh bayi selalu di rubah untuk mencegah decubitas dan sinar ultraviolet dapat merata ke keseluruhan tubuh.

- 3) Berikan ibu penjelasan pentingnya pemberian minum secara adekuat dan berikan ASI saja dan bantu ibu saat memberi ASI (Rukiyah dan Yulianti, 2012: 275-276).

b. Ikterus patologi

1) Fototerapi

Cara kerja fototerapi adalah dengan mengubah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam air untuk dieksresikan melalui empedu atau urin. Ketika bilirubin mengabsorpsi cahaya, terjadi reaksi fotokimia yaitu isomerisasi. Juga terdapat konversi ireversibel menjadi isomer kimia lainnya bernama lumirubin yang dengan cepat dibersihkan dari plasma melalui empedu. Lumirubin adalah produk terbanyak degradasi bilirubin akibat fototerapi pada manusia. Sejumlah kecil bilirubin plasma tak terkonjugasi diubah oleh cahaya menjadi dipyrole yang diekskresikan lewat urin. Fotoisomer bilirubin lebih polar dibandingkan bentuk asalnya dan secara langsung bias diekskresikan melalui empedu. Hanya produk foto oksidan saja yang bisa diekskresikan lewat urin.

a) Jenis Lampu

Beberapa studi menunjukkan bahwa lampu fluoresen biru lebih efektif dalam menurunkan bilirubin. Akan tetapi karena cahaya biru dapat mengubah warna bayi, maka yang lebih disukai adalah lampu fluoresen cahaya normal dengan spektrum 420 –

460 nm sehingga asuhan kulit bayi dapat diobservasi baik mengenai warnanya (jaundis, palor, sianosis) atau kondisi lainnya. Agar fototerapi efektif, kulit bayi harus terpajang penuh terhadap sumber cahaya dengan jumlah yang adekuat. Bila kadar bilirubin serum meningkat sangat cepat atau mencapai kadar kritis, dianjurkan untuk menggunakan fototerapi dosis ganda atau intensif, teknik ini melibatkan dengan menggunakan lampu *overhead* konvensional sementara itu bayi berbaring dalam selimut fiberoptik. Warna kulit bayi tidak mempengaruhi efisiensi pemberian fototerapi. Hasil terbaik terjadi dalam 24 sampai 48 jam pertama fototerapi. Fototerapi intensif adalah fototerapi dengan menggunakan sinar bluegreen spectrum (panjang gelombang 430-490 nm) dengan kekuatan paling kurang 30 uW/cm² (diperiksa dengan radio meter, atau diperkirakan dengan menempatkan bayi langsung di bawah sumber sinar dan kulit bayi yang terpajang lebih luas. Bila konsentrasi bilirubin tidak menurun atau cenderung naik pada bayi – bayi yang mendapat fototerapi intensif, kemungkinan besar terjadi proses hemolisis.

b) Jarak

Dosis dan kemanjuran dari fototerapi biasanya dipengaruhi oleh jarak antara lampu (semakin dekat sumber cahaya, semakin besar irradiasinya) dan permukaan kulit yang terkena

cahaya, karena itu dibutuhkan sumber cahaya di bawah bayi pada fototerapi. Jarak antara kulit bayi dan sumber cahaya. Dengan lampu neon, jarak harus tidak lebih besar dari 50 cm (20 in). Jarak ini dapat dikurangi sampai 10-20 cm jika homeostasis suhu dipantau untuk mengurangi resiko overheating.

c) Berat Badan dan Usia

Tabel 2.3. Petunjuk Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia Berdasarkan Berat Badan Dan Bayi Baru Lahir Yang Relatif Sehat

Kadar Bilirubin Total Serum (mg/dL)				
Berat Badan Kurang Bulan	Sehat		Sakit	
	Fototerapi	Transfusi Tukar	Fototerapi	Transfusi Tukar
<1000g	5-7	Bervariasi	4-6	Bervariasi
1001-1500g	7-10	Bervariasi	6-8	Bervariasi
1501-2000g	10-12	Bervariasi	8-10	Bervariasi
2001-2500g	12-15	Bervariasi	10-12	Bervariasi
Cukup bulan				
>2500g	15-18	20-25	12-15	18-20

Sumber : Kosim, dkk, 2012:132

Untuk bayi dengan berat lahir kurang dari 1000 gram, memulai fototerapi sebesar 5 - 6 mg / dL pada usia 24 jam, kemudian meningkat secara bertahap sampai usia 4 hari. Efisiensi fototerapi tergantung pada jumlah bilirubin yang diradiasi. Penyinaran area kulit permukaan besar lebih efisien daripada penyinaran daerah kecil, dan efisiensi meningkat fototerapi dengan konsentrasi bilirubin serum.

Tabel 2.4 Petunjuk Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia Pada Bayi Sehat Cukup Bulan

Kadar Bilirubin Total Serum (mg/dL [umol/L])				
Usia (Jam)	Pertimbangan Fototerapi	Fototerapi	Transfusi Tukar Jika Fototerapi Intensif	Transfusi Tukar & Fototerapi Intensif
25-48	≥12 (170)	≥15 (260)	≥20 (340)	≥25 (430)
49-72	≥15 (260)	≥18 (310)	≥25 (430)	≥30 (510)
>72	≥17 (290)	≥20 (340)	≥25 (430)	≥30 (510)

Sumber : Kosim, dkk, 2012: 133


Ikterus yang timbul pada usia 25-48 jam pasca kelahiran, fototerapi dianjurkan bila kadar bilirubin serum total > 12 mg/dl (170mmol/L). Fototerapi harus dilaksanakan bila kadar bilirubin serum total ≥ 15 mg/dl (260mmol/L). Bila fototerapi 2 x 24 jam gagal menurunkan kadar bilirubin serum total < 20 mg/dl (340 mmol/L), dianjurkan untuk dilakukan tranfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total 20 mg/dl (> 340 mmol/L) dilakukan fototerapi dan mempersiapkan tindakan tranfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total > 15 mg/dl (> 260 mmol/L) pada 25-48 jam pasca kelahiran, mengindikasikan perlunya pemeriksaan laboratorium ke arah penyakit hemolisis. Usia 49-72 jam pasca kelahiran, fototerapi dianjurkan bila kadar bilirubin serum total > 15 mg/dl (260mmol/L). Fototerapi harus dilaksanakan bila kadar bilirubin serum total 18 mg/dl (310mmol/L). Bila fototerapi 2

x 24 jam gagal menurunkan kadar bilirubin serum total < 25 mg/dl (430 mmol/L), dianjurkan untuk dilakukan tranfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total > 18 mg/dl (> 310 mmol/L) fototerapi dilakukan sambil mempersiapkan tindakan tranfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total > 25 mg/dl (>430 mmol/L) pada 49-72 jam pasca kelahiran, mengindikasikan perlunya pemeriksaan laboratorium ke arah penyakit hemolisis. Selanjutnya pada usia > 72 jam pasca kelahiran, fototerapi harus dilaksanakan bila kadar bilirubin serum total > 17 mg/dl (290mmol/L). Bila fototerapi 2 x 24 jam gagal menurunkan kadar bilirubin serum total < 20 untuk dilakukan tranfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total sudah mencapai > 20 mg/dl (> 340 mmol/L) dilakukan fototerapi sambil mempersiapkan tindakan tranfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total > 25 mg/dl (> 430 mmol/L) pada usia > 72 jam pasca kelahiran, masih dianjurkan untuk pemeriksaan laboratorium ke arah penyakit hemolisis.

d) Luas Permukaan Fototerapi

Hal penting dalam pelaksanaan praktis dari fototerapi termasuk pengiriman energi dan memaksimalkan luas permukaan yang tersedia harus mempertimbangkan bahwa bayi harus telanjang kecuali popok dan mata harus ditutup untuk mengurangi resiko kerusakan retina. Bila menggunakan lampu sorot, pastikan

bahwa bayi ditempatkan di pusat lingkaran cahaya, karena photoenergy tetes dari arah perimeter lingkaran. Amati bayi erat untuk memastikan bahwa bayi tidak bergerak jauh dari daerah energy tinggi. Lampu sorot mungkin lebih tepat untuk bayi prematur kecil daripada yang lebih besar jangka dekat bayi. Secara umum penatalaksanaan hiperbilirubinemia pada bayi berat lahir rendah digambarkan grafik sebagai berikut :



Gambar 2.2

Sumber : Kosim, dkk, 2012: 135

e) Efek Samping Fototerapi

Efek samping ringan yang harus diwaspadai perawat meliputi feses encer kehijauan, ruam kulit transien, hipertermia, peningkatan kecepatan metabolisme, seperti hipokalsemia dan priasplismus. Untuk mencegah atau meminimalkan efek tersebut, suhu dipantau untuk mendeteksi tanda awal hipotermia atau hipertermia, dan kulit diobservasi mengenai dehidrasi dan kekeringan, yang dapat menyebabkan ekskorsiasi dan luka (Kosim, 2012: 130-136).

2) Transfusi Tukar

Transfusi tukar adalah suatu tindakan pengambilan sejumlah darah pasien yang dilanjutkan dengan pengembalian darah dari donor dalam jumlah yang sama yang dilakukan berulang-ulang sampai sebagian besar darah pasien tertukar. Pada pasien hiperbilirubinemia, tindakan tersebut bertujuan mencegah ensefalopati bilirubin dengan cara mengeluarkan bilirubin indirek dari sirkulasi. Pada bayi hiperbilirubinemia karena isoimunisasi, transfusi tukar mempunyai manfaat lebih karena akan membantu mengeluarkan antibodi maternal dari sirkulasi darah neonatus. Hal tersebut akan mencegah terjadinya hemolisis lebih lanjut dan memperbaiki kondisi anemianya. Beberapa Indikasi dilakukannya transfusi tukar :

- a) Gagal dengan intensif fototerapi.
- b) Ensefalopati bilirubin akut (fase awal, *intermediate*, lanjut/*advanced*) yang ditandai gejala hipertonia, melengkung, retrocolli, opistotonus, panas, tangis melengking.

Tabel 2.5 Indikasi Transfusi Tukar Berdasarkan TSB (WHO)

Usia (Hari)	BCB sehat (mg/dL)	Bayi dengan faktor resiko* (mg/dL)
1	15	13
2	25	15
3	30	20
≥4	30	20

Sumber: (Usman, Ali, 2014: 102)

Tabel 2.6 Indikasi Transfusi Tukar Pada BBLR

Berat Badan (gram)	Kadar Bilirubin (mg/dL)
< 1000	10 – 12
1000 – 1500	12 – 15
1500 – 2000	15 – 18
2000 – 2500	18 – 20

Sumber: (Usman, Ali, 2014: 103)

Darah yang digunakan sebagai darah pengganti (darah donor) ditetapkan berdasarkan penyebab hiperbilirubinemia. Adapun darah donor yang digunakan untuk transfusi tukar :

- a) Darah yang digunakan golongan O.
- b) Gunakan darah baru (usia < 7 hari), *whole blood*.
- c) Pada penyakit hemolitik Rhesus, jika darah dipersiapkan sebelum persalinan harus golongan O dengan Rhesus (-), lakukan cross match terhadap ibu. Jika darah dipersiapkan setelah kelahiran, caranya sama, hanya dilakukan cross match dengan bayinya.
- d) Pada inkompatibilitas ABO, darah donor harus golongan O, Rhesus (-) atau Rhesus yang sama dengan ibu atau bayinya. Cross match terhadap ibu dan bayi yang mempunyai titer rendah antibodi anti A dan anti B. Biasanya memakai eritrosit golongan O dengan plasma AB, untuk memastikan bahwa tidak ada antibodi anti A dan anti B yang muncul.
- e) Pada penyakit hemolitik isoimun yang lain, darah donor tidak boleh berisi antigen tersensitisasi dan harus di-cross match terhadap ibu. Pada hiperbilirubinemia non imun, lakukan typing

dan *cross match* darah donor terhadap plasma dan eritrosit pasien/bayi.

- f) Transfusi tukar memakai 2 kali volume darah (2 kali exchange), yaitu 160 ml/kgBB sehingga akan diperoleh darah baru pada bayi yang dilakukan transfusi tukar sekitar 87% (Usman, Ali, 2014: 102-104).

10. Mencegah Ikterus pada Bayi

Ikterus dapat dicegah sejak masa kehamilan, dengan cara pengawasan kehamilan dengan baik dan teratur, untuk mencegah sedini mungkin infeksi pada janin dan hipoksia, misalnya karena kesulitan lahir, lilitan tali pusat dan lain-lain, segera diatasi dengan cepat dan tepat. Sebaiknya sejak lahir biasakan anak dijemur dibawah sinar matahari pagi sekitar jam 7-8 pagi setiap hari selama 15 menit dengan membuka pakaiannya (Manggiasih dan Pongki, 2016: 114).

**Tabel 2.7 : Standar Operasional Prosedur (SOP)
Fototerapi di RSUD Syekh Yusuf Gowa**

PENATALAKSANAAN FOTOTERAPI PADA BAYI		
No. Dokumen : 04.168.15	No. Revisi : A	Halaman : 1/2

Standar Operasional Prosedur

Tanggal Terbit : 11 Agustus 2015

Pengertian	Memberikan pengobatan atau perawatan pada bayi ikterus dengan menggunakan fototerapi.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mencegah terjadinya resiko lebih lanjut. 2) Menurunkan kadar bilirubin dalam darah.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur persiapan <ol style="list-style-type: none"> Persiapan Pasien <ol style="list-style-type: none"> 1) Keluarga diberitahu tentang maksud dan tujuan yang akan dilakukan. 2) Bayi telanjang dengan memakai celana, kasa tali pusat dilepas dan kedua mata ditutup dengan penutup mata khusus. Persiapan alat <ol style="list-style-type: none"> 1) Fototerapi set 2) Penutup mata 3) Medline 4) Boks bayi 5) Check list observasi b. Prosedur Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Lakukan cuci tangan 2) Pakai handscoon 3) Tidurkan bayi diatas boks 4) Tutup mata bayi dengan eyes protector 5) Ukur jarak antara bayi dan lampu 20 – 30 cm. 6) Hitung dan catat skala pada alat 7) Nyalakan lampu (berikan terapi sinar 1 x 24 jam / sesuai dengan advis dokter) 8) Observasi intake dan output 9) Buka eyes protector tiap 6 jam 10) Lepas handscoon 11) Lakukan cuci tangan 12) Catat tanggal, jam, skala awal dan akhir terapi sinar pada dokumen rekam medis pasien

(Sumber : RSUD Syekh Yusuf Gowa 2015)

C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen Kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Mufdillah, dkk, 2012: 110).

2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Adapun 7 langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney adalah:

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien/orang yang meminta asuhan. Memilih informasi data yang tepat diperlukan analisa suatu situasi yang menyangkut manusia yang rumit karena sifat manusia yang kompleks.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

1) Anamnesa, meliputi:

Melakukan tanggung jawab untuk memperoleh data meliputi, biodata pasien, keluhan utama waktu masuk, riwayat penyakit, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu dan riwayat operasi.

Pada kasus ikterus neonatorum orang tua bayi akan mengeluh kulit dan mata bayinya terlihat kuning, mungkin juga akan

disertai dengan keluhan lainnya seperti perut membuncit dan tidak mau menyusui.

2) Pemeriksaan Fisik, meliputi:

Keadaan umum pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara inspeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Pada kasus ikterus neonatorum kulit dan sklera bayi terlihat kuning, perut bayi terlihat buncit atau kembung, terjadi pembesaran hati dan kadar bilirubin dalam darah akan meningkat.

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual)

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Kasus ikterus neonatorum ditetapkan berdasarkan data dasar yang dikumpulkan bahwa bayi tersebut kulit dan skleranya terlihat kuning, pembesaran pada perut dan hati dan kadar bilirubin dalam darahnya meningkat.

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang

sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Pada kasus ikterus neonatorum masalah yang biasa timbul jika ikterus neonatorum ini tidak dapat diatasi dan kadar bilirubinnya semakin tinggi adalah kern ikterus bahkan bisa menyebabkan kematian.

d. Langkah IV (Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi)

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.

Pada kasus ikterus neonatorum diperlukan adanya tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk penanganan lebih lanjut.

e. Langkah V (Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah

diidentifikasi atau diantisipasi, dan pada langkah ini reformasi / data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi.

Pada kasus ikterus neonatorum rencana asuhan yang diberikan adalah mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, memberikan *intake* ASI, memeriksa kadar bilirubin dengan pemeriksaan laboratorium, pada bayi dengan ikterus fisiologi dianjurkan untuk menjemur bayi pada sinar matahari pagi jam 7-8 pagi selama 15 sampai 30 menit dan pada kasus ikterus patologi melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi.

f. Langkah VI (Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan)

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien, atau anggota tim kesehatan yang lain. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi dia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan mutu dan asuhan pada bayi dengan ikterus neonatorum.

g. Langkah VII (Evaluasi)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat

dianggap efektif jika memang sesuai dengan masalah dan diagnosis klien, juga benar dalam pelaksanaannya. Disamping melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah diberikan, bidan juga dapat melakukan evaluasi terhadap proses asuhan yang telah diberikan. Dengan harapan, hasil evaluasi proses sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. Pada kasus ikterus neonatorum diharapkan dapat terlaksana seperti: kebutuhan terpenuhi, kadar bilirubin menurun, kondisi umum bayi baik, refleks menghisap dan refleks gerak baik (Mufdillah, dkk, 2012: 111-119).

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Model dokumentasi yang digunakan dalam askeb adalah dalam bentuk catatan perkembangan, karena bentuk asuhan yang diberikan berkesinambungan dan menggunakan proses yang terus menerus (*Progress Notes*).

- a. **S** (Subjektif) adalah pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa, seperti keluhan dari pasien atau keluarga.
- b. **O** (Objektif) adalah data informasi yang didapatkan melalui hasil pemeriksaan dan observasi.
- c. **A** (Assesment) adalah pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam indentifikasi diagnosis/masalah, antisipasi diagnosis/masalah potensial dan perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau rujukan

d. **P** (Planing) adalah seluruh penatalaksanaan (tindakan antisipasi, tindakan rutin, tindakan segera, tindakan penyuluhan, support, kolaborasi, rujukan dan evaluasi) (Mufdillah, dkk, 2012:120-121).

Adapun planning yang dapat dilakukan pada bayi dengan ikterus neonatorum adalah :

Kunjungan I : menanyakan keluhan orang tua tentang keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi tanda-tanda vital bayi, memberikan intake ASI atau susu formula sesuai dengan kebutuhan bayi, melakukan pemeriksaan *head to toe* pada bayi, menimbang berat badan bayi, menjaga *personal hygiene* bayi, menjaga kehangatan bayi, melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk menilai kadar bilirubin bayi dan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk penanganan lebih lanjut.

Kunjungan II : menanyakan kepada orang tua tentang keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi tanda-tanda vital bayi, melakukan pemeriksaan fisik terfokus, mengobservasi BAB dan BAK bayi, menimbang berat badan bayi, memberikan intake ASI atau susu formula sesuai dengan kebutuhan bayi, melakukan pemeriksaan terfokus pada bayi, menjaga *personal hygiene* bayi, menjaga kehangatan bayi, melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk memantau kadar bilirubin bayi, dan tetap melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak.

Kunjungan III : yang dilakukan pada kunjungan ketiga sama dengan kunjungan kedua.

Kunjungan IV : menanyakan kepada orang tua tentang keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi tanda-tanda vital bayi, menjaga personal hygiene bayi, menimbang berat badan bayi, menjaga kehangatan bayi, memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua bayi

D. Tinjauan Umum Perawatan Bayi Baru Lahir Dalam Islam

1. Pemberian ASI

Salah satu bentuk perwujudan perhatian orang tua terhadap kesehatan anak adalah dengan memperhatikan kebutuhan mereka di kala bayi, yakni dengan memberikan ASI oleh seorang ibu kepada anaknya, seperti yang telah dibahas dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ أَوْلَادَهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama RI Al-Quran dan terjemahannya, 2010).

Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/633) : “Ini merupakan petunjuk dari Allah *ta’ala* kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang sempurna yaitu 2 tahun, maka tidak dianggap sebagai menyusui jika lebih dari itu. Pemberian ASI secara sempurna samapai disapih merupakan jasa kedua orang tua.

Ahli tafsir yang telah disebutkan diatas, sangatlah jelas bahwa pemberian ASI pada bayi sangat besar pengaruhnya pada perkembangan diri anak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ASI adalah bagian penting dari proses pembentukan kepribadian anak. Tentu saja dengan mempertimbangkan aspek fisik seorang ibu yang tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya. Tindakan atau perilaku sebagian orang tua terhadap bayinya dengan cara mengganti ASI dengan susu lain tanpa ada sebab-sebab yang jelas hanya akan merugikan anak . anak akan kehilangan makanan dan minuman yang sangat menentukan pertumbuhan fisiknya. Lebih dari itu, dan ini yang sangat penting anak kehilangan kontak batin dengan ibunya, yaitu kasih sayang yang di rasakan anak-anak lain selama menyusui. Dalam dunia medis ASI juga

kaya akan manfaat seperti meningkatkan tali kasih antara ibu dan bayinya, sebagai sistem kekebalan tubuh bagi bayi dan ASI juga kaya akan kandungan vitamin, protein dan lemak yang baik untuk proses pertumbuhan bayi.

2. Mengadzani bayi

Al Imam an-Nawawi rahimahkumullah, tokoh ulama madzhab asy-Syafi'i berkata : "Berkata sekelompok ulama dari sahabat-sahabat kami (ulama Syafi'iyah), disukai untuk diadzani di telinga kanan dan diiqamahi di telinga kiri bayi yang baru dilahirkan".

Penegasan pendapat tentang kesunnahan adzan di telinga bayi masih banyak lagi bertaburan dalam kitab-kitab mazhab syafi'i lainnya, diantaranya :

- a. *Al-Muhadzab* (1/438) : "Disunnahkan bagi orang yang baru kelahiran anak untuk mengadzani di telinga bayi tersebut".
- b. *Kifayat al-Akhyar* (2/224) : " Disunnahkan untuk diadzani di telinga kanannya dan diiqamati disebelah telinga kirinya".
- c. *Al-Bujairimi 'ala al-Khathib* (4/308) : " Disyari'atkan adzan di telinga kanan bayi yang baru dilahirkan dan diiqamati di telinga sebelah kiri".

Hadits tentang mengadzani bayi:

رَوَى أَبُو رَافِعٍ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ أُدِّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ فَاطُ

Abu Rafi meriwayatkan:

“Aku melihat Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam mengadzani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah” (H.R At-Tirmizy).

Al-Imam At-Tirmizy dan hakim keduanya menegaskan bahwa yang beliau riwayatkan itu adalah hadits hasan shahih. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab (9/348) menshahihkan hadits tersebut.

3. Pemberian Nama

Hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Oleh sebab itu para ulama bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan.

Allah *subhanahu wa ta'ala* menuntunkan kepada keturunan Adam untuk memberikan nama pada anak, sebagaimana Allah telah memberi nama “Yahya” kepada putra Nabi Zakariyya *'alaihi salam* yang akan dilahirkan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ أَشْمُهُ يُحْيِي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧)

Terjemahnya:

“Hai Zakariyya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang serupa dengannya” (QS Maryam: 7). (Departemen Agama RI Al-Quran dan terjemahannya, 2010).

Ibnu Hazm dalam *Maratibul Ijma'* mengatakan bahwa para ulama bersepakat atas wajibnya memberikan nama, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

4. Aqiqah

Di dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* dijelaskan bahwa aqiqah adalah hewan yang disembelih untuk kelahiran seorang anak. Adapun hadits yang berkaitan dengan aqiqah yaitu:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Terjemahnya:

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Aqiqah disembelih untuknya pada hari ketujuh, ia dinamai dan rambutnya digundul (pada hari ketujuh tersebut)” (H.R. Abu Daud dan An-Nasa’I).


Di dalam kitab *Lajnah Daimah* dijelaskan bahwa Aqiqah hukumnya sunnah mu’akadah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan dan disembelih pada hari yang ketujuh. Jika mengakhirkan pelaksanaan dari hari ketujuh, maka boleh menyembelih pada setiap waktu, dan tidak berdosa mengakhirkan pelaksanaannya namun yang afdhol untuk menyegerakannya.

Menurut AS-Sayyid Sabiq, aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak, jika pada hari tersebut mempunyai kelapangan untuk melaksanakannya. Jika tidak bisa, maka dilaksanakan pada hari ke empat belas atau hari ke dua puluh satu. Demikian juga, jika belum bisa melaksanakannya pada hari-hari tersebut, maka bisa

dilaksanakan kapanpun pada hari-hari setelahnya, sesuai dengan hadist Imam Al-Baihaqi.

تذبح لسبع، ولاربع عشر، ولاحدي وعشري

Terjemahnya:

“Hewan Aqiqah disembelih pada hari ketujuh, atau hari keempat belas, atau hari kedua puluh satu.” (H.R. Al-Baihaqi)”.


Hadist ini telah dishahihkan oleh Muhammad Nashirudin Al-Albani, lihat hadist no.4132 di dalam shahihul jami'.

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DENGAN
IKTERUS PATOLOGI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 28 APRIL – 02 MEI 2017

No.Register : 46xxxx
Tanggal MRS : 27 April 2017 Pukul : 13.45 WITA
Tanggal Lahir : 09 April 2017 Pukul : 16.00 WITA
Tanggal Pengkajian : 28 April 2017 Pukul : 12.30 WITA
Nama pengkaji : Hartina

A. Langkah 1 (Identifikasi data dasar)

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "N"

Tanggal Lahir : 09 April 2017

Umur : 20 hari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak ke : Ketiga

b. Orang Tua

Nama : Ny."N"/ Tn."B"

Umur : 39 tahun/41 tahun

Nikah/Lamanya : 1x/±15 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMP/SMP
Pekerjaan : IRT/Buruh Harian
Alamat : Jl. Poros Barombong

2. Keluhan Utama

- a. Ibu pasien mengatakan kekhawatiran dengan kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 27 april 2017.
- b. Ibu pasien mengatakan bahwa bayinya malas menyusui sejak tanggal 27 april 2017.

3. Riwayat Obstetri

- a. Ibu pasien mengatakan bahwa ini merupakan anaknya yang ketiga dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya.
- b. Ibu pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 20 juli 2016.
- c. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah sakit dan menderita penyakit apapun.
- d. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah mengkonsumsi obat apapun dan jamu.

4. Riwayat Persalinan

- a. Ibu pasien mengatakan melahirkan bayinya yang ketiga pada tanggal 09 april 2017, pukul 16.00 WITA, di BPS Qamariyah, ditolong oleh bidan, secara spontan, bayi lahir tunggal, keadaan bayi baru lahir segera menangis dan warna kulit bayi kemerahan.

Tabel. 3.1 : Riwayat Persalinan Ibu Pasien Terdahulu

No	Tahun	Penolong Persalinan	Jenis persalinan	Tempat persalinan	BBL	PBL	Jenis kelamin	Umur kehamilan
1	2008	Bidan	Spontan	PKM	2600 gram	49 cm	Perempuan	Aterem
2	2012	Bidan	Spontan	PKM	2950 gram	50 cm	Laki-laki	Aterem
3	2017	Bidan	Spontan	PKM	2700 gram	48 cm	Laki-laki	Aterem

(Sumber: Data primer)

5. Riwayat Kesehatan Keluarga

- a. Ibu pasien mengatakan dalam keluarga tidak ada penyakit menurun seperti DM, hipertensi dan tidak ada penyakit menular seperti TBC hepatitis dan riwayat PMS.
- b. Ibu pasien mengatakan dirinya dan anak-anak sebelumnya tidak ada yang mengalami penyakit kuning.

6. Riwayat kesehatan pasien di rumah sakit

Perawat perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan KU bayi lemah, refleks menghisap lemah, kulit bayi berwarna kuning, bayi dirawat diinfant warmer.

7. Pola kebiasaan pasien

a. Pola nutrisi

Jenis nutrisi yang diberikan adalah ASI dan susu formula sebanyak 40 cc setiap 3 jam sekali secara oral dengan cara disendoki.

b. Pola eliminasi

Pasien BAK rata-rata 5-7 kali dalam sehari warna jernih dan BAB 4 -5 kali sehari warna kuning dempul.

- c. Pola aktivitas
Gerakan pasien cukup aktif.
 - d. Pola kebersihan diri
Pasien diwashlap sebanyak 1 kali sehari tiap pagi hari.
 - e. Pola istirahat
Pasien tidur dalam sehari rata-rata ± 19 jam yaitu tidur malam ± 10 jam dan tidur siang ± 9 jam.
8. Riwayat psikologis, sosial dan ekonomi orang tua
- a. Ekspresi wajah ibu dan keluarga nampak cemas.
 - b. Ibu menggunakan kartu BPJS untuk membayar biaya perawatan.
9. Data spiritual orang tua
- a. Ibu dan keluarga berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat.
 - b. Ibu dan keluarga rajin melaksanakan shalat 5 waktu.
10. Pemeriksaan
- a. KU bayi lemah
 - b. Kesadaran composmentis
 - c. Gestasi 37 minggu 4 hari
 - d. Tanda-tanda vital :
 - Frekuensi jantung : 130x/i
 - Pernapasan : 44x/i
 - Suhu : 36,6 derajat celcius

e. Pemeriksaan *head to toe*

Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam dan tidak ada caput succedaneum.

Wajah : Tidak ada oedema.

Mata : Konjungtiva merah muda, sklera ikterik.

Hidung : Tidak ada sekret.

Mulut : Bibir kering, tidak ada kelainan.

Telinga : Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen.

Leher : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada.

Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Genitalia : Testis sudah turun semua, terdapat lubang pada penis.

Anus : Terdapat lubang pada anus.

Ekstremitas atas : Jari - jari lengkap, tidak ada kelainan, terpasang infus dextrosa 10% 15 TPM pada tangan sebelah kiri.

Ekstremitas bawah : Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan.

Kulit : Nampak kuning.

f. Refleksi

Refleks *moro* : Kuat, apabila dikagetkan lengan dan kaki terangkat.

Refleks *grasping* : Kuat, apabila benda diletakkan ditelapak kaki bayi secara spontan bayi akan menggenggam

Refleks *sucking* : Lemah, pada saat diberi susu tidak dapat menghisap secara aktif

Refleks *rooting* : Lemah, apabila menyentuh pipi bayi akan menoleh sentuhan

Refelks *swallowing* : Lemah, bayi tidak dapat menelan secara aktif

g. Pengukuran antropometri

BBS : 2800 gram

PBS : 48 cm

LK UNIVERSITAS : 34 cm M NEGERI

LD : 36 cm

LP : 35 cm

LILA M A K A S A R : 11 cm

h. Eliminasi

Urin : Sehari BAK 8-10 kali

Mekonium : Sehari 4-6 kali, warna kuning dempul, konsistensi lembek

i. Pemeriksaan penunjang

Tanggal 27 april 2017

Bilirubin direk : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin indirek : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 13,9 gr/dl

B. Langkah II (Identifikasi diagnosa atau masalah aktual)

1. Diagnosa aktual : Bayi "N",BCB,SMK, dengan ikterus patologi

a. BCB,SMK

Data dasar

Data subjektif :

- 1) Ibu mengatakan HPHT tanggal 20 juli 2016
- 2) Ibu mengatakan melahirkan tanggal 09 april 2017,pukul 16.00

WITA

Data objektif :

- 1) BBL : 2700 gram
- 2) PBL : 49 CM

Analisa dan interpretasi data:

- 1) Bayi cukup bulan adalah bayi yang dilahirkan dengan usia gestasi 37 – 42 minggu (Sarwono, 2014: 414). Dari hasil pengkajian pada kasus bayi "N" hari pertama haid terakhir ibu pada tanggal 20 juli 2016 sampai bayi lahir tanggal 09 april 2017 berarti bayi lahir pada usia kehamilan 37 minggu 4 hari sehingga bayi termasuk kategori Bayi Cukup Bulan (BCB).

2) Bayi lahir sesuai dengan masa kehamilan adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir 2500 – 4000 gram dengan usia gestasi 37 – 42 minggu (Sarwono, 2014: 414). Dari hasil pengkajian pada kasus bayi “N” lahir pada usia kehamilan 37 minggu 4 hari dengan berat badan lahir 2700 gram. Berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan lahir bayi “N” dengan usia kehamilan 37 minggu 4 hari sudah Sesuai Masa Kehamilan (SMK).

b. Ikterus Patologi

Data Dasar

Data subjektif :

- 1) Ibu pasien mengatakan kulit bayinya terlihat kuning.
- 2) Ibu pasien mengatakan bayinya malas minum.

Data objektif :

- 1) Kulit bayi terlihat kuning
- 2) Refleks menghisap dan menelan lemah
- 3) Hasil pemeriksaan LAB pada tanggal 27 april 2017

Bilirubin direk : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin indirek : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 13,9 gr/dl

Analisa dan interpretasi data:

Ikterus Patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2012: 277).

Adapun tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia adalah: kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg % pada neonatus yang cukup bulan dan 12,5 mg% pada neonatus yang kurang bulan, kehilangan berat badan sampai 5 % dalam 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit, feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejang, epistotonus, terjadi pembesaran hati, tidak mau minum, letargi, refleks isap dan menelan lemah (Maryunani, 2014:104).

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi "N" didapatkan kulit bayi nampak kuning, bayi malas minum yang ditandai dengan refleks menghisap dan menelan bayi lemah dan kadar bilirubin total bayi 13,9 gr/dl artinya bayi tersebut mengalami hiperbilirubinemia.

2. Masalah aktual : Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi

Data dasar

Data subjektif :

Ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 27 april 2017

Data objektif :

Refleks isap dan menelan bayi lemah

Analisa dan interpretasi data :

Masalah yang sering dijumpai pada bayi dengan hiperbilirubinemia adalah bayi tidak mau minum ASI, refleks isap dan menelan minuman (Manuaba, 2012: 72). Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi “N” bayi malas minum, refleks isap dan menelannya lemah.

C. Langkah III (Identifikasi diagnosa atau masalah potensial)

Diagnosa potensial : Kern ikterus

Data subjektif :

- 1) Ibu pasien mengatakan kulit bayinya terlihat kuning
- 2) Ibu pasien mengatakan bayinya malas minum

Data objektif :

- 1) Kulit bayi terlihat kuning
- 2) Refleks menghisap dan menelan lemah
- 3) Hasil pemeriksaan LAB pada tanggal 27 april 2017

Bilirubin direk : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin indirek : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 13,9 gr/dl

Analisa dan interpretasi data :

Apabila bayi dengan hiperbilirubinemia tidak ditangani dengan baik dan kadar bilirubinnya semakin tinggi maka akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan karena bilirubin dapat menumpuk di otak yang disebut dengan kern ikterus (Herawati dan Maya, 2017: 68). Pada kasus bayi “N” diantisipasi terjadinya kern ikterus.

D. Langkah IV (Perlunya tindakan segera atau kolaborasi)

Kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk fototerapi dan pemberian obat-obatan

E. Langkah V (Merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Diagnosa aktual : Bayi “N”, BCB, SMK, dengan ikterus patologi

Masalah aktual : Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi

Tujuan : Ikterus patologi dan masalah gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi teratasi

Kriteria :

1) KU bayi baik

2) Tanda-tanda vital dalam batas normal:

Frekuensi jantung : 120-160x/i

Pernapasan : 40-60x/i

Suhu : 36,5-37,5 derajat celcius

3) Refleks isap dan menelan kuat

4) Kulit bayi tidak kuning

Intervensi tanggal 28 april 2017, pukul 12.30 WITA

- 1) Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi
Rasional : Untuk mencegah terjadinya infeksi
- 2) Observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam
Rasional : Untuk memantau keadaan pasien dan mencegah terjadinya komplikasi.
- 3) Berikan intake ASI dan susu formula tiap 3 jam
Rasional : Untuk menurunkan kadar bilirubin dengan memberikan cukup ASI atau susu formula karena bilirubin dapat pecah jika bayi banyak mengeluarkan feses dan urin.
- 4) Jaga kehangatan bayi
Rasional : Untuk mempertahankan suhu bayi.
- 5) Lakukan pemberian injeksi
Ampicilin 135 mg/12 jam/IV
Gentamicin 13 mg/24 jam/IV
Rasional : Sebagai antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi.
- 6) Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan tindakan fototerapi.
Rasional : Untuk menurunkan kadar bilirubin dengan mengubah bilirubin menjadi bentuk larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau urin.
- 7) Berikan informasi dan dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "N" tentang kondisi bayi "N" saat ini.

Rasional : Untuk meningkatkan pemahaman, menurunkan rasa takut agar keluarga mengetahui kondisi bayi “N” saat ini.

- 8) Lakukan informed consent atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi.

Rasional : Sebagai bukti tertulis keluarga menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan.

- 9) Lakukan tindakan fototerapi 2 x 24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam).

Rasional : Untuk menurunkan kadar bilirubin dengan mengubah bilirubin menjadi bentuk larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau urin.

F. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Tanggal 28 april 2017, pukul: 12.30 WITA

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi lemah

Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 130x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 36,6 derajat *celcius*

3. Memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam.

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki.

4. Menjaga kehangatan bayi.

Hasil : Terlaksana, mengganti popok dan baju bayi jika basah.

5. Melakukan pemberian injeksi

Ampicilin 135 mg/12 jam/IV

Gentamicin 13 mg/24 jam/IV

Hasil : Telah diberikan secara IV

6. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak

Hasil : Terlaksana, dokter spesialis anak menginstruksikan untuk melakukan tindakan fototerapi

7. Memberikan informasi dan dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "N" tentang kondisi bayi "N" saat ini

Hasil : Terlaksana, ibu pasien mengerti

8. Melakukan informed consent atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi

Hasil : Terlaksana, pihak keluarga menyetujui untuk tindakan fototerapi

9. Melakukan tindakan fototerapi 2 x 24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Hasil : Terlaksana, pasien telah diletakkan tanpa mengenakan pakaian dibawah sinar fototerapi, tutup mata dan alat kelamin bayi dengan menggunakan kain kasa

G. Langkah VII (Evaluasi)

Tanggal 28 april 2017, pukul 16.00 WITA

1. KU bayi sedang

2. Tanda-tanda vital:

Frekuensi jantung : 136x/i

Pernapasan : 48x/i

Suhu : 36,9 derajat *celcius*

3. Kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi ditandai dengan bayi minum ASI 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki.

4. Popok bayi sudah diganti

5. Telah diberikan injeksi ampisilin 135 mg/12 jam/IV dan injeksi gentamicin 13 mg/24 jam/IV.

6. Tindakan fototerapi masih dilakukan

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI PATOLOGI
PADA BY. "N" DENGAN IKTERUS PATOLOGI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 28 APRIL 2017

No.Register : 46xxxx
Tanggal MRS : 27 April 2017 Pukul : 13.45 WITA
Tanggal Lahir : 09 April 2017 Pukul : 16.00 WITA
Tanggal Pengkajian : 28 April 2017 Pukul : 12.30 WITA

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "N"
Tanggal Lahir : 09 April 2017
Umur : 20 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : Ketiga

b. Orang Tua

Nama : Ny."N"/ Tn."B"
Umur : 39 tahun/41 tahun
Nikah/Lamanya : 1x/±15 tahun
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMP/SMP
Pekerjaan : IRT/Buruh Harian

Alamat : Jl. Poros Barombong

Data Subjektif (S)

1. Ibu pasien mengatakan kekhawatiran dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 27 april 2017.
2. Ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 27 april 2017.
3. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien merupakan anaknya yang ketiga dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya.

Tabel. 3.2 : Riwayat Persalinan Ibu Pasien Terdahulu

No	Tahun	Penolong persalinan	Jenis persalinan	Tempat persalinan	BBL	PBL	Jenis kelamin	Umur kehamilan
1	2008	Bidan	Spontan	PKM	2600 gram	49 cm	Perempuan	Aterem
2	2012	Bidan	Spontan	PKM	2950 gram	50 cm	Laki-laki	Aterem
3	2017	Bidan	Spontan	PKM	2700 gram	48 cm	Laki-laki	Aterem

(Sumber: Data primer)

4. Ibu pasien mengatakan melahirkan bayinya yang ketiga pada tanggal 09 april 2017, pukul 16.00 WITA, di BPS Qamariyah, ditolong oleh bidan, secara spontan, bayi lahir tunggal, keadaan bayi baru lahir segera menangis dan warna kulit bayi kemerahan.
5. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah sakit dan tidak pernah menderita penyakit apapun.
6. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah mengkonsumsi obat apapun dan jamu.
7. Ibu pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 20 juli 2016.
8. Ibu pasien mengatakan dalam keluarga tidak ada penyakit menurun dan tidak ada riwayat PMS.

9. Ibu pasien mengatakan anak-anak sebelumnya tidak ada yang mengalami penyakit kuning.
10. Perawat perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan KU bayi lemah,refleks menghisap kurang kuat, kulit bayi berwarna kuning, bayi dirawat diinfant warmer.
11. Ibu pasien mengatakan menggunakan BPJS untuk membayar biaya perawatan.
12. Ibu pasien dan keluarga berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat.

Data Objektif (O)

1. KU bayi lemah
2. Kesadaran composmentis
3. Gestasi 37 minggu 4 hari
4. Tanda-tanda vital :
 - Frekuensi jantung : 130x/i
 - Pernapasan : 44x/i
 - Suhu : 36,6 derajat celcius
5. Pemeriksaan head to toe
 - Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam dan tidak ada caput succadenum
 - Wajah : Tidak ada oedema
 - Hidung : Tidak ada sekret
 - Mulut : Bibir kering,tidak ada kelainan
 - Telinga : Simetris kiri dan kanan,tidak ada serumen

- Leher : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan
- Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada
- Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi
- Genetalia : Testis sudah turun semua, terdapat lubang pada penis
- Anus : Terdapat lubang pada anus
- Ekstremitas atas : Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan, terpasang infus dextrosa 10% 15 TPM pada tangan sebelah kiri
- Ekstremitas bawah : Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan
- Kulit : Nampak kuning
6. Refleks
- Refleks *moro* : Kuat, apabila dikagetkan lengan dan kaki terangkat
- Refleks *grasping* : Kuat, apabila benda diletakkan ditelapak kaki bayi secara spontan bayi akan menggenggam
- Refleks *sucking* : Lemah, pada saat diberi susu tidak dapat menghisap secara aktif
- Refleks *rooting* : Lemah, apabila menyentuh pipi bayi akan menoleh sentuhan.
- Refelks *swallowing* : Lemah, bayi tidak dapat menelan secara aktif.
7. Pengukuran antropometri
- BBS : 2800 gram
- PBS : 48 cm
- LK : 34 cm
- LD : 36 cm

LP : 35 cm

LILA : 11 cm

8. Eliminasi

Urin : Sehari BAK 8-10 kali

Mekonium : Sehari 4-6 kali, warna kuning dempul, konsistensi lembek.

9. Pemeriksaan penunjang

Tanggal 27 april 2017

Bilirubin direk : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin indirek : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 13,9 gr/dl

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Bayi "N", BCB, SMK, dengan ikterus patologi

Masalah aktual : Gangguan kebutuhan pemenuhan nutrisi

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya kern ikterus

Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi dan pemberian obat-obatan.

Planning (P)

Tanggal 28 april 2017, pukul:12.30 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi lemah

Tanda-tanda vital :
Frekuensi jantung : 130x/i
Pernapasan : 44x/i
Suhu : 36,6 derajat celcius

3. Memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki.

4. Menjaga kehangatan bayi

Hasil : Terlaksana, mengganti popok dan baju bayi jika basah

5. Melakukan pemberian injeksi ampicilin 135 mg/12 jam/IV dan injeksi gentamicin 13 mg/24 jam/IV.

Hasil : Telah diberikan secara IV

6. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak

Hasil : Terlaksana, dokter spesialis anak menginstruksikan untuk melakukan tindakan fototerapi.

7. Memberikan informasi dan dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "N" tentang kondisi bayi "N" saat ini.

Hasil : Terlaksana, ibu pasien mengerti.

8. Melakukan informed consent atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi.

Hasil : Terlaksana, pihak keluarga menyetujui untuk tindakan fototerapi.

9. Melakukan tindakan fototerapi 2X 24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Hasil : Terlaksana, pasien telah diletakkan tanpa mengenakan pakaian dibawah sinar fototerapi, tutup mata dan alat kelamin bayi dengan menggunakan kain kasa.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI PATOLOGI
PADA BY. "N" DENGAN IKTERUS PATOLOGI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 29 APRIL 2017

No.Register : 46xxxx
Tanggal MRS : 27 April 2017 Pukul : 13.45 WITA
Tanggal Lahir : 09 April 2017 Pukul : 16.00 WITA
Tanggal Pengkajian : 29 April 2017 Pukul : 09.00 WITA

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "N"
Tanggal Lahir : 09 April 2017
Umur : 21hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : Ketiga

b. Orang Tua

Nama : Ny."N"/ Tn."B"
Umur : 39 tahun/41 tahun
Nikah/Lamanya : 1x/±15 tahun
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMP/SMP
Pekerjaan : IRT/Buruh Harian
Alamat : Jl. Poros Barombong

Data Subjektif (S)

1. Perawat perinatologi di RSUD syekh yusuf Gowa mengatakan KU bayi sedang, kulit dan sklera bayi masih kuning.
2. Perawat perinatologi di RSUD syekh yusuf Gowa mengatakan bayi sudah BAB dan BAK.

Data Objektif (O)

1. KU bayi sedang
2. Tanda-tanda vital :
 - Frekuensi jantung : 146x/i
 - Pernapasan : 44x/i
 - Suhu : 37,3 derajat *celcius*
3. BBS : 2810 gram
4. Pemeriksaan fisik terfokus
 - Kepala : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan
 - Mata : Konjungtiva merah muda, sklera nampak kuning
 - Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada
 - Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi
 - Ekstremitas atas : Terpasang infus dextrosa 10 %,15 TPM pada tangan sebelah kiri
 - Kulit : Nampak kuning

5. Refleks *sucking* : Mulai kuat
 Refleks *rooting* : Mulai kuat
 Refleks *swallowing* : Mulai kuat

6. Eliminasi

BAB (+) warna kuning dempul, konsistensi lembek

BAK (+) warna kuning jernih

Assesment (A)

Diagnosa aktual : BCB, SMK, dengan ikterus patologi

Diagnosa Potensial : Potensial terjadinya kern ikterus

Planning (P)

Tanggal 29 april 2017, pukul 09.00 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi sedang

Tanda-tanda vital : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Frekuensi jantung : 146x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 37,3 derajat celcius

3. Menimbang berat badan bayi

Hasil : Terlaksana, BB sekarang 2810 gram

4. Memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki

5. Menjaga kehangatan bayi

Hasil : Terlaksana, pakaian dan popok bayi telah diganti

6. Melakukan tindakan fototerapi 2X 24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Hasil : Terlaksana, bayi sedang menjalani fototerapi

7. Mengobservasi BAB dan BAK bayi

Hasil : Terlaksana, bayi sudah BAB dan BAK

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI PATOLOGI

PADA BY. "N" DENGAN IKTERUS PATOLOGI

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 30 APRIL 2017

No.Register : 46xxxx
Tanggal MRS : 27 April 2017 Pukul : 13.45 WITA
Tanggal Lahir : 09 April 2017 Pukul : 16.00 WITA
Tanggal Pengkajian : 30 April 2017 Pukul : 15.00 WITA

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "N"
Tanggal Lahir : 09 April 2017
Umur : 22 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : Ketiga

b. Orang Tua

Nama : Ny."N"/ Tn."B"
Umur : 39 tahun/41 tahun
Nikah/Lamanya : 1x / ±15 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Poros Barombong

Data Subjektif (S)

1. Perawat perinatologi di RSUD syekh yusuf Gowa mengatakan KU bayi sedang, bayi sudah BAB dan BAK
2. Perawat perinatologi di RSUD syekh yusuf Gowa mengatakan kadar bilirubin bayi "N" sudah turun berdasarkan pemeriksaan LAB pada tanggal 30 april 2017 yaitu kadar bilirubin total 5,5 gr/dl.

Data Objektif (O)

1. KU bayi sedang
2. Tanda-tanda vital :
 - Frekuensi jantung : 148x/i
 - Pernapasan : 42x/i
 - Suhu : 36,8 derajat celcius
3. Pemeriksaan fisik terfokus
 - Kepala : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan
 - Mata : Konjungtiva merah muda, sklera mulai memutih.
 - Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada.
 - Abdomen : Perut tidak kembung, tali pusat sudah puput, tidak ada tanda- tanda infeksi.
 - Ekstremitas atas : Terpasang infus dextrosa 10 %,15 TPM pada tangan sebelah kiri.
 - Kulit : Sudah mulai kemerahan

4. Refleks

Refleks *sucking* : Kuat

Refleks *rooting* : Kuat

Refleks *swallowing* : Kuat

5. Eliminasi

BAB (+) warna kuning dempul, konsistensi lembek

BAK (+) warna kuning jernih

6. Pemeriksaan LAB

Pada tanggal 30 april 2017

Bilirubin total: 5,5 mg/dl

Assesment (A)

Diagnosa aktual : BCB, SMK, dengan ikterus patologi

Diagnosa Potensial : Potensial terjadinya kern ikterus

Planning (P)

Tanggal 30 april 2017, pukul 15.00 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi sedang

Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 148x/i

Pernapasan : 42x/i

Suhu : 36,8 derajat celcius

3. Memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki

4. Menjaga kehangatan bayi

Hasil : Terlaksana, pakaian dan popok bayi telah diganti

5. Melakukan tindakan fototerapi 2X 24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Hasil : Terlaksana, bayi sedang menjalani fototerapi

6. Mengobservasi BAB dan BAK bayi

Hasil : Terlaksana, bayi sudah BAB dan BAK

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI PATOLOGI

PADA BY. "N" DENGAN IKTERUS PATOLOGI

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 02 MEI 2017

No.Register : 46xxxx
Tanggal MRS : 27 April 2017 Pukul : 13.45 WITA
Tanggal Lahir : 09 April 2017 Pukul : 16.00 WITA
Tanggal Pengkajian : 02 Mei 2017 Pukul : 10.30 WITA

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "N"
Tanggal Lahir : 09 April 2017
Umur : 23 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : Ketiga

b. Orang Tua

Nama : Ny."N"/ Tn."B"
Umur : 39 tahun/41 tahun
Nikah/Lamanya : 1x / ±15 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Poros Barombong

Data Subjektif (S)

1. Perawat perinatologi di RSUD syekh yusuf Gowa mengatakan KU bayi sudah baik, kadar bilirubinnya sudah normal, kulitnya sudah tidak kuning dan infusnya sudah dilepas.
2. Perawat perinatologi di RSUD syekh yusuf Gowa mengatakan bayinya sudah diwashlap dan ditimbang dengan BBS:2820 gram.

Data Objektif (O)

1. KU bayi baik
2. Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung	: 142x/i
Pernapasan	: 46x/i
Suhu	: 36,7 derajat celcius
3. Pemeriksaan fisik terfokus

Kepala	: Tidak ada benjolan dan nyeri tekan
Mata	: Konjungtiva merah muda, sklera nampak putih
Dada	: Pernapasan sesuai dengan gerakan dada
Abdomen	: Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi.
Ekstremitas atas	: Tidak ada kelainan, infus sudah dilepas
Kulit	: Nampak kemerahan
4. Refleks

Refleks <i>sucking</i>	: Kuat
------------------------	--------

Refleks *rooting* : Kuat

Refleks *swallowing* : Kuat

5. Eliminasi

BAB (+) warna kuning dempul, konsistensi lembek

BAK (+) warna kuning jernih

6. Pemeriksaan LAB

Tanggal 02 april 2017

Bilirubin total : 1,25 mg/dl

Assesment (A)

Bayi "N" BCB, SMK, dengan keadaan normal

Planning (P)

Tanggal 02 mei 2017, pukul 10.30 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi

Hasil : KU bayi baik

Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 146x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 37,3 derajat celcius

3. Mendampingi visite dokter spesialis anak

Hasil : Terlaksana, bayi sudah diperbolehkan pulang

4. Memberitahu kepada orang tua bayi bahwa hari ini bayinya sudah diperbolehkan untuk pulang.

Hasil : Terlaksana, orang tua bayi nampak senang dengan informasi yang disampaikan tentang kondisi bayinya

5. Memberikan HE pada orang tua bayi mengenai:

- a. Pemberian ASI
- b. Pencegahan ikterus
- c. Pencegahan hipotermi
- d. Tanda-tanda bayi sakit
- e. Personal hygiene
- f. imunisasi

Hasil : Ibu mengerti, dan mau mengikuti saran yang diberikan

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang asuhan kebidanan pada bayi “N” dengan hiperbilirubinemia di RSUD Syekh Yusuf Gowa menggunakan manajemen asuhan kebidanan menurut Varney yang terdiri dari 7 langkah yaitu, pengumpulan data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah aktual, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, perlunya tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan asuhan yang menyeluruh, melaksanakan perencanaan, dan evaluasi. Adapun penatalaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dasar

Pada langkah ini kita menghimpun informasi tentang klien atau orang yang meminta asuhan dan memilih informasi yang tepat diperlukan analisa. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

1) Anamnesa, meliputi:

Melakukan tanggung jawab untuk memperoleh data meliputi, biodata pasien, keluhan utama waktu masuk, riwayat penyakit, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu dan riwayat operasi.

2) Pemeriksaan Fisik, meliputi:

Keadaan umum pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara inspeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Pada tahap pengkajian dengan teori ikterus patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut dengan hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2012: 27). Hiperbilirubinemia adalah istilah yang dipakai untuk ikterus neonatorum setelah ada hasil laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar bilirubin bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan. Hiperbilirubin merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang menimbulkan kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2012: 17).

Adapun tanda-tanda ikterus patologi diantaranya ikterus timbul dalam 24 jam pertama kehidupan, serum bilirubin total lebih dari 12 mg/dl, peningkatan bilirubin 5 mg/dl atau lebih dari 24 jam, kosentrasi bilirubin serum melebihi 10 mg/dl pada bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan, ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatibilitas darah, defisiensi enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD) dan sepsis, ikterus yang disebabkan oleh bayi kurang dari 2000 gram yang disebabkan karena usia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun dan kehamilan pada remaja, masa gestasi kurang

dari 36 minggu, asfiksia, hipoksia, syndrome gangguan pernapasan, infeksi, hipoglikemia, hiperkopnia dan hiperosmolitas darah sepsis (Maulida,2014:40).

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun di:sebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut

- a. Produksi yang berlebihan lebih dari pada kemampuan bayi untuk mengeluarkannya misalnya hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6PD, *pyruvate kinase*, perdarahan tertutup dan sepsis.
- b. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukorinil transferasi (*cringler najjar syndrome*). Penyebab lain ialah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel hepar.
- c. Gangguan dalam transfortasi bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut kehepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya *salsilitas*, *sulfatfurazole*. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang kemudian melekat ke sel otak.

- d. Gangguan dalam sekresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain.
- e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat meningkatkan hiperbilirubinemia unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterahepatik.
- f. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI). Ikterus akibat asi merupakan unconjugated hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Dapat dibedakan dari penyakit lain dengan reduksi kadar bilirubin yang cepat bila disubstitusi dengan susu formula selama 1-2 hari. Hal ini unruk membedakan pada bayi disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagai bahan yang terkandung dalam Air Susu Ibu (ASI) adalah (*beta glucoronidase*) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus. Bayi yang mendapatkan ASI bila dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan asupan beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberian (Marmi dan Rahardjo, 2012: 278-280).

Adapun yang menjadi faktor resiko pada bayi ikterus adalah :

a. Air Susu Ibu (ASI) yang kurang

Bagi yang mendapat ASI yang cukup saat menyusui dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi prematur yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI.

b. Peningkatan jumlah sel darah merah

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh, bayi yang memiliki jenis golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit atau mendapat transfusi darah, kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

c. Infeksi/ inkompabilitas ABO-Rh

Berbagai infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin didalam rahim dapat meningkatkan resiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella dan sepsis (Maulida, 2014: 39).

Menurut Maryunani tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia adalah kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg % pada neonatus yang cukup bulan

dan 12,5 mg % pada neonatus yang kurang bulan, kehilangan berat badan sampai 5 %selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit, feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejan, epistotonus (posisi tubuh bayi melengkung), terjadi pembesaran hati, tidak mau minum ASI, letargi, refleks isap dan menelan bayi lemah (Maryunani, 2014: 104).

Ikterus dianggap patologis apabila waktu muncul, lama, atau kadar bilirubin serum yang ditentukan berbeda secara bermakna dari ikterus fisiologis. Peningkatan bilirubin darah khususnya bilirubin indirek yang bersifat toksik bisa disebabkan oleh produksi yang meningkat dan ekskresinya melalui hati terganggu. Berbagai faktor resiko yang merupakan penyebab dari hyperbilirubinemia bisa dari faktor ibu maupun faktor bayi. Yang sering ditemukan antara lain dari faktor maternal seperti komplikasi kehamilan (inkomptabilitas golongan darah ABO dan Rh) dan pemberian air susu ibu (ASI). Faktor perinatal seperti infeksi, dan trauma lahir (cephalhermaton) dan faktor neonatus seperti prematuritas, rendahnya asupan ASI, hipoglikemia, dan faktor genetik (Faiqah, Syajaratuddur, 2014: 1355-1357).

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi "N" dengan ikterus patologi melalui anamnesa didapatkan ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit

bayinya berwarna kuning sejak tanggal 27 april 2017, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 27 april 2017, ibu pasien mengatakan bayinya lahir cukup bulan dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, kulit dan sklera bayi terlihat kuning refleks menghisap dan menelan lemah dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB pada tanggal 27 april 2017 didapatkan hasil bilirubin total 13,9 gr/dl. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Pada tahap pengkajian dengan teori Pada tahap pengkajian dengan teori ikterus patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut dengan hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2012: 27). Hiperbilirubinemia adalah istilah yang dipakai untuk ikterus neonatorum setelah ada hasil laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar bilirubin bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan. Hiperbilirubin merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang menimbulkan kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik

dapat menyebabkan keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2012: 17).

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun di:sebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Produksi yang berlebihan lebih dari pada kemampuan bayi untuk mengeluarkannya misalnya hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6PD, *pyruvate kinase*, perdarahan tertutup dan sepsis.
- b. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukorinil transferasi (*cringler najjar syndrome*). Penyebab lain ialah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel hepar.
- c. Gangguan dalam transfortasi bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut kehepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya *salsilitas*, *sulfatfurazole*. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang kemudian melekat ke sel otak.

- d. Gangguan dalam sekresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain.
- e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat meningkatkan hiperbilirubinemia unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterahepatik.
- f. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI). Ikterus akibat asi merupakan unconjugated hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Dapat dibedakan dari penyakit lain dengan reduksi kadar bilirubin yang cepat bila disubstitusi dengan susu formula selama 1-2 hari. Hal ini unruk membedakan pada bayi disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagai bahan yang terkandung dalam Air Susu Ibu (ASI) adalah (*beta glucoronidase*) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus. Bayi yang mendapatkan ASI bila dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan asupan beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberian (Marmi dan Rahardjo, 2012: 278-280).

Adapun yang menjadi faktor resiko pada bayi ikterus adalah :

a. Air Susu Ibu (ASI) yang kurang

Bagi yang mendapat ASI yang cukup saat menyusui dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi prematur yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI.

b. Peningkatan jumlah sel darah merah

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh, bayi yang memiliki jenis golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit atau mendapat transfusi darah, kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

c. Infeksi/ inkompabilitas ABO-Rh

Berbagai infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin didalam rahim dapat meningkatkan resiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella dan sepsis (Maulida, 2014: 39).

Menurut Maryunani tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia adalah kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubi serum 10 mg % pada neonatus yang cukup bulan

dan 12,5 mg % pada neonatus yang kurang bulan, kehilangan berat badan sampai 5 %selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit, feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejan, epistotonus (posisi tubuh bayi melengkung), terjadi pembesaran hati, tidak mau minum ASI, letargi, refleks isap dan menelan bayi lemah (Maryunani, 2014: 104).

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi “N” ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 27 april 2017, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 27 april 2017, ibu pasien mengatakan HPHT tanggal 20 juni 2016 dan bersalin tanggal 09 april 2017 berdasarkan hasil perhitungan berarti bayi lahir pada usia kehamilan 37 minggu 4 hari sehingga bayi termasuk kategori Bayi Cukup Bulan (BCB), ibu pasien mengatakan berat badan lahir bayinya 2700 gram, berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan lahir bayi “N” dengan usia kehamilan 37 minggu 4 hari sudah Sesuai Masa Kehamilan (SMK) dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, kulit dan sklera bayi terlihat kuning refleks menghisap dan menelan lemah dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB pada tanggal 27 april 2017 didapatkan hasil bilirubin total 13,9 gr/dl. Sehingga pada kasus bayi “N” ditegakkan diagnosa bayi lahir

cukup bulan, sesuai dengan masa kehamilan, ikterus patologi dengan masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

3. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila masalah potensial terjadi. Apabila ikterus patologi tidak ditangani dengan baik dan kadar bilirubinnya semakin tinggi maka akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan karena bilirubin dapat menumpuk di otak yang disebut dengan kern ikterus (Herawati dan Maya, 2017: 68). Hiperbilirubin merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang menimbulkan kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2012: 17).

Kondisi hiperbilirubinemia yang tak terkontrol dan kurang penanganan yang baik dapat menimbulkan komplikasi yang berat seperti kern ikterus akibat efek toksik bilirubin pada sistem saraf pusat (Mastiningsih, Putu, 2012: 15). Salah satu penyebab mortalitas pada bayi baru lahir adalah kern ikterus yang merupakan komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat yang dapat menimbulkan gejala sisa berupa cerebral palsy, tuli nada tinggi, paralisis dan displasia dental

yang sangat mempengaruhi kualitas hidup (Maulida, Luluk Fajria, 2014: 39

Diharapkan penatalaksanaan yang baik dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya yaitu dengan adanya pengawasan antenatal yang baik serta pertolongan persalinan yang aman dengan berpedoman pada asuhan sayang ibu sehingga mampu menurunkan angka kejadian ikterus neonatorum, karena jika tidak ditanggulangi dengan baik maka 75% bayi hiperbilirubinemia akan meninggal dan dampak yang terjadi apabila bayi mengalami hiperbilirubinemia 80% dari bayi yang hidup akan mengalami keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2012: 17).

Pada kasus bayi "N" telah dilakukan observasi penanganan umum dan penanganan segera dengan terapi sinar sehingga masalah potensial (kern ikteus) tidak muncul. Hal ini dikarenakan penanganan yang tepat dan baik dan pada pemeriksaan kadar bilirubin semakin hari semakin menurun. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

4. Langkah IV (Perlunya tindakan segera atau kolaborasi)

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter dan juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk

menentukan asuhan yang paling tepat. Pada kasus ikterus neonatorum diperlukan adanya tindakan segera dengan dokter spesialis anak untuk penanganan lebih lanjut (Mufdillah, dkk, 2012: 111-119). Pada kasus bayi “N” dengan ikterus patologi dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan fototerapi dan pemberian obat-obatan. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata dilapangan.

5. Langkah V (Merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi dan pada langkah ini reformasi data yang tidak lengkap bisa dilengkapi. Perencanaan ini disusun berdasarkan diagnosa, masalah dan kebutuhan. Pada kasus bayi dengan ikterus patologi rencana asuhan yang dilakukan adalah observasi KU umum yang bertujuan untuk memantau agar keadaan bayi tidak mencapai nilai yang menimbulkan kern ikterik, penuhi kebutuhan nutrisi secara baik karena bayi malas minum serta mencegah bayi tidak dehidrasi karena pengaruh sinar lampu, kolaborasi dengan dokter spesialis anak, observasi BAB dan BAK, juga lingkungan sekitar bayi dijaga agar tetap bersih dan hangat (Mufdillah, dkk, 2012: 111-119).

Perencanaan asuhan yang dilakukan pada bayi dengan hiperbilirubinemia adalah fototerapi tranfusi pengganti, fototerapi bila

neonatus dipapar dengan cahaya berintensitas tinggi, tindakan ini dapat menurunkan bilirubin dalam kulit dan transfusi pengganti digunakan untuk mengatasi anemia akibat eritrosit yang rentan terhadap antibodi eritrosit maternal, menghilangkan eritrosit yang tersensitisasi, mengeluarkan bilirubin serum, serta meningkatkan albumin yang masih bebas bilirubin dan meningkatkan keterikatannya dengan bilirubin (Mathindas, dkk, 2013: S8).

Pada kasus bayi "N" dengan ikterus patologi perencanaan yang dilakukan antara lain: cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan pemberian injeksi ampicilin 135 mg/12 jam/IV dan injeksi gentamicin 13 mg/24 jam/IV, lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan tindakan fototerapi, memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "N" tentang kondisi bayi "N" saat ini, lakukan informed consent atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi, lakukan tindakan fototerapi 2X 24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam). Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

6. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota kesehatan yang lain. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi dia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan mutu dan asuhan pada bayi dengan ikterus patologi. Pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari keluarga pasien dan dukungan dari petugas kesehatan diruangan perinatologi RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Pentalaksanaan yang dilakukan pada bayi dengan ikterus patologi adalah fototerapi, transfusi tukar dan pemberian ASI secara optimal. Fototerapi adalah terapi sinar yang diberikan pada bayi untuk mengubah bilirubin menjadi bentuk yang yang larut dalam air untuk diekskresikan melalui empedu atau urin sedangkan terapi transfusi tukar dilakukan apabila fototerapi tidak dapat mengendalikan kadar bilirubin. Transfusi tukar merupakan cara yang dilakukan dengan tujuan mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah, pemberian tranfusi tukar apabila kadar bilirubin 20 mg/dl, kenaikan kadar bilirubin yang cepat yaitu 0,3-1 mg/jam, anemia berat dengan gejala gagal jantung. Pemberian ASI secara optimal perlu diingat bahwa bilirubin dapat dipecah apabila bayi mengeluarkan feses dan urin. Sehingga

pemberian ASI harus diberikan sebab ASI sangat efektif dalam memperlancar BAB dan BAK. Namun demikian, pemberiannya harus tetap dalam pengawasan dokter (Maulida, Fajria Luluk, 2014: 41-43).

Diharapkan penatalaksanaan yang baik dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya yaitu dengan adanya pengawasan antenatal yang baik serta pertolongan persalinan yang aman dengan berpedoman pada asuhan sayang ibu sehingga mampu menurunkan angka kejadian ikterus neonatorum, karena jika tidak ditanggulangi dengan baik maka 75% bayi hiperbilirubinemia akan meninggal dan dampak yang terjadi apabila bayi mengalami hiperbilirubinemia 80% dari bayi yang hidup akan mengalami keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2012: 17).

Pada kasus bayi "N" dengan ikterus patologi, penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 28 april 2017 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, menjaga kehangatan bayi, melakukan pemberian injeksi ampicilin 135 mg/12 jam/Iv dan injeksi gentamicin 13 mg/24 jam/IV dan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi 2 x 24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam). Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 29 april 2017 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam,

memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, menimbang berat badan bayi untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan bayi, dan tetap melakukan tindakan fototerapi. Penatalaksanaan tanggal 30 april 2017 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, menimbang berat badan bayi untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan bayi, dan tetap melakukan tindakan fototerapi. Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 02 mei 2017 Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, mendampingi visite dokter spesialis anak dan bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberi tahu keluarga bayi bahwa bayi sudah dianjurkan untuk pulang, dan memberikan HE pada orang tua bayi. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

7. Langkah VII (Evaluasi)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang sesuai dengan masalah dan diagnosis klien, juga benar dalam pelaksanaannya. Disamping melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah diberikan, bidan juga dapat melakukan evaluasi terhadap proses asuhan yang telah diberikan. Dengan harapan,

hasil evaluasi proses sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. Pada teori bayi dengan hiperbilirubinemia keadaan yang ingin dicapai adalah KU bayi baik, kenaikan berat badan bayi, warna kuning pada kulit bayi sudah tidak terlihat, kebutuhan cairan bayi terpenuhi, refleks isap baik (Mufdillah, dkk, 2012: 111-119).

Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada bayi "N" dengan ikterus patologi selama 28 hari yakni 28 april sampai dengan 02 mei 2017 dengan 4 kali kunjungan. Pada kunjungan pertama tanggal 28 april 2017, masalah yang dialami klien akan diatasi dengan memberikan nutrisi ASI dan pemberian susu formula untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi dengan cara disendoki untuk merangsang refleks isap dan menelan pada bayi serta melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan fototerapi dan pemberian obat-obatan. Kemudian evaluasi pada kunjungan kedua tanggal 29 april 2017 KU bayi sedang, refleks isap dan menelan bayi sudah mulai kuat, kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi dan tindakan fototerapi masih dilakukan untuk menurunkan kadar bilirubin. Pada kunjungan ketiga tanggal 30 april 2017 keadaan bayi sudah mengalami kemajuan dan mulai membaik ditandai dengan sklera dan kulit bayi sudah mulai tidak kuning dan kadar bilirubin bayi sudah menurun. Kunjungan keempat tanggal 02 mei 2017 KU bayi sudah baik, refleks isap dan menelan kuat, kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi ditandai dengan berat badan bayi naik menjadi 2810 gram, sklera dan kulit bayi

sudah tidak kuning dan kadar bilirubin sudah normal dan sudah dianjurkan untuk pulang. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata dilapangan.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah penulis dapatkan dalam studi kasus dan pembahasan pada asuhan kebidanan pada bayi “N” dengan ikterus patologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk peningkatan pelayanan asuhan kebidanan khususnya pada bayi dengan hiperbilirubinemia.

A. KESIMPULAN

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada bayi “N” dengan ikterus patologi dilaksanakan dengan mengumpulkan data subyektif yang diperoleh dari hasil wawancara dimana ibu pasien mengatakan kulit bayinya berwarna kuning, data objektif diperoleh dari pemeriksaan fisik seperti kulit dan sklera bayi nampak kuning, refleks isap dan menelan bayi lemah serta data penunjang yang diperoleh dari pemeriksaan LAB yaitu bilirubin total 13,9 gr/dl.
2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan data secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada bayi “N”, BCB, SMK dengan ikterus patologi yang disertai dengan masalah kekurangan cairan, kebutuhan merangsang refleks isap dengan cara pemberian nutrisi dengan menggunakan sendok.
3. Diagnosa potensial pada kasus ini tidak muncul karena penanganan yang cepat dan tepat.

4. Perlunya tindakan segera atau kolaborasi dalam langkah ini dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan fototerapi 2 x 24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam) dan memenuhi kebutuhan cairan yaitu 40 cc per 3 jam.
5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh, pada kasus ini rencana asuhan yang dilakukan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan pemberian injeksi ampisilin 135 mg/12 jam/IV dan injeksi gentamicin 13 mg/24 jam/IV, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan tindakan fototerapi, memberikan informasi dan dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "N" tentang kondisi bayi "N" saat ini, melakukan informed consent atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi, melakukan tindakan fototerapi 2X 24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam).
6. Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pada bayi "N" merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan.
7. Evaluasi, setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 4 hari pada kasus bayi "N" dengan ikterus patologi didapat hasil KU bayi baik, refleks menghisap dan menelan kuat, sklera dan kulit bayi sudah tidak kuning, kebutuhan nutrisi tercukupi, berat badan bayi naik menjadi 2810 gram, dan kadar bilirubin menurun.

8. Penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus nyata dilapangan.

B. SARAN

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus penulis memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi rumah sakit

Diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan asuhan pada bayi agar dapat mempercepat proses penyembuhan khususnya pada bayi dengan ikterus patologi dan mencegah terjadinya komplikasi.

2. Bagi pendidikan

Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan menambah referensi sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa yang akan mengambil kasus yang sama.

3. Bagi profesi

Meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi bayi dengan ikterus patologi secara cepat, tepat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ekayanti Hafidah, dkk. *Faktor Determinan Status Kesehatan Bayi Neonatal Di RSKDIA Siti Fatimah Makassar: KESMAS*. Vol 6, No.3, 144-211. September 2012.
- Anggraini, Yetti. *Hubungan Antara Persalinan Prematur Dengan Hiperbilirubinemia: Jurnal Kesehatan*. Vol.V, No.2, 109-112. Oktober 2014.
- CMNRP. *Newborn Hyperbilirubinemia*. 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Di Ponegoro, 2010.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar: SIK, 2016.
- Elmeida, Ika Fitria. *Asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita dan anak pra sekolah*. Trans Info Media: Jakarta Timur. 2015
- Faiqah, Syajaratuddur. *Hubungan Usia Gestasi dan Jenis Persalinan Dengan Kadar Bilirubinemia Pada Bayi Ikterus Di RSUP NTB: Jurnal Kesehatan Prima*, Vol 8, .No.2. Agustus 2014.
- Herawati dan Maya Indriyati, *Pengaruh Pemberian ASI Awal Terhadap Kejadian Ikterus Pada Baru Lahir 0-7 Hari: Midwife Journal*, Vol.3, No. 01. Januari 2017.
- Intart, Wiwit Desi, dkk. *Efektifitas Muscle Pumping Dalam Meningkatkan Score Apgar Pada Bayi Baru Lahir Dengan Asfiksia.: Jurnal Kesehatan*. Vol. VIII, No.01. Juni 2016.
- Kosim, Yunanto, dkk. *Buku Ajar Neonatologi: CV. Agung Seto*. Jakarta. Edisi Pertama. 2012.
- Lubis, Bugis Mardina, dkk. *Rasio Bilirubin Albumin Pada Neonatus Dengan Hiperbilirubinemia*. Sari Pediatri: Vol.14, No.5. Februari 2013.
- Mala, Viya Yanti. *Analisa Penyebab Angka Kematian Bayi (AKB) Intervensi program KKB dalam mencapai sasaran MDG'S*. 2015.
- Manggiasih, Vdia Atika dan Pongki Jaya. *Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah*. Trans Info Media: Jakarta. 2016.
- Marmi dan Kukuh Rahardjo. *Asuhan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2012.
- Maryunani, Anik. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*, In Media: Jakarta. 2014.
- Mathindas, Stevry, dkk. *Hiperbilirubinemia Pada Neonatus: Jurnal Biomedik*. Vol.5, No. 1, S4-10. Maret 2013.

- Maulida, Luluk Fajria. *Ikterus Neonatorum: PROFESI*. Vol.10, No.3. September, 2013-Februari 2014.
- Maulike, Novie dan Nurjannah Ade. *Faktor-Faktor Pada Ibu Bersalin Yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Bayi Baru Lahir: Jurnal Kesehatan Kartika*. Vol.8. No.4 Maret 2013.
- Mufdillah, dkk. *Konsep Kebidanan*. Nuha Medika: Yogyakarta. 2012.
- Penuntun Penulisan KTI UIN: Makassar- Samata Gowa: UIN Press, 2013.
- Pholman, Mercedes Naaharani, dkk, *Hubungan Inisiasi Menyusu Dini Dengan Ikterus Neonatorum Di RSUD Wates Yogyakarta. Media Ilmu Kesehatan : Vol.4, No.2. Agustus 2015.*
- Ranuh, IG.N.Gde. *Beberapa Catatan Kesehatan Anak*. CV Agung Seto: Jakarta. 2013.
- Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). 2015.
- Rukiyah, Ai Yeyeh dan Lia Yulianti. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Trans Info Media: Jakarta. Edisi Kedua. 2012.
- Rukiyah, Ai Yeyeh dan Lia Yulianti. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*, Trans Info Media: Jakarta. Edisi ketiga. 2013.
- Shetty Anil dan Sraddha Shetty. *The Impact of Female Literacy on Infant Mortality Rate In Indian States: Cur Pediatr Res*. Vol.18, No.I. 2014.
- Shetty Anil dan Binoop Kumar. *Study Of Neonatal Hyperbiliubinemia In A Tertiary Care Hospital: International Journal of Medical Sciene and Public Health*. Vol.3, Issue 10. 2014.
- Sondakh. *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Erlangga: Jakarta. 2013
- Standar Operasional Prosedur, RSUD Syekh Yusuf Gowa 2015.
- Sukamti, Sri dan Pandu Riono. *Pelayanan Kesehatan Neonatal Berpengaruh Terhadap Kematian Neonatal di Indonesia: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan*. Vol.2, No. 2, Maret 2015.
- Susilaningsih, Rekawati. *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak*. Salemba Medika: Jakarta Selatan. 2013.
- Walyani, Elisabeth Siwi. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Pustaka Baru: Yogyakarta. 2015.

RIWAYAT HIDUP



Hartina, dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1996 di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Putri Pertama dari pasangan Ayahanda Rajamuddin dan Ibunda Nureda.

Jenjang pendidikan yang pernah di lalui penulis adalah:

Tamat SDN 177 Batuasang, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba tahun 2008, Tamat SMP Negeri 2 Herlang tahun 2011, Tamat SMK Keperawatan Gafur Yahya Bulukumba tahun 2014. Pada Tahun 2014, Penulis melanjutkan studinya pada Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pengalaman organisasi internal kampus:

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Diploma Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2016-2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 7 9 8 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7831/S.01P/P2T/06/2017
Lampiran :
Perihal : **izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.836FKIK/PP.00.9/05/2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **HARTINA**
Nomor Pokok : 70400114043
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI "N" DENGAN IKTERUS NEONATORUM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Juni s/d 05 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 06 Juni 2017

A. M. YAMIN, SE., MS.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 8 Juni 2017

K e p a d a

Nomor : 070/ 628 /BKB.P/2017

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Di-

T e m p a t

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 7831/S.01.P/P2T/06/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **HARTINA**
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 25 Mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Samata Gowa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI "N" DENGAN IKTERUS NEONATORUM**"

Selama : 06 Juni 2017 s/d 05 Juli 2017
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,

DRS. BAHARUDDIN.T
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kadis Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :163/Diklat.RSUD-SY/ VIII /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Hartina
N i m : 70400114043
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Perinatologi dan Rekam Medik Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul “ **Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi” N “ Dengan Ikterus Neonatorum Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa** “ pada tanggal 07 Juli 2017 S/D 07 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungguminasa, 07 Agustus 2017

An. Ketua Diklat
Koordinator Bagian Penelitian



Dra. Hj. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS

Nip. 19630710 198703 2 019