

**PENGARUH PEMBERIAN PAKAN KONSENTRAT
DAN UREA MOLASES BLOK (UMB) TERHADAP
EFESIENSI PENGGUNAAN BIAAYA UNTUK
PRODUKTIVITAS SAPI POTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Peternakan (S.Pt) pada Jurusan Ilmu Peternakan
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh

ALAUDDIN

MUHAMMAD SUWANDA

NIM. 60700110023

**JURUSAN ILMU PETERNAKAAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

2014

**PENGARUH PEMBERIAN PAKAN KONSENTRAT
DAN UREA MOLASES BLOK (UMB) TERHADAP
EFESIENSI PENGGUNAAN BIAAYA UNTUK
PRODUKTIVITAS SAPI POTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Peternakan (S.Pt) pada Jurusan Ilmu Peternakan
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh

ALAUDDIN

MUHAMMAD SUWANDA

NIM. 60700110023

**JURUSAN ILMU PETERNAKAAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Desember 2014

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S

MUHAMMAD SUWANDA
NIM: 607001110023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **Muhammad Suwanda**, NIM: 60700110025 mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Pengaruh Pemberian Pakan Konsentrat Dan Urea Molases Blok (UMB) Terhadap Efisiensi Penggunaan Biaya Untuk Produktivitas Sapi Potong”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Desember 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Abd. Latief Toleng, M.Sc
NIP: 19540602 197802 1 001

Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si
NIP: 196303241994021001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P
NIP: 19750909 200912 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pengaruh Pemberian Pakan Konsentrat Dan Urea Molases Blok (UMB) Terhadap Efisiensi Penggunaan Biaya Untuk Produktivitas Sapi Potong**” yang disusun oleh **Muhammad Suwanda, NIM: 60700110025**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 12 Desember 2014, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan dalam Ilmu Teknologi Hasil Ternak, Jurusan Ilmu Peternakan.

Makassar, 12 Desember 2014

DEWAN PENGUJI:

- Ketua : **Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd** (.....)
- Sekretaris : **Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** (.....)
- Munaqisyi I : **Dr. Ir. Basir S Paly. M.Si** (.....)
- Munaqisyi II : **Astati, S.Pt. Mp** (.....)
- Munaqisyi III : **Dr.Hasyim Haddade, S. Ag., M. Ag** (.....)
- Pembimbing I : **Prof. Dr. Ir. Abd. Latief Toleng, M.Sc** (.....)
- Pembimbing II : **Dr. Ir. Andi Suarda., M. Si** (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 19711204 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemberian Pakan Konsentrat Dan Urea Molases Blok (UMB) Terhadap Efisiensi Penggunaan Biaya Untuk Produktivitas Sapi Potong”** yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insya Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, perjalanan dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ibunda **Ibu Suadah** dan Ayahanda **Wawa Sadewa** serta

Sekeluarga yang tampah pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Bapak Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. **Bapak Prof. Dr. Ir. Abd. Latief Toleng, M.Sc** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan **Bapak Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si** selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. **Bapak Dr. Ir. Basir S Paly. M.Si, Ibu Astaty, S.Pt. M.Si. dan Bapak Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag** selaku penguji yang telah memberikan saran

dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Keluarga, rekan-rekan dan sahabat tercinta: **Muhammad Sugiwani, Febby Saskia, Umar, Ilyas, Sampeang, Muhammad Arsan Jamili, S.Pt, Muhammad Suhaebar, Riswandi, wawan, dan yang teristimewa Nurwahidah. J, S.Pt** yang tidak pernah berhenti mengiringi do'a, motivasi, serta canda tawa sehingga dalam kondisi apapun tetap mampu percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar: **Eka Juniarti Aries, Armiami Alimuddin, Adi Hermanto, Asnal Udin Alkahfi, Amaluddin, Andi Harun Munandar, Faisal, Ahmad Alim, Asdar, Amiluddin, Irfan, Miftahuddin, dan Sultan.**

Penulis berharap adanya masukan dan saran yang positif demi memperbaiki skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan khususnya masalah Produktivitas Sapi Potong. Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Hipotesis.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Tinjauan Umum Sapi Potong.....	6
B. Pakan.....	20
1. UMB (Urea Molasses Blok).....	22
2. Konsentrat	26

C. Efisiensi Penggunaan Pakan	32
D. Produktivitas Sapi Potong	34
E. Biaya Pakan.....	36
F. <i>Feed Cost Per Gain</i>	38
G. Limbah Pertanian Sebagai Pakan Ternak Ruminansia	39
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian	50
B. Materi Penelitian	50
1. Ternak	50
2. Pakan.....	51
3. Peralatan Tambahan	52
C. Prosedur Penelitian.....	52
D. Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. <i>Feed Cost Per Gain</i>	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kandungan Nutrisi Dedak halus	29
2. Bahan baku pakan asal pertanian	40
3. Kandungan nutrisi pakan asal limbah pertanian	48
4. Komposisi Pakan UMB dan Konsentrat	51
5. Hasil Analisa Pakan UMB dan Pakan Konsentrat	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Muhhammad Suwanda
NIM : 60700110023
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : **Pengaruh Pemberian Pakan Konsentrat Dan Urea Molases Blok (Umb) Terhadap Efisiensi Penggunaan Biaya Untuk Produktivitas Sapi Potong.**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Juni 2014. Lokasi penelitian bertempat di samata Integrated Farming System Jln. Veteran Bakung, Kelurahan Samata, Kec. Sumba Opu, Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrat dan UMB terhadap efisiensi penggunaan biaya untuk produktivitas sapi potong. Metode penelitian terdiri dari 2 perlakuan, perlakuan pertama yaitu pemberian pakan UMB dan perlakuan kedua pemberian pakan konsentrat. Masing-masing perlakuan terdiri dari 4 ekor sapi potong jantan. Data yang diperoleh dianalisis dengan Uji T (t- Test Independent Sampele).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pemberian pakan UMB dan pakan konsentrat tidak berpengaruh nyata terhadap efisiensi penggunaan biaya untuk produktivitas sapi potong.

Kata kunci: *Pakan UMB, Pakan Konsentrat, efisiensi penggunaan biaya untuk produktivitas , Sapi Potong.*

ABSTRACT

Name :

Nim : 60700110023

Subject :

Title :.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sub sektor peternakan sebagai salah satu bagian dari pembangunan secara keseluruhan memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu untuk konsumsi sehari-hari dan juga sebagai barang yang bernilai ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai produk komoditi konsumsi sehari-hari pembangunan peternakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan protein hewani sedangkan komoditi yang bernilai ekonomi, sosial, dan budaya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani peternak secara khusus dan masyarakat¹.

Ternak diciptakan ke dunia ini tidak sia-sia, melainkan mempunyai manfaat bagi manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minuun ayat 21.

وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّعِبْرَةِ نَسْفِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan”.

¹ Murtidjo., *Beternak Sapi Potong*. (Yogyakarta: Kanisius. 1990).

Dalam “*Tafsir Al-Mishbah*” ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, unta, atau juga sapi dan kambing, benar-benar terdapat ‘*Ibrah*, yakni pelajaran bagi kamu. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang itu, kamu dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah SWT dan karunia-Nya. Kami memberi kamu minuman dari sebagian yakni susu murni yang penuh gizi, yang ada pada perutnya, dan juga selain susunya. Padahal, yakni pada binatang-binatang ternak itu secara khusus terdapat faidah yang banyak untuk kamu seperti daging, kulit dan bulunya. Semuanya itu dapat kamu manfaatkan untuk berbagai tujuan dan sebagainya darinya, atas berkat Allah kamu makan dengan mudah lagi lezat dan bergizi. Dan di atasnya yakni, di atas punggung binatang-binatang itu yakni unta dan juga di atas perahu-perahu kamu dan barang-barang kamu diangkut atas izin Allah menuju tempat-tempat yang jauh².

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya pada penciptaan binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang sangat penting bagi manusia di samping pemanfaatannya sendiri sebagai nikmat pemberian Allah SWT. Sebagai pelajaran dan bahan riset, rumput yang dimakan oleh binatang ternak seperti sapi itu, setelah dikunyah dan masuk dalam perutnya, kemudian bercampur dengan darah, maka Allah berkuasa untuk memisahkan air susu dari percampuran dua benda yang kotor itu sebagaimana tersebut³.

² M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2002), h. 349.

³ Departemen Agama RI. " *Al-quran dan Terjemahnya* ". Al- Jumanatul ‘Ali. Surah al-mu’min ayat 21. h. 500.

Masih banyak peternak yang memberikan pakan seadanya tanpa memperhatikan persyaratan kualitas, dan efisiensi pemberiannya. Akibatnya, produktivitas ternak tidak optimal, bahkan banyak diantara para peternak yang mengalami kerugian akibat pakan yang tidak memadai.

Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan memanfaatkan potensi pakan lokal sangat penting untuk dilaksanakan karena pakan dalam usaha peternakan merupakan komponen biaya yang paling besar yaitu mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Ketersediaan pakan yang kontinu sepanjang tahun, murah, dan bernilai gizi tinggi sangat diperlukan dalam menunjang usaha peternakan terutama sapi potong guna mendukung program nasional swasembada daging sapi tahun 2014. Oleh karena itu, teknologi pakan lokal sangat diperlukan karena pakan sangat besar pengaruhnya terhadap pertambahan bobot badan sapi guna untuk hidup pokok, pertumbuhan, reproduksi, dan produksi daging⁴.

Q.S Al-Israa' Ayat 27 dijelaskan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
1965
ALAUDDIN
M A K A S S A R
إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

⁴ Kuswandi., *Sumber bahan pakan lokal ternak ruminansia.* (Bogor: Pusat penelitian dan pengembangan peternakan. 2011).

Dalam “*Tafsir Al-Mishbah*” ayat diatas dijelaskan yaitu sesungguhnya para pemboros, yakni yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya, adalah saudara-saudara, yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat setan-setan, sedangkan setan terhadap tuhanNya adalah sangat ingkar⁵.

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah yaitu perbuatan-perbuatan yang menyerupai syaitan seperti jadi pemboros-pemboros, sesuatu yang masih biasa dimanfaatkan tapi dibuang begitu saja maka kita tergolong orang yang pemboros. Jangan kita membuang-buang sesuatu yang masih bisa bermanfaat untuk kita, sebagai contoh limbah-limbah pertanian yang bisa digunakan sebagai pakan ternak.

Pemanfaatan limbah pertanian memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber pakan ternak ruminansia karena ketersediaannya cukup berlimpah dan berkesinambungan⁶. Dari uraian diatas, maka saya melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrat dan Urea Molases Blok (UMB) terhadap efisiensi penggunaan biaya untuk produktivitas sapi potong.

B. Rumusan Masalah

Baagaimana pengaruh pemberian konsentrat dan Urea Molases Blok (UMB) terhadap efisiensi penggunaan biaya untuk produktivitas sapi potong?

⁵ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2002). h.

⁶ Sutrisno. . *Potensi dan bahan pakan*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 1994).

C. Tujuan

Untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrat dan UMB terhadap efisiensi penggunaan biaya untuk produktivitas sapi potong.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa serta peternak, tentang pengaruh pemberian konsentrat dan UMB terhadap efisiensi penggunaan biaya untuk produktivitas sapi potong.

E. Hipotesis

Diduga pemberian pakan konsentrat dan Urea Molases Blok (UMB) dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan biaya untuk produktivitas sapi potong.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Sapi Potong

Sapi potong adalah sapi yang khusus dipelihara untuk digemukkan karena karakteristik yang dimilikinya seperti tingkat pertumbuhannya cepat dan kualitas daging cukup baik. Sapi-sapi inilah yang umumnya dijadikan sebagai sapi bakalan, yang dipelihara secara intensif selama beberapa bulan, sehingga diperoleh penambahan berat badan yang ideal untuk dipotong. Pemilihan bakalan yang baik menjadi langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan usaha. Salah satu tolak ukur penampilan produksi sapi potong adalah penambahan berat badan harian⁷.

Prospek peternakan sapi potong di Indonesia masih tetap terbuka lebar dalam waktu yang lama. Hal ini disebabkan permintaan daging dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini memang sejalan dengan peningkatan taraf ekonomi dan kesadaran akan gizi dari masyarakat. Namun, peningkatan permintaan daging sapi ini tidak diikuti oleh jumlah populasi ternak sapi potong. Tidak heran kalau setiap tahun permintaan persediaan daging sapi di Indonesia semakin menurun terhadap jumlah penduduk walaupun jumlah ternak sapi potong meningkat⁸.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl ayat 66:

⁷ Abidin. *Meningkatkan Produktivitas Ayam Ras Pedaging*. (Jakarta: Agromedia Pustaka. 2002).

⁸ Sugeng,. *Beternak Sapi Potong*. (Jakarta: Penebar Swadaya. 1998).

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا

سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”. (Q.S. An-Nahl ayat 66).

Dalam “*Tafsir Al-Mishbah*” ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu yang paling banyak dan dekat dalam benak masyarakat Arab ketika itu, yakni binatang ternak. Dan untuk itu di sebut susu yang dihasilkannya dan dengan demikian, bertemu dua minuman yang keduanya dibutuhkan manusia dalam rangka makanan yang sehat dan sempurna, yakni susu dan daging. Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak, yakni unta, sapi, kambing, dan domba, benar-benar terdapat pelajaran yang sangat berharga yang dapat mengantarkan kamu menyadari kesabaran dan kekuasaan Allah. Kami menyuguhkan kamu minuman sebagian dari apa yang berada dalam perutnya, yakni perut betina-betina binatang itu, yakni antara sisa-sisa makanan dan darah, yaitu susu murni yang tidak tercampur dengan darah walau warnanya tidak juga dengan sisa makanan walau baunya lagi yang mudah ditelan bagi para yang meminumnya⁹.

⁹ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2002).

Ternak dapat dibedakan satu sama lain salah satunya dapat dilihat dari warna bulu. Seperti Sapi Bali berwarna merah bata sedangkan sapi FH berwarna putih hitam. Sapi Bali jantan dewasa berwarna hitam sedangkan Sapi Bali betina berwarna merah bata. Keberadaan ternak dengan ciri-ciri fisik berupa warna bulu yang berbeda-beda tercantum dalam Q.S. Faathir ayat 28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالِدَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Terjemahnya :

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

Dalam “*Tafsir Al-Mishbah*” ayat ini menjelaskan bahwa aya ini menyitir perbedaan bentuk dan warna makhluk hidup. Ayat ini menyatakan bahwa: dan diantara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak yakni unta, sapi dan domba bermacam-macam bentuk, ukuran, jenis dan warnanya seperti itu pula yakni seperti keragaman tumbuhan dan gunung-gunung. Sebagian dari penyebab perbedaan itu dapat ditangkap maknanya oleh ilmuwan dan karena itu sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun¹⁰.

¹⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2002), h. 60.

Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Nya. Allah SWT menciptakan binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, yang bermacam-macam warnanya sekalipun berasal dari jenis yang satu, bahkan ada binatang yang satu, sering terdapat warna yang bermacam-macam. Maha suci Allah pencipta alam semesta dengan sebaik-baiknya.

Bangsa sapi di dunia ada 2 yaitu bangsa sapi tropis dan sub tropis¹¹ :

1. Bangsa Sapi Potong Tropis

Bangsa sapi potong tropis adalah bangsa sapi potong yang berasal dari belahan dunia beriklim tropis. *Bos indicus* (sapi bangsa Zebu) merupakan bangsa sapi potong berpuncuk dari daerah tropis di Asia yang kita kenal sekarang ini. Bangsa sapi potong tropis merupakan salah satu bangsa yang menjadi bibit sapi potong. Bibit ternak merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam usaha peternakan sapi potong, selain faktor pakan, perkandangan, penyakit, limbah, dan penanganan panen.

Bangsa sapi potong tropis yang dikenal sebagai bibit sapi potong di masyarakat peternakan Indonesia adalah :

a. Sapi Bali

Sapi Bali adalah bangsa sapi potong lokal asli Indonesia yang terbentuk dari banteng (*Bibos banteng*) yang telah dijinakkan berabad-abad yang lalu. Sapi Bali mempunyai angka reproduksi yang tinggi, tingkat adaptasi yang sangat baik

¹¹ Miftanissa. *Bangsa-bangsa sapi tropis dan sub tropis*. (<http://miftanissa.blogspot.Com/2012/12/bangsa-sapi-tropis-dan-subtropis.html>. 2012) Diakses tanggal 30 Januari 2014.

terhadap kondisi pakan yang jelek dan lingkungan yang panas serta mempunyai % karkas dan kualitas daging bagus. Kelemahan sapi Bali adalah rentan terhadap penyakit jembrana dan MCF serta tingkat kematian pedet pada sapi yang mencapai 15 sampai 20 %.

Ciri fisik sapi Bali adalah warna bulu merah bata, pada jantan akan menjadi hitam saat dewasa, ada warna putih dengan batas yang jelas pada bagian belakang paha, pinggiran bibir atas, kaki bawah mulai tarsus dan carpus, mempunyai gumba yang bentuknya khas serta terdapat garis hitam yang jelas pada bagian atas punggung, sapi Bali ini merupakan sapi lokal yang memiliki tipe pedaging karena persentase karkas dapat mencapai 56,9% dan baik sapi Bali jantan maupun betina memiliki tanduk.

b. Sapi Madura

Sapi Madura adalah bangsa sapi potong lokal asli Indonesia yang terbentuk dari persilangan antara Banteng dengan *Bos indicus* atau sapi Zebu yang secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan caplak.

Karakteristik sapi Madura sudah sangat seragam, yaitu bentuk tubuhnya kecil, kaki pendek dan kuat, bulu berwarna merah bata agak kekuningan tetapi bagian perut dan paha sebelah dalam berwarna putih dengan peralihan yang kurang jelas, bertanduk khas, dan jantannya bergumba.

Sapi Madura adalah salah satu sapi asli Indonesia. Sapi Madura berasal dari pulau Madura dan pulau-pulau di sekitarnya. Pulau Sapudi sangat dikenal sebagai tempat sapi Madura yang berkembang pesat. Sapi Madura merupakan

persilangan *Bos sondaicus* dengan *Bos indicus*. Ciri-ciri punuk diperoleh dari *Bos indicus* sedangkan warna diwarisi dari *Bos sondaicus*. Namun penelitian Popescu dan Smith (1998) menunjukkan bahwa pola karyotipik sapi Madura menunjukkan adanya kemiripan dengan *Bos taurus*, kecuali pada kromosom Y-nya yang mirip dengan *Bos indicus*. Sehingga Popescu dan Smith menyimpulkan sapi Madura merupakan hasil perkawinan silang antara indukan *Bos taurus* atau *Bos javanicus* dengan pejantan *Bos indicus*.

Ciri-ciri umum fisik Sapi Madura adalah baik jantan ataupun betina sama-sama berwarna merah bata, paha belakang berwarna putih, kaki depan berwarna merah muda, tanduk pendek beragam. Pada betina kecil dan pendek berukuran 10 cm, sedangkan pada jantannya berukuran 15-20 cm, Panjang badan mirip Sapi Bali tetapi memiliki punuk walaupun berukuran kecil, persentase karkas dari sapi Madura ini dapat mencapai 48 %. Sedangkan Keunggulan Sapi Madura secara umum adalah mudah dipelihara, mudah berbiak dimana saja, tahan terhadap berbagai penyakit dan tahan terhadap pakan kualitas rendah.

c. Sapi Aceh

Sapi Aceh adalah sapi potong turunan dari *grading-up* persilangan antara sapi Ongole dengan sapi lokal setempat. Bangsa sapi yang juga banyak ditemukan di Sumatera Utara selain di Aceh ini memiliki bobot badan dewasa yang dapat mencapai rata-rata 300 - 450 kg pada jantan dan 200 – 300 kg pada betina. Adapun ciri-ciri fisik sapi Aceh adalah berpunuk, bertanduk, bulu berwarna coklat merah atau warna menjangan. Sapi Aceh merupakan salah satu bangsa

sapi potong daerah tropis yang digunakan peternak Indonesia sebagai bibit sapi potong.

d. Sapi Ongole

Sapi Ongole adalah sapi potong impor yang berasal dari India, dibudidayakan di Indonesia secara murni di pulau Sumba, sapi ini dikenal pula sebagai sapi Sumba Ongole. Pada perkembangannya selain di pulau Sumba, saat ini sapi Ongole telah tersebar di Sulawesi Utara, Kalimantan, dan Jawa. Di pulau Jawa, sapi ini dikenal sebagai sapi Benggala. Bangsa sapi yang dikenal di Eropa sebagai sapi Zebu ini memiliki keunggulan dan performa produksi dan penambahan berat badan (PBB) bisa mencapai 0,47 – 0,81 kg per hari, Berat Badan jantan dewasa rata-rata 550 – 600 kg dan betina 350 – 450 kg, Tahan terhadap panas dan parasit, daya hidup pedet sangat baik, daya produksi yang baik dalam kondisi jelek, dan dapat dimanfaatkan sebagai sapi pekerja dan jinak.

Ciri-ciri fisik sapi Ongole adalah bulu berwarna variasi setelah berumur 1 tahun dari putih sampai putih kelabu dengan campuran kuning oranye kekelabuan, dimana pada leher, punuk dan kepala sapi jantan berwarna putih keabu-abuan serta lututnya berwarna hitam, anak sapi yang baru lahir sering berwarna coklat, kepala berukuran panjang, telinga sedang agak menggantung, tanduk berukuran pendek pada jantan dan berukuran lebih panjang pada betina, punuk bulat dan besar, gelambir lebar dan menggantung serta berlipat-lipat mulai dari leher melalui perut sampai dengan ambing atau tali pusar, tinggi badan dapat mencapai 150 cm pada jantan dan 135 cm pada betina dan rata-rata penambahan berat badan harian (ADG) dapat mencapai 0,4-0,6 kg/ hari dengan hasil silangnya

(keturunannya) memiliki ADG yang dapat mencapai 0,28 kg/hr, adanya warna hitam yang mengelilingi lubang mata yang biasa disebut cicin mata.

e. Sapi Peranakan Ongole

Sapi Peranakan Ongole atau sapi PO adalah sapi potong hasil *grading up*, sapi lokal setempat dengan sapi Ongole. Pada perkembangannya sapi ini banyak ditemukan di Grobogan, Wonogiri dan Gunung Kidul (Jawa Tengah), Magetan, Nganjuk dan Bojonegoro (Jawa Timur), serta Aceh dan Tapanuli Selatan. Bangsa sapi yang diyakini populasinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sapi lokal lain ini memiliki keunggulan dan performa produksi sebagai berikut : - BB dewasa mencapai 584 – 600 kg, masa *fattening* 3 bulan – 5 bulan, PBB 0,8 – 1 kg, persentase karkas 45%, tahan terhadap panas dan parasit, mampu berproduksi dengan baik dalam kondisi jelek, daya hidup pedet sangat baik, dapat dimanfaatkan juga sebagai sapi pekerja dan jinak.

f. Sapi Brahman

Sapi Brahman (sapi pedaging) impor, berasal dari India dan berkembang dengan sangat baik di Amerika Serikat, sehingga dikenal pula sebagai sapi American Brahman. Pada perkembangannya sapi Brahman telah tersebar di daerah tropis dan subtropis termasuk Australia dan Indonesia. Bangsa sapi yang termasuk sapi Zebu ini memiliki keunggulan dan performa produksi dengan masa *fattening* 3 – 4 bulan, PBB bisa mencapai 0,83 – 1,5 kg per hari, bahkan ada juga yang menyebut dapat 1,5 – 2 kg per hari, BB jantan dewasa mencapai 800 kg dan betina 550 kg, persentase karkas 48,6 – 54,2%, tingkat fertilitas yang tinggi, mampu tumbuh sama baiknya di daerah tropis dan subtropis, mampu

tumbuh cepat di daerah yang kurang subur dengan pakan yang sederhana, tahan terhadap panas dan parasit, bobot pascasapih dan daya hidup pedet yang baik.

Ciri – ciri fisik sapi Brahman adalah tubuh berukuran besar dan panjang dengan kedalaman yang sedang, punggung lurus, kaki berukuran sedang sampai panjang, bulu berwarna abu-abu muda atau merah atau hitam, dimana pada jantan menunjukkan, warna yang lebih gelap daripada pada betina, kepala panjang, telinga menggantung, tanduk berukuran sedang, lebar dan besar, kulit longgar dan halus dengan ketebalan yang sedang, punuk berukuran besar pada jantan dan berukuran kecil pada betina, gelambir berukuran besar dan tumbuh hingga bawah perut dan tali pusar.

2. Bangsa Sapi Potong Sub Tropis

Bangsa sapi potong subtropis (*Bos taurus*) adalah bangsa sapi potong yang berasal dari kawasan beriklim subtropis. Ciri-ciri umum bangsa sapi pedaging subtropis adalah tidak berpunuk (tidak berkelasa), ujung telinga berbentuk tumpul/bulat, kepala pendek dengan dahi yang lebar, kulit tebal (7-8 mm), timbunan lemak sapi dewasa cukup tebal, garis punggung lurus dan rata, tulang pinggang lebar dan menonjol keluar, rongga dada berkembang baik, bulu panjang dan kasar, kaki pendek sehingga bergerak lambat, cepat dewasa ditandai oleh pertumbuhan maksimal pada umur 4 tahun, tidak tahan pada suhu tinggi, relatif banyak minum, kotorannya basah, sapi dewasa tumbuh besar, dimana jantan dapat mencapai 900 kg.

Adapun beberapa bangsa sapi potong subtropis yang sudah dikenal sebagai bibit sapi potong di kalangan masyarakat peternakan Indonesia adalah:

a. Sapi Shorthorn

Sapi Shorthorn adalah sapi potong impor yang berasal dari Inggris, namun berkembang dengan baik di Amerika Serikat sejak tahun 1873. Bangsa sapi yang termasuk sapi terberat di antara bangsa sapi yang berasal dari Inggris ini dapat mencapai bobot badan dewasa rata-rata 1.000 kg pada jantan dan 750 – 770 kg pada betina. Sapi Shorthorn merupakan salah satu bangsa sapi potong subtropis yang digunakan peternak Indonesia sebagai bibit sapi potong.

Ciri-ciri fisik Sapi Shorthorn adalah tubuh besar dan kompak berbentuk segi empat atau bujur sangkar, badan rata pada sisinya, punggung berbentuk garis lurus sampai pangkal ekor, kepala pendek dan lebar, tanduk pendek menjurus ke samping dan berujung melengkung ke depan, bulu berwarna merah muda atau merah tua atau kombinasi merah putih atau kombinasi merah kelabu.

b. Sapi Hereford

Sapi Hereford dikenal sebagai *white face cattle* adalah sapi potong impor yang berasal dari Inggris, namun berkembang dengan baik di Amerika Serikat sejak tahun 1840. Dalam perkembangannya, sapi Hereford banyak dikembangkan di Amerika Latin, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Bangsa sapi yang sangat baik jika digemukkan dengan sistem pasture atau padang penggembalaan sapi ini memiliki keunggulan dan performa produksi dengan mutu daging sangat baik, daya adaptasi tinggi terhadap suhu tinggi dan suhu rendah, pakan sederhana, berat badan jantan dewasa rata-rata 850 kg dan 650 kg pada betina.

Ciri-ciri fisik sapi Hereford adalah tubuh rendah, tegap dan berurat daging padat, punggung lebar dan rata, bulu berwarna merah, dimana pada bagian muka, dada, sisi badan, perut bawah, bahu, ekor, dan keempat kaki dari batas lutut berwarna putih.

c. Sapi Charolais

Sapi Charolais adalah sapi potong impor yang berasal dari Perancis, namun berkembang dengan baik di Amerika Serikat. Bangsa sapi yang didatangkan ke Amerika Serikat terutama untuk disilangkan dengan sapi Brahman dan sapi lainnya ini memiliki bobot badan dewasa rata-rata 1.000 kg pada jantan dan 750 kg pada betina.

Ciri-ciri fisik sapi Charolais adalah Tubuh berpostur besar, padat dan kasar, bulu berwarna krem muda atau keputih-putihan, warna putih cream dengan pigmentasi kemerahan pada kulit, khususnya disekitar hidung, mata dan perut, Sapi charolais umumnya bertanduk, tetapi ada pula yang tidak bertanduk, Berat lahir maupun berat sapih tergolong berat, yaitu berat lahir dapat mencapai 45 kg dan berat sapih dapat mencapai 275 kg, tergolong sapi yang berukuran besar, dengan berat badan yang dicapai 1200 kg untuk yang jantan dan mencapai 750 kg untuk yang betina, rata-rata penambahan berat badan harian (ADG) dapat dicapai 1,5-1,6 kg.). Sifat-sifat yang disukai yaitu perdagangan yang sempurna khususnya bagian loin dan paha belakang, tulang-tulang kuat, memiliki kemampuan mengasuh anak, kecepatan pertumbuhan tinggi, persentase karkas tinggi serta mempunyai daya tahan yang baik terhadap panas dan dingin. Bangsa sapi Charolais di Indonesia dikembangkan di daerah kabupaten Banjarnegara dengan

hasil silangnya (keturunannya) dapat memiliki ADG sebesar 0,71 kg/hari. Sapi Charolais merupakan salah satu bangsa sapi pedaging subtropis yang digunakan peternak Indonesia sebagai bibit sapi pedaging.

d. Sapi Aberdeen Angus

Sapi ini termasuk kedalam sapi potong dengan bentuk tubuh yang panjang dan kompak, karkasnya menghasilkan daging yang sangat baik mutunya dan terkenal terdapat *marbling* atau penyebaran lemak dalam daging. Sapi Aberdeen Angus adalah sapi potong impor yang berasal dari Skotlandia, namun berkembang dengan baik di Amerika Serikat sejak tahun 1873.

Bangsa sapi potong ini didatangkan ke Indonesia sejak tahun 1973, memiliki keunggulan dan performa produksi dengan pertumbuhan cepat dan serasi, mampu tumbuh dengan pakan yang sederhana, cepat mencapai dewasa kelamin (masak dini), karkas bermutu tinggi dengan persentase yang tinggi jika dipotong pada umur 2,5 tahun, daging tebal dan empuk pada umur 18 bulan, bobot badan dewasa rata-rata 900 kg pada jantan dan 700 kg pada betina.

Ciri-ciri fisik yang menandakan sapi Aberdeen Angus adalah tubuh rata, lebar dalam dan pendek berbentuk panjang dan kompak seperti balok, bulu panjang, keriting dan halus berwarna hitam, kadang-kadang ditemui warna putih pada bagian bawah di belakang pusar dan tidak bertanduk.

e. Sapi Simmental

Bangsa sapi Simental ini berasal dari negara Switzerland dan merupakan salah satu bangsa sapi yang paling terkenal di Eropa dengan ciri-ciri adalah sapi Simmental ini berwarna merah dan bervariasi mulai dari merah gelap sampai

hampir kuning, totol-totol serta mukanya berwarna putih, bentuk badan dari sapi Simmental ini panjang, padat dan kompak, sapi ini terkenal karena memiliki kemampuan menyusui anaknya dengan baik serta pertumbuhan yang cepat dengan penimbunan lemak di bawah kulit rendah, tergolong sapi yang berukuran berat, baik pada saat kelahiran, penyapihan maupun saat mencapai dewasa. Berat badan dapat mencapai 800 kg untuk sapi yang betina sedang untuk sapi yang jantan dapat mencapai 1150 kg, Bangsa sapi Simmental ini di Indonesia dikembangkan di daerah Kabupaten Batang dan hasil silangnya (keturunannya) memiliki ADG yang dapat mencapai sebesar 1,0 kg/hari.

f. Sapi Limousin

Sapi Limousin dikembangkan di Prancis Tengah bagian selatan. sapi ini sebagai tenaga kerja dan sebagai sapi pedaging. Warna bulu merah coklat/coklat hitam, kecuali pada ambingnya. Pada jantan tanduknya mencuat keluar dan sedikit melengkung. Sapi ini termasuk sapi potong berkualitas baik, dimana bentuk tubuhnya panjang dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Sapi Limousin dengan perototan yang lebih baik dibandingkan sapi Simmental. Secara genetik sapi Limousin dari wilayah beriklim dingin, tipe besar, volume rumen yang besar, *voluntary intake* (kemampuan menambah konsumsi di luar kebutuhan yang sebenarnya) yang tinggi dan metabolik rate yang cepat, sehingga menuntut tatalaksana pemeliharaan lebih teratur. Sapi jenis Limousin ini merupakan salah satu yang merajai pasar-pasar sapi di Indonesia dan merupakan sapi primadona untuk penggemukan, karena perkembangan tubuhnya termasuk cepat, bisa sampai 1,1 kg/hari saat masa pertumbuhannya.

Allah berfirman dalam QS. Al-Mu'min ayat 79 yaitu:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

Terjemahnya:

“Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan”.

Dalam *“Tafsir Ibnu Katsir”*, menjelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan para hambanya, yakni dia ciptakan untuk mereka binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan domba. Diantara binatang ternak itu mereka kendarai dan diantaranya ada pula yang mereka makan. Unta itu dimakan, dikendarai, diperah susunya dan dibebankan barang-barang berat kepadanya disaat perjalanan melintas negeri-negeri yang jauh. Sapi dimakan, diminum susunya dan digunakan untuk mengelolah tanah. Sedangkan domba dimakan dan diminum susunya. Dari semuanya bisa dimanfaatkan bulu-bulu dan rambutnya guna dijadikan peralatan rumah tangga, baju juga barang-barang yang lain¹².

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan sesuatu ke bumi ini semua ada manfaatnya. Salah satunya adalah ternak sapi, dimana kita dapat memanfaatkan seekor sapi dalam kehidupan sehari-hari. Sapi dapat memberikan manfaat yang besar untuk manusia antara lain, sebagai alat untuk membajak sawah ataupun transportasi, kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan dan yang lebih pentingnya lagi dagingnya dapat digunakan dalam berbagai macam olahan.

¹² Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri. *Tafsir Ibnu Katsir*. (Penerbit. Pustaka Ibnu Katsir. 2010).

B. Pakan

Kebutuhan pakan untuk penggemukan sapi potong dapat dipenuhi dengan pakan hijauan (sebagai pakan utama) dan konsentrat (sebagai pakan penguat) dan UMB (sebagai pakan suplemen) yang bermanfaat untuk ternak dalam melengkapi zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh sehingga komposisi seimbang dan berproduksi secara optimal.

Q.S An Nahl ayat 10 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

"Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu". (Q.S An Nahl ayat 10)

Dalam "Tafsir Al-Mishbah" ayat diatas dijelaskan yaitu perincian argumentasi keesaan Allah SWT, sekaligus uraian tentang aneka nikmat-Nya. Ayat tersebut menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang. Ayat diatas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya, bahwa Dia yang maha kuasa itulah, yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan air hujan untuk kamu manfaatkan. Sebagiannya menjadi minuman segar dan sebagian lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang padanya, yakni ditempat tumbuhnya, kamu menggembalakan ternak kamu

sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging dan bulu¹³.

Maksud ayat tersebut menjelaskan bagaimana kita mengelola ternak dengan memanfaatkan segala sumber daya alam. Sistem integrasi tanaman- ternak ini merupakan salah satu cara pemeliharaan ternak baik itu secara tradisional maupun secara modern. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan masyarakat dan dukungan teknologi menjadi penghambat manajemen pengelolaan peternakan yang baik.

Pakan hijauan adalah semua bahan pakan yang berasal dari tanaman ataupun tumbuhan berupa daun-daunan, terkadang termasuk batang, ranting dan bunga¹⁴. Menurut¹⁵ pemberian pakan pada ternak sebaiknya diberikan dalam keadaan segar. Pemberian pakan yang baik diberikan dengan perbandingan hijauan dengan konsentrat 60 : 40. Apabila hijauan yang diberikan berkualitas rendah perbandingan hijauan dengan konsentrat dapat menjadi 55 : 45 dan hijauan yang diberikan berkualitas sedang sampai tinggi perbandingan itu dapat menjadi 64 : 36¹⁶.

Menurut¹⁷ menyebutkan, bahwa limbah pertanian memiliki potensi cukup besar sebagai sumber pakan ternak ruminansia. Jumlah produksi limbah pertanian di Indonesia sebanyak 51.546.297,3 ton dengan produksi terbesar adalah jerami

¹³ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2002).

¹⁴ Sugeng,. *Beternak Sapi Potong*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 1998).

¹⁵ Lubis,. *Ilmu Makanan Ternak*. (Jakarta: PT Pembangunan. 1992).

¹⁶ Siregar,. *Penggemukan Sapi*. (Jakarta: Penebar Swadaya. 2008).

¹⁷ Kuswandi. *Sumber bahan pakan lokal ternak ruminansia*. (Bogor: Pusat penelitian dan pengembangan peternakan.2011).

padi (85,81%), diikuti oleh jerami jagung (5,84%), jerami kacang tanah (2,84%), jerami kedelai (2,54%), pucuk ubi kayu (2,29%), dan jerami ubi jalar (0,68%).

1. UMB

Pemanfaatan UMB, pada ternak sapi agar terhindar dari defisiensi vitamin dan defisiensi mineral serta terhindar dari malnutrisi yaitu kekurusan yang disebabkan oleh rendahnya nilai gizi pakan ternak.

Penambahan UMB sebagai pakan suplemen dapat memperbaiki nilai gizi pakan dengan cara penambahan karbohidrat dan merangsang aktivitas mikrobiologi dalam rumen untuk memfermentasi pakan berserat kasar tinggi dengan lebih efisien, sehingga produksi dapat dipertahankan baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan dapat ditingkatkan sehingga usaha ternak dapat menguntungkan.

Sebagaimana halnya manusia, ternak juga membutuhkan ketersediaan vitamin dan mineral dalam jumlah yang memadai dan seimbang, untuk menjaga kesehatan dan menghasilkan tingkat produksi yang baik. Saat ini kualitas rumput (HMT) menjadi perhatian, dimana rumput sering kekurangan protein kasar (N) dan kondisi ini semakin buruk pada saat musim kemarau. Ketersediaan nitrogen yang tidak mencukupi di dalam pakan berarti bahwa mikro-organisme rumen tidak dapat membuat cukup mikroba protein bagi perkembangan dan pertumbuhan ternak.

Pada ruminansia, mikro-organisme dalam rumen mengubah makanan menjadi senyawa yang menyediakan kebutuhan gizi bagi ternak. Dalam rangka memenuhi fungsi ini, maka mikro-organisme dalam rumen memerlukan sejumlah

ammonia dan asam amino yang didapat dari nitrogen, terlepas dari yang bisa diperoleh dari rumput ammonia juga dapat diperoleh dari sumber-sumber non-protein seperti halnya urea.

Urea yang kita kenal sebagai pupuk dan tersedia dalam bentuk granular putih kristal padat, mengandung 46% nitrogen. Ketika diberikan sebagai bagian dari diet untuk ternak ruminansia, urea dikonversi menjadi amonia oleh mikroflora di dalam rumen. Mikro-organisme dalam rumen menggunakan amonia untuk membuat protein mikroba, yang kemudian dicerna oleh ternak. Karena itu urea memiliki nilai yang setara dengan protein untuk ternak ruminansia.

Beberapa peternak memberikan langsung urea kedalam pakan ternak mereka, hal ini kurang baik karena selain rasanya yang pahit dan tidak enak, juga dapat menyebabkan ternak keracunan nitrogen. Menggabungkan urea dengan molases atau biji-bijian atau keduanya membuat urea lebih cocok untuk ternak. Selain itu biji-bijian dan tetes juga akan memberikan energi yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan. Oleh karena itu cara yang aman dalam pemberian urea adalah dengan mempersiapkannya menjadi Urea Molases Blok (UMB). Persiapan ini adalah cara yang baik untuk menyediakan protein dan energi bagi ternak ruminansia, dan membantu meningkatkan pasokan protein hewan.

Manfaat pemberian Urea Molases Block (UMB) pada ternak sapi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan palatabilitas pakan (hijauan/rumput) yang berkualitas rendah dan meningkatkan nilai gizi pakan.

- b. Meningkatkan daya cerna pakan dan penyerapannya.
- c. Penelitian telah menunjukkan bahwa UMB yang diberikan kepada ternak betina dapat meningkatkan tingkat pembuahan sel telur ternak betina. Jika diberikan untuk ternak bunting akan melahirkan anak yang kuat dan sehat.
- d. UMB juga membantu penambahan bobot badan, meningkatkan kualitas daging, susu, dan energi ternak.
- e. UMB juga bertindak sebagai persediaan pada saat musim kering dan masa kritis lainnya misalnya pada saat terjadi kelangkaan pakan.
- f. Menghindarkan ternak dari defisiensi vitamin (avitaminosis) dan defisiensi mineral.

Bahan-Bahan dalam Pembuatan Urea Molasses Block (UMB)

1. Bahan sumber energi

Molasses (tetes tebu), adalah produk sampingan dari industri gula. Molases memiliki rasa dan aroma yang menyenangkan, yang membuat blok sangat menarik dan lezat bagi ternak. Merupakan limbah pati pengolahan tebu (menjadi gula) yang berbentuk cairan kental berwarna coklat kehitaman dan berbau manis atau harum yang khas;

Dedak halus (bekatul), disini berfungsi untuk menyediakan beberapa nutrisi penting seperti lemak, protein dan fosfor, selain itu juga bertindak sebagai penyerap kelembaban yang terkandung dalam molases dan memberikan struktur untuk blok. Merupakan limbah dari proses penggilingan padi. Gamblong atau ampas tapioka dan onggok merupakan limbah dari pabrik tapioka yang kering, padat dan keras, biasanya berbentuk gumpalan.

2. Bahan Sumber Nitrogen

Urea memberikan reaksi nitrogen, komponen yang paling penting dari blok. Urea yang mengandung nitrogen meningkatkan asupan hijauan kering atau hijauan berkualitas rendah serta meningkatkan daya cerna. Asupan nitrogen dalam bentuk urea diberikan secara terbatas untuk menghindari masalah *toxicitas* namun cukup untuk mempertahankan tingkat amonia dalam rumen secara konsisten di atas 200 mg N/l untuk pertumbuhan mikro-organisme di dalam rumen. Bungkil kedelai merupakan ampas biji kedelai setelah diambil minyaknya. Bungkil biji kapok merupakan limbah biji kapok yang sudah diambil minyaknya dijadikan bungkil. Ampas kecap merupakan limbah dari proses pembuatan kecap. Ampas tahu merupakan limbah dari proses pembuatan tahu

3. Bahan Sumber Mineral: kapur, benatolit, epung tulang, garam dan mineral komersial.

2. Konsentrat

Pakan penguat (konsentrat) adalah pakan yang mengandung serat kasar relatif rendah dan mudah dicerna. Bahan pakan penguat ini meliputi bahan pakan yang berasal dari biji-bijian seperti jagung giling, dedak, katul, bungkil kelapa, tetes, dan berbagai umbi. Fungsi pakan penguat adalah meningkatkan dan memperkaya nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai gizinya rendah¹⁸.

Konsentrat biasanya tersusun dari berbagai bahan pakan biji-bijian dan hasil ikutan dari pengolahan hasil pertanian maupun industri. Pemberian konsentrat dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan sapi. Namun,

¹⁸ Sugeng. *Beternak Sapi Potong*. (Jakarta: Penebar Swadaya.1998).

pemberian pakan penguat berupa konsentrat harus memperhitungkan nilai ekonomisnya. Pemberian konsentrat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerugian bila tidak diiringi peningkatan pertumbuhan atau produksi yang sesuai¹⁹. Jika ransum yang seluruhnya terdiri dari makanan penguat atau hijauan hanya sedikit, maka efisiensi penggunaan makanan diperbaiki tetapi harus diberi sumber energi yang tinggi, dan jika hijauan dalam ransum dihilangkan maka sangat berbahaya karena ransum tidak mengandung serat kasar yang tinggi, minimal 10% hijauan harus ada dalam ransum untuk menghindari gangguan pencernaan²⁰.

Kandungan gizi konsentrat dibagi dua golongan yaitu pertama konsentrat sebagai sumber protein, apabila kandungan protein lebih dari 18%, Total Digestible Nutrision (TDN) 60%. Konsentrat berasal dari hewan dan tumbuhan. Berasal dari hewan mengandung protein lebih dari 47%, mineral Ca lebih dari 1% dan P lebih dari 1,5% serta kandungan serat kasar dibawah 2,5%. Contohnya: tepung ikan, tepung susu, tepung daging, tepung darah, tepung bulu, dan tepung cacing. Berasal dari tumbuhan, kandungan proteinnya dibawah 47%, mineral Ca dibawah 1% dan P dibawah 1,5% serat kasar lebih dari 2,5%. Contohnya : tepung kedelai, tepung biji kapuk, tepung bunga matahari, bungkil wijen, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil kelapa sawit dan lain-lain.

Konsentrat sebagai sumber energi, apabila kandungan protein dibawah 18%, TDN 60% dan serat kasarnya lebih dari 10%. Contohnya : dedak, jagung, empok, polar dan lain-lain.

¹⁹ Parakkasi. *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminansia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1999).

²⁰ Wello. *Bahan Ajar Manajemen Ternak Potong dan Kerja*. (Makassar: Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin. 2012).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pakan penguat adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan harga satuan bahan pakan mudah diperoleh di suatu daerah, dengan harga bervariasi, sedang di beberapa daerah lain sulit didapat. Harga per unit bahan pakan sangat berbeda antara satu daerah dan daerah lain, sehingga keseragaman harga per unit nutrisi (bukan harga per unit berat) perlu dihitung terlebih dahulu.
- b. Standar kualitas pakan penguat dinyatakan dengan nilai nutrisi yang dikandungnya terutama kandungan energi dan protein. Sebagai pedoman, setiap kilogram pakan penguat harus mengandung minimal 2500 Kcal energi, 17% protein, dan serat kasar 12%.
- c. Metode dan teknik pembuatan untuk pakan penguat adalah metode simultan, metode segiempat bertingkat, metode aljabar, metode konstan kontrol, metode ekuasi atau metode grafik.

Berikut adalah bahan pakan yang ditambahkan dalam konsentrat antara lain:

1. Dedak Padi

Dedak padi adalah bahan pakan yang diperoleh dari pemisahan beras dengan kulit gabahnya melalui proses penggilingan padi dari pengayakan hasil ikutan dari penumbukan padi. Dedak merupakan hasil ikutan dalam proses pengolahan gabah menjadi beras yang mengandung bagian luar yang tidak tebal, tetapi tercampur dengan penutup beras. Hal ini mempengaruhi tinggi atau

rendahnya kandungan serat kasar dedak²¹. Dedak Kasar adalah kulit gabah halus yang bercampur dengan sedikit pecahan lembaga beras dan daya cernanya relatif rendah. Sebenarnya dedak kasar ini sudah tidak termasuk sebagai bahan makanan penguat (konsentrat) sebab kandungan serat kasarnya relatif terlalu tinggi (35.3%).

Dedak halus biasa ini banyak mengandung komponen kulit gabah, juga selaput perak dan pecahan lembaga beras. Kadar serat kasarnya masih cukup tinggi akan tetapi sudah termasuk dalam golongan konsentrat karena kadar serat kasar dibawah 18%. Martabat pati nya termasuk rendah dan hanya sebagian kecil saja yang dapat dicerna²².

Analisa Kandungan nutrisi dedak halus dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 1. Kandungan nutrisi dedak halus

Kandungan nutrisi	Nilai gizi (%)
Air	16,2
Protein	9,5
Bahan ekstrak tanpa N	43,8
Serat kasar	16,4
Lemak	3,3
Abu	10,8

²¹ Parakkasi. *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminansia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1999).

²²Yudith Taringan. *Pemamfaatan Pelepah sawit dan Hasil Ikutan Industri Kelapa Sawit Terhadap Pertumbuhan Sapi Peranakan Simental Fase Pertumbuhan*. (Sumatra Utara: Departemen Pendidikan Fakultas Sumatra Utara.2010).

2. Ampas Tahu

Ampas tahu adalah ampas yang diperoleh dari pembuatan tahu yang diberikan kepada ternak besar dan kecil. Biasanya pemberiannya dicampur dengan bekatul diberi air dan lebih baik lagi jika dicampur dengan ketela yang telah dicacah. Ampas tahu dalam keadaan segar mengandung lebih dari 80% air. Pemanfaatan ampas tahu sangat efektif diman terlihat pada sapi potong dengan penambahan berat badan akan lebih cepat. Selain pertumbuhan lebih cepat karkasnya bisa mencapai 60% dari berat sapi hidup²³.

3. Bungkil Kelapa

Bungkil kelapa adalah hasil ikutan yang didapat dari ekstraksi daging buah kelapa segar atau kering. Mutu standar bungkil kelapa meliputi kandungan nutrisi dan batas toleransi aflatoxin²⁴. Bungkil kelapa banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.

Protein kasar yang terkandung pada bungkil kelapa mencapai 23%, dan kandungan seratnya yang mudah dicerna merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk menjadikan sumber energi yang baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, seperti sebagai bahan pakan pedet terutama untuk menstimulasi

²³ Siregar. *Ransum Ternak Ruminansia*. (Jakarta: Penebar Swadaya. 1994).

²⁴ Chuzaemi. *Kecernaan dan retensi nitrogen pada ternak yang diberi ransum basal jerami padi dan menir dengan tambahan urea molasses blok*. (Bogor: Pros. Pertemuan Ilmiah Ruminansia. Jilid 2. Puslitbangnak. 1989).

rumen dan pakan asal bungkil kelapa juga terbukti ternak dapat menghasilkan susu yang lebih kental dan rasa yang enak²⁵. Penambahan bungkil kelapa dapat meningkatkan konsumsi pakan, pencernaan pakan dan pertambahan bobot badan harian. Ternak ruminansia yang mendapatkan pakan berkualitas rendah sebaiknya diberikan pakan tambahan yang kaya akan nitrogen untuk merangsang pertumbuhan dan aktivitas mikroba di dalam rumen²⁶. Bungkil kelapa diperoleh dari ampas kopra.

4. Garam

Garam yang dimaksud disini adalah garam dapur (NaCl), dimana selain berfungsi sebagai mineral juga berfungsi meningkatkan palatabilitas (Pardede dan Asmira, 1997). Na dan Cl untuk memenuhi kebutuhan produksi optimum. Hampir semua bahan makanan nabati (khususnya hijauan tropis) mengandung Na dan Cl relatif lebih kecil dibanding bahan makanan hewani²⁷.

5. Tetes tebu (Molasses)

Molasses dapat digunakan sebagai pakan ternak. Keuntungan penggunaan molasses untuk pakan ternak adalah kadar karbohidrat tinggi (48-60% sebagai gula), kadar mineral cukup dan disukai ternak. Tetes tebu juga mengandung vitamin B kompleks dan unsur-unsur mikro yang penting bagi ternak seperti

²⁵ Mariyono. *Analisis usaha penggemukan sapi potong*. (Jawa Timur. Un-publish.: Pusat Koperasi Sapi Potong, 2005).

²⁶ Mariyono. *Petunjuk Teknis : Teknologi Inovasi Pakan Murah untuk Usaha Pembibitan Sapi Potong*. (Pasuruan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2007).

²⁷ Parakkasi. *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminansia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1999).

kobalt, boron, yodium, tembaga, dan seng, sedangkan kelemahannya ialah kaliumnya yang tinggi dapat menyebabkan diare jika dikonsumsi terlalu banyak²⁸.

C. Efisiensi Penggunaan Pakan

Efisiensi pakan adalah nilai yang diperoleh dari perbandingan rata-rata pertambahan bobot badan per ekor per hari dengan rata-rata konsumsi bahan kering pakan per ekor per hari. Efisiensi pakan menggambarkan sejumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah bobot badan. Ternak yang memiliki pertumbuhan cepat, efisiensi pakannya akan lebih baik dari pada ternak yang pertumbuhannya lambat. Efisiensi pakan pada penggemukan sapi muda jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penggemukan sapi dewasa. Hal ini menyebabkan pertambahan bobot badan dan efisiensi pakan pada sapi muda sangat tinggi dibanding dengan sapi dewasa. Meningkatnya pakan penguat atau semakin baiknya kualitas pakan akan menyebabkan semakin baik pula efisiensi penggunaannya oleh ternak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan konsumsi bahan kering (BK) dan pertambahan berat badan harian (PBBH) maka dapat dihitung nilai efisiensi pakan dan *feed cost*. Efisiensi penggunaan pakan pada penelitian ini sebesar 0,02 yang artinya setiap 1 kg bahan kering ransum menghasilkan pertambahan bobot badan harian sebesar 0,02 kg. Hasil yang didapat menunjukkan nilai efisiensi yang tergolong rendah. Nilai efisiensi pakan yang rendah disebabkan karena rendahnya rerata PBBH dan rendahnya nilai nutrisi

²⁸ Thalib. *Penggunaan Rumen Modifier Komplit Pada Ternak Ruminansia yang Diberi Hijauan pakan Berserat Tinggi*. (Bogor: Kumpulan Hasil-Hasil Penelitian DIPA 2007. Balai Penelitian Ternak, Ciawi. 2007)

dari bahan pakan yang dikonsumsi sapi. Nilai efisiensi penggunaan pakan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa ransum yang dikonsumsi semakin sedikit untuk menghasilkan penambahan bobot badan. Efisiensi penggunaan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kemampuan ternak dalam mencerna bahan pakan, kecukupan zat pakan untuk hidup pokok, pertumbuhan dan fungsi tubuh serta jenis pakan yang digunakan²⁹.

Nilai efisiensi pakan pada penelitian Sagala (2011), yang terendah adalah -0,02 dan yang tertinggi adalah 0,06. Nilai efisiensi negatif disebabkan oleh nilai PBBH yang negatif juga. Menurut³⁰ efisiensi penggunaan pakan untuk sapi potong berkisar 7,52%-11,29%. Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi pakan antara lain umur, kualitas pakan dan bobot badan. Semakin baik kualitas pakan semakin baik pula efisiensi pembentukan energi dan produksi³¹. Nilai efisiensi pakan yang didapat dalam penelitian ini semua di bawah kisaran normal. Hal ini disebabkan karena pakan yang diberikan oleh peternak pada saat penelitian mempunyai kualitas rendah.

D. Produktivitas Sapi Potong

1. Pertambahan Bobot Badan (PBB)

²⁹ Sagala, W. 2011. *Analisis Biaya Pakan dan Performa Sapi Potong Lokal Pada Ransum Hijauan Tinggi yang Disuplementasi Ekstrak Lerak (Sapindus rarak)*. Skripsi S1. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

³⁰ Siregar, S. B. 2001. *Penggemukan Sapi*. Penebar Swadaya, Jakarta.

³¹ Pond, W.G., D.C. Church, K.R. Pond and P.A. Schoknecht. 2005. *Basic Animal Nutrition and Feeding*. Fifth Ed. John Wiley and Sons, Inc. United States. 91- 109.

Pertumbuhan adalah merupakan aktivitas fisiologis yang dapat dinyatakan dengan PBB rata-rata persatuan waktu. Laju PBB rata-rata harian atau *Average Daily Gain* (ADG) dari individu atau sekelompok ternak dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$ADG = \frac{W2 - W1}{t1 - t2}$$

Dimana W2 dan W1 masing-masing adalah BB akhir dan awal penimbangan, sedangkan t1 dan t2 adalah periode lama waktu antara penimbangan awal sampai akhir³². Kecepatan PBB ini diantaranya dipengaruhi oleh jumlah konsumsi pakan yakni makanan yang dihabiskan³³.

PBB merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan karena dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi dari pakan yang diberikan. PBB terjadi cepat sekali pada fase-fase sebelum dewasa tubuh, setelah itu kecepatan pertumbuhan berkurang terus hingga pada akhirnya akan tetap setelah ternak mencapai dewasa. Pertumbuhan yang cepat pada ternak muda dapat dipacu dengan pemberian pakan yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang cukup, tetapi untuk ternak dewasa peningkatan BB yang terjadi sebagai akibat penimbunan lemak³⁴.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan setelah disapih adalah pakan, jenis kelamin, umur dan BB saat penyapihan serta lingkungan tempat ternak berada.

³² Cole, H.H.. *Introduction to Livestock Production 2nd Edition*. (San Francisco: W.H. Freeman and Company. 1998).

³³ Tillman, Hartadi. H, Rekso Hadiprojo. S., Prawirokusumo, Lebdoesokodjo. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. (Fakultas Peternakan UGM : Gadjah Mada University Press. 1998)..

³⁴ Davies HL. 1983. *Principle on Growth of Animal*. In H. L. Davies, *Nutrition on Growth Manual*. (AUIDP : Canberra. 1983).

1. Konsumsi Pakan

Konsumsi adalah jumlah pakan yang dimakan oleh ternak yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan produksi. Konsumsi meliputi proses mencari pakan, mengenal dan mendekati pakan, proses bekerjanya indera ternak terhadap pakan, proses memilih pakan dan proses menghentikan makan³⁵.

Tingkat konsumsi (*Voluntary Feed Intake*) adalah jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Konsumsi pakan merupakan faktor esensial untuk mengetahui kebutuhan pokok dan produksi. Tingkat konsumsi dapat menggambarkan palatabilitas³⁶.

Tingkat konsumsi ransum banyak ditentukan oleh palatabilitas (bau, warna dan tekstur), sistem tempat dan pemberian pakan serta kepadatan kandang³⁷. Jumlah kebutuhan pakan setiap ternak berbeda tergantung pada jenis ternak, umur, fase (pertumbuhan, dewasa, bunting, menyusui), kondisi tubuh (normal, sakit) dan lingkungan tempat hidupnya (suhu, kelembapan udara) serta bobot badannya³⁸.

Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor penentu yang paling penting dalam menentukan jumlah zat-zat makanan yang didapat oleh ternak. Tinggi

³⁵ Rosida Analisis Potensi Sumber Daya Peternakan Kabupaten Tasikmalaya Sebagai Wilayah Pengembangan Sapi Potong. Skripsi. (Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. 2006).

³⁶ Parakkasi, A.. *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminansia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2001)

³⁷ Ayuni, N.. *Tata Laksana Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak Sapi Potong Berdasarkan Sumber Daya lahan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat*. Skripsi. (Bogor: Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. 2005).

³⁸ Winugroho M. *Strategi Pemberian Pakan Tambahan Untuk Memperbaiki Efisiensi Reproduksi Induk Sapi*.(Jurnal Litbang Pertanian. Vol. 21. No 1. 2002).

rendah konsumsi pakan pada ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan) dan faktor internal (kondisi ternak itu sendiri)³⁹.

E. Biaya Pakan

Secara ekonomis, bahan pakan basal sebaiknya tersedia secara lokal (diproduksi sendiri) dan oleh karena itu, harganya akan relatif murah dibandingkan kalau bahan pakan tersebut harus didatangkan dari luar daerah. Secara ekonomis, suatu bahan pakan yang harus diangkut hendaknya mempunyai nilai nutrisi yang tinggi (misalnya kadar zat-zat pakan/suatu bobot tertentu tinggi, apalagi kalau zat-zat pakan andalan tersebut kecernaannya tinggi) sehingga ongkos pengangkutan tersebut relatif menjadi tidak mahal. Pengeluaran untuk bahan pakan dalam suatu usaha peternakan adalah terbesar, oleh karena itu efisiensi penggunaan bahan pakan yang terdapat dalam bahan pakan tersebut perlu diperhatikan. Hal ini lebih terasa lagi oleh pengusaha apabila sedang menyusun strategi pemberian pakan secara normal dapat saja didatangkan dari luar bila diperlukan (dengan asumsi ongkos pengangkutan seperti diutarakan tadi) dan harganya relatif mahal mungkin dapat pula dipertanggungjawabkan secara ekonomis melalui penggunaannya yang relatif sedikit dibandingkan dengan bahan pakan basal dan bahan pakan semacam ini bersifat katalitik.

Biaya adalah nilai dari semua korbanan ekonomi yang diperlukan, yang tidak dihindarkan, dapat diperkirakan dan dapat diukur untuk menghasilkan suatu produk. Biaya bagi perusahaan adalah nilai faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk. Biaya produksi adalah kompensasi yang diterima oleh

³⁹ Lubis, D.A.. *Ilmu Makanan Ternak*. (Jakarta: Pambangun. Pasca sarjana, Institut Pertanian Bogor. 1996)

pemilik faktor-faktor produksi atau biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik secara tunai maupun tidak tunai. Ada dua macam biaya dalam usaha tani yaitu biaya tunai dan biaya tidak tunai. Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya tenaga kerja, biaya-biaya untuk membeli faktor produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan biaya panen sedangkan dalam usaha peternakan biaya ini meliputi biaya penggembalaan, biaya pembersihan kandang dan jenis upah kegiatan lainnya⁴⁰.

Biaya produksi juga digolongkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tidak tergantung pada jumlah produksi yang antara lain kandang, lahan dan peralatan. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin besar kuantitas produk yang dihasilkan maka semakin besar biaya variabel yang dibutuhkan. Biaya variabel ini meliputi biaya pakan, obat-obatan dan vaksinasi, upah tenaga kerja dan biaya lainnya. Biaya produksi terbesar yang dikeluarkan dalam usaha peternakan adalah biaya variabel, terutama biaya pakan dan upah tenaga kerja.

Biaya pakan dapat mencapai 60-80% dari biaya total. Faktor yang memengaruhi biaya pakan adalah bobot badan sapi, harga bahan pakan penyusun pakan tersebut, musim dan kontinuitas. Nilai harga pakan dalam penggemukan sangat dipengaruhi oleh lama penggemukan, fluktuasi harga pakan

⁴⁰ Mariyono. *Analisis usaha penggemukan sapi potong*. (Pusat Koperasi Sapi Potong, Jawa Timur. Un-publish. 2005).

dan bobot hidup ternak. Harga pakan dipengaruhi oleh musim karena menyangkut ketersediaan pakan sementara harga sapi bobot hidup relatif stabil⁴¹.

F. *Feed Cost Per Gain*

Feed cost per gain adalah besarnya biaya pakan yang diperlukan ternak untuk menghasilkan 1 kg pertambahan bobot badan atau gain (Suparman, 2004). *Feed cost per gain* dinilai baik apabila angka yang diperoleh serendah mungkin, yang berarti dari segi ekonomi penggunaan pakan efisien. Untuk mendapatkan *feed cost per gain* rendah, maka pemilihan bahan pakan untuk menyusun ransum harus semurah mungkin dan tersedia secara kontinyu atau dapat juga menggunakan limbah pertanian yang tidak kompetitif (Basuki, 2002 yang disitasi Fianti, 2004). Nurdin (2000) yang disitasi oleh Sugiharto (2004), menambahkan nilai *feed cost per gain* erat kaitannya dengan menurunnya nilai konversi dan harga pakan. Semakin rendah konversi pakan, maka semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan untuk pertambahan berat badan dalam satuan yang sama.

G. *Limbah Pertanian Sebagai Pakan Ternak Ruminansia*

Limbah adalah sisa atau hasil ikutan dari produk utama limbah. Limbah pertanian adalah bagian tanaman pertanian diatas tanah atau bagian pucuk, batang yang tersisa setelah dipanen atau diambil hasil utamanya dan merupakan pakan alternatif yang digunakan sebagai pakan, khususnya ruminansia. Beberapa limbah pertanian yang potensial dan belum banyak dimanfaatkan secara optimal berturut-

⁴¹ Sagala, W. *Analisis Biaya Pakan dan Performa Sapi Potong Lokal Pada Ransum Hijauan Tinggi yang Disuplementasi Ekstrak Lerak (Sapindus rarak)*. (Bogor: Skripsi S1. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. 2011).

turut antara lain jerami padi, jerami jagung, pucuk tebu, jerami kedele, jerami ketela rambat dan jerami kacang tanah⁴².

Bahan baku pakan asal pertanian secara umum dapat dikelompokkan menjadi: Limbah pertanian dan limbah agroindustri. Bahan baku pakan yang termasuk limbah pertanian dan agroindustri disajikan pada Table 1.

No	Limbah Pertanian	Limbah Agroindustri
1.	Jerami padi	Dedak padi
2.	Jerami jagung	Ampas tahu
3.	Tumpi jagung	Ampas pabrik roti
4.	Jerami kedelai	Bungkil kelapa
5.	Jerami kacang tanah	Kedelai afkir
6.	Jerami kacang hijau	
7.	Jerami komak	
8.	Kulit kacang tanah	

Sumber : Agustini (2010)

Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak ruminansia pada peternak masih rendah karena rendahnya tingkat pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan disebabkan peternak membakar limbah (jerami padi/jagung/ ubi jalar) setelah panen dimana limbah ini berfungsi sebagai pupuk organik di samping itu adanya anggapan dari peternak bahwa hijauan pakan tersedia dalam jumlah yang mencukupi dilahan pekarangan, sawah dan kebun untuk kebutuhan

⁴² Sitorus, T.F., 2002, *Peningkatan Nilai Nutrisi Jerami Padi dengan Fermentasi Ragi Isi Rumen*, (Semarang: Program Pasca Sarjana Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. 2002)

ternak. Hanya 37.88% peternak di Sulawesi Selatan yang menggunakan limbah pertanian sebagai pakan⁴³.

Beberapa faktor yang menyebabkan peternak tidak menggunakan limbah tanaman pangan sebagai pakan: a) umumnya petani membakar limbah tanaman pangan terutama jerami padi karena secepatnya akan dilakukan pengolahan tanah, b) limbah tanaman pangan bersifat kamba sehingga menyulitkan peternak untuk mengangkut dalam jumlah banyak untuk diberikan kepada ternak, dan umumnya lahan pertanian jauh dari pemukiman peternak sehingga membutuhkan biaya dalam pengangkutan, c) tidak tersedianya tempat penyimpanan limbah tanaman pangan, dan peternak tidak bersedia menyimpan/menumpuk limbah di sekitar rumah/kolong rumah karena takut akan bahaya kebakaran, d) peternak menganggap bahwa ketersediaan hijauan di lahan pekarangan, kebun, sawah masih mencukupi sebagai pakan ternak.

Di sentra-sentra penghasil padi, banyak jerami yang dibuang atau dibakar begitu saja setelah bulir-bulir padi dipanen. Padahal jerami tersebut setelah dikeringkan dan disimpan dengan baik digudang dapat dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak ruminansia andalan. Dengan memiliki persediaan jerami padi kering, peternak tak perlu lagi ngarit (mencari rumput) atau membeli hijauan segar untuk pakan sapi.

⁴³ Syamsu. *Analisis Potensi Limbah Tanaman Pangan Sebagai Sumber Pakan Ternak Ruminansia Di Sulawesi Selatan*. (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 2006).

Selama ini hampir 50% jerami padi dibakar, abunya dikembalikan ke tanah sebagai kompos dan hanya 35% yang digunakan sebagai pakan ternak. Sistem integrasi ternak dengan tanaman pangan tidak hanya meningkatkan nilai tambah limbah pertanian yang dihasilkan, tetapi juga meningkatkan jumlah dan kualitas pupuk organik yang berasal dari ternak sehingga mampu memperbaiki kesuburan lahan.

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi ternak. Pakan sangat penting bagi kesuksesan usaha peternakan, karena biaya pakan menduduki urutan pertama, biasa produksi dapat mencapai 60-80 persen. Upaya untuk meminimalkan biaya pakan dapat digunakan alternatif bahan pakan lokal yang bersifat nonkonvensional dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, harga murah, tetapi mempunyai kandungan nutrisi yang cukup untuk ternak.

Salah satu sektor yang belum banyak dimanfaatkan adalah limbah pertanian. Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan yang tidak dipergunakan kembali dari hasil aktifitas manusia, ataupun proses-proses alam yang belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan mempunyai nilai ekonomi yang rendah. Dikatakan mempunyai nilai ekonomi yang rendah karena limbah dapat mencemari lingkungan dan penanganannya memerlukan biaya yang cukup besar. Pemanfaatan limbah merupakan salah satu alternatif untuk menaikkan nilai ekonomi limbah tersebut⁴⁴.

⁴⁴Anonim. 2012. *Kualitas fisik dan kualitas nutrisi* <http://tehes89.blogspot.com/2012/12/kualitas-fisik-dan-kualitas-nutrisi.html>. Diakses tanggal 12 November. 2014)

Limbah hasil pertanian dan perkebunan cukup tersedia di Indonesia, namun potensinya belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak. Limbah pertanian dan perkebunan dapat diartikan sebagai bahan yang dibuang dari sektor pertanian dan perkebunan. Limbah pertanian dapat berupa jerami padi, jagung, kacang-kacangan, kedelai, ampas teh, kulit kopi dan lain-lain. Pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan sebagai pakan ternak baru mencapai 30-40% dari potensi yang tersedia saat ini, karena petani sering membakar dan membuang setelah panen. Permasalahan yang dihadapi dalam menggunakan pakan limbah pertanian dan perkebunan terdiri dari faktor pengetahuan peternak, kualitas pakan limbah pertanian dan perkebunan dan faktor lingkungan (cemaran). Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan dukungan teknologi dan sosialisasi tentang pemanfaatan limbah hasil pertanian sebagai pakan ternak secara berkesinambungan. Mutu pakan limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan, diantaranya melalui pengolahan (pretreatment) limbah hasil pertanian, suplementasi pakan dan pemilihan limbah pertanian/perkebunan. Pengolahan limbah hasil pertanian dilakukan dengan metoda fisik, kimia, biologis maupun kombinasinya⁴⁵.

Secara umum limbah hasil pertanian dan perkebunan cukup tersedia di berbagai daerah Indonesia, namun potensi limbah tersebut untuk digunakan

⁴⁵Anonim. 2012. *Pemanfaatan limbah pertanian*. <http://peteranakan-deean.bosekundip.blogspot.com/2012/11/pemanfaatan-limbah-pertanian-dan.html>. Diakses tgl 12

sebagai pakan ternak belum dikembangkan secara optimal. Pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan sebagai pakan ternak baru mencapai 39% dari potensi yang tersedia saat ini, sehingga sebagian besar dari limbah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, dan bahkan dibuang, dibakar atau digunakan untuk keperluan non-peternakan. Potensi ketersediaan beberapa limbah pertanian dan perkebunan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Ternak ruminansia (pemamah biak) meliputi sapi, kerbau, kambing, dan domba mempunyai peranan yang sangat strategis bagi kehidupan ekonomi petani di pedesaan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi ternak perlu diperhatikan melalui pemberian bahan pakan sesuai kebutuhan hidupnya. Bahan pakan adalah sesuatu yang bisa dimakan, dicerna seluruh/sebagian tubuh dan tidak mengganggu kesehatan ternak yang memakannya. Limbah adalah sisa atau hasil ikutan dari produk utama. Limbah pertanian adalah bagian tanaman pertanian di atas tanah atau bagian pucuk, batang yang tersisa setelah dipanen atau diambil hasil utamanya dan merupakan pakan alternatif yang dapat digunakan sebagai pakan, khususnya ruminansia. Beberapa limbah pertanian yang potensial dan belum banyak dimanfaatkan secara optimal berturut-turut antara lain jerami padi, jerami jagung, pucuk tebu, jerami kedele, jerami kacang tanah dan lain-lain⁴⁶.

Penggunaan limbah pertanian seperti jerami padi sebagai pakan pengganti rumput pada sapi merupakan suatu solusi dalam masalah pengembangan ternak ruminansia yang selalu terkendala oleh ketersediaan hijauan. Jerami padi yang

⁴⁶ Sitorus, T.F., 2002, *Peningkatan Nilai Nutrisi Jerami Padi dengan Fermentasi Ragi Isi Rumen*, (Semarang: Program Pasca Sarjana Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. 2002)

jumlahnya cukup banyak di Indonesia (44.2 juta ton/tahun) sampai saat ini pemanfaatannya sebagai pakan masih belum memuaskan⁴⁷.

Beberapa faktor pembatas sehubungan dengan penggunaan limbah pertanian sebagai pakan meliputi penyimpanan, konsumsi pakan yang jelek, kandungan nutrisi yang rendah dan selanjutnya penampilan ternak yang rendah.

Menurut⁴⁸ menyatakan, beberapa faktor yang menyebabkan peternak tidak menggunakan limbah tanaman pangan sebagai pakan adalah :

- a. Umumnya petani membakar limbah tanaman pangan terutama jerami padi karena secepatnya akan dilakukan pengolahan tanah.
- b. Limbah tanaman pangan bersifat amba sehingga menyulitkan peternak untuk mengangkut dalam jumlah banyak untuk diberikan kepada ternak, dan umumnya lahan pertanian jauh dari pemukiman peternak sehingga membutuhkan biaya dalam pengangkutan.
- c. Tidak tersedianya tempat penyimpanan limbah tanaman pangan, dan peternak tidak bersedia menyimpan/menumpuk limbah di sekitar rumah/kolong rumah karena takut akan bahaya kebakaran.
- d. Peternak menganggap bahwa ketersediaan hijauan di lahan pekarangan, kebun, sawah masih mencukupi sebagai pakan ternak.

Hijauan kering seperti jerami dan hay, jerami hasil ikutan pertanian seperti padi, jagung, kedelai dan lain-lain berupa batang, daun dan ranting. Jerami merupakan salah satu bahan pakan ternak yang mutunya rendah karena

⁴⁷Syamsu. *Analisis Potensi Limbah Tanaman Pangan Sebagai Sumber Pakan Ternak Ruminansia Di Sulawesi Selatan*. (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 2006).

⁴⁸ Febriana, Liana. 2008, Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Pakan Ruminansia pada Peternak Rakyat Di Kecamatan Rengat Barat

mengandung selulosa (silika dan lignin) yang sulit ditembus oleh getah pencernaan sehingga menyebabkan pencernaan rendah⁴⁹.

Jerami padi adalah tanaman padi yang telah diambil buahnya (gabahnya), sehingga tinggal batang dan daunnya yang merupakan limbah pertanian serta belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya faktor teknis dan ekonomis. Jerami padi selama ini hanya dikenal sebagai hasil ikutan dalam proses produksi padi di sawah. Produksi jerami padi yang dihasilkan sekitar 50% dari produksi gabah kering panen⁵⁰. Jika jerami padi langsung diberikan kepada ternak tanpa melalui proses pengolahan, maka jerami padi ini akan tergolong sebagai makanan ternak yang berkualitas rendah. Jerami padi memiliki kandungan zat gizi yang minim, kandungan protein yang sedikit, dan daya cernanya rendah⁵¹.

Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang cukup besar jumlahnya dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Produksi jerami padi dalam satu hektar sawah setiap kali panen mampu menghasilkan sekitar 10-12 ton jerami (berat segar saat panen), meskipun bervariasi tergantung pada lokasi, jenis varietas tanaman padi, cara potong (tinggi pemotongan) dan waktu pemotongan, seperti pada varietas Sintanur dengan tinggi pemotongan 8 cm dari tanah dapat menghasilkan 8-10 ton jerami segar per ha. Jerami padi yang dihasilkan ini dapat digunakan sebagai pakan sapi dewasa sebanyak 2-3 ekor sepanjang tahun

⁴⁹ Yunilas. *Bioteknologi Jerami Padi Melalui Fermentasi Sebagai Bahan Pakan Ternak Ruminansia*, (Medan: Departemen Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Sumatera Utara. 2009).

⁵⁰ Hanafi. *Teknologi Pengawetan Pakan Ternak* (Medan: Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara. 2008).

⁵¹ Shiddieqy. 2005. *Pakan Ternak Jerami Olahan*, (http://www.Pikiranrakyat/Pengolahan_jerami_padi, Diakses tgl 17 November 2014..

sehingga pada lahan yang mampu panen 2 kali setahun akan dapat menunjang kebutuhan pakan tersebut untuk 4-6 ekor⁵².

Bagian-bagian jerami padi dapat dibedakan menjadi helai daun, pelepah daun dan batang yang dapat dipilah atas ruas dan buku yang proporsinya sangat kecil. Proporsi helai daun, pelepah daun dan ruas adalah 15-27%, 23-30% dan 15-37%. Kandungan komponen dinding sel bisa beragam sesuai proporsi bagian tanaman.

Pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak di Indonesia baru mencapai 31 - 39 %, sedangkan yang dibakar atau dikembalikan ke tanah sebagai pupuk 36-62 %, dan sekitar 7 - 16 % digunakan untuk keperluan industri.

Faktor penghambat utama dalam penggunaan jerami sebagai makanan ternak adalah rendahnya koefisien cerna dan nilai gizinya. Kandungan protein yang rendah dengan daya cerna yang hanya 40% menyebabkan rendahnya konsumsi bahan kering (kurang dari 2% berat badan ternak). Hal ini jelas, tanpa penambahan konsentrat tidak mungkin dapat meningkatkan produksi ternak, bahkan mungkin dapat menurunkan produksi. Kendala lain yang mempengaruhi kualitas jerami adalah tingginya kandungan lignin dan silika sehingga menyebabkan daya cerna jadi rendah⁵³.

Selain kandungan nutrisinya yang rendah, jerami padi juga termasuk pakan hijau yang sulit dicerna karena kandungan serat kasarnya tinggi sekali.

⁵² Awaluddin. *Sistem Integrasi Padi-Ternak*. (Makassar: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan. 2010).

⁵³ Abdullah. *Pembuatan Jerami Padi Amoniasi Sebagai Sumber Pakan Ternak Potensial* (Makassar: Program penerapan IPTEKS. 2008).

Daya cerna yang rendah itu terutama disebabkan oleh struktur jaringan jerami yang sudah tua. Jaringan-jaringan pada jerami telah mengalami proses lignifikasi (pengerasan) sehingga terbentuk ligriselulosa dan lignohemiselulosa (Muis A, Dkk, 2008).

Selain oleh adanya proses lignifikasi, rendahnya daya cerna ternak terhadap jerami disebabkan oleh tingginya kandungan silikat. Lignifikasi dan silifikasi tersebut bersama-sama mempengaruhi rendahnya daya cerna jerami padi. Rendahnya protein kasar dan mineral pada jerami padi juga membawa efek langsung, yaitu jerami padi sulit dicerna kalau hanya diberikan secara tunggal untuk pakan ternak. Rendahnya kandungan nutrisi jerami padi tersebut dan sulitnya daya cerna jerami maka pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia perlu diefektifkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penambahan suplemen atau bahan tambahan lain agar kelengkapan nilai nutrisinya dapat memenuhi kebutuhan hidup ternak secara lengkap sekaligus meningkatkan daya cerna pakan⁵⁴.

Tabel 2. Kandungan nutrisi pakan asal limbah pertanian

No	Bahan Pakan	BK (%)	PK (%)	LK (%)	SK (%)	TDN (%)
1	Jerami padi	31,87	5,21	1,17	26,78	51,49
2	Kulit kedelai	90,37	18,96	1,25	22,83	62,72
3	Klobot jagung	42,56	3,40	2,55	23,32	66,41

⁵⁴ Muis, Khariani, Sukarjo, Rahardjo. *Petunjuk Teknis Teknologi Pendukung Pengembangan Agribisnis di Desa P4MI*, (Sulawesi Tengah: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah. 2008).

4	Tongkol jagung	76,61	5,62	1,57	25,54	53,07
5	Jerami kacang tanah	29,08	11,31	3,32	16,62	64,51
6	Jerami kedelai	30,39	14,10	3,54	20,97	61,59
7	Jerami kacang hijau	21,93	15,32	3,59	26,90	55,52
8	Jerami kacang panjang	28,39	6,94	3,33	33,49	55,28
9	Jerami komak	16,20	24,71	3,85	21,03	68,29
10	Jerami kc.tunggak/antap	15,52	16,06	3,93	38,08	48,31
11	Jerami jagung segar	21,69	9,66	2,21	26,30	60,24

Sumber : (Hardiyanto, R 2004) dalam Agustini (2010)

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa limbah pertanian memiliki kandungan serat kasar yang tinggi namun terdapat melimpah dialam sehingga perlu adanya pemanfaatan yang lebih lanjut dengan sentuhan teknologi menurut (Saswono & Arianto, 2006) bahwa hampir semua limbah pertanian tanaman pangan dapat dimanfaatkan untuk bahan pakan sapi. Walaupun hampir semua limbah pertanian itu mengandung serat kasar tinggi, tetapi dengan sentuhan teknologi sederhana limbah itu dapat diubah menjadi pakan bergizi dan sumber energi bagi ternak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Juni 2014. Lokasi penelitian bertempat di Samata Integrated Farming System Jln. Veteran Bakung, Kelurahan Samata, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa.

B. Materi Penelitian

1. Ternak

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sapi potong jantan sebanyak 8 ekor yang berumur 2 tahun. Sebelum penelitian dilaksanakan, dilakukan pembiasaan selama satu minggu dan semua ternak diberikan obat cacing dan dikandangkan.

2. Pakan

Pakan yang diberikan dalam penelitian ini adalah pakan yang berupa rumput gajah, jerami, konsentrat, dan UMB. Konsentrat dan UMB dibuat dari bahan pakan lokal dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel.1. Komposisi pakan UMB

No	Bahan	Harga pakan/kg	Komposisi%	Harga dalam Ransum
1	Dedak	1000	22	22000
2	Tepung udang	4500	8	36000
3	Tepung kakao	1900	8	15200
4	Tepung kulit kacang	1000	9	9000
5	molases	1000	31	31000
6	mineral	5000	2	10000
7	garam	1000	7	7000
8	Urea	1200	8	9600
9	semen	1200	5	6000
Jumlah			100	145800

Tabel 2. Komposisi Pakan Konsentrat

No	Bahan	Harga Pakan/kg	Komposisi %	Harga dalam ransum
1	Dedak	1000	28	28000
2	T.jagung	3500	16	56000
3	t.udang	4500	15	67500
4	t.kakao	1900	15	28500
5	k.kacang	1000	5	5000
6	molases	1000	7	7000
7	mineral	5000	2	10000
8	garam	1000	7	7000
9	urea	1200	5	6000
Jumlah			100	215000

Tabel 3. Hasil analisis pakan UMB dan pakan Konsentrat

N O	Pakan	Komposisi (%)					
		Air	Protein Kasar	Lemak Kasar	SeratKasar	BETN	Abu
1	Konsentrat	14,7	29,01	2,77	23,10	26,06	19,06
2	UMB	17,62	33,64	0,68	17,10	22,04	26,54
3	Jerami	8,21	7,17	4,55	33,43	33,20	26,54

Sumber: *Laboratorium Kimia Makanan Ternak Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar. 2014*

3. Peralatan Tambahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, skop, ember, parang dan mesin pencacah rumput.

C. Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini ternak dibagi menjadi 2 kelompok pakan. Kelompok 1 yaitu dengan pakan UMB dan kelompok 2 dengan pakan konsentrat. Pada kelompok 1 dengan pakan UMB diberikan hijauan secara ad libitum dan UMB diberikan sebanyak 1 kg/ekor/hari. Sedangkan untuk kelompok 2 dengan pakan konsentrat diberikan konsentrat sebanyak 30 % dan 70 % hijauan. Pada penelitian ini setiap kelompok pakan masing-masing 4 ekor sapi.

Ternak sapi potong ditimbang terlebih dahulu sebelum penelitian dimulai, untuk mengetahui berat awal. Dalam penelitian ini setiap hari, pakan yang diberikan ditimbang begitu juga dengan pakan yang tersisa. Penimbangan berat badan sapi dilakukan 1 kali dalam 10 hari, sebelum pemberian pakan.

Peubah yang diukur dalam penelitian ini adalah berapa rupiah yang digunakan untuk menaikkan 1 kg berat badan sapi potong, yaitu berapa banyak

pakan yang dikonsumsi ternak dan berapa pertambahan berat badan ternak tersebut.

$$\text{Feed cost per gain} = \frac{\text{Total Biaya Pakan per Periode}}{\text{PBB (kg)}}$$

D. Analisis Data

Uji-t adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari dua buah *mean* sampel (dua buah variabel yang dikomparasikan) (Hartono, 2008).

Data hasil penelitian ditabulasikan dalam program excel kemudian dianalisis dengan uji T independen untuk membedakan dua perlakuan. Data yang dianalisa terdiri dari 2 perlakuan dengan 4 ulangan di setiap perlakuannya untuk mengetahui pengaruh dari perbedaan perlakuan

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Keterangan:

t = Parameter yang diukur

x_1 = Rata-rata perlakuan kelompok pakan kosentrat

x_2 = Rata-rata perlakuan kelompok pakan UMB

s^2 = Simpangan baku rata-rata

s_1 = Simpangan baku kelompok pakan kosentrat

s_2 = Simpangan baku kelompok pakan UMB

n_1 = Banyaknya jumlah kelompok pakan kosentrat

n_2 = Banyaknya jumlah kelompok pakan UMB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

Feed Cost per Gain (FC/ G)

Rata-rata *feed cost per gain* sapi potong selama penelitian, yang diberikan pakan berbeda, yaitu perlakuan satu dengan pakan UMB dan perlakuan dua dengan pakan konsentrat dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan laju *feed cost per gain* selama 12 periode dapat dilihat pada Grafik 1.

Tabel 1. Rata-rata *feed cost per gain* sapi potong (Rp/kg)

No Sapi	Rata-rata <i>Feed Cost Per Gain</i> (Rp/Kg)	
	UMB	Konsentrat
1	37.043	22.340
2	19.892	24.340
3	18.864	32.433
4	21.550	29.985
Rata-Rata	24.337	27.274



Gambar 1. Grafik rata-rata feed cost per gain (Rp/kg) sapi potong yang diberi pakan UMB dan Pakan konsentrat.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa ternak sapi potong dengan pemberian pakan UMB mempunyai rata-rata *feed cost per gain* Rp. 24.337, sedangkan dengan pemberian pakan konsentrat rata-rata *feed cost per gain* mencapai Rp. 27.274. Walaupun pakan UMB menunjukkan nilai rata-rata *feed cost per gain* lebih rendah dari pada pakan konsentrat, namun perbedaan tidak signifikan ($p > 0,05$). Penambahan UMB sebagai pakan suplemen dapat memperbaiki nilai gizi pakan dengan cara penambahan karbohidrat dan merangsang aktivitas mikrobiologi dalam rumen untuk memfermentasi pakan berserat kasar tinggi dengan lebih efisien, sehingga produksi dapat dipertahankan baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan dapat ditingkatkan sehingga usaha ternak dapat menguntungkan.

Ada tiga komponen untuk menghitung *feed cost per gain* yaitu harga bahan pakan yang digunakan dalam menyusun ransum, jumlah bahan pakan yang dikonsumsi tiap harinya serta rata-rata pertambahan bobot badan yang dihasilkan.

Harga pakan UMB Rp. 1.458 dan harga pakan konsentrat Rp. 2.150 masing-masing per kg. Semakin kecil *feed cost per gain*, maka biaya pakan makin minimal untuk menghasilkan pertambahan bobot badan yang maksimal.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi potong yang diberi pakan UMB adalah yang paling ekonomis.. Hal ini dikarenakan kandungan protein kasar pakan UMB lebih tinggi dari pada pakan konsentrat dan harga pakan UMB lebih murah dari pada harga pakan konsentrat.

Tabel 1, menunjukkan bahwa rata-rata *feed cost per gain* untuk pakan UMB yaitu Rp. 24.337 dan pakan konsentrat Rp. 27.274. Ini berarti untuk menaikkan bobot badan sebanyak 1 kg diperlukan biaya pakan sebesar Rp. 24.337 untuk pakan konsentrat dan Rp. 27.274 untuk pakan UMB.

Penelitian ini lebih baik dari penelitian sebelumnya, dengan rata-rata *feed cost per gain* adalah Rp. 46.1662 dengan menggunakan sapi PO dan sapi Simental dengan pakan rumput-rumputan, kacang-kacangan dan limbah pertanian⁵⁵. Perbedaan ini mungkin dikarenakan jenis sapi dan pakan yang digunakan berbeda, sehingga konsumsi dan efisiensi pakan berbeda juga. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa nilai efisiensi pakan yang rendah disebabkan karena rendahnya rata-rata pertambahan berat badan harian (PBBH) dan rendahnya nilai nutrien dari bahan pakan yang dikonsumsi sapi. Nilai efisiensi penggunaan pakan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa ransum yang dikonsumsi semakin sedikit untuk menghasilkan pertambahan bobot badan. Efisiensi penggunaan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor

⁵⁵Nurdiati. *Efisiensi Produksi Sapi Potong pada Musim Kemarau di Peternakan Rakyat Daerah Pertanian Lahan Kering Kabupaten Gunungkidul*. (Surakarta: Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. 2002).

diantaranya kemampuan ternak dalam mencerna bahan pakan, kecukupan zat pakan untuk hidup pokok, pertumbuhan dan fungsi tubuh serta jenis pakan yang digunakan. Walaupun sapi mengkonsumsi BK dalam jumlah yang mendekati standar tetap tidak bisa memberikan pertambahan berat badan harian (PBBH) yang baik. Hasil pertambahan berat badan harian (PBBH) yang dicapai tidak sebanding dengan biaya pakan yang sudah dikeluarkan⁵⁶.

Semakin rendah nilai FC/G akan semakin baik, akan tetapi nilai FC/G yang negatif justru menunjukkan bahwa sapi tersebut memiliki performan yang buruk karena nilai negatif tersebut disebabkan oleh pertambahan berat badan harian (PBBH) yang negatif. Dalam penelitian ini nilai FC/G yang terbaik dapat dilihat pada grafik 1. Yaitu terdapat di periode ke dua untuk pakan UMB Rp. 4.318 sedangkan untuk pakan Konsentrat nilai FC/G yang terbaik terdapat pada periode 6 yaitu Rp. 8.065. Angka FC/G dapat ditekan dengan cara mengoptimalkan PBBH dan menekan biaya pakan dengan menggunakan pakan yang lebih efisien. Nilai PBBH dapat dioptimalkan dengan menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik seperti pemberian pakan yang berkualitas, sanitasi dan kebersihan, dan tata laksana pemeliharaan kesehatan ternak⁵⁷. *Feed cost* dapat ditekan dengan memilih bahan pakan untuk menyusun ransum yang mudah dicari atau tersedia secara kontinyu dan murah harganya akan tetapi dapat saling melengkapi membentuk formulasi ransum yang serasi dan seimbang.

⁵⁶ Sagala. *Analisis Biaya Pakan dan Performa Sapi Potong Lokal Pada Ransum Hijauan Tinggi yang Disuplementasi Ekstrak Lerak (Sapindus rarak)*. Skripsi S1. Fakultas Peternakan. (Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2011)

⁵⁷ Williamson dan Payne. *An Introduction to Animal Husbandry in The Tropics*. Longman Group. London. Dalam Darmadja, D. (ed). (Yogyakarta: Pengantar Peternakan di Daerah Tropis. Gadjah mada University Press. 1987)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak terdapat perbedaan nyata antara pakan UMB dan pakan konsentrat terhadap efisiensi penggunaan biaya untuk produktivitas sapi potong.

B. Saran

Untuk lebih mengefesienkan penggunaan biaya untuk produktivitas sapi potong maka perlu perbaikan manajemen pemberian pakan, yaitu menggunakan pakan yang berasal dari limbah-limbah pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2002. *Meningkatkan Produktivitas Ayam Ras Pedaging*. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Ayuni, N. 2005. Tata Laksana Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak Sapi Potong Berdasarkan Sumber Daya lahan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
- Chuzaemi, S. 1989. *Kecernaan dan Retensi Nitrogen Pada Ternak yang Diberi Ransum Basal Jerami Padi dan Menir Dengan Tambahan Urea Molasses Blok*. Pros. Pertemuan Ilmiah Ruminansia. Jilid 2. Puslitbangnak, Bogor
- Cole, H.H. 1998. *Introduction to Livestock Production* 2nd Edition. W.H. Freeman and Company, San Francisco.
- Davies HL. 1983. *Principle on Growth of Animal*. In H. L. Davies, *Nutrition on Growth Manual*. Canberra. AUIDP.
- Kuswandi, 2011.** *Sumber Bahan Pakan Lokal Ternak Ruminansia*. Pusat penelitian dan pengembangan peternakan. Bogor.
- Lubis, D. A. 1992. *Ilmu Makanan Ternak*. PT Pembangunan, Jakarta.
- Lubis, D.A. 1960. Ilmu Makanan Ternak. Program Pasca sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Mariyono. 2005. *Analisis Usaha Penggemukan Sapi Potong*. Pusat Koperasi Sapi Potong, Jawa Timur. Un-publish.
- Mariyono. R., 2007. *Petunjuk Teknis : Teknologi Inovasi Pakan Murah untuk Usaha Pembibitan Sapi Potong*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Pasuruan
- Parakkasi, A. 2001. *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminansia*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Parakkasi, A. 1999. *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminansia*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

- Pond, W.G., D.C. Church, K.R. Pond and P.A. Schoknecht. 2005. *Basic Animal Nutrition and Feeding*. Fifth Ed. John Wiley and Sons, Inc. United States. 91- 109.
- Rosida, I. 2006. Analisis Potensi Sumber Daya Peternakan Kabupaten Tasikmalaya Sebagai Wilayah Pengembangan Sapi Potong. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
- Sagala, W. 2011. *Analisis Biaya Pakan dan Performa Sapi Potong Lokal Pada Ransum Hijauan Tinggi yang Disuplementasi Ekstrak Lerak (Sapindus rarak)*. Skripsi S1. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Siregar, S. B. 1994. *Ransum Ternak Ruminansia*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Siregar, S. B. 2001. *Penggemukan Sapi*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Siregar, S. B. 2008. *Penggemukan Sapi*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sugeng, Y.B. 1998. *Beternak Sapi Potong*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Tillman, Hartadi. H, Rekso Hadiprojo. S., Prawirokusumo, Lebdosoekodjo. 1998. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Gajah Mada University Press. Fakultas Peternakan UGM.
- Wello, B. 2012. *Bahan Ajar Manajemen Ternak Potong dan Kerja*. Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Winugroho M. 2002. Strategi Pemberian Pakan Tambahan Untuk Memperbaiki Efisiensi Reproduksi Induk Sapi. Jurnal Litbang Pertanian.
- Yudith Taringan A., 2010. *Pemamfaatan Pelepah Sawit dan Hasil Ikutan Industri Kelapa Sawit Terhadap Pertumbuhan Sapi Peranakan Simental Fase Pertumbuhan*. Departemen Pendidikan Fakultas Sumatra Utara.

LAMPIRAN FOTO



