

**PENGARUH SUPLEMENTASI BAKTERI ASAM LAKTAT
(BAL) ASAL DANGKE ISOLAT *Enterococcus faecium* DAN
Lactobacillus plantarum TERHADAP SURVIVALITAS
MENCIT (*Mus musculus*) ICR JANTAN YANG
DITANTANG DENGAN *Escherichia coli***



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

SRIWAHYUNI
NIM. 60300113011

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sriwahyuni
NIM : 60300113011
Tempat/ Tgl. Lahir : Sinjai/ 29 September 1995
Jur/ Prodi : Biologi/ S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. Haji Kalla Lr. 1C No.15
Judul : Pengaruh Suplementasi Bakteri Asam Laktat (BAL) Asal Dangke Isolat *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* Terhadap Survivalitas Mencit (*Mus musculus*) ICR Jantan yang Ditantang dengan *Escherichia coli*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 November 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Sriwahyuni

NIM: 60300113011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saadati Sriwahyuni, NIM: 60300113011, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul, "Pengaruh Suplementasi Bakteri Asam Laktat (BAL) Asal Dangke Isolat *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* terhadap Survivalitas Mencit (*Mus musculus*) ICR Jantan yang Ditantang dengan *Escherichia coli*", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 27 November 2017



Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si
Pembimbing II



Fatmawati Nur, S.Si., M.Si
Pembimbing I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Pengaruh Suplementasi Bakteri Asam Laktat (BAL) Asal Dangke Isolat *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* Terhadap Survivalitas Mencit (*Mus musculus*) ICR Jantan yang Ditantang dengan *Escherichia coli*"** yang disusun oleh Sriwahyuni, NIM: 60300113011, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan)*

Makassar, 27 November 2017

08 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Ir. A. Suarda, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Dr. Mashuri Masri, M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Hafsan S.Si., M.Pd	(.....)
Munaqisy II	: Isna Rasdiana Azis, S.Si., M.Sc	(.....)
Munaqisy III	: Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 1969/205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Tiada kalimat yang pantas terucap, selain kalimat Alhamdulillah Rabbil alamin, yang mana atas berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Supplementasi Bakteri Asam Laktat (BAL) Asal Dangke Isolat *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* Terhadap Survivalitas Mencit (*Mus musculus*) ICR Jantan yang Ditantang dengan *Escherichia coli*”** ini dapat terselesaikan, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Shalawat dan salam semoga tetap tecurah kepada Baginda Rasulullah Saw yang telah mengajarkan beberapa ilmu ini. Pengetahuan yang dijadikan lampu penerang dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara khusus iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muh. Arja dan Ibunda Halimah yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayang dengan ketulusan dan keikhlasan, tak henti-hentinya melantunkan doa terbaik di setiap akhir sujud beliau, rela mengorbankan segalanya demi tercapainya harapan dari anak tercinta yang tidak akan pernah mampu untuk terbalas, serta saudara-saudara penulis Dita Cahyati dan Alif Ramadhani yang menjadi motivator penulis. Semoga berkah dan rahmat Allah swt. selalu menaungi mereka. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Dr. Mashuri Masri, M. Kes, selaku Ketua Jurusan Biologi dan Hasyimuddin S.Si, M.Si selaku sekretaris jurusan Biologi.
4. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si selaku Pembimbing I sekaligus selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis selama aktif menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si selaku pembimbing II dalam proses penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Hafsan, S.Si., M.Pd selaku penguji/pembahas I, Isna Rasdiana Azis S.Si., M.Sc selaku penguji/pembahas II, dan Nurkhalis A Ghaffar, S.Ag., M.Hum selaku penguji/pembahas III yang telah memberikan banyak masukan serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Nursiah S. Farm., M. Farm., selaku Kepala Laboratorium Biofarmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis melaksanakan penelitiannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi.
9. Saudara seperjuanganku, Muhammad Maslan S.Si., Retno, Siti Latifa Wulandari S.Si., Inna Shintia S.Si., Yul Fitriani S.Si., Dewi, Ria, Linda, Aswa, Hikmaladewi S.Pd., Thahirah Annisa S.Kep., Nurhikmawati S.E. dan UKHTYCU (Riskha S.E., Mujahidah dan Fitria Hasan) yang telah setia menemani, banyak memberikan masukan dan semangat satu sama lain selama ini.
10. Teman-teman “**BRACHIALIS**”, (Biologi Angkatan 2013) yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dan menghadirkan cerita indah selama kurang lebih 4 tahun bersama.
11. Kakak IKA Alumni jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
12. Adik-adik mahasiswa jurusan Biologi angkatan 2014, 2015, 2016 dan 2017.
13. Teman-teman KKN Angkatan 54 desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba yang senantiasa mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Serta Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca, guna perbaikan ke depannya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah swt senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, Amin.

Makassar, 27 November 2017

Penulis





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	12-42
A. Ayat dan Hadits yang Relevan.....	8
B. Tinjauan Umum Dangke.....	15
C. Tinjauan Umum Bakteri Asam Laktat.....	17
D. Tinjauan Umum Escherichia coli.....	24
E. Tinjauan Umum Probiotik.....	26
F. Tinjauan Umum Survivalitas Mencit (<i>Mus musculus</i>) ICR Jantan.....	29

	G. Hipotesis.....	33
	H. Kerangka Pikir.....	34
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	35-40
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43
	B. Pendekatan Penelitian.....	43
	C. Variabel Penelitian.....	43
	D. Defenisi Operasional Variabel.....	44
	E. Metode Pengumpulan Data.....	44
	F. Instrumen Penenelitian (Alat dan Bahan).....	44
	G. Prosedur Kerja.....	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41-59
	A. Hasil Penelitian.....	41
	B. Pembahasan.....	47
BAB V	PENUTUP.....	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	60
	KEPUSTAKAAN.....	61-65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68-80
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik <i>Analysist of Varian</i> (ANOVA).....	44
Tabel 4.2	Persentase Survive Mencit Selama 21 Hari Pengamatan.....	44
Tabel 4.3	Hasil Uji Hematologi Darah Mencit Parameter Sel Darah Putih	45
Tabel 4.4	Hasil Uji Hematologi Darah Mencit Parameter Sel Limfosit.....	45
Tabel 4.5	Hasil Pengamatan Waktu dan Masa Terjadinya Diare	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Mencit (<i>Mus musculus</i>).....	10
Gambar	4.1	Perubahan berat badan mencit (<i>Mus musculus</i>) ICR jantan yang telah disuplementasi dengan BAL asal dangke dan Infeksi EPEC.....	15
Gambar	4.2	Perubahan konsumsi ransum mencit (<i>Mus musculus</i>) ICR jantan yang telah disuplementasi dengan BAL asal dangke dan Infeksi EPEC.....	22
Gambar	4.3	Feses Mencit Diare.....	78



ABSTRAK

Nama : Sriwahyuni
Nim : 60300113011
Judul Skripsi : **Pengaruh Suplementasi Bakteri Asam Laktat (BAL) Asal Dangke Isolat *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* Terhadap Survivalitas Mencit (*Mus musculus*) ICR Jantan yang Ditantang dengan *Eschericia coli***

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri gram positif yang mampu memproduksi asam laktat dan memiliki potensi sebagai probiotik dengan kemampuannya menghasilkan zat antimikroba berupa bakteriosin serta menghambat pertumbuhan bakteri patogen melalui mekanisme perlekatan pada mukosa usus sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit dalam pencernaan seperti diare yang disebabkan oleh bakteri patogen *Eschericia coli*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian BAL (Bakteri Asam Laktat) asal dangke isolat *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* terhadap mencit (*Mus musculus*) ICR jantan yang telah ditantang dengan bakteri EPEC (*Enteropathogenic Eschericia coli*). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biofarmasi Universitas Hasanuddin pada bulan Februari 2017-Maret 2017. Metode yang digunakan terdiri dari suplementasi menggunakan BAL secara oral dengan 6 perlakuan. Kemudian dilanjutkan dengan uji induksi menggunakan bakteri EPEC (*Enteropathogenic Eschericia coli*) secara oral. Selanjutnya dilakukan pengamatan feses, perubahan berat badan, jumlah konsumsi ransum dan persentase mencit hidup untuk melihat kemampuan BAL asal dangke dalam menghambat terjadinya diare. Hasil yang diperoleh adalah kelompok kontrol negatif dan pemberian BAL *Enterococcus faecium* non-EPEC (kelompok B) yaitu 100%, kelompok perlakuan BAL B *Lactobacillus plantarum* non-EPEC dan dengan EPEC (kelompok D dan E) yaitu 80%, sedangkan kelompok kontrol positif (EPEC) yaitu 60%.

Kata kunci : BAL, Dangke, *Eschericia coli*, Diare, survivalitas.

ABSTRACT

Name : Sriwahyuni
Nim : 60300113011
Title : **The Effect of Lactic acid Bacteria (LAB) from Dangke Isolat *Enterococcus Faecium* and *Lactobacillus plantarum* on The Ability to Survive into Male Mice (*Mus musculus*) ICR which has Given *Escherichia coli***

LAB is a positive gram bacteria that could produce a lactic acid which has potential as a probiotic. It could deliver the anti-microba called Bacteriocin and it can inhibit the growth of pathogenic bacteria with giving treatment on intestinal mucosa so it could prevent the digastive diseases such as diarrhea caused by pathogenic bacteria, *Escherichia coli*. This study conducted to identify the effect of Lactic acid bacteria from dangke isolat *Enterococcus faecium* and *Lactobacillus plantarum* into Male Mice (*Mus musculus*) ICR which given EPEC (Enteropathogenic *Escherichia coli*) bacteria. This research was done at the field laboratory of Biofarm of Hasanuddin University on February 2017-March 2017. The method used is supplementation using lactic acid bacteria orally with 6 treatment. Then, it continues with induction test using observation on the mice's feces, weight, total consumption of rations, and percentage of mice could live with the lactic acid bacteria from Dangke to prevent diarrhea. The result is negative group control and the giving lactic acid bacteria *Enterococcus fecium* non-EPEC (group B) are 100%, the lactic acid bacteria *Lactobacillus plantarum* non-EPEC and with EPEC (group D and E) are 80%, while the positive control group (EPEC) are 60%.

Keywords: LAB, Dangke, *Escherichia coli*, diarrhea, survival.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan oleh Allah dimuka bumi agar dapat bermanfaat bagi makhluk lainnya. Sebagaimana halnya manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah agar dapat menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya serta menjaga bumi ini dari kerusakan. Manusia diberikan kelebihan dibanding makhluk lainnya berupa akal agar dapat berpikir dan memilah mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Dengan akal pikiran inilah manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu agar dapat mempelajari segala manfaat ciptaan Allah swt. (Adawiah, 2014).

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ali 'Imran /3: 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Kementerian Agama RI, 2012).

Tafsir Ibnu Katsir (2004), menjelaskan bahwa makna ayat tersebut yaitu Allah berfirman "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi." Artinya, yaitu pada

ketinggian dan kekuasaan langit dan juga pada kerendahan bumi serta kepadatannya. Dan juga tanda-tanda kekuasaan-Nya yang terdapat pada ciptaan-Nya yang dapat dijangkau oleh indera manusia pada keduanya (langit dan bumi), baik yang berupa; bintang-bintang, komet, daratan dan lautan, pegunungan dan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, barang tambang, serta berbagai macam warna dan aneka ragam makanan dan bebauan. Semua itu merupakan ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Dengan kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah swt. memudahkan manusia dalam mengetahui, mempelajari dan mengolah segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka semakin mudah bagi manusia untuk menciptakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Salah satunya adalah pemanfaatan bakteri asam laktat sebagai probiotik. Probiotik sendiri merupakan mikroba yang mampu untuk hidup pada saluran pencernaan dan memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen dengan meningkatkan sistem imun.

Salah satu bakteri patogen yang diketahui cukup sering menyerang sistem pencernaan yaitu bakteri *Enteropathogenic Escherichia coli* (EPEC) yang menyebabkan diare. Diare itu sendiri merupakan buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair dan kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya. EPEC merupakan strain pertama diantara strain *E. coli* yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab diare patogenik pada pasien bayi dan anak-anak

pada rumah sakit di Inggris dan beberapa negara di Eropa. Di beberapa daerah urban, sekitar 30% kasus-kasus diare akut pada bayi dan anak-anak disebabkan oleh EPEC (Jawetz, 1996).


Bakteri asam laktat telah lama dimanfaatkan dalam industri makanan karena kemampuannya dalam memproduksi senyawa antimikroba seperti asam laktat, hidroperoksida (H_2O_2), diasetil, karbondioksida (CO_2) dan bakteriosin. Salah satu pemanfaatannya didalam pengolahan makanan yaitu pada pembuatan Dangke. Dangke merupakan makanan khas Kabupaten Enrekang yang diketahui memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Dalam proses pembuatannya, Dangke mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri asam laktat.

Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa BAL asal dangke ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai probiotik dengan kemampuannya untuk menghambat bakteri patogen. Namun sebelum dapat dimanfaatkan sebagai probiotik, BAL asal dangke harus memenuhi persyaratan untuk menjadi kandidat probiotik. Diantaranya yaitu memiliki kemampuan tumbuh yang baik secara in vitro dalam keasaman lambung, toleransinya terhadap garam empedu dan kemampuan antagonistiknya terhadap bakteri patogen dan mampu menstimulasi sistem imun. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kemampuan bakteri asam laktat asal dangke telah membuktikan bahwa BAL asal dangke ini mampu untuk hidup dengan baik dalam keasaman lambung, memiliki ketahanan terhadap garam empedu dan mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen. Untuk dapat dijadikan sebagai probiotik, BAL asal dangke ini juga harus memiliki kemampuan dalam menstimulasi

sistem imun dan memiliki kemampuan dalam menghambat terjadinya diare maka uji induksi *E.coli* terhadap mencit (*Mus musculus*) yang sebelumnya telah disuplementasi BAL asal dangke untuk melihat kemampuan survivalitas mencit (*Mus musculus*) ini perlu dilakukan sehingga dapat mendukung pemanfaatan BAL asal dangke agar dapat dijadikan sebagai kandidat probiotik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh suplementasi bakteri asam laktat asal dangke terhadap kemampuan bertahan hidup mencit (*Mus musculus*) yang ditantang *E.coli* ?



C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan secara *in vivo* dengan menggunakan mencit (*Mus musculus*) sebagai hewan percobaan. Penelitian ini terdiri dari suplementasi mencit (*Mus musculus*) menggunakan suspensi BAL asal dangke bertujuan untuk menginduksi antibodi. Selanjutnya dilakukan uji induksi menggunakan suspensi EPEC (*Enteropathogenic Escherichia coli*) untuk mengetahui respon yang ditimbulkan dengan melihat kondisi dari mencit (*Mus musculus*) tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2017 di Laboratorium Biofarmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin.

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Made Astawan, dkk (2011). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan secara *in vivo* dengan menggunakan tikus (*Rattus norvegicus*) sebagai bahan percobaan. Pada penelitian ini pemberian *Enteropathogenic Escherichia coli* (EPEC) dengan dosis 10^6 cfu/ml selama 7 hari pada tikus percobaan menunjukkan terjadinya diare, penurunan berat badan dan penurunan nilai PER (*Protein Efficiency Ratio*). Pemberian *Lactobacillus plantarum* 2C12 dan *Lactobacillus fermentum* 2B4 dengan dosis 10^8 CFU/ml pada tikus yang diberi EPEC dapat mencegah terjadinya diare.

2. Natalia dan Zubaidah (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan produksi EPS (*Extracellular polysaccharide*) dan kemampuan probiotik isolat BAL hasil isolasi dari fermentasi sawi asin sehingga didapatkan isolat BAL yang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Hasil isolasi BAL dari sawi asin (*Brassica juncea*) didapatkan 4 isolat BAL dengan produksi EPS sebesar 1515-1990 mg/L di mana hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan EPS yang dihasilkan oleh BAL probiotik komersial (*L. casei*) sebesar 1340 mg/L yang biasa digunakan dalam industri pangan fermentasi. Dari beberapa pengujian probiotik secara *in-vitro* didapatkan 1 isolat terbaik (K1-1242) dengan ketahanan terhadap pH 2,5 sebesar 43,53%, ketahanan terhadap pH 3,0 sebesar 69,86%, ketahanan terhadap 3% garam Osgall sebesar 4,22%, diameter zona hambat sebesar 10,14 mm terhadap *E. coli* dan 8,73 mm terhadap *S. aureus*.
3. Anggraini, dkk (2013). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental pada tikus putih (*Rattus norvegicus*) model enteritis yang diinduksi indometasin pada dosis 15mg/kg BB dan diterapi dengan BAL pada dosis 1×10^9 CFU/ml secara per oral. Penelitian ini menggunakan 4 kelompok tikus, yaitu kelompok kontrol, kelompok indometasin, kelompok yang hanya diberi BAL dan kelompok terapi (indometasin + BAL). Hasil penelitian menunjukkan aktivitas protease duodenum tikus yang diterapi dengan suplementasi BAL mengalami penurunan menjadi 4.3 ± 3 nmol.mL/menit dibandingkan dengan tikus yang diinduksi indometasin 15 ± 1 nmol.mL/menit. Jumlah mikroflora pada tikus yang diterapi dengan suplementasi BAL mengalami perbaikan $3,5 \times 10^4 \pm 1,2$ CFU/ml (BAL) dan $5,2 \times 10^3 \pm 1$

CFU/ml (*enterobacter*) dibandingkan dengan tikus yang diinduksi indometasin $2,4 \times 10^4 \pm 5$ CFU/ml (BAL) dan $2,9 \times 10^3 \pm 1$ CFU/ml (*enterobacter*). Gambaran histopatologi duodenum tikus yang diterapi dengan suplementasi BAL mengalami perbaikan pada struktur vili dan epitel, serta tidak ada infiltrasi sel inflamasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terapi BAL pada tikus yang terpapar indometasin mampu menurunkan aktivitas protease, memperbaiki jumlah mikroflora dan perbaikan pada gambaran histopatologi duodenum.

4. Siti Rabiatul Adawiah (2014). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan Rancangan Acak Lengkap yang bertujuan untuk mengetahui ketahanan BAL dari dangke susu sapi terhadap garam empedu dengan berbagai konsentrasi 0,1%, 0,3% dan 0,5% serta tanpa garam empedu sebagai kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat BAL indigenous dangke susu sapi *Lactobacillus fermentum* dan *Lactobacillus acidophilus* memiliki ketahanan terhadap garam empedu. Isolat *L.acidophilus* memiliki ketahanan terhadap garam empedu lebih baik dibanding *L. fermentum*. Selisih antara jumlah koloni BAL pada media + Oxygall terhadap kontrol (A_0 dan B_0) untuk setiap perlakuan konsentrasi Oxygall 0,1%, 0,3% dan 0,5% berturut-turut *L.fermentum* : $1,4 \times 10^6$, $1,7 \times 10^6$, dan 4×10^6 sedangkan *L. acidophilus* : $0,7 \times 10^6$, $0,9 \times 10^6$, dan $1,4 \times 10^6$. Ketahanan *L. acidophilus* pada variasi konsentrasi garam empedu menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dengan nilai $p = 0,445$ demikian pula halnya ketahanan *L. fermentum* pada variasi konsentrasi garam empedu menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dengan nilai $p = 0,133$. Kemampuan *L.fermentum* dan *L.*

acidophilus bertahan terhadap garam empedu mengidentifikasi isolatnya berpotensi sebagai kandidat probiotik.

5. Sylvia Indriani (2014). Penelitian ini menggunakan BAL *L.acidophilus* dan *L. fermentum* yang merupakan hasil isolasi dari dangke. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis bakteri patogen uji menunjukkan perbedaan daya hambat BAL yang tidak nyata baik terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Bacillus cereus*. Jenis BAL dan masa inkubasi menunjukkan perbedaan daya hambat yang nyata (signifikan), dimana jenis BAL *L.acidophilus* menunjukkan daya hambat yang lebih tinggi dibandingkan *L. fermentum* dan kontrol negatif, sedangkan masa inkubasi yang menunjukkan daya hambat tertinggi adalah perlakuan masa inkubasi 3x24 jam, kemudian disusul oleh perlakuan masa inkubasi 2x24 jam, dan masa inkubasi 1x24 jam. Uji lanjut Duncan yang memperlihatkan perlakuan mana yang memberikan pengaruh yang paling besar dari kedua BAL yang digunakan *L. acidophilus* dengan masa inkubasi 72 jam. Hal tersebut membuktikan bahwa *L. acidophilus* dan *L. fermentum* mempunyai potensi untuk digunakan sebagai kandidat probiotik.
6. Nur Hikmah (2014). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk memperlihatkan kemampuan daya hambat BAL asal dangke yaitu *Lactobacillus acidophilis* dan *Lactobacillus fermentum* terhadap bakteri gram negatif. Bakteri patogen uji yang digunakan adalah *E. coli* dan *V. parhaemoliticus* secara in vitro pada medium MRSA dengan metode Kirby-Bauer. Berdasarkan uji daya hambat yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kedua BAL yang digunakan dapat

menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Rata-rata zona hambat yang terbentuk disekeliling *paper disk* yang diinkubasi selama 1x24 jam, 2x24 jam dan 3x24 jam. Hasil uji menunjukkan bahwa BAL dengan 3x pengulangan menghambat pertumbuhan bakteri *E.coli* dan *V.parhaemoliticus*.

7. Ika Dian Rostika (2015). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan bakteri *Pediococcus acidilactici* untuk mengetahui daya antimikroba BAL tersebut terhadap pertumbuhan *Bacillus cereus*, *E. coli* dan *Staphylococcus aureus*. Metode yang digunakan adalah *well-difussion* menggunakan bakteri uji *B. cereus*, *E. coli* dan *S. aureus* dengan masa inkubasi 24 jam, 48 jam dan 72 jam dengan 3x ulangan, dianalisis dengan uji General Linear Model-Univariate dan dilanjutkan dengan uji Duncan dan Least Significant Difference (LSD). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jenis bakteri patogen uji dan masa inkubasi memperlihatkan pengaruh daya hambat yang signifikan *P. acidilactici* tidak menunjukkan efek penghambatan terhadap *B.cereus* tetapi menunjukkan daya hambat terkuat terhadap *S. aureus* pada masa inkubasi 24 jam dengan diameter rata-rata zona bening sebesar 15 mm sedangkan *E. coli* sebesar 2,5 mm. Masa inkubasi 72 jam *P. acidilactici* tidak menunjukkan efek penghambatan terhadap bakteri uji. Oleh karena itu *P. acidilactici* dapat berpotensi sebagai kandidat probiotik lokal.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi bakteri asam laktat asal dangke terhadap kemampuan survivalitas (Perubahan berat badan, perubahan konsumsi pakan, pengamatan terjadinya diare dan respon imun) mencit (*Mus musculus*) yang telah ditantang *Escherichia coli*.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh suplementasi bakteri asam laktat asal dangke terhadap kemampuan survivalitas mencit (*Mus musculus*) yang telah ditantang *Escherichia coli*.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk produksi antidiare secara komersial dalam pengembangan bidang industri probiotik.
3. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Ayat dan Hadis yang Relevan

Al-Quran QS Fushshilat /41 : 53 yang berbunyi:

سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ
يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Terjemahnya:

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa al-Qur'an itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (Kementerian Agama RI, 2012).

Di dalam QS Fushshilat ayat 53 ini, menerangkan bahwa Allah akan memperlihatkan kepada mereka yaitu orang-orang musyrik tanda-tanda kekuasaan Allah di segenap penjuru berupa penaklukan-penaklukan dan kemenangan-kemenangan Islam atas semua negeri dan semua agama. Dan dalil-dalil yang terdapat didalam diri-diri mereka sendiri seperti peristiwa atau kejadian Perang Badar dan penaklukan kota suci Mekah. Allah swt. telah memberikan pertolongan pada peristiwa-peristiwa itu terhadap Muhammad saw. dan para sahabatnya. Dan telah menghinakan juga pada peristiwa-peristiwa itu kebatilan.

Menurut Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (2004), yang dimaksud dengan firman Allah, "dan pada diri mereka sendiri" adalah materi, campuran (senyawa) dan karakteristik yang menakjubkan yang membentuk tubuh manusia, sebagaimana

dijelaskan di dalam ilmu anatomi yang menunjukkan tentang hikmah Sang Pencipta. Termasuk tanda kekuasaan Allah yang ada dalam diri (karakter) manusia berupa perilaku yang berbeda-beda, ada yang baik dan jelek. Apakah mereka tidak menggunakan pikiran mereka untuk memahami bukti-bukti yang terdapat dalam al-Qur'an sendiri dan apakah belum cukup bagi mereka bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu, yakni atas perbuatan dan ucapan hamba-hamba-Nya.

Ayat ini memperingatkan kepada manusia bahwa dengan kekuasaan-Nya, Ia menciptakan tubuh dengan materi yang memiliki manfaatnya masing-masing. Termasuk didalamnya mikroba yang mendiami tubuh makhluk hidup. Beberapa mikroba yang ada disekitar kita terkadang dapat menyebabkan penyakit. Namun adapula diantaranya yang dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu yang diketahui melalui diadakannya penelitian-penelitian oleh para ilmuwan. Hal ini telah dijelaskan di dalam sabda Rasulullah saw. yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمَهُ مَنْ عِلِمَهُ وَجَهْلَهُ مَنْ جَهْلَهُ

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadits ini dalam Zawa'id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma'ad, 4/12-13).

Hadits di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah akan menurunkan obatnya. Meskipun terkadang

ada yang bisa menemukan obatnya, dan adapula yang belum bisa menemukannya. Oleh karena itu kita diminta untuk tetap bersabar karena Allah swt. telah menjelaskan bahwa ketika Dia menurunkan sebuah penyakit maka Dia turunkan pula obatnya.

Berdasarkan hadits tersebut maka dapat diketahui bahwa setiap penyakit memiliki obatnya bagi orang-orang berilmu yang mampu mencari tahu dengan seksama. Hal mengenai orang-orang berilmu yang mampu memberikan manfaat bagi kehidupan dan menjadi pedoman dilakukannya penelitian dalam berbagai bidang demi kemaslahatan umat manusia diterangkan dalam sabda Rasulullah saw. yaitu:

أَفْضَلُ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ الْعَالِمُ الَّذِي إِنْ أَحْتِجَجَ إِلَيْهِ نَفَعَّ وَإِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى
نَفْسَهُ (رواه البيهقي)

Artinya:

Seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri (*HR. Al-Baihaqi*).

Hadits ini menjelaskan bagaimana keutamaan ilmu bagi seseorang, dimana ia akan memberikan manfaat dan dibutuhkan oleh orang-orang disekitarnya. Bahkan jika seorang yang berilmu terangsingkan dari kehidupan sekitarnya, ilmu yang ia miliki akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, dan menjadi penghibur dalam kesendiriannya (Alie dan Sholeh, 2015). Menurut al-Ghazali (2007) dengan ilmu pengetahuan akan diperoleh segala bentuk kekayaan, kemuliaan, kewibawaan, pengaruh, jabatan, dan kekuasaan. Apa yang dapat diperoleh seseorang sebagai buah dari ilmu pengetahuan, bukan hanya diperoleh dari hubungannya dengan sesama

manusia, para binatangpun merasakan bagaimana kemuliaan manusia, karena ilmu yang ia miliki.

Sebagaimana diketahui dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa bakteri asam laktat yang terkandung di dalam dangke memiliki potensi untuk dijadikan sebagai probiotik dengan menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti *Escherichia coli* yang diketahui dalam kondisi pertumbuhan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya diare akut pada bayi dan anak-anak hingga mengakibatkan kematian. Sehingga penelitian untuk mendukung potensi BAL asal dangke sangat perlu dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi potensi kematian. Namun untuk dapat dijadikan sebagai probioik, BAL asal dangke harus memiliki kemampuan meningkatkan imunitas dan menghambat terjadinya diare pada hewan uji. Sedangkan pada umumnya, hewan dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki kesetaraan dengan manusia dalam hal kepemilikan hak untuk hidup. Namun di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ
 أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu (Kementerian Agama RI, 2012).

Ayat ini menjelaskan bahwa Dalam penggalan terjemahan ayat tersebut yang berbunyi “Kemudian Dia berkehendak menuju ke langit”. Kata kemudian dalam ayat ini bukan berarti selang masa tapi dalam arti peringkat, yakni peringkat sesuatu yang disebut sesudahnya yaitu langit dan apa yang ditampungnya lebih agung, lebih besar, indah dan misterius daripada bumi. Maka Dia, yakni Allah menyempurnakan mereka yakni menjadikan tujuh langit dan menetapkan hukum-hukum yang mengatur perjalanannya masing-masing, serta menyiapkan sarana yang sesuai bagi yang berada disana. Itu semua diciptakannya dalam keadaan sempurna dan amat teliti. Dan itu semua mudah bagi-Nya karena Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (Shihab, 2009).

Yang menarik, setelah Allah mengingatkan asal-usul kejadian manusia yang berasal dari ketiadaan dan kematian, yang berasal dari tanah, tumbuhan, dan hewan, tiba-tiba menyebutkan bahwa semua yang ada di bumi ini (termasuk tanah, tumbuhan, dan hewan), Dia ciptakan untuk manusia. Pesan yang bisa kita tangkap dari peringatan ini ialah bahwa tubuh biologis manusia (yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bumi) diciptakan untuk berbakti kepada tubuh ruhaniannya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa pada diri manusia yang justru bukan berasal dari bumi; tetapi untuknyalah bumi diciptakan. Artinya, kalau bukan demi manusia ruhaniah itu, Allah tidak menciptakan bumi ini. Melalui peringatan ini, Allah hendak mengesankan manusia bahwa diri ruhaniannya itu adalah makhluk yang sangat mulia, yang sedemikian mulianya sehingga nilai kemuliannya melampaui seluruh nilai alam semesta yang material ini (Musthofa, 1986).

Pantas juga kalau ketika Allah menawarkan *amanah* (agama, tugas *ilahiah*) kepada langit, bumi, dan gunung, semua menolak untuk menerimanya. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Manusalah yang menerimanya karena hanya manusia sajalah yang memiliki kesanggupan untuk itu. “*Sungguh Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan mengemban amanat itu karena khawatir akan mengkhianatnya, sehingga amanat itu (pun) diemban oleh manusia. (Maka) sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh (jika tidak melaksanakan amanah tersebut).*” (33:72) Kendati akan ditunaikan di dunia yang bersifat material, tetapi substansi *amanah* ini murni bersifat ruhaniah, sehingga hanya makhluk yang memiliki tubuh material dan tubuh ruhaniahlah yang layak mengembannya. Dan itulah manusia. Dan sekaligus penentu mulia tidaknya dia adalah diemban tidaknya *amanah* ini. Karena apabila dia tidak mengembannya, maka sia-sialah tubuh ruhaniahnya, sehingga diapun masuk kategori menzalimi dan membodohi dirinya sendiri. Sebab tugas yang Allah letakkan padanya ialah agar dapat mengemban *amanah* tersebut (Shihab, 2009).

B. Tinjauan Umum Dangke

Dangke merupakan produk olahan susu kerbau atau susu secara tradisional yang berasal dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan yang diproduksi sejak tahun 1905. Produk keju tradisional dapat ditemukan di daerah Enrekang, Baraka, Anggeraja, dan Alla di wilayah Sulawesi Selatan. Nama dangke diambil dari kalimat “dank u well” yang dalam bahasa Belanda berarti “terima kasih banyak”.

Berdasarkan dari cerita masyarakat lokal, pribumi mempersembahkan produk ini kepada Belanda ketika pertama kali mengunjungi Sulawesi Selatan dan mengatakan pada mereka “dank je” yang merupakan kepanjangan dari “dank u well”. Pemerintah Kabupaten Enrekang menjadikan dangke sebagai produk pangan lokal unggulan dan merupakan makanan tradisional yang sangat digemari (Surono, 2015).

Kebanyakan masyarakat Enrekang, hanya mengenal satu jenis dangke yakni dangke susu kerbau. Namun karena tingginya permintaan dan kebutuhan dangke dan kemampuan dalam memproduksi susu kerbau yang sangat terbatas, yang juga disebabkan karena penurunan populasi kerbau. Sehingga pengolah dangke mencoba mencari alternatif bahan baku lain dalam pembuatan dangke kepada susu sapi. Beberapa karakteristik yang dimiliki dangke yang berasal dari susu kerbau adalah tampak lebih putih, tekstur lebih halus, dan aroma lebih tajam (Rahman, 2014).

Satu buah dangke rata-rata dibuat dari 1.25-1.5 liter susu segar. Dangke diproduksi secara tradisional dengan teknologi yang sederhana melalui teknik pemanasan dan fermentasi. Berdasarkan jumlah air yang dikandung di dalamnya dangke termasuk dalam golongan keju lunak (*soft cheese*) dengan kadar air 45.75 % berwarna putih dan bersifat elastis. Masyarakat Enrekang umumnya mengkonsumsi dengan cara digoreng, dimasak, dan dibakar, atau dapat pula dengan mengkombinasikan ketiga cara tersebut (Rahman, 2014).

Dangke itu sendiri merupakan suatu produk olahan yang terbuat dari fermentasi susu kerbau yang dikerjakan secara tradisional melalui teknik penggumpalan melalui beberapa campuran bahan. Dangke merupakan produk sejenis

keju lunak yang dibuat dengan cara dipanaskan dengan api kecil sampai mendidih, kemudian ditambahkan koagulan berupa getah pepaya (papain) sehingga terjadi penggumpalan. Enzim secara alamiah akan mengubah susu sapi atau kerbau itu menjadi padat akibat terjadinya pemisahan protein dan air. Metode pengawetan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah penambahan larutan garam dapur (Ferdina dkk, 2013).


Dangke biasanya menggunakan penggumpal dari getah pepaya. Dalam getah pepaya mengandung enzim papain, yaitu enzim proteolitik yang terdapat pada getah tanaman pepaya (*Carica papaya* L). Secara umum yang dimaksud dengan papain adalah papain yang dimurnikan maupun papain yang masih kasar. Semua bagian pepaya seperti buah, daun, tangkai daun, dan batang mengandung enzim papain dalam getahnya, tetapi bagian yang paling banyak mengandung enzim papain adalah buahnya (Yuniawati, 2010).

Susu dapat digumpalkan oleh enzim rennet untuk bisa menjadi keju. Susu dapat pula digumpalkan atau dikoagulasikan dengan bantuan asam. Koagulan dari asam yang biasanya digunakan adalah asam asetat, asam cuka, asam sitrat, jeruk nipis, asam laktat, dan asam klorida (Cahyadi, 2008).

C. Tinjauan Umum *Escherichia coli* (*E.coli*)

Escherichia Coli pertama kali diidentifikasi oleh dokter hewan Jerman, Theodor Escherich dalam studinya mengenai sistem pencernaan pada bayi hewan.

Pada 1885, beliau menggambarkan organisme ini sebagai komunitas bakteri coli dengan membangun segala perlengkapan patogenitasnya di infeksi saluran pencernaan. Nama “*Bacterium Coli*” sering digunakan sampai pada tahun 1991. Ketika Castellani dan Chalames menemukan genus *Escherichia* dan menyusun tipe spesies *E. Coli*.



Gambar 2.1. Bakteri (Smith-Keary, 1988).

Bakteri *E. coli* merupakan merupakan bakteri gram negatif, bentuk batang, memiliki ukuran 2,4 mikro, bergerak, tidak berspora, positif pada tes indol, glukosa, laktosa, sukrosa (Greenwood *et al.*, 2007).

E. coli yang menyebabkan diare banyak ditemukan di seluruh dunia. Menurut Jawetz (1996), *E. coli* diklasifikasikan oleh ciri khas sifat-sifat virulensinya, dan setiap kelompok menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda. Ada lima kelompok galur *E. coli* yang patogen, yaitu:

1. *E. coli* Enteropatogenik (EPEC)

EPEC penyebab penting diare pada bayi, khususnya di negara berkembang. EPEC sebelumnya dikaitkan dengan wabah diare pada anak-anak di negara maju. EPEC melekat pada sel mukosa usus kecil.

2. *E. coli* Enterotoksigenik (ETEC)

ETEC penyebab yang sering dari “diare wisatawan” dan penyebab diare pada bayi di negara berkembang. Faktor kolonisasi ETEC yang spesifik untuk manusia menimbulkan pelekatan ETEC pada sel epitel usus kecil.

3. *E. coli* Enteroinvasif (EIEC)

EIEC menimbulkan penyakit yang sangat mirip dengan shigelosis. Penyakit yang paling sering pada anak-anak di negara berkembang dan para wisatawan yang menuju negara tersebut. Galur EIEC bersifat non-laktosa atau melakukan fermentasi laktosa dengan lambat serta bersifat tidak dapat bergerak. EIEC menimbulkan penyakit melalui invasinya ke sel epitel mukosa usus.

4. *E. coli* Enterohemoragik (EHEC)

EHEC menghasilkan verotoksin, dinamai sesuai efek sitotoksiknya pada sel Vero, suatu ginjal dari monyet hijau Afrika. EHEC dianggap sebagai patogen zoonosis baru yang dapat menyebabkan gastroenteritis akut dan hemoragik kolitis dengan komplikasi ginjal dan neurologis sebagai akibat dari translokasi Shiga toksin (Stx 1 dan Stx 2) di usus. Merupakan penyebab utama kematian bayi dalam Negara berkembang.

5. *E. coli* Enteroagregatif (EAEC)

EAEC menyebabkan diare akut dan kronik pada masyarakat di Negara berkembang. Akibat infeksiya menyebabkan diare akut dan kronik pada negara berkembang. Bakteri ini ditandai dengan pola khas perlekatannya pada sel

manusia. EAEC memproduksi hemolisin dan ST enterotoksin yang sama dengan ETEC.

D. Tinjauan Umum Probiotik

Menurut Sunaryanto dkk (2014), istilah probiotik berasal dari bahasa Yunani yang berarti ‘untuk hidup’. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Lilley dan Stillwell pada tahun 1965 yang diartikan sebagai substansi yang dihasilkan oleh satu mikrobia yang dapat menstimulasi pertumbuhan mikroba lain.

FAO (*the Food Agriculture Organization*) dan WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan probiotik sebagai mikroorganisme hidup yang apabila diberikan dalam jumlah cukup akan memberikan manfaat dengan memperbaiki kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Probiotik dapat pula didefinisikan sebagai makanan tambahan (*food supplements*) yang bermanfaat untuk memperbaiki kesehatan seseorang dan didefinisikan sebagai suatu mikroorganisme dan substansi yang bertujuan memperbaiki keseimbangan mikroorganisme dalam usus. Menurut Djunaedi (2007), ada beberapa cara kerja probiotik yaitu:

1. Produksi bahan-bahan anti-mikrobal

Produk probiotik menekan jumlah, metabolisme dan produksi toksin oleh bakteri usus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik pada tikus tidak berhasil mengeliminasi *Clostridium difficile* namun dapat mencegah timbulnya kolitis dan mungkin juga menekan produksi toksin bakteri tersebut.

Selain itu ditemukan bahwa *volatile fatty acids* yang diproduksi oleh *Lactic Acid Bacteria* (LAB) mampu mengendalikan kolonisasi *Shigella sonnei* dan *Enteropathogenic* (EPEC).

2. Kompetisi pada reseptor adhesi

Bakteri patogen harus mempunyai kemampuan untuk melakukan adhesi sehingga dapat menghasilkan kolonisasi dan menimbulkan penyakit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hewan coba yang diberi galur *E. coli* non-patogen lebih resisten terhadap infeksi *E. coli* patogen dibandingkan dengan kontrol. Selain itu juga dilaporkan bahwa pemberian probiotik mampu mencegah tikus dalam status imunodefisiensi dari serangan candidiasis dan pemberian heat-killed *L.acidophilus* (lacteol strain) mampu menghambat adesi *E. coli* pada dinding usus penderita (in vivo) maupun pada media in vitro. Laporan lain menunjukkan bahwa pemberian heat-killed *L.acidophilus* kepada penderita diare anak yang memperoleh terapi rehidrasi oral dan antibiotik bermuara pada durasi diare yang lebih pendek dibandingkan dengan mereka yang diberi plasebo. Ini berarti galur non-patogen juga terikat pada reseptor adesi yang sama dengan galur patogen sehingga galur patogen tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan adesi, membentuk kolonisasi dan menimbulkan penyakit (Fooks dkk, 2002). Probiotik nampaknya berperan sebagai pesaing (*competitor*) bagi galur patogen untuk mengikat diri pada reseptor adesi sehingga galur patogen tak mampu membentuk koloni dan dengan demikian tidak mampu menimbulkan penyakit.

3. Kompetisi terhadap zat makanan

Meskipun usus merupakan sumber makanan yang berlimpah sehingga teori mengenai persaingan antar mikroorganisme nampaknya tidak dapat diterima, namun perlu diingat bahwa keberlangsungan mekanisme persaingan dengan mikroorganisme patogen hanya memerlukan pelibatan satu jenis nutrient. Temuan penelitian *in vitro* menunjukkan mikro-organisme usus dalam bentuk koloni bersaing secara lebih efisien terhadap *C. difficile* berkaitan dengan monomeric glucose, N-acetyl-glucosamine dan asam salisilat.

4. Stimulasi imunitas

Cara kerja bakteri probiotik dalam mendesak pertumbuhan bakteri penyebab penyakit nampaknya diawali dari pengaruh kerjanya terhadap sistem imun. Pada dekade belakangan ditemukan bahwa lactobacilli yang dimakan dapat menstimulasi aktivitas makrofag terhadap beberapa spesies bakteri yang berbeda. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh absorpsi antigen atau translokasi lactobacilli melalui dinding usus langsung ke peredaran darah untuk kemudian menstimulasi makrofag. Penelitian membuktikan bahwa lactobacilli yang disuntikkan intravena ditemukan hidup dalam hati, limpa dan paru disertai aktivitas NK cell yang meningkat.

E. Tinjauan Umum Bakteri Asam Laktat (BAL)

Pada mulanya, istilah bakteri asam laktat (BAL) hanya digunakan untuk mendefinisikan tentang sekelompok bakteri yang menyebabkan keasaman pada susu (*milk-souring organism*). Secara umum Bal didefinisikan sebagai kelompok bakteri gram positif yang tidak menghasilkan spora. Berbentuk bulat atau batang yang

memproduksi asam laktat sebagai produk akhir dari metabolik utama selama proses fermentasi karbohidrat (Okviati, 2008).

Salah satu produk pangan fungsional yang banyak dikonsumsi adalah minuman dan makanan probiotik. Minuman dan makanan probiotik adalah minuman dan makanan yang mengandung bakteri seperti bakteri asam laktat (BAL) yang menguntungkan bagi saluran pencernaan karena dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora usus dan mampu bertahan hidup dalam keasaman lambung sehingga dapat menempati usus dalam kuantitas yang cukup besar.

Saat ini penelitian mengenai bakteri asam laktat baik didalam maupun diluar negeri telah banyak dilakukan. Di Indonesia sendiri telah banyak penelitian-penelitian terdahulu mengenai bakteri asam laktat. BAL yang banyak tersebar di alam Indonesia ini dapat diisolasi dari berbagai sumber antara lain buah-buahan busuk, sayuran busuk, berbagai produk asinan tradisional, susu terfermentasi, feses ternak, feses bayi, dan lain-lain. Menurut Kanbe (1992), BAL yang digunakan dalam fermentasi perlu diseleksi untuk memperoleh isolat yang memiliki kemampuan unggul, sehingga memiliki kelebihan-kelebihan:

1. Memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan sehingga memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.
2. Ketersediaan mikroba terjamin, sebab bersumber dari lingkungan alam Indonesia yang dapat diisolasi dari banyak sumber.
3. Memungkinkan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat untuk industri besar maupun industri kecil, karena ketersediaan yang cukup serta biaya relatif murah.

Akibat semakin tingginya minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk makanan probiotik maka semakin banyak pula produk makanan probiotik yang diciptakan melalui hasil fermentasi dari bakteri asam laktat. Hal ini terjadi karena produk-produk tersebut dinyatakan mengandung mikroba BAL yang memiliki efek menyehatkan. Dampak menyehatkan ini karena produk tersebut mengandung nutrisi lebih tinggi (vitamin) dan lebih mudah dicerna dibanding dengan bahan baku darimana dia dibuat, karena BAL dalam susu asam akan menghasilkan beberapa vitamin dan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa yang sangat berguna bagi orang-orang yang tidak dapat mentolerir laktosa. BAL juga dikatakan dapat mengaktivasi immunitas dalam tubuh inang terutama ketahanan tubuh di daerah saluran pencernaan (karena di sinilah terjadi interaksi antara probiotik dan inang), sehingga ketika terdapat bakteri patogen atau benda asing yang memasuki saluran pencernaan akan segera dihancurkan. Meningkatnya immunitas tubuh pada inang yang menderita kanker dapat mencegah berkembangnya sel-sel kanker tersebut sehingga terapi dapat dilakukan lebih baik (Kanbe, 1992).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa BAL yang dikonsumsi bersama dengan produk susu terfermentasi dapat meningkatkan imunitas tubuh inang. Meningkatnya imunitas ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah sel leukosit, meningkatnya produksi sitokin, meningkatnya aktifitas fagositosis, dilain pihak Schiffirin *et al.* (1995) menemukan bahwa tidak ada peningkatan jumlah leukosit setelah konsumsi bakteri asam laktat melalui susu terfermentasi namun ditemukan meningkatnya fagositosis terhadap *Escherichia coli* secara *in vitro*. Interaksi antara

bakteri non-patogen *Lactobacillus johnsonii*, *Lb. casei* dan *Escherichia coli* dengan sel leukosit secara in vitro menunjukkan bahwa ketiga strain bakteri tersebut dapat meningkatkan proliferasi sel leukosit. Proliferasi terbanyak disebabkan oleh interaksi dengan *Lb. johnsonii*.

Schiffirin *et al.* (1995) menyatakan strain bakteri asam laktat yang berbeda menunjukkan aktivitas biologi yang berbeda di dalam tubuh inang. Kemampuan dari masing-masing strain bakteri asam laktat untuk dapat hidup dan mengkolonisasi lapisan permukaan tidaklah sama, sehingga kesempatan untuk berinteraksi dengan sel leukosit dari sistem imun juga berbeda. Di lain pihak untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh sebaiknya bakteri asam laktat tersebut masih dalam keadaan hidup ketika berada di dalam saluran pencernaan.

Bakteri asam laktat adalah bakteri yang dapat menguraikan gula dan karbohidrat lainnya serta menghasilkan sejumlah besar asam laktat sebagai produk akhir. Bakteri tersebut tidak mendegradasi atau menguraikan protein. Bakteri yang tergolong bakteri asam laktat adalah *Bifidobacterium* dan *Lactobacillus* (Mitsuoka, 1990).

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan kelompok bakteri gram positif, katalase negatif yang dapat memproduksi asam laktat dengan cara memfermentasi karbohidrat. BAL yang menghasilkan dua molekul asam laktat dari fermentasi glukosa disebut bakteri asam laktat homofermentatif, sedangkan BAL yang menghasilkan satu molekul asam laktat dan satu molekul etanol serta satu molekul karbon dioksida disebut bakteri asam laktat heterofermentatif (Reddy *et al.*, 2008).

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki BAL yaitu: 1) BAL mampu menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat memberikan rasa dan aroma spesifik pada makanan fermentasi (Rahayu, 2001). 2) BAL mampu meningkatkan nilai cerna pada makanan fermentasi karena dapat melakukan pemotongan pada bahan makanan yang sulit dicerna sehingga dapat langsung diserap oleh tubuh, misalnya protein diubah menjadi asam-asam amino (Guerra *et al.*, 2006), 3) BAL menghasilkan senyawa antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan pembusuk pada bahan makanan sehingga dapat memperpanjang masa simpan produk tersebut. Senyawa-senyawa antimikroba yang dihasilkan BAL antara lain: asam laktat, hidrogen peroksida, CO₂, dan bakteriosin (Holzapfel *et al.*, 1995). Produk utamanya yaitu asam laktat yang dapat terakumulasi pada lingkungan di sekitarnya sehingga pH dapat menurun hingga pH 4,0-4,8. Hal ini menyebabkan mikroba patogen dan pembusuk yang umumnya hidup pada pH 6,0-8,0 tidak dapat tumbuh.

Pada penelitian ikan laut diperoleh isolat-isolat yang berpotensi sebagai probiotik yaitu gram positif (*Bacillus*, *Lactococcus*, *Micrococcus*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Streptococcus*, *Weissella*) dan gram negatif (*Aeromonas*, *Alteromonas*, *Photobacterium*, *Pseudomonas*, *Vibrio*) (Marzouk *et al.*, 2008). Sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Razak dkk (2008), sebanyak 3 dari 30 isolat yang diperoleh menunjukkan potensi untuk dapat menghasilkan senyawa antimikroba yang masing-masing diidentifikasi sebagai *Lactobacillus plantarum* DU15, *Enterococcus faecium* DU55, dan *Leuconostoc mesenteroides* DU02.

Probiotik tidak selamanya menimbulkan efek ketika mengkolonisasi usus. Seperti misalnya *Lactobacillus* sp. yang diketahui mampu meningkatkan ekspresi mucin in vitro pada sel epitel usus manusia sehingga dapat mencegah perlekatan dan pertahanan terhadap patogen (Gogieni, 2013).

Probiotik mempengaruhi ekosistem usus dengan merangsang mekanisme kekebalan mukosa usus serta merangsang mekanisme non imun melalui antagonisme dan kompetisi dengan patogen yang potensial. Hal ini merupakan efek menguntungkan dari penggunaan probiotik termasuk dalam mengurangi terjadinya diare ataupun mengurangi parahnya kejadian diare. Ini merupakan kegunaan paling umum diketahui dari penggunaan probiotik (Guarner, 2011).

Pada umumnya, bakteri yang sering digunakan dalam pembuatan probiotik adalah bakteri asam laktat spesies *Lactobacillus* sp., *Bifidobacterium* sp., *Streptococcus* sp., *Lactobacillus lactis* dan beberapa spesies *Enterococcus* sp. pada manusia, lactobacilli dan bifidobacteria umumnya ditemukan pada vagina dan saluran pencernaan. Namun bifidobacteria terdapat pula pada mulut. Probiotik ini berperan sebagai bakteri komensal yang berguna dalam memelihara kesehatan usus agar menjadi sehat (Howarth *et al.*, 2013).

1. *Enterococcus faecium*

Enterococcus faecium berasal dari genus *Enterococcus*. Bersifat fakultatif anaerob, tidak memiliki spora dan merupakan bakteri gram positif. *Enterococcus faecium* adalah komponen dari flora normal usus. *Enterococcus faecium* SF68 telah digunakan sebagai alternatif terhadap terapi antibiotik untuk mengobati diare.

Mereka telah digunakan sebagai agen probiotik untuk menghambat patogen mikroorganisme dalam usus, untuk merangsang kekebalan sistem, dan untuk mengurangi kadar kolesterol darah (Lewenstein *et al.*, 1979).

Gheiser dan Hosseindoust (2016), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa disimpulkan bahwa dimasukkannya probiotik yang mengandung *Enterococcus faecium* meningkatkan pertumbuhan kinerja dan mengubah populasi mikroba usus, tanpa efek negatif pada warna daging dan profil darah di ayam pedaging.

Dalam proses fermentasi terkandung bakteri asam laktat *Enterococcus faecium*. *Enterococcus faecium* IS-27526 telah teruji mampu meningkatkan bakteri asam laktat dan menurunkan jumlah total mikroba aerob serta anaerob pada feses lansia (Surono, 2004). Manfaat lain dari probiotik adalah memperbaiki status intoleransi laktosa, mencegah integritas brush border dan sel epitel, dan mencegah penyakit diare. *E. faecium* IS-27526 memiliki kemampuan bertahan terhadap kondisi asam lambung dan garam empedu, menempel pada epitel usus, meningkatkan perkembangan bakteri menguntungkan dan menurunkan perkembangan bakteri koliform atau bakteri pathogen (Drisko *et al* 2003, Collado *et al* 2007).

2. *Lactobacillus plantarum*

Genus *Lactobacillus* terdiri atas banyak kelompok termasuk beberapa spesies yang digunakan untuk fermentasi dan pengawetan makanan. Beberapa *Lactobacillus* merupakan probiotik, yang dapat memberikan efek yang menguntungkan bagi kesehatan hostnya (Claesson *et al.*, 2007).

Lactobacillus plantarum merupakan 1 dari 27 spesies yang termasuk dalam genus *Lactobacillus* famili Lactobacillaceae. *Lactobacillus plantarum* tergolong bakteri Gram positif, nonmotil, batang, pada umumnya berukuran 0,6-0,8 μm x 1,2-6,0 μm , berantai tunggal atau banyak dan pendek. Bakteri ini bersifat katalase negatif, tidak berspora, tidak mereduksi nitrat menjadi nitrit, tidak memproduksi NH_3 dari arginin, bersifat fakultatif anaerob, dan tumbuh optimum pada suhu 30-35°C. *Lactobacillus plantarum* bersifat toleran terhadap garam, memproduksi asam dengan cepat dan memiliki pH ultimat 5,3 hingga 5,6 (Buckle *et al.*, 1987).

Bakteri *Lactobacillus plantarum* terutama berguna untuk pembentukan asam laktat, penghasil hidrogen peroksida tertinggi dibandingkan bakteri asam laktat lainnya dan juga menghasilkan bakteriosin yang merupakan senyawa protein yang bersifat bakterisidal. Bakteri *Lactobacillus plantarum* umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam dan oleh karenanya menjadi lebih banyak terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe asam laktat. Bakteri ini sering digunakan dalam fermentasi susu, sayuran, dan daging (sosis). Fermentasi dari *Lactobacillus plantarum* bersifat homofermentatif sehingga tidak menghasilkan gas (Buckle *et al.*, 1987).

F. Tinjauan Umum Survivalitas Mencit (*Mus musculus*)

Survivalitas (Daya hidup) adalah kemampuan bertahan hidup suatu makhluk hidup terhadap hal-hal yang menjadi faktor penghambat kehidupannya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa perbedaan galur mencit akan mempengaruhi pola

parasitemia dan daya hidup yang berbeda pula (De Menezes *et al.*, 2004). Perbedaan daya hidup galur mencit hanya perbedaan kecepatan kematiannya, mencit yang peka akan lebih cepat mengalami kematian dibanding mencit yang kurang peka (Carmona *et al.*, 2006).

Menurut Sudono (1981), kurva pertumbuhan mencit merupakan titik-titik pertemuan antara bobot badan dengan waktu, pola kurva pertumbuhan mencit berbentuk sigmoid. Pertumbuhan mencit ada dua fase yaitu fase tumbuh cepat saat laju pertambahan bobot badan mencit meningkat tajam, dan fase yang kedua yaitu fase tumbuh lambat saat laju pertambahan bobot badan mulai menurun sampai menjadi nol yaitu hewan telah mencapai dewasa tubuh.

Menurut Blakely dan David (1991), mortalitas merupakan jumlah atau persentase ternak yang mati dalam suatu populasi pada tempat dimana ternak tersebut berada, kondisi lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan ternak dapat menurunkan angka mortalitas. Nilai mortalitas dalam bentuk persentase diperoleh dengan cara membagi jumlah mencit yang mati selama selang waktu tertentu dengan jumlah populasi awal, dikalikan 100%.

Mencit (*Mus musculus*) merupakan hewan dari famili Muridae. Semua galur *Mus musculus* laboratorium sekarang ini merupakan keturunan dari *Mus musculus* liar sesudah melalui peternakan selektif. Mencit memiliki bulu yang pendek halus dan berwarna putih serta ekor berwarna kemerahan dengan ukuran lebih panjang dari badan dan kepalanya (Smith & Mangkoewidjojo, 1988).



Gambar 2.2. Mencit (*Mus musculus*) (Dokumentasi Pribadi, 2017)

Menurut Priyambodo (2003) klasifikasi mencit sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Classis : Mamalia

Ordo : Rodentia

Familia : Muridae

Genus : *Mus*

Spesies : *Mus musculus*

Mencit (*Mus Musculus*) merupakan hewan coba yang sering digunakan dalam penelitian. Mencit memiliki sifat – sifat reproduksi mirip dengan mamalia besar dan siklus estrus pendek (Malole dan Pramono, 1989).

Penggunaan mencit sebagai hewan percobaan dilandasi berbagai pertimbangan, antara lain mencit berukuran kecil, tidak membutuhkan banyak tempat, mudah penanganannya, susunan anatomi dan fisiologi tubuhnya mendekati manusia, serta mempunyai kemampuan yang baik untuk menyesuaikan diri dengan

kondisi berbagai jenis penelitian. Mencit biasanya digunakan dalam penelitian yang mempelajari tentang kandungan gizi, studi tentang suatu penyakit dan uji coba produk medis (Smith, 1988).

Menurut Malole dan Pramono (1989) kebutuhan pakan mencit adalah 10% bobot badan, pakan harus mengandung nutrisi yang lengkap dan memenuhi kebutuhan mencit. Pakan mencit harus mengandung 14-18% protein, 5-10% lemak, 40-50% karbohidrat, 16-20% serat kasar dan 5% abu. Pakan mencit juga harus mengandung vitamin dan mineral yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Mus musculus jantan dan betina muda sukar untuk dibedakan. *Mus musculus* betina dapat dikenali karena jarak yang berdekatan antara lubang anus dan lubang genitalnya. Testis pada *Mus musculus* jantan pada saat matang seksual terlihat sangat jelas, berukuran relatif besar dan biasanya tidak tertutup oleh rambut. Testis dapat ditarik masuk ke dalam tubuh. *Mus musculus* betina memiliki lima pasang kelenjar susu dan puting susu sedang pada *Mus musculus* jantan tidak dijumpai (Muliani, 2011).

Mus musculus akan lebih aktif pada senja atau malam hari, mereka tidak menyukai terang. Mereka juga hidup di tempat tersembunyi yang dekat dari sumber makanan dan membangun sarangnya dari bermacam-macam material lunak. *Mus musculus* adalah hewan terrestrial dan satu jantan yang dominan biasanya hidup dengan beberapa betina dan *Mus musculus* muda. Jika dua atau lebih *Mus musculus* jantan dalam satu kandang mereka akan menjadi agresif jika tidak dibesarkan

bersama sejak lahir. Namun jika dibandingkan dengan mencit jantan, mencit betina merupakan yang lebih agresif terhadap mencit lain yang berada dalam satu kandang dengannya (Muliani, 2011).

Siklus hidup dan reproduksi *Mus musculus* dinyatakan dalam (Muliani, 2011) bahwa *Mus musculus* betina memiliki siklus estrus lamanya 4-6 hari, dengan lama estrus kurang dari 1 hari. Beberapa *Mus musculus* betina jika hidup bersama dalam keadaan yang berdesakan, maka tidak terjadi siklus estrus pada saat itu tetapi jika dirangsang oleh urine *Mus musculus* jantan, maka estrus akan terjadi dalam 72 jam. *Mus musculus* betina pada saat kopulasi akan membentuk *vaginal plug* secara alami untuk mencegah terjadinya kopulasi kembali. *Vaginal plug* akan terjadi selama 24 jam. Masa bunting sekitar 19-21 hari dan beranak sebanyak 4-13 ekor (rata-rata 6-8). Satu *Mus musculus* betina dapat beranak sekitar 5-10 kali per tahun, sehingga populasinya meningkat dengan sangat cepat. *Mus musculus* betina mencapai matang seksual sekitar 6 minggu dan *Mus musculus* jantan sekitar 8 minggu, tetapi keduanya dapat dikawinkan minimal setelah berusia 35 hari (Muliani, 2011).

Lama hidup mencit satu sampai tiga tahun, dengan masa kebuntingan yang pendek (18-21 hari) dan masa aktifitas reproduksi yang lama (2-14 bulan) sepanjang hidupnya. Mencit mencapai dewasa pada umur 35 hari dan dikawinkan pada umur delapan minggu (jantan dan betina). Siklus reproduksi mencit bersifat poliestrus dimana siklus estrus (berahi) berlangsung sampai lima hari dan lamanya estrus 12-14 jam. Mencit jantan dewasa memiliki berat 20-40 gram sedangkan mencit betina

dewasa 18-35 gram. Hewan ini dapat hidup pada temperatur 30°C (Smith & Mangkoewidjojo, 1988).

G. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu bakteri asam laktat asal dangke berpotensi dalam menghambat kematian dan terjadinya diare pada mencit yang disebabkan .

H. Kerangka Pikir

Input

- 2 isolat BAL terbaik strain *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* yang diisolasi dari dangke

Proses

- Pemberian BAL dan EPEC secara oral pada mencit dengan 6 perlakuan berbeda.
- Pengukuran berat badan dan jumlah pakan mencit
- Pengamatan terjadinya diare pada hewan percobaan yang terinfeksi *E.coli*
- Pengamatan mencit yang bertahan hidup

Output

- BAL asal Dangke berpotensi menghambat diare akibat infeksi *E.coli*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biofarmasi Universitas Hasanuddin pada bulan Februari 2017-Maret 2017.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif eksperimental dengan menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki dua macam variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Suspensi EPEC (*Enteropathogenic Escherichia coli*) dan isolat BAL asal dangke sebagai variabel bebas. Kemudian survivalitas mencit sebagai variabel terikat.

D. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Bakteri asam laktat adalah dua isolat terbaik yaitu *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* yang berhasil diisolasi (asal dangke) dan diidentifikasi

secara biokimia dan molekuler yang akan disuplementasi kedalam tubuh mencit (*Mus musculus*) yang kemudian ditantang dengan bakteri patogen EPEC (*Enteropathogenic Escherichia coli*).

2. *Escherichia coli* adalah bakteri patogen yang akan diinduksikan ke dalam tubuh mencit (*Mus musculus*) untuk melihat kemampuan bakteri asam laktat asal dangke yang disuplementasikan sebelumnya terhadap mencit dalam menghambat terjadinya diare.
3. Survivalitas mencit (*Mus musculus*) merupakan kemampuan bertahan hidup (daya hidup) mencit setelah disuplementasi BAL yang kemudian diuji tantang dengan bakteri patogen EPEC (*Enteropathogenic Escherichia coli*). Parameter yang dimaksud berupa perubahan berat badan, perubahan konsumsi ransum, pengamatan terjadinya diare dan respon imun mencit (*Mus musculus*).

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui percobaan laboratorium dengan mengukur bobot badan dan jumlah konsumsi pakan, persentase *survive* mencit serta pengamatan terjadinya diare pada mencit (*Mus musculus*).

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah oven, spektrofotometer visible, timbangan, vortex, mikropipet, kandang, spoid insulin, pipa kapiler, dan sonde.

Adapun bahan yang digunakan yaitu mencit (*Mus musculus*), kertas HVS, aquadest, ransum mencit, suspensi EPEC (*Enteropathogenic Escherichia coli*), suspensi dua isolat BAL asal dangke (isolat *Enterococcus faecium* yang merupakan BAL A dan isolat *Lactobacillus plantarum* yang merupakan BAL B).

G. Prosedur Kerja

1. Adaptasi Mencit (*Mus musculus*)

Sebelum memberi perlakuan terhadap hewan uji, perlu dilalukan adaptasi terlebih dahulu dengan tujuan agar hewan uji yang digunakan mampu saling beradaptasi dan tidak saling menyerang satu sama lain. Sehingga ketika percobaan berlangsung mencit (*Mus musculus*) tidak saling mengganggu dan tetap tenang karena telah terbiasa. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencit ICR jantan dengan bobot badan rata-rata 18-33 gram dan usia 2-3 bulan yang diperoleh dari Laboratorium Biofarmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Pemilihan usia 2-3 bulan tersebut digunakan karena merupakan rentang usia untuk mewakili usia dewasa pada mencit sehingga diharapkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi sedang berjalan optimal (Sugiarto, 2008). Pemilihan mencit (*Mus musculus*) dengan jenis kelamin jantan sebagai hewan uji adalah untuk memudahkan dalam pengamatan dengan menggunakan jenis kelamin yang sama sehingga memiliki karakteristik organ yang sama pula. Mencit yang diikutsertakan dalam penelitian adalah mencit yang sehat dengan ciri-ciri mata bersinar dan bertingkah laku normal.

Mencit yang memperlihatkan tanda-tanda mengalami kelainan atau sakit tidak diikutsertakan dalam perlakuan.

Mencit ditempatkan dalam kandang yang terbuat dari plastik bening berukuran 25 cm x 13 cm dengan penutup menggunakan kawat rang. Setiap kandangnya terdiri atas satu ekor mencit. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam pengamatan feses.

2. Preparasi Suspensi Bakteri Asam Laktat (BAL)

Pembuatan suspensi BAL dilakukan dengan cara memindahkan 1 ose isolat BAL ke dalam media *deMan Rogosa Sharpe Broth* (MRSB) lalu dihomogenkan, selanjutnya memipet 1 ml larutan isolat ke dalam 9 ml aquadest dan dihomogenkan kemudian menghitung jumlah suspensi BAL hingga mencapai populasi 10^8 CFU/ml dengan menggunakan spektrofotometer. Pemberian larutan uji dilakukan secara per oral, yaitu pemberian obat dalam bentuk suspensi dan larutan kepada hewan uji yang dilakukan dengan menggunakan jarum suntik dengan ujung tumpul (bentuk bola, sonde) (Tjay dan Rahardja, 2010).

3. Perlakuan terhadap hewan percobaan

Mencit (*Mus musculus*) dibagi kedalam 6 kelompok perlakuan. Kelompok A (kontrol negatif) yaitu mencit normal yang hanya diberi aquadest, kelompok B yaitu mencit yang diberi BAL A, kelompok C yaitu mencit yang diberi BAL A +

EPEC, kelompok D yaitu mencit yang diberi BAL B, kelompok E yaitu mencit yang diberi BAL B + EPEC, dan kelompok F (kontrol positif) yaitu mencit yang diinfeksi EPEC. Selama percobaan, semua kelompok mencit diberi pakan ransum standar.

Pemberian BAL dilakukan selama tiga minggu penuh, yaitu dari hari ke-1 hingga ke-21, secara oral melalui sonde. BAL yang diberikan sebanyak 0.2 ml dengan populasi 10^8 CFU/ml sesuai standar *Mc. Farland* ($0,5 \times 10^8$ CFU/ml). Infeksi EPEC dilakukan dengan populasi 10^6 CFU/ml sebanyak 0,2 ml per hari selama 7 hari (hari ke-8 sampai ke-14), secara oral menggunakan sonde (Astawan, 2011).

Untuk analisis peubah dilakukan uji hematologi (uji darah lengkap) pada darah mencit yang diambil pada hari terakhir percobaan (hari ke-21) untuk melihat jumlah WBC (*White Blood Cell*) dan limfosit dari setiap kelompok perlakuan.

4. Pengukuran Bobot Badan dan Konsumsi Ransum

Bobot awal badan mencit (*Mus musculus*) ditimbang pada hari ke-0 (Sebelum perlakuan) dan selanjutnya pada saat setelah perlakuan bobot badan mencit ditimbang setiap tiga hari sekali untuk mengetahui perubahan bobot badan mencit selama perlakuan. Menurut Pradana (2012), nilai perubahan bobot badan harian dihitung dengan persamaan:

$$PBBH (g) = \frac{BBt - BBt3 (g)}{3}$$

PBBH = Perubahan bobot badan harian (g)

BBt = Berat badan terakhir penimbangan (g)

BBt₃ = Berat badan 3 hari sebelumnya (g)

5. Pengamatan terjadinya diare pada mencit terinfeksi EPEC

Kejadian diare tikus percobaan diamati melalui pengamatan fisik dengan memperhatikan secara langsung berlendir tidaknya feses dengan melihat bentuk dari feses (padat, semi padat, cair). Pengamatan diare ini dilakukan dengan mengganti alas kandang berupa sekam menjadi kertas HVS kemudian mengamati konsistensi feses. Apabila kertas disekitaran feses menyerap lebih banyak air dibanding feses normal maka dipastikan hewan coba mengalami diare (Rachmawati, 2016).

6. Pengamatan Survivalitas Mencit

Pengamatan survivalitas mencit dengan melihat jumlah mencit yang bertahan hidup hingga pada hari terakhir pengamatan (hari ke-21). Perhitungan persentase survive mencit yaitu dengan membagi jumlah mencit yang hidup selama selang waktu tertentu dengan jumlah populasi awal, dikalikan 100% (Blakely dan David, 1991).

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap, dengan model matematika sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \sum_{ij}$$

Y_{ij} = pengaruh perlakuan ke-I dan ulangan ke-j

μ = nilai tengah perlakuan

α_i = pengaruh perlakuan ke-i

β_j = pengaruh ulangan ke-j

\sum_{ij} = galat perlakuan ke-I dan ulangan ke-j

Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA. Jika terdapat perbedaan nyata akan diuji lanjut dengan uji Tukey HSD dan Duncan Multiple Comparison Test (Steel and Torrie, 1995).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi, telah banyak dilakukan pengolahan makanan yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan seperti pembuatan makanan yang mengandung probiotik. Salah satunya yaitu pembuatan Dangke, makanan khas Enrekang yang telah diketahui mengandung bakteri asam laktat yang memiliki potensi sebagai probiotik.

Bakteri asam laktat (BAL) memberikan manfaat positif bagi kesehatan, terutama menjaga keseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan. Manfaat lainnya yang mampu diberikan BAL bagi tubuh yaitu mengendalikan patogen dalam saluran pencernaan (Surono, 2004).

Enteropatogenic Escherichia coli (EPEC) merupakan salah satu strain dari bakteri patogen *Escherichia coli* yang dapat menyebabkan diare jika dikonsumsi pada dosis 10^5 - 10^{10} cfu/ml (Kelleher, 2002). EPEC melekat pada permukaan mukosa usus dan menyebabkan terjadinya perubahan struktur sel. EPEC dilaporkan sering menginfeksi anak-anak. Pencegahan diare yang disebabkan oleh EPEC sangat penting dilakukan karena diare akut dapat menyebabkan kematian (Nitisinprasert et al., 2006).

1. Perubahan Bobot Badan Mencit (*Mus musculus*) ICR Jantan

Berdasarkan hasil pengukuran bobot badan yang dilakukan setiap 3 hari selama 21 hari dan pengamatan konsumsi ransum setelah imunisasi BAL isolat *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* serta infeksi EPEC pada mencit (*Mus musculus*) diperoleh hasil yaitu terjadi perubahan bobot badan pada mencit namun pada analisis data statistik perubahan bobot badan tidak menunjukkan perbedaan nyata terhadap perlakuan ($p = 0.111 > 0.005$). Hal ini ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1. Grafik Perubahan Bobot Badan Mencit.

Keterangan:


- A = Kelompok Negatif (Tanpa perlakuan)
- B = Pemberian BAL *Enterococcus faecium*
- C = Pemberian BAL *Enterococcus faecium* + EPEC
- D = Pemberian BAL *Lactobacillus plantarum*

E = Pemberian BAL *Lactobacillus plantarum* + EPEC

F = Kelompok Positif (Pemberian EPEC)

2. Perubahan Konsumsi Pakan Mencit (*Mus musculus*) ICR Jantan

Berdasarkan hasil pengamatan konsumsi ransum selama 21 hari setelah imunisasi BAL isolat *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum* serta infeksi EPEC pada mencit (*Mus musculus*) diperoleh hasil yaitu terjadi perubahan konsumsi pakan pada mencit dan pada analisis data statistik perubahan konsumsi pakan menunjukkan perbedaan nyata terhadap perlakuan ($p = 0.000 < 0.005$). Hal ini ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2. Perubahan Konsumsi Ransum Mencit

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, maka diperoleh hasil yaitu terjadi perubahan nyata pada perlakuan terhadap konsumsi pakan mencit. Dimana

hasil uji ANOVA menunjukkan nilai $p = 0.000 < p = 0.005$. Kemudian dilanjutkan dengan uji Tukey HSD dan Duncan Multiple Comparison.

Tabel 4.1. Hasil Uji Statistik *Analysis Of Varian* (ANOVA)

ANOVA					
Konsumsi Pakan					
	Jumlah Kuadrat	df	Nilai Tengah Kuadrat	F	Sig.
Antara Kelompok	3.942	5	.788	65.741	.000
Antar kelompok	.504	42	.012		
Total	4.446	47			

3. Uji Induksi *Escherichia coli*

Setelah suplementasi BAL asal dangke selama 7 hari, mencit kemudian diuji dengan *Escherichia coli*. Induksi dilakukan secara oral selama 7 hari. Pengamatan dilakukan sejak hari pertama perlakuan sampai hari ke-21 dengan melihat jumlah mencit (*Mus musculus*) yang bertahan hidup. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa terjadi kematian pada beberapa kelompok mencit perlakuan dan pada kelompok positif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Persentase Survive Mencit Selama 21 Hari Pengamatan.

Perlakuan	Jumlah Kematian	% Survive (Selama 21 Hari)
Kontrol - (A)	0	100%
BAL A (B)	0	100%
BAL A + EPEC (C)	2	60%
BAL B (D)	1	80%
BAL B + EPEC (E)	1	80%
Kontrol +/-EPEC (F)	2	60%

Untuk analisis peubah, maka dilakukan uji darah lengkap untuk mengetahui bagaimana pengaruh suplementasi BAL terhadap respon imun mencit (*Mus musculus*) yang telah ditantang dengan *Escherichia coli* dengan parameter yang akan diamati yaitu WBC (*White Blood Cell/ Sel Darah Putih*) dan Limfosit. Hasil pengamatan uji hematologi dengan parameter WBC (*White Blood Cell/ Sel Darah Putih*) dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Hasil Uji Hematologi Darah Mencit Parameter Sel Darah Putih

Parameter	Perlakuan	Jumlah Sel Darah Putih ($10^3/\mu\text{L}$)	Nilai Rujukan	Keterangan
WBC (<i>White Blood Cell</i>)	A	$3.6 \times 10^3/\mu\text{L}$	0.05-0.52	Meningkat
	B	$5.1 \times 10^3/\mu\text{L}$		Meningkat
	C	$7.3 \times 10^3/\mu\text{L}$		Meningkat
	D	$9.8 \times 10^3/\mu\text{L}$		Meningkat
	E	$7.1 \times 10^3/\mu\text{L}$		Meningkat
	F	$1.3 \times 10^3/\mu\text{L}$		Meningkat

Adapun untuk hasil pengamatan uji hematologi pada mencit (*Mus musculus*) dengan parameter yang akan diamati yaitu Limfosit dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4. Hasil Uji Hematologi Darah Mencit Parameter Limfosit

Parameter	Perlakuan	Jumlah Limfosit (%)	Nilai Rujukan	Keterangan
Limfosit	A	92.9 %	20-50 %	Meningkat
	B	96.1 %		Meningkat
	C	90.2 %		Meningkat
	D	87.8 %		Meningkat
	E	76.5 %		Meningkat
	F	87.3 %		Meningkat

4. Pengamatan Terjadinya Diare

Pada pengamatan terjadinya diare pada mencit berdasarkan pengamatan secara langsung konsistensi feses dengan melihat padat, lembek, atau berairnya serta mengamati penyerapan air feses pada kertas HVS kemudian membandingkan dengan feses normal mencit diperoleh hasil yaitu terjadi diare pada kelompok B, C, D, E dan F pada waktu dan durasi yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5. Hasil Pengamatan Waktu dan Masa Terjadinya Diare

Perlakuan	Sampel	Hari Terjadi Diare	Masa Terjadi Diare (Hari)
A	1	-	0
	2	-	0
	3	-	0
	4	-	0
	5	-	0
B	1	-	0
	2	-	0
	3	-	0
	4	14	1
	5	-	0
C	1	-	0
	2	14	2
	3	-	0
	4	-	0
	5	-	0
D	1	-	0
	2	-	0
	3	-	0
	4	14	2
	5	-	0
E	1	-	0
	2	15	2
	3	-	0
	4	-	0
	5	-	0
F	1	17	5
	2	-	0
	3	-	0
	4	17	5
	5	19	2

B. Pembahasan

Probiotik mempengaruhi ekosistem usus dengan merangsang kekebalan mukosa dan merangsang mekanisme non imun melalui antagonisme dan kompetisi dengan patogen yang potensial. Diperkirakan hal tersebut dapat memediasi efek menguntungkan dari probiotik, termasuk didalamnya mengurangi terjadinya dan parahnya diare. Ini dianggap sebagai keuntungan paling umum diketahui mengenai kegunaan dari probiotik (Guarner *et al.*, 2012).

Sebelum melalui tahap suplementasi, mencit (*Mus musculus*) diadaptasikan terlebih dahulu selama 7 hari dalam kandang terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah masa adaptasi dilakukan suplementasi BAL terhadap kelompok perlakuan (Kelompok B, C, D, dan E) dengan cara per oral menggunakan sonde. Sedangkan pada kelompok kontrol positif, diberi perlakuan berupa induksi EPEC dilakukan secara per oral. Tujuan dilakukannya pemberian BAL sebelum perlakuan infeksi diare adalah untuk memberi kesempatan bagi BAL untuk terabsorpsi di dalam tubuh sehingga ketika dilakukan induksi EPEC maka BAL tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan efek antidiare.

Hasil pengamatan perubahan bobot badan mencit pada kelompok A tanpa perlakuan terjadi peningkatan sejak hari pertama penelitian hingga hari terakhir pengamatan. Hal ini sejalan dengan perubahan konsumsi pakan mencit yang tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak awal pengamatan. Hal ini disebabkan kelompok A merupakan kelompok tanpa perlakuan sehingga mencit tetap dalam keadaan pertumbuhan normal tanpa adanya gangguan dalam metabolisme tubuhnya.

Hal ini juga didukung dengan pengamatan terjadinya diare dan survivalitas mencit. Pada kelompok A tidak terjadi diare pada kelima sampel dan jumlah persentase survivalitasnya 100% yang berarti tidak terdapat kematian pada kelompok ini yang menunjukkan kelompok kontrol negatif ini tidak mengalami perubahan apapun atau tetap dalam keadaan normal.

Pada pengamatan perubahan bobot badan kelompok B yang merupakan kelompok perlakuan pemberian BAL *Enterococcus faecium* non-EPEC diperoleh hasil yaitu terjadi peningkatan bobot badan pada hari ke-3, ke-6 dan ke-9, namun terjadi penurunan konsumsi ransum. Pada hari terakhir pengamatan bobot badan dan konsumsi ransum kembali mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian BAL ternyata berhasil memperbaiki nafsu makan dan penambahan bobot badan mencit.

Pada kelompok C yang merupakan kelompok pemberian BAL dan infeksi EPEC, perubahan bobot badan terus mengalami peningkatan hingga hari terakhir pengamatan namun pada konsumsi ransum terjadi perubahan naik dan turunnya konsumsi ransum yaitu kenaikan jumlah konsumsi pakan pada hari ketiga selanjutnya menurun pada hari ke-6, meningkat pada hari ke-9 dan kembali mengalami penurunan hingga hari ke-18. Hal ini dapat diakibatkan oleh meningkatnya jumlah populasi mikroba dalam saluran pencernaan akibat penambahan EPEC yang melekat pada epitel mukosa usus. Sebagaimana telah dijelaskan Coconnier dalam Astawan (2011) bahwa adhesi atau perlekatan merupakan tahap awal dari infeksi patogen dan mengakibatkan kolonisasi, gangguan metabolisme sel, kerusakan sel dan gangguan

pertumbuhan. EPEC menginfeksi sel mukosa usus dan merusak sel. Banyaknya sel yang rusak menyebabkan terganggunya proses metabolisme dalam tubuh sehingga dapat mengganggu fungsi normal organ dan mengakibatkan menurunnya nafsu makan sehingga mencit menjadi lebih banyak minum untuk memperbaiki aktivitas metabolisme sehingga perubahan bobot badan tetap meningkat. Namun akibat adanya EPEC yang merusak sel mukosa usus hingga mengganggu proses resorpsi air dan menyebabkan terjadinya diare pada hari ke 14 pengamatan selama 2 hari. Namun pada hari terakhir pengamatan, bobot badan dan konsumsi ransum kembali mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian BAL telah berhasil memperbaiki nafsu makan dan penambahan bobot badan mencit serta menghambat terjadinya diare akibat EPEC.

Pada pengamatan perubahan bobot badan dan konsumsi pakan pada kelompok perlakuan pemberian BAL *Lactobacillus plantarum* (D) menunjukkan bahwa bobot badan dan konsumsi pakan pada hari ke-6 mengalami penurunan. Akan tetapi, pada hari ke 15 hingga hari terakhir pengamatan, bobot badan kembali meningkat dikarenakan nafsu makan mencit kembali normal sehingga akumulasi protein oleh tubuh yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya kembali meningkat.

Pada kelompok perlakuan pemberian *Lactobacillus plantarum* dan infeksi EPEC, peningkatan konsumsi pakan dan bobot badan terjadi hingga hari ke-6. Hal ini disebabkan pada masa tersebut belum terjadi penambahan infeksi EPEC sehingga konsumsi pakan tergolong normal sehingga akumulasi protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan masih berjalan normal. Namun pada pengamatan bobot badan dan

konsumsi pakan hari ke-9 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya infeksi EPEC yang mulai diberikan pada hari ke-7 pengamatan sehingga EPEC menginfeksi sel mukosa usus dan merusak sel. Banyaknya sel yang rusak menyebabkan terganggunya proses metabolisme dalam tubuh mencit (*Mus musculus*) sehingga dapat mengganggu fungsi normal organ yang mengakibatkan menurunnya nafsu makan dan pertumbuhan. Namun pada pengamatan hari ke-12, konsumsi pakan kembali meningkat sedangkan bobot badan mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya pemberian EPEC yang menyebabkan perlekatan pada mukosa usus dan merusak mekanisme sel sehingga beberapa proses metabolisme dalam tubuh menjadi terganggu. Ini mengakibatkan pakan yang dikonsumsi dan seharusnya digunakan untuk proses pertumbuhan justru digunakan untuk menghasilkan energi dan menjalankan fungsi tubuh yang lebih penting. Hal ini sesuai dengan Maulida (2004) protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan digunakan juga untuk dijadikan sumber energi dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat. Pada pengamatan hari ke-15 terjadi penurunan konsumsi pakan namun terjadi peningkatan bobot badan. Hal ini merupakan akibat dari adanya indikasi diare oleh EPEC sehingga mencit kehilangan nafsu makan dan menjadi lebih banyak minum untuk mengganti energi yang hilang akibat kurang konsumsi pakan sehingga perubahan bobot badan mencit tetap mengalami peningkatan. Bobot badan yang meningkat adalah bobot akibat penambahan massa secara umum, bukan merupakan penambahan massa otot. Namun akibat dari meningkatnya konsumsi air, menyebabkan meningkatnya cairan pada lumen usus sehingga kemampuan resorpsi air oleh usus menjadi menurun hingga

menyebabkan terjadinya diare sekretori. Hal ini didukung dengan mulai terjadinya diare pada hari ke-15 pengamatan selama 2 hari.

Pada analisis data statistik uji ANOVA pada perubahan bobot badan terhadap perlakuan, diperoleh hasil yaitu $p = 0.111 > 0.005$ yang berarti bahwa perlakuan tidak berpengaruh terhadap perubahan bobot badan. Sedangkan analisis data statistik uji ANOVA pada perubahan konsumsi pakan terhadap perlakuan yang dilanjut dengan uji Duncan, perlakuan yang diberikan terhadap konsumsi ransum menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nyata antara kelompok kontrol negatif (A) terhadap kelompok perlakuan (B, C, D, E dan kelompok kontrol positif F) dengan nilai $p = 0.000 < 0.05$ yang bermakna bahwa konsumsi pakan berpengaruh terhadap perlakuan dimana pada uji LSD untuk melihat beda nyata terkecil (BNT) menunjukkan bahwa kelompok kontrol positif merupakan kelompok yang memiliki jumlah konsumsi pakan terendah disusul oleh kelompok B, E, D, dan C sedangkan kelompok A kontrol negatif memiliki jumlah konsumsi pakan tertinggi. Kemudian dilanjut dengan uji lanjutan Tukey HSD dan uji Duncan yang menunjukkan beda nyata jujur (BNJ) diperoleh hasil yaitu terdapat perbedaan nyata antara kelompok kontrol negatif (A) terhadap semua kelompok. Hal ini dikarenakan kelompok A merupakan kelompok kontrol negatif yang tidak diberi perlakuan apapun. Sehingga memiliki perbedaan nyata terhadap kelompok lainnya yang diberikan perlakuan secara berbeda-beda.

Pada kelompok perlakuan pemberian BAL *Enterococcus faecium*, konsumsi pakan mencit tergolong kelompok B memiliki perbedaan nyata terhadap kelompok

kontrol negatif (A), kelompok C, kelompok D dan kelompok F, namun tidak berbeda nyata terhadap kelompok E yang merupakan kelompok pemberian BAL *Lactobacillus plantarum* dan EPEC dengan nilai signifikan yaitu 0.975 ($p > 0.005$). Hal ini disebabkan mencit pada kelompok B dan E merupakan kelompok yang memperoleh perlakuan BAL meskipun dengan jenis suspensi BAL dan perlakuan EPEC yang berbeda namun keduanya memiliki tingkat konsumsi pakan yang tidak jauh berbeda akibat adanya pengaruh penambahan BAL yang mampu memperbaiki tingkat konsumsi pakan melalui kemampuannya menghambat pertumbuhan BAL sehingga dapat mengembalikan dengan cepat nafsu makan mencit. Sehingga kelompok E meskipun diberi perlakuan EPEC tingkat konsumsinya hampir setara dengan kelompok B yang merupakan kelompok perlakuan BAL *Enterococcus faecium*.

Selanjutnya, kelompok pemberian BAL *Enterococcus faecium* dan EPEC (C) pada uji beda nyata jujur (BNJ) tidak berbeda nyata terhadap kelompok pemberian BAL *Lactobacillus plantarum* (D) dengan nilai signifikan yaitu 0.776 ($p > 0.005$) (Lampiran 6). Hal ini menunjukkan persamaan dengan kelompok sebelumnya (kelompok B dan E) sehingga dapat dikatakan bahwa keempat kelompok tersebut memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dalam mempengaruhi jumlah konsumsi pakan mencit sehingga keempat kelompok tersebut dapat dikatakan mampu untuk memperbaiki konsumsi pakan mencit meskipun kelompok C dan E merupakan kelompok perlakuan dengan pemberian EPEC.

Sedangkan kelompok kontrol positif (F) berbeda nyata terhadap semua kelompok. Kelompok ini merupakan kelompok dengan tingkat konsumsi ransum yang paling rendah. Hal ini dikarenakan mencit kelompok F mengalami infeksi EPEC sehingga konsumsi pakan pada kelompok F cenderung menurun akibat adanya ciri-ciri diare akibat perlekatan EPEC pada sel mukosa usus yang menyebabkan mencit mengalami gangguan gizi dan gangguan penyerapan makanan. Rendahnya konsumsi pakan pada kelompok kontrol negatif (F) yang diberi perlakuan berupa infeksi EPEC bukan disebabkan oleh perbedaan protein atau ransum yang dikonsumsi melainkan disebabkan oleh pemberian EPEC sehingga konsumsi pakan mengalami penurunan. Mekanisme adhesi atau perlekatan yang terjadi pada infeksi EPEC melibatkan gen *EPEC adherence factor* (EAF) melalui *Bundle Forming Pili* (BFP). Mekanisme inilah yang menyebabkan perubahan konsentrasi kalsium intraseluler dan arsitektur sitoskeleton di bawah membrane mikrovili, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada mikrovili. Dengan rusaknya mikrovili, menyebabkan hilangnya area penyerapan gizi di usus halus. Oleh karena itu, penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh termasuk protein menjadi terganggu (Astawan, 2011).

Sebagaimana dijelaskan Muliani (2011) bahwa pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh zat-zat makanan yang terkandung dalam makanan (nutrisi). Hal ini terbukti bahwa apabila seekor hewan kekurangan nutrisi atau mengalami defisiensi suatu zat makanan maka laju pertumbuhan hewan tersebut akan terhambat. Peningkatan bobot badan selama pertumbuhan terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi protein tubuh. Penambahan bobot badan ini biasanya digunakan sebagai

parameter pertumbuhan, indikator pertumbuhan itu berupa peningkatan bobot badan per satuan waktu.

1. Uji Induksi *Escherichia coli*

Pada uji induksi *Escherichia coli*, parameter yang diamati yaitu persentase survivalitas mencit dan uji hematologi darah untuk melihat jumlah WBC (*White Blood Cell*) dan Limfosit. Probiotik merupakan mikroba hidup menguntungkan pada makhluk hidup, yang bermanfaat untuk memperbaiki keseimbangan mikroba yang terdapat di dalam saluran pencernaan (Afrianto dan Liviawaty, 2005) dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap fisiologi dan kesehatan inangnya. Senyawa-senyawa racun yang dihasilkan pada metabolisme bakteri probiotik seperti asam laktat, hidrogen peroksida, bakteriosin yang bersifat antimikroba dan antibiotik mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen (Yulinery *et al.*, 2006).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa bakteri asam laktat dari susu fermentasi atau sejenisnya memiliki kemampuan untuk dijadikan sebagai probiotik. Termasuk didalamnya bakteri asam laktat asal Dangke yang telah berhasil diidentifikasi diantaranya yaitu *Enterococcus faecium* dan *Lactobacillus plantarum*.

Tujuan dari pemberian kedua BAL ini yaitu untuk menguji kemampuan antidiare BAL asal dangke tersebut terhadap kemampuan survivalitas mencit (*Mus musculus*) yang ditantang dengan salah satu strain bakteri *E. coli* (EPEC). Kedua BAL ini diharapkan mampu mengendalikan bakteri patogen dalam saluran pencernaan setelah di infeksi dengan EPEC. Dimana menurut Surono (2004),

diketahui bahwa EPEC merupakan bakteri patogen penyebab diare. EPEC melekat pada mukosa usus dan menyebabkan terjadinya perubahan struktur sel, kemudian melakukan invasi menembus sel mukosa.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja probiotik yaitu dengan cara kompetisi untuk mengadakan perlekatan dengan enterosit (sel epitel mukosa). Enterosit yang telah jenuh dengan bakteri probiotik tidak dapat lagi mengadakan perlekatan dengan bakteri lain sehingga dengan adanya bakteri probiotik di dalam mukosa usus dapat mencegah terjadinya kolonisasi oleh bakteri patogen (Reid, 2003).

Untuk mencegah terjadinya diare diperlukan sistem imun mukosa yang baik. Pemberian probiotik dianggap mampu sebagai pencegahan terhadap infeksi gastrointestinal. Keberadaan mikroba alami dalam saluran pencernaan mempunyai peran yang penting dalam menjalankan fungsi regulasi sistem imun mukosa. Mikroba komensal melakukan “crosstalk” dengan sel epitel dan memicu respon imun untuk mencegah proses infeksi (Corthesy *et al.*, 2007).

Menurut (Budino *et al.*, 2005), pemberian probiotik dapat meningkatkan jumlah dan panjang mikrovili usus, beberapa penelitian sebelumnya belum menyebutkan tentang peningkatan lebar mikrovili karena yang lebih ditekankan adalah panjang dari mikrovili. Peningkatan jumlah dan panjang mikrovili dapat memperluas daerah absorpsi makanan sehingga meningkatkan efisiensi kerja usus dalam mencerna makanan. Bakteri probiotik mampu meningkatkan jumlah dan panjang mikrovili karena adanya invasi bakteri ke dalam mikrovili. Probiotik membantu

memodifikasi respons imun dengan mengimbangi melalui peningkatan respons IL-4 dari sel Th2. Pemberian probiotik sebelum terpajan LPS *Escherichia coli* diketahui mampu melindungi kerusakan struktur mukosa usus (Athiyah dkk, 2012).

Hasil penelitian persentase survivalitas mencit setiap perlakuan menunjukkan bahwa kelompok perlakuan C yaitu mencit yang diberi perlakuan BAL *Enterococcus faecium* + EPEC serta kelompok F yang merupakan kontrol positif yaitu mencit yang diberi perlakuan berupa infeksi EPEC dari hari pertama hingga hari ke-21 memiliki persentase *survive* terendah yaitu sebesar 60% dengan jumlah kematian 2 ekor mencit.

Selanjutnya yaitu pada kelompok perlakuan BAL *Lactobacillus plantarum* (D) dan kelompok perlakuan BAL *Lactobacillus plantarum* + EPEC (E) memiliki persentase *survive* 80% dengan jumlah kematian masing-masing 1 ekor mencit. Sedangkan kelompok perlakuan kontrol negatif (A) dan kelompok BAL *Enterococcus faecium* (B) merupakan kelompok dengan persentase *survive* tertinggi yaitu sebesar 100% dengan jumlah kematian mencit tidak ada, dikarenakan kelompok tersebut merupakan kelompok tanpa perlakuan dan pemberian BAL non EPEC sehingga semua proses yang dialami selama pengamatan berlangsung tergolong normal dan tidak mengalami gangguan infeksi apapun dari bakteri *Escherichia coli*.

Hal ini menunjukkan bahwa perlekatan EPEC telah mengakibatkan rusaknya struktur mukosa usus yang menyebabkan terjadinya iritasi dan diare akut pada mencit sehingga menimbulkan kematian pada mencit kelompok kontrol positif (F), kelompok BAL *Enterococcus faecium* + EPEC (C), dan kelompok BAL

Lactobacillus plantarum + EPEC (E) karena adanya induksi EPEC sesuai dengan Coconnier *et al.*, (1993) yang menyatakan bahwa adhesi atau perlekatan bakteri patogen pada permukaan mukosa menjadi tahap awal dari infeksi saluran usus. Perlekatan pada sel epitelial usus tersebut akan mengakibatkan terjadinya kolonisasi, kerusakan pada sel, gangguan mekanisme pengaturan sel, serta pertumbuhan dan perkembangbiakan intraselular.

2. Pengamatan Terjadinya Diare

Diare menempati posisi ke lima dalam daftar penyakit yang menyebabkan timbulnya kematian. Diare seringkali dianggap sebagai penyakit yang sepele, padahal di tingkat global dan nasional menunjukkan fakta yang sebaliknya. Menurut catatan WHO (*World Health Organisation*), diare membunuh dua juta anak di dunia setiap tahun (Amiruddin, 2007).

Diare adalah defekasi encer lebih dari tiga kali sehari dengan/tanpa darah dan/atau lendir dalam tinja. Diare akut adalah diare yang terjadi secara mendadak dan berlangsung kurang dari 7 hari. Bila diare hanya beberapa kali sehari dan berhenti dalam 1-2 hari, hal ini tidak perlu penanganan khusus. Tetapi bila defekasi sering, bisa 8-15 kali sehari, disertai perut mules, feses cair, maka perlu diwaspadai. Penyebab diare bermacam-macam, antara lain adanya infeksi virus (Rotavirus, Adenovirus), infeksi bakteri (*Shigella*, *Salmonella*, *E. coli*), malabsorpsi karbohidrat (intoleransi laktosa), makanan basi, beracun atau alergi terhadap makanan (Mansjoer, *et al.*, 2000).

Bakteri asam laktat telah diketahui mampu menghambat perlekatan dan invasi patogen pada epitel intestinal secara *in vitro*. Penghambatan perlekatan patogen berperan dalam membantu mencegah atau mengurangi infeksi (Matijasic dkk, 2006).

Pada hasil pengamatan terjadinya diare, diperoleh hasil yaitu pada kelompok kontrol negatif (A) tidak mengalami kejadian diare. Hal ini terjadi karena kelompok A merupakan kelompok kontrol negatif yang tidak diberikan perlakuan apapun. Sehingga kondisi mencit tetap dalam keadaan normal tanpa perubahan apapun pada metabolismenya.

Pada kelompok BAL *Enterococcus faecium* (B) dan kelompok BAL *Enterococcus faecium* + EPEC (C) diare terjadi selama masing-masing 1 dan 2 hari pada hari ke-14 namun dianggap sebagai diare ringan karena hanya berlangsung selama 1-2 hari sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap perlakuan.


Pada kelompok BAL *Lactobacillus plantarum* (D) diare terjadi selama 3 hari. ini dapat disebabkan karena pertumbuhan *Lactobacillus plantarum* di dalam usus yang semakin meningkat akibat faktor nutrisi dan lingkungan dalam usus yang cukup baik tanpa adanya patogen sebagai faktor penghambat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan flora normal usus dan mengakibatkan terjadinya diare.

Pada kelompok BAL *Lactobacillus plantarum* + EPEC (E) diare terjadi selama 2 hari dan dianggap sebagai diare ringan. Diare yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh induksi EPEC namun tidak berlangsung lama dikarenakan adanya perlakuan BAL yang membantu menekan pertumbuhan EPEC didalam usus mencit dengan cara menghasilkan zat antimikroba dan menetralkan senyawa toksik yang

dikeluarkan oleh bakteri patogen sehingga diare dapat segera diatasi dengan waktu yang singkat.

Sedangkan pada kelompok kontrol positif (F) diare terjadi selama 5 hari pada hari ke-17 hingga hari ke-21. Ini disebabkan infeksi EPEC yang dilakukan secara terus menerus selama 21 hari sehingga mengakibatkan pertumbuhan EPEC menjadi semakin meningkat setiap harinya yang kemudian menginvasi mukosa usus dan menyebabkan ketidakseimbangan mikroflora pada usus sehingga mengakibatkan terjadinya diare.

Kelompok kontrol positif (F) menunjukkan waktu berlangsung diare yang paling lama karena kelompok F merupakan kelompok kontrol yang diinfeksi EPEC sehingga mengalami diare akut ditandai dengan feses yang lembek dan berair, serta alat kelamin yang berlendir.



Gambar 4.3. Feses Mencit Diare (*Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017*).

Kejadian diare pada tikus yang dipapar EPEC muncul pada minggu kedua pemeliharaan. Tikus yang dipapar EPEC tanpa perlakuan probiotik (F) mengalami diare yang cukup parah yang ditunjukkan dengan durasi atau waktu berlangsungnya diare yang cukup lama, bagian anus mengalami iritasi dan kondisi tubuh tidak aktif bergerak. Berbeda dengan kelompok perlakuan pemberian EPEC yang diberi BAL,

meskipun terjadi diare namun tidak berlangsung lama. Hal ini membuktikan bahwa pemberian BAL mampu menghambat terjadinya diare dengan melakukan perlekatan pada sel mukosa usus sehingga menghambat perlekatan bakteri patogen.

3. Respon Imun Mencit (*Mus musculus*)

Pada uji hematologi (Tabel 4.2) terhadap darah mencit setiap kelompok diketahui bahwa pada kelompok kontrol negatif (A) diketahui jumlah WBC (*White Blood Cell*) yang terdiri atas limfosit, granulosit dan MID (*Minimum Inhibitory Dilusi*) tergolong normal. Ini dikarenakan kelompok A merupakan kelompok tanpa perlakuan.

Pada kelompok pemberian BAL *Enterococcus faecium* (B) dan kelompok pemberian BAL *Lactobacillus plantarum* (D), jumlah sel darah putih, utamanya limfosit mengalami peningkatan sedangkan MID dan granulosit tergolong normal. Peningkatan ini dipengaruhi pemberian BAL terhadap kelompok B yang sebagaimana disebutkan oleh Astawan (2011) bahwa pemberian BAL mempengaruhi sifat imunomodulator yaitu meningkatkan jumlah sel limfosit pada sel limpa.

Pada kelompok pemberian BAL *Enterococcus faecium* dan EPEC (C) dan kelompok BAL *Lactobacillus plantarum* dan EPEC (E), terjadi peningkatan sel darah putih, limfosit dan granulosit. Sebagaimana dijelaskan oleh Herawati dkk, (2011) bahwa terjadinya peningkatan pada granulosit menunjukkan bahwa terjadi infeksi patogen pada seseorang sehingga menimbulkan respon imun dengan mengaktifkan granulosit yang terdiri dari neutrofil yang berfungsi dalam pertahanan terhadap invasi

mikroba melalui fagositosis. Sedangkan menurunnya limfosit dapat menjadi hal yang cukup berbahaya dan menunjukkan bahwa seseorang rentan terhadap infeksi.

Seperti halnya pada kelompok kontrol positif (F) yang menunjukkan jumlah sel limfosit meningkat dari nilai interpretasinya namun jumlah ini cukup rendah disebabkan karena adanya infeksi EPEC yang menyebabkan diare akut hingga mengakibatkan kematian mencit sejumlah 2 ekor kematian.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Guarner, (2011) bahwa probiotik mempengaruhi ekosistem usus dengan merangsang mekanisme kekebalan mukosa usus serta merangsang mekanisme non imun melalui antagonisme dan kompetisi dengan patogen yang potensial. Hal ini merupakan efek menguntungkan dari penggunaan probiotik termasuk dalam mengurangi terjadinya diare ataupun mengurangi parahnya kejadian diare.

Efek yang menguntungkan dari bakteri tersebut dapat mencegah dan mengobati kondisi patologis usus apabila bakteri tersebut diberikan secara oral atau melalui mulut. Sehingga probiotik sering disebut sebagai *Friendly colonizer/ Friendly microorganism* atau mikroorganisme bersahabat (Sudarmo dkk, 2000).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- Hasil pengamatan analisis sidik ragam (ANOVA) terhadap perubahan berat badan diperoleh $p = 0.111 > 0.05$ maka perubahan berat badan tidak berpengaruh nyata terhadap perlakuan. Sedangkan pada pengamatan analisis sidik ragam (ANOVA) terhadap perubahan konsumsi pakan menunjukkan perbedaan nyata yaitu $p = 0.000 < 0.005$ yang bermakna bahwa konsumsi pakan berpengaruh terhadap perlakuan. Dimana pada uji Tukey HSD menunjukkan bahwa kelompok kontrol positif merupakan kelompok yang memiliki jumlah konsumsi pakan terendah disusul oleh kelompok B, E, D, dan C sedangkan kelompok A kontrol negatif memiliki jumlah konsumsi pakan tertinggi.
- Pada pengamatan terjadinya diare dan survivalitas mencit, kelompok dengan durasi diare yang paling lama adalah kelompok kontrol positif F yaitu selama 5 hari dengan tingkat survivalitas 60% disebabkan infeksi EPEC. Kemudian pada kelompok A, tidak terjadi diare dengan tingkat survivalitas 100%, kelompok B, terjadi diare selama 1 hari dengan tingkat survivalitas 100%, kelompok C terjadi diare selama 1 hari dengan tingkat survivalitas 60%.

kelompok D dan E terjadi diare selama 2 hari dengan tingkat survivalitas 80%.

- Pada induksi diare, respon imun pada kelompok kontrol negatif (A) dan pemberian BAL (B, C, D dan E) lebih baik dibanding kelompok kontrol positif (F).
- Bakteri asam laktat asal dangke memiliki kemampuan untuk meningkatkan konsumsi ransum, menghambat terjadinya diare dan mengurangi tingkat kematian mencit yang disebabkan oleh EPEC namun tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan berat badan. *Enterococcus faecium* lebih berpotensi sebagai antidiare dibanding *Lactobacillus plantarum*.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlunya dilakukan penelitian lanjutan berupa pengamatan jumlah sel limfosit untuk mengetahui status imun dari hewan uji yang diberi perlakuan BAL asal dangke ini apakah mampu ataupun tidaknya BAL ini meningkatkan respon imun, khususnya sel limfosit yang merupakan sel kunci dalam proses imun spesifik yaitu mengenali antigen.

KEPUSTAKAAN

- Adawiah, Siti Rabiatul. Ketahanan Bakteri Asam Laktat Asal Dangke Terhadap Garam Empedu sebagai Salah Satu Kandidat Probiotik. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin. 2014.
- Afrianto E dan Liviawaty E. *Pakan Ikan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Amiruddin, R. *Current Issue Kematian Anak Akibat Diare*. Makasar : Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Epidemiologi Universitas Hasanuddin, 2007.
- Antoine, Moussiaux, N, S Magez and D Desmecht. Contributions of experimental mouse models to the understanding of African trypanosomiasis. *Trends in Parasitology*. (2008): p. 24 (9) : 411–418.
- Biggers, J. P., L. M. Rinaldini, and M. Webb. *The Biological Action of Growth Substances*. New York: Academic Press Inc, 1969.
- Buckle, K. A, R. A Edwards, G. H Fleet and M. Wotoon. *Ilmu Pangan Terjemahan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.
- Budiño, F. E. L., M. C. Thomaz, R. N. Kronka, L. S. O. Nakaghi, F. M. Tucci, A. L. Fraga, A. J. Scandolera, R. A. R. Huaynate. Effect of Probiotic and Prebiotic Inclusion in Weaned Piglet Diets on Structure and Ultra-structure of Small Intestine. *Brazilian Archives of Biology and Technology*. Vol. 48 No. 6 (2005): p.
- Carmona, TMP, J Garrizzo, A Roschman-González, F Tejero, A Escalante and PM Aso. Susceptibility of different mouse strains to experimental infection with a Venezuelan isolate of *Trypanosoma evansi*. *J. Protozool*. (2006): p. Res. 16 : 1-8.
- Claesson, M. J., D. V. Sinderen, and P. W. O'Toole. The genus *Lactobacillus*– a genomic basis for understanding its diversity. *FEMS Microbiol. Lett*. (2007): p. 269: 22-28
- Collier, L. *Microbiology and Microbial Infections*, Edisi 9, 935 – 939, New York: Oxford University Press, Inc, 1998.

- Collado CM, Surono IS, Meriluoto J & Salminen S. Indigenous Dadih Lactic Acid Bacteria: Cell-Surface Properties and Interaction with Pathogens. *Journal of Food Science*. (2007): p. 72:3:89-93
- Corthesy B, Gaskins HR, Mercenier A. Cross-talk between probiotic bacteria and the host immune system. *J. Nutr.* (2007): p. 137:781S-790S.
- De-Menezes VT, AO Queiroz, MAM Gomes, MAP Marques, and AM Jansen. 2004. *Trypanosoma evansi* in inbred and Swiss-Webster mice : distinct aspects of pathogenesis. *Parasitol.*(2004): p. *Res.* 94 : 193-200.
- Drisko JA, Giles CK & Bischoff BJ. Probiotics in Health Maintenance and Disease Prevention. *Alternative Medicine Review*. (2003): p. 8:2.
- Rachmawati, Fitri. Efek Antidiare Berbagai Komposisi Probiotik Pada Mencit Yang Diinduksi Diare. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2016.
- Guarner, F. Probiotics and Prebiotics. *Probiotics and Prebiotics-World Gastroenterology Organisation Global Guidelines*. (2011): p. 3-4
- Guerra, N.P., Bernardez, P.F., Mendez, J., Cachaldora, P., Castro, L.P., , “Production of Four Potentially Probiotic Lactic Acid Bacteria and Their Evaluation as Feed Additives for Weaned Piglets, Animal Feed” *Science and Technology*. (2006): p. 134: 89-107.
- Hartina, R. Uji Proteksi Antibodi Pada Mencit (*Mus musculus*) ICR Jantan yang Diimunisasi dengan Antigen Outer Membran Protein (OMP) 36 kDa *Salmonella typhi* sebagai Kandidat Imunodiagnostik Demam Tifoid. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin. 2016.
- Hikmah, Nur. Daya Hambat Bakteri Asam Laktat Asal Dangke terhadap Pertumbuhan Bakteri Gram Negatif sebagai Kandidat Probiotik. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin. 2014.
- Holzappel, W.H., Haberer, P., Geisen, R., Bjorkroth, J., and Schillinger. “Taxonomy and Important Features of Probiotic Microorganism in food and Nutrition”. *The American Journal of Clinical Nutrition*. (2001): p.
- Howarth, G.S. Wang, H. Role of endogenous microbiota probiotics and their biological products in human health. *Nutrients*. Vol. 5, No. 1 (2013): p.2. 65-66.
- Jawetz. *Mikrobiologi Kedokteran*, Edisi 20, 238 – 240. Jakarta: EGC, 1996.

- J. H. L. Playfair dan B.M. Chain, *Immunology at Glance* 7th Edition, Blackwell Publishing (2001).
- Kanbe, M. *a Cancer control and fermented milk. dalam: Functions of Fermented Milk*. Nakazawa, Y dan Hosono, A. (Eds). London, New York: Elsevier Appl. Sci, 1992.
- Kelleher, S. I. Casas, N. Carbaja, & B. Lonnedal. Supplementation of infant formula with the probiotic *Lactobacillus reuteri* and zinc : impact on enteric infection nutrition in infant rhesus monkeys. "J. Pediatr Gastroenterol" (2002): p. Nutr. 35 : 162-168.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Lewenstein A., Frigerio G., Moroni M. Biological properties of SF68, a new approach for the treatment of diarrheal diseases. *Current Therapeutic Research* (1979): p. 26: 967–981.
- Malole, M.B.M. dan C.S.U. Pramono. *Penggunaan hewan-hewan percobaan di laboratorium*. Bogor: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Pusat Antar Universitas Bioteknologi, IPB, 1989.
- Mansjoer, A, Suprohaitan, Wahyu, IW, & Wiwiek, S. *Kapita Selekta Kedokteran, Edisi 3, Cetakan II*. Jakarta: Media Aesculapius, 2000.
- Marzouk MS, Moustafa MM, Nermeen, and Mohamed M. The Influence of Some Probiotic on The Growth Performance and Intestinal Microbial Flora of O. NILOTICUS. *International Symposium on Tilapia in Aquaculture*. (2008):p. 1059-1071.
- Matijasic, B. B., M. Narat, M. Z. Peternel, I. Rogelj. Ability of *Lactobacillus gasseri* K7 to Inhibit *Escherichia coli* Adhesion In Vitro on Caco-2 cells and Ex Vivo on Pigs' Jejunal Tissue. *International Journal of Food Microbiology*. (2006): p. 107 (92 – 96).
- Mitsuoka, T. *A Profile of Intestinal Bacteria*. Tokyo: Yakult Honsha Co., Ltd, 1990. Hal. 21; 36-37
- Muliani, Hirawati. "Pertumbuhan Mencit (*Mus Musculus* L.) Setelah Pemberian Biji Jarak Pagar (*Jatropha curcas* L.)" *Jurnal Buletin Anatomi dan Fisiologi* Vol. XIX, No. 1, (Maret 2011): h.
- Nitisinprasert, S., N. Pungsungworn, P. Wanchaitanawong, G. Loiseau, & D. Montet. "In vitro adhesion assay of lactic acid bacteria, *Escherichia coli* and

Salmonella sp. by microbiological and PCR methods”. *Songklanakarinn J. Sci. Technol* (2006): p. No. 28 (suppl.1) 99-106.

Pradana, Adi. Performa Mencit (*Mus musculus*) Jantan Lepas Sapih Umur 21-39 Hari Dengan Pemberian Cacing Tanah (*Lumbricus rubellus*) Sebagai Pakan Tambahan. Bogor: Fakultas Peternakan Institut Peternakan Bogor, 2012.

Priyambodo, S. *Pengendalian Hama Tikus Terpadu*. Ed ke-3. Jakarta: Penebar Swadaya, 2003.

Rahayu, E. “Potensi Bakteri Asam Laktat di Bidang Industri Pangan”. Prosiding Seminar Ilmiah Tahunan Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia. Makassar, 2001.

Razak, A.R., A.R. Patong, T. Harlim, M.N. Djide, Haslia, dan Mahdalia. *J. Kim. Tad.* Vol.9(2) (2008):p. 17-29.

Reddy G, M Altaf, BJ Naveena, M Venkateshwar, & EV Kumar. “Amylolytic bacterial lactic acid fermentation” - A review. *J Elsevier- Biotechnol Adv* (2008): p. 26: 22–34.

Reid G, Jass J, Sebulsky MT, McCormick JK. Potential uses of probiotics in clinical practice. *Clin Microbiol Rev* (2003). p:16:658-72.

Rostika, Ika Dian. Daya Antimikroba Bakteri Asam Laktat dari Limbah Pembuatan Dangke terhadap Bakteri Patogen. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2015.

Schiffirin, E.J., F. Rochat, H. Link-Amster, J.M. Aeschlimann dan A. Donnet-Hughes. “Immunomodulation of human blood cells following the ingestion of lactic acid bacteria”. *J. Dairy Sci.* (1995): p. 78: 491-497.

Smith, B. J. dan S. Mangkoewidjojo. *Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan di Daerah Tropis Indonesia*. Jakarta: University Press, 1988.

Sudarmo SM, Ranuh RG, Djupri LS, Suparto P. *Peranan Prebiotik dan Probiotik Dalam Upaya Pencegahan Diare pada Anak*. Dalam: Soegijanto S, dkk. *Pediatri Pencegahan Mutakhir I, Continuing Education Ilmu Kesehatan Anak*. Surabaya: FK Unair, 2000.

Sugiarto, Netty Febriyanti. Efektivitas Antidiare dari Jamu DNR pada Mencit yang Telah di Induksi dengan Minyak Jarak. *Skripsi*. Jakarta: FMIPA-Universitas Indonesia, 2008.

Surono, Ingrid S. *Probiotik: Susu Fermentasi dan Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia, 2004.

Tjay, T. H. dan Rahardja K. *Obat-obat Penting Edisi VI*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2010.

Yulinery T, Yulianto E, dan Nurhidayat N. Uji Fisiologis Probiotik *Lactobacillus* sp. Mar 8 Yang Telah Dienkapsulasi dengan Menggunakan *Spray Dryer* Untuk Menurunkan Kolesterol. *Jurnal Biodiversitas*. Vol 7(2) (2006). h: 118-122.



Lampiran 1. Data Penimbangan Berat Badan Mencit

1. Hari Ke-0 (Kamis, 09 Februari 2017)

No.	Kelompok	Berat Badan Mencit ke-					Ket
		1	2	3	4	5	
1	A	22,7	22,7	21,5	18,0	18,1	
2	B	22,5	23,2	21,4	23,5	33,4	
3	C	19,6	25,2	18,3	22,4	19,4	
4	D	21,5	21,7	33,7	18,3	33,8	
5	E	26,6	17,8	25,6	21,7	24,0	
6	F	20,9	22,4	19,5	24,6	19,7	

2. Hari Ke-3 (Minggu, 12 Februari 2017)

No.	Kelompok	Berat Badan Mencit ke-					Ket
		1	2	3	4	5	
1	A	25,5	25,2	23,1	19,9	19,0	
2	B	24,0	24,8	25,4	33,4	35,1	
3	C	21,3	27,5	21,4	24,7	22,3	
4	D	22,8	23,7	33,8	21,8	35,7	
5	E	26,0	15,6	27,1	23,4	25,6	
6	F	23,7	20,5	21,5	26,0	23,0	

3. Hari Ke-6 (Rabu, 15 Februari 2017)

No.	Kelompok	Berat Badan Mencit ke-					Ket
		1	2	3	4	5	
1	A	25,7	24,7	23,3	21,2	19,1	
2	B	20,8	29,5	25,4	32,4	34,7	
3	C	21,3	27,0	22,0	25,8	19,4	
4	D	22,5	22,8	33,9	22,0	30,1	
5	E	24,7	17,0	27,2	22,3	33,7	
6	F	23,9	16,9	21,2	25,8	23,3	

4. Hari Ke-9 (Sabtu, 18 Februari 2017)

No.	Kelompok	Berat Badan Mencit ke-					Ket
		1	2	3	4	5	
1	A	26,3	26,0	25,0	23,8	19,9	
2	B	26,1	30,0	25,9	32,7	36,5	
3	C	20,4	28,6	22,5	28,3	22,5	
4	D	24,5	34,2	34,6	23,6	32,3	
5	E	26,3	15,7	28,2	19,8	34,8	
6	F	25,1	14,7	20,3	26,5	22,3	

5. Hari Ke-12 (Selasa, 21 Februari 2017)

No.	Kelompok	Berat Badan Mencit ke-					Ket
		1	2	3	4	5	
1	A	27,6	27,3	26,3	24,4	21,2	
2	B	25,1	29,1	26,1	31,8	35,8	
3	C	M	28,2	M	27,6	22,7	
4	D	23,9	34,3	34,1	23,8	29,9	
5	E	23,2	16,0	28,0	M	30,2	
6	F	25,7	M	M	26,6	24,9	

6. Hari Ke-15 (Jum'at, 24 Februari 2017)

No.	Kelompok	Berat Badan Mencit ke-					Ket
		1	2	3	4	5	
1	A	28,0	27,5	26,8	25,0	21,7	
2	B	24,6	28,8	26,0	32,3	35,8	
3	C	M	28,3	M	28,2	23,6	
4	D	23,5	34,0	34,0	24,2	25,1	
5	E	24,0	15,9	27,3	M	31,5	
6	F	27,0	M	M	27,2	23,6	

7. Hari Ke-18 (Senin, 27 Februari 2017)

No.	Kelompok	Berat Badan Mencit ke-					Ket
		1	2	3	4	5	
1	A	28,1	27,7	26,9	25,1	21,9	
2	B	24,2	27,4	26,4	32,2	36,0	
3	C	M	29,3	M	29,7	23,6	
4	D	24,5	33,9	34,1	25,0	M	
5	E	25,0	16,0	28,0	M	31,5	
6	F	26,0	M	M	27,2	25,0	

8. Hari Ke-21 (Kamis, 02 Februari 2017)


No.	Kelompok	Berat Badan Mencit ke-					Ket
		1	2	3	4	5	
1	A	29,3	28,3	27,7	26,2	23,2	
2	B	24,3	29,6	27,3	32,3	37,2	
3	C	M	29,6	M	29,6	24,4	
4	D	25,5	33,8	34,2	25,6	M	
5	E	25,9	15,4	28,5	M	32,0	
6	F	26,0	M	M	25,5	26,7	

Lampiran 2. Data Rata-Rata Perubahan Berat Badan Mencit


Kelompok	Perubahan Berat Badan Mencit Hari Ke-							
	0	3	6	9	12	15	18	21
A	20,6	22,54	22,8	24,2	25,36	25,8	25,94	26,94
B	24,8	28,54	28,56	30,24	29,58	29,5	29,24	30,14
C	20,98	23,44	23,1	24,46	26,17	26,7	27,5	27,87
D	20,68	27,16	26,26	29,84	29,2	28,16	29,3	29,7
E	23,14	23,54	24,98	24,96	24,35	24,7	25,1	25,45
F	21,42	22,94	22,22	21,78	25,7	25,9	26,1	26,1

Lampiran 3. Data Hasil Pengamatan Feses Mencit Hari ke-14 s/d Hari ke-21

Hari ke-14



Feses Mencit Kelompok A



Feses Mencit Kelompok B



Feses Mencit Kelompok C



Feses Mencit Kelompok D




Feses Mencit Kelompok E



Feses Mencit Kelompok F


Hari Ke-15




Feses Mencit Kelompok A




Feses Mencit Kelompok B



Feses Mencit Kelompok C



Feses Mencit Kelompok D



Feses Mencit Kelompok E




Feses Mencit Kelompok F


Hari ke-16




Feses Mencit Kelompok A




Feses Mencit Kelompok B



Feses Mencit Kelompok C



Feses Mencit Kelompok D



Feses Mencit Kelompok E




Feses Mencit Kelompok F


Hari ke-17




Feses Mencit Kelompok A




Feses Mencit Kelompok B




Feses Mencit Kelompok C



Feses Mencit Kelompok D




Feses Mencit Kelompok E




Feses Mencit Kelompok F


Hari ke-18




Feses Mencit Kelompok A




Feses Mencit Kelompok B



Feses Mencit Kelompok C



Feses Mencit Kelompok D




Feses Mencit Kelompok E




Feses Mencit Kelompok F


Hari ke-19




Feses Mencit Kelompok A



Feses Mencit Kelompok B




Feses Mencit Kelompok C



Feses Mencit Kelompok D




Feses Mencit Kelompok E




Feses Mencit Kelompok F

Hari ke-20




Feses Mencit Kelompok A



Feses Mencit Kelompok B



Feses Mencit Kelompok C



Feses Mencit Kelompok D




Feses Mencit Kelompok E




Feses Mencit Kelompok F


Hari ke-21




Feses Mencit Kelompok A




Feses Mencit Kelompok B




Feses Mencit Kelompok C



Feses Mencit Kelompok D



Feses Mencit Kelompok E



Feses Mencit Kelompok F

Lampiran 4. Data Perhitungan Sisa Ransum

Kelompok	Mencit Ke-	Sisa Ransum Hari Ke-							
		0	3	6	9	12	15	18	21
A	1	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03
	2	0,04	0,2	0,08	0,06	0,06	0,04	0,05	0,02
	3	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04	0,03	0,02	0,02
	4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04
	5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
B	1	0,4	0,7	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,4
	2	0,4	0,8	0,4	0,4	1,1	1,3	1,1	0,8
	3	0,7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
	4	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5
	5	0,7	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7
C	1	0,5	0,3	0,3	0,3	M	M	M	M
	2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2
	3	0,7	0,5	0,8	0,5	M	M	M	M
	4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7
	5	0,6	0,4	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5
D	1	0,6	0,4	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2
	2	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
	3	1,1	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,5
	4	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
	5	0,7	0,5	0,8	0,6	1,4	2,7	M	M
E	1	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,4
	2	0,5	0,8	0,5	0,8	0,7	2,0	0,4	1,2
	3	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3
	4	0,7	0,6	0,6	0,9	M	M	M	M
	5	1,4	1,3	0,6	0,6	0,5	0,8	0,7	0,7
F	1	1,2	0,9	1,0	0,8	0,9	1,2	1,2	1,0
	2	0,8	0,7	1,0	1,2	M	M	M	M
	3	1,0	0,8	1,3	1,2	M	M	M	M
	4	0,8	0,6	0,6	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9
	5	0,9	1,3	1,1	0,8	1,2	1,5	1,5	1,4

Lampiran 5. Hasil Uji Statistik Anova (Analysist Of Varian) Perubahan Berat Badan

Oneway**ANOVA**

Berat Badan					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Antara kelompok	.323	5	.065	2.025	.111
Antar-kelompok	.766	24	.032		
Total	1.090	29			

Post Hoc Tests**Homogeneous Subsets****Berat Badan**

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	
Tukey HSD ^a	E	5	.0760	
	F	5	.1220	
	C	5	.1560	
	B	5	.2520	
	A	5	.3000	
	D	5	.3720	
	Sig.		.131	
Duncan ^a	E	5	.0760	
	F	5	.1220	.1220
	C	5	.1560	.1560
	B	5	.2520	.2520
	A	5	.3000	.3000
	D	5		.3720
	Sig.		.087	.057

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

Lampiran 6. Hasil Uji Statistik Anova (Analysist Of Varian) Konsumsi Pakan

Oneway**ANOVA**

Konsumsi Pakan

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Antara kelompok	3.942	5	.788	65.741	.000
Antar-kelompok	.504	42	.012		
Total	4.446	47			

Post Hoc

Multiple Comparisons							
Dependent Variable:Konsumsi Pakan							
	(I)	(J)	Mean			95% Confidence Interval	
	Kelom	Kelom	Difference (I-	Std. Error	Sig.	Lower	Upper
	pok	pok	J)			Bound	Bound
Tukey HSD	A	B	.62125*	.05476	.000	.4578	.7847
		C	.37625*	.05476	.000	.2128	.5397
		D	.44813*	.05476	.000	.2847	.6116
		E	.58062*	.05476	.000	.4172	.7441
		F	.95125*	.05476	.000	.7878	1.1147
	B	A	-.62125*	.05476	.000	-.7847	-.4578
		C	-.24500*	.05476	.001	-.4085	-.0815
		D	-.17312*	.05476	.032	-.3366	-.0097
		E	-.04062	.05476	.975	-.2041	.1228
		F	.33000*	.05476	.000	.1665	.4935

	C	A	-.37625*	.05476	.000	-.5397	-.2128
		B	.24500*	.05476	.001	.0815	.4085
		D	.07188	.05476	.776	-.0916	.2353
		E	.20438*	.05476	.007	.0409	.3678
		F	.57500*	.05476	.000	.4115	.7385
	D	A	-.44813*	.05476	.000	-.6116	-.2847
		B	.17312*	.05476	.032	.0097	.3366
		C	-.07188	.05476	.776	-.2353	.0916
		E	.13250	.05476	.173	-.0310	.2960
		F	.50312*	.05476	.000	.3397	.6666
	E	A	-.58062*	.05476	.000	-.7441	-.4172
		B	.04062	.05476	.975	-.1228	.2041
		C	-.20438*	.05476	.007	-.3678	-.0409
		D	-.13250	.05476	.173	-.2960	.0310
		F	.37062*	.05476	.000	.2072	.5341
	F	A	-.95125*	.05476	.000	-1.1147	-.7878
		B	-.33000*	.05476	.000	-.4935	-.1665
		C	-.57500*	.05476	.000	-.7385	-.4115
		D	-.50312*	.05476	.000	-.6666	-.3397
		E	-.37062*	.05476	.000	-.5341	-.2072
LSD	A	B	.62125*	.05476	.000	.5107	.7318
		C	.37625*	.05476	.000	.2657	.4868
		D	.44813*	.05476	.000	.3376	.5586
		E	.58062*	.05476	.000	.4701	.6911
		F	.95125*	.05476	.000	.8407	1.0618
	B	A	-.62125*	.05476	.000	-.7318	-.5107
		C	-.24500*	.05476	.000	-.3555	-.1345
		D	-.17312*	.05476	.003	-.2836	-.0626

		E	-.04062	.05476	.462	-.1511	.0699
		F	.33000*	.05476	.000	.2195	.4405
	C	A	-.37625*	.05476	.000	-.4868	-.2657
		B	.24500*	.05476	.000	.1345	.3555
		D	.07188	.05476	.196	-.0386	.1824
		E	.20438*	.05476	.001	.0939	.3149
		F	.57500*	.05476	.000	.4645	.6855
		D	A	-.44813*	.05476	.000	-.5586
	B		.17312*	.05476	.003	.0626	.2836
	C		-.07188	.05476	.196	-.1824	.0386
	E		.13250*	.05476	.020	.0220	.2430
	F		.50312*	.05476	.000	.3926	.6136
	E		A	-.58062*	.05476	.000	-.6911
		B	.04062	.05476	.462	-.0699	.1511
		C	-.20438*	.05476	.001	-.3149	-.0939
		D	-.13250*	.05476	.020	-.2430	-.0220
		F	.37062*	.05476	.000	.2601	.4811
		F	A	-.95125*	.05476	.000	-1.0618
	B		-.33000*	.05476	.000	-.4405	-.2195
	C		-.57500*	.05476	.000	-.6855	-.4645
	D		-.50312*	.05476	.000	-.6136	-.3926
	E		-.37062*	.05476	.000	-.4811	-.2601
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.							

Homogeneous**Konsumsi Pakan**

		N	Subset for alpha = 0.05				
			1	2	3	4	5
Tukey HSD ^a	F	8	1.9600				
	B	8		2.2900			
	E	8		2.3306	2.3306		
	D	8			2.4631	2.4631	
	C	8				2.5350	
	A	8					2.9112
	Sig.			1.000	.975	.173	.776
Duncan ^a	F	8	1.9600				
	B	8		2.2900			
	E	8		2.3306			
	D	8			2.4631		
	C	8			2.5350		
	A	8				2.9112	
	Sig.			1.000	.462	.196	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 8.000.

Lampiran 7. Hasil Perhitungan Mortalitas dan Survivalitas Mencit

$$1. \text{Mortalitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah mencit yang mati}}{\text{Jumlah mencit dalam kelompok}} \times 100\%$$

$$A = \frac{0}{5} \times 100\% = 0 \%$$

$$B = \frac{0}{5} \times 100\% = 0 \%$$

$$C = \frac{2}{5} \times 100\% = 40 \%$$

$$D = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

$$E = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

$$F = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

$$2. \text{ Survivalitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah mencit yang hidup}}{\text{Jumlah mencit dalam kelompok}} \times 100\%$$

$$A = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$


$$B = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

$$C = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

$$D = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

$$E = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

$$F = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$



Lampiran 8. Perhitungan Perubahan Berat Badan Harian (PBBH)

$$\text{PBBH} = \frac{\text{BBt}_0 - \text{BBt}_3}{3}$$

1. Kelompok A

Hari ke 3

$$A1 = \frac{25,5 - 22,7}{3} = \frac{2,8}{3} = 0,93$$

$$A2 = \frac{25,2 - 22,7}{3} = \frac{2,5}{3} = 0.83$$

$$A3 = \frac{23.1 - 21.5}{3} = \frac{1.6}{3} = 0.53$$

$$A4 = \frac{19.9 - 18.0}{3} = \frac{1.9}{3} = 0.63$$

$$A5 = \frac{19.0 - 18.1}{3} = \frac{0.9}{3} = 0.3$$

Hari ke 6

$$A1 = \frac{25.7 - 25.5}{3} = \frac{0.2}{3} = 0.07$$

$$A2 = \frac{24.7 - 25.2}{3} = \frac{0.5}{3} = -0.17$$

$$A3 = \frac{23.3 - 23.1}{3} = \frac{0.2}{3} = 0.93$$

$$A4 = \frac{21.2 - 19.9}{3} = \frac{1.3}{3} = 0.43$$

$$A5 = \frac{19,1 - 19,0}{3} = \frac{0,1}{3} = 0.03$$

Hari ke 9

$$A1 = \frac{26.3 - 25.7}{3} = \frac{0.6}{3} = 0.2$$

$$A2 = \frac{26.0 - 24.7}{3} = \frac{1.3}{3} = 0.43$$

$$A3 = \frac{25.0 - 23.3}{3} = \frac{1.7}{3} = 0.57$$

$$A4 = \frac{23.8 - 21.2}{3} = \frac{2.6}{3} = 0.87$$

$$A5 = \frac{19.9 - 19.1}{3} = \frac{0.8}{3} = 0.27$$

Hari ke 12

$$A1 = \frac{27.6 - 26.3}{3} = \frac{1.3}{3} = 0.43$$

$$A2 = \frac{27.3 - 26.0}{3} = \frac{1.3}{3} = 0.43$$

$$A3 = \frac{26.3 - 25.0}{3} = \frac{1.3}{3} = 0.43$$

$$A4 = \frac{24.4 - 23.8}{3} = \frac{0.4}{3} = 0.13$$

$$A5 = \frac{21.2 - 19.9}{3} = \frac{1.3}{3} = 0.43$$

Hari ke 15

$$A1 = \frac{28.0 - 27.6}{3} = \frac{0.4}{3} = 0.13$$

$$A2 = \frac{27.5 - 27.3}{3} = \frac{0.2}{3} = 0.07$$

$$A3 = \frac{26.8 - 26.3}{3} = \frac{0.5}{3} = 0.17$$

$$A4 = \frac{25.0 - 24.4}{3} = \frac{0.6}{3} = 0.2$$

$$A5 = \frac{21.7 - 21.2}{3} = \frac{0.5}{3} = 0.17$$

Hari ke 18

$$A1 = \frac{28.1 - 28.0}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$A2 = \frac{27.7 - 27.5}{3} = \frac{0.2}{3} = 0.07$$

$$A3 = \frac{26.9 - 26.8}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$A4 = \frac{25.1 - 25.0}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$A5 = \frac{21.9 - 21.7}{3} = \frac{0.2}{3} = 0.07$$

Hari ke 21

$$A1 = \frac{29.3 - 28.1}{3} = \frac{1.2}{3} = 0.4$$

$$A2 = \frac{28.3 - 27.7}{3} = \frac{0.6}{3} = 0.2$$

$$A3 = \frac{27.7 - 26.9}{3} = \frac{0.8}{3} = 0.27$$

$$A4 = \frac{26.2 - 25.1}{3} = \frac{1.1}{3} = 0.37$$

$$A5 = \frac{23.2 - 21.9}{3} = \frac{1.3}{3} = 0.43$$

2. Kelompok B

Hari ke 3

$$B1 = \frac{24.0 - 22.5}{3} = \frac{1.5}{3} = 0.5$$

$$B2 = \frac{24.8 - 23.2}{3} = \frac{1.6}{3} = 0.53$$

$$B3 = \frac{25.4 - 21.4}{3} = \frac{4.0}{3} = 1.3$$

$$B4 = \frac{33.4 - 23.5}{3} = \frac{9.9}{3} = 3.3$$

$$B5 = \frac{35.1 - 33.4}{3} = \frac{1.7}{3} = 0.57$$

Hari ke 6

$$B1 = \frac{20.8 - 24.0}{3} = \frac{-3.2}{3} = -1.07$$

$$B2 = \frac{29.5 - 24.8}{3} = \frac{4.7}{3} = 1.56$$

$$B3 = \frac{25.4 - 25.4}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

$$B4 = \frac{32.4 - 33.4}{3} = \frac{-1}{3} = -0.33$$

$$B5 = \frac{34.7 - 35.1}{3} = \frac{-0.4}{3} = -0.13$$

Hari ke 9

$$B1 = \frac{26.1 - 20.8}{3} = \frac{5.3}{3} = 1.77$$

$$B2 = \frac{30.0 - 29.5}{3} = \frac{0.5}{3} = 0.17$$

$$B3 = \frac{25.9 - 25.4}{3} = \frac{0.4}{3} = 0.17$$

$$B4 = \frac{32.7 - 32.4}{3} = \frac{0.3}{3} = 0.1$$

$$B5 = \frac{36.5 - 34.7}{3} = \frac{1.8}{3} = 0.6$$

Hari ke 12

$$B1 = \frac{25.1 - 26.1}{3} = \frac{-1}{3} = -1.07$$

$$B2 = \frac{29.1 - 30.0}{3} = \frac{-0.9}{3} = -0.3$$

$$B3 = \frac{26.1 - 25.9}{3} = \frac{0.2}{3} = 0.07$$

$$B4 = \frac{31.8 - 32.7}{3} = \frac{-0.9}{3} = -0.3$$

$$B5 = \frac{35.8 - 36.5}{3} = \frac{-0.7}{3} = -0.23$$

Hari ke 15

$$B1 = \frac{24.6 - 25.1}{3} = \frac{-0.5}{3} = -0.16$$

$$B2 = \frac{28.8 - 29.1}{3} = \frac{-0.3}{3} = -0.1$$

$$B3 = \frac{26.0 - 26.1}{3} = \frac{-0.1}{3} = -0.03$$

$$B4 = \frac{32.3 - 31.8}{3} = \frac{0.5}{3} = 0.16$$

$$B5 = \frac{35.8 - 35.8}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

Hari ke 18

$$B1 = \frac{24.2 - 24.6}{3} = \frac{-0.4}{3} = -0.13$$

$$B2 = \frac{27.4 - 28.8}{3} = \frac{-1.4}{3} = -0.47$$

$$B3 = \frac{26.4 - 26.0}{3} = \frac{0.4}{3} = 0.13$$

$$B4 = \frac{32.2 - 32.3}{3} = \frac{-0.09}{3} = -0.03$$

$$B5 = \frac{36.0 - 35.8}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.07$$

Hari ke 21

$$B1 = \frac{24.3 - 24.2}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.03$$

$$B2 = \frac{29.6 - 27.4}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.73$$

$$B3 = \frac{27.3 - 26.4}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.3$$

$$B4 = \frac{32.3 - 32.2}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$B5 = \frac{37.2 - 36.0}{3} = \frac{1.2}{3} = 0.4$$

3. Kelompok C

Hari ke 3

$$C1 = \frac{21.3 - 19.6}{3} = \frac{1.7}{3} = 0.57$$

$$C2 = \frac{27.5 - 25.2}{3} = \frac{2.3}{3} = 0.77$$

$$C3 = \frac{21.4 - 18.3}{3} = \frac{3.1}{3} = 1.03$$

$$C4 = \frac{24.7 - 22.4}{3} = \frac{2.3}{3} = 0.77$$

$$C5 = \frac{22.3 - 19.4}{3} = \frac{2.9}{3} = 0.97$$

Hari ke 6

$$C1 = \frac{25.5 - 22.7}{3} = \frac{2.8}{3} = 0.93$$

$$C2 = \frac{25.5 - 22.7}{3} = \frac{2.8}{3} = 0.93$$

$$C3 = \frac{25.5 - 22.7}{3} = \frac{2.8}{3} = 0.93$$

$$C4 = \frac{25.5 - 22.7}{3} = \frac{2.8}{3} = 0.93$$

$$C5 = \frac{25.5 - 22.7}{3} = \frac{2.8}{3} = 0.93$$

Hari ke 9

$$C1 = \frac{20.4 - 21.3}{3} = \frac{-0.9}{3} = -0.3$$

$$C2 = \frac{28.6 - 27.0}{3} = \frac{1.6}{3} = 0.53$$

$$C3 = \frac{22.5 - 22.0}{3} = \frac{0.5}{3} = 0.17$$

$$C4 = \frac{28.3 - 25.8}{3} = \frac{2.5}{3} = 0.83$$

$$C5 = \frac{22.5 - 19.4}{3} = \frac{3.1}{3} = 1.03$$

Hari ke 12

$$C1 = \text{Mati}$$

$$C2 = \frac{28.2 - 28.6}{3} = \frac{-0.4}{3} = -0.13$$

$$C3 = \text{Mati}$$

$$C4 = \frac{27.6 - 28.3}{3} = \frac{-0.7}{3} = -0.23$$

$$C5 = \frac{22.7 - 22.5}{3} = \frac{0.2}{3} = 0.07$$

Hari ke 15

$$C1 = \text{Mati}$$

$$C2 = \frac{28.3 - 28.2}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$C3 = \text{Mati}$$

$$C4 = \frac{28.2 - 27.6}{3} = \frac{0.6}{3} = 0.2$$

$$C5 = \frac{23.6 - 22.7}{3} = \frac{0.9}{3} = 0.3$$

Hari ke 18

C1 = Mati

$$C2 = \frac{29.3 - 28.3}{3} = \frac{1}{3} = 0.33$$

C3 = Mati

$$C4 = \frac{29.7 - 28.2}{3} = \frac{1.5}{3} = 0.5$$

$$C5 = \frac{23.6 - 23.6}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

Hari ke 21

C1 = Mati

$$C2 = \frac{29.6 - 29.3}{3} = \frac{0.3}{3} = 0.1$$

C3 = Mati

$$C4 = \frac{29.6 - 29.7}{3} = \frac{-0.1}{3} = -0.03$$

$$C5 = \frac{24.4 - 23.6}{3} = \frac{0.8}{3} = 0.27$$

4. Kelompok D

Hari ke 3

$$D1 = \frac{22.8 - 21.5}{3} = \frac{1.3}{3} = 0.43$$

$$D2 = \frac{23.7 - 21.7}{3} = \frac{2}{3} = 0.67$$

$$D3 = \frac{33.8 - 28.3}{3} = \frac{5.5}{3} = 1.83$$

$$D4 = \frac{21.8 - 18.3}{3} = \frac{2,8}{3} = 1.13$$

$$D5 = \frac{33.7 - 33.6}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.03$$

Hari ke 6

$$D1 = \frac{22.5 - 22.8}{3} = \frac{-0.3}{3} = -0.1$$

$$D2 = \frac{22.8 - 23.7}{3} = \frac{-0.9}{3} = -0.3$$

$$D3 = \frac{33.9 - 33.8}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$D4 = \frac{22.0 - 21.8}{3} = \frac{0.2}{3} = 0.07$$

$$D5 = \frac{30.1 - 33.7}{3} = \frac{-0.6}{3} = -0.2$$

Hari ke 9

$$D1 = \frac{24.5 - 22.5}{3} = \frac{2}{3} = 0.67$$

$$D2 = \frac{34.2 - 22.8}{3} = \frac{11.4}{3} = 3.8$$

$$D3 = \frac{34.6 - 33.9}{3} = \frac{0.7}{3} = 0.23$$

$$D4 = \frac{23.6 - 22.0}{3} = \frac{1.6}{3} = 1.6$$

$$D5 = \frac{32.3 - 30.1}{3} = \frac{2.2}{3} = 0.73$$

Hari ke 12

$$D1 = \frac{23.9 - 24.5}{3} = \frac{2,8}{3} = -0.2$$

$$D2 = \frac{25,5 - 22,7}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.03$$

$$D3 = \frac{25,5 - 22,7}{3} = \frac{2,8}{3} = -0.03$$

$$D4 = \frac{25,5 - 22,7}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.07$$

$$D5 = \frac{25,5 - 22,7}{3} = \frac{2,8}{3} = -0.8$$

Hari ke 15

$$D1 = \frac{23.5 - 23.9}{3} = \frac{-0.4}{3} = -0.13$$

$$D2 = \frac{34.0 - 34.3}{3} = \frac{-0.1}{3} = -0.1$$

$$D3 = \frac{34.0 - 34.1}{3} = \frac{-0.1}{3} = -0.03$$

$$D4 = \frac{24.2 - 23.8}{3} = \frac{0.4}{3} = 0.13$$

$$D5 = \frac{25.1 - 29.9}{3} = \frac{-4.8}{3} = -1.6$$

Hari ke 18

$$D1 = \frac{24.5 - 23.5}{3} = \frac{1}{3} = 0.33$$

$$D2 = \frac{33.9 - 34}{3} = \frac{-0.1}{3} = -0.03$$

$$D3 = \frac{34.1 - 34.0}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$D4 = \frac{25.0 - 24.2}{3} = \frac{0.8}{3} = 0.27$$

D5 = Mati

Hari ke 21

$$D1 = \frac{25.5 - 24.5}{3} = \frac{1}{3} = 0.33$$

$$D2 = \frac{33.8 - 33.9}{3} = \frac{-0.1}{3} = -0.03$$

$$D3 = \frac{34.2 - 34.1}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$D4 = \frac{25.6 - 25.0}{3} = \frac{0.6}{3} = 0.2$$

D5 = Mati

5. Kelompok E

Hari ke 3

$$E1 = \frac{26.0 - 26.6}{3} = \frac{-0.6}{3} = -0.2$$

$$E2 = \frac{15.6 - 17.8}{3} = \frac{-2.2}{3} = -0.73$$

$$E3 = \frac{27.1 - 25.6}{3} = \frac{1.5}{3} = 0.5$$

$$E4 = \frac{23.4 - 24.0}{3} = \frac{0.6}{3} = 0.57$$

$$E5 = \frac{25.6 - 24.0}{3} = \frac{1.6}{3} = 0.53$$

Hari ke 6

$$E1 = \frac{24.7 - 26.0}{3} = \frac{2.8}{3} = -0.43$$

$$E2 = \frac{17.0 - 15.6}{3} = \frac{2.8}{3} = 0.47$$

$$E3 = \frac{27.2 - 27.1}{3} = \frac{2.8}{3} = 0.03$$

$$E4 = \frac{22.3 - 23.4}{3} = \frac{2.8}{3} = -0.37$$

$$E5 = \frac{33.7 - 25.6}{3} = \frac{2.8}{3} = 2.7$$

Hari ke 9

$$E1 = \frac{26.3 - 24.7}{3} = \frac{2.8}{3} = 0.93$$

$$E2 = \frac{15.7 - 17.0}{3} = \frac{2.8}{3} = -0.43$$

$$E3 = \frac{28.2 - 27.2}{3} = \frac{2.8}{3} = 0.33$$

$$E4 = \frac{19.8 - 22.3}{3} = \frac{2,8}{3} = -0.83$$

$$E5 = \frac{34.8 - 33.7}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.37$$

Hari ke 12

$$E1 = \frac{23.2 - 26.3}{3} = \frac{2,8}{3} = -1.03$$

$$E2 = \frac{16.0 - 15.7}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.1$$

$$E3 = \frac{28.0 - 28.2}{3} = \frac{2,8}{3} = -0.06$$

E4 = Mati

$$E5 = \frac{30.2 - 34.8}{3} = \frac{2,8}{3} = -1.53$$

Hari ke 15

$$E1 = \frac{24.0 - 23.2}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.27$$

$$E2 = \frac{15.9 - 16.0}{3} = \frac{2,8}{3} = -0.03$$

$$E3 = \frac{27.3 - 28.0}{3} = \frac{2,8}{3} = -0.23$$

E4 = Mati

$$E5 = \frac{31.5 - 30.2}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.43$$

Hari ke 18

$$E1 = \frac{25.0 - 24.0}{3} = \frac{1}{3} = 0.33$$

$$E2 = \frac{16.0 - 15.9}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$E3 = \frac{28.0 - 27.3}{3} = \frac{0.7}{3} = 0.23$$

E4 = Mati

$$E5 = \frac{31.5 - 31.5}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

Hari ke 21

$$E1 = \frac{25.9 - 25.0}{3} = \frac{0.9}{3} = 0.3$$

$$E2 = \frac{15.4 - 16.0}{3} = \frac{-0.6}{3} = -0.2$$

$$E3 = \frac{28.5 - 28.0}{3} = \frac{0.5}{3} = 0.17$$

E4 = Mati

$$E5 = \frac{32.0 - 31.5}{3} = \frac{0.5}{3} = 0.17$$

6. Kelompok F

Hari ke 3

$$F1 = \frac{23.7 - 20.9}{3} = \frac{2.6}{3} = 0.93$$

$$F2 = \frac{20.5 - 22.4}{3} = \frac{-1.9}{3} = -0.63$$

$$F3 = \frac{21.5 - 19.5}{3} = \frac{2}{3} = 0.67$$

$$F4 = \frac{26.0 - 24.6}{3} = \frac{1.4}{3} = 0.47$$

$$F5 = \frac{23.0 - 19.7}{3} = \frac{3.3}{3} = 1.1$$

Hari ke 6

$$F1 = \frac{23.9 - 23.7}{3} = \frac{0.2}{3} = 0.07$$

$$F2 = \frac{16.9 - 20.5}{3} = \frac{-3.6}{3} = -1.2$$

$$F3 = \frac{21.2 - 21.5}{3} = \frac{-0.3}{3} = -0.1$$

$$F4 = \frac{25.8 - 26.0}{3} = \frac{-0.2}{3} = -0.07$$

$$F5 = \frac{23.3 - 23.0}{3} = \frac{0.3}{3} = 0.1$$

Hari ke 9

$$F1 = \frac{25.1 - 23.9}{3} = \frac{1.2}{3} = 0.4$$

$$F2 = \frac{14.7 - 16.9}{3} = \frac{-2.2}{3} = -0.73$$

$$F3 = \frac{20.3 - 21.2}{3} = \frac{-0.9}{3} = -0.3$$

$$F4 = \frac{26.5 - 25.8}{3} = \frac{0.7}{3} = 0.23$$

$$F5 = \frac{22.3 - 23.3}{3} = \frac{-1}{3} = -0.33$$

Hari ke 12

$$F1 = \frac{25.7 - 25.1}{3} = \frac{0.6}{3} = 0.2$$

F2 = Mati

F3 = Mati

$$F4 = \frac{26.6 - 26.5}{3} = \frac{0.1}{3} = 0.03$$

$$F5 = \frac{24.9 - 22.3}{3} = \frac{2.6}{3} = 0.87$$

Hari ke 15

$$F1 = \frac{27.0 - 25.7}{3} = \frac{2,8}{3} = 0.43$$

F2 = Mati


F3 = Mati

$$F4 = \frac{27.2 - 26.6}{3} = \frac{0.6}{3} = 0.2$$

$$F5 = \frac{23.6 - 24.9}{3} = \frac{-1.3}{3} = -0.43$$

Hari ke 18

$$F1 = \frac{26.0 - 27.0}{3} = \frac{-1}{3} = -0.33$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

$$F2 = \frac{27.2 - 27.2}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

F3 = Mati

F4 = Mati

$$F5 = \frac{25.0 - 23.6}{3} = \frac{1.4}{3} = 0.47$$

Hari ke 21


$$F1 = \frac{26.0 - 26.0}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

F2 = Mati

F3 = Mati

$$F4 = \frac{25.5 - 27.2}{3} = \frac{1.7}{3} = -0.57$$

$$F5 = \frac{26.7 - 25.0}{3} = \frac{1.7}{3} = 0.57$$



Lampiran 9. Pemberian BAL dan Pengamatan Feses Mencit



Proses Suplementasi BAL



Proses Induksi EPEC



Feses Berlendir (abnormal)

Pengamatan Feses Mencit




Penimbangan Pakan Mencit



Suspensi BAL A dan BAL B



Penimbangan Mencit



Suntikan Ujung Bulat (Sonde)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sriwahyuni (6030113011). Lahir di Sinjai, Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada tanggal 29 September 1995. Penulis yang akrab disapa “Uni” adalah anak sulung dari tiga bersaudara, pasangan suami istri M. Arja dan Halimah. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN No.27 Tondong pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Sinjai Timur dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Neg. 1 Sinjai Timur (Sekarang SMA Neg. 3 Sinjai) pada tahun 2010 hingga tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata (S1) di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur SPMB-PTAIN Prestasi dan diterima di Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi Sains. Selama masa pendidikannya, penulis aktif pada organisasi kemahasiswaan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Biologi pada periode 2014-2015 sebagai anggota Devisi Minat dan Bakat.

ALAUDDIN
M A K A S S A R