

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI Ny “H” DENGAN
HIPOTERMI DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 04 MEI s/d 24 MEI TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar**

OLEH

SARNAH

NIM : 70400114001

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 27 Oktober 2017

Penyusun

Sarnah
70400114001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Sarnah

Nim : 70400114001


Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny "H" Dengan Hipotermi
Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar


Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Firdayanti, S.S.T., M.Keb
NIP: 19751113 200604 2 001


dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes
NIP: 19810623 201101 2 009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny "H" Dengan Hipotermi Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017", yang disusun oleh Sarnah, NIM: 70400114001, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 27 Oktober 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 27 Oktober 2017 M

7 Shafar 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.ST., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Darmawansyih, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)

Dekan



Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc
NIP: 195502031983121001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assaalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny “H” Hipotermi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017”. Penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan tugas akhir ini agar menjadi jauh lebih baik lagi.

Maka itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a yang tak henti-hentinya Ibunda Samsia dan Ayahanda Sarro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin M.Sc sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan.
5. Ibu Firdayanti, S.SiT., M.Keb sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya demi membimbing, membantu, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan proposal studi kasus laporan tugas akhir ini.

6. Ibu dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes, sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing, serta memberikan saran yang membangun dalam penyusunan proposal studi kasus laporan akhir ini.
7. Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes, sebagai Penguji I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Bapak Dr. Wahyuddin G, M.Ag., sebagai Penguji II yang telah banyak memerikan masukan untuk perbaikan karya tulis ilmiah ini.
9. Dosen-dosen dan staf Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan kebidanan, menyelesaikan pendidikan hingga selesainya karya tulis ilmiah ini.
10. Direktur Puskesmas Jumpandang Baru Makassar beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Mahasiswi seangkatan tahun 2014 Jurusan Kebidanan serta teman yang lain di luar sana yang telah memberikan dorongan berupa semangat dan memberikan saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Niat yang bai dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Innamal a’maalu bin niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, Oktober 2017

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penulisan.....	8
E. Manfaat Penulisan.....	9
F. Metode Penulisan	9
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Neonatus	12
B. Tinjauan Khusus Tentang Hipotermi	14
C. Manajemen Asuhan Kebidanan	41
D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)	48
E. Tinjauan Islam Tentang Bayi Hipotermi.....	52
BAB III STUDI KASUS.....	55
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar	55
B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual	59
C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial	60
D. Langkah IV Tindakan Segera atau Kolaborasi	61
E. Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan	61
F. Langkah VI Implementasi.....	63
G. Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	65
Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP).....	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	76
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :Surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran II :Surat Permohonan Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Lampiran III :Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar Kepada Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
- Lampiran IV :Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
- Lampiran V :Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Klasifikasi Suhu Tubuh Abnormal	20
Tabel 2 : Standar Operasional Prosedur.....	32



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, 27 OKTOBER 2017

SARNAH, 70400114001

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : dr. Andi Sitti Rahma

“Manajemen Asuhan Kebidanan pada bayi Ny “H” dengan Hipotermi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar”

Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. BBL memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine ke kehidupan ektrauterine). Hipotermi adalah suhu tubuh dibawah $36,5^{\circ}\text{C}$, yang terbagi atas : hipotermi ringan yaitu suhu antara $36-36,5^{\circ}\text{C}$, hipotermi sedang yaitu suhu antara $32-36^{\circ}\text{C}$, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh $<32^{\circ}\text{C}$. Komplikasi yang diakibatkan dari hipotermi adalah hipoglikemia. Hipoglikemia yaitu kadar glukosa dalam darah kurang dari 45 mg/dl (2,6 mmol/L). Hipoglikemia merupakan masalah yang serius pada bayi baru lahir, karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat hipoksi otak. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat bahkan sampai kematian. Glukosa merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan dan hari-hari pertama pasca lahir. Setiap stress yang terjadi mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatkan penggunaan glukosa.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada bayi Ny. “H” dengan Hipotermi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada bayi Ny “H” ditegakkan diagnosis dengan Hipotermi berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada bayi Ny “H” ditandai dengan tanda-tanda vital heart rate : 124 x/menit, pernafasan : 44 x/menit, dan suhu : $35,3^{\circ}\text{C}$ dimana keadaan tubuh bayi dingin, refles menghisap lemah, bibir pucat, pergerakan kurang aktif, dan kuku pucat. Pada pasien ini dilakukan penatalaksanaan berupa mengobservasi tanda-tanda vital setiap pagi dan sore, membedong bayi dengan kain hangat, mengganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah, dan menganjurkan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara on demand.

Berdasarkan hasil dari studi kasus 7 langkah varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan, dapat disimpulkan bahwa pada bayi Ny “H” ditegakkan diagnosa Hipotermi.

Daftar Pustaka : 31(2007-2015)

Kata kunci : Bayi baru lahir (neonatus), Hipotermi.

ABSTRACT

MIDWIFERY MANAGEMENT ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MAKASSAR SCIENTIFIC PAPER, OCTOBER 27, 2017

SARNAH, 70400114001

Supervisor I : Firdayanti

Supervisor II : dr. Andi Sitti Rahma

**"Midwifery Care Management in Mrs. "H"'s Baby with Hypothermia at
Jumpandang Baru Makassar Public Health Center"**

Newborns (neonates) are newborn babies, aged 0-28 days. Birth Weight requires a physiological adjustment in the forms of maturation, adaptation (adjusting from intra-uterine to extra-uterine life). Hypothermia is a body temperature below 36.5°C, which is divided into: mild hypothermia i.e. temperature between 36-36.5°C, moderate hypothermia i.e. temperature between 32-36 ° C and severe hypothermia i.e. body temperature <32°C. The complications resulting from hypothermia are hypoglycemia. Hypoglycemia is blood glucose levels less than 45 mg/dl (2.6 mmol/L). It is a serious problem in newborns as it can cause seizures that result in hypoxic brain. When not properly managed, it will cause damage to the central nervous system even death. Glucose is an important source of calories for survival during labor and the first postpartum. Any stress that occurs reduces the existing glucose reserves as it increases the use of glucose.

This study is aimed at implementing the Management of Midwifery Care on Mrs. "H" baby with Hypothermia at Jumpandang Baru Makassar Public Health Center in accordance with 7 Varney steps and SOAP.

The results of the case study conducted on Mrs. "H"'s baby are diagnosed with Hypothermia based on anamnesis and physical examination. In Mrs. "H"'s baby, it is marked with vital signs of heart rate: 124 x/min, respiration: 44 x/min, and temperature: 35.3°C where the baby's body is cold, weak sucking reflex, pale lips, less active movements, and pale nails. In this patient, it is conducted the management of observing vital signs every morning and evening, wrapping the baby with a warm cloth, change clothes or baby diapers whenever is wet, and encouraging the mother to breastfeed her baby on demand.

Based on the case study results of the 7 Varney steps and SOAP applied in the obstetric problem-solving process, it can be concluded that Mrs. "H"'s baby is diagnosed with Hypothermia.

References: 31 (2007-2015)

Keywords: Newborn (neonate), Hypothermia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2013 Angka Kematian Bayi (AKB) di dunia 34 per 1.000 kelahiran hidup, AKB di negara berkembang 37 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB di negara maju 5 per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Asia Timur 11 per 1.000 kelahiran hidup, Asia Selatan 43 per 1.000 kelahiran hidup, Asia Tenggara 24 per 1.000 kelahiran hidup dan Asia Barat 21 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2013 AKB di Indonesia mencapai 25 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan Malaysia, Filipina dan Singapura, angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka dari negara-negara tersebut dimana AKB Malaysia 7 per 1.000 kelahiran hidup, Filipina 24 per 1.000 kelahiran hidup dan Singapura 2 per 1.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan AKB sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai target MDGs 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, AKB di Indonesia masih termasuk tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sudah di bawah 10 kematian per 1.000 kelahiran bayi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Meningkatnya angka kematian bayi (AKB) merupakan suatu permasalahan di sektor kesehatan khususnya di Sulawesi Selatan, yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 5.93 per 1000 kelahiran hidup dan tahun 2013 mencapai 3,8 per 1000 kelahiran hidup. Profil kesehatan tahun 2014 jumlah kematian bayi menjadi 1.056 bayi atau 7.23 per 1000 kelahiran hidup dan Angka kematian Neonatal adalah jumlah penduduk yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran 0-28 hari yang menunjukkan sebesar 762 kasus yaitu 5,22 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Provinsi Sul-Sel, 2014:35).

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari). Harus diingat bahwa bayi pada saat lahir mempunyai suhu $0,5-1^{\circ}\text{C}$ lebih tinggi dibanding suhu ibunya. Bayi baru lahir rentan berisiko mengalami penurunan suhu tubuh menjadi $35-35,5^{\circ}\text{C}$ dalam 15-30 menit karena kecerobohan perawatan diruang bersalin. Ruang bersalin seringkali tidak cukup hangat, dengan aliran udara yang dingin di dekat bayi (yang berasal dari AC), atau petugas tidak mengeringkan dan menyelimuti bayi dengan baik segera setelah dilahirkan (Rohsiswatmo, 2014:368).

Kematian usia neonatal masih lebih tinggi dibandingkan anak usia lainnya. Sebagian besar kematian anak di Indonesia saat ini terjadi pada masa baru lahir (neonatal), bulan pertama kehidupan. Kemungkinan anak meninggal pada usia yang berbeda adalah 19 per 1000 selama masa neonatal, 15 per 1000 dari usia 2 hingga 11 bulan dan 10 per 1000 dari usia 1 sampai 5 tahun. Kematian bayi baru lahir kini

merupakan hambatan utama dalam menurunkan kematian anak lebih lanjut. (Unicef Indonesia, 2012:1).

Bayi hipotermi adalah bayi dengan suhu badan di bawah normal. Adapun suhu tubuh bayi dan neonatus adalah 36,5-37,5°C (suhu aksilla). Termoregulasi adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara produksi panas dan hilangnya panas dalam rangka menjaga suhu tubuh dalam keadaan normal, kemampuan ini sangatlah terbatas pada BBL. Bayi baru lahir sering mengalami hipotermi karena ketidakmampuannya mempertahankan suhu tubuh, lemak subkutan yang belum sempurna, permukaan tubuh yang luas dibandingkan massa tubuh, dan suhu lingkungan yang dingin.

Hipotermi dapat terjadi pada bayi baru lahir (neonatus), yaitu pada bayi dengan asfiksia, bayi BBLR, bayi dengan sepsis, distress pernafasan, pada bayi prematur atau bayi kecil yang memiliki cadangan glukosa yang sedikit (Rukiyah dan Yulianti, 2013:287).

Hasil Riskesdas tahun 2013 menyatakan bahwa presentasi balita (0-59 bulan) dengan BBLR sebesar 10,2 %. Presentasi BBLR di Sulawesi Selatan 12 %. Masalah BBLR terjadi karena ketidakmatangan sistem organ pada bayi tersebut. Bayi berat lahir rendah mempunyai kecenderungan kearah peningkatan terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi. Masalah pada BBLR yang sering terjadi adalah gangguan pada sistem pernafasan, susunan saraf pusat, kardiovaskuler, gastrointestinal, ginjal, dan kegagalan termoregulasi (hipotermi). (Profil Kesehatan Indonesia, 2014:149).

Berdasarkan data dari Puskesmas Jumpandang Baru pada tahun 2015 angka kejadian BBLR dari 1010 jumlah persalinan terdapat 106 bayi yang mengalami Berat Badan Lahir Rendah sedangkan pada tahun 2016 angka kejadian BBLR mengalami penurunan yaitu dari 918 jumlah persalinan terdapat 59 bayi yang BBLR.

Banyak faktor yang menyebabkan suhu tidak stabil pada bayi BBLR. Faktor-faktor tersebut diantaranya kehilangan panas karena permukaan tubuh yang relatif luas, lemak subkutan yang kurang (terutama lemak coklat), tidak adanya refleksi kontrol dari pembuluh darah kapiler kulit, tidak adekuatnya aktivitas otot dan imatur pusat pengaturan suhu di otak. Risiko tinggi hipotermi berhubungan dengan imaturitas fungsi termoregulasi atau perubahan suhu lingkungan oleh sebab itu suhu tubuhnya harus dipertahankan (Maryunani, 2013:168-169).

Bayi prematur cenderung memiliki suhu yang abnormal disebabkan oleh produksi panas yang buruk dan peningkatan kehilangan panas. Kegagalan untuk menghasilkan panas yang adekuat disebabkan tidak adanya jaringan adiposa coklat (yang mempunyai aktivitas metabolik yang tinggi), pernafasan yang lemah dengan pembakaran oksigen yang buruk, dan masukan makanan yang rendah. Kehilangan panas yang meningkat karena adanya permukaan tubuh yang relatif besar dan tidak adanya lemak subkutan, tidak adanya pengaturan panas bayi sebagian disebabkan oleh panas immature dari pusat pengatur panas dan sebagian akibat kegagalan untuk memberikan respon terhadap stimulus dari luar. Pada minggu pertama dari kehidupan, bayi prematur memperlihatkan fluktuasi (naik turunnya) nyata dalam suhu

tubuh dan hal ini berhubungan dengan fluktuasi suhu lingkungan (Maryunani, 2013:49)

Hipotermi menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, yang mengakibatkan terjadinya metabolik anaerobik, meningkatkan kebutuhan oksigen, mengakibatkan hipoksemia dan berlanjut dengan kematian (Rukiyah dan Yulianti, 2013:287).

Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematian bayi terjadi dalam periode neonatal yaitu dalam bulan pertama kehidupan. Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, bahkan kematian. Sebagai contoh bayi yang mengalami hipotermi akan menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi kerusakan otak (Vivian, 2013:11-12).

Hipoglikemia adalah masalah serius pada bayi baru lahir, karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat hipoksi otak. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat bahkan sampai kematian. Glukosa merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan dan hari-hari pertama pasca lahir. Setiap stress yang terjadi mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatkan penggunaan cadangan glukosa, misalnya pada asfiksia, hipotermi, hipertermi, dan gangguan pernafasan.

Mekanisme pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum berfungsi sempurna, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas dari tubuh bayi karena bayi beresiko mengalami hipotermi. Bayi dengan hipotermi sangat rentan

terhadap kesakitan dan kematian. Hipotermi mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun di dalam ruangan yang relatif hangat (Indrayani & Moudy Emma, 2013:316).

Bayi baru lahir tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri sehingga dengan cepat terjadi kehilangan panas apabila tidak segera di cegah. Mekanisme kehilangan panas pada bayi dapat terjadi melalui : Evaporasi adalah kehilangan panas tubuh melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara, karena air/cairan ketuban. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dan benda atau permukaan yang temperaturnya lebih rendah. Konveksi adalah kehilangan panas tubuh bayi melalui aliran udara sekitar bayi yang lebih dingin. Radiasi adalah Kehilangan panas badan bayi melalui pemancaran/radiasi dari tubuh bayi ke lingkungan sekitar bayi yang lebih dingin.

Menurut hasil penelitian Heny Ekawati bahwa sebelum melakukan IMD hampir seluruh atau 76,2 % bayi baru lahir mengalami hipotermi. Hal ini sesuai dengan hasil uji statistic *Wilcoxon* menunjukkan nilai $Z = -3,317$ dan $P\text{-Sign} = 0,001$ dimana $P\text{-Sign} < 0,05$ maka H_0 diterima, artinya pelaksanaan IMD berpengaruh terhadap perubahan suhu tubuh bayi baru lahir di Klinik Bersalin MITRA HUSADA Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan pada tahun 2014.

Bidan menurut *International Confederation Of Midwives* (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan *Federation of International Gynecologist Obstetrition* (FIGO) tersebut adalah : Bidan adalah seseorang yang mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di

negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan.

Standar kompetensi bidan menurut Kepmenkes No.369/MENKES/SK/III/2007 yang berkaitan dengan asuhan bayi baru lahir terdapat pada kompetensi ke 6 yaitu :

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. (Kepmenkes RI, 2007).

Berdasarkan uraian diatas untuk mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB) maka dengan cara mengurangi angka kejadian hipotermi. Hal ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan dengan penanganan yang tepat melalui asuhan kebidanan. Mengingat hal itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut melalui Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Neonatus dengan Hipotermi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana asuhan kebidanan pada neonatus dengan hipotermi.

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah asuhan kebidanan dengan kasus hipotermi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.

D. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Dilaksanakannya asuhan kebidanan pada bayi Ny “H” dengan hipotermi berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan di puskesmas jumpandang baru makassar sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a. Dilaksanakan pengkajian dan analisa data dasar pada bayi Ny “H” dengan hipotermi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.
- b. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnosa/masalah aktual pada bayi Ny “H” dengan hipotermi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.
- c. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnosa/masalah potensial pada bayi Ny “H” dengan hipotermi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.
- d. Dilaksanakan tindakan segera dan kolaborasi pada bayi Ny “H” dengan hipotermi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.
- e. Dilaksanakan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada bayi Ny “H” dengan hipotermi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.
- f. Dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada bayi Ny “H” dengan hipotermi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.
- g. Dilaksanakan evaluasi asuhan kebidanan pada bayi Ny “H” dengan hipotermi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.
- h. Didokumentasikan evaluasi asuhan kebidanan pada bayi Ny “H” dengan hipotermi di puskesmas jumpandang baru makassar tahun 2017.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program pendidikan diploma III kebidanan universitas islam negeri alauddin makassar.

2. Manfaat ilmiah

Hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat pendidikan

Untuk menambah wacana bagi Pembaca di Perpustakaan dan berbagai masukan bagi Program Studi D3 kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Manfaat bagi penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang hipotermi pada neonatus.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini metode yang digunakan adalah :

1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan hipotermi.

2. Studi kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 yang meliputi :

identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan tehnik antara lain :

a. Anamnesa.

Penulis menggunakan tanya jawab dengan orang tua bayi dan yang terlibat guna mendapatkan data yang diperlukan untuk memberikan asuhan kebidanan pada klien tersebut.

b. Pemeriksaan fisik.

Dilakukan secara sistematis pada bayi mulai dari inspeksi, palpasi dan pengukuran pada daerah tertentu

c. Studi Dokumentasi.

Dalam manajemen asuhan kebidanan dalam kasus hipotermi penulis membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan bayi baik bersumber dari bidan, dokter, perawat maupun pemeriksaan lainnya.

d. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien, dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi dan rekan-rekan seprofesi lainnya yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulisa karya tulis ilmiah iniyaitu : pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar

belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teori, akan menguraikan mengenai tinjauan umum neonatus, tinjauan khusus tentang hipotermi, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus dengan hipotermi.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Neonatus

1. Pengertian Neonatus

Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. BBL memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin) dan toleransi bagi BBL untuk dapat hidup dengan baik (Marmi dan Rahardjo, 2015:1).

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru dilahirkan pada kehamilan cukup bulan (dari kehamilan 37-42 minggu) dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram dan tanpa tanda-tanda asfiksia dan penyakit penyerta lainnya (Sari, 2012:1).

Bayi baru lahir *Newborn* (Inggris) atau *Neonatus* (Latin) adalah bayi yang baru dilahirkan sampai dengan usia empat minggu (Sari, 2012:1).

Neonatus adalah individu yang baru saja mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine ke kehidupan ekstrauterine (Vivian, 2013:12).

2. Masa Neonatal

Masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran (Rahardjo, Kukuh & Marmi, 2015:3).

- a. Neonatus adalah bayi berumur 0 (baru lahir) sampai dengan usia 1 bulan sesudah lahir.
- b. Neonatus dini : usia 0-7 hari.
- c. Neonatus lanjut : usia 0-28 hari.

3. Ciri-ciri bayi baru lahir Normal

- a. Berat badan : 2500-4000 gram.
- b. Panjang badan : 48-52 cm.
- c. Lingkar kepala : 33-35 cm.
- d. Lingkar dada : 30-38 cm.
- e. Frekuensi jantung : 120-160 x/menit.
- f. Pernafasan : 40-60 x/menit.
- g. Kulit kemerahan dan licin karena jaringan subkutan cukup.
- h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya sudah sempurna.
- i. Kuku agak panjang dan lemas.
- j. Genetalia
 - Perempuan labia mayora telah menutupi labia minora, jika laki-laki testis telah turun, skrotum sudah ada.
- k. Refleks hisap dan menelan telah terbentuk dengan baik.
- l. Refleks moro batau gerak memeluk bila dikagetkan sudah baik.
- m. Refleks graps atau menggenggam sudah baik.
- n. Eleminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan (Rahardjo.Kukuh, Marmi, 2015:8)

B. Tinjauan Khusus Tentang Hipotermi

1. Pengertian hipotermi

Hipotermi adalah suhu dibawah 36,5°C, yang terbagi atas : hipotermi ringan (*cold stress*) yaitu suhu antara 36-36,5°C, hipotermi sedang yaitu suhu antara 32-36°C, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh <32°C. (Ari, 2014:89).

Hipotermi adalah suhu badan dibawah normal. Adapun suhu normal bayi adalah 36,5-37,5°C (suhu ketiak). Suhu normal pada neonatus 36,5-37,5°C (suhu ketiak) (Rukiyah & Yulianti, 2013:283).

Hipotermi adalah bayi baru lahir dengan suhu tubuh sampai di bawah 36,5-37,5°C (Sudarti & Fauziah, 2013:117).

Hipotermi didefinisikan sebagai keadaan termal yang tidak normal dimana suhu tubuh bayi turun dibawah 36,5°C. Penurunan suhu tubuh secara progresif menyebabkan efek yang dapat merugikan mulai dari gangguan metabolik hingga kematian (Khalifa, 2015:6).

2. Penyebab

Penyebab terjadinya hipotermi pada bayi yaitu : jaringan lemak subkutan tipis, perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan besar, cadangan glikogen dan brown fat sedikit, BBL (Bayi Baru Lahir) tidak mempunyai respon shivering (menggigil) pada reaksi kedinginan, kurangnya pengetahuan perawat dalam pengelolaan bayi yang berisiko tinggi mengalami hipotermi. (Rukiyah & Yulianti. 2013, hal.283).

Luas permukaan neonatus relatif lebih luas dari orang dewasa sehingga metabolisme basal per kg BB lebih besar. Oleh karena itulah, bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga energi dapat diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan lemak. Pada jam-jam pertama kehidupan, energi didapatkan dari karbohidrat. Dari hari kedua, energi berasal dari pembakaran lemak. Setelah mendapat susu, sekitar dihari keenam energi diperoleh dari lemak dan karbohidrat yang masing-masing sebesar 60 % dan 40 % (Dewi, 2013:14).

Pada saat lahir, suhu tubuh bayi kira-kira sama dengan suhu tubuh ibunya. Namun demikian sedikit insulasi lemak. Faktor yang meningkatkan kehilangan panas pada bayi baru lahir, antara lain :

- a) Rasio permukaan tubuh dengan berat badan lebih besar.
- b) Kehilangan cairan transdermal.
- c) Insulasi buruk akibat kulit tipis dan pembuluh darah yang dipermukaan.
- d) Keterbatasan merubah posisi tubuh.

Hipotermia juga dapat disebabkan oleh karena terpapar dengan lingkungan dingin (suhu lingkungan rendah, permukaan yang dingin atau basah) atau bayi dalam keadaan basah atau tidak berpakaian (Yunanto, 2014:89).

Luas permukaan tubuh yang besar dan sirkulasi yang relatif buruk serta dapat berkeringat atau menggigil sehingga kemampuan bayi untuk mengatur suhu tubuhnya masih buruk. Disamping itu, dingin yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan kerja jantung.

Selain itu beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan hipotermi menurut (Sudarti dan Fauziah, 2013:118) adalah :

- a. Kesalahan perawatan bayi segera setelah lahir.
- b. Bayi dipisahkan dengan ibunya setelah lahir.
- c. BBLR.
- d. Kondisi ruangan yang dingin.
- e. Prosedur penghangatan yang adekuat.
- f. Asfiksia, hipoksia.

3. Tanda dan gejala hipotermia

Bayi tidak mau minum atau menetek, bayi tampak lesu atau mengantuk saja, tubuh bayi teraba dingin, dalam keadaan berat, denyut jantung bayi menurun dan kulit tubuh bayi mengeras (sklerema).

- a. Tanda-tanda hipotermi sedang (*stress dingin*) yaitu : Aktifitas berkurang, Letargis, Tangisan lemah, Kulit berwarna tidak rata (*cutis marmorata*), Kemampuan menghisap lemah dan Kaki teraba dingin.
- b. Tanda-tanda hipotermi berat (*cedera dingin*) Sama dengan hipotermi sedang ditambah dengan bibir dan kuku kebiruan, pernafasan lambat, pernafasan tidak teratur, bunyi jantung lambat dan selanjutnya mungkin timbul hipoglikemia dan asidosis metabolik. Hipotermia juga bisa menyebabkan hipoglikemia (kadar gula darah yang rendah), asidosis metabolik (keasaman darah yang tinggi) dan kematian. Tubuh dengan cepat menggunakan energi agar tetap hangat, sehingga

pada saat kedinginan bayi memerlukan lebih banyak cadangan oksigen. Karena itu, hipotermi bisa menyebabkan berkurangnya aliran oksigen ke jaringan.

- c. Tanda-tanda stadium lanjut hipotermi yaitu muka, ujung kaki dan tangan berwarna merah terang, bagian tubuh lainnya pucat, kulit mengeras merah dan timbul oedema terutama pada punggung, kaki dan tangan (sklerema) (Rukiyah & Yulianti, 2013:289)

Tanda-tanda Hipotermi (Yunanto, 2014:93) adalah akral dingin, bayi tidak mau minum, kurang aktif, kutis marmorata, pucat, takipne atau takikardia..

4. Patofisiologi

Apabila terjadi paparan dingin, secara fisiologis tubuh akan memberikan respon untuk menghasilkan panas berupa :

- a. *Shivering thermoregulation/ST.*

Merupakan mekanisme tubuh berupa menggigil atau gemetar secara involunter akibat dari kontraksi otot untuk menghasilkan panas.

- b. *Non-shivering thermoregulation/NST.*

Merupakan mekanisme yang dipengaruhi oleh stimulasi sistem saraf simpatis untuk menstimulasi proses metabolik dengan melakukan oksidasi terhadap jaringan lemak coklat. Peningkatan metabolisme jaringan lemak coklat akan meningkatkan produksi panas dari dalam tubuh.

- c. *Vasokonstriksi perifer.*

Mekanisme ini juga diestimulasi oleh sistem saraf simpatis, kemudian sistem saraf perifer akan memicu otot sekitar arterioli kulit untuk berkontraksi sehingga

terjadi vasokonstriksi. Keadaan ini efektif untuk mengurangi aliran darah ke jaringan kulit dan mencegah hilangnya panas yang tidak berguna.

Pada lingkungan yang dingin, pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil merupakan usaha utama seorang bayi yang kedinginan untuk mendapatkan kembali panas tubuhnya. Pembentukan suhu tanpa menggigil ini merupakan hasil penggunaan lemak coklat yang terdapat di seluruh tubuh, dan mereka mampu meningkatkan panas tubuh. Untuk membakar lemak coklat, seorang bayi menggunakan glukosa untuk mendapatkan energi yang akan mengubah lemak menjadi panas. Lemak coklat tidak dapat diproduksi ulang oleh bayi baru lahir dan cadangan lemak coklat ini akan habis dalam waktu singkat dengan adanya stress dingin. Jika seorang bayi kedinginan, dia akan mulai mengalami hipoglikemia, hipoksia dan asidosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan kehilangan panas merupakan prioritas utama dan bidan berkewajiban untuk meminimalkan kehilangan panas pada bayi baru lahir. Suhu tubuh normal pada neonatus adalah $36,5-37,5^{\circ}\text{C}$ melalui pengukuran aksilla dan rektum, jika nilainya turun dibawah $36,5^{\circ}\text{C}$ maka bayi mengalami hipotermi.

Pada bayi, respon fisiologis terhadap paparan dingin adalah dengan proses oksidasi dari lemak coklat atau jaringan adiposa coklat. Pada bayi BBL, NST (proses oksidasi jaringan lemak coklat) adalah jalur yang utama dari suatu peningkatan produksi panas yang cepat, sebagai reaksi atas paparan dingin. Paparan dingin yang berkepanjangan harus dihindarkan oleh karena dapat menimbulkan komplikasi serta gangguan-gangguan metabolik yang berat (Yunanto, 2014:92).

Tekanan dingin yang lama dapat mengalihkan kalori untuk menghasilkan panas, yang mengganggu pertumbuhan. Neonatus merespons pendinginan oleh hepar saraf simpatis norepinephrine pada lemak coklat dan dengan liposis diikuti oleh oksidasi atau reesterifikasi asam lemak yang dilepaskan. Reaksi ini menghasilkan panas secara lokal, dan suplai darah yang kaya lemak coklat membantu memindahkan panas ini ke bagian tubuh neonatus lainnya. Reaksi ini meningkatkan metabolisme dan konsumsi oksigen 2 sampai 3 kali lipat. Dengan demikian, pada neonatus dengan stress dingin juga dapat menyebabkan hipoksia jaringan dan kerusakan neurologis. Selain itu, hipotermia dapat menyebabkan hipoglikemia, asidosis metabolik, dan kematian (Khalifa, 2015:6).

5. Komplikasi

Akibat yang ditimbulkan hipotermi apabila tidak segera ditangani yaitu Hipoglikemia-Asidosis Metabolik karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob, kebutuhan oksigen yang meningkat, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermi berat, syok, apnea dan perdarahan Intra Ventricular (Rukiyah & Yulianti, 2013:284).

Hipoglikemia adalah kadar glukosa darah kurang dari 45 mg/dl (2,6 mmol/L) Hipoglikemia adalah masalah serius pada bayi baru lahir, karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat hipoksi otak. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat bahkan sampai kematian. Glukosa merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses

persalinan dan hari-hari pertama pasca lahir. Setiap stress yang terjadi mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatkan penggunaan cadangan glukosa, misalnya pada asfiksia, hipotermi, hipertermi, dan gangguan pernafasan (Yongki, dkk. 2012:146).

6. Klasifikasi Suhu Tubuh Abnormal

Tabel.24

Klasifikasi suhu tubuh abnormal (Yongki, dkk. 2012:144).

Anamnesis	Pemeriksaan	Klasifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - Bayi terpapar suhu lingkungan yang rendah - Waktu timbulnya kurang dari 2 hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Suhu tubuh 36,4°C - Gangguan nafas - Denyut jantung kurang dari 100 x/menit - Malas minum - Letargi 	Hipotermia sedang
<ul style="list-style-type: none"> - bayi terpapar suhu (lingkungan yang rendah) - waktu timbulnya kurang dari 2 hari - tidak terpapar dengan dingin atau panas yang berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> - suhu tubuh 32°C - tanda lain hipotermia sedang - kulit teraba keras - nafas pelan dan dalam - suhu tubuh berfluktuasi antar 36°C -39°C meskipun berada di suhu lingkungan yang stabil 	Hipotermia berat
		Suhu tubuh tidak stabil (lihat dugaan sepsis)

<ul style="list-style-type: none"> - bayi berada di lingkungan yang sangat panas, terpapar sinar matahari, berada di inkubator, atau dibawah pemancar panas 	<ul style="list-style-type: none"> - fluktuasi terjadi sesudah periode suhu stabil - suhu tubuh 37,3 °C - tanda dehidrasi (elastisitas kulit turun, mata dan ubun-ubun besar dan cekung, lidah dan membran mukosa kering) - malas minum - frekuensi nafas >60 kali/menit - denyut jantung >160 kali/menit - letargi 	<p>Hipotermia</p>
--	--	-------------------

7. Mekanisme Kehilangan Panas

Bayi baru lahir tidak dapat mengatur suhu tubuhnya, dan dapat dengan cepat kehilangan panas apabila tidak segera dicegah. Bayi yang mengalami hipotermi beresiko mengalami kematian. Mekanisme kehilangan panas bayi baru lahir terjadi melalui (Wahyuni, Sari, 2012:5-7)

a) Evaporasi

Evaporasi adalah cara kehilangan panas utama pada tubuh bayi. Kehilangan panas terjadi karena menguapnya cairan pada permukaan tubuh bayi. Kehilangan panas tubuh melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara, karena bayi baru lahir diselimuti oleh air/cairan ketuban/amnion. Proses ini terjadi apabila BBL tidak segera dikeringkan setelah lahir.

b) Konduksi

Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dan benda atau permukaan yang temperaturnya lebih rendah. Misalnya, bayi ditempatkan langsung pada meja, perlak, timbangan, atau bahkan di tempat dengan permukaan yang terbuat dari logam.

c) Konveksi

Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi pada saat tubuh bayi terpapar udara atau lingkungan bertemperatur dingin. Kehilangan panas badan bayi melalui aliran udara sekitar bayi yang lebih dingin. Misalnya, bayi dilahirkan di kamar yang pintu dan jendela terbuka, ada kipas/AC yang dihidupkan.

d) Radiasi

Radiasi adalah pelepasan panas akibat adanya benda yang lebih dingin di dekat tubuh bayi. Kehilangan panas badan bayi melalui pemancaran/radiasi dari tubuh bayi ke lingkungan sekitar bayi yang lebih dingin. Misalnya, suhu kamar bayi/kamar bersalin di bawah 25°C, terutama jika dinding kamarnya lebih dingin karena bahannya dari keramik/marmer.

8. Asuhan pada bayi hipotermi

Asuhan yang diberikan pada bayi hipotermi berdasarkan bayi aterm, bayi preterm dan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu :

1. Bayi aterm.

Jika pada bayi aterm : letakkan BBL pada Radiant Warmer, keringkan untuk menghilangkan panas melalui evaporasi, tutup kepala, bungkus tubuh segera, bila stabil dapat segera rawat gabung sedini mungkin setelah lahir bayi dapat disusukan.

2. Bayi preterm.

Seperti prosedur diatas masukkan ke inkubator dengan servo control atau radiant warmer dengan servo controle.

3. Bayi BBLR.

Asuhan yang dilakukan pada bayi dengan berat badan lahir rendah (Maryunani, 2013:278-279) yaitu :

- a) Ganti pakaian yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat dan kering, memakai topi dan selimut.
- b) Bila ada ibu/pengganti ibu anjurkan menghangatkan bayi dengan melakukan kontak kulit dengan kulit.
- c) Periksa ulang suhu bayi 1 jam kemudian, bila suhu naik pada batas normal (36,5-37,5°C), berarti usaha menghangatkan berhasil.
- d) Anjurkan ibu untuk menyusui lebih sering. Bila bayi tidak dapat menyusui, berikan ASI peras.
- e) Bila suhu tetap dalam batas normal dan bayi dapat minum dengan baik serta tidak ada masalah lain yang memerlukan pengawasan, bayi tidak usah dirujuk.
- f) Nasehati ibu cara merawat bayi lekat/metode kanguru dirumah.

9. Penanganan Dan Pencegahan

a. Penanganan

Bayi yang mengalami hipotermi biasanya mudah sekali meninggal. Tindakannya yang harus dilakukan adalah segera menghangatkan bayi di dalam incubator atau melalui penyinaran lampu. Dimana inkubator bayi adalah sebuah wadah tertutup yang kehangatan lingkungannya dapat diatur dengan cara memanaskan udara dengan suhu tertentu yang berfungsi untuk menghangatkan bayi (Setyaningsih & Wahyunggoro, 2015:1).

Cara lain yang sangat sederhana dan mudah dikerjakan oleh setiap orang adalah menghangatkan bayi melalui panas tubuh ibu. Bayi diletakkan di dada ibu agar terjadi kontak kulit langsung ibu dan bayi. Untuk menjaga agar bayi tetap hangat, tubuh ibu dan bayi harus berada di dalam satu pakaian (merupakan teknologi tepat guna baru) disebut sebagai Metode Kanguru. Sebaiknya ibu menggunakan pakaian longgar berkancing depan (Rukiyah & Yulianti, 2013:290).

Metode kanguru (Kangaroo Mother Care) pada umumnya bayi digendong oleh ibu atau bapaknya sendiri dengan prinsip terjadinya kontak kulit ke kulit antara kulit bayi dengan orang dewasa. KMC pertama kali dilaksanakan di Bogota, Colombia pada tahun 1978, yaitu dengan penempelan kulit ke kulit dalam posisi tegak lurus pada dada ibunya. Metode KMC memungkinkan untuk memberika ASI secara eksklusif dan dapat meninggalkan rumah sakit lebih awal, namun tetap dalam

pengawasan yang baik. KMC dapat dilaksanakan secara intermiten (beberapa jam seharinya) atau kontinyu selama lebih dari 20 jam sehari. Caranya adalah bayi tanpa pakaian atau baju sampai ke popoknya dan ditempelkan pada ibu/ayahnya, kemudian bayi diselimuti agar hangat. KMC dalam perawatan bayi :

- 1) KMC dapat menjalin bonding antara bayi dan ibu.
- 2) KMC memberikan kenyamanan bayi seperti masih di dalam rahim dan bayi bisa merasakan denyut jantung ibu.
- 3) KMC menunjukkan pernafasan yang stabil dan bisa tidur nyenyak.
- 4) Berat badan lebih cepat naik serta suhu tubuhnya lebih stabil.
- 5) KMC dapat mencegah hipotermia.
- 6) Mengurangi stress ibu yang menggendongnya dan produksi ASI lebih banyak.
- 7) KMC dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas (Ranuh, 2013:82-83).

Bila tubuh bayi masih dingin, gunakan selimut atau kain hangat yang disetrika terlebih dahulu, yang digunakan untuk menutupi tubuh bayi dan ibu. Lakukanlah berulang kali sampai tubuh bayi hangat. Biasanya bayi hipotermi menderita hipoglikemia, sehingga bayi harus diberi ASI sedikit-sedikit sesering mungkin. Bila bayi tidak menghisap, diberi infus glukosa 10% sebanyak 60-80 ml/kg per hari (Rukiyah & Yulianti, 2013:290).

Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan suhu tubuh bayi baru lahir agar tidak terjadi hipotermi adalah pemantauan suhu tubuh bayi secara cepat dan teliti,

mengusahakan agar suhu kamar optimal atau pemakaian selimut hangat, lampu penghangat, inkubator, metode kanguru dan skin to skin yaitu salah satunya dengan meletakkan bayi telungkup di dada ibu maka akan terjadi kontak kulit langsung antara ibu dan bayi sehingga bayi akan memperoleh kehangatan karena ibu juga salah satu sumber panas yang baik bagi bayi (Ekawati, 2015:1).

Penanganan lain yang dilakukan :

a) Hipotermi Sedang

1. Ganti pakaian yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat, memakai topi dan selimuti dengan selimut hangat.
2. Bila ada ibu/pengganti ibu, anjurkan menghangatkan bayi dengan melakukan kontak kulit dengan kulit atau perawatan bayi lekat (PMK : Perawatan Metode Kanguru).
3. Bila ibu tidak ada:
 - (a) Hangatkan kembali bayi dengan menggunakan alat pemancar panas, gunakan inkubator dan ruangan hangat, bila perlu :
 - (b) Periksa suhu alat penghangat dan suhu ruangan, beri ASI peras dengan menggunakan salah satu alternatif cara pemberian minum disesuaikan pengatur suhu.
 - (c) Hindari paparan panas yang berlebihan dan posisi bayi lebih sering diubah.
 - (1) Anjurkan ibu untuk menyusui lebih sering. Bila bayi tidak dapat menyusui, berikan ASI peras menggunakan salah satu alternatif cara pemberian minum.

- (2) Mintalah ibu untuk mengamati tanda kegawatan (misalnya gangguan napas, kejang, tidak sadar) dan segera mencari pertolongan bila terjadi hal tersebut.
 - (3) Periksa kadar glukosa darah, bila <45 mg/dL (2,6 mmol/L), tangani hipoglikemia.
 - (4) Nilai tanda kegawatan, misalnya gangguan napas, bila ada tangani gangguan napasnya.
 - (5) Periksa suhu tubuh bayi setiap jam, bila suhu naik minimal $0,5^{\circ}\text{C}/\text{jam}$, berarti usaha menghangatkan berhasil, lanjutkan memeriksa suhu setiap 2 jam.
 - (6) Bila suhu tidak naik atau naik terlalu pelan, kurang $0,5^{\circ}\text{C}/\text{jam}$, cari tanda sepsis.
 - (7) Setelah suhu tubuh normal : lakukan perawatan lanjutan dan pantau bayi selama 12 jam berikutnya, periksa suhu setiap 3 jam.
 - (8) Bila suhu tetap dalam batas normal dan bayi dapat minum dengan baik serta tidak ada masalah lain yang memerlukan perawatan dirumah sakit, bayi dapat dipulangkan. Nasihati ibu cara menghangatkan bayi dirumah.
- b) Hipotermi Berat
- (1) Segera hangatkan bayi di bawah pemancar panas yang telah dinyalakan sebelumnya, bila mungkin. Gunakan inkubator atau ruangan hangat, bila perlu.
 - (2) Ganti baju yang dingin dan basah bila perlu. Beri pakaian yang hangat, pakai topi dan selimut dengan selimut hangat.

- (3)Hindari paparan panas yang berlebihan dan posisi bayi sering diubah.
- (4)Bila bayi dengan gangguan nafas (frekuensi nafas lebih 60 atau kurang 30 x/menit, tarikan dinding dada , merintih saat ekspirasi), lakukan manajemen gangguan nafas.
- (5)Pasang jalur IV dan beri cairan IV sesuai dengan dosis rumatan, dan infus tetap terpasang dibawah pemancar panas, untukmehangatkan cairan.
- (6)Periksa kadar glukosa darah, bila kadar glukosa darah kurang 45 mg/dL (2,6 mmol/L), tangani hipoglikemia.
- (7)Nilai tanda kegawatan pada bayi (misalnya gangguan nafas, kejang atau tidak sadar) setiap jamdan nilai juga kemampuan minumsetiap 4 jam sampai suhu tubuh kembali dalam batas normal.
- (8)Ambil sample darah dan beri antibiotika sesuai dengan yang disebutkan dalam penanganan kemungkinan besar sepsis.
- (9)Anjurkan ibu menyusui segera setelah bayi siap : bila bayi tidak dapat menyusui, beri ASI peras dengan menggunakan salah satu alternatoif cara pemberian minum. Bila bayi tidak dapat menyusui sama sekali, pasang pipa lambung dan beri ASI peras begitu suhu tubuh bayi mencapai 35°C.
- (10)Periksa suhu tubuh bayi setiap jam. Bila suhu naik paling tidak 0,5°C/jam, berarti supaya menghangatkan berhasil, kemudian lanjutkan dengan memeriksa suhu bayi memeriksa suhu bayi setiap 2 jam.
- (11) Periksa juga suhu alat yang dipakai untuk menhangatkan dan suhu ruangan setiap jam.

(12) Setelah suhu tubuh bayi normal :

Lakukan perawatan lanjutan untuk bayi dan pantau bayi selama 12 jam kemudian, dan ukur suhunya setiap 3 jam.

(13) Pantau bayi selama 24 jam setelah penghentian antibiotika. Bila suhu bayi tetap dalam batas normal dan bayi minum dengan baik dan tidak ada masalah lain yang memerlukan perawatan rumah sakit, bayi dipulangkan dan nasehati ibu bagaimana cara menjaga agar bayi tetap hangat selama dirumah.

10. Standar Kompetensi Bidan.

Bidan menurut *International Confederation Of Midwives* (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan *Federation of International Gynecologist Obstetrition* (FIGO) tersebut adalah : Bidan adalah seseorang yang mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas.

Memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan.

Standar kompetensi bidan menurut Kepmenkes No.369/MENKES/SK/III/2007 yang berkaitan dengan asuhan bayi baru lahir terdapat pada kompetensi ke 6 yaitu :

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. (Kepmenkes RI, 2007).

a) Pengetahuan dasar

- 1) Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan diluar uterus.
- 2) Kebutuhan dasar bayi baru lahir : kebersihan jalan nafas, perawatan tali pusat, kehangatan, nutrisi, “bonding dan attachment”.
- 3) Indikator pengkajian bayi baru lahir , misalnya dari APGAR.
- 4) Penampilan dan perilaku bayi baru lahir.
- 5) Tumbuh kembang yang normal pada bayi baru lahir selama 1 bulan.
- 6) Memberikan imunisasi pada bayi.
- 7) Masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir normal, seperti caput, molding, mongolian spot, hemangioma.
- 8) Komplikasi yang lazim terjadi pada bayi baru lahir normal seperti : hipoglikemia, hipotermi, dehidrasi, diare dan infeksi, ikterus.
- 9) Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada bayi baru lahir sampai 1 bulan.
- 10) Keuntungan dan resiko imunisasi pada bayi.
- 11) Pertumbuhan dan perkembangan bayi premature.
- 12) Komplikasi tertentu pada bayi baru lahir, seperti trauma intra-cranial, fraktur clavicula, kematian mendadak, hematoma.

b) Keterampilan dasar

- 1) Membersihkan jalan nafas dan memelihara kelancaran pernafasan, dan merawat tali pusat.
- 2) Menjaga kehangatan dan menghindari panas yang berlebihan.
- 3) Menilai segera bayi baru lahir seperti nilai APGAR.
- 4) Membersihkan badan bayi dan memberikan identitas.
- 5) Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada bayi baru lahir dan screening untuk menemukan adanya tanda kelainan-kelainan pada bayi baru lahir yang tidak memungkinkan untuk hidup.
- 6) Mengatur posisi bayi pada waktu menyusu.
- 7) Memberikan imunisasi pada bayi.
- 8) Mengajarkan pada orang tua tentang tanda-tanda bahaya dan kapan harus membawa bayi untuk minta pertolongan medik.
- 9) Melakukan tindakan pertolongan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir seperti : asfiksia/kesulitan bernafas, hipotermi dan hipoglikemia.
- 10) Memindahkan secara aman bayi baru lahir ke fasilitas kegawatdaruratan apabila dimungkinkan.
- 11) Mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan.

c) Keterampilan tambahan

- 1) Melakukan penilaian masa gestasi.
- 2) Mengajarkan pada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi yang normal dan asuhannya.

- 3) Membantu orang tua dan keluarga untuk memperoleh sumber daya yang tersedia di masyarakat.
- 4) Memberikan dukungan kepada orang tua selama masa berduka cita sebagai akibat bayi dengan cacat bawaan, keguguran atau kematian bayi.
- 5) Memberikan dukungan kepada orang tua selama bayinya dalam perjalanan rujukan diakibatkan ke fasilitas perawatan kegawatdaruratan
- 6) Memberikan dukungan kepada orang tua dengan kelahiran ganda.

11. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur tentang penanganan hipotermi pada bayi di Rumah Sakit “Aulia” Lodoyo Blitar dengan (No. Dokumen : 7/KPW.E/II/2014).

Pengertian hipotermi adalah suatu keadaan dimana suhu tubuh dibawah normal (kurang dari 36,5°C). Hipotermi merupakan salah satu penyebab tersering dari kematian bayi baru lahir, terutama dengan berat badan kurang dari 2,5 kg. Tujuan penanganan hipotermi dilakukan untuk mencegah morbiditas mortalitas bayi. Kebijakan pada protap ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya hipotermi pada bayi, terutama pada bayi baru lahir.

Prosedur pelaksanaan :

(a) Persiapan

1. Siapkan baju bayi bersih dan kering
2. Siapkan infuset, abocat, dan cairan infus (dekstrose 10 %)

(b) Pelaksanaan

1. Menyiapkan tempat persalinan yang bersih, kering dan cukup penyaluran

2. Bayi yang mengalami hipotermi biasanya mudah sekali meninggal. Tindakan yang harus dilakukan adalah segera menghangatkan bayi didalam inkubator atau melalui penyinaran lampu.
3. Melaksanakan metode kanguru, yaitu bayi baru lahir dipakaikan popok dan tutup kepala, diletakkan pada dada ibu agar tubuh bayi menjadi hangat karena terjadi kontak kulit langsung. Bila tubuh bayi masih teraba dingin bisa ditambahkan selimut.
4. Biasanya bayi hipotermi menderita hipoglikemia, sehingga bayi harus diberi ASI sedikit-sedikit sesering mungkin. Bila bayi tidak menghisap, beri infus glukosa/dekstrose 10 % sebanyak 60-80 ml/kg per hari.
5. Menunda memandikan bayi baru lahir 6 jam setelah lahir.
6. Seseberapa mungkin memberikan ASI untuk mencegah hipotermi.

Unit yang terkait : Kamar bersalin dan Ruang perinatologi.

b. Pencegahan

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kehilangan tubuh bayi menurut (Indrayani & Djami, 2013:318-320).

- 1) Keringkan bayi secara seksama.

Pastikan tubuh bayi dikeringkan segera setelah lahir untuk mencegah kehilangan panas secara evaporasi. selain untuk menjaga kehangatan tubuh bayi, mengeringkan dengan menyeka tubuh bayi juga merupakan rangsangan taktil yang dapat merangsang pernafasan bayi.

- 2) Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat.

Bayi yang diselimuti kain yang sudah basah dapat terjadi kehilangan panas secara konduksi. Untuk itu setelah mengeringkan tubuh bayi, ganti kain tersebut dengan selimut atau kain yang bersih, kering dan hangat.

3) Tutup bagian kepala.

Bagian kepala bayi merupakan permukaan yang relatif luas dan cepat kehilangan panas. Untuk itu tutupi bagian kepala bayi agar bayi tidak kehilangan panas.

4) Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya.

Selain untuk memperkuat jalinan kasih sayang ibu dan bayi, kontak kulit antara ibu dan bayi akan menjaga kehangatan tubuh bayi. Untuk itu anjurkan ibu untuk memeluk bayinya. Selain itu juga dapat membuat bayi lebih tenang.

5) Perhatikan cara menimbang bayi atau jangan segera memandikan bayi baru lahir.

Menimbang bayi tanpa alas timbangan dapat menyebabkan bayi mengalami kehilangan panas secara konduksi. Jangan biarkan bayi di timbang telanjang. Gunakan selimut atau kain berat badan bayi dapat dihitung dari selisih berat bayi dengan berat kain yang di gunakan. Bayi baru lahir rentan mengalami hipotermi untuk itu tunda memandikan bayi hingga 6 jam setelah lahir.

6) Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat.

Jangan tempatkan bayidi ruangan ber AC. Tempatkan bayi bersama ibu (*rooming in*). Jika menggunakan AC, jaga suhu ruangan agar tetap hangat.

7) Jangan segera memandikan bayi baru lahir.

Bayi baru lahir akan cepat dan mudah kehilangan panas karena sistem pengaturan panas didalam tubuhnya belum sempurna. Bayi sebaiknya dimandikan minimal 6 jam setelah lahir. Memandikan bayi dalam beberapa jam pertama setelah lahir dapat menyebabkan hipotermia yang sangat membahayakan kesehatan bayi baru lahir.

Praktek memandikan bayi yang dianjurkan :

- a) Tunggu minimal 6 jam setelah lahir (lebih lama lagi apabila bayi mengalami asfiksia atau hipotermi).
- b) Sebelum memandikan bayi, pastikan suhu tubuh bayi dalam keadaan stabil (suhu aksilla $36,5^{\circ}\text{C}$ - $37,5^{\circ}\text{C}$). Apabila suhu tubuh bayi berada di bawah $36,5^{\circ}\text{C}$, selimuti kembali tubuh bayi secara longgar, tutupi bagian kepala dan tempatkan bersama ibunya di tempat tidur atau penerapan metode kanguru. Tunda memandikan bayi hingga suhu tubuhnya menjadi stabil dalam waktu minimal 1 jam.
- c) Tunda untuk memandikan bayi yang sedang mengalami masalah pernafasan.
- d) Sebelum bayi dimandikan, pastikan ruangan kamar mandi dalam keadaan hangat dan tidak ada tiupan angin. Siapkan handuk bersih dan kering untuk mengeringkan tubuh bayi dan beberapa lembar kain atau selimut bersih dan kering untuk menyelimuti tubuh bayi setelah dimandikan.
- e) Mandikan bayi secara cepat dengan air bersih dan hangat.
- f) Segera keringkan bayi dengan mengguakan handuk bersih dan kering.

- g) Gantikan handuk yang basah dengan selimut yang bersih dan kering, kemudian selimuti tubuh bayi secara longgar, pastikan bagian kepala bayi di selimuti dengan baik.
- h) Bayi dapat di letakkan bersentuhan dengan kulit ibu atau dengan penerapan metode kanguru.
- i) Ibu dan bayi dalam satu ruangan/rawat gabung dan anjurkan ibu untuk menyusukan bayinya.

Mandi harus ditunda setelah 24 jam kelahiran. Hal ini tidak memungkinkan karena budaya alasannya, mandi harus ditunda setidaknya 6 jam. Memakaikan pakaian yang tepat untuk bayi, mengatur suhu lingkungan yang dianjurkan, menggunakan topi pada bayi, bayinya tidak boleh berpisah harus tetap tinggal bersama ibunya dalam ruangan yang sama 24 jam (WHO, 2012:4).

c. 10 langkah proteksi termal

Saat mempertimbangkan hipotermi pada neonatus pencegahannya dapat berdasarkan “rantai hangat”. Rantai hangat adalah seperangkat sepuluh prosedur saling terkait yang dilakukan saat lahir dan selama masa bayi baru lahir. Indeks rantai hangat termasuk persalinan yang hangat, pengeringan langsung, skin to skin kontak, menyusui, mandi dan timbang di tunda, pakaian dan tempat tidur yang sesuai, ibu dan bayi diruang yang sama, transportasi hangat, resusitasi hangat, dan pelatihan/keadaran pemeliharaan (Sindhu, 2015:3).

Termoregulasi adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara produksi panas dan hilangnya panas dalam rangka menjaga suhu tubuh dalam keadaan normal, kemampuan ini sangatlah terbatas pada BBL (Yunanto, 2014:89).

Sepuluh langkah proteksi termal / *warm chain*, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pada BBL, dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya stress hipotermi maupun hipertermi, serta menjaga suhu tubuh bayi tetap berada dalam keadaan normal yaitu antara 36,5-37,5°C (Yunanto, 2014:98).

1) Langkah ke 1 : Ruang melahirkan yang hangat.

Selain bersih, ruang bersalin tempat ibu melahirkan, harus cukup hangat dengan suhu ruangan antara 25°C-28°C serta bebas dari aliran arus udara melalui jendela, pintu, ataupun dari kipas angin. Selain itu saran resusitasi lengkap yang diperlukan untuk pertolongan BBL sudah disiapkan, serta harus dihadiri paling tidak 1 orang tenaga terlatih dalam resusitasi BBL sebagai penanggung jawab pada perawatan BBL.

2) Langkah ke 2 : Pengeringan segera.

Segera setelah lahir, bayi dikeringkan kepala dan tubuhnya, dan segera mengganti kain yang basah dengan kain yang hangat dan kering. Kemudian diletakkan di permukaan yang hangat seperti pada dada atau perut ibunya atau segera dibungkus dengan pakaian hangat. Kesalahan yang sering dilakukan adalah, konsentrasi penolong kelahiran terutama pada oksigenasi dan tindakan pompa jantung pada waktu resusitasi, sehingga melupakan kontrol terhadap paparan dingin yang kemungkinan besar terjadi segera setelah bayi dilahirkan.

3) Langkah ke 3 : Kontak kulit dengan kulit.

Kontak kulit dengan kulit adalah cara yang sangat efektif untuk mencegah hilangnya panas pada BBL, baik pada bayi-bayi aterm maupun preterm. Dada atau perut ibu, merupakan tempat yang sangat ideal bagi BBL untuk mendapatkan lingkungan suhu yang tepat. Apabila oleh karena sesuatu hal melekat pada BBL ke dada atau ke perut ibunya tidak dimungkinkan, maka bayi yang telah dibungkus dengan kain hangat, dapat diletakkan dalam dekapan lengan ibunya.

Metode perawatan kontak kulit dengan kulit (*skin to skin contact / kangaroo mother / KMC /perawatan bayi lekat*) dalam perawatan bayi selanjutnya sangat dianjurkan khususnya untuk bayi-bayi kecil, oleh karena dari beberapa penelitian dilaporkan adanya penurunan secara bermakna angka kesakitan dan angka kematian bayi-bayi kecil.

4) Langkah ke 4 : Pemberian ASI.

Pemberian ASI sesegera mungkin, sangat dianjurkan dalam jam-jam pertama kehidupan BBL. Pemberian ASI dini dan dalam jumlah yang mencukupi akan sangat menunjang kebutuhan nutrisi, serta akan berperan dalam proses termoregulasi pada BBL.

5) Langkah ke 5 : Tidak segera memandikan/menimbang bayi.

Memandikan bayi dapat dilakukan beberapa jam kemudian (paling tidak setelah 6 jam) yaitu setelah keadaan bayi stabil. Oleh karena tindakan memandikan bayi segera setelah lahir, akan menyebabkan terjadinya penurunan suhu tubuh bayi. Mekonium, darah, atau sebagian verniks, dapat dibersihkan pada aktu tindakan

mengeringkan bayi. Sisa verniks yang masih menempel di tubuh bayi tidak perlu dibuang, selain tindakan tersebut akan menyebabkan iritasi kulit juga verniks tersebut masih bermanfaat sebagai pelindung panas tubuh bayi, dan akan direabsorpsi dalam hari-hari pertama kehidupan bayi.

Menimbang bayi dapat ditunda beberapa saat kemudian, oleh karena dengan tindakan menimbang sangat dimungkinkan akan terjadi penurunan suhu tubuh bayi. Sangat dianjurkan pada waktu menimbang bayi, timbangan yang digunakan diberi alas kain hangat.

6) Langkah ke 6 : Pakaian dan selimut bayi yang adekut.

Secara umum, BBL memerlukan beberapa lapis pakaian dan selimut lebih banyak daripada orang dewasa. Pakaian, dalam hal ini juga meliputi topi, karena sebagian besar (kurang lebih 25 %) kehilangan panas dapat terjadi melalui kepala bayi. Pakaian dan selimut seyogyanya cukup longgar, sehingga memungkinkan adanya lapisan udara diantara permukaannya sebagai penyangga panas tubuh yang cukup efektif. Bedong (*swadlling*) yang biasanya sangat erat sebaiknya dihindarkan, selain menghilangkan lapisan udara sebagai penyangga panas, juga menaikkan resiko terjadinya pneumonia dan penyakit infeksi saluran nafas lainnya, karena tidak memungkinkan paru bayi mengembang sempurna pada waktu bernafas.

7) Langkah ke 7 : Rawat gabung.

Bayi-bayi yang dilahirkan dirumah ataupun yang dilahirkan di rumah sakit, seyogyanya dijadikan satu, dalam tempat tidur yang sama dengan ibunya, selama 24 jam penuh dalam ruangan yang cukup hangat (minimal 25°C). Hal ini akan sangat menunjang pemberian ASI *on demand*, serta mengurangi resiko terjadinya infeksi nosokomial pada bayi-bayi yang lahir di rumah sakit.

8) Langkah ke 8 : Transportasi hangat.

Apabila bayi perlu segera dirujuk kerumah sakit, atau kebagian lain di lingkungan rumah sakit seperti di ruang rawat bayi selama dalam perjalanan. Apabila memungkinkan, adalah merujuk bayi bersamaan dengan ibunya dalam perawatan bayi lekat, oleh karena hal ini merupakan cara yang sederhana dan aman.

9) Langkah ke 9 : Resusitasi hangat.

Pada waktu melakukan resusitasi, perlu menjaga agar tubuh bayi tetap hangat. Hal ini sangat penting, oleh karena bayi-bayi yang mengalami asfiksia, tubuhnya tidak dapat menghasilkan panas yang cukup efisien sehingga mempunyai resiko tinggi menderita hipotermia. Pada waktu melakukan resusitasi dirumah sakit, memberikan lingkungan yang hangat dan kering, dengan meletakkan bayi di bawah alat pemancar panas, merupakan salah satu dari rangkaian prosedur standar resusitasi BBL.

10) Langkah ke 10 : Pelatihan dan sosialisasi rantai hangat.

Semua pihak yang terlibat dalam proses kelahiran serta perawatan bayi (dokter, bidan, perawat, dukun bayi dan lain-lain), perlu dilatih dan diberikan

pemahaman tentang prinsip-prinsip serta prosedur yang benar tentang rantai hangat. Keluarga dan anggota masyarakat yang mempunyai bayi dirumah, perlu diberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga agar bayinya selalu tetap hangat.

C. Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah dengan metode pengaturan pemikiran dan tindakan dalam suatu urutan logis baik pasien maupun petugas kesehatan. Proses itu digambarkan dalam arti kata perilaku yang diharapkan dari klinis tersebut. Hal ini digambarkan dengan jelas bahwa proses berpikir dan bertindak yang terlibat, tetapi juga tingkat perilaku dalam setiap langkah yang akan dicapai dalam rangka memberikan asuhan/pelayanan yang aman dan menyeluruh.

Proses asuhan kebidanan ada tujuh langkah yang secara periodik disaring ulang, itu mulai dengan pengumpulan data dan berakhir dengan evaluasi. Ketujuh langkah terdiri dari kerangka yang menyeluruh dan dapat diterapkan dalam setiap situasi. Setiap langkah bagaimanapun dapat diuraikan dalam tugas yang terbatas dan ini bervariasi sesuai dengan kondisi pasien.

a. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

1) Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pengumpulan data dasar secara komprehensif untuk evaluasi pasien. Data dasar ini termasuk riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik apabila perlu, tinjau catatan saat ini atau catatan lama dari rumah sakit. Tinjauan singkat dari data laboratorium dan pemeriksaan tambahan lainnya, semua informasi pasien dari semua sumber yang berhubungan dengan kondisi pasien. Bidan kumpulan data awal yang menyeluruh walaupun pasien itu ada komplikasi yang akan diajukan kepada dokter konsulen. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Anamnesa, meliputi tanya jawab untuk memperoleh riwayat kesehatan ibu, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data, social, ekonomi dan psikologi serta meliputi HPHT, HTP, pergerakan janin, umur kehamilan, sakit perut tembus kebelakang sejak kapan dan ada pelepasan lendir dan darah.

Pemeriksaan fisik meliputi : pemeriksaan tanda-tanda vital bayi, keadaan umum klien, dan pemeriksaan fisik secara inspeksi, palpasi meliputi : tubuh dan kaki bayi teraba dingin, tampak lesu, konjungtiva pucat serta aktifitas berkurang.

Hipotermi adalah suhu dibawah $36,5^{\circ}\text{C}$, yang terbagi atas : hipotermi ringan (*cold stress*) yaitu suhu antara $36-36,5^{\circ}\text{C}$, hipotermi sedang yaitu suhu antara $32-36^{\circ}\text{C}$, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh $<32^{\circ}\text{C}$ (suhu ketiak).

Bayi tidak mau minum atau menetek, bayi tampak lesu atau mengantuk saja, tubuh bayi teraba dingin, dalam keadaan berat, denyut jantung bayi menurun dan kulit tubuh bayi mengeras (sklerema).

Tanda-tanda hipotermi sedang (*stress dingin*) yaitu : aktifitas berkurang, letargis, tangisan lemah, kulit berwarna tidak rata (*cutis marmorata*), kemampuan menghisap lemah dan kaki teraba dingin. Tanda-tanda hipotermi berat (*cidera dingin*) sama dengan hipotermi sedang, bibir dan kuku kebiruan, pernafasan lambat, pernafasan tidak teratur, bunyi jantung lambat dan selanjutnya mungkin timbul hipoglikemia dan asidosis metabolik. Tanda-tanda stadium lanjut hipotermi yaitu muka, ujung kaki dan tangan berwarna merah terang, bagian tubuh lainnya pucat, kulit mengeras merah dan timbul oedema terutama pada punggung, kaki dan tangan (sklerema).

2) Langkah Ke II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Dikembangkan dari data dasar : interpretasi dari data ke masalah atau diagnosa khusus yang teridentifikasi. Kedua kata masalah maupun diagnosa dipakai, karena beberapa masalah tidak dapat didefinisikan sebagai diagnosa tetapi tetap perlu dipertimbangkan untuk membuat wacana yang menyeluruh untuk pasien.

Hipotermi adalah suhu dibawah $36,5^{\circ}\text{C}$, yang terbagi atas : hipotermi ringan (*cold stress*) yaitu suhu antara $36-36,5^{\circ}\text{C}$, hipotermi sedang yaitu suhu antara $32-36^{\circ}\text{C}$ dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh $<32^{\circ}\text{C}$. Bayi tidak mau minum atau menetek, bayi tampak lesu atau mengantuk saja, tubuh bayi dalam keadaan dingin, dalam keadaan berat, denyut jantung bayi menurun dan kulit tubuh bayi mengeras (sklerema).

Hipotermi dapat terjadi pada bayi baru lahir (neonatus), yaitu pada bayi dengan asfiksia, bayi BBLR, bayi dengan sepsis, distress pernafasan, pada bayi prematur atau bayi kecil yang memiliki cadangan glukosa yang sedikit (Rukiyah dan Yulianti, 2013:287)

3) Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial lainnya berdasarkan masalah yang sudah ada adalah suatu bentuk antisipasi, pencegahan apabila perlu menunggu dengan waspada dan persiapan untuk suatu pengakhiran apapun. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Pada kasus hipotermi biasanya dapat menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Hipoglikemia adalah masalah serius pada bayi baru lahir karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat terjadinya hipoksi otak. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat bahkan sampai kematian. Glukosa merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan dan hari-hari pertama pasca lahir. Setiap stres yang terjadi mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatkan penggunaan cadangan glukosa misalnya pada asfiksia, hipotermi, hipertermi dan gangguan pernafasan.

Akibat yang ditimbulkan hipotermi yaitu Hipoglikemia-Asidosis Metabolik, karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob, kebutuhan oksigen yang meningkat, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermi berat, syok, apnea dan perdarahan Intra Ventricular (Rukiyah & Yulianti, 2013:284).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kehilangan tubuh bayi menurut (Indrayani & Djami, 2013:318-320).

Mengeringkan bayi secara seksama dengan memastikan tubuh bayi dikeringkan segera setelah lahir untuk mencegah kehilangan panas secara evaporasi, selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat karena bayi yang diselimuti kain yang sudah basah dapat terjadi kehilangan panas secara konduksi, tutup bagian kepala dimana bagian kepala bayi merupakan permukaan yang relatif luas dan cepat kehilangan panas, anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya, tempatkan bayi di lingkungan yang hangat, jangan segera memandikan bayi baru lahir.

4. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi

Merefleksikan proses manajemen yang sifatnya terus menerus tidak hanya pada asuhan primer yang periodik selama kunjungan antenatal tetapi juga selama bidan terus bersama wanita itu misalnya selama waktu bersalin. Data baru terus dikumpulkan dan dievaluasi. Jika terjadi kasus hipotermi berat (*cidera dingin*) sama dengan hipotermi sedang, bibir dan kuku kebiruan, pernafasan lambat, pernafasan tidak teratur, bunyi jantung lambat dan selanjutnya mungkin timbul hipoglikemia dan

asidosis metabolik. Harus dilakukan tindakan segera seperti menempatkan bayi pada incubator, menyelimuti bayi dengan kain hangat dan melakukan metode kanguru agar bayi tetap hangat didekap ibunya.

5. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Membuat suatu rencana asuhan yang komprehensif, ditentukan oleh langkah sebelumnya, adalah suatu perkembangan dari masalah atau diagnosa yang sedang terjadi atau terantisipasi dan juga termasuk mengumpulkan informasi tambahan atau tertinggal untuk data dasar.

Suatu rencana asuhan yang komprehensif tidak saja mencakup apa yang ditentukan oleh kondisi pasien dan masalah yang terkait, tetapi juga menggaris bawahi bimbingan yang terantisipasi (*anticipatory guide*) untuk seperti apa yang diharapkan terjadi berikutnya.

Berdasarkan kasus hipotermi terkhusus hipotermi ringan maupun sedang ini bisa ditolong di puskesmas dengan cara menghangatkan bayi didalam inkubator atau dibawah penyinaran lampu, melakukan metode kanguru untuk menghangatkan bayi melalui panas tubuh ibu, memeriksa suhu tubuh bayi setiap jam, mengganti pakaian yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat, memakai topi dan selimut hangat. Hindari paparan panas dan posisi bayi sering diubah.

Jika pada bayi aterm : letakkan BBL pada Radiant Warmer, keringkan untuk menghilangkan panas melalui evaporasi, tutup kepala, bungkus tubuh segera, bila stabil dapat segera rawat gabung sedini mungkin setelah lahir bayi dapat disusukan.

Jika pada bayi preterm : seperti prosedur diatas masukkan ke inkubator dengan servo

control atau radiant warmer dengan servo controle. Jika pada bayi dengan BBLR menurut (Maryunani, 2013:278-279) yaitu :

Ganti pakaian yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat dan kering, memakai topi dan selimut, periksa ulang suhu bayi 1 jam kemudian, bila suhu naik pada batas normal (36,5-37,5°C), berarti usaha menghangatkan berhasil, anjurkan ibu untuk menyusui lebih sering, bila suhu tetap dalam batas normal dan bayi dapat minum dengan baik serta tidak ada masalah lain yang memerlukan pengawasan, bayi tidak usah dirujuk, dan nasehati ibu cara merawat bayi lekat/metode kanguru dirumah.

6. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Melaksanakan perencanaan asuhan menyeluruh, perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggungjawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (yaitu : memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen asuhan klien agar penanganan kasus dengan hipotermi dapat berhasil dan memuaskan.

7. Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi langkah terakhir ini sebenarnya adalah merupakan pengecekan apakah rencana asuhan tersebut, yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya dan dianggap tidak efektif jika memang tidak efektif. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian tidak.

Sekali lagi, dengan mengingat bahwa proses manajemen asuhan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut (Sudarti & Fauziah, 2013:177-182).

Beberapa hal yang di evaluasi : apakah ibu sudah mengerti dengan penjelasan yang diberikan, apakah ibu sudah melakukan apa yang telah di anjurkan dan telah diajarkan, bagaimana keadaan umum bayi, mengukur tanda-tanda vital bayi untuk memantau keadaan bayi, apa kecemasan pada ibu teratasi, apakah kasus neonatus dengan hipotermi dapat teratasi.

b. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Dokumentasi asuhan dalam pelayanan kebidanan adalah bagian dari kegiatan yang harus dikerjakan oleh perawat dan bidan setelah memberi asuhan kepada pasien. Dokumentasi merupakan suatu informasi lengkap meliputi status kesehatan kesehatan

pasien, kebutuhan pasien, kegiatan asuhan kebidanan serta respons pasien terhadap asuhan yang diterimanya. Dengan demikian dokumentasi kebidanan mempunyai porsi yang besar dari catatan klinis pasien yang menginformasikan faktor tertentu atau situasi yang terjadi selama asuhan dilaksanakan. Disampingkan itu catatan juga dapat sebagai wahana komunikasi dan koordinasi antar profesi (*Interdisipliner*) yang dapat dipergunakan untuk mengungkap suatu fakta aktual untuk dipertanggungjawabkan.

Dokumentasi asuhan kebidanan merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan yang dilaksanakan sesuai standar. Dengan demikian pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan standar dengan baik merupakan suatu hal yang mutlak bagi setiap tenaga kebidanan agar mampu membuat dokumentasi kebidanan secara baik dan benar.

Manajemen kebidanan merupakan metode atau bentuk pendekatan yang digunakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, sehingga langkah-langkah dalam manajemen merupakan alur pikir bidan dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan klinis.

1) Subjektif.

Subjektif menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa sebagai langkah 1 varney. Subjektif (S) ini merupakan informasi

yang diperoleh langsung dari klien. Informasi tersebut dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa.

Catatan ini berhubungan masalah dengan sudut pandang pasien :

- a) Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sehingga kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa (data primer).
- b) Pada bayi atau anak kecil data subjektif ini dapat diperoleh dari orang tuanya (data sekunder).
- c) Data subjektif menguatkan diagnosa yang akan dibuat.
- d) Tanda gejala subjektif yang diperoleh dari hasil bertanya dari pasien, suami atau keluarga (identitas umum, keluhan, riwayat menachre, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat penyakit, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, riwayat psikososial, pola hidup).
- e) Pada orang yang bisu, dibagian data belakang "S" diberi tanda "0" atau "X" ini menandakan porang itu bisu. Data subjektif menguatkan diagnosa yang akan dibuat.

2) Objektif

Objektif menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan tes diagnosa lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung assesment sebagai langkah 1 varney. Data yang diperoleh dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan pada waktu pemeriksaan termasuk juga hasil pemeriksaan laboratorium, USG, dan lain-lain. Apa yang dapat diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosa yang akan ditegakkan.

- a) Data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa.
 - b) Tanda gejala objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan (tanda KU, Vitalsign, Fisik, Khusus, kebidanan, pemeriksaan dalam, laboratorium dan pemeriksaan penunjang). Pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi.
 - c) Data yang digolongkan dalam kategori ini, antara lain : Data psikologik, Hail observasi yang jujur, Informasi kajian teknologi (hasil pemeriksaan laboratorium, RO, CTG, USG, dan lain-lain).
 - d) Anda yang dapat memuaskan laporan dari keluarga yang masuk kategori ini.
 - e) Apa yang dapat diobservasikan oleh bidan atau perawat akan menjadi komponen yang penting dari diagnosa yang ditegakkan.
- 3) Assesment

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi : 1. Diagnosa atau masalah (Diagnosa adalah rumusan dari hasil pengkajian mengenai kondisi klien : hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Berdasarkan hasil analisa data yang didapat. Masalah segala sesuatu yang menyimpang sehingga kebutuhan klien terganggu, kemungkinan mengganggu kehamilan atau kesehatan tetapi tidak masuk dalam diagnosa. 2. Antisipasi diagnosa atau masalah potensia. Perlunya tindakan segera oleh Bidan atau Dokter, konsultasi atau kolaborasi atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 varney.

- a) Masalah atau diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif maupun data atau informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan dan disimpulkan.
- b) Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu ada informasi baru baik subjektif maupun objektif dan sering diungkapkan secara terpisah-pisah, maka proses analisa adalah proses yang dinamik.
- c) Sering menganalisis S penting !
- d) Mengikuti perkembangan pasien dan menjamin segala perbuatan baru dapat diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang tepat.

4) Planning

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan, tindakan dan evaluasi berdasarkan assesment sebagai langkah 5, 6, 7.

- a) Membuat perencanaan tindakan saat itu atau yang akan datang untuk mengusahakan mencapai kondisi pasien sebaik mungkin atau menjaga atau mempertahankan kesejahteraan.
- b) Proses ini termasuk kriteria tujuan terdiri dari kebutuhan pasien yang harus dicapai dalam bata waktu tertentu.
- c) Tindakan yang diambil harus membantu pasien mencapai kemajuan dalam kesejahteraannya yang pasalnya dan harus mendukung rencana Dokter bila itu dalam manajemen kolaborasi atau rujukan.

c. Tinjauan Islam Tentang Bayi Hipotermi

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mu'minun (23):12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah” (12). “Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)”(13). “Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah SWT, pencipta yang paling baik”(14).

Ayat ini menguraikan tentang proses terjadinya manusia, keberuntungan orang-orang mukmin dengan aneka sifat mereka yang terpuji, kini ayat-ayat diatas menjelaskan proses kejadian manusia. Uraian tentang proses tersebut yang denikian mengagumkan membuktikan perlunya beriman dan tunduk kepada Allah SWT Sang Pencipta serta keharusan mengikuti jejak orang-orang mukmin yang disebut pada ayat-ayat kelompok pertama. Hal itulah yang dapat mengantar manusia mencapai kesempurnaan hidup duniawi dan ukhrawi.

Q.S Ghafir (40):67 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ

لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya :

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya.”

Ayat diatas masih merupakan lanjutan dari uraian tentang Allah SWT. Ayat ini diuraikan sebagai bukti kuasa Allah SWT adalah diri manusia sendiri. Ini pada hakikatnya lebih jelas karena dapat dialami dan diketahui oleh masing-masing manusia, paling tidak setelah Allah SWT menganugerahkan kepadanya kemampuan berfikir. Ayat diatas menyatakan : *Dia juga Yang Maha Esa itu yang menciptakan kamu, wahai putra putri Adam, dari tanah kemudian dari setetes air mani yang bertemu dengan indung telur dan menyatu dalam rahim, sesudah itu dari ‘alaqah, kemudian setelah enam bulan atau lebih dikeluarkannya kamu dari perut ibu kamu masing-masing sebagai seorang anak kecil, kemudian kamu dipelihara dengan memberimu kekuatan lahir dan batin supaya kamu mencapai masa kedewasaan, kemudian sebagaimana kamu dibiarkan hidup lagi agar kamu menjadi orang-orang tua yang lemah fisik dan daya pikirnya; diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum mencapai masa dewasa atau tua itu, yakni wafat sejak bayi atau sebelum dewasa.*

Allah SWT melakukan hal yang demikian itu agar berbeda-beda usia kamu *dan supaya* masing-masing orang diantara kamu *sampai kepada ajal yang ditentukan baginya dan supaya kamu berakal.*



BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI Ny “H” DENGAN HIPOTERMI DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR

TANGGAL 04 MEI 2017 s/d 24 MEI 2017

No. Register : 06XXXX
Tanggal lahir : 03 mei 2017 pukul 02.38 wita
Tanggal pengkajian : 04 mei 2017 pukul 10.05 wita
Nama pengkaji : Sarnah

Langkah I. Identifikasi data dasar

1. Identifikasi bayi dan orang tua

a. Identitas bayi

Nama : By “H”
Tanggal lahir : 03 mei 2017 pukul 02.38 wita
Anak ke : keempat
Jenis kelamin : laki-laki

b. Identitas ibu ayah

Nama : Ny “H” / Tn “S”
Umur : 24 tahun / 32 tahun
Nikah : 1x / ± 8 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh harian
Alamat : jl. Teuku umar 12 lr.5 no.61

2. Data biologis/psikologis

a. Keadaan bayi setelah lahir baik, lahir secara spontan, menangis dengan rangsangan taktil dengan Apgar Score 8/10.

b. Riwayat kehamilan dan persalinan

1) Prenatal

Ibu mengatakan HPHT : 10 Agustus 2016, HTP : 17 Mei 2017 dan melahirkan tanggal 03 Mei 2017 pukul 02.38 wita, usia kehamilannya yaitu 38 minggu, ibu sering datang memeriksakan kehamilannya dipelayanan kesehatan dan ibu juga telah mendapatkan suntikan TT, ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes millitus dan penyakit lainnya.

2) Natal

Berat badan bayi yaitu 3300 (2500-4000 gram), panjang badannya yaitu 48 cm (48-52 cm), keadaan umum bayi baik, bayi lahir tanggal 03 mei 2017 pukul 02.38 wita, bayi lahir normal, segera menangis, bayi dilakukan Inisiasi Menyusui Dini segera setelah lahir, dan bayi memiliki Apgar Score 7/10.

3) Riwayat pemenuhan / kebutuhan dasar bayi

a. Nutrisi cairan

Kebutuhan nutrisi/cairan bayi sementara di peroleh dari pemerian ASI eksklusif oleh ibu.

b. Personal Hygiene

Bayi sudah dimandikan dan pakaian bayi diganti tiap kali basah/habis BAB/BAK.

c. Eleminasi

BAK : bayi sudah BAK selama pengkajian, frekuensi BAK 2 kali selama pengkajian, warna kuning jernih dengan bau amoniak.

BAB : bayi belum pernah BAB selama pengkajian.

d. Istirahat

Bayi lebih banyak tidur dan terbangun jika bayi lapar.

e. Imunisasi

Selama lahir bayi telah disuntikkan imunisasi Hepatitis B.

f. Pemeriksaan fisik

1) Pertumbuhan

BB : 3300 gram, normalnya (2500-4000 gram).

PB : 48 cm, normalnya (48-52 cm).

2) Tanda-tanda vital

Heart Rate : 124 x/menit

Pernafasan : 44 x/menit

Suhu : 35,3°C

3) Kepala

Simetris kiri dan kanan, tidak ada caput succedaneum, tidak ada chepal hematoma, UUB belum menutup rambut hitam tipis dan halus.

4) Mata

Simetris kiri dan kanan, pupil mata bereaksi dengan baik, sklera putih dan tidak ikterus, dan konjungtiva merah muda.

5) Mulut

Refleks menghisap lemah, tidak ada lendir, tidak ada kelainan pada pallatum, bibir pucat.

6) Leher

Tidak ada pembesaran, pembengkakan dan nyeri tekan ditandai dengan bayi tidak menangis.

7) Dada dan perut

Simetris kiri dan kanan, gerakan dada sesuai dengan nafas bayi, tidak ada tonjolan dada pada bayi, tonus otot bayi baik, tali pusat masih basah.

8) Punggung dan bokong

Tidak ada tonjolan pada tulang punggung.

9) Genetalia dan anus

Tidak ada kelainan pada genetalia

10) Ekstremitas atas dan bawah

Pergerakan kurang aktif, jari tangan kiri dan kanan lengkap, kuku pucat, tangan dan kaki teraba dingin.

11) Pemeriksaan pengukuran

Lingkar kepala : 33 cm (33-35 cm)

Linkar dada : 30 cm (30-38 cm)

Lingkar perut : 30 cm (31-35 cm)

LILA : 10 cm (10-11 cm)

Langkah II : Identifikasi diagnosa/masalah aktual

Diagnosa : Bayi cukup bulan (BCB) / Sesuai Masa Kehamilan (SMK)

Masalah aktual : hipotermi

a. Bayi cukup bulan (BCB)/Sesuai masa kehamilan (SMK)

Data Subjektif :

1. ibu mengatakan HPHT 10 Agustus 2016
2. ibu mengatakan melahirkan tanggal 03 Mei 2017

Data Objektif :

1. HTP tanggal 17 Mei 2017

Analisa dan interpretasi data :

Menentukan usia kehamilan menurut hukum Neagle melalui HPHT, jadi dari HPHT yang didapatkan dari ibu yakni tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal melahirkan ibu yakni tanggal 03 Mei 2017 maka usia kehamilan ibu adalah 38 minggu (Prawirohardjo, 2014:279).

Usia kehamilan normal menurut Sari Wahyuni adalah 37 minggu sampai dengan 42 minggu (Wahyuni, 2012:1)

a. Hipotermi

Data subjektif :

1. Ibu mengatakan tubuh bayinya dingin

2. Ibu mengatakan bayinya kurang aktif dan refleks menghisap lemah

Data objektif :

1. Tanda-tanda vital

HR : 124 x/menit

P : 44 x/menit

S : 35,5°C

Analisa dan interpretasi data :

Hipotermi adalah adalah suhu dibawah 36,5°C, yang terbagi atas : hipotermi ringan (*cold stress*) yaitu suhu antara 36-36,5°C, hipotermi sedang yaitu suhu antara 32-36°C, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh <32°C yang ditandai dengan Aktifitas berkurang, Kemampuan menghisap lemah dan Kaki teraba dingin

Langkah III : Identifikasi diagnosa/masalah potensial

Potensial terjadi hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kadar glukosa darah kurang dari 45 mg/dl (2,6 mmol/L). Masalah serius pada bayi baru lahir, karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat hipoksi otak. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat bahkan sampai kematian. Glukosa merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan dan hari-hari pertama pasca lahir. Setiap stress yang terjadi mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatnya penggunaan cadangan glukosa, misalnya pada asfiksia, hipotermi, hipertermi, dan gangguan pernafasan.

Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi

Tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera

Langka V : Rencana Tindakan

a. Tujuan

1. Hipotermi dapat teratasi
2. Kebutuhan nutrisi terpenuhi/teratasi
3. Tidak terjadi hipoglikemia

b. Kriteria

1. Hipotermi telah teratasi
2. Suhu tubuh dalam batas normal ($36,5-37,5^{\circ}\text{C}$)

c. Rencana asuhan

Tanggal 4 mei 2017

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Rasional : tangan yang kotor dapat menjadi tempat berkembangbiaknya mikroorganisme, dimana apabila menyentuh pasien dapat terkontaminasi.

2. Observasi tanda-tanda vital setiap pagi dan sore

Rasional : Tanda-tanda vital memberikan gambaran dalam menentukan tindakan selanjutnya.

3. Timbang BB bayi setiap hari

Rasional : BB bayi sangat penting untuk menetapkan kalori dan cairan bayi dengan mengetahui perubahan BB bayi maka kita dapat mengetahui kondisi bayi.

4. Bedong dengan kain hangat

Rasional : perawatan bayi dengan terbungkus akan menghindari terjadinya konduksi dan evaporasi.

5. Observasi eliminasi bayi

Rasional : untuk mengetahui keseimbangan intake dan output.

6. Gantikan pakaian atau popok bayi tiap kali basah

Rasional : pakaian bayi akan mempengaruhi suhu badan yang dapat mengakibatkan evaporasi.

7. Anjurkan kepada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya secara on demand.

Rasional : pemberian ASI secara teratur sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, serta akan berperang dalam proses termoregulasi bayi. Banyak dampak positifnya bagi bayi antara lain menjalin/memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, memberikan kekebalan pada bayi melalui kolostrum, membantu pemenuhan nutrisi bayi, dan lain-lain.

8. Anjurkan pada ibu untuk mengkomsumsi makanan dengan gizi seimbang

Rasional : kecukupan asuhan gizi pada ibu menyusui sangat mempengaruhi produksi ASI yang dibutuhkan bayi.

9. Ajarkan pada ibu tehnik dan posisi menyusui yang baik dan benar, yaitu :

- a. Usahakan pada saat menyusuiibu dalam keadaan tenang
- b. Memasukkan semua areolla mammae kedalam mulut bayi
- c. Ibu dapat menyusui dengan cara duduk atau berbaring sesuai kenyamanan dengan santai dan dapat menggunakan sandaran (bantal)pada punggung

- d. Payudara dipegang dengan ibu jari diatas, jari yang lain menopang dibawah payudara
- e. Berikan ASI pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara on demand. Setelah salah satu payudara mulai terasa kosong, sebaiknya ganti pada payudara yang satunya.
- f. Setelah selesai menyusui oleskan ASI payudaranya, biarkan kering sebelum kembali memakai bra, langkah ini berguna untuk mencegah lecet pada puting
- g. Sendawakan bayi tiap kali habis menyusui untuk mengeluarkan udara dari lambung bayi agar bayi tidak kembung dan muntah.

Rasional : bayi akan tampak tenang karena mudah menghisap ASI, pemenuhan nutrisi bayi cukup dan mencegah terjadinya puting susu lecet dan tidak terasa nyeri.

- 10. Anjurkan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk memeriksa kadar gula dalam darah.

Rasional : setiap stress yang terjadi mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatnya penggunaan cadangan glukosa.

- 11. Lakukan pendokumentasian

Rasional : pencatatan yang baik dapat menjadi pegangan petugas jika terjadi sesuatu pada pasien.

Langkah VI : Implementasi

Tanggal 04 mei 2017

- 1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi pukul 10.05 wita

Hasil : petugas sudah mencuci tangan.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital telah dilakukan jam 10.10 wita wita

Hasil : Heart Rate : 124 x/menit.

Pernafasan : 44 x/menit

Suhu : 35,3°C

3. Membedong dengan kain hangat pukul 10.20 wita

Hasil : bayi dibungkus (dibedong)

4. Mengobservasi eliminasi bayi pukul 10.30 wita

Hasil : BAK sudah 2 kali dan BAB 1 kali selama pengkajian.

5. Mengganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah pukul 10.45 wita

Hasil : bayi sudah memakai popok.

6. Menganjurkan kepada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya selama 6 bulan dan mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi ASI lancar pukul 10.55 wita

Hasil : ibu mau menyusui bayinya dan telah siberi ASI sedikit-sedikit tapi sering.

7. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi pukul 11.00 wita

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

8. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar pukul 11.20 wita

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar.

9. Menganjurkan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi pukul

11.38 wita

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.

10. Melakukan pendokumentasian

Hasil : sudah melakukan pendokumentasian.

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 05 mei 2017

1. Suhu tubuh bayi telah normal dan bayi telah pulang kerumah
2. Kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi ditandai bayi selalu menyusui
3. Keadaan bayi baik.

Heart Rate : 138 x/menit

Pernafasan : 46 x/menit

Suhu : 36,7°C

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI Ny “H”
DENGAN HIPOTERMI DI PUSKESMAS**

JUMPANDANG BARU MAKASSAR

TANGGAL 4 MEI 2017

No. Register : 06XXXX

Tanggal lahir : 03 mei 2017 pukul 02.38 wita

Tanggal pengkajian : 04 mei 2017 pukul 10.05 wita

Nama pengkaji : Sarnah

Langkah I. Identifikasi data dasar

1. Identifikasi bayi dan orang tua

c. Identitas bayi

Nama : By “H”

Tanggal lahir : 03 mei 2017 pukul

Anak ke : keempat

Jenis kelamin : laki-laki

d. Identitas ibu ayah

Nama : Ny “H” / Tn “S”

Umur : 24 tahun / 32 tahun

Nikah : 1x / ± 8 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh harian

Alamat : jl. Teuku umar 12 lr.5 no.61

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya lahir tanggal 03 mei 2017 pukul 02.38 wita
2. Ibu mengatakan HPHT 10 agustus 2016
3. Ibu mengatakan tubuh bayinya dingin
4. Ibu mengatakan bayinya kurang aktif dan refleks menghisap lemah

Objektif (O)

1. Masa gestasi 38 minggu
2. Suhu bayi yaitu 35,3°C
3. BB : 3300 gram, PB : 48 cm

Assesmenta (A)

Bayi cukup bulan (BCB)/Sesuai Masa Kehamilan (SMK) dengan hipotermi

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi pukul 10.05 wita

Hasil : petugas sudah mencuci tangan.

2. Observasi tanda-tanda vital telah dilakukan jam 10.10 wita

Hasil : Heart Rate : 140 x/menit.

Pernafasan : 44 x/menit

Suhu : 35,3°C

3. Membedong dengan kain hangat pukul 10.20 wita

Hasil : bayi dibungkus (dibedong)

4. Mengobservasi eliminasi bayi pukul 10.30 wita

Hasil : BAK sudah 2 kali dan BAB 1 kali selama pengkajian.

5. Mengganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah pukul 10.45 wita

Hasil : bayi sudah memakai popok.

6. Mengajarkan kepada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya selama 6 bulan dan mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi ASI lancar pukul 10.55 wita.

Hasil : ibu mau menyusui bayinya dan telah diberi ASI sedikit-sedikit tapi sering.

7. Mengajarkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi pukul 11.00 wita

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

8. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar pukul 11.20 wita

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar.

9. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi pukul 11.38 wita

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.

10. Melakukan pendokumentasian

Hasil : sudah melakukan pendokumentasian.

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI Ny
“H” DENGAN HIPOTERMI DI PUSKESMAS
JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 5 MEI 2017

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak dingin lagi
2. Ibu mengatakan telah berencana untuk pulang
3. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui

Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik, kesadaran komposmentis
2. Mengobservasi tanda-tanda vital
Heart Rate : 138 x/menit
Pernafasan : 46 x/menit
Suhu : 36,7°C
3. Berat badan : 3270 gram.
4. Bayi telah BAB 1 kali warna hijau kehitaman, konsistensi lembek.
5. BAK 2 kali warna kuning jernih.

Assesment (A)

Bayi Ny “H” umur 3 hari dengan hipotermi

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi
Hasil : petugas sudah mencuci tangan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Heart Rate : 138 x/menit

Pernafasan :46 x/menit

Suhu : 36,7°C

3. Mengobservasi eliminasi

Hasil : BAK 2 kali dan BAB 1 kali selama pengkajian

4. Mengganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah

Hasil : bayi telah memakai popok

5. Menganjurkan kepada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya selama 6 bulan dan mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi ASI lancar.

Hasil : ibu mau menyusui bayinya dan telah diberi ASI sedikit-sedikit tapi sering

6. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah diajarkan

7. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar

8. Menganjurkan kepada ibu agar menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya.

Hasil : ibu bersedia menjaga kebersihannya

9. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya bagi bayi baru lahir yang harus diwaspadai.

Hasil : ibu mengerti dan tahu tanda-tanda bahaya bagi bayi

10. Mengajukan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara on demand.

Hasil : ibu mau melakukannya

11. Mengajukan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

12. Melakukan pendokumentasian

Hasil : sudah melakukan pendokumentasian.



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI Ny
“H” DENGAN HIPOTERMI DI PUSKESMAS
JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 12 MEI 2017**

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat.
2. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel.
3. Ibunya mengatakan bayinya kuat menyusui.

Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik, kesadaran komposmentis.
2. Mengobservasi tanda-tanda vital
Heart Rate : 142 x/menit
Pernafasan : 48 x/menit
Suhu : 37,1°C
3. Berat badan : 3600 gram

Assesment (A)

Bayi Ny “H” umur 10 hari dengan riwayat Hipotermi.

Planning (P)

1. Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan dari bayi “H”.
Hasil : bayi “H” dalam keadaan sehat.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Heart Rate : 142 x/menit

Pernafasan : 48 x/menit

Suhu : 37,1°C

3. Menimbang berat badan bayi

Hasil : 3600 gram

4. Mengajarkan ibu cara merawat bayi sehari-hari yaitu mengganti popok apabila basah atau kotor dan memandikan bayi.

Hasil : ibu sudah tau cara merawat bayi sehari-hari

5. Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil : bayi sudah menyusui pada ibunya

6. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

Hasil : ibu selalu memberikan Asi pada bayinya

7. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkomsumsi makanan bergizi

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

8. Mengajarkan pada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang benar

9. Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya imunisasi lengkap sesuai jadwal imunisasi di pelayanan kesehatan terdekat

Hasil : ibu bersedia membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal imunisasinya

10. Melakukan pendokumentasian.

Hasil : sudah melakukan pendokumentasian.



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI Ny
“H” DENGAN HIPOTERMI DI PUSKESMAS
JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 24 MEI 2017

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel.
2. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui.
3. Ibu mengatakan bayinya sangat aktif.

Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik.
2. Kesadaran komposmentis.
3. Mengukur tanda-tanda vital.

Heart Rate : 140 x/menit.

Pernafasan : 48 x/menit.

Suhu : 36,9°C

4. Berat badan : 3800 gram

Assesment (A)

Bayi Ny “H” umur 22 hari riwayat hipotermi

Planning (P)

1. Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan dari bayi “H”.

Hasil : bayi “H” dalam keadaan sehat.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Heart Rate : 142 x/menit

Pernafasan : 48 x/menit

Suhu : 36,9°C

3. Menimbang berat badan bayi

Hasil : 3800 gram

4. Mengajarkan ibu cara merawat bayi sehari-hari yaitu mengganti popok apabila basah atau kotor dan memandikan bayi.

Hasil : ibu sudah tau cara merawat bayi sehari-hari

5. Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil : bayi sudah menyusui pada ibunya

6. Mengajarkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

Hasil : ibu selalu memberikan Asi pada bayinya

7. Mengajarkan kepada ibu untuk mengkomsumsi makanan bergizi

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

8. Mengajarkan pada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang benar

9. Mengajarkan ibu untuk membawa bayinya imunisasi lengkap sesuai jadwal imunisasi di pelayanan kesehatan terdekat

Hasil : ibu bersedia membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal imunisasinya

10. Melakukan pendokumentasian.

Hasil : sudah melakukan pendokumentasian.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan pada bayi Ny “H” dengan hipotermi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar. Asuhan ini dilakukan selama sebanyak dua kali asuhan diruangan Postnatal Care dilanjutkan dengan kunjungan rumah sebanyak dua kali kunjungan.

Dalam hal ini, pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yaitu : pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Langkah I : Identifikasi data dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Nurhayati dkk, 2013).

Pengkajian data dasar pada kasus hipotermi dilakukan pada saat pengamatan pertama kali di ruangan postnatalcare. Pengkajian meliputi anamnesis langsung oleh ibu pasien. Pengkajian ini berupa identitas pasien, data biologis/fisiologis yang

meliputi : keadaan umum bayi, riwayat kehamilan dan persalinan serta pola eliminasi bayi. Pengkajian data objektif diperoleh melalui pemeriksaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Pengkajian pada kasus ini dilanjutkan pada pendokumentasian asuhan kebidanan.

Tahap ini dilakukan identifikasi data dasar (pengkajian) yang merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien mengenai bayi Ny "H", baik orang tua maupun bidan dan dokter yang ada diruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga memudahkan untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Data yang diambil dari studi kasus bayi Ny "H" dengan hipotermi selama bayi dirawat di Puskesmas sampai dilakukan kunjungan rumah klien meliputi :

HPHT tanggal 10 agustus 2016, HTP 17 mei 2017 dan melahirkan tanggal 03 mei 2017 pukul 02.38 wita, usia kehamilannya yaitu 38 minggu, ibu sering datang memeriksakan kehamilannya dipelayanan kesehatan dan ibu juga telah mendapatkan suntik TT, ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit serius. Bayi lahir normal, presentase belakang kepala dengan berat badan 3300 gram, panjang badannya yaitu 48 cm, keadaan umum bayi baik, bayi lahir tanggal 03 mei 2017 pukul 02.38 wita dengan Apgar Score 7/10. Bayi dirawat gabung bersama ibunya di ruangan Postnatal Care dengan suhu bayi 35,3°C.

Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik, heart rate 124 x/menit, pernafasan 44x/menit, suhu 35,3°C, refleks menghisap lemah, bibir pucat, pergerakan

kurang aktif, kuku pucat, tangan dan kaki teraba dingin yang disebabkan kurangnya pengetahuan ibu tentang bagaimana cara mempertahankan suhu tubuh bayinya.

Menurut Yunanto Ari, Hipotermi merupakan suhu dibawah normal ($36,5^{\circ}\text{C}$), yang terbagi atas : hipotermi ringan yaitu suhu antara $36-36,5^{\circ}\text{C}$, hipotermi sedang yaitu suhu antara $32-36^{\circ}\text{C}$, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh $<32^{\circ}\text{C}$ (Yunanto, 2014:89).

Berdasarkan teori menurut Rukiyah dan Yulianti, tanda-tanda hipotermi dibagi menjadi 3 yaitu : Tanda-tanda hipotermi sedang (*stress dingin*) yaitu : Aktifitas berkurang, Letargis, Tangisan lemah, Kulit berwarna tidak rata (*cutis marmorata*), Kemampuan menghisap lemah dan Kaki teraba dingin. Tanda-tanda hipotermi berat (*cedera dingin*) Sama dengan hipotermi sedang ditambah dengan bibir dan kuku kebiruan, pernafasan lambat, pernafasan tidak teratur, bunyi jantung lambat dan selanjutnya mungkin timbul hipoglikemia dan asidosis metabolik. Hipotermia juga bisa menyebabkan hipoglikemia (kadar gula darah yang rendah), asidosis metabolik (keasaman darah yang tinggi) dan kematian. Tubuh dengan cepat menggunakan energi agar tetap hangat, sehingga pada saat kedinginan bayi memerlukan lebih banyak cadangan oksigen. Karena itu, hipotermi bisa menyebabkan berkurangnya aliran oksigen ke jaringan. Tanda-tanda stadium lanjut hipotermi yaitu muka, ujung kaki dan tangan berwarna merah terang, bagian tubuh lainnya pucat, kulit mengeras merah dan timbul oedema terutama pada punggung, kaki dan tangan (sklerema) (Rukiyah & Yulianti, 2013:289).

Teori menurut Yunanto, Tanda-tanda Hipotermi adalah akral dingin, bayi tidak mau minum, kurang aktif, kutis marmorata, pucat, takipne atau takikardia (Yunanto, 2014:93)

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus hipotermi. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik (Nurhayati dkk, 2013).

Dalam menegakkan suatu diagnosa masalah kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dan ditunjang oleh beberapa data baik subjektif maupun objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang dilakukan. Adapun diagnosa masalah aktual yang diidentifikasi pada bayi Ny "H" adalah bayi cukup bulan (BCB)/sesuai masa kehamilan (SMK) dengan hipotermi. Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis hipotermi. Ibu mengatakan HPHT 10 Agustus 2016, HTP 17 mei 2017 dan melahirkan tanggal 03 mei 2017 pukul 02.38 wita 2017.

Berdasarkan teori menurut Manuaba, menentukan usia kehamilan menurut hukum Neagle melalui HPHT, jadi dari HPHT yang didapatkan dari ibu yakni tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal melahirkan ibu yakni tanggal 03 Mei

2017 maka usia kehamilan ibu adalah 38 minggu (Prawirohardjo, 2014:279). Usia kehamilan normal menurut Sari Wahyuni adalah 37 minggu sampai dengan 42 minggu (Wahyuni, 2012:1).

Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital heart rate 124 x/menit, pernafasan 44 x/menit, suhu 35,3°C, refleks menghisap lemah, bibir pucat, tangan dan kaki dingin, pergerakan kurang aktif, dan kuku pucat.

Pada tinjauan pustaka dijelaskan bahwa hipotermi adalah suhu tubuh dibawah normal (<36,5°C), yang terbagi atas : hipotermi ringan yaitu suhu antara 36-36,5°C, hipotermi sedang yaitu suhu antara 32-36°C, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh <32°C (Yunanto, 2014:84). Tanda-tanda hipotermi sedang yaitu aktifitas berkurang, letargis, tangisan lemah, kulit berwarna tidak rata (cutis marmorata), kemampuan menghisap lemah dan kaki teraba dingin (Rukiyah & Yulianti, 2013:289).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian data tidak ada perbedaan dengan tinjauan kepustakaan yang ditemukan pada kasus.

Langkah III : Identifikasi diagnosis/Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Manguji dkk, 2013). Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan

dapat bersiap-siap, bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman.

Hipotermi berpotensi mengalami hipoglikemia-Asidosis metabolik karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob, kebutuhan oksigen yang meningkat, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermi, syok, apnea, dan perdarahan Intraventricular.

Hipoglikemia adalah kadar glukosa dalam darah kurang dari 45 mg/dl (2,6 mmol/L) yang merupakan masalah yang serius pada bayi baru lahir, karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat hipoksi otak. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat bahkan sampai kematian. Glukosa merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan dan hari-hari pertama pasca lahir. Setiap stres mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatnya penggunaan cadangan glukosa yang ada misalnya pada bayi yang menderita asfiksia, hipotermi, hipertermi dan gangguan pernafasan.

Defenisi hipoglikemia berdasarkan Operational Threshold adalah konsentrasi kadar plasma atau whole blood dimana klinisi harus mempertimbangkan intervensi berdasarkan bukti-bukti terbaru yang ada di literatur. Konsentrasi kadar plasma gula darah ini <45 mg/dL. Defenisi lama hipoglikemia menggunakan kadar glukosa <39 mg/dL dalam 24 jam pertama dan <45 mg/dL setelah 24 jam pada bayi (kontroversial). Sesudah itu, hipoglikemia didefinisikan dengan kadar serum glukosa

<40-45mg/dL pada bayi prematur dan bayi cukup bulan (kontroversial). Gejala klinis yang sering berhubungan dengan hipoglikemia adalah tremor, apatis, sianosis, kejang, apne, takikardia, lemah, letargis, gangguan minum, pucat, dan hipotermia (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Departemen Ilmu Kesehatan Anak, 2012).

Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi

Tindakan segera dan kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya. Berdasarkan kasus ini, tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera.

Langkah V : Perencanaan Asuhan Kebidanan

Langkah ini merupakan lanjutan manajemen asuhan kebidanan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Suatu rencana tindakan harus disetujui pasien dan bidan agar lebih efektif. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan alasan yang benar berlandaskan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, serta telah divalidasi dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Rencana asuhan disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan pencegahan masalah/diagnosa potensial. Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan tindakan

yang akan dilakukan dan terdapat sasaran target serta hasil yang akan dicapai dalam penerapan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus (Nurhayati dkk, 2013).

Adapun sasaran/target dalam rencana asuhan pada kasus ini berfokus untuk mencegah terjadinya komplikasi pada bayi dengan penanganan yang cepat dan tepat serta suhu tubuh bayi kembali normal. Bila diagnosis hipotermi ditegakkan rencana asuhan yang akan di berikan adalah memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan, diskusikan penyebab dan penatalaksanaannya, rekomendasikan untuk segera diintervensi.

Rencana tindakan yang telah di susun yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, mengobservasi tanda-tanda vital, membedong atau menyelimuti bayi dengan kain hangat, mengobservasi eliminasi bayi, mengganti pakaian yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya selama 6 bulan dan mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi ASI ibu lancar, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi, mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar, dan menganjurkan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya.

Perawatan bayi dengan Hipotermi sama dengan bayi normal, pengawasan keadaan umum bayi, berikan lingkungan yang baik, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi, observasi tanda-tanda vital, penimbangan berat badan, membedong bayi dengan kain hangat, observasi eliminasi bayi, mengganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah, menganjurkan pada ibu untuk memberikan ASI pada

bayinya selama 6 bulan, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi, bidan harus mengajarkan tehnik menyusui yang baik dan benar, memberitahu tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir, memberikan konseling pada orang tua : tentang keadaan yang dialami bayinya, menjelaskan bahwa bayi kapan saja bisa terjadi hipotermi apabila tidak dilakukan perawatan dengan baik, hipotermi dapat teratasi dengan melakukan perawatan bayi sehari-hari.

Ganti pakaian yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat dan kering, memakai topi dan selimut, periksa ulang suhu bayi 1 jam kemudian, bila suhu naik pada batas normal ($36,5-37,5^{\circ}\text{C}$), berarti usaha menghangatkan berhasil, anjurkan ibu untuk menyusui lebih sering, bila suhu tetap dalam batas normal dan bayi dapat minum dengan baik serta tidak ada masalah lain yang memerlukan pengawasan, bayi tidak usah dirujuk.

Penatalaksanaan yang dilakukan pada bayi hipotermi menurut Ai Yeyeh Rukiyah & Lia Yulianti, bila suhu tubuh bayi masih dingin gunakan selimut atau kain hangat yang di setrika terlebih dahulu, yang di gunakan untuk menutupi tubuh bayi dan ibu. Lakukan berulang kali sampai tubuh bayi hangat. Biasanya bayi hipotermi menderita hipoglikemia, sehingga bayi harus diberi ASI sedikit-sedikit sesering mungkin. Bila bayi tidak menghisap, diberi infus glukosa 10 % sebanyak 60-80 ml/kg per hari (Rukiyah & Yulianti, 2013:290).

ASI merupakan pilihan optimal sebagai pemberian makan pada bayi karena mengandung nutrisi, hormon, faktor kekebalan, faktor pertumbuhan, dan antiinflamasi. Bayi yang berumur 0-6 bulan sesuai rekomendasi *World Health*

Organization (WHO) pada tahun 2001 hanya memerlukan ASI saja tanpa cairan atau makanan padat apapun yang disebut dengan ASI eksklusif. Penegasan pemberian ASI eksklusif juga diatur dalam PP Nomor 33 tahun 2012 Pasal 6 yang berbunyi “Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya” (Dian Isana Fitri dkk, 2014:1).

Hasil penelitian Dian Insana Fitri dkk, pertumbuhan menurut status gizi didapatkan bahwa bayi yang diberikan ASI eksklusif mempunyai pertumbuhan normal lebih banyak dari pada bayi yang diberikan ASI non eksklusif. Pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 73,3% pertumbuhannya normal dan 26,7 % pertumbuhannya kurang, sedangkan bayi yang diberikan ASI non eksklusif diperoleh 62,9 % dengan pertumbuhan normal dan 37,1 % adalah pertumbuhan kurang. Nilai OR 1,62, artinya bayi yang mendapatkan Asi eksklusif berpeluang mendapatkan pertumbuhan normal 1,62 kali lebih besar dibandingkan dengan bayi ASI non eksklusif (Dian Isana Fitri dkk, 2014:4).

Uraian tersebut tampak adanya persamaan antara teori (tinjauan pustaka) dengan rencana tindakan yang dilakukan pada kasus bayi Ny “H”.

Langkah VI : Implementasi

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta

kerjasama tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan (Mangkuji dkk, 2012).

Pada studi kasus bayi Ny “H” dengan hipotermi, tidak semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Seperti anjuran untuk kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk memeriksa kadar gula dalam darah, asuhan ini direncanakan namun tidak dilakukan karna persediaan alat yang kurang memadai.

Selama pemantauan di Puskesmas selama dua hari pada bayi NY “H” dengan dilakukan rawat inap di ruangan Postnatal Care, observasi suhu bayi, membedong bayi dengan kain hangat, memakaikan topi, pemenuhan nutrisi bayi, menganjurkan personal hygiene pada diri dan bayinya.

Kunjungan rumah sebanyak dua kali yaitu pada kunjungan rumah pertama bayi Ny “H” dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, penimbangan berat badan bayi, ibu tetap diberikan konseling dan bimbingan agar selalu mempertahankan suhu tubuh bayinya dengan cara membedong bayi agar suhu bayi tetap hangat, memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara on demand dan tehnik menyusui yang benar, memberitahu ibu dan keluarga agar selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi agar terhindar dari infeksi, setelah dilakukan bimbingan pada ibu, ibu mengerti apa yang dijelaskan dan melakukan apa yang telah dianjurkan.

Pemantauan kunjungan rumah kedua, bayi Ny “H” berat badannya semakin bertambah. Pada pemantauan kali ini memberitahukan kembali kepada ibu agar selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya, menganjurkan ibu untuk

selalumempertahankan suhu tubuh bayinya, memberitahu ibu untuk tidak memberikan makanan tambahan pada bayinya sebelum berumur 6 bulan, menganjurkan kepada ibu agar selalu menjaga nutrisi bayinya dengan cara memberikan ASI secara on demand, memberitahuan kepada ibu agar selalu mengkomsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran atau daun katuk agar produksi ASI ibu tambah banyak, ibu mengerti dengan yang dijelaskan dan akan melakukan apa yang dianjurkan.

Dalam tahap ini penulis melakukan asuhan kebidanan selama 2 hari di Puskesmas dan 2 kali kunjungan rumah, berdasarkan perencanaan yang telah disusun sesuai kebutuhan klien, sehingga tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan kasus yang ada.

Langkah VII : Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan.

Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi. Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan selama 2 hari di Puskesmas. Bayi tidak mengalami komplikasi , hipotermi telah teratasi yang ditandai dengan suhu bayi

kembali normal, keadaan bayi sudah membaik dan telah pulang kerumah, keadaan berlangsung normal, pada kunjungan rumah selama 2 kali kunjungan, bayi dalam keadaan normal.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses Manajemen Asuhan Kebidanan yang diterapkan pada bayi Ny “H” dengan hipotermi cukup berhasil dan efektif.

Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Pada kunjungan pertama di puskesmas dilakukan pengumpulan data mulai dari riwayat kehamilan sampai riwayat melahirkan. Ibu mengatakan HPHT : 10 Agustus 2016, HTP : 17 Mei 2017 dan melahirkan tanggal 03 Mei 2017 pukul 02.38 wita, dengan berat badan 3300 gram (2500-4000 gram), panjang badan 48 cm (48-52 cm). Pada pemeriksaan fisik bayi bergerak kurang aktif, refleks menghisap lemah, kuku pucat, bibir pucat, kaki dan tangan teraba dingin dan ditandai dengan pemeriksaan tanda-tanda vital Heart rate : 124 x/menit, pernafasan : 44 x/menit, suhu : 35,3°C.

Kunjungan kedua di puskesmas bayi Ny “H” dilakukan observasi. Hipotermi telah teratasi yang ditandai dengan suhu bayi kembali normal, pemeriksaan tanda-tanda vital Heart rate : 138 x/menit, pernafasan : 46 x/menit, suhu : 36,7° keadaan bayi dalam batas normal, bayi telah diizinkan untuk pulang kerumah.

Kunjungan rumah sebanyak 2 kali, keadaan umum bayi baik, kesadaran komposmentis, bayi dalam keadaan sehat, refleks menghisap baik yang ditandai dengan bayi kuat menyusui dan tidak rewel.



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan selama 2 hari pada bayi “H” dengan hipotermi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar melalui bab ini, penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dari data subjektif dan objektif yang didapatkan bayi “H” dengan hipotermi.
2. Pengkajian dan analisa data yang diberikan dengan asuhan kebidanan sangat penting dilakukan karena merupakan langkah awal yang kiranya perlu penanganan cermat sehingga semua masalah-masalah dapat terdeteksi secara dini dan tidak berlanjut ke masalah kematian.
3. Masalah potensial yang terjadi pada hipotermi potensi terjadi Hipoglikemia-Asidosis Metabolik karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob, kebutuhan oksigen yang meningkat, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermi berat, syok, apnea dan perdarahan Intra Ventricular.
4. Tindakan segera atau kolaborasi pada bayi “H” tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera.
5. Rencana asuhan kebidanan yang dilakukan pada bayi “H”, hipotermi dapat teratasi dan suhu kembali normal, kebutuhan nutrisi terpenuhi/teratasi, dan tidak terjadi infeksi.

6. Penatalaksanaan tindakan yang dilakukan pada bayi “H” dengan hipotermi yaitu berupa observasi.
7. Evaluasi hasil asuhan kebidanan yang dilakukan pada bayi “H” dengan hipotermi yaitu suhu bayi telah normal dan keadaan bayi baik.
8. Pendokumentasian merupakan serangkaian proses pada setiap tahap dan asuhan kebidanan yang telah diberikan sehingga sangat penting untuk dilaksanakan. Pendokumentasian dilakukan di puskesmas selama 2 hari tanggal 04 s/d 05 Mei 2017, dan sebanyak 2 kali kunjungan rumah yaitu kunjungan pertama tanggal 12 Mei 2017 dan kunjungan kedua 24 Mei 2017

B. SARAN

1. Bagi ibu
 - a. Diharapkan agar ibu menjaga kebersihan diri dan bayinya, menjaga asupan nutrisi bayinya serta menganjurkan untuk memberikan ASI eksklusif 6 bulan.
 - b. Pentingnya membawa bayi imunisasi lengkap.
2. Bagi bidan
 - a. Petugas kesehatan dapat mengenali dan mendeteksi secara dini setiap kemungkinan terjadinya komplikasi pada bayi baru lahir.
 - b. Petugas kesehatan khususnya bidan perlu menjelaskan keadaan bayi kepada orang tua bayi kondisi yang dialami oleh bayinya serta diharapkan memberikan dorongan moril pada orang tua bayi.

3. Bagi institusi pendidikan

- a. Agar menerapkan asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat metode ini sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih profesional.
- b. Perlu adanya persamaan persepsi antara pendidikan dan petugas kesehatan dilahan praktek tentang penerapan asuhan kebidanan sebagai alat dalam pendekatan pemecahan masalah pada praktek sehari-hari sehingga meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia Menurut WHO,
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50561/Chapter%20I.pdf?sequence=5>. Diakses tanggal 01 mei 2017 jam 18.00 wita) Angka
- Dewi, Vivian Nanny Lia. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Salemba Medika. Edisi kelima. 2013.
- Dian Insana Fitridkk : / *Jurnal Keseha tan Andalas*. Hubungan Pemberian ASI dengan Tumbuh Kembang Bayi Umur 6 Bulan di Puskesmas Nanggalo Vol. 3. Issue 2 .2014
- Ekawati, Heny. *Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Terhadap Perubahan Suhu Tubuh Pada Bayi Baru Lahir Di Klinik Bersalin Mitra Husada Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan*. 2015.
- Indrayani dan Moudy Emma Unaria Djami. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru lahir*. Jakarta: CV Trans Info Media. 2013.
- Khalifa, Amany K.A. *A Jurnal Of International Management Of Neonatal Hazards In Intensive Care Units : A Review*. 2015. Di akses pada tanggal 02 juli 2017 pukul 21.15 WITA.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Kompetensi Bidan.
- Laksana, Mutiara Putriani dan Ahmad Syafiq. *Determinan Angka Kematian Bayi di Indonesia (Analisis Data Sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012)*. 2014:h.2.
- Marmi, dan Kukuh Rahardjo. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, Dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Mangkuji, Betty. dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta : EGC, 2012.
- Maryunani, Anik. *Asuhan Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah*. Jakarta timur: CV. Trans Info Media. 2013.
- Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika, 2013.
- Profil Kesehatan Povinsi Sulawesi Selatan tahun 2014.

- Prof. DR. Dr. Bambang Supriyatno SpA(K). *Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Departemen Ilmu Kesehatan Anak*. 2012.
- Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial.
- Prawirohardjo,Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014
- Rukiyah, Ai Yeyeh dan Lia Yulianti. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: CV. Trans Info Medika. 2013.
- Rohsiswatmo, Rina. *Ilmu kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014.
- Ranuh, Shiila. *Beberapa Catatan Kesehatan Anak*. Jakarta: CV Sagung Seto. 2013.
- Setyaningsih, Noor Yulita Dwi dan Oyas Wahyunggoro. *Pemilihan Lampu Sebagai Pemanas Pada Inkubator Bayi*. STMIK AMIKOM Yogyakarta. 2015.
- Sindhu, Ramalingam, dkk. *Reducing Early Neonatal Heat Loss In Low Resourced Context An Indian Exemplar. International jurnal of caring sciences* 8, no.1. 2015. Diakses pada tanggal 02 juli 20.55 WITA.
- Safitri Aulia Rahma & Sri Pingit Wulandari: / *jurnal sains dan seni its*. Klasifikasi Risiko Infeksi pada Bayi Baru Lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Menggunakan Metode Classification Trees.Vol. 5, No.1. 2016
- Sudarti dan Afroh Fauziah. *Asuhan Neonatus Risiko Tinggi Dan Kegawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta:Lentera Hati. 2009.
- Unicef Indonesia Ringkasan Kajian Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2012.
- World Health Organisation. *Recommendations On Newborn Health*. 2012. Di akses pada tanggal 02 juli 2017 pukul 21.32 WITA.
- Wahyuni, Sari. *Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita Penuntun Belajar Praktek Klinik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2012.
- Yongki, dkk. *Asuhan Pertumbuhan Kehamilan dan Persalinan, Neonatus, Bayi dan Balita*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Yunanto, Ari. *Buku Ajar Neonatologi*. Jakarta: Badan Penerbit IDAI. 2014.

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

1. Nama : Sarnah
2. NIM : 70400114001
3. Tempat/Tanggal Lahir : Rappo-rappo Jawayya, 24 juli 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Samata Gowa
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Sarro
 - b. Ibu : Samsia

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD : SDN no.31 Embo Tahun 2007
2. Tamat SMP : SMP Negeri 1 Tamalatea Tahun 2010
3. Tamat SMA : SMK Primanegara Jeneponto tahun 2013
4. Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan