

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL PADA NY “J” DENGAN
ABORTUS INKOMPLIT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 26 -27 APRIL 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar**

Oleh

SARAS YULISTINA HARJU
NIM. 70400114034

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saras Yulistina Harju
Nim : 70400114034
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 04 November 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Bakung Regency Blok F No.9
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny “J”
Dengan Abortus Inkomplit Di RSUD Syekh Yusuf Gowa
Tanggal 26-27 April 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, Oktober 2017

Penyusun

SARAS YULISTINA HARJU
NIM.70400114034

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Saras yulistina harju
Nim : 70400114034
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil pada Ny "J" dengan Abortus Inkomplit Di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Firdayanti, S.Si.T., M.Keb
NIP: 19751113 200604 2 001


dr. Rini Fitriani, M.Kes
NIP: 1980008 200801 2 018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "**Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny "J" Dengan Abortus Inkomplit Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017**", yang disusun oleh **Saras Yulistina Harju**, NIM: 70400114034, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Jummi, 27 Oktober 2017 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya Kebidanan**, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata 27 Oktober 2017 M

7 Shafar 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.ST., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Nurkhalis A Ghaffar, S.Ag., M.Hum	(.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assaalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny “J” Dengan Abortus Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”. Penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan tugas akhir ini agar menjadi jauh lebih baik lagi.

Maka itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a yang tak henti-hentinya Ibunda Juharni dan Ayahanda Habri
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armin Nuridin M.Sc sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan.
5. Ibu Firdayanti, S.SiT., M.Keb sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya demi membimbing, membantu, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan proposal studi kasus laporan tugas akhir ini.

6. Ibu dr. Rini Fitriani, M.Kes sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing, serta memberikan saran yang membangun dalam penyusunan proposal studi kasus laporan akhir ini.
7. Ibu dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes, sebagai Penguji I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Bapak Nurkhalis A Ghaffar, S.Ag., M.Hum, sebagai Penguji II yang telah banyak memerikan masukan tentang integrasi terkait keilmuan.
9. Dosen-dosen dan staf Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan kebidanan, menyelesaikan pendidikan hingga selesainya karya tulis ilmiah ini.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Mahasiswi seangkatan tahun 2014 Jurusan Kebidanan serta teman yang lain di luar sana yang telah memberikan dorongan berupa semangat dan memberikan saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, Amin.

Samata-Gowa, Oktober 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penulisan	6
E. Manfaat Penulisan	7
F. Metode Penulisan	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN TEOERITIS	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	12

B. Tinjauan Umum Tentang Abortus	19
C. Tinjauan Khusus Tentang Abortus Inkomplit	36
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	47
E. Tinjauan Islam Tentang Kehamilan	60
BAB III STUDI KASUS.....	67
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar.....	67
B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual.....	73
C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial.....	76
D. Langkah IV Tindakan Segera atau Kolaborasi.....	78
E. Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	78
F. Langkah VI Implementasi	82
G. Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan	85
H. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP)	87
BAB IV PEMBAHASAN.....	96
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	28
-----------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran 2 : Surat izin/ekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 3 : Surat rekomendasi penelitian dari pemerintah kabupaten Gowa Kepala Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 4 : Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2017

Nama : Saras Yulistina Harju

NIM : 70400114034

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Ny “J” dengan Abortus Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017

Abortus Inkomplit adalah pengeluaran sebagian konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu tetapi sebagian tertinggal (biasanya jaringan plasenta). Setelah terjadi abortus dengan pengeluaran jaringan, pendarahan berlangsung terus menerus. Perdarahan memanjang, Terjadi infeksi ditandai suhu tinggi, kanalis servikalis terbuka, dapat diraba jaringan dalam rahim merupakan ciri dari abortus inkomplit. Komplikasi yang dapat terjadi pada kasus abortus inkomplit yaitu pendarahan, perforasi atau perlukaan pada uterus, syok pada abortus biasa terjadi karena perdarahan dan karena infeksi berat, infeksi dapat terjadi pada genetalia, kematian yang disebabkan oleh perdarahan.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Abortus Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “J” ditegakkan diagnosis dengan Abortus Inkomplit berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ibu Ny “J, datang ke RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan keluhan utama keluar darah dari jalan lahir, keluar darah dari jalan lahir sejak 1 minggu yang lalu awalnya sedikit kemudian keluar gumpalan dan terus keluar darah sedikit. Tampak lemah, *composmentis*, tekanan darah 110/70 mmHg, tinggi fundus uteri pertengahan simpisis pusat, ostium uteri terbuka 2 cm, uterus retrofleksi dan terdapat pelepasan darah. Pemeriksaan USG dengan kesan sangat mungkin abortus inkomplit. Pada pasien ini dilakukan penatalaksanaan berupa kuretase. Pemantauan dilakukan selama 2 jam post kuret. Keadaan ibu membaik, masih ada pengeluaran darah dari vagina dan masih ada nyeri tekan pada perut bagian bawah dan tidak ditemukan hambatan pada saat pelaksanaan tindakan.

Berdasarkan hasil dari studi kasus 7 langkah varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan, dapat disimpulkan bahwa pada Ny “J” ditegakkan diagnosa Abortus Inkomplit. Kuretase merupakan tatalaksana dari Abortus Inkomplit.

Daftar pustaka : 38 (2004-2016)

Kata kunci : Abortus Inkomplit, kuretase

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2017

Name : Saras Yulistina Harju
Student Reg. No. : 70400114034
Title : Management of Maternal Midwifery Care on Mrs. "J" with Incomplete Abortion at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital, on April 26-27, 2017

The incomplete abortion is the partial secretion of conception in pregnancy before 20 weeks but partially left behind (usually placental tissue). After an abortion occurs with tissue exposure, the bleeding continues. Bleeding elongated, occurs infection marked with high temperature, open cervical canal, can be touched tissue in uterus are the characteristics of incomplete abortion. Complications that can occur in cases of incomplete abortion are bleeding, perforation or uterine injury, abortion shock usually occurs due to bleeding and due to severe infection, infection can occur in genital, deaths caused by bleeding.

This study is aimed at implementing the Maternal Midwifery Care Management with incomplete abortion at Syekh Yusuf Gowa Hospital according to 7 Varney steps and SOAP.

The result from a case study applied on Mrs. "J" is diagnosed with Incomplete Abortion based on anamnesis and physical examination. Mrs. "J", came to Syekh Yusuf Gowa Hospital with the main complaint of blood out of the birth canal since 1 week ago, initially just a little blood and later on it was lump. She looked weak, compos mentis, blood pressure 110/70 mmHg, high fundus mid uteri central simpisis, open uteri ostium of 2 cm, retroflexed uterus and there was release of blood. Ultrasonography examination showed the impression of a very possible incomplete abortion. The management of curettage was applied on the patient. Monitoring was done for 2 hours post curettage. The condition of the mother improved, there was still blood out of the vagina and there was still tenderness in the lower abdomen and found no obstacles during the implementation of the action.

Based on the results of the 7 Varney steps and SOAP case study used for the obstetric problem-solving process, it can be concluded that in Mrs. "J" the diagnosis of Incomplete Abortion is established. Curettage is the management of Incomplete Abortion.

References: 38 (2004-2016)

Keywords: Incomplete Abortion, curettage



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian dan kesakitan ibu masih merupakan masalah kesehatan yang serius di negara berkembang. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia yaitu 289.000 jiwa. Beberapa negara memiliki AKI cukup tinggi seperti Afrika Sub-Saharan 179.000 jiwa, Asia Selatan 69.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 190 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 49 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 26 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut dikarenakan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan (Kemenkes RI, 2014:86).

Angka Kematian Ibu (AKI) di seluruh dunia yaitu satu dari 8 kematian ibu, diperkirakan 13% atau 67.000 kematian, diakibatkan oleh aborsi yang tidak aman. Hampir 95% aborsi yang tidak aman berlangsung di Negara berkembang dan diperkirakan bahwa diseluruh dunia, hampir 80.000 wanita meninggal tiap tahun akibat komplikasi setelah abortus. Diperkirakan bahwa diantara 10% dan 50% dari seluruh wanita yang mengalami aborsi yang tidak aman memerlukan pelayanan medis akibat komplikasi. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah aborsi inkomplit, sepsis, hemoragi, dan cedera intra abdomen (WHO, 2012:32-33).

Menurut *World Health Organization* (WHO), bahwa aborsi termasuk dalam masalah kesehatan reproduksi yang perlu mendapatkan perhatian dan merupakan penyebab penderitaan wanita di seluruh dunia.”Masalah aborsi menjadi suatu pokok perhatian dalam kesehatan masyarakat karena pengaruhnya terhadap morbiditas dan mortalitas maternal” (Prawirohardjo, 2014: 7).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriza 2013, abortus sebanyak 5% dan perdarahan sebanyak 28% adalah penyebab langsung AKI di Indonesia terkait kehamilan dan persalinan. Penyebab lain yaitu preeklamsia dan eklamsia 24%, infeksi sebanyak 11%, partus lama sebanyak 5% (Andriza, 2013: 1).

Sampai saat ini aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) akibat kehamilan yang tidak diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya AKI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan

dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan.

Tindakan aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target agenda pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat diwujudkan (Susiana, 2016: 9).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susiana Sali yang berjudul “Aborsi dan hak Reproduksi Perempuan” menyatakan bahwa tingginya kasus *unsafe abortion* mengindikasikan bahwa masalah kesehatan reproduksi merupakan masalah yang bersifat lintas sektor dan tidak dapat ditangani oleh Kementerian dan Dinas yang menangani bidang kesehatan saja (Susiana, 2016: 12).

Distribusi penyebab kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 karena perdarahan yang didalamnya termasuk kasus abortus karena dalam laporan hanya disebutkan perdarahan atau sepsis sebanyak 55 orang (39,85%), infeksi sebanyak 3 orang (2,17%), karena gangguan system peredaran darah sebanyak 2 kasus (1,44%), dan karena penyebab lain sebanyak 34 kasus (24,63%) (Profil Dinkes Sul-Sel, 2014).

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Maliana Andesia tahun 2016 bahwa faktor resiko yang paling dominan sebagai penyebab abortus inkomplit dari hasil uji statistik multivariat, variabel umur dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 1.985 (95% CI 1.218-3.236), ibu dengan umur berisiko (<20 atau >35 tahun) 2 kali lebih tinggi terjadi abortus inkomplit dibandingkan ibu dengan umur tidak berisiko (Maliana, 2016:20-35).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy (2014) menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2014 ditemukan ibu hamil dengan abortus inkomplit sebanyak 52 orang. Umur ibu yang mengalami abortus inkomplit lebih banyak pada umur resiko rendah sebanyak 31 responden (59,6%) dan umur resiko tinggi sebanyak 21 responden (40,4%), responden paritas ibu yang mengalami abortus inkomplit lebih banyak pada paritas resiko rendah sebanyak 28 responden (53,8%) dan paritas resiko tinggi sebanyak 24 responden (46,2%). Karena masih tingginya angka kejadian abortus inkomplit di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang diharapkan pada ibu hamil agar untuk bisa lebih aktif memeriksakan kehamilannya dan bertanya tentang kehamilannya agar meningkatkan informasi ibu dan mencegah terjadinya kehamilan dengan resiko terjadinya abortus inkomplit (Sandy, 2014:1).

Standar kompetensi bidan dalam asuhan dan konseling selama hamil terdapat pada kompetensi ke-3 yaitu Bidan memberikan asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu.

Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari hasil temuan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2014 angka kejadian abortus berjumlah 410 diantaranya abortus inkomplit 282, abortus imminiens 96 orang, abortus insipiens 20 orang, abortus komplit 2 orang, missed abortus 10 orang, pada tahun 2015 kejadian abortus 193 orang diantaranya inkomplit 132 orang, abortus imminiens 34 orang, abortus insipiens 4 orang, abortus komplit 5 orang, missed abortus 11 orang, abortus habitualis 1 orang dan abortus provokatus 6 orang, pada tahun 2016 kejadian abortus 322 orang diantaranya abortus inkomplit 182 orang, abortus imminiens 61 orang, abortus insipiens 10 orang, abortus komplit 31 orang, missed abortus 34 orang dan abortus provokatus 4 orang, Pada tahun 2017 kejadian abortus dari bulan 1-3 berjumlah 107 orang diantaranya terdapat abortus inkomplit 78 orang, abortus imminiens 13 orang, abortus insipiens 3 orang, abortus komplit 3 orang, missed abortus 9 orang dan abortus provocatus 1 orang.

Tingginya kejadian kasus abortus inkomplit penulis mengangkat judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil pada NY”J” dengan Abortus Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa” karena penanganan secara dini oleh petugas kesehatan sangat di perlukan khususnya bidan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana asuhan kebidanan pada kehamilan dengan abortus inkomplit.

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah manajemen asuhan kebidanan ibu hamil pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan manajemen asuhan kebidanan ibu hamil pada Ny “J” dengan abortus inkomplit berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan pengkajian dan analisa data dasar pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- b. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnosa/masalah aktual pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- c. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnosis/masalah potensial pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- d. Dilaksanakan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- e. Dilaksanakan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

- f. Dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- g. Dilaksanakan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- h. Didokumentasikan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program diploma III kebidanan universitas islam negeri alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat pendidikan

Untuk menambah wacana bagi pembaca di perpustakaan dan sebagai masukan bagi Program Studi D3 kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Manfaat bagi penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang ibu dengan abortus inkomplit.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini metode yang digunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literature dan media internet yang berhubungan dengan abortus inkomplit.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 yang meliputi : identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan tehnik antara lain :

a. Anammnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenec digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

d. Studi Dokumentasi

Membaca dan mempelajari kasus serta dan menginterpretasiakan yang berhubungan dengan klien baik bersumber dari catatan dokter, bidan, maupun dari sumber lain yang menunjang seperti hasil USG.

e. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu : pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teori, akan menguraikan mengenai tinjauan umum kehamilan, tinjauan umum tentang abortus, dan tinjauan khusus abortus inkomplit, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di Rumah sakit syekh yusuf gowa dalam memberikan asuhan kebidanan ibu hamil pada Ny "J" dengan abortus inkomplit.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Setiap wanita yang memiliki organ reproduksi sehat, yang telah mengalami menstruasi, dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang organ reproduksinya sehat sangat besar kemungkinannya akan mengalami kehamilan. Apabila kehamilan ini di rencanakan, akan memberi rasa kebahagiaan dan penuh harapan (Mandriwati 2012:3).

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan pertama dimulai sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan ke-4 sampai ke-6, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan (Pudiastuti, 2012).

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional (Prawirohardjo, 2016).

2. Tanda dan Gejala Kehamilan

Tanda-tanda wanita hamil dibagi menjadi dua yaitu tanda pasti dan tanda tidak pasti.

a) Tanda-tanda pasti tanda-tanda yang memastikan bahwa wanita itu pasti hamil.

Tanda-tanda pasti ini diketahui setelah wanita hamil 16 minggu atau lebih.

- 1) Terdapat bunyi jantung janin tanda-tanda pasti baru timbul setelah kehamilan lanjut diatas 4 bulan dengan *untrasound* bunyi jantung janin dapat didengar pada kehamilan 12 minggu.
- 2) Melihat, meraba atau mendengar pergerakan anak saat melakukan pemeriksaan.
- 3) Melihat rangka janin pada sinar Ro “atau dengan ultrasound”

b) Tanda-tanda tidak pasti dibagi lagi menjadi:

Tanda subjektif ini hanya dirasakan oleh penderita terdiri dari :

- 1) *Ammenorrhoe* (tidak datang bulan),

Semua wanita hamil akan mengalami *Ammenorrhoe*. Terjadi pula pada keadaan yang lain : wanita yang mengalami gangguan emosi, penyakit kronis seperti tuberkulose, anemia, gangguan fungsi ovarium, pergantian lingkungan dan lain-lain.

- 2) *Morning sickness* (mual di pagi hari)

Morning sickness ialah perasaan mual diwaktu pagi ini ialah perasaan mual, meriang, muntah-muntah, pusing kepala umumnya dipagi dari bangun tidur sampai kira-kira jam 10.00 pagi. Adanya perasaan mual belum dipastikan wanita ini hamil.

Keadaan ini bias juga terjadi pada penyakit lain seperti ; *hepatitis, tiroid adominalis, ulcus peptikum* dan lain-lain.

3) Merasa adanya pergerakan anak

Pergerakan janin yang pertama ini belum menjadi tanda pasti karena perasaan ini adalah subjektif yang dirasakan oleh wanita itu sendiri. Wanita yang sangat menginginkan punya keturunan mungkin akan merasakan adanya *quickenig* biarpun sesungguhnya wanita itu tidak hamil.

4) Sering buang air kemih

Sering buang air kemih oleh karena pembesaran rahim menekan kandung kemih. Keadaan ini tidak menjadi tanda yang pasti sebab dapat juga disebabkan oleh hal lain yang ada gangguan pada kandung kemih yang menyebabkan volume menjadi sedikit dan menimbulkan rangsangan untuk buang air kemih, misalnya tumor dan penyakit lain.

5) Perubahan payudara

Perubahan payudara terjadi karena pengaruh hormonal, payudara menjadi lebih besar, tegang. Pada kehamilan 4 minggu keluar cairan jernih yang disebut kolostrum dapat dikeluarkan pada kehamilan 16 minggu. Perubahan payudara yang membesar dapat disebabkan oleh penyakit lain dan cairan yang keluar oleh payudara dapat pula disebabkan oleh tumor atau *ovarial cysta*. (Sunarti, 2013:59-61).

3. Perubahan yang terjadi pada Wanita Hamil

a. Perubahan Fisik

1) Rahim

Rahim perubahan yang amat jelas adalah pembesaran rahim untuk menyimpan bayi yang ditumbuh. Peningkatan ukuran ini disebabkan membesar dan meragang yang disebabkan oleh rangsangan estrogen serta progesteron dan terjadi akibat tekanan mekanik dari dalam yaitu janin, plasenta serta cairan ketuban akan memerlukan lebih banyak ruangan.

2) Vagina

Vagina sampai minggu ke-8, meningkatnya *vaskularisas* dan pengaruh hormone *estrogen* pada vagina menyebabkan tanda kehamilan yang khas disebut tanda *chadwick's*, yang berwarna kebiru-biruan yang dapat terlihat oleh pemeriksa. Respon lain pengaruh hormonal adalah sekresi sel-sel vagina meningkat, sekresi tersebut berwarna putih yang bersifat sangat asam, dikenal dengan istila “putih” atau *leucorrhea*.

3) Ovarium

Ovarium merupakan sumber hormone estrogen dan progesteron pada wanita tidak hamil. Pada kehamilan ovulasi berhenti, corpus luteum terus tumbuh sampai terbentuk plasenta yang mengambil alih pengeluaran hormone estrogen dan progesteron . Plasenta juga membentuk hormon yang lain: *human chorionic*

gonadotropin (HCG), human plasenta lactogen (HPL), juga disebut human chorionic somammotropin (hCS) dan human chorionic thyrotropin (hCT).

4) Dinding perut

Dinding perut dengan pembesaran rahim menimbulkan peregangan dan menyebabkan robeknya serabut elastis di bawah kulit, maka timbullah *striae gravidarum*. Kulit perut pada *linia alba* (garis keputih) bertambah pigmentasinya disebut *linia nigra*.

5) Kulit

Kulit akibat membesarnya rahim dan pertumbuhan janin, perut menonjol keluar. Serabut-serabut elastis dari lapisan kulit terdalam terpisah dan terputus karena regangan. Tanda regangan yang disebut *strie gravidarum* terlihat pada abdomen dan bokong terjadi pada 50% wanita hamil dan menghilang menjadi bayangan lebih terang setelah melahirkan. Perubahan deposit pigmeng dan *hiperpigmentasi* karena pengaruh rangsangan hormone *melanophore*.

6) Payudara

Payudara terjadi perubahan secara bertahap mengalami pembesaran karena peningkatan pertumbuhan jaringan *alveoli* dan suplai darah. Putting susu menjadi menonjol dan keras, perubahan ini yang membawa fungsi laktasi, disebabkan oleh peningkatan kadar hormone estrogen, progesteron, laktogen dan prolaktin.

7) Sistem Sirkulasi darah

System sirkulasi darah sebagaimana kehamilan berlanjut, volume darah meningkat bertahap sampai mencapai 30% sampai 50% diatas tingkat pada keadaan tidak hamil.

8) Sistem pernapasan

Wanita hamil kadang-kadang mengeluh sesak dan pendek nafas, dikarenakan pada wanita hamil terjadi perubahan system respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Disamping itu terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar pada umur kehamilan 32 minggu.

9) Sistem Gastrointestinal

Sistem gastrointestinal dapat terpengaruh oleh karena kehamilan, penyebabnya adalah factor hormonal dan mekanis. Tingginya kadar progesteron mengganggu keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolesterol darah.

10) Sistem Urinari

Sistem urinari pada awal kehamilan suplai darah ke kandung kemih meningkat dan pembesaran uterus menekan kandung kemih, menyebabkan sering kemih. Terjadinya hemodilusi menyebabkan metabolisme air makin lancar sehingga pembentukan air senipun bertambah.

11) Berat Badan

Berat badan pada wanita hamil peningkatan berat badan normalnya sama dengan 25% dari berat badan sebelumnya, peningkatan yang utama adalah pada trimester kedua kehamilan.

12) Sistem Muskuloskeletal

Selama masa kehamilan wanita membutuhkan kira-kira lebih banyak kalsium dan fosfor, dengan makan makanan yang seimbang kebutuhan tersebut akan terpenuhi. Postur tubuh pada wanita mengalami perubahan secara bertahap karena janin membesar bertahap dalam rahim (Sunarti, 2013:43-49).

4. Perubahan psikologis pada wanita hamil

Perubahan psikologis pada wanita hamil merupakan salah satu dari tiga perubahan dalam hidupnya, ialah puberta, kehamilan dan *menopause* perubahan yang terjadi merupakan suatu respon terhadap suatu respon terhadap kehamilannya, akibat peningkatan hormone dapat mempengaruhi suasana hati dan karena yang kadarnya yang naik turun maka demikian juga suasana hati wanita, biasanya wanita menjadi labil, lebih emosional, mudah tersinggung, mudah adanya depresi, marah, sedih, takut, khawatir, tingkah laku berubah lain tidak sama sebelum hamil perubahan ini harus di hadapi sekalipun agak membingungkan sementara waktu.

Perubahan selama kehamilan tidak dapat di hindari, sering dalam waktu yang singkat, ada beberapa sosial dan ahli klinis menyatakan bahwa kehamilan adalah salah satu tipe krisis, terdapat teori krisis yaitu pada awalnya mengalami syok dan

menyangkal, kebingungan dengan masalah yang mengganggu. Pada periode ini, berbagai alternative seperti aborsi, atau adopsi yang menjadi pertimbangan, legal etik, moral dan ekonomi agar dapat menerima keadaan ini membutuhkan waktu satu sampai enam minggu untuk mengatasinya membutuhkan dukungan situasional yang mereka harapkan. (Jannah, 2013: 54-55).

B. Tinjauan Umum Tentang Abortus

1. Pengertian Abortus

Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi atau berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia luar, tanpa mempersoalkan penyebabnya dengan berat badan <500 gram atau umur kehamilan <20 minggu. (Fadlun dan Achmad, 2014:40)

Abortus adalah terancamnya atau keluarnya buah kehamilan baik sebagian ataupun keseluruhan pada umur kehamilan lewat dari 20 minggu. Kematian janin dalam rahim disebut *Intra Uterine Fetal Death (IUFD)*, yakni kematian yang terjadi saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau pada trimester kedua dan atau yang beratnya 500 gram. Jika terjadi pada trimester pertama disebut keguguran atau abortus (Setiawati, 2013:189-190).

2. Macam-macam Abortus

Abortus dapat dibagi sebagai berikut

- a) Abortus Provocatus (disengaja, digugurkan); 80 % dari semua abortus dibagi atas 2 yaitu:

1. Abortus provocatus artificialis (abortus buatan)

Abortus provocatus artificialis atau abortus therapeuticus ialah pengguguran kehamilan biasanya dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan membawa maut bagi ibu, misalnya karena ibu berpenyakit berat. Abortus provokatus pada hamil muda (bawah 12 minggu) dapat dilakukan dengan pemberian prostaglandin atau kuretase dengan penyedotan (vacuum) atau dengan sendok curet. Pada hamil yang tua (di atas 12 minggu) dilakukan *histerotomi*, juga dapat disuntikkan garam hipertonis (20%) atau prostraglundin intra-inisial. Indikasi untuk abortus *therapeuticus* misalnya: penyakit jantung, hipertensi, karsinoma dari serviks. (Pudiastuti, 2012:41-42)

2. Abortus Provokatus kriminalis

Abortus provokatus kriminalis adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah atau oleh orang tidak berwenang dan dilarang oleh hukum (Fadlun dan Achmad, 2014:41).

b) Abortus Spontan (terjadi dengan sendiri, keguguran); merupakan $\pm 20\%$ dari semua abortus.

Abortus spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan sebagai embrio atau janin seberat 500 gram atau kurang, yang biasanya sesuai dengan usia janin (usia kehamilan) dari 20 hingga 22 minggu atau kurang. Abortus spontan terjadi pada sekitar 15%-20% dari seluruh kehamilan yang diakui, dan biasanya terjadi sebelum usia kehamilan memasuki minggu ke-13. (Fauziyah, 2012:37).

Gejala abortus spontan adalah kram dan pendarahan vagina adalah gejala yang paling umum terjadi pada abortus spontan. Kram dan pendarahan vagina yang mungkin terjadi sangat ringan, sedang, atau bahkan berat. Tidak ada pola tertentu untuk berapa lama gejala akan berlangsung. Gejala lain yang menyertai abortus spontan yaitu nyeri perut bagian bawah, nyeri pada punggung, pembukaan leher rahim, dan pengeluaran janin dari dalam rahim. (Fauziya, 2012:42).

Adapun klasifikasi Abortus dan Penangannya yaitu :

1) Abortus imminens

Abortus imminens adalah pendarahan vagina pada umur kehamilan <20 minggu. Pada keadaan ini terjadi ancaman proses keguguran, namun produk kehamilan belum keluar. Pemeriksaan ginekologi menunjukkan ostium uteri eksternum (OUE) tertutup, gestational sac (GS) masih utuh sehingga tidak ada cairan amnion ataupun jaringan yang keluar dan biasanya fetus masih hidup. (Nugroho, 2012:74)

Tanda dan gejalanya yaitu adanya pendarahan vagina berwarna merah segar atau coklat, jumlah pendarahan sedikit/pendarahan bercak, dapat terjadi terus-menerus untuk beberapa hari sampai 2 minggu, kram abdomen bagian bawah atau sakit punggung normal. (Marmi dkk, 2014:57)

Adapun penanganan yang dilakukan terhadap kasus abortus adalah berbaring dengan cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan sehingga rangsang mekanik berkurang, pemberian hormon progesteron dan pemeriksa USG. (Fauziyah, 2012:43)

2) Abortus Insiapiens

Abortus insiapiens adalah abortus yang sedang berlangsung dan tidak dapat di cegah lagi. Ostium terbuka, teraba ketuban, dan berlangsung hanya dalam beberapa jam saja. Abortus insiapiens di diagnosis apabila pada wanita hamil di temukan pendarah banyak, kadang-kadang keluar gumpalan darah yang di sertai nyeri karena kontraksi rahim kuat dan ditemukan adanya dilatasi serviks sehingga jari pemeriksa dapat masuk dan air ketuban dapat teraba. Kadang-kadang pendarahan dapat menyebabkan kematian ibu dan jaringan yang tertinggal dapat menyebabkan infeksi, oleh karena itu, evakuasi harus segera dilakukan. Janin biasanya sudah mati dan mempertahankan kehamilan pada keadaan ini merupakan kontraindikasi. (Fadlun dan Achmad, 2014:41)

Adapun manajemen yang diberikan adalah pemberian misoprostol 200-600 mg oral atau vagina yang menyebabkan terjadinya perlunakan cervik dan kontraksi uterus sehingga menyebabkan keluarnya produk kehamilan. Alternatif lain dengan pemberian oksitosin 10 unit, bila produk kehamilan yang keluar tidak lengkap lanjutkan dengan kuretase. (Nugroho, 2012:74)

3) Abortus inkompletus

Abortus inkomplitus adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Pada pemeriksaan vaginal , servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalam kavun uteri atau kadang-kadang sudah menonjol dari ostium uterieksternum. Pendarahan tidak akan berhenti sebelum sisa janin dikeluarkan, dapat menyebabkan syok. Penangannya diberikan infuse cairan NaCl fisiologik dan transfusi, setelah syok dilatasi dilakukan kerokan.

Saat tindakan disuntikkan intramuskulus ergometrin untuk mempertahankan kontraksi otot uterus. (Fauziyah, 2012:43)

4) Abortus Kompletus

Abortus komplit merupakan abortus dimana keseluruhan hasil konsepsi dikeluarkan (fetus dan plasenta), sehingga tak ada yang tertinggal di dalam kavum uteri. Diagnosisnya ditemukan pendarahan yang kemudian berhenti spontan setelah semua produk kehamilan keluar, ada kontraksi uterus yang terasa nyeri yang juga akhirnya yang juga berhenti setelah produk konsepsi keluar. Dalam pemeriksaan ginekologi ostium uteri eksternum tertutup dengan pendarahan minimal dan tidak ditemukan adanya jaringan yang keluar, serta uterus mengecil. (Nugroho, 2012:74)

5) Missed Abortion

Missed abortion adalah kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari. Gejala seperti abortus immines yang kemudian menghilang secara spontan di sertai kehamilan menghilang, payudara agak mengendor, uterus mengecil, tes kehamilan negative. Dengan USG dapat diketahui apakah janin sudah mati dan besarnya sesuai dengan usia kehamilan. Dengan hormone HSG tes bisa diketahui kemungkinan keguguran. Biasanya terjadi pembekuan darah. Penanganannya pada kehamilan kurang dari 12 minggu dilakukan pembukaan serviks uteri dengan laminaria selama kurang lebih 12 jam kedalam servikalis. Pada kehamilan lebih dari 12 minggu maka pengeluaran janin dengan infuse intravena oksitosin dosis tinggi. (Fauziyah, 2012:44-45)

6) Abortus Habitualis (Keguguran berulang)

Pada abortus jenis ini, pasien termasuk jika telah mengalami keguguran berturut-turut selama lebih dari tiga kali. (Sulistyawati, 2013:163)

3. Etiologi

Penyebab abortus spontan tidak selalu bias ditentukan. Yang paling umum diketahui penyebab abortus spontan pada trimester 1 adalah kelainan kromosom, penyakit kolagen vaskuler, diabetes, masalah hormonal lain, inveksi dan bawaan (hadir sejak lahir) kelainan rahim. Kelainan kromosom pada janin adalah penyebab paling umum dari abortus spontan dini, termasuk *blighted ovum*.

a) Kelainan Kromosom

Kromosom adalah komponen mikroskopis dari setiap sel dalam tubuh yang membawa semua bahan genetic yang menentukan warna rambut, warna mata, dan tampilan secara keseluruhan dan tata rias.

b) Penyakit Kolagen Vaskular

Penyakit kolagen vascular adalah penyakit dimana system kekebalan tubuh sendiri menyerang organ mereka sendiri (*autoimun*). Penyakit tersebut dapat berpotensi sangat serius, baik selama atau sementara kehamilan.

c) Diabetes

Diabetes umumnya dapat dikelola dengan baik selama kehamilan, jika dikontrol dengan baik. Namun, jika diabetes yang kurang terkontrol, tidak hanya merupakan risiko abortus spontan lebih tinggi, tetapi bayi bias memiliki cacat lahir.

d) Faktor Hormonal

Faktor hormonal dapat dikaitkan dengan peningkatan dengan risiko abortus spontan, termasuk *Sindrom Cushing*, penyakit tiroid, dan *polycytic ovary syndrome* (PCOs).

e) Infeksi

Ibu yang terinfeksi dengan sejumlah besar organisme yang berbeda telah dikaitkan dengan peningkatan risiko abortus spontan. Janin atau plasenta terinfeksi oleh organisme yang kemudian menyebabkan abortus spontan.

f) Abnormal Struktural Anatomi

Anatomi abortus uterus juga dapat menyebabkan abortus spontan.

g) Penyebab Lainnya

Prosedur pembedahan invasive di dalam rahim, seperti amniosentesis dan *chorionic villus sampling*, juga dapat meningkatkan risiko abortus spontan.

h) Gaya Hidup

Merokok lebih dari 10 batang per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko abortus spontan dan beberapa studi menunjukkan risiko abortus spontan meningkat dengan ayah merokok (Fauziyah, 2012: 38-42).

4. Patofisiologi

Pada awal abortus, terjadi pendarahan dalam desidua basalis kemudian diikuti oleh nekrosis jaringan sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan hasil konsepsi terlepas sebagian atau seluruhnya sehingga merupakan benda asing dalam uterus. Keadaan ini menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan isinya. Pada kehamilan kurang dari 8 minggu, hasil konsepsi itu biasanya dikeluarkan seluruhnya karena vili korialis belum menembus desidua secara mendalam.

Pada kehamilan antara 8 dan 14 minggu, vili korinalis menembus desidua lebih dalam dan umumnya plasenta tidak dilepaskan dengan sempurna sehingga dapat menyebabkan banyak pendarahan. Pada kehamilan 14 minggu ke atas, umumnya yang dikeluarkan setelah ketuban pecah adalah janin, disusul setelah beberapa waktu kemudian adalah plasenta. Pendarahan tidak banyak jika plasenta segera terlepas dengan lengkap. Peristiwa abortus ini menyerupai persalinan dalam bentuk miniatur (Yulaikha, 2012:75).

5. Diagnosis Abortus

Abortus dapat diduga bila seorang wanita dalam masa reproduksi mengeluh tentang pendarahan pervaginam setelah mengalami haid terlambat, sering pula terdapat rasa mules. Kecurigaan tersebut dapat diperkuat dengan ditentukannya kehamilan muda pada pemeriksaan bimanual dan dengan tes kehamilan secara biologis atau imunologi, bila mana hal itu dikerjakan. Harus di perhatikan banyaknya pendarahan, pembukaan serviks dan adanya jaringan dalam kavum uterus atau vagina. (Nita, Mustika, 2013:198)

Diagnosis lain :

Sebagai seorang bidan pada kasus pendarahan awal kehamilan yang harus dilakukan adalah memastikan arah kemungkinan keabnormalan yang terjadi berdasarkan hasil tanda dan gejala yang ditemukan, yaitu melalui

a. Anamnesa

- 1) Usia kehamilan ibu (kurang dari 20 minggu).
- 2) Adanya kram perut atau mules daerah atas symphysis, nyeri pinggang akibat kontraksi uterus.
- 3) Pendarahan pervaginam mungkin disertai dengan keluarnya jaringan hasil konsepsi.

b. Pemeriksaan fisik

Hasil pemeriksaan fisik di dapat:

- 1) Biasanya keadaan umum (KU) tampak lemah.
- 2) Tekanan darah normal atau menurun.

- 3) Denyut nadi normal, cepat atau kecil dan lambat.
 - 4) Suhu badan normal atau meningkat.
 - 5) Pembesaran uterus sesuai atau lebih kecil dari usia kehamilan.
- c. Pemeriksaan ginekologi

Hasil pemeriksaan ginekologi didapat:

Inspeksi vulva untuk menilai perdarahan pervaginam dengan atau tanpa jaringan hasil konsepsi.

- 1) Pemeriksaan pembukaan serviks.
 - 2) Inspekulo menilai ada/tidaknya perdarahan dari cavum uteri, ostium uteri terbuka atau tertutup, ada atau tidaknya jaringan di ostium.
 - 3) *Vagina Toucher* (VT) menilai portio masih terbuka atau sudah tertutup teraba atau tidak jaringan dalam cavum uteri, tidak nyeri adneksa, kavum doglas tidak nyeri.
- d. Pemeriksaan penunjang dengan ultrasonografi (USG) oleh dokter (Irianti, 2014: 76-77).

Macam-Macam Abortus dan Tingkatan Pendarahannya

Diagnosis	Pendarahan	Nyeri perut	Uterus	Serviks	Gejala khas
Abortus iminens	Sedikit	Sedang	Sesuai usia gestasi	Tertutup	Tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi
Abortus insipiens	Sedang-banyak	Sedang-hebat	Sesuai usia kehamilan	Terbuka	Tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi

Abortus inkomplit	Sedang-banyak	Sedang-hebat	Sesuai usia kehamilan	Terbuka	Ekspulsi sebagian jaringan konsepsi
Abortus komplit	Sedikit	Tanpa/Sedikit	Lebih kecil dari usia gestasi	Terbuka/tertutup	Ekspulsi seluruh jaringan konsepsi
Missed abortion	Tidak ada	Tidak ada	Lebih kecil dari usia kehamilan	Tertutup	Janin telah mati tapi tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi

Tabel 1.1 (Sumber: WHO, 2013:85)

6. Tatalaksana umum

Klasifikasi Abortus dan Penanganannya:

Sebelum penanganan sesuai klasifikasinya, abortus memiliki penanganan secara umum antara lain:

- a. Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, pernapasan, suhu).
- b. Pemeriksaan tanda-tanda syok (akral dingin, pucat, takikardi, tekanan sistolik <90 mmHg). Jika terdapat syok, lakukan tatalaksana awal syok. Jika tidak terlihat tanda-tanda syok, tetap pikirkan kemungkinan tersebut saat penolong melakukan evaluasi mengenai kondisi ibu karena kondisinya dapat memburuk dengan cepat.
- c. Bila terdapat tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, berikut kombinasi antibiotika sampai ibu bebas demam untuk 48 jam:
 1. Ampisilin 2 g IV/IM kemudian 1 g diberikan setiap 6 jam.
 2. Gentamicin 5 mg/kgBB IV setiap 24 jam
 3. Metronidazol 500 mg IV setiap 8 jam

- d. Segera rujuk ibu ke rumah sakit.
- e. Semua ibu yang mengalami abortus perlu mendapat dukungan emosional dan konseling kontrasepsi pasca keguguran.
- f. Lakukan tatalaksana selanjutnya sesuai jenis abortus (WHO, 2013:84).
 1. Abortus imminens adalah Penanganannya:
 - a) Berbaring, cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan sehingga rangsang mekanik berkurang.
 - b) Pemberian hormon progesteron
 - c) Pemeriksa ultrasonografi (USG).
 2. Abortus Insiptens adalah pengeluaran janin dengan kuret vakum atau cunam ovum, disusul dengan kerokan. Pada kehamilan lebih dari 12 minggu bahaya perforasi pada kerokan lebih besar, maka sebaiknya proses abortus dipercepat dengan pemberian infus oksitosin. Sebaliknya secara digital dan kerokan bila sisa plasenta tertinggal bahaya perforasinya kecil.
 3. Abortus inkomplit adalah begitu keadaan hemodinamik pasien sudah dinilai dan pengobatan dimulai, jaringan yang tertahan harus diangkat atau perdarahan akan terus berlangsung. Oksitosik (oksitosin 10 IU/500ml larutan dekstrosa 5% dalam larutan RL IV dengan kecepatan kira-kira 125 ml/jam) akan membuat uterus berkontraksi, membatasi perdarahan, membantu pengeluaran bekuan darah atau jaringan dan mengurangi kemungkinan perforasi uterus selama D dan K.

4. Abortus komplit dan abortus tertunda (*missed Abortion*)

Pengobatan terbaru *missed abortion* adalah induksi persalinan dengan supositoria prostaglandin E₂, jika perlu dengan oksitosin IV (C.Benson, 2013: 302)

Standar Prosedur Operasional Penatalaksanaan Abortus di Rsud Syekh Yusuf Gowa:

1. Persiapan alat

- a. Tensi meter ,spoit 3 cc
- b. infus set ,cairan RL Cairan Nacl 0,9%
- c. Kuret set ,hand coen (sarung tangan)
- d. Doek steril
- e. Larutan Chlorin 0,5%

2. Persiapan Obat

- a. Laminaria
- b. Misoprostol
- c. Oxytocin

3. Persiapan Pasien

Pasien diberi penjelasan tentang hal – hal yang akan dilakukan

4. Persipan petugas

Memakai alat pelindung diri lengkap

Penatalaksanaan :

1. Penilaian awal

- a. Keadaan umum pasien
- b. Tanda-tanda syok (pucat, berkeringat banyak ,pingsan,tekanan sistolik < 90 mHg ,nadi > 112 X / mnt
- c. Bila syok disertai adanya massa lunak diadneksa ,nyeri perut bawah ,adanya cairan bebas dlm cavum pelvis,pikirkan kemungkinan kehamilan
- d. Tanda-tanda infeksi atau sepsis (Demam tinggi ,Secret berbau pervaginam ,nyeri perut bawah ,dinding perut tegang ,nyeri goyang portio, dehidrasi,gelisah atau pingsan

2. Penanganan spesifik

a. Abortus Imminens

- 1) Anjurkan tindakan melakukan aktifitas fisik secara berlebihan atau melakukan hubungan seksual
- 2) Tirah baring total
- 3) Bila terjadi perdarahan
 - a) Berhenti : lakukan ANC terjadwal & penilaian ulang bila terjadi perdarahan lagi
 - b) Terus berlangsung : nilai kondisi janin (uji kehamilan / USG , lakukan konfirmasi kemungkinan penyebab lain (hamil etopik / molahidatidosa)

b. Abortus insipiens

- 1) Lakukan prosedur evaluasi hasil konsepsi ,bila hasil gestasi \leq 16mg evaluasi dilakukan dgn peralatan aspirasi vakum manual stlh bagian

janin dikeluarkan ,bila usia gestasi>16mg evaluasi diadakan dgn peralatan aspirasi vakum manual setelah bagian janin dikeluarkan ,bila usia gestasi>16mg evaluasi diadakan dgn prosedur dilatasi & kuretase

2) Bila prosedur evaluasi tidak segera dilakukan / usia gestasi > 16 minggu ,lakukan tindakan pendahuluan dengan :

- a) Infus oksitocin 20 iu dalam 500 ml NaCl 0,9% atau RL mulai dgn 8 tts/ menit yg dpt dinaikkan dgn 40 tts/m yg dpt dinaikkan dgn 40 tts /m ,sesuai dgn kondisi kontraksi uterus hingga terjadi pengeluaran hasil konsepsi
- b) Ergometrin 0,2 mg IM yang diulangi 15 menit kemudian
- c) Mesoprostol 2 tab perrectal & apa bila masih diperlukan dpt diulangi dgn dosis yg sama 4jam kemudian dgn dosis yg sama

c. Abortus incomplitus

- 1) Tentukan besar uterus (takir usia kehamilan),kenali dan atasi setiap komplikasi (perdarahan hebat ,syok,infeksi,/sepsis)
- 2) Hasil konsepsi yang terperangkap diserviks dan disertai perdarahan hingga ukuran sedang ,dapat dikeluarkan secara digital atau cunam ovum ,setelah itu evaluasi perdarahan :
 - a) Bila perdarahan berhenti , beri ergometrin 0,2 mg IM atau mesoprostol 400 mg peroral
 - b) Bila perdarahan terus berlangsung ,evaluasi sisa hasil konsepsi dengan AVM/D & K
- 3) Bila ada tanda2 infeksi,beri anti biotika profilaksis (Ampisili 500mg /oral)

- 4) Bila terjadi infeksi,beri ampisilin 1gr & Mebendasol 500mg / 8 Jam
 - 5) Bila terjadi perdarahan hebat &usia Gestasi < 16mg segera lakukan evaluasi AVM
 - 6) Bila pasien tampak anemis ,berikan Sulfas Ferosus 600mg /hari selama 2 mg (anamia sedang) atau transfusi darah (Anamia berat)
- d. Abortus Komplitus
- 1) Bila kondisi pasien baik,ckp diberi tab ergometrin 3x1 tab/hari selama 3 hari
 - 2) Bila pasien mengalami anemia sedang berikan tablet Fe 600 mg / hari selama 2mg disertai anjuran mengkonsumsi makanan bergizi ,jika anamia berat maka transfusi darah
 - 3) Bila tidak terdapat tanda-tanda infeksi tdk diperlukan antibiotika
- e. Abortus infeksiosa
- 1) Lakukan rehidrasi cairan yang hilang dengan RL ,beri anti biotika (misal Ampicilin 1 gr dan metronidazol 500mg)
 - 2) Jika ada riwayat abortus tidak aman ,beri ATS Dan TT
 - 3) Setelah kondisi stabil dpt dilakukan pengosongan uterus sesegera mungkin (lakukan secara hati-hati karena tingginya kejadian ferporasi)
- f. Missed Abortus
- 1) Plasenta dpt melekat sgt erat didinding rahim ,sehingga prosedur evakuasi (Kuretase) lebih sulit & risiko perforasi lebih tinggi
 - 2) Umumnya kanalis servikalis dlm keadaan tertutup sehingga perlu tindakan dilatasi dgn batang laminaria sel ma 12 jam

- 3) Periksa kadar fibrinogen untuk mengetahui terjadinya komplikasi hipofibrinogenemia yang berlanjut dgn gangguan pembekuan darah
- 4) Kuretase dilakukan dgn hati – hati dalam perlindungan infus RL /Ns
- 5) Untuk mencegah terjadinya komplikasi perdarahan diberikan oksitorin drip dan disediakan darah.

7. Komplikasi pada Abortus

Komplikasi yang serius kebanyakan terjadi pada fase abortus yang tidak aman (unsafe abortion) walaupun kadang-kadang dijumpai juga pada abortus spontan. Komplikasi dapat berupa perdarahan, kegagalan ginjal, infeksi, syok akibat perdarahan dan infeksi sepsis.

a. Perdarahan

Perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfusi darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak di berikan pada waktunya.

b. Perforasi

Perforasi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus dalam posisi hiperretrofleksi. Jika terjadi peristiwa ini penderita perlu diamati dengan teliti jika ada tanda bahaya, perlu segera dilakukan laparotomi, dan tergantung dari luas dan bentuk perforasi. Perforasi uterus pada abortus yang dikerjakan oleh seorang awam menimbulkan persoalan gawat karena perlukaan uterus biasanya luas, mungkin pula terjadi pada kandung kemih atau usus. Dengan adanya dugaan atau kepastian

terjadinya perforasi, laparotomi harus segera dilakukan untuk menentukan luasnya cedera , untuk selanjutnya mengambil tindakan-tindakan seperlunya guna mengatasi komplikasi.

c. Infeksi

Infeksi dalam uterus dan adneksa dapat terjadi dalam setiap abortus.

d. Syok

Syok pada abortus biasa terjadi karena perdarahan (syok hemoragik) dan karena infeksi berat (syok endoseptik). (Nita dan Mustika, 2013 : 198-199).

C. Tinjauan Khusus Tentang Abortus Inkomplit

1. Pengertian Abortus Inkomplit

Abortus Inkomplit adalah pengeluaran sebagian konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu tetapi sebagian tertinggal (biasanya jaringan plasenta). (Pudiastuti, 2012:45).

Pengertian lain tentang abortus adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi dengan meninggalkan sisa konsepsi dalam rahim sehingga menimbulkan keluhan pendarahan dan nyeri pada bagian perut bawah (irianti, 2014:75)

2. Tanda-tanda Abortus Inkomplit

- a) Setelah terjadi abortus dengan pengeluaran jaringan, pendarahan berlangsung terus.
- b) Kanalis servikalis tetap terbuka karena masih ada benda di dalam rahim yang dianggap corpus allienum, maka uterus akan berusaha mengeluarkannya dengan mengadakan kontraksi. Tetapi kalau keadaan ini dibiarkan lama serviks akan menutup kembali. (Pudistuti, 2012: 45)

3. Diagnosis

- a. Perdarahan memanjang, sampai terjadi keadaan anemis.
- b. Perdarahan mendadak banyak menimbulkan keadaan gawat.
- c. Terjadi infeksi ditandai suhu tinggi.
- d. Dapat terjadi degenerasi ganas.
- e. Pada pemeriksaan dijumpai gambaran:
 - 1) Kanalis servikalis terbuka
 - 2) Dapat diraba jaringan dalam rahim.
 - 3) Lakukan pemeriksaan bimanual: ukuran uterus, dilatasi, nyeri tekan penipisan serviks, serta kondisi ketuban.
 - 4) Jika hasil pemeriksaan negatif, lakukan pemeriksaan denyut jantung janin untuk menentukan kelangsungan hidup janin dan tenangkan keadaan ibu.

- 5) Jika perdarahan terus berlanjut, khususnya jika ditemui uterus lebih besar dari yang harusnya mungkin menunjukkan kehamilan ganda atau molahidatidosa.
- 6) Jika perdarahan berhenti, lakukan asuhan antenatal seperti biasa dan lakukan penilaian jika terjadi perdarahan lagi.
- 7) Konsultasi dan rujuk ke dokterspesialis jika terjadi perdarahan hebat, kram meningkat atau hasil pemeriksaan menunjukkan hasil abnormal (Yulaikhah, 2015:79-80).

4. Penanganan Abortus Inkomplit

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngot Thi Nuh Nguyen, 2013 adalah 300 terdaftar antara bulan September 2009 dan Mei 2010. Hampir semua peserta (96,3%) berhasil menyelesaikan pemeriksaan dengan menggunakan dosis tunggal misoprostol 400 mcg. Mayoritas wanita (87,2%) menemukan efek samping yang bisa ditoleransi atau mudah ditolerir. Sebagian besar wanita (84,3%) merasa puas atau sangat puas. Dengan perlakuan yang mereka terima: hanya satu yang tidak puas (0.3%).

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa 400 mcg sublingual misoprostol efektif mengevakuasi uterus untuk sebagian besar. Wanita mengalami aborsi tidak lengkap. Tingginya tingkat kepuasan dan tolerabilitas efek samping juga membuktikan kemudahan penggunaan metode ini. Dari data tersebut dan diberikan consensus Internasional seputar keefektifan misoprostol untuk perawatan aborsi yang tidak lengkap, tampaknya tepat waktu penggunaan obat untuk indikasi ini diperluas

secara luas baik di seluruh Vietnam maupun dimanapun akses terhadap perawatan aborsi terbatas (Ngot Thi Nuh Nguyen dkk, 2013: 1).

Abortus Inkomplit harus segera dibersihkan dengan kuretase atau secara digital. Selama masih ada sisa-sisa plasenta akan terus terjadi pendarahan (Pudiastuti,2012: 48).

a. penanganan

- 1) Terapi abortus dengan curetase
- 2) Perawatan pasca tindakan
- 3) Pemantauan pasca abortus

b. Penanganan

1. Lakukan konseling.
2. Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk tanda-tanda vital (nadi, tekann darah, pernapasan, suhu).
3. Pemeriksaan tanda-tanda syok (akral dingin,pucat, takikardi, tekanan sistolik <90 mmHg). Jika terdapat syok, lakukan tatalaksana awal syok. Jika tidak terlihat tanda-tanda syok, tetap pikirkan kemungkinan tersebut saat penolong melakukan evaluasi mengenai kondisi ibu karena kondisinya dapat memburuk dengan cepat.
4. Bila terdapat tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, berikut kombinasi antibiotika sampai ibu bebas demam untuk 48 jam:
 - a) Ampisilin 2 g IV/IM kemudian 1 g diberikan setiap 6 jam.
 - b) Gentamicin 5 mg/kgBB IV setiap 24 jam

- c) Metronidazol 500 mg IV setiap 8 jam
5. Segera rujuk ibu ke rumah sakit.
 6. Semua ibu yang mengalami abortus perlu mendapat dukungan emosional dan konseling kontrasepsi pasca keguguran (WHO, 2013:84).
 7. Jika perdarahan ringan atau sedang dan usia kehamilan kurang dari 16 minggu, gunakan jari atau forsep cincin untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang mencuap dari serviks.
 8. Jika perdarahan berat atau usia kehamilan kurang dari 16 minggu, lakukan evaluasi isi uterus. Aspirasi vacuum manual (AVM) adalah metode yang dianjurkan. Kuret tajam sebaiknya hanya dilakukan bila AVM tidak tersedia. Jika evaluasi tidak dapat segera dilakukan, berikan ergometri 0,2 mg IM (dapat di ulang 15 menit kemudian bila perlu).

Pilihan utama bagi evakuasi uterus adalah AVM, Dilatasi dan kuretase dianjurkan apabila aspirasi vakum manual tidak tersedia (Saifuddin dkk, 2014: P-4).

Aspirasi vakum cocok untuk aborsi pada usia kehamilan 7 sampai 12 minggu sedangkan pada trimester kedua, dilatasi dan evakuasi serta sistemik atau intrauterine (Lim, 2014).

9. Jika usia kehamilan lebih dari 16 minggu, berikan infus 40 IU oksitosin dalam satu liter NaCl 0,9% atau ringer laktat dengan kecepatan 40 tetes/menit untuk membantu pengeluaran hasil konsepsi.

10. Lakukan evaluasi tanda vital pasca tindakan setiap 30 menit selama 2 jam. Bila kondisi ibu baik, pindahkan ibu ke ruang rawat.
11. Lakukan pemeriksaan jaringan secara makroskopis dan kirimkan untuk pemeriksaan patologi ke laboratorium.
12. Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, tanda akut abdomen, dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar hb > 8 g/dl, ibu dapat diperbolehkan pulang (WHO, 2013: 87).

Standar Kompetensi Bidan :

Asuhan dan Konseling Selama Kehamilan

Kompetensi ke-3

Bidan memberikan asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu.

a. Pengetahuan Dasar

1. Anatomi dan fisiologi tubuh manusia.
2. Siklus menstruasi dan proses konsepsi.
3. Tumbuh kembang janin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Tanda-tanda dan gejala kehamilan.
5. Mendiagnosa kehamilan.
6. Perkembangan normal kehamilan.
7. Komponen riwayat kesehatan.
8. Komponen pemeriksaan fisik yang terfokus selama antenatal.

9. Menentukan umur kehamilan dari riwayat menstruasi, pembesaran dan/atau tinggi fundus uteri.
10. Mengenal tanda dan gejala anemia ringan dan berat, hyperemesis gravidarum, kehamilan ektopik terganggu, abortus imminen, molahydatidosa dan komplikasinya, dan kehamilan ganda, kelainan letak serta pre eklamsia.
11. Nilai Normal dari pemeriksaan laboratorium seperti Haemaglobin dalam darah, test gula, protein, acetone dan bakteri dalam urine.
12. Perkembangan normal dari kehamilan: perubahan bentuk fisik, ketidaknyamanan yang lazim, pertumbuhan fundus uteri yang diharapkan.
13. Perubahan psikologis yang normal dalam kehamilan dan dampak kehamilan terhadap keluarga.
14. Penyuluhan dalam kehamilan, perubahan fisik, perawatan buah dada ketidaknyamanan, kebersihan, seksualitas, nutrisi, pekerjaan dan aktifitas (senam hamil).
15. Kebutuhan nutrisi bagi wanita hamil dan janin.
16. Penatalaksanaan immunisasi pada wanita hamil.
17. Pertumbuhan dan perkembangan janin.
18. Persiapan persalinan, kelahiran, dan menjadi orang tua.
19. Persiapan keadaan dan rumah/keluarga untuk menyambut kelahiran bayi.
20. Tanda-tanda dimulainya persalinan.
21. Promosi dan dukungan pada ibu menyusukan.
22. Teknik relaksasi dan strategi meringankan nyeri pada persiapan persalinan dan kelahiran.

23. Mendokumentasikan temuan dan asuhan yang diberikan.
24. Mengurangi ketidaknyamanan selama masa kehamilan.
25. Penggunaan obat-obat tradisional ramuan yang aman untuk mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan.
26. Akibat yang ditimbulkan dari merokok, penggunaan alkohol, dan obat terlarang bagi wanita hamil dan janin.
27. Akibat yang ditimbulkan/ditularkan oleh binatang tertentu terhadap kehamilan, misalnya toxoplasmosis.
28. Tanda dan gejala dari komplikasi kehamilan yang mengancam jiwa seperti pre-eklampsia, perdarahan pervaginam, kelahiran premature, anemia berat.
29. Kesejahteraan janin termasuk DJJ dan pola aktivitas janin.
30. Resusitasi kardiopulmonary.

b. Pengetahuan Tambahan :

1. Tanda, gejala dan indikasi rujukan pada komplikasi tertentu dalam kehamilan, seperti asma, infeksi HIV, infeksi menular seksual (IMS), diabetes, kelainan jantung, postmatur/serotinus.
2. Akibat dari penyakit akut dan kronis yang disebut diatas bagi kehamilan dan janinnya.

c. Keterampilan Dasar :

1. Mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisisnya pada setiap kunjungan/pemeriksaan ibu hamil.
2. Melaksanakan pemeriksaan fisik umum secara sistematis dan lengkap.

3. Melaksanakan pemeriksaan abdomen secara lengkap termasuk pengukuran tinggi fundus uteri/posisi/presentasi dan penurunan janin.
4. Melakukan penilaian pelvic, termasuk ukuran dan struktur tulang panggul.
5. Menilai keadaan janin selama kehamilan termasuk detak jantung janin dengan menggunakan fetoscope (Pinrad) dan gerakan janin dengan palpasi uterus.
6. Menghitung usia kehamilan dan menentukan perkiraan persalinan.
7. Mengkaji status nutrisi ibu hamil dan hubungannya dengan pertumbuhan janin.
8. Mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi kehamilan.
9. Memberikan penyuluhan pada klien/keluarga mengenai tanda-tanda berbahaya serta bagaimana menghubungi bidan.
10. Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan anemia ringan, hyperemesis gravidarum tingkat I, abortus imminen dan pre eklamsia ringan.
11. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan yang lazim terjadi dalam kehamilan.
12. Memberikan immunisasi pada ibu hamil.
13. Mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan melakukan penanganan yang tepat termasuk merujuk ke fasilitas pelayanan tepat dari:
 - a) Kekurangan gizi.
 - b) Pertumbuhan janin yang tidak adekuat: SGA & LGA.
 - c) Pre eklamsia berat dan hipertensi.

- d) Perdarahan per-vaginam.
 - e) Kehamilan ganda pada janin kehamilan aterm.
 - f) Kelainan letak pada janin kehamilan aterm.
 - g) Kematian janin.
 - h) Adanya adema yang signifikan, sakit kepala yang hebat, gangguan pandangan, nyeri epigastrium yang disebabkan tekanan darah tinggi.
 - i) Ketuban pecah sebelum waktu (KPD=Ketuban Pecah Dini).
 - j) Persangkaan polyhydramnion.
 - k) Diabetes melitus.
 - l) Kelainan congenital pada janin.
 - m) Hasil laboratorium yang tidak normal.
 - n) Persangkaan polyhydramnion, kelainan janin.
 - o) Infeksi pada ibu hamil seperti : IMS, vaginitis, infeksi saluran perkemihan dan saluran nafas.
14. Memberikan bimbingan dan persiapan untuk persalinan, kelahiran dan menjadi orang tua.
15. Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai perilaku kesehatan selama hamil seperti nutrisi, latihan (senam), keamanan dan berhenti merokok.
16. Penggunaan secara aman jamu/obat-obatan tradisional yang tersedia.

d. Keterampilan Tambahan

1. Menggunakan Doppler untuk memantau DJJ.
2. Memberikan pengobatan dan/atau kolaborasi terhadap penyimpangan dari keadaan normal dengan menggunakan standar local dan sumber daya yang tersedia.
3. Melaksanakan kemampuan Asuhan Pasca Keguguran
(Sari, 2012:129-133)

5. Komplikasi abortus inkomplit

a. Perdarahan

Perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfuse darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak di berikan pada waktunya.

b. Perforasi

Perforasi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus pada posisi hiperretrofleksi. Dengan adanya dugaan atau kepastian terjadi perforasi, laparotomi harus segera di lakukan untuk menentukan luasnya perlukaan pada uterus dan apakah ada perlukaan alat-alat lain.

c. Syok

Syok pada abortus biasa terjadi karena perdarahan dan karena infeksi berat.

d. Infeksi

Pada genetalia eksterna dan vagina terdapat flora normal, khususnya pada genetalia eksterna.

e. Kematian

Abortus berkontribusi terhadap kematian ibu sekitar 15%. Data tersebut sering kali tersembunyi di balik data kematian ibu akibat perdarahan. Data lapangan menunjukkan bahwa sekitar 60% -70% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, dan sekitar 60% kematian akibat perdarahan tersebut, atau sekitar 35-40% dari seluruh kematian ibu, disebabkan oleh perdarahan postpartum. Sekitar 15-20% kematian disebabkan oleh perdarahan (Irianti, 2014:77-78).

D. Tinjauan Manajemen Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah dengan metode pengaturan pemikiran dan tindakan dalam suatu urutan logis baik pasien maupun petugas kesehatan. Proses itu digambarkan dalam arti kata perilaku yang diharapkan dari klinis tersebut. Hal ini digambarkan dengan jelas bahwa proses berfikir dan bertindak yang terlibat, tetapi juga tingkat perilaku dalam setiap langkah yang akan dicapai dalam rangka memberikan asuhan/pelayanan yang aman dan menyeluruh.

Proses asuhan kebidanan ada tujuh langkah yang secara periodik disaring ulang, itu mulai dengan pengumpulan data dan berakhir dengan evaluasi. Ketujuh langkah terdiri dari kerangka yang menyeluruh dan dapat diterapkan dalam setiap

situasi. Setiap langkah bagaimanapun dapat diuraikan dalam tugas yang terbatas dan ini bervariasi sesuai dengan kondisi pasien.

2. Tahapan Dalam Manajemen Kebidanan

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pengumpulan data dasar secara komprehensif untuk evaluasi pasien. Data dasar ini termasuk riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik apabila perlu, tinjau catatan saat ini atau catatan lama dari rumah sakit. Tinjauan singkat dari data laboratorium dan pemeriksaan tambahan lainnya, semua informasi pasien dari semua sumber yang berhubungan dengan kondisi pasien. Bidan kumpulan data awal yang menyeluruh walaupun pasien itu ada komplikasi yang akan diajukan kepada dokter konsulen. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Anamnese, meliputi Tanya jawab untuk memperoleh meliputi riwayat kesehatan ibu, riwayat kehamialn, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data, sosial, ekonomi, dan psikologi serta meliputi serta meliputi HPHT dan HTP.

Pemeriksaan fisik meliputi : keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu. Klien yang mengalami abortus inkomplit biasanya menunjukkan klien adanya pengeluaran jaringan , pendarahan berlangsung terus menerus, nyeri perut yang hebat, pendarahan berlangsung terus menerus dan kanalis servikalis terbuka karena masih ada benda di dalam rahim yang dianggap asing. Pada

pemeriksaan penunjang USG kehamilan ditemukan adanya retensi produk/sisa kehamilan.

Adapun tanda-tanda dari abortus inkomplit adalah Setelah terjadi abortus dengan pengeluaran jaringan, pendarahan berlangsung terus dan Kanalis servikalis tetap terbuka karena masih ada benda di dalam rahim yang dianggap corpus allienum, maka uterus akan berusaha mengeluarkannya dengan mengadakan kontraksi. Tetapi kalau keadaan ini dibiarkan lama serviks akan menutup kembali.

Dari tanda-tanda di atas penyebab dari abortus spontan adalah tidak selalu bias ditentukan. Yang paling umum diketahui penyebab abortus spontan pada trimester 1 adalah kelainan kromosom, penyakit kolagen vaskuler, diabetes, masalah hormonal lain, infeksi, abnormal structural anatomi, gaya hidup dan bawaan (hadir sejak lahir) kelainan rahim. Kelainan kromosom pada janin adalah penyebab paling umum dari abortus spontan.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Dikembangkan dari data dasar : interpretasi dari data ke masalah atau diagnosa khusus yang teridentifikasi. Kedua kata masalah maupun diagnosa dipakai, karena beberapa masalah tidak dapat didefinisikan sebagai diagnosa tetapi tetap perlu dipertimbangkan untuk membuat wacana yang menyeluruh untuk pasien.

Abortus pada kehamilan terbagi atas 2 yaitu: abortus provokatus yaitu pengguguran kehamilan dengan sengaja yang terbagi menjadi dua abortus provokatus artificialis yaitu pengguguran kehamilan dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan membawa maut bagi ibu, kedua abortus provocatus

criminalis adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah atau oleh orang tidak berwenang dan dilarang oleh hukum.

Adapun abortus spontan yaitu setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan sebagai embrio atau janin seberat 500 gram atau kurang, yang biasanya sesuai dengan usia janin (usia kehamilan) dari 20 hingga 22 minggu atau kurang. Abortus spontan terbagi menjadi beberapa yaitu : abortus imminens adalah pendarahan vagina pada umur kehamilan <20 minggu. Pada keadaan ini terjadi ancaman proses keguguran, namun produk kehamilan belum keluar, abortus insipiens adalah abortus yang sedang berlangsung dan tidak dapat di cegah lagi. Ostium terbuka, teraba ketuban, dan berlangsung hanya dalam beberapa jam saja.

Selanjutnya abortus inkomplitus adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus, abortus komplit merupakan abortus dimana keseluruhan hasil konsepsi dikeluarkan (fetus dan plasenta), missed abortus adalah kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari dan abortus habitualis pada abortus jenis ini, pasien termasuk jika telah mengalami keguguran berturut-turut selama lebih dari tiga kali.

Ibu dikatakan abortus apabila termasuk dalam diagnosis yaitu dapat diduga bila seorang wanita dalam masa reproduksi mengeluh tentang pendarahan pervaginam setelah mengalami haid terlambat, sering pula terdapat rasa mules. Kecurigaan tersebut dapat diperkuat dengan ditentukannya kehamilan muda pada pemeriksaan bimanual dan dengan tes kehamilan secara biologis atau imunologi,

bilamana hal itu dikerjakan. Harus di perhatikan banyaknya perdarahan, pembukaan serviks dan adanya jaringan dalam kavum uterus atau vagina.

Pada hal ini ibu dikatakan abortus inkomplit apabila apabila terjadi amenorea, disertai dengan PP test (+), Nyeri perut, terkadang nyeri dideskripsikan menyerupai nyeri saat persalinan, pendarahan yang bisa sedikit atau banyak, biasanya berupa stolsel (darah beku), sudah ada keluar fetus atau jaringan. Kemudian pemeriksaan ginekologi pada pemeriksaan dalam, untuk abortus yang baru terjadi didapatkan serviks terbuka, kadang-kadang dapat diraba sisa-sisa jaringan dalam kanalis servikalis atau kavum uteri serta uterus berukuran lebih kecil dari usia kehamilan, dan pemeriksaan penunjang USG kehamilan untuk mendeteksi adanya retensi produk/sisa kehamilan.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial lainnya berdasarkan masalah yang sudah ada adalah suatu bentuk antisipasi, pencegahan apabila perlu menunggu dengan waspada dan persiapan untuk suatu pengakhiran apapun. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman. Pada kasus abortus inkomplit biasanya dapat menyebabkan terjadinya pendarahan, perforasi, syok, infeksi dan kematian pada ibu.

d. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi

Merefleksikan proses manajemen yang sifatnya terus menerus tidak hanya pada asuhan primer yang periodik selama kunjungan antenatal tetapi juga selama bidan terus bersama wanita itu misalnya selama waktu bersalin. Data baru terus dikumpulkan dan dievaluasi. Beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intervensi dokter. Pada kasus abortus inkomplit Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak di berikan pada waktunya.

e. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Membuat suatu rencana asuhan yang komprehensif, ditentukan oleh langkah sebelumnya, adalah suatu perkembangan dari masalah atau diagnosa yang sedang terjadi atau terantisipasi dan juga termasuk mengumpulkan informasi tambahan atau tertinggal untuk data dasar.

Suatu rencana asuhan yang komprehensif tidak saja mencakup apa yang ditentukan oleh kondisi pasien dan masalah yang terkait, tetapi juga menggaris bawahi bimbingan yang terantisipasi (*anticipatory guinde*) untuk seperti apa yang diharapkan terjadi berikutnya.

Berdasarkan kasus abortus terkhusus abortus inkomplit ini ditolong di rumah sakit.

a. Penanganan

1. Lakukan konseling.
2. Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, pernapasan, suhu).
3. Pemeriksaan tanda-tanda syok (akral dingin, pucat, takikardi, tekanan sistolik <90 mmHg). Jika terdapat syok, lakukan tatalaksana awal syok. Jika tidak terlihat tanda-tanda syok, tetap pikirkan kemungkinan tersebut saat penolong melakukan evaluasi mengenai kondisi ibu karena kondisinya dapat memburuk dengan cepat.
4. Bila terdapat tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, berikut kombinasi antibiotika sampai ibu bebas demam untuk 48 jam:
 - a) Ampisilin 2 g IV/IM kemudian 1 g diberikan setiap 6 jam.
 - b) Gentamicin 5 mg/kgBB IV setiap 24 jam
 - c) Metronidazol 500 mg IV setiap 8 jam
5. Segera rujuk ibu ke rumah sakit.
6. Semua ibu yang mengalami abortus perlu mendapat dukungan emosional dan konseling kontrasepsi pasca keguguran (WHO, 2013:84).
7. Jika perdarahan ringan atau sedang dan usia kehamilan kurang dari 16 minggu, gunakan jari atau forsep cincin untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang mencuap dari serviks.

8. Jika perdarahan berat atau usia kehamilan kurang dari 16 minggu, lakukan evaluasi isi uterus. Aspirasi vacuum manual (AVM) adalah metode yang dianjurkan. Kuret tajam sebaiknya hanya dilakukan bila AVM tidak tersedia. Jika evaluasi tidak dapat segera dilakukan, berikan ergometri 0,2 mg IM (dapat di ulang 15 menit kemudian bila perlu).

Pilihan utama bagi evakuasi uterus adalah AVM, Dilatasi dan kuretase dianjurkan apabila aspirasi vakum manual tidak tersedia (Saifuddin dkk, 2014: P-4). Aspirasi vakum cocok untuk aborsi pada usia kehamilan 7 sampai 12 minggu sedangkan pada trimester kedua, dilatasi dan evakuasi serta sistemik atau intrauterine (Lim, Li Min, 2014).

9. Jika usia kehamilan lebih dari 16 minggu, berikan infus 40 IU oksitosin dalam satu liter NaCl 0,9% atau ringer laktat dengan kecepatan 40 tetes/menit untuk membantu pengeluaran hasil konsepsi.
10. Lakukan evaluasi tanda vital pasca tindakan setiap 30 menit selama 2 jam. Bila kondisi ibu baik, pindahkan ibu ke ruang rawat.
11. Lakukan pemeriksaan jaringan secara makroskopis dan kirimkan untuk pemeriksaan patologi kelaboratorium.
12. Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, tanda akut abdomen, dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar hb > 8 g/dl, ibu dapat diperbolehkan pulang (WHO, 2013: 87).

f. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Melaksanakan perencanaan asuhan menyeluruh, perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggungjawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (yaitu : memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen asuhan klien agar penanganan kasus dengan abortus inkomplit dapat berhasil dan memuaskan.

g. Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi langkah terakhir ini sebenarnya adalah merupakan pengecekan apakah rencana asuhan tersebut, yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya dan dianggap tidak efektif jika memang tidak efektif. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian tidak.

Sekali lagi, dengan mengingat bahwa proses manajemen asuhan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut (Sudarti dan Afroh, 2012:177-182).

Beberapa hal yang di evaluasi : apakah ibu sudah tidak mengalami perdarahan yang dapat menyebabkan komplikasi lanjut dan membahayakan ibu dan memeriksa hasil USG apakah benar-benar telah bersih atau belum pasca kuretase.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Dokumentasi asuhan dalam pelayanan kebidanan adalah bagian dari kegiatan yang harus dikerjakan oleh perawat dan bidan setelah memberi asuhan kepada pasien. Dokumentasi merupakan suatu informasi lengkap meliputi status kesehatan kesehatan pasien, kebutuhan pasien, kegiatan asuhan kebidanan serta respons pasien terhadap asuhan yang diterimanya. Dengan demikian dokumentasi kebidanan mempunyai porsi yang besar dari catatan klinis pasien yang menginformasikan faktor tertentu atau situasi yang terjadi selama asuhan dilaksanakan. Disampingkan itu catatan juga dapat sebagai wahana komunikasi dan koordinasi antar profesi (*Interdisipliner*) yang dapat dipergunakan untuk mengungkap suatu fakta aktual untuk dipertanggungjawabkan.

Dokumentasi asuhan kebidanan merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan yang dilaksanakan sesuai standar. Dengan demikian pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan standar dengan baik merupakan suatu hal yang mutlak bagi setiap tenaga kebidanan agar mampu membuat dokumentasi kebidanan secara baik dan benar.

Manajemen kebidanan merupakan metode atau bentuk pendekatan yang digunakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, sehingga langkah-langkah dalam manajemen merupakan alur pikir bidan dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan klinis.

a) Subjektif.

Subjektif menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa sebagai langkah 1 varney. Subjektif (S) ini merupakan informasi yang diperoleh langsung dari klien. Informasi tersebut dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa.

1. Catatan ini berhubungan masalah dengan sudut pandang pasien.
2. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sehingga kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa (data primer).
3. Pada bayi atau anak kecil data subjektif ini dapat diperoleh dari orang tuanya (data sekunder).
4. Data subjektif menguatkan diagnosa yang akan dibuat.
5. Tanda gejala subjektif yang diperoleh dari hasil bertanya dari pasien, suami atau keluarga (identitas umum, keluhan, riwayat menachre, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat penyakit, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, riwayat psikosial, pola hidup).
6. Pada orang yang bisu, dibagian data belakang “S” diberi tanda “0” atau “X” ini menandakan porang itu bisu. Data subjektif menguatkan diagnosa yang akan dibuat.

b) Objektif

Objektif menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan tes diagnosa lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk

mendukung assesment sebagai langkah 1 varney. Data yang diperoleh dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan pada waktu pemeriksaan termasuk juga hasil pemeriksaan laboratorium, USG, dan lain-lain. Apa yang dapat diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosa yang akan ditegakkan.

1. Data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa.
2. Tanda gejala objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan (tanda KU, Vitalsign, Fisik, Khusus, kebidanan, pemeriksaan dalam, laboratorium dan pemeriksaan penunjang). Pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi.
3. Data yang digolongkan dalam kategori ini, antara lain : Data psikologik, Hasil observasi yang jujur, Informasi kajian teknologi (hasil pemeriksaan laboratorium, RO, CTG, USG, dan lain-lain).
4. Apa yang dapat memuaskan laporan dari keluarga yang masuk kategori ini.
5. Apa yang dapat diobservasikan oleh bidan atau perawat akan menjadi komponen yang penting dari diagnosa yang ditegakkan.

c) Assesment

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi : 1. Diagnosa atau masalah (Diagnosa adalah rumusan dari hasil pengkajian mengenai kondisi klien : hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Berdasarkan hasil analisa data yang didapat. Masalah segala sesuatu yang menyimpang sehingga kebutuhan klien terganggu, kemungkinan mengganggu kehamilan atau kesehatan tetapi tidak masuk dalam diagnosa. 2. Antisipasi diagnosa

atau masalah potensia. Perlunya tindakan segera oleh Bidan atau Dokter, konsultasi atau kolaborasi atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 varney.

1. Masalah atau diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif maupun data atau informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan dan disimpulkan.
2. Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu ada informasi baru baik subjektif maupun objektif dan sering diungkapkan secara terpisah-pisah, maka proses analisa adalah proses yang dinamik.
3. Sering menganalisis S penting !
4. Mengikuti perkembangan pasien dan menjamin segala perbuatan baru dapat diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang tepat.

d) Planning

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan, tindakan dan evaluasi berdasarkan assesment sebagai langkah 5, 6, 7.

1. Membuat perencanaan tindakan saat itu atau yang akan datang untuk mengusahakan mencapai kondisi pasien sebaik mungkin atau menjaga atau mempertahankan kesejahteraan.
2. Proses ini termasuk kriteria tujuan terdiri dari kebutuhan pasien yang harus dicapai dalam bata waktu tertentu.
3. Tindakan yang diambil harus membantu pasien mencapai kemajuan dalam kesejahteraannya yang pasalnya d
4. an harus mendukung rencana Dokter bila itu dalam manajemen kolaborasi atau rujukan.

E. Tinjauan Islam

1. Tinjauan Islam Tentang Pelayanan Kesehatan

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. difirmankan oleh Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menolong didalam koridor “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah melarang sebaliknya. Jika kita melanggar ketentuan Allah maka hukuman akan diberikan dan “Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Jadi interaksi itu boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan diatas.

Keadaan tersebut mengharuskan bidan bertindak profesional dalam tindakan dalam pelayanan bagi pasien, sebagaimana Allah swt menyukai hambanya yang bekerja dengan profesional.

Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَرِفَ، وَمَنْ كَدَّ عَالِي عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ هِدٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (profesional atau ahli). Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla.” (HR Ahmad)

Manusia yang beriman dan bekerja dengan baik, sehingga melahirkan karya-karya besar yang bermanfaat bagi sesamanya, disebutkan al-Qur’an sebagai manusia yang paling baik dan terpuji. Sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesamanya dan makhluk lain secara menyeluruh.

2. Tinjauan Islam Tentang Kehamilan

Setiap kehamilan dan persalinan merupakan suatu proses alamiah yang terjadi pada wanita, akan tetapi masih terdapat kemungkinan untuk berkembang menjadi patologis dan mengalami keguguran. Keguguran janin janin dapat terjadi pada periode antepartum (sebelum persalinan).

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ
 كَلَّ فِي الرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ
 يَخْلُقَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَذْكَرٌ يَارَبِّ أُنْثَى يَا رَبِّ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ
 فَيُكْتُبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

“Dari Anas bin Malik (moga-moga ridha Allah terlimpah atasnya), dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata; "Wahai Rabb, sekarang baru sperma, wahai Rabb, segumpal darah, wahai Rabb (sekarang jadi) segumpal daging". Maka bila Allah menghendaki menciptakan janin itu, malaikat itu berkata; "Wahai Rabb, laki-laki, wahai Rabb (atau) perempuan, Wahai Rabb sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, kapan ajalnya. Demikianlah ditulis ketetapanannya selagi berada di dalam perut ibunya" (H.R. Bukhari, Muslim dan al-Imam Ahmad)

Dalam Hadist yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dan al-Imam Ahmad ini dijelaskan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang lepas dari penjagaan Allah swt., sampai bagi tiap-tiap anak dalam kandungan sudah sedia malaikat yang menjaga pertumbuhannya, sejak air segumpal (*nutfah*), sampai darah segumpal (*alaqah*), dan sampai daging segumpal (*mudghah*) dan pertumbuhan selanjutnya, akan jadi atau akan gugur dalam kandungan sudah dalam ilmu dan ketentuan Allah swt. Bahkan celaka atau bahagianya, rezeki atau ajalnya, semua sudah tertentu. Hanya kita manusia yang tidak tahu (Al-Maragi, 1994).

Ayat di atas dijelaskan bahwa dalam penciptaan manusia dari *nutfah* yakni setets mani, kemudian setets mani menjadi *alaqah* yakni sesuatu yang berdempet di dinding rahim kemudian *alaqah* itu mengalami proses menjadi *mudhghah* yakni berupa sekerat daging kecil sebesar apa yang dapat dikunyah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa ada *mudhghah* yang sempurna kejadiannya sehingga dapat berproses sampai lahir manusia sempurna, dan ada juga yang tidak sempurna kejadiannya. Makna ayat ini memberikan penjelasan bahwa dalam penciptaan manusia akan ada yang mengalami proses penciptaan yang tidak sempurna. Sebagaimana kehamilan yang berlangsung dengan normal (selama sembilan bulan) dan diharapkan lahir normal, sehat sempurna fisiknya. Atas kehendak Allah Swt. kehamilan bisa berlangsung sebelum sampai pada usia sembilan bulan melainkan kurang ataupun lebih, lahir dengan sehat atau gugur sebelum dilahirkan.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan ibu hamil dengan abortus ialah (Qs.Al-Anfal/ 8: 27)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu” (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2004).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman diingatkan agar tidak mengabaikan perintah, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan juga jangan mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW atas amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu seperti halnya yang diberikan amanat atau kepercayaan untuk hamil, berarti Allah menitipkan kepercayaan kepadanya dan merasa aman bahwa sesuatu yang dititipkan itu akan dipelihara olehnya dengan baik. Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah Swt. Termasuk keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya. Dalam ayat ini pula ditegaskan bahwa siapa yang mengkhianati amanat berarti mengkhianati Allah dan Rasulnya dan sama halnya mengkhianati dirinya sendiri.

Setelah ayat yang lalu menyebut aneka nikmat dan ditutup dengan kewajiban mensyukurinya, di sini orang-orang yang beriman diingatkan agar tidak mengabaikan perintah bersyukur itu dengan menegaskan bahwa: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati yakni mengurangi sedikitpun hak, Allah sehingga mengkhianati-Nya atau tidak mensyukuri-Nya dan jangan mengkhianati Rasulullah Muhammad swa. Tetapi perkenankanlah serunya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, oleh siapa pun, baik amanat itu amanat orang lain maupun keluarga seperti istri dan anak, muslim ataupun nonmuslim, sedang kamu mengetahui (Tafsir Al-Misbah, 2009:508).

Dalam proses kehamilan hendaklah orang tua dapat menjaga calon anak mereka dengan sebaik-baiknya sebab anak merupakan titipan dari Allah untuk di rawat dan di jaga dengan sepenuh hati.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Anfaal/ 8:28.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“...dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”

Ayat ini juga menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah suatu ujian dan cobaan, manusia diingatkan jangan sampai lemah dalam menghadapi ujian itu dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad dan tanggung jawab dan amanat. Mengabaikan hal ini adalah hianat kepada Allah dan rasul serta khianat terhadap diri sendiri, peringatan itu disertai dengan mengingatkan bahwa disisi Allah terdapat ganjaran yang besar lebih besar dari pada harta benda dan anak-anak. Karena itu, jangan sampai anak dan harta menjadikan kamu melanggar sehingga kamu mendapat siksa maka bersyukur dan berserah dirilah kepada Allah karena sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar (Tafsir Al-Misbah, 2009:508).

QS.Al-Furqan/25: 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Terjemahannya :

“...dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2004).

Setelah menyebut sifat-sifat terpuji mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ketaatan serta sikap moderasi mereka, kini diuraikan keterhindaran mereka dari pokok-pokok kedurhakaan. Ayat di atas menggambarkan sifat *Ibad ar-Rahman* yang kelima, memurnikan Tauhid, serta yang keenam, yaitu tidak melakukan penganiayaan yang berupa pembunuhan dengan mencabut jiwa manusia, serta yang ketujuh tidak juga membunuh secara moral dengan melakukan perzinahan dan pelecehan seksual tetapi mereka mencukupkan diri dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui pernikahan yang sah semata-mata.

Ayat di atas mengatakan: Dan, di samping sifat-sifat terpuji yang di sandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercelah. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan Tauhid, yang tidak menyembah dan bermohon kepada tuhan yang lain bersama Allah dan di samping itu mereka juga tidak membunuh jiwa manusia yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan haq, yakni sebab yang dibenarkan Allah, misalnya dalam bentuk membela nyawa, qishash, atau peperangan menegakkan kebenaran, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa yang sangat jauh keburukannya itu, niscaya dia menemukan balasan dosa-Nya. Balasan yang diterimanya itu berupa dilipatgandakan untuknya siksa pada Hari Kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya, yakni dalam siksa itu, dalam keadaan terhina (Tafsir Al-Misbah, 2009:153).

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN
ABORTUS INKOMPLIT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TGL 26 APRIL 2017

No Registrasi : 469xxx
Tanggal Masuk : 26 April 2017, jam 13:00 wita
Tanggal pengkajian : 26 April 2017, jam 13:30 wita
Pengkaji : Saras Yulistina Harju

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”J” / Tn”H”
Umur : 37 tahun/ 38 tahun
Nikah/lamanya : 1 kali / 15 tahun
Suku : Makassar/ Bugis
Agama : Islam/ Islam
Pendidikan : SMA/ SD
Pekerjaan : IRT/ Buruh Harian
Alamat : jl.Syekh Yusuf

B. Data Biologis Fisiologis

1. Keluhan Utama : keluar darah dari jalan lahir.
2. Riwayat keluhan utama
 - a. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 1 minggu yang lalu yakni tanggal 19 april 2017, awalnya sedikit kemudian keluar gumpalan dan terus keluar darah sedikit sampai hari ini pada tanggal 26 april 2017.
 - b. Lokasi keluhan perut bagian bawah
 - c. Tidak ada riwayat hubungan seksual sebelum terjadi perdarahan.
 - d. Ibu mengatakan tidak pernah terjatuh atau mengangkat beban terlalu berat
 - e. Ibu mengatakan tidak pernah meminum obat-obatan atau jamu yang dapat membahayakan janin

C. Riwayat Kesehatan yang lalu

1. Tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun
2. Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, paru-paru, diabetes militus (DM) dan hipertensi.
3. Tidak ada riwayat alergi terhadap makanan dan obat-obatan
4. Tidak ada riwayat ketergantungan obat-obat terlarang, alkohol ataupun rokok.

D. Riwayat Reproduksi

1. Riwayat haid
 - a. Menarche : 13 tahun
 - b. Lamanya : 5-7 hari
 - c. Siklus : 28-30 hari

- d. Tidak ada disminorhea
2. Riwayat kehamilan sekarang
- a. GV PIV Ao
- b. Ibu mengatakan ini kehamilannya yang kelima dan tidak pernah keguguran.
- c. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir pada tanggal 02 januari 2017
- d. Ibu mengatakan tidak pernah ke dukun.
- e. Ibu mengatakan sering bekerja berat.
- f. Ibu mengatakan keguguran setelah melakukan perjalanan jauh naik motor selama kurang lebih 4 jam
- g. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Tabel 3.1.Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu.

Kehamilan	Persalinan						Nifas	
	Anak ke (Gravid)	Tahun Lahir	JK	BBL	Proses	Tempat Persalinan	Penolong	Kondisi
I	2002	L	2.800gr	Normal	BPS	Bidan	Hidup	±1 thn
II	2006	P	3.200gr	Normal	BPS	Bidan	Hidup	±9 bln
III	2010	P	2.900gr	Normal	Puskesmas	Bidan	Hidup	±1 thn
IV	2016	L	3.000gr	Normal	Puskesmas	Bidan	Hidup	±6 bln
V	2017	Kehamilan sekarang (Abortus)						

3. Riwayat ginekologi

Ibu tidak pernah menderita penyakit PMS (penyakit menular seksual), dan tumor.

4. Riwayat keluarga berencana (KB)

Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan selama 6 bulan.

E. Riwayat Sosial Ekonomi

1. Ibu mengatakan ini pernikahannya yang pertama dengan suaminya yang sekarang.
2. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.

F. Riwayat Psikososial

1. Ekspresi wajah nampak cemas
2. Klien menanyakan mengenai keadaannya.
3. Klien dan keluarga ingin cepat ditolong dan cepat sembuh

G. Riwayat Spiritual

1. Ibu dan keluarga beribadah kepada Allah SWT
2. Ibu banyak berdo'a untuk keselamatan dirinya.

H. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Kebutuhan nutrisi
 - a. Menu makanan sehari-hari nasi dan lauk pauk
 - b. Frekuensi 3x sehari
 - c. Nafsu makan baik
 - d. Kebutuhan minum 6-7 gelas/ hari.

2. Kebutuhan Eliminasi
 - a. Buang air kecil (BAK)
 - 1) Warna kuning jernih
 - 2) Bau amoniak
 - b. Buang air besar (BAB)
 - 1) Frekuensi 1x sehari
 - 2) Konsistensi padat
3. Personal hygiene
 - a. Mandi 2x sehari dengan menggunakan sabun mandi
 - b. Sikat gigi 2x sehari
 - c. Keramas 3x seminggu
 - d. Mengganti pakaian tiap habis mandi
4. Ibu tidak dapat istirahat/tidur dengan baik karena mengeluh nyeri pada perut bagian bawah.

I. Pemeriksaan Fisik

1. Pemeriksaan secara umum
 - a. Klien tampak lemah, kesadaran komposmentis
 - b. Tanda-tanda vital (TTV)
 - 1) Tekanan darah (TD) : 100/70 mmHg
 - 2) Suhu (S) : 36,7°C
 - 3) Nadi (N) : 82x/ menit
 - 4) Pernapasan (P) : 22x/menit

2. Pemeriksaan khusus

- a. Kepala: rambut bersih, gelombang, ada rontok dan tidak ada massa,benjolan dan nyeri tekan.
- b. Wajah: tidak ada oedema dan kloasma
- c. Mata: kongjungtiva pucat dan sklera putih
- d. Telinga: tidak ada serumen
- e. Hidung: tidak ada polip
- f. Mulut dan gigi: bibir pucat, tidak ada sariawan, mulut dan gigi bersih.
- g. Leher: tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.
- h. Dada: payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hiperpigmentasi pada areola mammae, dan tidak ada massa benjolan dan nyeri tekan.
- i. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, tinggi fundus uteri pertengahan simpisis pusat.
- j. Ekstremitas: simetris kiri dan kanan, tidak ada varices dan tidak ada oedema.
- k. Genetalia: tidak ada varices, tidak ada kelainan pada vulva, nampak pengeluaran darah dari vagina.

Pemeriksaan *Vagina toucher* (VT) tanggal 26 april 2017, pukul 13:30 wita oleh dr”F”

- 1) Keadaan vulva dan vagina :tidak ada kelainan
- 2) Portio : lunak, tebal

3) Ostium uteri eksterna/ostium uteri interna (OUE/OUI) : terbuka 2cm

4) Uterus : retrofleksi

5) Pelepasan : darah

3. Pemeriksaan penunjang

a. Pemeriksaan Laboratorium tgl 26 april 2017

1) Hemoglobina : 11,5 gr%

2) Leukosit : 6.500/mm³

3) Eritrosit : 81,6 juta

4) Hematokrit : 37,7%

5) Trombosit : 255.000/mm³

6) Plano test : positif (+)

b. Pemeriksaan ultrasonografi (USG), pukul 13:45 wita

Hasil USG: kesan sangat mungkin abortus inkomplit

LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : G_v P_{IV} A₀ Gestasi 16 minggu 2 hari, Abortus Inkomplit,

Masalah aktual : Nyeri perut bagian bawah.

A. G_v P_{IV}A₀

1. Data subjektif

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilannya yang kelima

2. Data objektif

a. Tampak linea nigra

b. Tonus otot perut tampak tegang

3. Analisi dan interpretasi data

Pada usia kehamilan 16 minggu uterus membesar setinggi simfisis dan janin berukuran 15 cm. ini merupakan awal di trimester ke-2. Kulit janin masih transparan, telah mulai tumbuh lanugo (rambut janin). Janin bergerak aktif, yaitu menghisap dan menelan air ketuban. Telah terbentuk mekonium (feses) dalam usus. Jantung berdenyut 120-150 x/menit (Sarwono,2014: 158).

B. Gestasi 16 minggu 2 hari

1. Data subjektif

Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir (HPHT) tanggal 02 januari 2017

2. Data objektif

a. Hari tafsiran pesalinan (HTP) tanggal 09 oktober 2017

b. pengkajian tanggal 26 april 2017

3. Analisis dan interpretasi data

Dari HPHT tanggal 02 januari 2017 sampai tanggal 26 april 2017 maka umur kehamilan diperoleh 16 minggu 2 hari.

C. Abortus inkomplit

1. Data subjektif

Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 1 minggu yang lalu yakni tanggal 19 april 2017, awalnya sedikit kemudian keluar gumpalan dan terus keluar darah sedikit sampai hari ini pada tanggal 26 april 2017.

2. Data objektif

- a. Tampak pengeluaran darah dari vagina
- b. Adanya nyeri perut bagian bawah
- c. Pada pemeriksaan dalam dapat di raba sisa jaringan dalam kanalis servikalis
- d. Pemeriksaan obstetrik TFU pertengahan simpisis pusat
- e. Pemeriksaan plano test positif
- f. Hasil USG di dapatkan hasil kesan sisa jaringan
- g. Hasil pemeriksaan VT tanggal 26 april 2017, pukul 13: 30 wita oleh dr”F”
 - 1) Keadaan vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - 2) Portio : lunak, tebal
 - 3) OUE/OUI : terbuka 2cm
 - 4) Uterus : retrofleksi
 - 5) Pelepasan : darah

3. Analisis dan interpretasi data

Abortus inkomplit di diagnosa apabila sebagian dari hasil konsepsi telah lahir atau teraba pada vagina, tetapi sebagian tertinggal (biasanya jaringan plasenta) masih tertinggal dalam rahim. Perdarahan terus berlangsung banyak, dan membahayakan ibu (Feryanto, 2014: 41-42).

D. Nyeri perut bagian bawah

1. Data subjektif

Klien mengeluh nyeri perut bagian bawah

2. Data objektif

Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna kehitaman.

3. Analisa dan interpretasi data

Pada abortus inkomplit sering serviks terbuka karena masih ada benda di dalam rahim yang dianggap sebagai benda asing (*corpus alienum*). Oleh karena itu, uterus akan berusaha mengeluarkannya dengan mengadakan kontraksi sehingga ibu merasakan nyeri (Feryanto, 2014: 42).

LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL

A. Antisipasi terjadi infeksi pada jalan lahir

1. Data subjektif

- a. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 1 minggu yang lalu yakni tanggal 19 april 2017, awalnya sedikit kemudian keluar gumpalan dan terus keluar darah sedikit sampai hari ini pada tanggal 26 april 2017.
- b. Ibu mengeluh sakit perut bagian bawah.

2. Data objektif

- a. Keadaan umum ibu lemah
- b. Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna kehitaman.
- c. TTV

- 1) TD : 100/70 mmhg
- 2) S : 36,7⁰C
- 3) N : 82x/ menit
- 4) P : 22x/menit

3. Analisis dan interpretasi data

Terbukanya jalan lahir dan adanya perdarahan merupakan media perkembangannya mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi. Infeksi dalam uterus dan sekitarnya dapat terjadi disetiap abortus tetapi biasanya ditemukan pada abortus inkomplit dan lebih sering pada abortus buatan yang dikerjakan tanpa memperhatikan aseptisi dan antisepsis (Irianti Bayu dkk, 2014: 77).

B. Antisipasi terjadi Anemia

1. Data subjektif

c. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 1 minggu yang lalu yakni tanggal 19 april 2017, awalnya sedikit kemudian keluar gumpalan dan terus keluar darah sedikit sampai hari ini pada tanggal 26 april 2017.

2. Data objektif

a. Keadaan umum ibu lemah

b. Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna hitam.

c. TTV

1) TD : 100/70 mmhg

2) S : 36,7°C

3) N : 82x/ menit

4) P : 22x/menit

3. Analisis dan interpretasi data

Anemia pada abortus biasa terjadi karena perdarahan (Irianti Bayu dkk, 2014:78).

LANGKAH IV: TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

A. Kolaborasi dengan dokter untuk tindakan selanjutnya

1. Penatalaksanaan pemberian cairan infus ringer laktat (RL), drips oxytocin 20 IU unit dalam 500 cc, dengan 28 tetes/menit.
2. Rencana kuret tanggal 27 april 2017, pukul 11:00 wita

B. Penataklasaan pemberian obat

1. Antibiotik (ceftriaxone IV/12 jam).
2. Analgetik (Asam Mefenamat 3x1).
3. Penambah darah (SF 1x1).
4. Misoprostol 2 tablet/vagina

LANGKAH V: RENCANA/INTERVENSI

A. Diagnosa : GV PIV Ao, gestasi 16 minggu 2 hari, Abortus Inkomplit

B. Masalah aktual : Nyeri perut bagian bawah

C. Masalah potensial :

1. Antisipasi terjadinya infeksi jalan lahir
2. Antisipasi terjadinya anemia

D. Tujuan:

1. Abortus inkomplit dapat teratasi
2. Nyeri perut dapat teratasi

3. Keadaan ibu baik
4. Infeksi tidak terjadi
5. Anemia tidak terjadi

E. Kriteria:

1. Perdarahan pervaginam berhenti
2. Ibu tidak mengeluh nyeri dan tidak ada nyeri tekan pada perut
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
 - a) TD : sistole 90-120 mmHg, diastole 60-90 mmHg
 - b) N : 60-90 kali/ menit
 - c) S : 36,5-37,5^oc
 - d) P : 16-24 kali/ menit

F. Rencana tindakan :

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya
Rasional: dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, ibu dapat mengerti tentang keadaannya dan dapat mengurangi kecemasan ibu.
2. Observasi tanda-tanda vital setiap 1 jam
Rasional: tanda-tanda vital merupakan indikator dari keadaan umum klien dan menentukan intervensi selanjutnya.
3. Beri informasi kepada klien tentang penyebab perdarahan
Rasional: agar ibu mengerti tentang keadaannya sekarang

4. Jelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan kuret, jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 27 April 2017, pukul 11:00 wita.

Rasional: dengan penjelasan kepada klien/keluarganya diharapkan dapat menyetujui rencana tindakan kuret dan ibu dapat menyiapkan fisik dan psikis.

5. Informed consent untuk pelaksanaan tindakan kuretase

Rasional: sebagai pernyataan persetujuan dari ibu/keluarga untuk tindakan dan sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan bidan dalam melakukan tindakan.

6. Anjurkan ibu untuk istirahat.

7. Persiapan pelaksanaan tindakan kuretase

Rasional: dengan persiapan yang dilakukan yakni dengan persiapan alat, penolong dan persiapan pasien maka akan memudahkan dalam melakukan prosedur kerja sesuai dengan protap.

8. Kaji tingkat nyeri

Rasional: mengkaji tingkat nyeri dapat membantu menentukan tindakan selanjutnya.

9. Berikan penjelasan tentang penyebab nyeri pada perut bagian bawah yang dirasakan oleh ibu.

Rasional: agar ibu dapat mengerti bahwa nyeri yang dirasakan akibat dari kontraksi uterus sehingga ibu dapat menerima keadaannya sebagai hal yang fisiologis.

10. Bantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien

Rasional: mengatur posisi yang diinginkan akan memberikan rasa nyaman pada ibu.

11. Anjurkan teknik relaksasi jika timbul rasa nyeri

Rasional: teknik relaksasi merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan perhatian klien terhadap nyeri yang dirasakan dan meningkatkan suplai oksigen yang masuk kedalam tubuh diteruskan ke otak yang akan menghambat/ mengurangi rangsangan nyeri yang timbul.

12. Beri kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya.

Rasional: dengan mengungkapkan perasaannya dan mendengarkan keluhannya klien akan merasa diperhatikan sehingga ia akan lebih tenang .

13. Beri dorongan spiritual kepada ibu

Rasional: dengan dorongan spiritual memberikan ketenangan hati bahwa segala tindakan yang diberikan untuk proses penyembuhan dan tetap berdoa kepada yang maha kuasa.

14. Libatkan orang terdekat klien selama perawatan

Rasional: klien akan merasa nyaman dan aman bila didampingi oleh orang terdekatnya khususnya suami.

15. Anjurkan pada ibu untuk meningkatkan kebersihan diri dengan dengan mengganti doek atau pembalut setiap kali basa.

Rasional: dengan menjaga kebersihan diri akan memberi rasa nyaman dan mencegah berkembangnya kuman pathogen penyebab infeksi.

16. Bekerja secara septik dan antiseptik selama melakukan perawatan pada klien.

Rasional: untuk mencegah infeksi silang/kontaminasi dengan benda-benda tidak steril.

17. Penatalaksanaan pemberian obat analgetik dan antibiotik

Rasional: analgetik (asam mefenamat 3x1) akan membantu mengurangi rasa nyeri yang dirasakan ibu dan antibiotic (ceftriaxone IV/12 jam) akan membantu mencegah terjadinya infeksi.

LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya.

Hasil: ibu memahami dan mengerti dengan keadaanya.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

a. TD : 100/70 mmhg

b. S : 36,7⁰C

c. N : 82x/ menit

d. P : 22x/menit

3. Memberikan informasi kepada klien tentang penyebab pendarahan

Hasil: klien mengerti dengan apa yang diinformasikan

4. Menjelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan kuret jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 27 April 2017, pukul 11:00 wita.

Hasil: ibu/keluarga mengerti dan setuju, maka akan dilakukan tindakan kuretase.

5. Informed consent untuk pelaksanaan tindakan kuretase.

Hasil: suami setuju dan telah menandatangani persetujuan tindakan kuret, rencana kuret tanggal 27 April 2017, pukul 11:00 wita.

6. Menganjurkan ibu untuk istirahat sebelum dikuret

Hasil: ibu mengerti dan melakukannya.

7. Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretasi yakni berupa persiapan alat, penolong dan persiapan pasien

a) Persiapan alat kuret

- 1) Handscoon 2 pasang
- 2) Kain kasa secukupnya
- 3) Duk steril 1 buah
- 4) Kateter 1 buah
- 5) Spekulum anterior dan posterior
- 6) Tampongtan
- 7) Tenakulum
- 8) Sonde uterus
- 9) Abortus tang
- 10) Kuret tajam dan kuret tumpul
- 11) Kapas DTT
- 12) Larutan betadin

b) Persiapan penolong

- 1) Masker
- 2) Celemek
- 3) Kacamata
- 4) Tutup kepala
- 5) Sepatu boot

c) Persiapan alat dan bahan lain :

- 1) Tempat darah
- 2) Tempat sampah
- 3) Larutan klorin
- 4) Lampu sorot
- 5) Tabung oksigen

d) Persiapan pasien

Hasil: persiapan kuret telah dilaksanakan

8. Memberikan penjelasan tentang penyebab nyeri pada perut bagian bawah yang dirasakan oleh ibu

Hasil: ibu mengerti dengan keadaanya sekarang

9. Membantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien

Hasil: ibu merasa nyaman dengan posisinya sekarang

10. Mengajarkan teknik relaksasi bila timbul rasa nyeri

Hasil: ibu melakukan tehnik relaksasi dengan menarik nafas dalam melalui hidung dan menghembuskan secara perlahan-lahan lewat mulut.

11. Memberi kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya
Hasil: ibu merasa tenang telah mengungkapkan perasaannya
12. Memberikan dorongan spiritual kepada ibu
Hasil: ibu mengerti dan tampak mulai berdoa
13. Melibatkan orang terdekat klien selama perawatan
Hasil: klien didampingi oleh suami
14. Menganjurkan pada ibu untuk meningkatkan kebersihan diri dengan mengganti doek atau pembalut setiap kali basah.
Hasil: ibu mengerti dan melakukannya
15. Bekerja secara septic selama melakukan perawatan pada klien
16. Penatalaksanaan pemberian obat analgetik dan antibiotik
Hasil:
 - a. Ceftriaxone IV/12 jam
 - b. Asam mefenamat 3x1
 - c. SF 1x1

LANGKAH VII : EVALUASI

1. Nyeri perut bagian bawah telah teratasi
 - a. Ibu mengatakan sudah tidak ada nyeri perut
 - b. Ekspresi wajah ibu tidak meringis bila bergerak
2. Abortus inkomplit teratasi ditandai dengan
 - a. Telah dilakukan tindakan kuretase
 - b. Perdarahan pervaginam berkurang

3. Keadaan ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal

a. TD : 100/ 70 mmHg

b. P : 20x/ menit

c. N : 76x/ menit

d. S : 36,6°c

4. Infeksi jalan lahir belum dapat diintervensi

5. Anemia tidak terjadi ditandai dengan

a. Kesadaran komposmentis

b. TTV dalam batas normal

1) TD : 100/ 70 mmHg

2) P : 20x/ menit

3) N : 76x/ menit

4) S : 36,6°c

c. Hemoglobin (Hb) 11,5 gr%

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN
ABORTUS INKOMPLIT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TGL 27 APRIL 2017

No Registrasi : 469xxx
Tanggal Masuk : 26 April 2017, jam 13: 00 wita
Tanggal pengkajian : 27 April 2017, jam 07: 00 wita
Pengkaji : Saras Yulistina Harju

Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”J” / Tn”H”
Umur : 37 tahun/ 38 tahun
Nikah/lamanya : 1 kali / 15 tahun
Suku : Makassar/ Bugis
Agama : Islam/ Islam
Pendidikan : SMA/ SD
Pekerjaan : IRT/ Buruh Harian
Alamat : Katangka

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan ini kehamilannya yang kelima
2. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 02 januari 2017

3. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 1 minggu yang lalu yakni awalnya sedikit kemudian keluar gumpalan dan terus keluar darah sedikit sampai hari ini pada tanggal 26 april 2017.
4. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah
5. Keluhan yang dirasakan sangat mengganggu aktivitas sehingga ibu takut bergerak banyak.

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. HTP tanggal 09 oktober 2017
2. Ibu Nampak lemah
3. Tampak ekspresi wajah ibu meringis
4. Nyeri tekan pada daerah simpisis
5. Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna hitam dan bergumpal.
6. Tanda-tanda vital
 - a. TD : 100/70 mmHg
 - b. S : 36,7⁰C
 - c. N : 80x/ menit
 - d. P : 20x/menit
7. Hasil pemeriksaan VT tanggal 26 april 2017, pukul 13: 30 wita oleh dr"”F””
 - a. Keadaan vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - b. Portio : lunak, tebal
 - c. Uterus : retrofleksi

- d. OUE/OUI : terbuka 2cm
- e. Pelepasan : darah

7. Pemeriksaan Laboratorium tgl 26 april 2017

- a. Hb : 11,5 gr%
- b. Leukosit : 6.500 mm³
- c. Eritrosit : 81,5 juta
- d. Hematokrit : 37,7 %
- e. Trombosit : 255.000 mm³
- f. Plano test : positif (+)

8. Pemeriksaan penunjang

USG : kesan sangat mungkin abortus inkomplit

C. ASSESMENT (A)

GVPIVA0 Gestasi 16 minggu 2 hari, Abortus Inkomplit, masalah nyeri perut bagian bawah

D. PLANNING (P)

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: ibu mengerti tentang apa yang disampaikan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil:

- a. TD : 100/70 mmHg
- b. P : 22x/menit

c. N : 82x/menit

d. S : 36,7⁰C

3. Menjelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan kuret jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 27 April 2017 jam 11:00 wita.
4. Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretase yakni berupa persiapan alat, penolong dan persiapan pasien
 - a. Persiapan alat kuret
 - 1) Handscoon 2 pasang
 - 2) Kain kasa secukupnya
 - 3) Duk steril 1 buah
 - 4) Kateter 1 buah
 - 5) Speculum anterior dan posterior
 - 6) Tampongtan
 - 7) Tenakulum
 - 8) Sonde uterus
 - 9) Abortus tang
 - 10) Kuret tajam dan kuret tumpul
 - 11) Kapas deteksi tingkat tinggi (DTT)
 - 12) Larutan betadin

- b. Persiapan penolong
 - 1) Masker
 - 2) Celemek
 - 3) Kacamata
 - 4) Tutup kepala
 - 5) Sepatu boot
 - c. Persiapan alat dan bahan lain
 - 1) Tempat darah
 - 2) Tempat sampah
 - 3) Larutan klorin
 - 4) Lampu sorot
 - 5) Tabung oksigen
 - d. Persiapan pasien: klien dianjurkan untuk istirahat dan berpuasa.
5. Membantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien
Mengajarkan teknik relaksasi bila timbul rasa nyeri
 6. Memberi kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya
 7. Memberi dorongan spiritual kepada ibu
 8. Melibatkan orang terdekat klien selama perawatan
 9. Menganjurkan pada ibu untuk meningkatkan kebersihan diri dengan mengganti doek/pembalut setiap kali basah
 10. Bekerja secara septik dan antiseptik selama melakukan perawatan pada klien
 11. Penatalaksanaan pemberian obat analgetik, antibiotic dan penambah darah.

Hasil:

- a. Ceftriaxone IV/12 jam
- b. Asam Mefenamat 3x1 sehari
- c. SF 1x1 sehari



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL DENGAN
ABORTUS INKOMPLIK DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TGL 27 APRIL 2017

No Registrasi : XXXXoooo
Tanggal Masuk : 26 April 2017, jam 13:00 wita
Tanggal pengkajian : 27 April 2017, jam 13:00 wita
Pengkaji : Saras Yulistina Harju

Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”J” / Tn”H”
Umur : 37 tahun/ 38 tahun
Nikah/lamanya : 1 kali / 15 tahun
Suku : Makassar/ Bugis
Agama : Islam/ Islam
Pendidikan : SMA/ SD
Pekerjaan : IRT/ Buruh Harian
Alamat : Jl.Syekh Yusuf

A. DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan bahwa keadaannya mulai membaik
2. Ibu merasa masih ada sedikit darah yang keluar dari jalan lahir dan nyeri perut sudah tidak terasa
3. Klien bisa beristirahat dengan baik.

B. DATA OBJEKTIF

1. Post kuret abortus inkomplit tanggal 27 April 2017 (2 jam lalu)
2. Ekspresi wajah tampak tenang dan cerah
3. Keadaan umum ibu baik
 - a) TD : 110/70 mmHg
 - b) N : 80x/menit
 - c) S : 36,8⁰C
 - d) P : 22x/menit
4. Tampak masih ada sedikit pengeluaran darah dari vagina
5. Masih ada sedikit nyeri tekan pada perut bagian bawah.
6. Pemberian obat-obat dilanjutkan berdasarkan instruksi dokter
 - a) Antibiotik (cefadroxil 2x1).
 - b) Analgetik (asam mefenamat 2x1).
 - c) Penambah darah (SF 1x1).

C. ASSESMENT (A)

Post kuret abortus inkomplit 2 jam lalu dengan nyeri perut bagian bawah

D. PLANNING (P)

1. Menganjurkan pada ibu untuk istirahat yang banyak
Hasil: ibu bersedia melakukannya
2. Menganjurkan pada ibu untuk menjaga kebersihannya
Hasil: ibu bersedia tetap menjaga kebersihannya
3. Menganjurkan pada ibu untuk makan-makanan yang bergizi
Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

4. Observasi perdarahan dan TTV

a) Tampak pengeluaran darah sedikit

b) TTV

1) TD : 110/70 mmHg

2) N : 80x/menit

3) P : 22x/menit

4) S : 36,8⁰C

5. Mengingatkan pada ibu untuk teratur minum obat.

a) Cefadroksil 2x1

b) Asam mefenamat 3x1

c) Sf 1x1

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa selama 2 hari asuhan di ruangan antenatal care (ANC) dan ruangan postnatal care (PNC) dan dilakukan pemantauan dimulai tanggal 26 sampai dengan 27 april 2017.

Penulis akan menguraikan berdasarkan SOAP dan langkah Varney. Bab ini, penulis akan membandingkan antara tinjauan kasus pada Ny”J” dengan Abotus Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan teori tentang penanganan Abortus Inkomplit.

Pembahasan ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah, yaitu pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Langkah-langkah Penatalaksanaan Menurut Varney Yaitu:

1. Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan

wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Nuurhayati dkk, 2013).

Tahap ini dilakukan Identifikasi data dasar (pengkajian) merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis yang meliputi biodata bertujuan memperjelas identitas pasien, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan sekarang dan riwayat psikososial untuk mendapatkan informasi tentang keluhan-keluhan yang biasa dialami oleh ibu dan kekhawatiran khusus yang muncul akibat adanya perubahan psikologis maupun psikologi.

Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital juga pemeriksaan khusus yang meliputi pemeriksaan inspeksi untuk mengamati penampilan ibu, emosi serta sikap. Palpasi yaitu pemeriksaan dengan meraba. Auskultasi bertujuan untuk mengetahui usia kehamilan, keadaan janin dalam kandungan, dan mendorong menentukan posisi anak.

Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium dan USG. Pengkajian pada kasus ini maka dilanjutkan dengan perencanaan kuretase. Pada tahap ini disebabkan karena respon ibu dalam memberikan informasi begitu pula dengan keluarga, bidan dan dokter yang merawat sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh secara terfokus pada masalah klien sehingga intervensinya juga lebih terfokus sesuai keadaan klien.

Ny "J", usia 37 tahun, GVIIVAO, datang kerumah sakit dengan keluhan ada pengeluaran darah sejak 1 minggu yang lalu yakni dari tanggal 19 april 2017,

awalnya sedikit kemudian keluar gumpalan dan terus keluar darah sedikit sampai hari ini pada tanggal 26 april 2017 yang disertai dengan nyeri perut bagian bawah.

Dalam tinjauan pustaka dikemukakan gejala atau tanda abortus inkomplit berupa adanya riwayat amenorhea, perdarahan dari jalan lahir yang awalnya keluar gumpalan dan terus keluar darah sampai hari ini, serta terdapat nyeri perut bagian bawah. Pada pemeriksaan dalam akan didapati pembukaan serviks dan kadang-kadang dapat diraba sisa-sisa jaringan dalam kanalis servikalis.

Berdasarkan studi kasus pada Ny"J" maka data yang diperoleh dari hasil pengkajian atau anamnesa pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum lemah, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 82x/menit, pernapasan 22x/menit, dan suhu 36,7°C. Ekspresi wajah tampak cemas, pucat dan meringis menahan sakit serta tidak ada oedema dan pembengkakan pada wajah, kedua konjungtiva mata tidak anemis, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis, payudara tampak simetris, hiperpigmentasi pada areola mammae.

HPHT tanggal 02 januari 2017 dengan usia kehamilan 16 minggu 2 hari, perdarahan awalnya sedikit kemudian keluar gumpalan dan terus keluar darah sampai hari ini berwarna merah kehitaman, nyeri perut bagian bawah pada pemeriksaan laboratorium didapatkan pemeriksaan darah rutin yang normal yaitu hemoglobin 11,5 gr%, leukosit 6.500/mm³, eritrosit 81,6 juta, hematocrit 37,7%, trombosit 255.000/mm³, plano test positif dan pada pemeriksaan obstetrik TFU pertengahan simpisis pusat, serta pada pemeriksaan dalam terdapat pembukaan 2 cm dan sisa-sisa

jaringan dapat diraba dalam kanalis servikalis atau kavum uteri dan pada pemeriksaan USG didapatkan kesan sisa jaringan.

Pasien tidak pernah memeriksakan kehamilan selama hamil, pasien tidak mengetahui bahwa dirinya sedang hamil sehingga tidak lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Pasien tidak pernah mengalami trauma selama hamil, pasien tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, asma jantung dan diabetes, riwayat mengonsumsi obat-obatan selama hamil. Selama hamil, nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, istirahat cukup, aktivitas pasien tetap melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tetapi selalu melakukan perjalanan jauh naik motor bersama suaminya dikarenakan kepentingan acara keluarga sehingga ibu kelelahan dan kurang waktu untuk istirahat, pasien tidak ada riwayat hubungan seksual sebelum terjadi perdarahan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus abortus inkomplit. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

2. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik (Nurhayati dkk, 2013).

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam

langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah. Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien.

Hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis abortus inkomplit. Pasien datang dengan keluhan keluar darah bergumpal dan berwarna merah kehitaman dan terus keluar darah sampai hari ini serta nyeri perut bagian bawah, pada pemeriksaan laboratorium didapatkan plano test positif dan pada pemeriksaan obstetrik TFU teraba pertengahan simpisis pusat, serta pada pemeriksaan dalam terdapat pembukaan 2 cm dan sisa-sisa jaringan dapat diraba dalam kanalis servikalis atau kavum uteri dan pada pemeriksaan USG didapatkan kesan sisa jaringan.

Hal tersebut sesuai dengan teori kasus abortus inkomplit merupakan perdarahan dari uterus pada kehamilan kurang dari 20 minggu disertai keluarnya sebagian hasil konsepsi (sebagian tertinggal dalam uterus). Pada tinjauan pustaka, diagnosa abortus inkomplit dapat ditegakkan apabila ditemukan ada riwayat amenorhea, terjadinya perdarahan melalui jalan lahir sampai keadaan anemis, dapat terjadi infeksi ditandai dengan suhu tinggi, perdarahan disertai nyeri perut bagian bawah diikuti dengan pengeluaran hasil konsepsi dan pada pemeriksaan plano test didapatkan hasil positif, kemudian pada pemeriksaan ginekologi didapatkan serviks terbuka, dapat diraba jaringan di kanalis servikalis (Yulaikhah, 2015: 76-77).

Pada Ny”J” dengan diagnosa abortus inkomplit, Kehamilan 16 Minggu 2 Hari dengan masalah aktual adalah nyeri perut bagian bawah disebabkan karena sisa jaringan yang tertinggal dalam uterus, menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan isinya. Hal inilah yang menyebabkan nyeri perut bagian bawah.

Berdasarkan uraian diatas maka diagnosis pada kasus tersebut adalah GVPIVA0, gestasi 16 minggu 2 hari, dengan abortus inkomplit. Demikian penerapan tinjauan pustaka dan kasus pada Ny “J” secara garis besar tampak adanya persamaan antara teori dengan diagnosis aktual yang ditegakkan sehingga memudahkan memberikan tindakan selajutnya.

3. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Mangkuji dkk, 2013). Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Kondisi pasien saat ini dengan nyeri perut bagian bawah, Pemeriksaan dalam tidak ada kelainan, pembukaan 2 cm dan ada pelepasan darah. Pasien berpotensi terjadi anemia jika tidak segera ditangani dan infeksi. Pasien dengan abortus harus segera diberi tahu. Sikap dan empati yang ditunjukkan oleh bidan dan dokter akan memberi pengaruh psikologis ibu dan keluarga.

Adapun kriteria anemia pada laki-laki dewasa dengan kadar Hb <13g/dl, wanita dewasa yang tidak hamil dengan kadar Hb <12 g/dl, wanita hamil dengan kadar Hb <11g/dl, anak umur 6-14 tahun dengan kadar Hb <12 g/dl dan anak umur 6 bulan-6 tahun dengan kadar Hb <11 g/dl. Berdasarkan kadar Hb pembagian anemia pada ibu hamil yaitu: anemia ringan Hb 9-10 gr%, anemia sedang Hb 7-8 gr%, anemia berat Hb < 7 gr% (Jannah,2012: 190).

Terbukanya jalan lahir dan adanya perdarahan merupakan media perkembangannya mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi dalam uterus dan sekitarnya dapat terjadi disetiap abortus tetapi biasanya ditemukan pada abortus inkomplit dan lebih sering pada abortus buatan yang dikerjakan tanpa memperhatikan asepsis dan antisepsis (Irianti Bayu dkk, 2014: 77).

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa pada kasus Ny"J" dengan diagnosa abortus inkomplit masalah potensial yang dapat terjadi adalah potensial infeksi jalan lahir. Data yang mendukung yaitu pada pemeriksaan dalam ostium uteri terbuka satu jari longgar, ada teraba sisa jaringan atau darah yang tertinggal.

Pada kasus Ny"J" dengan diagnosa abortus inkomplit masalah potensial yang dapat terjadi adalah potensial terjadi anemia. Data yang mendukung yaitu perdarahan sedikit-sedikit, sehingga menimbulkan keadaan anemis. Sebagian hasil konsepsi masih tertinggal dalam uterus dimana pada pemeriksaan vagina, kanalis servikalis masih terbuka dan teraba jaringan pada cavum uteri. Perdarahan biasanya masih

terjadi jumlahnya pun bisa banyak atau sedikit bergantung pada sisa jaringan yang tersisa, sehingga perdarahan berjalan terus. Pasien dapat jatuh dalam keadaan anemia (Prawirohardjo, 2014: 469-470). Nampak ada persamaan dan tidak di temukan adanya kesenjangan.

4. Tindakan Segera/ Kolaborasi

Pada langkah ini beberapa data menunjukkan situasi emergensi, di mana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi. Beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Tindakan tersebut mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan megevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan (Nurhayati dkk, 2013: 143).

Tindakan segera dan kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya, dalam kasus ini, tidak ada indikasi untuk dilakukannya tindakan segera. Akan tetapi, kolaborasi dengan dokter ahli kandungan dilakukan untuk menetapkan diagnosa dengan pemeriksaan USG, pemeriksaan laboratorium dan rencana kuretase.

Kuretase adalah cara membersihkan hasil konsepsi memakai alat kuretase (sendok kerokan), yang bertujuan untuk menghentikan perdarahan yang terjadi pada keguguran kehamilan dengan cara mengeluarkan hasil kehamilan yang telah gagal berkembang (Barasa,2015:6-7).

Adanya nyeri perut dan keluarnya darah yang banyak dari jalan lahir dapat menyebabkan infeksi apabila tidak ditangani dengan segera. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk tindakan selanjutnya yaitu penatalaksanaan pemberian cairan infus RL, rencana kuret pada tanggal 27 april 2017 dan penatalaksanaan pemberian obat.

Pada Ny"J" dilakukan tindakan dengan pemasangan infus dengan cairan RL dengan 28 tetes/menit, rencana kuret pada tanggal 27 april 2017 pukul 11:00 wita, dan penatalaksanaan pemberian obat yaitu ceftriaxone 2x1, misoprostol 2 tab/vagina, cefadroxil 2x1, asam mefenamat 3x1 dan Sf 1x1 sehari.

Prostaglandin adalah obat terbaik yang telah diakui untuk pematangan cervix, dimana satu diantaranya adalah misoprostol (analog prostaglandin E1). Selain efektifitasnya yang tinggi, misoprostol diproduksi dalam bentuk tablet yang penyimpanannya cukup dalam suhu ruang serta mudah pemakaiannya. Misoprostol yang dipasarkan sebagai obat proteksi mukosa gastrointestinal digunakan pada pematangan cervix dan induksi persalinan karena aman, bermanfaat dan tidak mahal. Penelitian mengenai penggunaan misoprostol untuk pematangan cervix dan induksi persalinan pada kehamilan aterm resiko rendah telah banyak dilakukan baik secara peroral maupun pervaginam (Trihastuti,2015:2).

Pengeluaran hasil konsepsi biasanya dengan aman dengan blok paraserviks pada fasilitas rawat jalan. Namun, faktor yang membatasi adalah kemampuan mengobservasi pasien secara memadai setelah tindakan. Pada kasus dengan

perdarahan hebat atau jika abortus terjadi pada trimester kedua, biasanya diperlukan rawat inap (C.Benson Ralph dan Martin L.Pernoll, 2013: 302).

Pada kasus abortus inkomplit memerlukan tindakan segera yaitu kolaborasi atau berkonsultasi dengan dokter, dengan demikian ada kesamaan antara tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus dilahan praktek dan ini berarti tidak ada kesenjangan.

5. Rencana Tindakan Asuhan

Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen kebidanan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Suatu rencana tindakan harus disetujui pasien dan bidan agar menjadi efektif. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan alasan yang benar berlandaskan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, serta telah divalidasi dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Rencana asuhan disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan pencegahan masalah/diagnosa potensial. Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan yang berisi sasaran/target dan hasil yang akan dicapai dalam penerapan asuhan kebidanan pada kasus kematian janin dalam rahim (Nurhayati dkk, 2013).

Dalam membuat perencanaan ini ditemukan tujuan dan kriteria yang akan dicapai dalam menerapkan asuhan kebidanan Ibu Hamil pada Ny”J” dengan Abortus Inkomplit tidak berbeda dengan teori dimana rencana asuhan kebidanan

dikembangkan berdasarkan pada intervensi dan rasional sesuai dengan masalah aktual dan potensial pada ibu hamil dengan abortus Inkomplit.

Pada kasus Ibu hamil Ny”J” penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial yang dilakukan di Rumah Sakit berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Pada langkah ini, informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi yaitu sebagai berikut: cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan klien, mendengar keluhan, menjelaskan keadaan yang dialami, memberikan motivasi, menganjurkan agar melakukan pemeriksaan secara teratur, menganjurkan untuk beristirahat yang teratur, pemeriksaan laboratorium, memberikan informasi tentang perubahan fisik dan psikologis.

observasi tanda-tanda vital, kaji adanya tanda infeksi dan anemia, *memberikan health education*, mendiskusikan pada ibu dan keluarga tentang perencanaan kuretase, menjelaskan pada ibu pentingnya dilakukan kuretase dan jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 27 April 2017, pukul 11:00 wita, memberikan dukungan psikologis dan spiritual.

Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretase yakni berupa persiapan alat kuret (handscoon 2 pasang, kasa secukupnya, duk steril satu buah, kateter 1 buah, speculum anterior dan posterior, tampon tang, kuret tajam dan kuret tumpul, kapas DTT, larutan betadin), persiapan penolong (penutup kepala, kacamata, masker, celemek dan sepatu tertutup), dan persiapan pasien yaitu pasien dianjurkan untuk istirahat dan berpuasa, kolaborasi dengan dokter pemberin obat antibiotik, analgetik

dan obat penambah darah yaitu cevtriaxone 2x1, misoprostol 2tab/vagina, asam mefenamat 3x1 dan SF 1x1.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan pemantauan selama dirawat di rumah sakit untuk memantau keadaan klien apakah nyeri perut dan pengeluaran darahnya berhenti atau tidak. Rencana asuhan yang diberikan yaitu memantau tanda-tanda vital, memberikan *Health education* yaitu menganjurkan ibu menjaga kebersihan dan mengomsumsi makanan yang bergizi, menjelaskan teknik relaksasi bila timbul nyeri, mengingatkan pada ibu untuk teratur mengomsumsi obatnya.

Berdasarkan tinjauan teoritis asuhan yang diberikan ibu hamil dengan abortus inkomplit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah adalah tindakan umum pada abortus inkomplit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Secara umum yaitu penanganan nyeri perut bagian bawah dan penanganan pengeluaran darah dari jalan lahir karena ibu hamil dengan keluhan tersebut rentan mengalami anemia dan infeksi. Adapun prinsip-prinsip pencegahan infeksi adalah dengan cuci tangan sebelum melakukan tindakan, pengeluaran hasil konsepsi dengan kuretase karena dengan keluarnya seluruh hasil konsepsi maka tidak ada rangsangan untuk kontraksi, pengeluaran darah akan berhenti dan serviks akan menutup.

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Penanganan abortus inkomplit jika kehamilan lebih dari 16 minggu berikan infus oksitosin 20 unit dalam 500 ml cairan RL/IV dengan kecepatan 40 tetes/menit sampai terjadi ekspulsi hasil konsepsi dan jika perlu berikan misoprostol 200 mcg pervaginam setiap empat jam sampai terjadi ekspulsi hasil konsepsi (maksimal 800 mcg), pastikan untuk tetap memantau kondisi ibu setelah penanganan (Saifuddin, 2014: M-16).

Rencana tindakan asuhan sudah disusun berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktik.

6. Implementasi Asuhan Kebidanan

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta kerjasama dengan tim kesehatan atau dokter dengan demikian bidan harus bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut (Manguji dkk, 2013). Pada saat dilakukan tindakan pada klien, yang pertama dilakukan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan untuk pencegahan terjadinya infeksi.

Pada studi kasus Ny”J” dengan abortus inkomplit, semua tindakan yang telah direncanakan seperti penanganan nyeri dan pencegahan pengeluaran darah dari jalan lahir yaitu tindakan pertama yaitu memberikan cairan infus RL, Memberikan obat analgetik, antibiotik dan penambah darah telah diberikan (ceftriaxone, asam

mefenamat dan SF), pukul 05:30 wita memberikan mesoprostol 2 tab/vagina, dilakukan tindakan kuretase dan ibu setuju kuret dilakukan pada tanggal 27 april 2017, pukul 11:00 wita. obat injeksi lainnya yaitu tanggal 28 April 2017, pukul 06:00 wita memberikan cefadroxil 1gr/IV, melakukan pemanantauan tanda-tanda vital, kuretase dilakukan pada tanggal 27 april 2017, pukul 11:00 wita, dan memberikan dukungan psikologis dan spiritual ibu dan keluarga selama di rumah sakit, dapat dilksanakan dengan baik tanpa ada hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di ruang ANC dan PNC di RSUD Syech Yusuf Gowa.

Pada kasus ini Ny "J", usia 37 tahun dengan diagnosa abortus inkomplit. Pada kasus ini, diagnosis abortus inkomplit ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pelaksanaan asuhan untuk mengatasi masalah yang dialami klien adalah dengan kuretase. Pada kasus Ny"J" dilakukan tindakan dengan kuretase.

Pada hari petama Ny"J" memberikan cairan pada ibu dengan memasang infus RL drips oksitocin 2 unit dengan 28 tetes/menit, memberikan obat analgetik (asam mefenamat 2x1 sehari), antibiotik (ceftriaxone 2x1 sehari), dan penambah darah telah diberikan (SF 1x1 sehari), misoprostol 2 tab/vagina, ibu mengerti bahwa abortus inkomplit harus dilakukan tindakan kuretase dan ibu bersedia dikuret pada tanggal 27 april 2017, pukul 11:00 wita, ibu berpuasa dan beristirahat sebelum dikuret, ibu menjaga personl higienenya, melakuakan persiapan pelaksanan kuret yaitu persiapan alat, persiapan penolong dan persiapan pasien.

Pada hari kedua stadi kasus Ny”J” mengobservasi tanda-tanda vital, pengeluaran darah masih terjadi, menjelaskan pada ibu penyebab perdarahan dan nyeri perut bagian bawah, memberikan dukungan psikologis dan spiritual ibu dengan menganjurkan pada ibu untuk meminta kepada ibu untuk selalu mengingat Allah SWT, memberikan penyuluhan pada ibu tentang personal hygiene yaitu dengan cara mengganti pembalut setiap kali basu atau setiap 2 jam, istirahat yang cukup yaitu tidur siang \pm 2 jam, tidur malam \pm 8 jam, ibu sudah istirahat tetapi ibu tidak istirahat dengan tenang karena rasa nyeri yang dirasakan dan membuat ibu terganggu, ibu melakukan puasa untuk persiapan kuretase, ibu bersedia di kuret pada pukul 10:00 wita mendorong klien ke ruang ok, membawa alat dan status klien, pemantauan tanda-tanda vital, mengingatkan pada ibu untuk mengomsumsi obatnya.

Dengan post kuret mengganti cairan infuse RL dengan 28 tetes/menit pada pukul 12:00 wita, memberikan cefadroxil 2x1, asam mafenamot 3x1, sf 1x1, ceftriaxone/12 jam/IV, memantau tanda-tanda vital, keadaan ibu baik ditandai dengan TTV dalam batas normal, memberikan kongseling tentang *health education* pada ibu yaitu makan makanan yang bergizi seperti nasi, ikan, sayur-sayuran hijau dan buah-buahan, personal hygiene yaitu dengan menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genitalia dengan cara sering mengganti pakaian dalam, pembalut setiap 2 jam atau setiap selesai BAB/BAK, istirahat yang cukup yaitu dengan menganjurkan pada ibu untuk tidur siang \pm 2 jam pada siang hari dan tidur \pm 8 jam pada malam hari. Mengingatkan pada ibu untuk teratur minum obatnya. Setelah dilakukan pembimbingan pada ibu, ibu mengerti dan melakukan apa yang dianjurkan.

Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

7. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi efektivitas dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi bantuan pemenuhan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar kreatif dalam penatalaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut sudah efektif, sedangkan sebagian lagi belum. Manajemen kebidanan ini merupakan suatu kontinum, maka perlumengulang kembali lagi dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen tidak efektif, serta melakukan penyusuaian pada rencana asuhan berikutnya (Nurhayati, 2013:144).

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi.

Hasil evaluasi setelah asuhan kebidanan yang dilaksanakan selama 2 hari yakni pada tanggal 26 april sampai tanggal 27 april 2017 yaitu pada masalah yang

dialami oleh klien akan diatasi dengan pengeluaran sisa-sisa jaringan melalui kuretase, tidak terjadi komplikasi selama pemberian asuhan dan penanganan, nyeri perut teratasi, abortus inkomplit teratasi ditandai dengan telah dilakukan tindakan kuretase dan tampak pengeluaran darah sedikit, kemudian setelah post kuret keadaan ibu sudah mengalami kemajuan dan membaik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal dan Hb dalam batas normal dan ibu dalam keadaan sehat.

Berdasarkan studi Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dengan Abotus Inkomplit tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus NY”J” secara garis besar tidak ditemukan kesenjangan.

8. Pendokumentasian

Pada hari pertama ibu datang pada tanggal 26 April 2017 di RSUD Syekh Yusuf Gowa di lakukan pengumpulan data mulai dari riwayat kehamilan sekarang dan kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat kesehatan, riwayat sosial ekonomi, riwayat psikososial, riwayat spiritual, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir sejak 1 minggu yang lalu awalnya sedikit kemudian keluar gumpalan dan terus keluar darah sedikit di sertai nyeri perut bagian bawah, HPHT 02 januari 2017 usia kehamilan 16 minggu 2 hari, tidak ada riwayat hubungan seksual sebelum terjadi pendarahan, tidak pernah terjatuh dan mengangkat beban berat dan tidak pernah meminum obat-obatan atau jamu yang dapat membahayakan janin.

Di lakukan pemeriksaan ttv dalam batas normal, pemeriksaan laboratorium Hb 11,5 gr, TFU pertengahan simpisis pusat dan sisa jaringan dapat di raba dalam kanalis servikalis dan pemeriksaan USG hasil kesan sisa jaringan. Pada kasus Ny “J” hasil pengkajian menunjukkan diagnosis Abortus Inkomplit.

Pada hari kedua ibu di rawat di Rumah sakit dan di lakukan kuretase pada tanggal 27 April 2017 pukul 11:00 wita, selanjutnya pemantauan 2 jam pasca kuret untuk memantau keadaan klien, hasil yaitu pada masalah yang dialami klien di atasi dengan pengeluaran sisa-sisa jaringan melalui kuretase, nyeri perut teratasi dan keadaan ibu membaik ttv normal dan ibu tampak tenang.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengamatan langsung dari lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan ibu hamil dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Telah dilaksanakan pengkajian dan analisis data Ny “J” dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
2. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa/masalah aktual ibu hamil pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
3. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa/masalah potensial ibu hamil pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi ibu hamil pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
5. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan ibu hamil pada NY “J” dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017, dengan hasil penulisan merencanakan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial.

6. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan yang telah disusun pada ibu hamil pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada ibu hamil pada Ny “J” dengan abortus inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan hasil yaitu tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka.
8. Pendokumentasian dilaksanakan mulai tanggal 26 April sampai 27 April 2017, pengkajian pertama sampai kedua tanggal 26 April-27 April 2017 dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

B. SARAN

1. Saran untuk klien
 - a. Menganjurkan kepada ibu agar banyak beristirahat.
 - b. Menganjurkan kepada ibu untuk mengomsumsi makanan dengan gizi seimbang.
 - c. Menganjurkan kepada ibu untuk mengomsumsi obat secara teratur sesuai instruksi dokter.
 - d. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan organ genetaliannya.
 - e. Menganjurkan kepada ibu untuk mobilisasi dini.

2. Saran untuk bidan

- a. Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang professional sehingga dapat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI). Oleh karena itu bidan harus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, melalui program pendidikan, pelatihan-pelatihan, seminar agar menjadi bidan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan (IPTEK).
- b. Bidan harus memberikan asuhan sesuai wewenang untuk itu manajemen kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang mendasari bagi bidan untuk memecahkan masalah klien dan berbagai kasus.
- c. Seorang bidan hendaknya menganggap bahwa semua ibu hamil mempunyai resiko untuk komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu dan janin, oleh karena itu bidan diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya tanda-tanda bahaya kehamilan dan menganjurkan ibu dan keluarga segerah ke pelayanan kesehatan bila mengalami hal tersebut.

3. Saran untuk institusi kebidanan

- a. Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang profesional untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Untuk pelayanan yang lebih berkualitas sesuai dengan kemajuan teknologi, sebaiknya bidan yang sudah bertugas diberi kesempatan untuk melanjutkan atau semacam pelatihan-pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994
- Andriza. “*hubungan Umur dengan Paritas Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus Inkomplit di Rumahsakit Muhammadiyah Palembang 2013*” *Jurnal Harapan Bangsa* Vol.1 No. 1, Juli 2013
- Ansariadi, “*epidemiologi kematian Ibu di Sulawesi Selatan 2008-2013*” (IAKMI) XII, 28-29 oktober 2014.
- Barasa, Sinta Susanty. *Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Mekanisme Koping Ibu Menjelang Tindakan Kuretase Di RSUD. Dr. Pirngadi Medan: Jurnal Kesehatan*. Vol.2, No.6, Juli 2015.
- C.Benson Ralph dan Martin L.Pernoll. *Buku Saku Obstetridan Ginekologi*. Jakarta: EGC.2013.
- Fadlun dan Ahmad Ferianto. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta :Salemba Medika.2014
- Fauziyah, Yulia. *Obstetri Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Hawari Dadang. *Al Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*. Yokyakarta: Pt.dana bakti prima yasa. 2004.
- Irianti, Bayudkk. *Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti*. Jakarta :Sagung Seto.2014.
- Jannah, Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kehamilan*. Yogyakarta: ANDI. 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. 2004.
- Kemenkes RI. “*Pusat Data dan Informasi Kementrian kesehatan RI*” Jakarta. 2014.
- Lamadhah, Athif. *Kehamilan dan Melahirkan*. Yogyakarta: Diva Press.2012.
- Mangkuji, Abettydck. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP*. Jakarta: EGC.2013.
- Marmi dkk. *Asuhan kebidanan patologi*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar. 2014
- Maliana, Andesia “*Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus inkomplit di ruang kebidanan*” *Jurnal Kesehatan*, Volume VII, Nomor 1, April 2016.

- Manriwati. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta: EGC. 2012.
- Nita Norma dan Mustika Dwi. *Asuhan kebidanan patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013.
- NgotThiNuh Nguyen dkk “Results from a study using misoprostol for management of incomplete abortion in Vietnamese hospitals: implications for task shifting” Ngoc et al. *BMC Pregnancy and Childbirth* 2013, 13:118 <http://www.biomedcentral.com/1471-2393/13/118>. 2013
- Nugroho, Taufan. *Patologi kebidanan* Yogyakarta: Nuha Medika. 2012
- Nurhayatidkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Lim, Li Min and Singh, K. *Methods of Abortion in First and Second Trimester*. Department of Obstetrics and Gynaecology, National University Hospital, Singapore, 2014
- Pudiastuti, Ratna Dewi. *Asuhan Kebidanan Pada Hamil Normal Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: P.T. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014.
- Saifuddin, Abdul Bari. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternadan Neonatal*. Jakarta: PT Bina Sarwono Prawirohardjo. 2014.
- Sandi, Deby Matia, “Gambaran Umum dan Paritas Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus Inkomplit di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang” *Jurnal Harapan Bangsa Vol 2*. 2014.
- Sari, Rury Narulita. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lenterahati, 2009.
- Sulistiyawati Ari. *Asuhan Kebidanan pada masa Kehamilan*. Jakarta: salemba medika. 2013
- Sunarti, *Asuhan Kehamilan*. Jakarta: In Media. 2013.

- Susiana, Sali. "Aborsidan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan" Studikhusus Gender pada bidang kesejahteraan social" Badan Keahlian DPR RI. Vol. VIII, No 06/II/P3D/Maret/2016.
- Syahrir dkk."profil kesehatan provinsi Sulawesi Selatan 2014".Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar 2016.
- Trihastuti, Mariana Paristiwati. "Pengaruh Pemberian Misoprostol 25 µg Peroral Ambulatoir pada Tenggat Waktu Persalinan Wanita Hamil > 40 Minggu Resiko Rendah" *Majalah Obstetri & Ginekologi*, Vol. 23 No. 1 Januari - April 2015 : 1-9
- WHO (*World Health Organization*), *Maternal Mortality*. 2014
- WHO (*World Health*), *Manajemen Abortus Inkompli*. Jakarta. EGC. 2012.
- WHO, *Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Jakarta: Unicef, 2013.
- Yulaikha, Lili. *Seri Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta: EGC. 2012.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penelitian

Nama : Saras Yulistina Harju
Nim : 70400114034
T.T.L : Bulukumba 04 November 1997
Suku : Konjo
Agama : Islam
Alamat : Jl. Vetran bakung
Nama Orang Tua
a. Ayah : Habri
b. Ibu : Juharni

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 315 Karosi : 2003-2008
SMP Negeri 24 Bulukumba : 2008-2011
SMA Negeri 6 Bulukumba : 2011-2014.
UIN Alauddin Makassar : 2014-2017