

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR PADA
BAYI NY "S" DENGAN HIPOTERMIA SEDANG DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2017**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH

EKA MURDIANA
70400114036

**PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Murdiana
Nim : 70400114036
Tempat / Tgl. Lahir : Bantaeng, 08 Desember 1996
Jurusan / Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas / Program : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan / Diploma
Alamat : Jl. Galesong, tanabangka kec. Bajeng barat
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny
“S” Dengan Hipotermia Sedang Di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar diperoleh batal demi hukum.

Samata – Gowa, September 2017

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

EKA MURDIANA
NIM: 70400114036

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny "S" Dengan Hipotermia Sedang Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2017" yang disusun oleh Eka Murdiana NIM: 70400114036, Mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 29 September 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (Dengan beberapa perbaikan).

Samata, 29 September 2017 M
9 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc (.....)
- Sekretaris : Firdayanti, S. Si.T., M. Keb (.....)
- Pembimbing I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M. Keb (.....)
- Pembimbing II : dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes (.....)
- Penguji I : Anieq Mumtiah alkautsar, S. ST., M. Keb (.....)
- Penguji II : Dra. Syamsul Bahri, M. Pd (.....)


Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc
NIP: 195502031983121001

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karuniah-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktifitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia dimuka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny “S” Dengan Hipotermia Sedang Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”**. Karya tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di jurusan kebidanan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Cinta dan penghormatan ku persembahkan kepada kedua orang tuaku, ayahanda Makmur dan ibunda Nuridha, dua orang yang menjadi sosok panutan sebelum ku tersentuh dengan dunia luar, mereka adalah orang pertama yang telah

memberikanku kasih sayang, cinta, perhatian, dukungan, doa, dan bimbingan yang begitu besar, serta dasar hidup yang senantiasa ditanamkan sejak kecil.

Penyusunan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M. Si.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. beserta seluruh staff administrasi.
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T, S.KM, M.Keb selaku ketua prodi kebidanan dan sebagai pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya demi membantu membimbing, serta memberikan saran kepada penulis.
4. Ibunda dr. Syatirah Jalaluddin, S.Ked, SP.A, M. Kes sebagai pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing serta memberikan arahan.
5. Ibunda Anieq Mumti'ah al-kauthsar, S.ST, M.keb, selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
6. Ayahanda Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

7. Para dosen jurusan kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
8. Gubernur Sulawesi – Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Bapak Bupati Kabupaten Gowa yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan studi kasus yang dilakukan.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
11. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 014 serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik disisi-Nya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata – Gowa September 2017

Penulis

EKA MURDIANA
Nim: 70400114036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISTILAH.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	6
E. Metode Penulisan	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir Normal	12
1. Pengertian Bayi Baru Lahir Normal	12
2. Ciri – Ciri Bayi Baru Lahir Normal.....	13
3. Adaptasi BBL di luar uterus	14
B. Tinjauan Umum Tentang Hipotermia sedang	26
1. Pengertian Hipotermia	26

2. Etiologi.....	28
3. Tanda dan gejala	28
4. Patofisiologi	29
5. Komplikasi.....	31
6. Penatalaksanaan	31
C. Tinjauan Umum Tentang Bayi Menurut Pandangan Islam.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	40
1. Pengertian	41
2. Langkah – Langkah Manajemen Kebidanan	41
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	53
BAB III STUDI KASUS	55
Langkah I Identifikasi Data Dasar.....	55
Langkah II Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual	60
Langkah III Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial.....	62
Langkah IV Tindakan Segera / Kolaborasi	63
Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan	63
Langkah VI Tindakan Asuhan Kebidanan	65
Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan	66
Pendokumentasian	70
BAB IV PEMBAHASAN.....	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
DAFTAR LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tanda Apgar BBL14

Tabel 2.2 Perkembangan Sistem Pulmonal Sesuai Umur Kehamilan.....15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Mekanisme Kehilangan Panas Pada BBL	30
--	----



DAFTAR SINGKATAN

AKN	Angka Kematian Neonatal
AKB	Angka Kematian Bayi
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
BBL	Bayi Baru Lahir
DJJ	Denyut Jantung Janin
DPT	Difteri Pertusis Tetanus
DTT	Desinfeksi Tingkat Tinggi
HR	<i>Heart Rate</i> Atau Denyut Jantung
IDAI	Ikatan Dokter Anak Indonesia
IMD	Inisiasi Menyusui Dini
MTBM	Manajemen Terpadu Bayi Muda
PMK	Perawatan Metode Kangguru
SOP	Standar Operasional Prosedur
UNICEF	United Nations Internasional Children's Emergency Fund
WHO	<i>World Health Organization</i> Atau Organisasi Kesehatan Dunia

DAFTAR ISTILAH

APGAR <i>score</i>	NILAI APGAR, Suatu Metode Praktis Yang Digunakan Untuk Menilai Keadaan Bayi Sesaat Setelah Dilahirkan Apakah Mengalami Asfiksia Atau Tidak
Antropometri	Pengukuran Badan Bayi Baru Lahir Yaitu: Panjang Badan, Lingkar Kepala, Lingkar Dada, Lingkar Perut, Lila Dan Berat Badan.
Assesment	Penilaian Klinis
Grasping	Gerakan Refleks Bayi Saat Mengeggam
Hipotermia	Bayi Yang Suhu Badannya Kurang Dari Normal 36,5 – 37,5 °C
Konjungtiva	Membran Tipis Bening Yang Melapisi Permukaan Bagian Dalam Kelopak Mata Dan Menutupi Bagian Depan Sklera (Bagian Putih Mata), Kecuali Kornea.
Kolumna Vertebrata	Pondasi Utama Tubuh Dan Berfungsi Untuk Menopang Tubuh Manusia Dalam Posisi Tegak, Yang Secara Mekanik Sebenarnya Melawan Pengaruh Gaya Gravitasi Agar Tubuh Secara Seimbang Tetap Tegak.
MedulaSpinalis	Jaringan Saraf Berbentuk Seperti Kabel Putih Yang Memanjang Dari Medulla Oblongata Turun Melalui

	Tulang Belakang Dan Bercabang Ke Berbagai Bagian Tubuh.
Newborn	Neonatus Atau Bayi Baru Lahir
Rooting	Gerakan Mencari Putting Susu Dengan Rangsangan Taktil Pada Pipi Dan Daerah Mulut
Rooming In	Tempatkan Bayi Bersama Ibu Atau Rawat Gabung
Shivering	Respon Menggigil Pada Reaksi Kedinginan Bayi Baru Lahir
Syok	Suatu Keadaan Disebabkan Gangguan Sirkulasi Darah Ke Dalam Jaringan Sehingga Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Oksigen Dan Nutrisi Jaringan Dan Tidak Mampu Mengeluarkan Hasil Metabolisme.
Suksedaneum	Oedema Dari Kulit Kepala Anak Yang Terjadi Karena Tekanan Dari Jalan Lahir Kepada Kepala Anak.
Sefal Hematoma	Perdarahan Sub Periosteal Akibat Kerusakan Jaringan Periosteal Karena Tarikan Atau Tekanan Jalan Lahir.
Subaponeurotik	Perdarahan Ini Terjadi Dibawah Aponeurosis Akibat Pecahnya Vena-Vena Yang Menghubungkan Jaringan Di Luar Dengan Sinus-Sinus Di Dalam Tengkorak.

Sklera	Lapisan Luar Mata Yang Berwarna Putih, Berserat, Tembus Cahaya, Elastis Dan Mengandung Kolagen.
Termoregulasi	Kemampuan Untuk Meningkatkan Produksi Panas Sebagai Respons Terhadap Stimulus Yang Diterima Dari Reseptor Suhu
Planning	Rencana Kegiatan
VernixCaseosa	Jaringan Subkutan Yang Terdapat Pada Bayi Baru Lahir



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, SEPTEMBER 2017

EKA MURDIANA, 70400114036

Supervisor I : Hj. Sitti Saleha

Supervisor II : Hj. Syatirah jalaluddin

"Management of Newborn Midwifery Care on Mrs. "S"'s Baby with Moderate Hypothermia at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital in 2017 "

Hypothermia is a normal baby temperature of $36.5 - 37.5^{\circ}\text{C}$. Hypothermia is divided into three types: mild hypothermia/cold stress, moderate hypothermia and severe hypothermia. Cold stress restriction is $35.5 - 36.4^{\circ}\text{C}$, moderate hypothermia is $32 - 35.4^{\circ}\text{C}$ and severe hypothermia is 32°C .

This scientific paper is aimed at implementing the Management of Newborn Midwifery Care on Mrs. "S"'s baby with moderate hypothermia at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital in 2017 in accordance with 7 Varney steps and SOAP.

The results from a case study conducted on the baby of Mrs. "S" with moderate hypothermia, found no hindrances at the time of treatment of this case. The management performed on Mrs. "S"'s baby namely applying kangaroo method of care carried out based on SOP, observing the vital signs, treating under infant warmer, providing counseling on exclusive breastfeeding and signs of danger to Birth Weight, infection prevention and cord care.

The conclusion of the case that is 7 Varney steps and SOAP used for the process of obstetrics problem solving have been conducted assessment and data analysis on the baby of Mrs. "S" with Moderate Hypothermia at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital in 2017 for 2 days. The results are the infant body temperature becomes normal with the treatment of kangaroo method, normal vital signs, no signs of infection, the mother always gives milk on demand.

References: 30 (2009-2016)

Keywords: Birth Weight, Moderate Hypothermia, PMK, Shock and 7 Varney Steps



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bayi baru lahir normal adalah berat lahir antara 2500 - 4000 gram, cukup bulan, lahir langsung menangis, dan tidak ada kelainan kongenital (cacat bawaan) yang berat. Pada waktu kelahiran, sejumlah adaptasi psikologik mulai terjadi pada tubuh bayi baru lahir, karena perubahan dramatis ini, bayi memerlukan pemantauan ketat untuk menentukan bagaimana ia membuat suatu transisi yang baik terhadap kehidupannya diluar uterus. Bayi baru lahir juga membutuhkan perawatan yang dapat meningkatkan kesempatan menjalani masa transisi dengan berhasil. Adaptasi neonatal (bayi baru lahir) merupakan proses penyesuaian fungsional neonatus dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus (Rahardjo dan Marmi, 2015 : 11).

Keberlangsungan hidup bayi baru lahir bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan ekstrasuterin. Kemampuan adaptasi ini meliputi adaptasi dalam sikulasi kardiopulmunal dan penyesuaian fisiologis lain untuk menggantikan fungsi plasentadan mempertahankan homeostatis. kelahiran juga merupakan permulaan awal hubungan orang tua/bayi dan, setelah ibu dan bayi dipastikan sehat, privasi orang tua untuk berbicara, menyentuh, dan berkumpul berdua saja dengan bayinya merupakan hal penting (Fraser dan Cooper, 2012 : 397).

Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematian bayi terjadi dalam periode neonatal yaitu dalam bulan pertama kehidupankurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup,bahkan kematian, misalnya karena hipotermiaakan menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi kerusakan otak.Pencegahan merupakan hal yang terbaik yang harus dilakukan dalam penanganan neonatal sehingga neonatus sebagai organisme yang harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin dapat bertahan dengan baik karena periode neonatal merupakan periode yang paling kritis dalam fase pertumbuhan dan perkembangan bayi (Indrayani, 2013 : 309).

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak.Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal(AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB).Perhatian terhadapupaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematianneonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi.(Kemenkes RI, 2016 : 125-126).

Angka kematian neonatal di kota Makassar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 1,19 per 1.000 kelahiran hidup (AKN: 1,19/1.000 kelahiran hidup) meningkat dari tahun 2014 sebesar 0,98 per 1.000 kelahiran hidup (AKN: 0,98/1000 kelahiran hidup). Tahun 2013 sebesar 2,44 per 1.000 kelahiran hidup (AKN: 2,44/1.000 kelahiran hidup) (Profil kesehatan kota Makassar, 2015).

World Health Organization(WHO) telah merekomendasikan asuhan untuk mempertahankan panas dalam asuhan bayi baru lahir, namun hipotermia terus berlanjut menjadi kondisi yang biasa terjadi pada neonatal, yang tidak diketahui, tidak di dokumentasikan dan kurang memperoleh penanganan, Prevalensi yang tinggi dari hipotermia telah dilaporkan secara luas bahkan dari negara tropis (Jurnal kesehatan Andalas, 2014).

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi. Menurut WHO, pada tahun 2013 AKB di dunia 34 per 1.000 kelahiran hidup, AKB di negara berkembang 37 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB di negara maju 5 per 1.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanusneonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah padapemeriksaan dengan manajemen terpadu bayi muda (MTBM).Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak pada bayi.Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan ditangani, namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, kemampuan tenaga cakupan targetkesehatan, keadaan sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik,terlambatnya deteksi dini, dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan(Kemenkes RI, 2016 : 129).

Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dan WHO

merekomendasikan sebaiknya anak disusui hanya air susu ibu (ASI) selama paling sedikit enam bulan (Survei Demografi dan kesehatan Indonesia, 2012 : 159)

Pada tahun 2016, hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kematian bayi (AKB) mencapai 25,5 kematian setiap 1.000 bayi yang lahir. Selama beberapa tahun terakhir, AKB di Indonesia berangsur-angsur mengalami penurunan. Bahkan perkembangan AKB di Indonesia cukup menggembirakan dalam waktu 20 tahun menunjukkan penurunan (Kematian Bayi (<http://databoks.katadata.co.id/tags/kematian-Bayi>)).

Berbagai upaya yang aman dan efektif untuk mencegah dan mengatasi penyebab utama kematian bayi baru lahir (BBL) adalah pelayanan antenatal yang berkualitas asuhan persalinan normal atau dasar pelayanan kesehatan neonatal oleh tenaga profesional. Untuk menurunkan angka kematian bayi baru lahir dengan BBLR, persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan manajemen bayi baru lahir dengan hipotermia. Kemampuan dan keterampilan ini digunakan setiap kali menolong persalinan (Depkes RI, 2013).

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hipotermia adalah menutup kepala bayi dengan topi, pakaian yang kering, diselimuti, ruangan hangat (suhu kamar tidak kurang dari 25°C), bayi selalu dalam keadaan kering, tidak menempatkan bayi di arah hembusan angin dari jendela/pintu/pendingin ruangan. Sebelum memandikan bayi perlu disiapkan baju, handuk, dan air hangat. Setelah

dimandikan, bayi segera dikeringkan dengan handuk dan dipakaikan baju (Wandita S, IDAI diakses tanggal 24 april 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pencatatan dan pelaporan RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tahun 2014 sebanyak 11 bayi, pada tahun 2015 sebanyak 37 bayi, pada tahun 2016 sebanyak 23 bayi dan sampai pada tahun 2017 jumlah keseluruhan sebanyak 73 bayi yang mengalami hipotermia.

Meskipun angka kematian bayi dan anak telah terjadi penurunan yang bermakna namun kematian bayi baru lahir masih cukup tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan kurangnya penanganan obstetrik dan masih rendahnya status kesehatan ibu.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penulisan ini adalah penerapan: Manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan hipotermia di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Untuk Mengetahui asuhan kebidanan yang diberikan pada bayi baru lahir pada bayi Ny “S” dengan Hipotermia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukanya pengkajian data bayi baru lahir pada bayi Ny “S” dengan hipotermia di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

- b. Dilakukanya pengumpulan data, menginteprestasikan data, merumuskan diagnosa atau masalah aktual yang terjadi pada bayi baru lahir pada bayi Ny “S” dengan hipotermia di RSUD Syekh yusuf Gowa tahun 2017.
- c. Dilakukanya diagnosis/masalah pada bayi baru lahir Ny “S” dengan Hipotermia di RSUD Syekh yusuf Gowa tahun 2017.
- d. Dapat mengidentifikasi tindakan segera/kolaborasi pada bayi baru lahir Ny “S” dengan Hipotermia di RSUD Syekh yusuf Gowa tahun 2017.
- e. Dapat mengidentifikasi rencana tindakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Ny “S” dengan Hipotermia di RSUD Syekh yusuf Gowa tahun 2017.
- f. Untuk mengetahui tindakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Ny “S” dengan Hipotermia di RSUD Syekh yusuf Gowa tahun 2017.
- g. Mengevaluasi efektifitas tindakan yang telah dilaksanakan pada bayi baru lahir Ny “S” dengan Hipotermia di RSUD Syekh yusuf Gowa tahun 2017.
- h. Dapat mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Ny “S” dengan Hipotermia di RSUD Syekh yusuf Gowa tahun 2017.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Aplikatif (Manfaat Bagi Rumah Sakit)

Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pengelola program kesehatan Rumah sakit Umum Daerah Syekh yusufKab Gowa dalam pencegahan dan penanganan hipotermia.

2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- a. Diharapkan karya tulis ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan acuan bagi penulisan karya tulis ilmiah dan dapat memperluas pola pikir dan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan inspirasi penulis selanjutnya.
- b. Pelaksanaan asuhan kebidanan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang hipotermia pada bayi baru lahir.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penuliskarena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang hipotermia pada bayi.

4. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan hipotermia.

5. Manfaat Ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

6. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca tentang hipotermia pada bayi.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek dan pengalaman. Metode penulisan karya tulis ini adalah :

1. Studi kepustakaan

Penulis membaca dan mempelajari berbagai buku-buku, literatur dan internet yang ada kaitannya dengan bayi baru lahir dengan hipotermia sebagai dasar teoritis yang digunakan pada pembahasan.

2. Studi Kasus

Melaksanakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi: Identifikasi data dasar, Identifikasi diagnosa/masalah aktual maupun potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/ implementasi, implementasi serta evaluasi asuhan kebidanan pada klien dengan kasus bayi baru lahir dengan hipotermia. Untuk memperoleh data/informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik:

- a. Anamnesis klien: Melakukan tanya jawab dengan ibu dan bapak klien dan keluarga yang dapat membantu memberikan keterangan/informasi yang dibutuhkan dengan dipantau oleh tenaga kesehatan/ bidan setempat.

- b. Pemeriksaan fisik: Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin diperolehnya data yang lengkap mulai dari kepala sampai kaki (*head to toe*) meliputi: inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan diagnostik lainnya dengan menggunakan format pengkajian yang telah disusun sebelumnya.
- c. Pengkajian psikososial: Pengkajian psikososial dilakukan melalui pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi keluarga/orang tua terhadap petugas-petugas kesehatan dan orang di sekitar lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam menyelesaikan karya tulis ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan orang tua bayi, keluarga dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan karya tulis ini, maka penulis menyusun secara sistematika yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Ruang lingkup pembahasan
- C. Tujuan penulisan
 - 1. Tujuan Umum
 - 2. Tujuan Khusus
- D. Manfaat penulisan
- E. Metode penulisan
- F. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir
 - 1. Pengertian Bayi Baru Lahir Normal
 - 2. Ciri-ciri Bayi Normal
 - 3. Adaptasi Bayi Baru Lahir Diluar Uterus
 - 4. Tahapan Bayi Baru Lahir
 - 5. Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Normal
- B. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir dengan Hipotermia Sedang
 - 1. Pengertian Hipotermia
 - 2. Etiologi
 - 3. Tanda dan gejala
 - 4. Patofisiologi
 - 5. Komplikasi

6. Penatalaksanaan
- C. Tinjauan Umum Bayi Menurut Pandangan Islam
- D. Proses Manajemen Kebidanan
 1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan
 2. Langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan
 3. Pendokumentasian asuhan kebidanan SOAP

BAB III STUDI KASUS

- A. Langkah I. Pengumpulan Data Dasar
- B. Langkah II. Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual
- C. Langkah III. Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial
- D. Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi Asuhan Kebidanan
- E. Langkah V. Rencana Asuhan Kebidanan
- F. Langkah VI. Pelaksanaan Asuhan Kebidanan
- G. Langkah VI. Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan.

BAB IV PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir Normal

1. Pengertian Bayi Baru Lahir (BBL)

Bayi baru lahir (BBL) normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37- 42 minggu atau 294 hari dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram, bayi baru lahir (newborn atau neonatus) adalah bayi yang baru dilahirkan sampai dengan usia empat minggu (Wahyuni, 2012).

Bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai umur 12 bulan, namun tidak ada batasan yang pasti. Menurut psikologi, bayi adalah periode perkembangan yang panjang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Asuhan tidak hanya diberikan kepada ibu, tapi juga sangat diperlukan oleh bayi baru lahir (BBL). Walaupun sebagian besar proses persalinan terfokus pada ibu, tetapi karena proses tersebut merupakan pengeluaran hasil kehamilan (Bayi) maka penatalaksanaan persalinan baru dapat dikatakan berhasil apabila selain ibunya, bayi yang dilahirkan juga berada dalam kondisi yang optimal. Memberikan asuhan yang segera, aman, dan bersih untuk BBL merupakan bagian esensial asuhan BBL.

Bayi “cukup bulan” adalah bayi yang dilahirkan setelah usia kehamilan genap mencapai 37 minggu dan sebelum usia kehamilan genap mencapai 41 minggu (Williamson, 2014 : 3).

2. Ciri-ciri Bayi Normal

1. Berat badan 2500-4000 gram.
2. Panjang badan lahir 48-52 cm.
3. Lingkar dada 30-38 cm.
4. Lingkar kepala 33-35 cm .
5. Bunyi jantung dalam menit-menit pertama kira-kira 180×/menit, kemudian menurun sampai 120-140×/menit.
6. Pernafasan pada menit-menit pertama kira-kira 80x/menit, kemudian menurun setelah tenang kira-kira 40×menit.
7. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup terbentuk dan diliputi *vernix caseosa*, Kuku panjang .
8. Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna.
9. Genitalia : labia mayora sudah menutupi labia minora (pada perempuan), Testis sudah turun (pada laki-laki).
10. Refleks isap dan menelan sudah terbentuk dengan baik.
11. Refleks moro sudah baik: bayi bila dikagetkan akan memperlihatkan gerakan seperti memeluk.
12. Refleks grasping sudah baik: apabila diletakkan suatu benda diatas telapak tangan, bayi akan menggengam / adanya gerakan refleksi.
13. Refleks rooting/mencari puting susu dengan rangsangan tekstil pada pipi dan daerah mulut Sudah terbentuk dengan baik.
14. Eliminasi baik: urine dan mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan (Saleha, 2012)

Tabel 2.1 Tanda APGAR bayi baru lahir

Tanda	0	1	2
Appearance	Biru, pucat tungkai biru	Badan pucat,muda	Semuanya merah
Pulse	Tidak teraba	<100	>100
Grimace	Tidak ada	Lambat	Menangis kuat
Activity	Lemas/lumpuh	Gerakan sedikit/fleksi tungkai	Aktif/fleksi tungkai baik/ reaksi melawan
Respiratory	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Baik, menangis kuat

Sumber: Kriebs Jan. M. *Buku saku asuhan kebidanan varney*. 2010:471.

Interpretasi:Nilai 1-3 asfiksia berat, Nilai 4-6 asfiksia sedang, Nilai 7-10 asfiksia ringan.Hasil nilai APGAR skor dinilai setiap variabel dinilai dengan 0, 1, dan 2 nilai tertinggi adalah 10, selanjutnya dapat ditentukan keadaan bayi sebagai berikut:

- a. Nilai 7-10 menunjukkan bahwa bayi dalam keadaan baik (Vigrous baby)
- b. Nilai 4-6 menunjukkan bayi mengalami depresi sedang dan membutuhkan tindakan resusitasi
- c. Nilai 0-3 menunjukkan bayi mengalami depresi serius dan membutuhkan resusitasi segera sampai ventilasi (Walyani dan Purwoastuti, 2015).

3. Adaptasi Bayi Baru Lahir Terhadap Kehidupan Di Luar Uterus

Adaptasi bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fungsional neonatus dari kehidupan didalam uterus ke kehidupan diluar uterus.Beberapa perubahan fisiologi yang dialami bayi baru lahir antara lain yaitu :

a. Sistem Pernafasan

Masa yang paling kritis pada bayi baru lahir adalah ketika harus mengatasi resistensi paru pada saat pernapasan yang pertama kali. Pada umur kehamilan 34-36 minggu struktur paru-paru matang, artinya paru-paru sudah bisa mengembangkan sistem alveoli. Selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi. (Rahardjo dan Marmi, 2015: 14).

Tabel 2.2 Perkembangan sistem pulmunol sesuai umur kehamilan.

Umur kehamilan	Perkembangan
24 hari	Bakal paru-paru terbentuk
26-28 hari	Dua bronchi membesar
6 minggu	Di bentuk segmen bronkus
12 minggu	Differensial lobus
24 minggu	Di bentuk alveolus
28 minggu	Di bentuk surfaktan
34-36 minggu	Maturasi struktur (paru-paru dapat mengembangkan sistem alveolidan tidak mengempis lagi)

Sumber: Rahardjo. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan anak Prasekolah*. 2015:14

Struktur matang ranting paru-paru sudah bisa mengembangkan sistem alveoli. Selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi. Rangsangan gerakan pernapasan pertama :

1. Tekanan mekanik dari torak sewaktu melalui jalan lahir (stimulasi mekanik)

2. Penurunan PaO₂ dan peningkatan PaCO₂ merangsang kemoreseptor yang terletak di sinus karotikus (stimulasi kimiawi)
3. Rangsangan dingin di daerah muka dan perubahan suhu di dalam uterus (stimulasi sensorik) (Indrayani, 2013:311).

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 menit pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya surfaktan yang dengan menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan merintih sehingga tertahan di dalam. Respirasi pada neonatus biasanya pernafasan diafragmatik dan abdominal, sedangkan frekuensi dan dalam tarikan belum teratur. Apabila surfaktan berkurang, maka alveoli akan kolaps dan paru-paru kaku sehingga terjadi atelektasis, dalam keadaan anoksia neonatus masih dapat mempertahankan hidupnya karena adanya kelanjutan metabolisme anaerobik.

b. Sirkulasi darah

Pada masa fetus darah dari plasenta melalui vena umbilikalis sebagian ke hati, sebagian langsung ke serambi kiri jantung, kemudian ke bilik kiri jantung. Dari bilik kiri darah di pompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Dari bilik kanan darah di pompa sebagian ke paru dan sebagian melalui duktus arteriosus ke aorta. Setelah bayi lahir, paru akan berkembang mengakibatkan tekanan-tekanan arteriol dalam paru menurun.

Tekanan dalam jantung kiri lebih besar dari pada tekanan jantung kanan yang mengakibatkan menutupnya foramen ovale secara fungsional. Hal ini terjadi pada jam-jam pertama setelah kelahiran. Oleh

karena tekanan dalam paru turun dan tekanan dalam aorta desenden naik dan karena rangsangan biokimia (p_{aO_2} yang naik), duktus arteriosus akan berobliterasi, ini terjadi pada hari pertama. Aliran darah paru pada hari pertama ialah 4-5 liter per menit / m^2 . Aliran darah sistolik pada hari pertama rendah yaitu 1.96 liter/menit/ m^2 karena penutupan duktus arteriosus (Indrayani, 2013: 312).

c. Metabolisme

Luas permukaan tubuh neonatus, relatif lebih luas dari orang dewasa sehingga metabolisme basal per kg BB akan lebih besar, sehingga BBL harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga energi diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan lemak. Pada jam-jam pertama energi didapatkan dari perubahan karbohidrat. Pada hari kedua, energi berasal dari pembakaran lemak. Setelah mendapat suhu < pada hari keenam, energi 60% di dapatkan dari lemak dan 40% dari karbohidrat (Indrayani, 2013).

d. Keseimbangan air dan fungsi ginjal

Tubuh bayi baru lahir relatif mengandung lebih banyak air dan kadar natrium relatif lebih besar dari kalium karena ruangan ekstraseluler luas. Fungsi ginjal belum sempurna karena:

1. Jumlah nefron masih belum sebanyak orang dewasa
2. Tidak seimbang antara luas permukaan glomerulus dan volume tubulus proksimal
3. Aliran darah ginjal (*renal blood flow*) pada neonatus relatif kurang bila dibandingkan dengan orang dewasa (Indrayani, 2013: 313).

e. Imunoglobulin

Sistem imunitas bayi baru lahir masih belum matang, sehingga menyebabkan neonatus rentan terhadap berbagai infeksi dan alergi. Sistem imunitas yang matang akan memberikan kekebalan alami maupun yang didapat. Kekebalan alami terdiri dari struktur pertahanan tubuh yang berfungsi mencegah atau meminimalkan infeksi. Berikut beberapa contoh kekebalan alami: Perlindungan dari membran mukosa, Fungsi saringan saluran nafas, Pembentukan koloni mikroba dikulit dan usus, Perlindungan kimia oleh lingkungan asam lambung (Walyani dan Purwoastuti, 2015:135).

f. Traktus digestivus

Traktus digestivus relatif lebih berat dan lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa. Pada neonatus traktus digestivus mengandung zat yang berwarna hitam kehijauan yang terdiri dari mukopolisakarida dan disebut meconium. Pengeluaran meconium biasanya dalam 10 jam pertama dan 4 hari biasanya tinja sudah berbentuk dan berwarna biasa. Enzim dalam traktus digestivus biasanya sudah terdapat pada neonatus kecuali amilase pankreas. Bayi sudah ada refleks hisap dan menelan, sehingga pada bayi lahir sudah bisa minum ASI. Gumoh sering terjadi akibat dari hubungan oesofagus bawah dengan lambung belum sempurna, dan kapasitas dari lambung juga terbatas yaitu < 30 cc (Indrayani, 2013: 314).

g. Hati

Fungsi hati janin dalam kandungan dan segera setelah lahir masih dalam keadaan matur (belum matang), hal ini dibuktikan dengan ketidakseimbangan hepar untuk menghilangkan bekas penghancuran dalam peredaran darah (Rahardjo dan Marmi, 2015: 22).

Setelah segera lahir, hati menunjukkan perubahan kimia dan morfologis, yaitu kenaikan kadar protein dan penurunan kadar lemak dan glikogen. Sel hemopoetik juga mulai berkurang walaupun memakan waktu yang lama. Enzim hati belum aktif benar pada waktu bayi baru lahir, daya detoksifikasi hati pada neonatus juga belum sempurna, contohnya pemberian obat kloramfenikol dengan dosis lebih dari 50 mg/kgBB/hari dapat menimbulkan *grey baby syndrome* (Indrayani, 2013: 314).

4. Tahapan Bayi Baru Lahir

- a. Tahap I: terjadi segera setelah lahir, Selama menit-menit pertama kelahiran. Pada tahap ini digunakan sistem skoring apgar untuk fisik dan scoring gray untuk interaksi bayi dan ibu.
- b. Tahap II: di sebut transisional reaktivitas. Pada tahap II dilakukan pengkajian selama 24 jam pertama terhadap adanya perubahan perilaku.
- c. Tahap III: disebut tahap periodik, pengkajian dilakukan setelah 24 jam pertama yang meliputi pemeriksaan seluruh tubuh (Saleha, 2012: 4).

5. Asuhan kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Normal

Memberikan asuhan aman dan bersih segera setelah bayi baru lahir merupakan bagian esensial dari asuhan pada bayi baru lahir seperti jagabayi tetap hangat, isap lender dari mulut dan hidung bayi (hanya jika perlu), keringkan, pemantauan tanda bahaya, klem dan potong tali pusat, IMD, beri suntikan Vit K, 1 mg intramuskular, beri salep mataantibiotika pada kedua mata, pemeriksaan fisik, imunisasi hepatitis B 0.5 ml intramuscular (Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial, 2010).

1. Pencegahan infeksi

Bayi lahir sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau kontaminasi mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung maupun beberapa saat setelah lahir. Sebelum menangani bayi, pastikan penolong persalinan telah menerapkan upaya pencegahan infeksi, antara lain:

- a. Cuci tangan secara efektif sebelum bersentuhan dengan bayi.
- b. Gunakan sarung tangan yang bersih pada saat menangani bayi yang belum dimandikan.
- c. Pastikan semua peralatan dan bahan yang digunakan, terutama klem, gunting, penghisap lender Delee dan benang tali pusat telah didesinfeksi tingkat tinggi atau steril. Gunakan bola karet yang baru dan bersih jika akan melakukan penghisapan lendir dengan alat tersebut (jangan bola karet penghisap yang sama untuk lebih dari satu bayi).
- d. Pastikan semua pakaian, handuk, selimut dan kain yang digunakan untuk bayi sudah dalam keadaan bersih. Demikian pula halnya timbangan, pita

pengukur, thermometer, stetoskop, dan benda-benda lain yang akan bersentuhan dengan bayi. Dokumentasi dan cuci setiap kali setelah digunakan.

2. Penilaian

Segera setelah lahir, lakukan penilaian awal pada bayi baru lahir:

- a. Apakah bayi bernapas atau menangis kuat tanpa kesulitan ?
- b. Apakah bayi bergerak aktif ?
- c. Bagaimana warna kulit, apakah berwarna kemerahan ataukah ada sianosis?

3. Perlindungan termal (termoregulasi)

Pada lingkungan yang dingin, pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil merupakan usaha utama seorang bayi yang kedinginan untuk mendapatkan kembali suhu tubuhnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan kehilangan panas merupakan prioritas utama dan berkewajiban untuk meminimalkan kehilangan panas pada bayi baru lahir. Suhu tubuh normal pada neonatus adalah $36,5-37,5^{\circ}\text{C}$ melalui pengukuran di aksila dan rektum, jika nilainya turun dibawah $36,5^{\circ}\text{C}$ maka bayi mengalami hipotermia (Rahardjo dan Marmi, 2015: 25).

a. Mekanisme kehilangan panas

Mekanisme pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum berfungsi sempurna, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas dari tubuh bayi karena bayi beresiko mengalami hipotermia. Bayi dengan hipotermia sangat rentan terhadap kesakitan dan

kematian. Hipotermia mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan di selimuti walaupun di dalam ruangan yang relatif hangat.

b. Proses adaptasi

Dalam proses adaptasi kehilangan panas, bayi mengalami

1. Stress pada BBL menyebabkan hipotermia
2. BBL mudah kehilangan panas
3. Bayi menggunakan timbunan lemak coklat untuk meningkatkan suhu tubuhnya
4. Lemak coklat terbatas sehingga apabila habis akan menyebabkan adanya stress dingin.

c. Mencegah kehilangan panas

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kehilangan panas dari tubuh bayi adalah:

1. Keringkan bayi secara seksama

Pastikan tubuh bayi dikeringkan segera setelah bayi lahir untuk mencegah kehilangan panas secara evaporasi. Selain untuk menjaga kehangatan tubuh bayi, mengeringkan dengan menyeka tubuh bayi juga merupakan rangsangan taktil yang dapat merangsang pernafasan bayi.

2. Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat

Bayi yang di selimuti kain yang sudah basah dapat terjadi kehilangan panas secara konduksi. Untuk itu setelah mengeringkan tubuh

bayi, ganti kain tersebut dengan selimut atau kain yang bersih, kering dan hangat.

3. Tutup bagian kepala bayi

Bagian kepala bayi merupakan permukaan yang relatif luas dan cepat kehilangan panas. Untuk itu tutupi bagian kepala bayi agar bayi tidak kehilangan panas.

4. Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya

Selain untuk memperkuat jalinan kasih sayang ibu dan bayi, kontak kulit antara ibu dan bayi akan menjaga kehangatan tubuh bayi. Untuk itu anjurkan ibu untuk memeluk bayinya.

5. Perhatikan cara menimbang bayi atau jangan segera memandikan bayi baru lahir

1. Menimbang bayi tanpa alas timbangan dapat menyebabkan bayi mengalami kehilangan panas secara konduksi. Jangan biarkan bayi ditimbang telanjang. Gunakan selimut atau kain bersih.

2. Bayi baru lahir rentan mengalami hipotermi untuk itu tunda memandikan bayi hingga 6 jam setelah lahir.

- a) Tempatkan bayi dilingkungan yang hangat

Jangan tempatkan bayi di ruang ber-AC. Tempatkan bayi bersama ibu (*rooming in*). Jika menggunakan AC, jaga suhu ruangan agar tetap hangat.

- b) Jangan segera memandikan bayi baru lahir

Bayi baru lahir akan cepat dan mudah kehilangan panas karena sistem pengaturan panas di dalam tubuhnya belum sempurna. Bayi sebaiknya di mandikan minimal enam jam setelah lahir. Memandikan bayi dalam beberapa jam pertama setelah lahir dapat menyebabkan hipotermia yang sangat membahayakan kesehatan bayi baru lahir (Indrayani, 2013).

d. Merawat tali pusat

Setelah plasenta lahir dan kondisi ibu dinilai sudah stabil maka lakukan pengikatan tali pusat atau jepit dengan klem plastik tali pusat (bila tersedia).

1. Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk membersihkan darah dan sekresi lainnya.
2. Bilas tangan dengan air DTT.
3. Keringkan dengan handuk atau kain yang bersih dan kering.
4. Ikat tali pusat dengan jarak sekitar 1 cm dari pusat bayi. Gunakan benang atau klem plastik penjepit tali pusat DTT atau steril. Ikat kuat dengan simpul mati atau kuncikan penjepit plastik tali pusat.
5. Lepaskan semua klem penjepit tali pusat dan rendam dalam larutan klorin 0,5%
6. Bungkus tali pusat yang sudah di ikat dengan kasa steril.

e. Pemberian ASI

Rangsangan hisapan bayi pada puting susu ibu akan diteruskan oleh serabut syaraf ke hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon

prolaktin. Prolaktin akan mempengaruhi kelenjar ASI untuk memproduksi ASI di alveoli. Semakin sering bayi menghisap puting susu maka akan semakin banyak prolaktin dan ASI yang di produksi. Penerapan inisiasi menyusui dini (IMD) akan memberikan dampak positif bagi bayi, antara lain menjalin / memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi melalui kolostrum, merangsang kontraksi uterus, dan lain sebagainya.

Melihat begitu unggulnya ASI, maka sangat disayangkan bahwa di Indonesia pada kenyataannya penggunaan ASI belum seperti yang dianjurkan. Pemberian ASI yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

- a) ASI eksklusif selama 6 bulan karena ASI saja dapat memenuhi 100% kebutuhan bayi.
- b) Dari 6-12 bulan ASI masih merupakan makanan utama bayi karena dapat memenuhi 60-79% kebutuhan bayi dan perlu ditambahkan makanan pendamping ASI berupa makanan lumat sampai lunak sesuai dengan usia bayi.
- c) Diatas 12 bulan ASI saja hanya memenuhi sekitar 30% kebutuhan bayi dan makanan padat sudah menjadi makanan utama. Namun, ASI tetap dianjurkan pemberiannya sampai paling kurang 2 tahun untuk manfaat lainnya (Saifuddin AB, 2014).

f. Pencegahan infeksi pada mata

Pencegahan infeksi mata dapat diberikan kepada bayi baru lahir. Pencegahan infeksi tersebut di lakukan dengan menggunakan salep mata tetrasiklin 1%. Salep antibiotika tersebut harus diberikan dalam waktu

satu jam setelah kelahiran. Upaya profilaksis infeksi mata tidak efektif jika diberikan lebih dari satu jam setelah kelahiran (Indrayani, 2013).

g. Profilaksis perdarahan pada bayi baru lahir

Semua bayi baru lahir harus segera diberikan vitamin K1 injeksi 1 mg intramuskuler di paha kiri sesegera mungkin untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin K yang dapat dialami oleh sebagian bayi baru lahir.

h. Pemberian imunisasi hepatitis B

Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah terjadinya infeksi disebabkan oleh virus Hepatitis B terhadap bayi (Saifuddin AB, 2014). Terdapat 2 jadwal pemberian imunisasi Hepatitis B. Jadwal pertama, imunisasi hepatitis B sebanyak 3 kali pemberian, yaitu usia 0 hari (segera setelah lahir menggunakan uniject), 1 dan 6 bulan. Jadwal kedua, imunisasi hepatitis B sebanyak 4 kali pemberian, yaitu pada 0 hari (segera setelah lahir) dan DPT+ Hepatitis B pada 2, 3 dan 4 bulan usia bayi (Indrayani, 2013).

B. Tinjauan Umum Tentang Hipotermia Sedang

1. Pengertian Hipotermia

Hipotermia adalah bayi yang kaki dan tangannya teraba dingin dan sering menangis karena produksi panas yang kurang akibat sirkulasi masih belum sempurna, respirasi masih lemah dan konsumsi oksigen rendah, inaktivitas otot serta asupan makanan rendah. Bayi yang mengalami hipotermia

sedang (suhu 32-36°C) disebut hipotermia berat bila suhu <32°C. Hipotermia umumnya terjadi pada bayi baru lahir terutama yang prematur, yang belum mampu beradaptasi terhadap lingkungan baru dengan suhu lebih rendah dari suhu didalam perut ibunya (Wahyuni S, 2012: 28).

Hipotermia adalah penyebab utama kesakitan dan kematian bayi baru lahir di Negara berkembang. Salah satu asuhan untuk mencegah hipotermia adalah dengan melaksanakan inisiasi menyusui dini (IMD) (jurnal kesehatan andalas, 2014:3). Bila diketahui hal-hal ini maka segera atasi penyebabnya tersebut. Untuk menghangatkan bayi dilakukan kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibu sambil disusui, dan ukur ulang suhu bayi setiap jam sampai suhunya normal. Bila suhunya tetap tidak naik atau malah turun maka segera bawa ke dokter. Bayi dengan suhu kurang dari 35,5°C mengalami kondisi berat yang harus segera mendapat penanganan dokter. Tindakan yang dapat dilakukan oleh ibu sebelum dan selama dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan adalah terus memberikan air susu ibu (ASI) dan menjaga kehangatan. Tetap memberikan ASI penting untuk mencegah agar kadargula darah tidak turun. Apabila bayi masih mampu menyusui, bayi disusui langsung ke payudara ibu. Namun, bila bayi tidak mampu menyusui tapi masih mampu menelan, berikan ASI yang diperah dengan sendok. Menjaga bayi dalam keadaan hangat dilakukan dengan kontak kulit ke kulit, yaitu melekatkan bayi di dada ibu sehingga kulit bayi menempel langsung pada kulit ibu, dan ibu dan bayi berada dalam satu pakaian. Kepala bayi ditutup dengan

topi. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk penanganan hipotermia sedang adalah menutup kepala bayi dengan topi, pakaian yang kering, diselimuti, ruangan hangat (suhu kamar tidak kurang dari 25°C), bayi selalu dalam keadaan kering, tidak menempatkan bayi di arah hembusan angin dari jendela/pintu/pendinginruangan. Sebelum memandikan bayi perlu disiapkan baju, handuk, dan air hangat. Setelah dimandikan, bayi segera dikeringkan dengan handuk dan dipakaikan baju (IDAI, 2016).

2. Etiologi

- a. Jaringan lemak subkutan tipis
- b. Perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan besar
- c. BBL (Bayi Baru Lahir) tidak mempunyai respon shivering (menggigil) pada reaksi kedinginan
- d. Syok hipovolemik
- e. Infeksi
- f. Gangguan termoregulasi (Rahardjo dan Marmi, 2015).

3. Tanda Dan Gejala

- a. Hipotermia ringan
 1. Suhu badan 36,0 – 36,4°C
 2. Bayi tampak lesu atau mengantuk (Saifuddin, 2014)
 3. Kemampuan menghisap lemah (SaifuddinAB, 2014 : 369)
- b. Hipotermia sedang
 1. Suhu badan 32-35,9°C
 2. Kaki / tangan dingin disertai gerakan bayikurang dari normal

c. Hipotermia berat

1. Suhu badan $<32^{\circ}\text{C}$
2. Seluruh badan terasa dingin disertai gejala

4. Patofisiologi


Pusat pengaturan panas di otak bayi memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi panas sebagai respons terhadap stimulus yang diterima dari reseptor suhu (termoreseptor). Akan tetapi, ini bergantung pada peningkatan aktivitas metabolik yang mengganggu kemampuan bayi untuk mengontrol suhu tubuh, terutama dalam kondisi lingkungan yang buruk. Bayi memiliki kemampuan terbatas untuk menggigil dan tidak mampu meningkatkan aktifitas volunter otot untuk menghasilkan panas. Oleh sebab itu, bayi harus bergantung pada kemampuannya sendiri untuk menghasilkan panas melalui metabolisme (Fraser dan Cooper, 2012).

Hipotermia cenderung terjadi pada masa transisi pada bayi baru lahir. Masa transisi bayi merupakan masa yang sangat kritis pada bayi dalam upaya untuk dapat bertahan hidup. Bayi baru lahir harus beradaptasi dengan kehidupan diluar uterus yang suhunya jauh lebih dingin bila dibandingkan suhu didalam uterus yang relatif lebih hangat sekitar 37°C . suhu ruangan yang normalnya $25^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$ berarti ada penurunan sekitar 10°C . Kemampuan bayi baru lahir tidak stabil dalam mengendalikan suhu secara adekuat, bahkan jika bayi lahir saat cukup bulan dan sehat sehingga sangat rentan untuk kehilangan panas (Jurnal Kesehatan Andalas, 2014).

Hipotermia adalah keadaan dimana suhu tubuh berada dibawah normal ($<36,5$ c), hipotermia terjadi karena perawatan bayi baru lahir yang salah, hilangnya panas tubuh disebabkan oleh 4 hal yaitu radiasi, konveksi, konduksi, dan evaporasi (Istiqomah & Mufida: Jurnal Eduhealth, 2014).

Adapun mekanisme kehilangan suhu tubuh bayi yaitu:

Gambar 2.3 Mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir



Sumber: (Rahardjo dan Marmi, 2015)

Terdapat empat mekanisme kemungkinan hilangnya panas tubuh dari bayi ke lingkungannya adalah sebagai berikut:

1. Konduksi

Panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda sekitarnya yang kontak langsung dengan tubuh bayi (pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung) Contoh: menimbang bayi tanpa alas timbangan, tangan penolong yang dingin memegang BBL, menggunakan stetoskop dingin untuk pemeriksaan BBL.

2. Konveksi

Panas hilang dari tubuh bayi ke udara sekitarnya yang sedang bergerak (jumlah panas yang hilang tergantung kepada kecepatan dan suhu udara). Contoh: membiarkan atau menempatkan BBL dekat jendela, dan membiarkan BBL di ruang yang terpasang kipas angin.

3. Radiasi

Panas di pancarkan dari BBL, keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin (pemindahan panas antara 2 objek yang mempunyai suhu berbeda). Contoh: BBL di biarkan dalam ruangan AC tanpa di berikan pemanas (*radiant warmer*), BBL di biarkan dalam keadaan telanjang .

4. Evaporasi

Panas hilang melalui proses penguapan tergantung kepada kecepatan dan kelembaban udara (perpindahan panas dengan cara merubah cairan menjadi uap). Contoh: tingkat kelembaban udara di sekitar tempat tidur BBL.

5. Komplikasi

1. Hipoglikemiaasidosis metabolik, karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob
2. Kebutuhan oksigen yang meningkat
3. Metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu

4. Gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermia berat
5. Shok (Rahardjo dan Marmi, 2015).

6. Penatalaksanaan

a. Kontak kulit dengan kulit

Kontak kulit dengan kulit adalah cara yang sangat efektif untuk mencegah hilangnya panas pada BBL, baik pada bayi-bayi aterm maupun preterm. Dada atau perut ibu, merupakan tempat yang sangat ideal bagi BBL untuk mendapatkan lingkungan suhu yang tepat.

Apabila oleh karena sesuatu hal melekatkan BBL ke dada atau ke perut ibunya tidak dimungkinkan, maka bayi yang telah dibungkus dengan kain hangat dapat diletakkan dalam dekapan lengan ibunya (Saifuddin AB, 2014: 368)

Pelukan ibu pada tubuh bayi dapat menjaga kehangatan tubuh dan. Mencegah kehilangan panas dan anjurkan ibu untuk menyusui bayinya segera setelah lahir sebaiknya pemberian ASI harus dimulai dalam waktu satu jam pertama kelahiran.

Bayi diletakkan telungkup di dada ibu agar terjadi kontak kulit langsung ibu dan bayi. Untuk menjaga agar bayi tetap hangat, tubuh ibu dan bayi harus berada di dalam satu pakaian (merupakan teknologi tepat guna baru) disebut sebagai Metoda Kanguru. Sebaiknya ibu menggunakan pakaian longgar berkancing depan (Saifuddin AB, 2014).

b. Perawatan Metode Kangguru (PMK)

PMK adalah kontak kulit antara ibu dan bayi secara dini, terus-menerus, dan dikombinasi dengan pemberian ASI eksklusif. Tujuannya adalah agar bayi kecil tetap hangat. PMK dapat dimulai dengan segera setelah lahir atau setelah bayi stabil. PMK dapat dilakukan di rumah sakit atau di rumah setelah pulang. Bayi tetap dapat dirawat dengan PMK, meskipun belum bisa menyusui, berikan ASI peras dengan menggunakan salah satu alternatif pemberian minum (Rizema Putra, 2012).

Perawatan metode kangguru didefinisikan sebagai kontak kulit antara ibu dan bayi secara sering dan eksklusif. Kehangatan tubuh ibu merupakan sumber panas yang efektif, hal ini terjadi bila ada kontak langsung antara kulit ibu dan kulit bayi. Keuntungan yang didapat dari metode kangguru bagi perawatan bayi: Meningkatkan hubungan emosional antara ibu dan bayi, Menstabilkan suhu tubuh, denyut jantung, dan pernafasan bayi, Meningkatkan pertumbuhan dan berat badan bayi dengan lebih baik.

1. Pelaksanaan metode kangguru dapat dilakukan pada waktu:

- a. Segera setelah lahir.
- b. Sangat awal, setelah 10-15 menit.
- c. Awal, setelah umur 24 jam.
- d. Menengah, setelah 7 hari perawatan.
- e. Lambat, setelah bayi bernafas sendiri tanpa O₂.
- f. Setelah keluar dari perawatan inkubator.

2. Kriteria bayi untuk metode kangguru:
 - a. Bayi dengan berat badan < 2000 gram.
 - b. Tidak ada kelainan atau penyakit yang menyertai.
 - c. Refleks dan kordinasi isap dan menelan yang baik.
 - d. Perkembangan selama di inkubator baik.
 - e. Kesiapan dan keikutsertaan orang tua, sangat mendukung dalam keberhasilan.
3. SOP (Standar Operasional Prosedur) Perawatan Metode Kangguru yaitu:
 - a. Perkenalkan kepada keluarga bayi tentang perawatan metode kangguru (Termasuk jelaskan tujuan, manfaat dan cara pelaksanaannya).
 - b. Siapkan ibu (Yaitu bersihkan daerah dada dan perut. Mandi atau mencuci badan setiap hari sangat diperlukan untuk kebersihan ibu. Usahakan dada dan perut selalu dalam keadaan bersih).
 - c. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. (Baju kangguru, support binder/ikatan/pembalut penahan, topi bayi, baju bayi, popok bayi, kaos kaki bayi, lap atau handuk, sabun, air).
 - d. Cuci tangan dan bersihkan kuku. (Cuci tangan di bawah air mengalir dan hindarkan agar kuku tidak melukai bayi).
 - e. Siapkan bayi. Pakaian popok, topi yang hangat, dan kaos kaki (Suhu Ruang 22° - 24° C). Pakaikan baju tanpa lengan, bagian depan terbuka, popok, topi, dan kaos kaki.

- f. Kenakan baju sesuai metode kangguru (mulai dengan memasukkan tangan kiri dan selanjutnya tangan kanan).
- g. Kancingkan baju. (kancingkan baju kangguru dan sebaiknya sesuaikan dengan ukuran bayi).
- h. Selanjutnya letakkan bayi di dada ibu. (Bayi diletakkan di antara payudara dengan posisi tegak. Dada bayi menempel ke dada ibu. Kepala bayi dipalingkan ke sisi kanan atau kiri dengan sedikit tengadah. Pangkal paha bayi dan tangan dalam posisi “kodok” atau atur posisi senyaman mungkin).
- i. Atur posisi bayi. (Sebaiknya berada disekitar epigastrium ibu. Dengan cara ini bayi dapat melakukan pernapasan perut. Napas ibu akan merangsang bayi).
- j. Pakai pembalut penahan atau kain untuk mengikat bagian bawah. (Ikatkan kain dengan kuat. Pada beberapa jenis baju kangguru, bagian bawahnya terdapat tali untuk mengikat agar bayi tidak jatuh)
- k. Periksa ulang kancing, ikatan tali pinggang serta kenyamanan bayi. (Kancing dan ikat bagian bawah baju dengan kain/selendang serta perhatikan posisi bayi sehingga mudah untuk bernapas).
- l. Setelah selesai tindakan, cuci tangan kembali. (Mencuci tangan dengan menggunakan sabun untuk mencegah infeksi) (Wahyuni, 2012).

c. IMD (Inisiasi Menyusui Dini)

Inisiasi menyusui dini (IMD) adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan dengan air susu ibunya sendiri dalam satu jam pertama kelahiran. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yaitu upaya menyusui satu jam pertama kehidupan yang diawali dengan kontak kulit antara ibu dan bayi. Upaya tersebut dilakukan oleh bayi segera setelah dipotong talipusatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dilaksanakannya IMD dengan benar terhadap kejadian hipotermia (Apriastuti & Tinah: Jurnal IMD terhadap kejadian hipotermia, 2015).

Rangsangan hisapan bayi pada puting susu ibu akan diteruskan oleh serabut syaraf ke hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin. Prolaktin akan mempengaruhi kelenjar ASI ini untuk memproduksi ASI di alveoli. Semakin sering bayi menghisap puting susu maka akan semakin banyak prolaktin dan ASI yang diproduksi. Penerapan inisiasi menyusui dini (IMD) akan memberikan dampak positif bagi bayi, antara lain menjalin/memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, memberikan kekebalan pasif yang segera kepada bayi melalui kolostrum, merangsang kontraksi uterus dan lain sebagainya (Indrayani, 2013).

d. Inkubator

Cara lainnya menghangatkan bayi adalah dengan menggunakan inkubator. Adapun cara menghangatkan dan mempertahankan suhu tubuh bayi dengan inkubator adalah sebagai berikut: setiap minggu atau setiap

6. Gunakan satu inkubator untuk satu bayi (Rizema Putra, 2012).

C. Tinjauan Umum Tentang penciptaan Manusia Menurut Pandangan Islam

Menurut Al-Qur'an, Allah menjelaskan dengan sangat rinci tentang proses penciptaan manusia termasuk proses perkembangan janin di dalam tubuh manusia. Hal ini adalah bukti bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. karena ilmu pengetahuan yang berkembang ketika itu belum mempunyai alat untuk melihat ataupun mengetahui proses perkembangan janin tersebut.

Dalam Firman Allah SWT telah menjelaskan Q.S Al Mukminun 18/ (12-14):

﴿مَكِّنْ قَرَارِي فِي نُطْفَةٍ جَعَلْنَاهُ ثُمَّ ۝١٢ طِينٍ مِّن سُلَالَةٍ مِّنَ الْإِنسَانِ خَلَقْنَا وَلَقَدْ عَظَمًا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُمَّ ۝١٣﴾
 ﴿الْخَلِيقِينَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَبَارِكْ ۝١٤ آخِرَ خَلْقًا أَنْشَأْنَاهُ ثُمَّ لَحْمًا الْعِظْمَ فَكَسَوْنَا﴾

Terjemahan

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kami menjadikannya nutfah dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, kami ciptakan nutfah itu 'alaqah', lalu kami ciptakan 'alaqah' itu mudhghah. Lalu kami ciptakan mudhghah itu tulang belulang, lalu Kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian, kami mewujudkannya makhluk lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik (Kementrian agama, RI. 2011:342).

Proses penciptaan manusia dalam perut ibunya dalam Al Quran dijelaskan sangatlah sempurna, dari 'alaqah atau gumpalan darah beku, kemudian diikuti dengan pembentukan daging, seterusnya tulang-belulang dan yang terakhir adalah membalutnya dengan daging hingga terbentuklah dia seorang anak manusia (calon bayi/janin). Pada tahap penciptaan dalam kandungan, setelah semuanya terbentuk maka disana saat penentuan rezeki, ajal dan amalnya serta nasibnya sengsara ataukah bahagia.

Firman Allah sebagai berikut Q.S Al-a'la' 30/ (2-3):

فَهَدَىٰ قَدْرًا ۗ وَالَّذِي فَسَوَّىٰ خَلْقَ ٱلَّذِي

Terjemahan

Diayang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan) dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk (Kementrian agama, RI. 2011: 591).

Manusia juga, seperti makhluk-makhluk yang lain, dianugerahi fitrah yang mengantarnya menyempurnakan kekurangannya, memenuhi kebutuhannya, serta mengingatkannya tentang apa yang bermanfaat atau mencelakakan hidupnya (Shihab, M: 2009).

Lalu ayat berikut dalam Q.S Ar-Rum 21/ (20) menjelaskan tentang

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾

Terjemahan

Dan di antara tanda – tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba – tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak (Kementrian agama, RI. 2011: 404).

Asal usul zigot tidak kokoh, zigot bisa tidak menempel di rahim, atau bisa terlepas dari rahim, sehingga pembentukan manusia terhenti prosesnya. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak sombong dan ingkar, tetapi bersyukur dan patuh kepada-nya. Karena dengan kemahakuasaan dan karunia Allah, ia bisa tercipta. Menurut kajian ilmiah alaqah merupakan bentuk perkembangan pra embrionik yang terjadi setelah percampuran sel mani (sperma) dan sel telur.

Moore dan azzindani menjelaskan bahwa alaqah dalam bahasa arab berarti lintah atau suatu segumpal darah. Jadi alaqah merupakan tingkatan embrionik, yang berbentuk seperti buah per. Di mana sistem kardiovaskuler (sistem pembuluh jantung) sudah mulai tampak, dan hidupnya tergantung dari darah ibunya, mirip dengan lintah. Alaqah terbentuk sekitar 24 - 25 hari sejak

pembuahan. jika jaringan pra-embriionik alaqah ini di ambil keluar, memang tampak seperti segumpal darah (Shihab, MQ. 2009).

Adapun Firman Allah Didalam Al-Quran Q.S As-Sajdah 21/(7-9):

لَهُ جَعَلَ ثُمَّ طِينٍ مِنَ الْأَرْضِ خَلَقَ وَبَدَأَ خَلْقَهُ شَيْءٍ كُلِّ أَحْسَنَ الَّذِي
عَلَيْكُمْ وَجَعَلَ رُوحَهُ مِنْ فِيهِ وَنَفَخَ سَوْنَهُ ثُمَّ مَهِينٍ مَاءٍ مِنْ سُلْبَةٍ مِنْ نَسْءِ
تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا وَالْأَفْعِدَةَ وَالْأَبْصَرَ السَّمِ

Terjemahan

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan kedalam (tubuh)Nya ruh (ciptaan)Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit bersyukur (Kementerian agama, RI. 2011:415).

Allah Swt. Yang mengatur segala urusan dan maha penciptaan bahwa dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya dan serapi-rapinya yaitu mereka berkembang biak melalui nutfah (air mani). Dia yang menyempurnakan dan meniupkan kedalam tubuh-Nya ruh (ciptaan)Nya dan setelah lahir ke bumi. Dia menjadikan bagi kamu, wahai manusia pendengaran agar kamu dapat mendengar kebenaran dan penglihatan dan agar kamu dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah, agar kamu dapat juga berfikir dan beriman: tetapi sedikit sekali kamu bersyukur dan banyak diantara kamu yang kufur. Yakni, kamu tidak memfungsikan anugerah-anugerah itu sebagaimana yang Allah kehendaki.

D. Tinjauan Umum Tentang Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak yang khususnya dilakukan oleh bidan didalam memberikan asuhan kebidanan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat (Sianturi, 2015).

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Asuhan kebidanan juga merupakan aplikasi atau penerapan dari peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sesuai kewenangan bidan dan kebutuhan klien dengan memandang klien sebagai makhluk biopsikososial kultural secara menyeluruh yang berfokus kepada perempuan (Yulifah dan Surachmindari, 2014).

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian keputusan yang berfokus pada klien. Manajemen kebidanan menyangkut pemberian pelayanan yang utuh dan menyeluruh dari bidan kepada kliennya, yang merupakan suatu proses manajemen kebidanan yang

diselenggarakan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas melalui tahapan dan langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan data-data, memberikan pelayanan yang benar sesuai dengan keputusan tindakan klinik yang dilakukan dengan tepat (Sianturi , 2015:61).

2. Langkah-Langkah Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Varney2015, proses manajemen kebidanan terdiri dari 7 (tujuh) langkah/step, yaitu sebagai berikut:

Langkah 1: pengumpulan data dasar

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, yaitu riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, serta meninjau data laboratorium dan membandingkan dengan hasil studi.

Pada keadaan tertentu dapat terjadi langkah pertama *overlap* dengan langkah 5 dan 6 (atau menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut), karena data yang diperlukan diambil dari hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan diagnostik yang lain.

Pada langkah ini penulis tidak merasa ada hambatan dalam pengumpulan data dasar awal yang lengkap karena adanya kerja sama yang baik antara orang tua bayi, perawat, bidan dan dokter yang ada diruangan

untuk mendapatkan informasi atau datadari orang tua bayi yaitu nama/identitas lengkap, serta ibu mengatakan bayinya lahir tanggal 7 agustus 2017 jam 09.00 Wita dengan kaki/tangan teraba dingin dengan usia gestasi 39 minggu 4 hari, bayi telah dirawat dibawah infant warmer,JK: perempuan, BB: 2800 gram, PB: 48 cm, AS: 8/9 dan pengukuran antropometri dan melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik sesuai dengan penyakit pada bayi tersebut sehingga memudahkan tindakan selanjutnya.

a. Pengkajian setelah lahir

Pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji adaptasi bayi baru lahir dari kehidupan dalam uterus ke kehidupan luar uterus yaitu dengan penilaian APGAR, meliputi:

Tabel 2.4 Penilaian Apgar Score Pada Bayi Baru Lahir

Tanda	0	1	2
Appearance	Biru, pucat tungkai biru	Badan pucat,muda	Semuanya merah
Pulse	Tidak teraba	<100	>100
Grimace	Tidak ada	Lambat	Menangis kuat
Activity	Lemas/lumpuh	Gerakan sedikit/fleksi tungkai	Aktif/fleksi tungkai baik/reaksi melawan
Respiratory	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Baik, menangis kuat

Hasil nilai APGAR skor dinilai setiap variabel dinilai dengan angka 0, 1 dan 2, nilai tertinggi adalah 10, selanjutnya ditentukan keadaan bayi:Nilai 7-10 menunjukkan bayi baik (vigorous baby), Nilai 4-6 menunjukkan depresi sedang dan membutuhkan tindakan resusitasi,

Nilai 0-3 menunjukkan bayi mengalami depresi serius dan membutuhkan resusitasi segera sampai ventilasi.

b. Pengkajian keadaan fisik

Data subjektif bayi baru lahir yang harus dari riwayat kesehatan bayi baru lahir yang penting adalah:

1. Faktor genetik
2. Faktor maternal (ibu)
3. Faktor antenatal
4. Faktor perinatal

Data objektif bayi baru lahir yang harus dikumpulkan antaralain :

1) Pemeriksaan umum

Pengukuran antropometri yaitu pengukuran lingkaran kepala yang dalam keadaan normal berkisar 33-35 cm, LD: 30,5-33 cm, PB: 45-50 cm dan BB bayi 2500-4500 gram.

2) Pemeriksaan tanda-tanda vital

Suhu tubuh, nadi, pernafasan bayi baru lahir bervariasi dalam berespon terhadap lingkungan.

a) Suhu bayi

Suhu bayi dalam keadaan normal berkisar antara 36,5-37,5 °C pada pengukuran diaksila.

b) Nadi

Denyut nadi bayi yang normal berkisar 120-140 kali permenit.

c) Pernafasan

Pernafasan pada bayi baru lahir tidak teratur kedalaman, kecepatan, iramanya. Pernafasannya bervariasi dari 30 sampai 60 kali permenit.

d) Tekanan darah

Tekanan darah bayi baru lahir rendah dan sulit untuk diukur secara adekuat. Rata-rata tekanan darah pada waktu lahir adalah 80/64 mmHg.

3) Pemeriksaan fisik secara sistematis (head to toe)

Pemeriksaan fisik secara sistematis pada bayi baru lahir dimulai dari:

1. Kepala

Periksa adanya trauma kelahiran misalnya: caput suksedaneum, sefalhematoma, perdarahan subaponeurotik/fraktur tulang tengkorak.

2. Telinga

Periksa dan pastikan jumlah, bentuk dan posisinya pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah (low set ears) terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu.

3. Mata

Periksa adanya trauma seperti palpebra, perdarahan konjungtiva atau retina, adanya secret pada mata, konjungtivitis

oleh kuman gonokokus dapat menjadi panoftalmia dan menyebabkan kebutaan.

4. Hidung atau mulut

Bibir bayi baru lahir harus kemerahan dan lidahnya harus rata dan simetris, bibir dipastikan tidak adanya sumbing dan langit-langit harus tertutup. Refleksi hisap bayi harus bagus, dan berespon terhadap rangsangan.

5. Leher

Ukuran leher normalnya pendek dengan banyak lipatan tebal. Periksa adanya pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Adanya lipatan kulit yang berlebihan dibagian belakang leher menunjukkan adanya kemungkinan trisomi 21.

6. Dada

Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Apabila tidak simetris kemungkinan bayi mengalami pneumotorik, paresis diafragma atau hernia diafragmatika. Pernafasan yang normal dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan.

7. Bahu, lengan dan tangan

Periksa jumlah jari. Perhatikan adanya plidaktil atau sidaktil. Telapak tangan harus dapat terbuka, garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom seperti trisomi.

8. Perut

Perut tampak harus bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Kaji adanya pembengkakan, jika perut sangat cekung kemungkinan terdapat hernia diafragma.

9. Kelamin

Pada lekukan labia mayora normalnya menutupi labia minora dan klitoris. Klitoris normalnya menonjol. Pada bayi laki-laki rugae normalnya tampak pada skrotum dan kedua testis turun ke dalam skrotum.

10. Ekstremitas atas dan bawah

Ekstremitas bagian atas normalnya fleksi dengan baik dengan gerakan yang simetris. Refleks menggengam normalnya ada. Ekstremitas bagian bawah normalnya pendek, bengkok dan fleksi dengan baik. Nadi femoralis dan pedis normalnya ada.

11. Punggung

Periksa spina dengan cara menelungkupkan bayi, cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan atau cekungan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas, medulla spinalis atau kolumna vertebrata.

12. Kulit

Verniks (tidak perlu dibersihkan karena untuk menjaga kehangatan tubuh bayi), warna, pembengkakan atau bercak-bercak hitam, tanda-tanda lahir. Perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi kurang bulan.

13. Refleksi

Refleksi berkedip, batuk, bersin, dan muntah ada pada waktu lahir dan tetap tidak berubah sampai dewasa. Beberapa refleksi lain normalnya ada waktu lahir, yang menunjukkan imaturitas neurologis, Tidak adanya refleksi- refleksi ini menandakan masalah neurologis yang serius.

Langkah 2 : Identifikasi diagnosis/masalah actual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi/interpretasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis aktual terhadap bayi baru lahir yaitu APGAR score, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital serta di temukannya aspek pada BBL diantara di dalam teori dikatakan bahwa tanda-tanda hipotermia yaitu Suhu badan <36 derajat celcius, Seluruh badan terasa dingin disertai gejala, Bayi tampak lesu atau mengantuk, Mengantuk dan letargis, Kemampuan menghisap lemah. Adanya diagnosa masalah aktual yang dapat diidentifikasi pada BBL dengan hipotermia.

Langkah 3: Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial

Pada langkah ini mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa potensial lain yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, jika memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis atau masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian diagnosa atau masalah potensial pada BBL adalah berpotensi terjadi hipotermia. Hipotermia adalah bayi yang kaki dan tangannya terasa dingin dan sering menangis karena produksi panas yang kurang akibat sirkulasi masih belum sempurna, respirasi masih lemah dan konsumsi oksigen rendah, inaktifitas otot serta asupan makanan rendah. Faktor lain dikarenakan kehilangan panas yang tinggi.

Komplikasi yang mungkin akan terjadi seperti: hipoglikemia asidosis metabolik, karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob, kebutuhan oksigen yang meningkat, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermia berat, Shok.

Langkah 4 : Identifikasi Kebutuhan Yang Memerlukan Penanganan Segera

Mengeidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim yang lain yang sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan dari data yang dikumpulkan dapat menunjukkan satu situasi yang memerlukan tindakan segera sementara yang lain harus menunggu intervensi sesuai kebutuhan klien yaitu penanganan segera pada bayi baru lahir dengan hipotermia seperti: kontak kulit dengan kulit, perawatan metode kangguru (PMK), Inisiasi menyusui dini (IMD) dan inkubator.

Langkah 5: Merencanakan Asuhan Yang Menyeluruh

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi tentang hal yang sudah diidentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap bayi tersebut tentang hal yang akan terjadi berikutnya.

Pada langkah ini perlu asuhan yang menyeluruh adapun penanganan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kehilangan panas dari tubuh bayi adalah:

1. Keringkan bayi secara seksama

Pastikan tubuh bayi dikeringkan segera setelah bayi lahir untuk mencegah kehilangan panas secara evaporasi. Selain untuk menjaga kehangatan tubuh bayi, mengeringkan dengan menyeka tubuh bayi juga merupakan rangsangan taktil yang dapat merangsang pernafasan bayi.

2. Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat

Bayi yang di selimuti kain yang sudah basah dapat terjadi kehilangan panas secara konduksi. Untuk itu setelah mengeringkan tubuh bayi, ganti kain tersebut dengan selimut atau kain yang bersih, kering dan hangat.

3. Tutup bagian kepala bayi

Bagian kepala bayi merupakan permukaan yang relatif luas dan cepat kehilangan panas. Untuk itu tutupi bagian kepala bayi agar bayi tidak kehilangan panas.

4. Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya

Selain untuk memperkuat jalinan kasih sayang ibu dan bayi, kontak kulit antara ibu dan bayi akan menjaga kehangatan tubuh bayi. Untuk itu anjurkan ibu untuk memeluk bayinya.

5. Perhatikan cara menimbang bayi atau jangan segera memandikan bayi baru lahir

1. Menimbang bayi tanpa alas timbangan dapat menyebabkan bayi mengalami kehilangan panas secara konduksi. Jangan biarkan bayi ditimbang telanjang. Gunakan selimut atau kain bersih.
2. Bayi baru lahir rentan mengalami hipotermi untuk itu tunda memandikan bayi hingga 6 jam setelah lahir.
 - a. Tempatkan bayi dilingkungan yang hangat

Jangan tempatkan bayi di ruang ber-AC. Tempatkan bayi bersama ibu (*rooming in*). Jika menggunakan AC, jaga suhu ruangan agar tetap hangat.

- b. Jangan segera memandikan bayi baru lahir

Bayi baru lahir akan cepat dan mudah kehilangan panas karena sistem pengaturan panas di dalam tubuhnya belum sempurna. Bayi sebaiknya di mandikan minimal enam jam setelah lahir. Memandikan bayi dalam beberapa jam pertama setelah lahir dapat menyebabkan hipotermia yang sangat membahayakan kesehatan bayi baru lahir (Indrayani, 2013).

Langkah 6: Melaksanakan Perencanaan

Pada langkah ke-6 ini, perencanaan yang menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian oleh klien atau anggotatim kesehatan lainnya dalam menangani klien. Langkah ini memerlukan pelaksanaan asuhan kebidanan pada BBL sesuai tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dan

memerlukan tindakan segera sesuai kebutuhan klien dan memberikan penanganan yang baik sesuai standar operasional kesehatan.

Langkah 7: Evaluasi

Pada langkah ke-7 ini dilakukan keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan terhadap bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Evaluasi merupakan tahapan akhir dari asuhan kebidanan yang penting guna mengetahui sejauh mana kemajuan dan keberhasilan telah dicapai dalam evaluasi dan pemantauan dalam perencanaan tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif pelaksanaannya.

Mengevaluasi apakah penanganan bayi baru lahir dengan hipotermia telah diberikan dengan semaksimal mungkin dan komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu:

1. Subjektif (S)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data melalui anamnesis, merupakan suatu ekspresi pasien tentang kekhawatiran

dan keluhan yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosis.

2. Objektif (O)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, dan tes diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung *assesment*.

3. Assesment (A)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan analisis dan interpretasi, objektif dalam suatu identifikasi. Yaitu: Diagnosis/masalah, antisipasi diagnosis lain/masalah potensial.

4. Planning (P)

Menggambarkan pendokumentasian hasil perencanaan yang telah dilakukan merupakan ringkasan dari langkah 5, 6 dan 7 dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana planning ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien.

Pemantauan ulang dilakukan pada bayi untuk mengetahui kondisi apakah mengalami perubahan atau tidak dengan melakukan pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital: seperti denyut jantung, suhu, pernafasan serta pengukuran antropometri yaitu: berat badan, lingkaran kepala, panjang badan, lingkaran dada, lingkaran perut, lingkaran lengan atas dengan melakukan kunjungan rumah kurang lebih selam 2 hari.

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIRPADA
BAYI NY "S" DENGAN HIPOTERMIA SEDANGDI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 7 SD 9AGUSTUS 2017

No. Register : 46xxx
Tgl lahir : 7 agustus 2017, Pukul 09.00 Wita
Tgl pengkajian : 7 agustus 2017, Pukul 09.00 Wita
Nama pengkaji : Eka murdiana
LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

I. Identifikasi Bayi dan Orangtua

1) Identitas Bayi

Nama : Bayi "S"
Umur : 0 hari
Tanggal lahir : 7 agustus 2017, Pukul 09.00 Wita
Anak ke : ke tiga

2) Identitas orang tua

Nama : Ny."S" / Tn. "J"

Umur : 27 tahun / 37 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / S1
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Syekh Yusuf Raya.

2. Data Biologis / Fisiologis

1. Keadaan bayi setelah lahir baik, lahir secara spontan, segera menangis, warna kulit kemerahan, gerakan aktif sedikit, rangsangan taktil dengan apgar score 8/9
2. Riwayat kehamilan dan persalinan
 - a) Prenatal
 1. Ibu mengatakan HPHT: 02-11-2016 dengan HTP: 09-08-2017
 2. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 7 agustus 2017, pukul 09.00
Wita
 3. Umur kehamilan ibu cukup bulan dengan usia gestasi: 39 minggu 4 hari
 4. Pemeriksaan ANC sebanyak 5 kali di Puskesmas Somba Opu
 - Trimester I : 2 kali
 - Trimester II : 1 kali
 - Trimester III : 2 kali

5. Ibu mengatakan telah mendapat imunisasi TT (Tetanus Toxoid) sebanyak 2 kali pada umur kehamilan TT1:20 minggu dan TT2: 24 minggu di Puskesmas somba Opu
6. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, asma, DM, dan penyakit menular seksual
7. Ibu memiliki riwayat penyakit hipertensi selama kehamilan
8. Selama hamil ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat

b) Natal

1. Berat badan bayi : 2800 gram
2. Panjang badan : 48 cm
3. Keadaan umum bayi baik, bayi lahir tanggal 7 agustus 2017, Pukul 09.00 Wita
4. Bayi lahir spontan, normal, segera menangis, gerakan aktif sedikit, bayi tampak lesu atau mengantuk, kaki/ tangan dingin disertai gerakan bayi kurang dari normal.
5. Bayi dirawat dibawah *infant warmer* sesuai standar prosedur dan bayi memiliki apgar score 8/9

3. Riwayat pemenuhan/ kebutuhan dasar bayi

1. Nutrisi / cairan

Kebutuhan nutrisi / cairan bayi sementara diperoleh dari pemberian asi eksklusif oleh ibu karena refleks isap bayi sudah baik

2. Personal Hygiene

Bayi belum dimandikan, rambut bayi belum pernah dicuci dan pakaian bayidiganti tiap kali basah / habis BAK/BAB

3. Eliminasi

BAK: Bayi sudah BAK selama pengkajian, frekuensi BAK 2 kali selama

Pengkajian, warna kuning jernih dengan bau amoniak

BAB: Bayi belum pernah BAB selama pengkajian

4. Istirahat

Bayi lebih banyak tidur dan terbangun jika bayi lapar

5. Imunisasi

Pemberian imunisasi pertama bayi yaitu: HBo

4. Pemeriksaan Fisik

1. Pertumbuhan

BB : 2800 gram

PB : 48 cm

2. Tanda-tanda Vital

Denyut jantung : 138x/i

Pernafasan : 54x/i

Suhu badan : 35°C

3. Kepala : Simetris kiri dan kanan UUB belum menutup, rambut hitam, tipis dan halus, tidak ada caput succadeneum
4. Mata : Simetris kiri dan kanan, pupil mata bereaksi dengan baik, sclera putih dan tidak ikhterus
5. Hidung : Simetris kiri dan kanan, bernafas tanpa kesulitan, tidak ada cuping hidung, tampak bersih dan tidak ada kelainan
6. Telinga : Simetris kiri dan kanan, terbentuk dengan baik, struktur telinga lengkap, tidak ada benjolan
7. Mulut : Bibir kemerahan-merahan, bibir tidak sumbing, Refleks isap baik dan pallatum terbentuk baik
8. Leher : Tidak ada pembesaran, pembengkakan, dan peradangan
9. Dada dan perut : Simetris kiri dan kanan, gerakan dada sesuai nafas bayi, tidak ada tonjolan pada dada bayi, tonus otot bayi kurang baik, tali pusat masih basah
10. Bahu dan lengan atas : Jumlah jari lengkap, refleks menggenggam baik
11. Genitalia dan anus : Labia mayora sudah menutupi labia minora, lubang anus ada
12. Ektremitas
 - a. Tangan : Pergerakan baik, jari tangan kiri dan kanan lengkap, refleks menggenggam baik

b. Kaki : Pergerakan aktif, Jari-jari kaki kiri dan kanan lengkap, refleks babinsky dan refleks moro baik

c. Pengukuran antropometri:

Hasil: LK: 33 cm, LD: 32 cm, LP: 29 cm, Lila: 11 cm

d. Dari Maturitas Kematangan Fisik dan Neuromuskular Bayi yang dinilai dari Ballard Score

Hasil: 39 minggu 4 Hari

e. LubchencoBB: 2800 gram, dengan usia kehamilan 39 minggu, maka kesimpulannya bayi adalah “Appropriate For Gestasional Age”/ Bayi Sesuai masa kehamilan.

LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

Diagnosa Aktual

1. BCB / SMK / Lahir Normal/ Hipotermia Sedang

DS:

- a. Ibu mengatakan HPHT tanggal: 09-08-2017
- b. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 7 agustus 2017, pukul 09.00 Wita

DO:

- a. Usia gestasi: 39 minggu 4 hari
- b. Bayi lahir tanggal 7 agustus 2017
- c. BBL: 2800 gram, PB: 48 cm, A/S: 8/9.

Analisa Dan Interpretasi Data

Bayi baru lahir normal, cukup bulan, Hipotermia Sedang

Masalah aktual

2. Bayi baru lahir dengan hipotermia sedang

DS: Bayi lahir tanggal 7 agustus 2017, Pukul 09.00 Wita

DO:

1. Kaki / tangan dingin disertai gerakan bayi kurang dari normal, lesu dan mengantuk
2. Bayi dirawat dibawah infant warmer
3. Bayi diberi susu dengan ASI (air susu ibu) secara eksklusif.

Analisa dan Interpretasi Data

1. Gangguan termoregulasi karena pada bayi baru lahir memiliki kemampuan terbatas untuk menggigil dan tidak mampu meningkatkan aktifitas volunter otot untuk menghasilkan panas sehingga bayi harus dirawat dengan cara IMD (Inisiasi Menyusui Dini).
2. Pelukan ibu pada tubuh bayi dapat menjaga kehangatan tubuh dan mencegah kehilangan panas serta kehangatan tubuh ibu merupakan sumber panas yang efektif.

Langkah III: Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

1. Potensi terjadi syok

DS :

1. Ibu mengatakan bayi lahir tanggal 7 agustus 2017
2. Ibu mengatakan bayi lahir segera menangis, gerakan kurang aktif, kaki / tangan teraba dingin dan dirawat dibawah infant warmer dan IMD

DO :

1. BB: 2800 gram, DJ: 138x/I, S: 35°C, P:54x/i
2. Bayi telah diletakkan didada ibu untuk dilakukan IMD.

Analisa Dan Interpretasi Data

Syok adalah suatu keadaan disebabkan gangguan sirkulasi darah ke dalam jaringan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan dan tidak mampu mengeluarkan hasil metabolisme, dan penyebab syok yaitu: emboli air ketuban, udara / thrombus.

DO:

1. Tali pusat belum puput dan masih basah
2. BB: 2800 gram, PB: 48 cm
3. HR: 138x/I, S: 35°C, P: 54x/i

Analisa dan Interpretasi data

Masa transisi bayi merupakan masa yang sangat kritis pada bayi dalam upaya untuk dapat bertahan hidup. Bayi baru lahir harus beradaptasi dengan kehidupan diluar uterus yang suhunya jauh lebih dingin bila dibandingkan suhu didalam uterus yang relatif lebih hangat sekitar 37°C. kemampuan bayi baru lahir belum sempurna dalam mengendalikan suhu secara adekuat, bahkan jika bayi lahir saat cukup bulan dan sehat pun masih sangat rentan untuk kehilangan panas.

Langkah IV: Tindakan Segera / Kolaborasi

Tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera

Langkah V: Rencana tindakan

Tujuan Asuhan:

1. Menghangatkan dan mempertahankan suhu tubuh bayi dengan infant warmer
2. Mencegah kehilangan panas dengan IMD
3. Tidak terjadi syok

Kriteria :

1. Suhu badan bayi lebih normal
2. Menjalin / memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi
3. Memberikan kekebalan pasif yang segera kepada bayi melalui kolostrum merangsang kontraksi uterus.

Rencana asuhan :

Tanggal 7 agustus 2017, Pukul 09.40 Wita.

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Rasional : Tangan yang kotor dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme dimana apabila menyentuh pasien dapat terkontaminasi

2. Observasi tanda-tanda vital

Rasional : Tanda-tanda vital memberikan gambaran dalam menentukan tindakan selanjutnya

3. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya

Rasional : Pemberian ASI dan susu tambahan (formula) secara teratur sangat membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi.

4. Menjelaskan cara menjaga kehangatan suhu tubuh bayi dengan IMD

Rasional: Perawatan bayi dengan IMD akan meningkatkan tali kasih antara ibu dan bayi serta dapat memberikan kekebalan pasif melalui kolostrum

5. Menjelaskan tanda bahaya bayi baru lahir

Rasional : Untuk mengurangi angka kematian bayi yang dapat disebabkan oleh hipotermia

6. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi nol hari sampai 6 bulan

Rasional : Rangsangan oleh hisapan bayi dapat merangsang hipofisis posterior mengeluarkan hormon oksitosin untuk sekresi ASI dan hipofisis anterior untuk merangsang hormon prolaktin untuk produksi ASI

7. Menjelaskan cara perawatan tali pusat

Rasional: Adanya luka yang terbuka dan lembab dapat terjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme

8. Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pakaian / popok bayi setiap kali basah

Rasional: Pakaian bayi akan mempengaruhi suhu badan yang dapat mengakibatkan evaporasi

9. Melakukan observasi eliminasi bayi

Rasional: Untuk mengetahui keseimbangan antara intake dan output

10. Mengkaji tanda-tanda infeksi

Rasional: Bayi masih sangat rentan terhadap infeksi, terutama pada tali pusat yang dapat menjadi tempat masuknya mikroorganisme

11. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang

Hasil: kecukupan asupan gizi pada ibu menyusui sangat mempengaruhi produksi asi

12. Ajarkan pada ibu cara menyusui yang benar

Hasil: agar ibu tahu cara menyusui yang benar dan bayi merasa puas

13. Anjurkan ibu untuk selalu menjaga personal hygiene pada bayi dan dirinya

Hasil: untuk mencegah terjadinya infeksi

14. Memberitahu ibu tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yang harus diwaspadai

Hasil: agar ibu mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir yang dapat menyebabkan kematian

15. Mengajarkan pada ibu cara perawatan tali pusat

Hasil: agar tidak terjadi infeksi tali pusat seperti: merah, bengkak, bernanah, serta mengeluarkan darah.

16. Anjurkan ibu cara menyusui bayinya secara on demand

Hasil: agar bayi mendapatkan ASI sebagai nutrisi penting

17. Anjurkan ibu dan keluarga menjaga kebersihan bayinya

Hasil: ibu senantiasa ingin selalu mengurus bayinya

18. Melakukan pendokumentasian

Hasil: telah dicatat sebagai hasil pendokumentasian

Langkah VI: Implementasi

Tanggal 7 Agustus 2017, Pukul 09.40 Wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil: Petugas sudah mencuci tangan

2. Lalu Bayi dirawat di bawah infant warmer sesuai suhu yang telah ditetapkan

Hasil: Bayi telah berada dibawah Infant Warmer

3. Observasi tanda-tanda vital telah dilakukan

Hasil: DJ:148x/i, P:44x/i, S: 36,8°C

4. Mengajarkan ibu untuk memberikan asi pada bayinya

Hasil: bayi sudah menetek pada ibunya

5. Menjaga suhu tubuh bayi dengan cara IMD

Hasil: bayi telah diletakkan didada ibu selama 1 jam untuk dilakukan IMD

6. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya pada bayi baru lahir

Hasil: ibu telah mengerti dan mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir

7. Mengajarkan ibu untuk memberikan asi eksklusif nol hari sampai 6 bulan

Hasil: ibu mau menyusui bayinya secara eksklusif mulai nol hari sampai 6 bulan

8. Merawat tali pusat

Hasil: tali pusat belum puput, masih basah, nampak bersih

9. Mengganti popok bayi saat basah

Hasil: bayi sudah memakai popok

10. Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil: Bayi telah BAK satu kali dan BAB belum pernah sejak lahir sampai pengkajian

11. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

12. Mengajarkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

13. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu paham mengenai cara menyusui yang benar

14. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya

Hasil: Ibu bersedia menjaga kebersihannya

15. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yang harus diwaspadai

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Pernafasan 60 x/i | f. Mengantuk berlebihan |
| b. Terlalu panas | g. Bayi sering muntah |
| c. Tali pusat: Merah, bengkak, bernanah | h. Tidak BAK selama 24 jam |
| d. Tidak BAB selama 2 hari | i. Kejang |
| e. Hisapan lemah | k. Menggigil Dan Menangis |

Hasil: Ibu mengerti dan tahu tanda-tanda bahaya bagi bayi

16. Mengajarkan cara merawat tali pusat yaitu dengan sebelum dan sesudah memegang bayi, selalu mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dibawah air mengalir, tidak memberi apapun pada tali pusat, rawat tali pusat secara terbuka dan kering, bila tali pusat kotor/ basah cuci dengan air bersih dan sabun mandi kemudian keringkan.

Hasil: Ibu mengerti apa yang diajarkan.

17. Menganjurkan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara on demand

Hasil: ibu mengerti apa yang diajarkan

18. Menganjurkan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

19. Melakukan pendokumentasian

Hasil: sudah dilakukan pendokumentasian.

Langkah VII Evaluasi

Tanggal 7 agustus 2017, pukul 09.45 Wita

1. Bayi dalam keadaan hangat dengan cara bayi dirawat di bawah infant warmer
2. Bayi tidak mengalami syok karena telah dibantu dengan PMK dan ditandaibayi telah menyusui pada ibunya
3. Tidak terjadi infeksi tali pusat ditandai dengan tidak adanya merah, bengkak, panas, nyeri, dan tidak ada pengeluaran pus/nanah.
4. Keadaan bayi baik

DJ: 148x/i, P: 44x/I, S: 36,8°C

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY
"S" DENGAN HIPOTERMIA SEDANG DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 7 AGUSTUS 2017

No Register : 46xxx
Tgl Lahir : 7 agustus 2017, pukul 09.00 Wita
Tgl Pengkajian : 7 agustus 2017, pukul 09.00 Wita
Nama pengkaji : Eka Murdiana

A. Pengkajian Dan Analisa Data Dasar

I. Identitas bayi dan Orang tua

1) Identitas Bayi

Nama : Bayi "S"
Umur : 0 hari
Tanggal lahir : 7 agustus 2017, Pukul 09.00 Wita
Anak ke : ke tiga

2) Identitas orang tua

Nama : Ny."S" / Tn. "J"
Umur : 27 tahun / 37 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Syekh Yusuf Raya.

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya lahir tanggal 7 agustus 2017, Pukul 09.00 Wita
2. Ibu mengatakan HPHT tanggal 02-11-2016

Data Objektif (O)

1. Masa gestasi 39 minggu 4 hari
2. Bayi lahir tanggal 7 agustus 2017
3. BB: 2800 gram, PB: 48 cm
4. Bayi dirawat dibawah infant warmer
5. TTV bayi:

HR : 138 x/i

S : 36,7°C

P : 54 x/i

Assessment (A)

1. BCB/SMK lahir normal
2. Potensi terjadinya syok

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil: Petugas sudah mencuci tangan

2. Observasi tanda-tanda vital telah dilakukan

Hasil: DJ:138x/i, P:54x/i, S: 36,7°C

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi pada bayinya

Hasil: bayi sudah menetek pada ibunya

4. Menjaga suhu tubuh bayi dengan cara IMD

Hasil: bayi telah diletakkan didada ibu selama 1 jam untuk dilakukan IMD

5. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya pada bayi baru lahir

Hasil: ibu telah mengerti dan mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir

6. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi eksklusif nol hari sampai 6 bulan

Hasil: ibu mau menyusui bayinya secara eksklusif mulai nol hari sampai 6 bulan

7. Merawat tali pusat

Hasil: tali pusat belum puput, masih basah, nampak bersih

8. Mengganti popok bayi saat basah

Hasil: bayi sudah memakai popok

9. Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil: Bayi telah BAK satu kali dan BAB belum pernah sejak lahir sampai pengkajian

10. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

11. Mengajukan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi
Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan
12. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar
Hasil: Ibu paham mengenai cara menyusui yang benar
13. Mengajukan kepada ibu untuk menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya
Hasil: Ibu bersedia menjaga kebersihannya
14. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yang harus diwaspadai
Hasil: Ibu mengerti dan tahu tanda-tanda bahaya bagi bayi
15. Mengajarkan cara merawat tali pusat yaitu dengan sebelum dan sesudah memegang bayi, selalu mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dibawah air mengalir, tidak memberi apapun pada tali pusat, rawat tali pusat secara terbuka dan kering, bila tali pusat kotor/ basah cuci dengan air bersih dan sabun mandi kemudian keringkan.
Hasil: Ibu mengerti apa yang diajarkan.
16. Mengajukan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara on demand
Hasil: ibu mengerti apa yang diajarkan
17. Mengajukan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi
Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
18. Melakukan pendokumentasian
Hasil: sudah dilakukan pendokumentasian.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY
''S'' DENGAN HIPOTERMIA SEDANG DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 8 AGUSTUS 2017

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya lahir tanggal 7 agustus 2017, Pukul 09.00 Wita
2. Ibu mengatakan HPHT tanggal 02-11-2016

Data Objektif (O)

1. Masa gestasi 39 minggu 4 hari
2. Bayi lahir tanggal 7 agustus 2017
3. BB: 2940 gram, PB: 48 cm
4. Bayi dirawat dibawah infant warmer

5. TTV bayi:

HR : 134 x/i

S : 36.6°C

P : 58 x/i

1. BCB/SMK lahir normal
2. Potensi terjadinya syok

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi
Hasil: Petugas sudah mencuci tangan
2. Observasi tanda-tanda vital telah dilakukan
Hasil: DJ:134x/i, P:58x/i, S: 36,6°C
3. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi pada bayinya
Hasil: bayi sudah menetek pada ibunya
4. Menjaga suhu tubuh bayi dengan cara IMD
Hasil: bayi telah diletakkan didada ibu selama 1 jam untuk dilakukan IMD
5. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya pada bayi baru lahir
Hasil: ibu telah mengerti dan mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir
6. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi eksklusif nol hari sampai 6 bulan
Hasil: ibu mau menyusui bayinya secara eksklusif mulai nol hari sampai 6 bulan
7. Merawat tali pusat
Hasil: tali pusat belum puput, masih basah, nampak bersih
8. Mengganti popok bayi saat basah
Hasil: bayi sudah memakai popok
9. Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil: Bayi telah BAK satu kali dan BAB belum pernah sejak lahir sampai pengkajian

10. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

11. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

12. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu paham mengenai cara menyusui yang benar

13. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya

Hasil: Ibu bersedia menjaga kebersihannya

14. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yang harus diwaspadai

Hasil: Ibu mengerti dan tahu tanda-tanda bahaya bagi bayi

15. Mengajarkan cara merawat tali pusat yaitu dengan sebelum dan sesudah memegang bayi, selalu mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dibawah air mengalir, tidak memberi apapun pada tali pusat, rawat tali pusat secara terbuka dan kering, bila tali pusat kotor/ basah cuci dengan air bersih dan sabun mandi kemudian keringkan.

Hasil: Ibu mengerti apa yang diajarkan.

16. Menganjurkan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara on demand

Hasil: ibu mengerti apa yang diajarkan

17. Menganjurkan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

18. Melakukan pendokumentasian

Hasil: sudah dilakukan pendokumentasian.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY
''S'' DENGAN HIPOTERMIA SEDANG DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 9 AGUSTUS 2017

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya lahir tanggal 7 agustus 2017, Pukul 09.00 Wita
2. Ibu mengatakan HPHT tanggal 02-11-2016

Data Objektif (O)

1. Masa gestasi 39 minggu 4 hari
2. Bayi lahir tanggal 7 agustus 2017
3. BB: 3000 gram, PB: 48 cm
4. Bayi dirawat dibawah infant warmer
5. TTV bayi:

HR : 140 x/i

S : 36, 8°C

P : 52 x/i

Assessment (A)

1. BCB/SMK lahir normal
2. Potensi terjadinya syok

Planning (P)

77

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi
Hasil: Petugas sudah mencuci tangan
2. Observasi tanda-tanda vital telah dilakukan
Hasil: DJ:140x/i, P:52x/i, S: 36,8°C
3. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi pada bayinya
Hasil: bayi sudah menetek pada ibunya
4. Menjaga suhu tubuh bayi dengan cara IMD
Hasil: bayi telah diletakkan didada ibu selama 1 jam untuk dilakukan IMD
5. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya pada bayi baru lahir
Hasil: ibu telah mengerti dan mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir
6. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi eksklusif nol hari sampai 6 bulan
Hasil: ibu mau menyusui bayinya secara eksklusif mulai nol hari sampai 6 bulan
7. Merawat tali pusat
Hasil: tali pusat belum puput, masih basah, nampak bersih

8. Mengganti popok bayi saat basah

Hasil: bayi sudah memakai popok

9. Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil: Bayi telah BAK satu kali dan BAB belum pernah sejak lahir sampai pengkajian

10. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

11. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

12. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu paham mengenai cara menyusui yang benar

13. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya

Hasil: Ibu bersedia menjaga kebersihannya

14. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yang harus diwaspadai

Hasil: Ibu mengerti dan tahu tanda-tanda bahaya bagi bayi

15. Mengajarkan cara merawat tali pusat yaitu dengan sebelum dan sesudah memegang bayi, selalu mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dibawah air mengalir, tidak memberi apapun pada tali pusat, rawat tali pusat secara terbuka dan kering, bila tali pusat kotor/ basah cuci dengan air bersih dan sabun mandi kemudian keringkan.

Hasil: Ibu mengerti apa yang diajarkan.

16. Menganjurkan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara on demand

Hasil: ibu mengerti apa yang diajarkan

17. Menganjurkan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

18. Melakukan pendokumentasian

Hasil: sudah dilakukan pendokumentasian.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pada pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny "S" Dengan Hipotermia Sedang di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tanggal 7 agustus 2017. Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan 7 langkah Varney dengan uraian sebagai berikut:

I. Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen kebidanan yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi serta pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium dan pemeriksaan diagnostik. Pada tahap ini disebabkan karena respon ibu dalam memberikan informasi begitu pula dengan keluarga, bidan dan dokter yang merawat sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang

diinginkan. Data diperoleh secara terfokus pada masalah klien sehingga intervensinya juga lebih terfokus sesuai keadaan klien.

Menurut teori yang ada bahwa hipotermia pada BBL merupakan proses penyesuaian yang dilakukan oleh bayi dari intrauterin ke ekstrauterin ini hal yang fisiologis pada bayi baru lahir. Hipotermia adalah bayi yang kaki dan tangannya teraba dingin dan sering menangis karena produksi panas yang kurang akibat sirkulasi masih belum sempurna, respirasi lemah, konsumsi oksigen rendah, inaktivitas otot lemah serta asupan makanan rendah. Keterkaitan antara ibu dan bayi sehingga mengalami hipotermia ialah dari ibu: kurangnya pengetahuan tentang asupan atau nutrisi ketika hamil, kurang pengetahuan dari kader kesehatan dan dukung terlatih, merasa acuh tak acuh, kurangnya dukungan moral dari keluarga dan suami, faktor keuangan dan jauhnya tempat pelayanan kesehatan dari tempat tinggal ibu hamil tersebut. Dari bayi: sistem imunologi yang belum matang sehingga mudah terjadi infeksi pada BBL yaitu baik dari alat medis, penolong, ibu, suami, keluarga yang turut hadir serta petugas kesehatan lainnya, kemudian perbandingan luas permukaan dengan berat badan lebih besar, serta pada BBL tidak memiliki respon menggigil pada reaksi kedinginan dan dapat ditentukan dari usia gestasi dengan perbandingan berat badan lahir bayi tersebut.

Hipotermia umumnya terjadi pada bayi baru lahir terutama yang prematur, yang belum mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dengan suhu lebih rendah dari suhu didalam perut ibunya (Wahyuni S, 2012: 28).

Berdasarkan studi kasus pada bayi Ny "S" dengan hipotermia sedang dapat ditemukan bayi dalam keadaan kurang baik, ibu ingin mempertahankan suhu tubuh bayinya agar tetap normal, ibu ingin menjaga suhu tubuh bayinya dengan IMD, mengganti pakaian / popok bayi jika basah atau lembab, ibu akan memberikan ASI eksklusif sebagai nutrisi pertama pada bayinya. Ini dapat dilihat dari respon dan sikap ibu yang terbuka untuk memberikan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan keadaan bayi Ny "S" apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

2. Identifikasi Diagnosa / Masalah aktual

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah. Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien.

Pada tinjauan pustaka dikatakan bahwa bayi akan mengalami syok karena disebabkan oleh gangguan termoregulasi atau kemampuan untuk mempertahankan panas dan produksi panas yang masih terbatas disamping itu jaringan lemak subkutan yang tipis, respirasi lemah, serta luas permukaan tubuh relatif lebih besar dibandingkan berat badan sehingga mudah kehilangan panas. Adapun mekanisme kemungkinan hilangnya panas tubuh dari bayi ke

lingkungannya adalah konduksi: panas hilang dari tubuh bayi ke benda sekitarnya yang kontak langsung dengan tubuh bayi, konveksi: panas hilang dari tubuh bayi ke udara sekitarnya yang sedang bergerak, radiasi: panas dipancarkan dari BBL dari tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin, evaporasi: panas hilang melalui proses penguapan tergantung kepada kecepatan dan kelembaban udara (Indrayani, 2013).

Sedangkan pada studi kasus pada bayi Ny "S" ditemukan bayi kaki / tangan teraba dingin serta gerakan kurang dari normal, suhu badan 35°C , sering menangis dan respirasi yang masih lemah sehingga ditegakkan diagnosa bayi baru lahir dengan hipotermia sedang. Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus pada bayi Ny "S" secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu bayi kaki / tangan teraba dingin, suhu badan 35°C , sehingga apa yang dijelaskan ditinjau pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

3. Identifikasi Diagnosa / Masalah potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa keadaan bayi dengan hipotermia sedang kemungkinan dapat terjadi syok apabila tidak ditangani dengan baik. Syok adalah suatu keadaan disebabkan gangguan sirkulasi darah ke dalam jaringan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan dan tidak mampu mengeluarkan hasil metabolisme dan penyebab

terjadinya syok adalah emboli air ketuban, udara / thrombus (Saifuddin, AB, 2014: 402).

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus bayi Ny “S” dilahan praktek dapat diidentifikasi masalah potensial yaitu terjadi syok, hipotermia dan mudah terjadi infeksi. Dengan demikian penerapan tinjauan dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus bayi Ny “S” Nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan.

4. Tindakan Segera / Kolaborasi

Beberapa data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan kesehatan yang lebih professional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada bayi baru lahir dengan hipotermia sedang tindakan segera dilakukan apabila terjadi syok, tetapi pada studi kasus bayi Ny “S” dengan bayi baru lahir dengan hipotermia sedang, tidak ditemukan indikasi untuk melakukan tindakan segera atau kolaborasi mengingat keadaan pada saat pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan tidak dalam keadaan darurat atau bahaya. Dengan demikian ada kesamaan antara tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus dilahan praktek dan ini berarti tidak ada kesenjangan.

Penanganan yang dapat dilakukan pada kasus tersebut yaitu: kontak kulit dengan kulit adalah cara efektif untuk mencegah hilangnya panas

pada BBL, baik pada bayi-bayi aterm maupun preterm, perawatan metode kangguru (PMK) adalah kontak kulit antara ibu dan bayi secara dini, terus menerus, dan dikombinasi dengan pemberian ASI eksklusif. Inisiasi menyusui dini (IMD) selama 1 jam didada ibu adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan dengan air susu ibunya sendiri dalam satu jam pertama kelahiran. Penanganan selanjutnya dapat dilakukan dengan perawatan inkubator yaitu dapat menghangatkan bayi serta dapat mempertahankan suhu bayi dengan menggunakan incubator.

5. Rencana Tindakan Asuhan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Pada studi kasus bayi Ny “S” dengan hipotermia sedang, penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan ibu untuk mempertahankan suhu tubuh bayinya dengan membungkus kain / sarung kering dan bersih, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif, merawat tali pusat, menganjurkan ibu untuk mengganti popok jika basah atau lembab, anjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya, PMK dan observasi eliminasi bayi.

Dari rencana asuhan kebidanan yang telah diberikan, pada kasus ini ada kesesuaian antara teori dengan kasus yang ada pada bayi Ny “S”.

6. Implementasi Tindakan Asuhan Kebidanan

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Pada studi kasus bayi baru lahir pada Ny "S" dengan hipotermia sedang dapat dilakukan perawatan metode kangguru (PMK) salah satu carapencegahan infeksi pada BBL, semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan diruang peritanologi di RSUD Syekh Yusuf gowa serta pemberian penanganan harus sesuai prosedur pelaksanaan tindakan.

7. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan.

Evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi: bayi telah dihangatkan dibawah infant warmer, tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu telah memberikan ASI pada bayinya dan tidak ditemukan adanya infeksi tali pusat pada bayi, mengajarkan tanda-tanda bahaya bayi baru lahir pada ibu.

Berdasarkan studi kasus bayi baru lahir pada Ny “S” dengan hipotermia sedang tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus bayi Ny “S” secara garis besar tidak ditemukan adanya kesenjangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada bayi Ny“S” dengan hipotermia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa, maka bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data bayi baru lahir pada Ny “S” dengan hipotermia sedang di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
2. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa / masalah aktual bayi baru lahir pada Ny “S” dengan hipotermia sedang di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

3. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa / masalah potensial bayi baru lahir dengan hipotermia sedang di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi bayi baru lahir pada Ny "S" dengan hipotermia sedang di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan bayi baru lahir pada Ny "S" dengan hipotermia sedang di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
6. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan yang telah disusun pada bayi Ny "S" dengan hipotermia se⁸⁸ RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada bayi Ny "S" dengan hipotermia sedang di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil yaitu tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi ibu bayi

- a. Diharapkan pada setiap ibu yang memiliki bayi baru lahir agar senantiasa menjaga kehangatan suhu tubuh bayi untuk mencegah terjadinya syok akibat hipotermia.
 - b. Diharapkan kepada ibu bayi agar sering memberikan ASI secara eksklusif, merawat tali pusat, mengganti popok / celana jika lembab atau basah, mempertahankan menjaga suhu tubuh bayi dengan membungkus dengan kain / sarung kering dan bersih, observasi eliminasi bayi.
 - c. Diperlukan keterlibatan dari suami / keluarga dalam perawatan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antara ibu dan bayinya demi menambah pengetahuan dan bimbingan sebagai kelanjutan perawatan dirumah.
2. Untuk bidan
- a. Bidan sebagai tenaga kesehatan sangat berperan dalam menurunkan angka kematian bayi dengan memberikan perawatan untuk mencegah terjadinya komplikasi.
 - b. Sebagai bidan diharapkan senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih professional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan.
 - c. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara petugas professional lain (dokter, perawat, dan sesama bidan) agar proses berjalan dengan mudah.

- d. Sebagai tenaga bidan yang professional dan muslimah harus dapat memberikan dukungan, motivasi agar ibu senantiasa merawat bayinya dengan baik.
- e. Perlunya bukti pertanggung jawaban petugas kesehatan terhadap semua asuhan yang diberikan maka setiap tindakan yang dilakukan harus didokumentasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriastuti DA& Tinah. Jurnal: *Inisiasi Menyusui Dini Terhadap Kejadian Hipotermi Pada Bayi Baru Lahir Study Komparatif Design*. Di RB Mujiyem dan RB Suwinah Kabupaten Boyolali tahun 2015: STIKES Estu Utomo Boyolali, Vol 07 No.02, Desember 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Meski Menurun, Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tinggi*. Kematian Bayi (<http://databoks.katadata.co.id/tags/kematian-bayi>). 2016
- Beiranvand S, Valizadeh F dkk. Article: *The Effects of Skin-to-Skin Contact on Temperature and Breastfeeding Successfulness in-Full-Term Newborns after Cesarean Delivery*. Academic Editor: Namik YO, Internasional Journal Of Pediatrics. University Of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. Vol 2014, Article ID 846486, 7 pages.
- Dinkes. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014*. Sistem informasi kesehatan, Sulawesi Selatan 2014.
- Davies, L& Donald MS.
Pemeriksaan Kesehatan Bayi Sebagai Pendekatan Multidimensi. Indri Mahayuni (alihbahasa) dan Dwi Widiarti, dkk (Editor Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2012.

- Fraser, DM & Cooper MA. *Buku Saku Praktik Klinik Kebidanan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2012
- Heny, E. Skripsi, *Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Terhadap Perubahan Suhu Tubuh Pada Bayi Baru Lahir Di Klinik Bersalin Mitra Husada Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan tahun 2014*: STIKES Muhammadiyah Lamongan, Vol.07, No.01, april 2015.
- Hutagaol, HS. *Skripsi. Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Terhadap Suhu Dan Kehilangan Panas Pada Bayi Baru Lahir Di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang Sumatera Barat Tahun 2014*; 3 (3) <http://jurnal.fk.unad.ac.id>.
- Ibrahim, AI . *Gizi Dalam Daur Kehidupan Manusia*. Makassar Alauddin University Press. 2012
- Indrayani, D. *Asuhan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Trans Info Media, 2013.
- Kemkes RI. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012*. Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kemkes RI. Jakarta. 2013.
- Kemkes RI. *Profil Data Kesehatan Indonesia tahun 2015*. Pusat Data dan Informasi Kemkes RI. Jakarta. 2015.
- Kementrian agama, RI. *Al-Quran Dan ' 91 nya*. CV Penerbit diponegoro. Bandung, 2011
- Kemkes RI. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial & Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta. 2010
- Kriebs, Jan M & Gegor CL. *Buku Saku Asuhan Kebidanan Varney*. Jakarta: EGC, 2009.
- Putra, SR. *Buku Asuhan Neonatus Bayi Dan Balita Untuk Keperawatan Dan Kebidanan*. Yogyakarta. Diva Press. 2012
- Rahardjo, K & Marmi. *Asuhan Neonatus Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Saleha, S. *Asuhan Kebidanan Neonates, Bayi Dan Balita*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- Saifuddin, AB. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2010
- Saifuddin, AB. *Buku Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014.
- Shihab, MQ. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.

- Sianturi, E. *Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Jakarta : EGC, 2015.
- Walyani, ES & Purwoastuti Th. Endang. *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: 2015.
- WHO. *World Health Organization*. 2014. WHO Library Cataloging swiss. 2014.
- Wahyuni, S. *Asuhan Neonatus, Bayi Dan Balita: Penuntun Belajar Praktik Klinik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2012
- Williamson, A & Crozier K. *Buku Ajar Asuhan Neonatus*. Devi Yulianti (alih bahasa) dan Sari Isnaeni (editor edisi bahasa Indonesia). Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013.
- Widiyawati & Syahrul F. Skripsi. *Pregnancy exercise Influence In Labor And Neonatal Health Status Di Rumah Bersalin Gratis- Rumah Zakat Surabaya tahun 2013-09* <http://journal.unair.ac.id>.
- Wandita, S. IDAI: *Ikatan Dokter Anak Indonesia*, di akses tanggal 24 april 2013:4.
- Yulifah, R & Surachmindari. *Konsep kebidanan untuk pendidikan kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika. 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriastuti DA & Tinah. Jurnal: *Inisiasi Menyusui Dini Terhadap Kejadian Hipotermi Pada Bayi Baru Lahir Study Komparatif Design*. Di RB Mujiyem dan RB Suwinah Kabupaten Boyolali tahun 2015: STIKES Estu Utomo Boyolali, Vol 07 No.02, Desember 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Meski Menurun, Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tinggi*. Kematian Bayi (<http://databoks.katadata.co.id/tags/kematian-bayi>). 2016
- Beiranvand S, Valizadeh F dkk. Article: *The Effects of Skin-to-Skin Contact on Temperature and Breastfeeding Successfulness in-Full-Term Newborns after Cesarean Delivery*. Academic Editor: Namik YO, Internasional Journal Of Pediatrics. University Of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. Vol 2014, Article ID 846486, 7 pages.
- Dinkes. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014*. Sistem informasi kesehatan, Sulawesi Selatan 2014.
- Davies, L & Donald MS. *Pemeriksaan Kesehatan Bayi Sebagai Pendekatan Multidimensi*. Indri Mahayuni (alih bahasa) dan Dwi Widiarti, dkk (Editor Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2012.
- Fraser, DM & Cooper MA. *Buku Saku Praktik Klinik Kebidanan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2012
- Heny, E. Skripsi, *Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Terhadap Perubahan Suhu Tubuh Pada Bayi Baru Lahir Di Klinik Bersalin Mitra Husada Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan tahun 2014: STIKES Muhammadiyah Lamongan, Vol.07, No.01, april 2015*.
- Hutagaol, HS. Skripsi. *Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Terhadap Suhu Dan Kehilangan Panas Pada Bayi Baru Lahir Di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang Sumatera Barat Tahun. 2014; 3 (3) <http://jurnal.fk.unad.ac.id>*.
- Ibrahim, AI . *Gizi Dalam Daur Kehidupan Manusia*. Makassar Alauddin University Press. 2012
- Indrayani, D. *Asuhan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Trans Info Media, 2013.
- Kemenkes RI. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012*. Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kemenkes RI. Jakarta. 2013.
- Kemenkes RI. *Profil Data Kesehatan Indonesia tahun 2015*. Pusat Data dan informasi Kemenkes RI. Jakarta.2015.

- Kementrian agama, RI. Al-Quran Dan Terjemahannya. CV Penerbit diponegoro.Bandung, 2011
- Kemenkes RI. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial & Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta. 2010
- Kriebs, Jan M & Gegor CL. *Buku Saku Asuhan Kebidanan Varney*. Jakarta: EGC, 2009.
- Putra, SR. *Buku Asuhan Neonatus Bayi Dan Balita Untuk Keperawatan Dan Kebidanan*. Yogyakarta. Diva Press. 2012
- Rahardjo, K & Marmi .*Asuhan Neonatus Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015.
- Saleha, S. *Asuhan Kebidanan Neonates, Bayi Dan Balita*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- Saifuddin, AB. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2010
- Saifuddin, AB. *Buku Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014.
- Shihab, MQ. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Jakarta: Lentera hati. 2009.
- Sianturi, E. *Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Jakarta : EGC, 2015.
- Walyani, ES & Purwoastuti Th. Endang.*Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: 2015.
- WHO. *World Health Organization*. 2014. WHO Library Cataloging swiss. 2014.
- Wahyuni, S. *Asuhan Neonatus, Bayi Dan Balita: Penuntun Belajar Praktik Klinik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2012
- Williamson, A& Crozier K.*Buku Ajar Asuhan Neonatus*. Devi Yulianti (alih bahasa) dan Sari Isnaeni (editor edisi bahasa Indonesia). Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013.
- Widiyawati & Syahrul F. Skripsi. *Pregnancy exercise Influence In Labor And Neonatal Health Status Di Rumah Bersalin Gratis- Rumah Zakat Surabaya tahun 2013-09* <http://journal.unair.ac.id>.
- Wandita, S. IDAI : *Ikatan Dokter Anak Indonesia*, di akses tanggal 24 april 2013:4.
- Yulifah, R & Surachmindari. *Konsep kebidanan untuk pendidikan kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika. 2014.

**DAFTAR
LAMPIRAN**

