

**PENGARUH KONSENTRASI L-ASPARAGIN TERHADAP  
PRODUKSI ENZIM KASAR L-ASPARAGINASE OLEH  
BAKTERI *Pseudomonas putida***



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh  
**MUH. ALAMSYAH**  
NIM. 60300110030

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

**PENGARUH KONSENTRASI L-ASPARAGIN TERHADAP  
PRODUKSI ENZIM KASAR L-ASPARAGINASE OLEH  
BAKTERI *Pseudomonas putida***



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh  
**MUH. ALAMSYAH**  
NIM. 60300110030

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
2017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Alamsyah  
NIM : 60300110030  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 20 Juni 1992  
Jur/Prodi : Biologi  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. Muh. Tahir BTN Jongaya Indah C.5 Makassar  
Judul : Pengaruh Konsentrasi L-Asparagin Terhadap Produksi Enzim Kasar L-Asparaginase oleh Bakteri *Pseudomonas putida*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar. 28 November 2017

Penyusun,



**Muh. Alamsyah**  
NIM. 60300110030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Konsentrasi L-Asparagin Terhadap Produksi Enzim Kasar L-Asparaginase Oleh Bakteri *Pseudomonas putida*”** yang disusun oleh Muh. Alamsyah, NIM: 60300110030, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 28 November 2017 M, bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 28 November 2017 M  
10 Rabiul Awal 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: Hafsan, S.Si., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Konsentrasi L-Asparagin Terhadap Produksi Enzim Kasar L-Asparaginase oleh Bakteri *Pseudomonas putida*”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai sekarang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berpartisipasi membantu dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara khusus iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis ayahanda Abdi Hakim Ali dan ibunda Rosadi yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayang dengan ketulusan dan keikhlasan. Ucapan terima kasih untuk Orang Tua/Wali Penulis Ibu Harni Lapandi, SE. yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanannya selama masa pendidikan baik moril dan materil. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah sehingga peran dan partisipasi dari berbagai pihak sangat berarti dan berguna bagi penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya.
3. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Hasyimuddin, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. dan Hafsan S.Si., M.Pd selaku pembimbing I dan II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.

5. Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si dan Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI. selaku penguji I dan II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Staf pengajar terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan pegawai akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi.
7. Spesial buat teman-teman Biologi Osmosis 2010, tanpa terkecuali atas kebersamaannya menjalani hari-hari perkuliahan, semoga menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan selama kurang lebih 4 tahun bersama.

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Makassar, 28 November 2017

Penulis,



**Muh. Alamsyah**


NIM. 60300110030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR ILUSTRASI .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-7</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>8-43</b>
A. Ayat dan Hadis Yang Relevan .....	8
B. Tinjauan Umum Bakteri .....	12
C. Tinjauan Bakteri <i>Pseudomonas putida</i> .....	19
D. Tinjauan Umum Enzim .....	23
E. Tinjauan Enzim L-Asparaginase .....	39
F. Tinjauan L-Asparagin .....	41
G. Kerangka Pikir .....	43
H. Hipotesis .....	43
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>44-49</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	44
C. Variabel Penelitian .....	44
D. Definisi Operasional Penelitian .....	44
E. Instrument Penelitian .....	45
F. Prosedur Kerja .....	46
G. Analisis Data .....	49

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	51-60
	A. Hasil Penelitian .....	51
	B. Pembahasan .....	53
BAB V	PENUTUP .....	61
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran .....	61
KEPUSTAKAAN	.....	62-65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	.....	66-81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan antara bakteri Gram positif dengan Gram negatif .....	18
Tabel 2.2. Perbedaan dinding sel bakteri Gram positif dengan Gram negatif .....	18
Tabel 4.1. Data hasil pengukuran pertumbuhan sel bakteri <i>Pseudomonas putida</i> pada berbagai konsentrasi substrat L-Asparagin .....	51
Tabel 4.2. Data hasil pengukuran aktivitas enzim kasar L-Asparaginase pada berbagai konsentrasi substrat L-Asparagin .....	52



## DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1.	Bentuk Susunan sel Bakteri .....	13
Gambar 2.2.	Struktur sel Bakteri .....	15
Gambar 2.3.	Kurva Pertumbuhan Mikrobial .....	17
Gambar 2.4.	Dinding sel bakteri Gram positif dan Gram negatif .....	19
Gambar 2.5.	Model Lock and Key dari Fischer .....	32
Gambar 2.6.	Model induced-fit dari konshland .....	33
Gambar 2.7.	Hubungan antara konsentrasi substrat dengan Laju reaksi .....	35
Gambar 2.8.	Reaksi hidrolisis enzim L-Asparaginase .....	39
Gambar 2.9.	Asparagin .....	42
Gambar 4.1	Grafik Pertumbuhan bakteri <i>Pseudomonas</i> <i>putida</i> pada berbagai konsentrasi substrat L-Asparagin .....	52
Gambar 4.2.	Grafik aktivitas enzim kasar L-Asparaginase pada berbagai konsentrasi substrat L-Asparagin .....	53

## ABSTRAK

**Nama** : Muh. Alamsyah  
**NIM** : 60300110030  
**Judul Skripsi** : **Pengaruh Konsentrasi L-Asparagin Terhadap Produksi Enzim Kasar L-Asparaginase oleh Bakteri *Pseudomonas putida*.**

---

L-Asparaginase adalah salah satu jenis enzim hidrolase yang mengkatalis reaksi hidrolisis L-Asparagin menjadi asam aspartat dan amonia dengan memutus ikatan amida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi substrat L-Asparagin optimum dan aktivitas enzim L-Asparaginase dari Bakteri *Pseudomonas putida*. Aktivitas L-Asparaginase ditentukan dengan metode Nessler menggunakan spektrofotometer UV-Visible dengan mengukur jumlah amoniak yang dihasilkan dari katalisis L-Asparaginase menggunakan reagen Nessler. Satu unit L-Asparaginase (IU) didefinisikan sebagai jumlah enzim L-Asparaginase yang mengkatalisis pembentukan satu  $\mu\text{mol}$  amoniak per menit pada kondisi pengujian. Konsentrasi media L-Asparagin optimum 1,0 g/mL dengan waktu inkubasi 36 jam pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$  menunjukkan nilai OD (*Optical Density*) 1,53. Aktivitas enzim optimum dari enzim L-Asparaginase berasal dari media L-Asparagin 1,0 g/mL dengan waktu inkubasi 48 jam dengan nilai aktivitas adalah 1,68 IU/mL.

Kata kunci : *Pseudomonas putida*, L-Asparaginase, Aktivitas enzim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

**Name** : Muh. Alamsyah  
**Student ID Number** : 60300110030  
**Title** : **Effect of L-Asparagin Concentration on Production of Crude Enzyme L-Asparaginase by *Pseudomonas putida* Bacteria.**

---

L-Asparaginase is one type of hydrolase enzyme that catalyzes the reaction of L-Asparagin hydrolysis to aspartic acid and ammonia by breaking the amide bond. This study aims to determine the optimum concentration of L-Asparagin substrate and L-Asparaginase enzyme activity of *Pseudomonas putida* bacteria. The activity of L-Asparaginase was determined by the Nessler method using a UV-Visible spectrophotometer by measuring the amount of ammonia produced from L-Asparaginase catalysis using Nessler reagent. One L-Asparaginase (IU) unit is defined as the amount of L-Asparaginase enzyme that catalyzes the formation of one  $\mu\text{mol}$  of ammonia per minute under test conditions. The optimum concentration of L-Asparagin media 1.0 g/mL with 36 hours incubation time at 37<sup>0</sup>C showed the value of OD (Optical Density) 1.53, The optimum enzyme activity of L-Asparaginase enzyme came from L-Asparagin 1.0 g/mL medium with incubation time 48 hours with activity value is 1.68 IU/mL.

**Keywords** : *Pseudomonas putida*, L-Asparaginase, Enzyme activity

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Peranan bakteri dalam kehidupan manusia ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Selama ini orang beranggapan bahwa bakteri adalah mikroorganisme yang merugikan manusia. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar karena jumlah bakteri yang bermanfaat atau menguntungkan manusia justru lebih banyak daripada jumlah bakteri yang merugikan. Bakteri dapat menguntungkan karena dapat menghasilkan senyawa-senyawa penting atau memiliki kemampuan yang dapat digunakan dalam industri makanan, farmasi, pertanian, peternakan, lingkungan, ataupun pertambangan (Hasannudin, 2017).

Mikroorganisme merupakan salah satu sumber penghasil enzim yang memiliki nilai ekonomi penting dan banyak digunakan dalam industri sekarang ini. Oleh karena itu pencarian mikroba yang mampu menghasilkan enzim-enzim komersial perlu diupayakan. Pendekatan yang dapat diupayakan untuk mengeksplorasi mikroba penghasil enzim komersial adalah dengan cara mengisolasi dan menskrining mikroba dari alam kemudian mempelajari beberapa pengaruh terhadap produksi enzim seperti komposisi medium, pH, suhu, variasi konsentrasi substrat dan waktu fermentasi (Fitriani, 2012).

Enzim adalah sebuah istilah genetika untuk katalis protein yang dibentuk di dalam sel makhluk hidup. Di mana pun terdapat kehidupan, di dalam tumbuhan maupun hewan, enzim selalu ada. Enzim ikut ambil bagian dalam seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, seperti sintesis dan penguraian, transportasi ekskresi, detoksifikasi, dan penyediaan energi. Makhluk hidup tidak akan dapat mempertahankan kehidupannya tanpa adanya enzim (Shinya, 2010: 24).

Menurut literatur diperkirakan terdapat 3000 macam enzim di dalam sel. Tanpa enzim maka reaksi selular berlangsung sangat lambat, bahkan mungkin tidak terjadi reaksi. Dalam mengkatalis suatu reaksi enzim bersifat spesifik, sehingga meskipun jumlah enzim ribuan di dalam sel dan substratnya-pun sangat banyak, tidak akan terjadi kekeliruan (Iswari dan Ari, 2006: 35).

Salah satu fungsi paling menonjol dari protein adalah aktivitas enzim. Meskipun cara kerja enzim telah dipelajari selama lebih dari 100 tahun, namun cara molekul protein enzim berfungsi masih belum diketahui selengkapnya. Secara praktis dapat dikatakan bahwa teknologi enzim telah ada sejak berabad-abad, seperti pada pembuatan anggur. Sebenarnya dari pengetahuan kita terdahulu tentang kerja enzim berasal dari pekerjaan Pasteur, Kuhne, Bunchner dan yang lain penelitian tentang ragi. Kuhne adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah enzim (Yunani: “di dalam ragi”), dalam tahun 1878. Sifat protein dari enzim baru dapat dibuktikan pada 1926, ketika Sumner membuat kristal dari enzim urease dan membuktikannya sebagai suatu protein. Sejak itu lebih dari 150 enzim telah dikristalisasikan dan lebih dari 1000 telah diisolasi dengan berbagai tingkat kemurniaan. (Page, 1997: 80).

Enzim dapat diperoleh dari sel-sel hidup dan dapat bekerja baik untuk reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Pemanfaatan enzim untuk reaksi-reaksi yang terjadi di luar sel sekarang banyak diaplikasikan dalam dunia industri. Pemanfaatan enzim dapat dilakukan secara langsung menggunakan enzim hasil isolasi maupun dengan cara pemanfaatan mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim yang diinginkan (Harti, 2015: 237).

L-Asparaginase umumnya dijumpai pada jaringan hewan, bakteri, tanaman, dan dalam serum tikus, namun tidak dijumpai pada manusia. L-Asparaginase dihasilkan dengan jumlah yang besar oleh beberapa mikroorganisme termasuk *E. Coli*, *Erwinia cartova*, *Enterobacter aerogenes*, *Corynebacterium glutamicum*, *Candida utilities*, dan *Pisum sativum* (El-Bessoumy dkk., 2004).

Produksi L-Asparaginase yang bersumber dari hewan ataupun tanaman akan menemui beberapa kendala diantaranya adalah sulitnya perbanyakan dari produksi enzim. Oleh karena itu produksi L-Asparaginase yang berasal dari mikroorganisme lebih dipilih karena mikroorganisme mudah untuk memperbanyak diri sehingga perbanyakan produksi enzim mudah untuk dilakukan (Aprigiyonies, 2011: 3).

Dalam bidang medis enzim L-Asparaginase telah digunakan untuk terapi penyakit kanker pada anak-anak. Karena kemampuan Enzim ini dalam menghidrolisis L-Asparagin (asam amino non esensial) menjadi aspartat dan amonia. Sehingga dapat menyebabkan sel kanker menjadi mati karena kehilangan bahan makanannya dan tidak dapat melakukan aktivitas pembelahan sel.

Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan produksi L-Asparaginase oleh bakteri *Pseudomonas putida* dengan beberapa konsentrasi substrat L-Asparagin yang berbeda-beda.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kemampuan bakteri *Pseudomonas putida* menghasilkan enzim kasar L-Asparaginase dari substrat L-Asparagin ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini meliputi :

1. Bakteri *Pseudomonas putida* yang digunakan merupakan stok bakteri penelitian yang telah diisolasi dari rumput laut *Sargassum sp* oleh (Masri, 2014).
2. Produksi Enzim kasar L-Asparaginase dari bakteri *Pseudomonas putida* dilakukan dengan menggunakan media produksi dan variasi konsentrasi L-Asparagin sebagai substrat.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka mencakup beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, manfaat, dan posisi dari penelitian ini, yaitu

1. Fattah dan Olama, 2002 melakukan penelitian tentang Produksi L-Asparaginase oleh *Pseudomonas aeruginosa* dengan kultur medium padat kemudian



mengevaluasi dan optimalisasi kondisi medium menggunakan desain faktorial. Desain eksperimental berbasis statistik diterapkan untuk mengoptimalkan kultur pada fermentasi media padat untuk produksi L-Asparaginase oleh *Pseudomonas aeruginosa* 50071. Lima belas kondisi kultur diperiksa signifikansinya pada produksi enzim dan aktivitas spesifik menggunakan desain faktorial Plackett /Burman. pH, kasein hidrolisat dan cairan jagung adalah faktor yang paling signifikan pada peningkatan proses produksi enzim. Langkah optimasi kedua adalah mengidentifikasi nilai optimal dari ketiga faktor yang menghasilkan aktivitas L-Asparaginase maksimal, menggunakan desain Box/Behnken. Aktivitas enzim maksimal (142,8 IU) terdeteksi pada kondisi pH 7,9. Media kasein hidrolisat sebesar 3,11% dan pada media cairan jagung sebesar 3,68%.

2. El-Bessoumy dkk, 2004 melakukan penelitian tentang Produksi, Isolasi, dan Pemurnian L-Asparaginase dari *Pseudomonas Aeruginosa* 50071 menggunakan fermentasi media padat. Beberapa langkah pemurnian dilakukan dengan fraksinasi amonium sulfat dan dilanjutkan dengan pemisahan pada Sephadex G-100 penyaringan gel dan CM-Sephadex C50 yang selanjutnya diterapkan pada filtrasi kultur untuk mendapatkan preparasi enzim murni dari bakteri. Pemurnian Enzim dilakukan sebanyak 106 kali lipat dan menunjukkan hasil akhir aktivitas spesifik 1900 IU/mg dengan hasil 43%. Sodium elektroforesis gel dodesil sulfat-poliakrilamida (SDSPAGE) dari enzim yang dimurnikan memiliki salah satu ikatan peptida berantai dengan Mr 160 kDa. Analisis Lineweaver-Burk menunjukkan nilai  $K_m$  0,147 mM dan  $V_{maks}$  sebesar 35,7 IU. Enzim L-

Asparaginase menunjukkan aktivitas maksimum pada pH 9 saat diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit.

3. Manikandan dkk, 2010 melakukan penelitian optimalisasi produksi Asparaginase oleh *Pseudomonas aeruginosa* menggunakan metode eksperimental. Rancangan eksperimen Box-Behnken diadopsi untuk mengoptimalkan sumber nutrisi, fisiologis (masa inkubasi) dan mikroba yang telah diisolasi sebagai acuan dalam menghasilkan enzim L-Asparaginase dari bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.
4. Patta dkk., 2013 melakukan penelitian isolasi, pemurnian, dan karakterisasi L-Asparaginase yang diproduksi dari *Bacillus licheniformis* Strain HSA3-1a. Bakteri *Bacillus licheniformis* HSA3-1a telah diuji dalam medium skrining produksi L-Asparaginase. Enzim L-Asparaginase yang dihasilkan diisolasi dan dimurnikan lalu dilakukan uji aktivitas dan karakterisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Bacillus licheniformis* HSA3-1a dapat memproduksi L-Asparaginase ekstraseluler secara maksimum pada konsentrasi asam amino L-Asparagin 2% dalam medium fermentasi dan waktu inkubasi 48 jam. L-Asparaginase memiliki aktivitas yang optimum pada pH 8 suhu 50°C dengan aktivitas spesifik 616,26 IU/mg protein serta stabil pada suhu dan pH optimum selama 60 menit.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri *Pseudomonas putida* menghasilkan enzim kasar L-Asparaginase dari substrat L-Asparagin.

### ***F. Kegunaan Penelitian***

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Memberikan informasi tentang manfaat bakteri *Pseudomonas putida* yang dapat memproduksi enzim L-Asparaginase.
2. Memberikan informasi ilmiah tentang bakteri yang dapat digunakan dalam produksi enzim.
3. Memberikan informasi tentang konsentrasi optimum substrat L-Asparagin yang terbaik dalam memproduksi enzim L-Asparaginase.
4. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Ayat dan Hadis Yang Relevan*

Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad. Al-Qur'an juga satu-satunya mukjizat yang bertahan hingga sekarang. Selain sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, Al-Qur'an juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah mati. Jika dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang, sejatinya telah Allah tuliskan dalam al-Qur'an.

Allah swt berfirman dalam surah Asy-Syuaraa/26 : 80 yang berbunyi

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku (Kementerian Agama RI, 2012).

Dalam ayat ini, sakit disandarkan kepada dirinya, sekali pun hal tersebut merupakan qadar (takdir), qadha (ketetapan) dan ciptaan Allah swt. Akan tetapi, hal itu disandarkan kepadanya sebagai bentuk adab. Allah swt mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihis salam yaitu apabila aku jatuh sakit, maka sesungguhnya tidak ada seorang pun yang kuasa menyembuhkanku selain-Nya sesuai dengan takdir-Nya berupa sebab-sebab yang menyampaikan (Ibnu Katsir, 2016: 570-571).

Segala macam penyakit dapat disembuhkan dengan kehendak Allah swt. Manusia dapat berikhtiar semaksimal mungkin dengan berobat melalui berbagai macam alternatif pengobatan yang dibolehkan oleh agama islam. Dengan adanya penelitian terkait mengenai salah satu terapi penyembuhan penyakit kanker dengan enzim L-Asparaginase maka hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk pengobatan dari penyakit tersebut.

Allah swt berfirman dalam surah Al-An'am/6 : 17 yang berbunyi

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Kementerian Agama RI, 2012).

Allah berfirman dalam rangka mengabarkan bahwa Dia-lah yang berkuasa untuk menimpakan mara bahaya dan memberi manfaat, Dia-lah mengatur seluruh makhluk-Nya sesuai yang dia kehendaki, tidak ada yang menolak putusan dan qadha-Nya (Ibnu Katsir, 2016: 142).

Allah swt menegaskan dalam Al-Quran bahwa segala macam takdir yang telah ditetapkan oleh-Nya untuk seluruh makhluk yang telah Dia ciptakan adalah mutlak atas kehendak-Nya. Menurut manusia penyakit kanker adalah salah satu musibah atau hal buruk apabila hal tersebut menimpa dalam kehidupan manusia. Akan tetapi musibah penyakit yang Allah swt timpakan kepada makhluk-Nya tidak

terlepas dari izin-Nya tidak lain untuk menguji hamba-hamba-Nya yang beriman atau menantang manusia untuk berfikir bahwa dibalik musibah yang menimpa manusia, Allah swt juga memberi manfaat dengan mengilhamkan kepada manusia yang telah menemukan berbagai obat untuk mengobati penyakit kanker. Salah satunya adalah dengan enzim L-Asparaginase yang telah digunakan untuk terapi sel kanker leukemia pada anak-anak.

Adapun hadis yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'Azza wajalla." (HR. Muslim, no. 4084).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut dijelaskan bahwa apabila terdapat obat yang tepat dari suatu penyakit, maka penyakit tersebut akan sembuh sesuai dengan izin Allah swt. Tentunya dengan usaha dalam menemukan obat yang tepat dan ikhtiar maksimal untuk menjalani pengobatan yang dilakukan oleh manusia, jenis penyakit apapun akan sembuh atas kehendak Allah swt. Dengan

adanya berbagai penelitian dan perkembangan teknologi dibidang medis dalam menangani masalah penyakit kanker saat ini. Maka telah ditemukan enzim L-Asparaginase yang dapat dijadikan salah satu alternatif pengobatan dalam menangani penyakit tersebut. Sehingga seseorang yang ditimpa cobaan dari penyakit kanker dapat menjadikan hal tersebut sebagai sarana pengobatan untuk dirinya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي  
حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. Bukhari no. 5246)

Setiap penyakit yang menimpa manusia terdapat obat penawar untuk kesembuhan manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk berpikir maka dengan adanya usaha dan upaya yang telah dilakukan, maka Allah swt memberikan petunjuk kepada manusia lewat hasil penelitian yang telah mereka lakukan bahwa enzim L-Asparaginase memiliki kemampuan dalam mengubah L-Asparagin yang menjadi sumber makanan dari sel kanker menjadi aspartat dan amonia. Sehingga sel kanker yang berada dalam tubuh manusia tidak dapat mengalami perkembangan sel lebih lanjut dan pada waktu

tertentu sel kanker tersebut akan mati karena makanan dalam hal ini L-Asparagin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel kanker telah diubah oleh enzim L-Asparaginase menjadi senyawa lain.

### ***B. Tinjauan Umum Bakteri***

Istilah bakteri berasal dari kata “bakterion” (bahasa Yunani) berarti tongkat atau batang. Istilah bakteri ini sekarang banyak dipakai untuk tiap mikroba yang bersel satu (Adam, 1995: 17).


Bakteri termasuk dalam golongan prokariota yaitu merupakan bentuk sel yang paling sederhana yang memiliki ukuran dengan diameter dari 1 hingga 10  $\mu\text{m}$  (Nadyah, 2011: 93). Namun demikian ukuran sel bakteri pada umumnya jarang ada yang lebih besar dari 100  $\mu\text{m}$ , Oleh karena mata telanjang manusia tidak mampu melihat benda yang diameternya lebih kecil dari 0,1 mm atau 100  $\mu\text{m}$ , maka sangat diperlukan alat bantu yang disebut mikroskop untuk mengamati (Hafsan, 2011: 15).

Ukuran sel setiap jenis bakteri bervariasi, contoh pada bakteri bentuk bulat berdiameter 0,2 – 2,0  $\mu\text{m}$ , bakteri bentuk batang memiliki panjang 2 – 10  $\mu\text{m}$ , lebar 0,2 sampai 1,5  $\mu\text{m}$ . Bakteri terkecil yaitu *Dialester pneumosintes*, berukuran 0,15 – 0,30  $\mu\text{m}$ . Bakteri terbesar yaitu *Spirillum volutans*, ukuran lebar 1,5  $\mu\text{m}$  dan panjang 15  $\mu\text{m}$ . Faktor yang mempengaruhi ukuran sel adalah umur sel dan lingkungan (Harti, 2015: 12)

Menurut Hafsan (2011: 13) bentuk sel bakteri dapat terlihat di bawah mikroskop cahaya, bakteri dibagi ke dalam 4 bentuk yang berbeda-beda yaitu :



1. Bentuk *coccus*, bakteri berbentuk bulat.
2. Bentuk *basil*, bakteri berbentuk batang atau silinder.
3. Bentuk *spiral*, bakteri berbentuk batang bengkok atau melingkar.
4. Bentuk *filamen*, bakteri berbentuk benang atau *filamentus*.




Gambar 2.1. Bentuk Susunan sel Bakteri (Harti, 2015: 13)

Secara struktural, bakteri tersusun atas beberapa bagian (Imam, 2015).

1. Kapsul, selubung pelindung bakteri yang tersusun atas polisakarida. Kapsul terletak di luar dinding sel. Hanya bakteri bersifat patogen yang mempunyai kapsul. Fungsi kapsul adalah untuk melindungi diri dari kekeringan dan mempertahankan diri dari antitoksin yang dihasilkan oleh sel inang.
2. Dinding Sel, pada bagian ini terletak di luar membran sel dan tersusun atas protein yang berikatan dengan polisakarida (Peptidoglikan). Adanya dinding sel

menyebabkan bentuk bakteri menjadi tetap. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel bakteri terhadap lingkungannya.

3. Membran Sel tersusun atas molekul lemak dan protein (Fosfolipid). Membran sel bersifat semipermeabel. Membran sel mengandung enzim respirasi. Fungsinya adalah untuk membungkus plasma dan mengatur pertukaran mineral dari sel dan ke luar sel.
4. Sitoplasma, cairan yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas koloid yang mengandung berbagai molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme.
5. Bulu Cambuk (Flagel), alat gerak pada bakteri sehingga membantu bakteri untuk mendekati makanan atau menjauh jika ada racun atau bahan kimia.
6. Materi Genetik (DNA) bakteri tidak tersebar dalam sitoplasma, tetapi terdapat pada daerah tertentu yang disebut nukleoid. DNA berfungsi mengendalikan sintesis protein bakteri dan merupakan zat pembawa sifat.
7. Ribosom, berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom tersusun dari protein, jika dilihat dari mikroskop, ribosom terlihat seperti struktur kecil yang melingkar.
8. Plasmid, selain DNA, bakteri juga mempunyai plasmid. Plasmid mengandung gen-gen tertentu, misalnya gen patogen dan gen kebal antibiotik. Plasmid juga mampu memperbanyak diri. Dalam satu sel bakteri bisa terbentuk kurang lebih 20 Plasmid.



Gambar 2.2. Struktur sel Bakteri (Harti, 2015: 12)

Reproduksi bakteri adalah perkembangbiakan bakteri. Bakteri mengadakan pembiakan dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Pembiakan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan, sedangkan pembiakan seksual dilakukan dengan cara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Namun, proses pembiakan cara seksual berbeda dengan eukariota lainnya. Sebab, dalam proses pembiakan tersebut tidak ada penyatuan inti sel sebagaimana biasanya pada eukarion, yang terjadi hanya berupa pertukaran materi genetika (rekombinasi genetik) (Nadyah, 2011: 105).

Menurut Imam (2015) Cara bereproduksi bakteri bisa terjadi secara seksual melalui transduksi, transformasi, dan konjugasi

1. Transduksi adalah pemindahan materi genetik dengan perantaraan virus. Proses ini diawali dengan masuknya virus ke dalam bakteri. Kemudian virus akan

berkembang biak sehingga menyebabkan sel bakteri yang dimasukinya mengalami pecah. Virus yang baru terbentuk akan berhamburan keluar dari sel bakteri.


2. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik berupa DNA atau gen dari bakteri satu ke bakteri lainnya yang sejenis dengan proses fisiologis yang kompleks.
3. Konjugasi adalah perkawinan antara kedua sel kelamin. Sel kelamin jantan ditandai dengan adanya rambut halus (Fili) pada permukaan dinding sel yang dapat berikatan pada suatu tempat khusus di permukaan sel betina. Reproduksi secara konjugasi terjadi pada bakteri gram negatif seperti *Escherichia coli*, *Salmonella sp.*, dan *Pseudomonas sp.*

Perkembangbiakan secara aseksual bakteri adalah dengan cara membelah diri (*Binary fission*). Bakteri akan membelah menjadi 2 sel anakan, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Pembelahan biner selesai setelah terbentuknya dinding sel. Dalam kondisi yang ideal, bakteri akan membelah diri setiap 15-20 menit. Meskipun bakteri mampu berkembang biak secara cepat, pertumbuhan bakteri juga dipengaruhi oleh faktor suhu, sinar matahari, kelembaban, dan zat kimia. Suhu maksimal untuk pertumbuhan bakteri adalah  $27^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ . Bakteri bisa tumbuh dengan baik pada lingkungan yang lembab. Sinar matahari mampu merusak struktur materi genetik bakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri (Imam, 2015).

Menurut Nadyah (2011: 104) Fase-fase pertumbuhan pada bakteri terdiri dari

1. Fase lag (lambat) adalah fase dimana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai bertambah sedikit demi sedikit.

2. Fase logaritmik (eksponensial) adalah fase dimana pembiakan bakteri berlangsung paling cepat.
3. Fase stationer adalah fase dimana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian.
4. Fase autolisis (kematian) adalah fase dimana jumlah bakteri yang mati semakin banyak, melebihi jumlah bakteri yang berkembang biak.



Gambar 2.3. Kurva Pertumbuhan Mikrobia, yaitu (1) fase adaptasi (*fase lag*), (2) fase pertumbuhan eksponensial, (3) fase stasioner. (Yuwono, 2005: 20)


Berdasarkan pewarnaan Gram, bakteri digolongkan 2 macam, yaitu bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. Pewarnaan Gram dapat digunakan untuk determinasi bakteri, yaitu dengan melihat hasil akhir pewarnaan bakteri. Pada akhir pewarnaan, Gram positif berwarna ungu (violet) dan bakteri Gram negatif berwarna merah. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan komposisi dinding selnya, pada bakteri Gram negatif lebih rumit daripada Gram positif (Harti, 2015: 17).

Keterangan	Gram Positif	Gram Negatif
Dinding sel	Sederhana	Lebih kompleks
Struktur dinding sel	1 lapisan peptidoglikan	2 lapisan : a. Bagian luar lipopolisakarida dan protein b. Bagian dalam : Peptidoglikan
Ketebalan	15 – 80 nm	10 – 15 nm
Berat	50 % berat kering sel	10 % berat kering sel
Syarat nutrisi	lebih kompleks	lebih sederhana
Resistensi terhadap		
Penisilin	lebih rentan	kurang resisten
Streptomisin	kurang rentan	resisten
Ungu Kristal	pertumbuhan terhambat	lebih resisten
Fisik	lebih resisten	kurang resisten

Tabel 2.1. Perbedaan antara bakteri Gram positif dengan Gram negatif (Harti, 2015: 17).

Keterangan	Gram Positif	Gram Negatif
Peptidoglikan	40 - 50 %	5 - 20 %
Asam teikoat	ada	tidak ada
Lipopolisakarida	tidak ada	ada
Protein	10 %	60 %
Lipid	2 %	20 %

Tabel 2.2. Perbedaan dinding sel bakteri Gram positif dengan Gram negatif (Harti, 2015: 17).



Gambar 2.4. Dinding sel bakteri Gram positif dan Gram negatif (Harti, 2015: 18).

### C. Tinjauan Bakteri *Pseudomonas putida*

*Pseudomonas putida* adalah salah satu dari 40 spesies bakteri dalam genus *Pseudomonas*. Bakteri ini memiliki bentuk batang, Gram-negatif, dan secara resmi ditemukan pada pertengahan 1900-an. Karakteristik lainnya yaitu *Non-spore forming*, terdiri dari 1 atau lebih flagella, bersifat aerobik, tumbuh pada suhu optimum (mesofilik), menggunakan molekul organik sebagai sumber energi dan karbon (kemoheterotrofik).

Mikroorganisme ini merupakan mikroorganisme yang paling umum hidup di tanah dan lingkungan air tawar di seluruh permukaan bumi dengan sifat motilitasnya

menggunakan satu atau lebih flagel sehingga dapat ditemukan di bagian permukaan lingkungan tersebut. Mikroorganisme ini memiliki peran yang sangat penting dalam dekomposisi yang menggerakkan siklus karbon. Uji yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa *Pseudomonas putida* dapat memecah senyawa hidrokarbon alifatik dan aromatik. Senyawa yang tidak dapat dipecah yaitu teflon, styrofoam, dan produk organik yang mengandung hidrogen tunggal.

Diantara hal yang menyebabkan banyak ahli mikrobiologi dan lingkungan di dunia tertarik dengan *Pseudomonas putida* adalah kemampuannya yang dapat memecah banyak toksin organik termasuk atrazine, herbisida yang paling banyak digunakan di dunia, menjadi karbondioksida dan air. Atrazine bersifat toksik terhadap lingkungan dan diduga merupakan karsinogen. Sampai sekarang, cara satu-satunya untuk membersihkan bumi dari pencemaran Atrazine adalah dengan merelokasi tanah yang tercemar ke penimbunan limbah (*landfill*). Saat ini saintis sedang mengembangkan sistem untuk menginokulasi tanah yang terkontaminasi dengan *Pseudomonas putida* dengan konsentrasi tinggi untuk membersihkan bahan kimia beracun. *Pseudomonas putida* bekerja sangat efektif yaitu dengan mengurangi waktu paruh atrazine delapan tahun menjadi hanya 5,5 jam.

Rintangan terbesar untuk melakukan proses bioremediasi adalah dengan menumbuhkan *Pseudomonas putida* di tanah yang sangat dalam supaya dapat secara efektif memecah atrazine yang sebelumnya dipindahkan ke tanah dengan air rembesan dari permukaan. Teknik yang paling menjanjikan yaitu metode *curtain*. Metode ini dilakukan dengan mengebor tanah di bagian Atrazine digunakan dan



*Pseudomonas putida* ditempatkan di dalam lubang. Air dari permukaan merembes akan membawa toksin berbahaya tersebut dan melewatkannya ke lubang yang telah diinokulasi, menghilangkan toksin dari air. Metode tersebut sedang diujicobakan di Australia di mana atrazine telah mengontaminasi persediaan air di Perth, Australia.

*Pseudomonas putida* juga dapat menghasilkan biosurfaktan yaitu amphiphilic yang diproduksi pada permukaan sel mikroba atau diekskresikan secara ekstraseluler dan mengandung bagian-bagian hidrofobik dan hidrofilik yang menurunkan tegangan permukaan dan tegangan interfacial di antara molekul pada permukaan dan antar permukaan. Struktur biosurfaktan meliputi mycolic acid, glycolipid, kompleks polisakarida-lipid, lipoprotein, fosfolipid, atau permukaan sel mikroba itu sendiri. *Pseudomonas putida* diduga menghasilkan biosurfaktan yang termasuk jenis rhamnolipid yang terdiri dari dua molekul rhamnose dan dua molekul *n*-hydroxydecanoic acid. Surfaktan tersebut dapat menambah luas permukaan materi hidrofobik, seperti kandungan pestisida di tanah dan air, sehingga menambah pula kelarutan dalam air. Dalam hal ini, adanya surfaktan menambah tingkat degradasi polutan oleh mikroba.

Dalam suatu penelitian, diketahui bahwa bakteri ini memiliki kemampuan dalam mengoksidasi logam mangan (Mn) dengan menghasilkan protein pengoksidasi mangan yang dihasilkan secara independen (terdapat  $Mn^{2+}$  atau tidak). Protein tersebut hanya diekspresikan pada fase stationer secara konsisten dengan sifatnya yang non-katalitik (bukan enzim sebenarnya) dan tidak memerlukan oksigen pada reaksinya. Logam mangan dapat digunakan sebagai sumber energi dengan

menghasilkan ATP dari senyawa anorganik dengan membutuhkan komponen organik yang tereduksi untuk mendapatkan sumber karbon sehingga Mn dapat dioksidasi menjadi  $Mn^{2+}$  kemudian  $Mn^{3+}$  atau  $Mn^{4+}$ .

Bakteri *Pseudomonas putida* juga memiliki kemampuan untuk mendegradasi senyawa toluene dalam tanah yang terkontaminasi dengan memanfaatkan kandungan toluene tersebut sebagai sumber karbon. Katabolisme toluene menggunakan sistem enzim toluene dioxygenase. Toluene pertama dioksidasi menjadi (+)-cis-(1S, 2R)-dihydroxy-3-methylcyclohexa-3,5-diene (cis-toluene dihydrodiol).

Selain kemampuannya dalam bioremediasi, *Pseudomonas putida* memiliki kemampuan dalam memproduksi bioplastik dengan melakukan rekayasa pada genomnya. Bioplastik yang dihasilkan tersusun dari polimer *polyhydroxyalkanoic acid* (PHA) yang merupakan polimer yang mudah terdegradasi secara biologis. PHA terakumulasi pada kondisi pertumbuhan mikroba yang tidak seimbang sebagai mekanisme penyimpanan kelebihan karbon dan energi. Polimer tersebut disintesis oleh enzim PHA synthase yang terikat pada granula PHA dan menggunakan koenzim A thioester dari hydroxyalkanoic acid sebagai substrat. Pada suatu penelitian yang dilakukan, *Pseudomonas putida* memiliki kemampuan dalam mengakumulasi PHA pada medium alpechin (*olive-mill waste water*) yang memiliki kandungan zat organik yang tinggi berupa senyawa fenolik sederhana yang bersifat toksik bagi lingkungan.

*Pseudomonas putida* juga memiliki kemampuan sebagai agen biokontrol pada akar tumbuhan. Sifat biokontrol ini ditentukan dari sifat antagonistik terhadap patogen tertentu yang menyerang tumbuhan, seperti fungi *Fusarium* yang

menyebabkan penyakit *Fusarium wilt*. Dengan jumlah atau densitas *Pseudomonas putida* yang melebihi jumlah koloni *Fusarium*, sifat supresif terhadap *Fusarium* akan terinduksi sehingga melindungi tumbuhan dari kerusakan akibat penyakit yang ditimbulkan oleh *Fusarium*.

Adapun klasifikasi dari bakteri *Pseudomonas putida* adalah :

Kingdom	: Bacteria
Phylum	: Proteobacteria
Class	: Gammaproteobacteria
Ordo	: Pseudomonadales
Family	: Pseudomonadaceae
Genus	: Pseudomonas
Spesies	: <i>Pseudomonas putida</i> (Budiyanto, 2011).

#### ***D. Tinjauan Umum Enzim***

Organisme hidup mampu mendapatkan dan menggunakan energi dengan cepat karena adanya katalis biologis yang disebut enzim. Sebagaimana katalis anorganik, enzim mengubah kecepatan suatu reaksi kimia, tetapi tidak mempengaruhi kesetimbangan akhir reaksi (Bintang, 2010: 49).

Enzim merupakan biomolekul yang berasal dari protein yang berfungsi sebagai katalis. Katalis adalah senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Reaksi ini dalam suatu reaksi kimia organik. substrat (molekul awal) akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk.

jenis produk yang akan dihasilkan bergantung pada suatu kondisi zat yang disebut promotor. Semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme yang ditentukan oleh hormon sebagai promotor (Baharuddin, 2011: 63).

Walaupun nama enzim diajukan untuk suatu katalis biologi oleh Wilhem Kuhne pada tahun 1878, namun penemuan suatu enzim lazimnya dihubungkan dengan Anselme Payen dan Jean-Francois Persoz, ahli kimia yang bekerja di pabrik gula di paris. Pada tahun 1833 kedua peneliti melaporkan mendapatkan dari ekstrak malt suatu faktor yang dapat digunakan kembali yang disebut diastase (dikenal sebagai amilase) yang mengubah kanji menjadi gula (Armstrong, 1995: 99).

Banyak enzim yang dimurnikan dari berbagai sumber, yang pertama kali mengkristalkan enzim adalah J.B. Sumner. Enzim yang dikristalkan ini berasal dari jack beans. Untuk hasil yang memakan waktu 6 tahun penelitian ini (1924-1930), Sumner mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1964. Pekerjaannya didemonstrasikan sekali saja meskipun enzim-enzim merupakan kesatuan kimia yang berbeda (Ngili, 2009: 261-262).

Seperti protein pada umumnya enzim dapat mengalami denaturasi oleh berbagai faktor, seperti : perubahan pH yang mencolok, temperatur, pelarut organik, urea dan dapat dihambat oleh racun enzim (Iswari dan Ari, 2006: 36).

Dalam penamaan enzim pertama kali hanya berasal dari substrat yang ditambah dengan akhiran -ase. Contohnya adalah laktase, alkohol dehidrogenase (mengatalisis penghilangan hidrogen dari alkohol), dan DNA polimerase. Selanjutnya

karena banyaknya enzim yang ditemukan sehingga International Union of Biochemistry and Molecular Biology telah mengembangkan suatu tata nama untuk enzim, yang disebut sebagai nomor EC, tiap-tiap enzim memiliki empat digit nomorurut sesuai dengan ketentuan klasifikasi yang berlaku. Sistem kode terdiri atas 4 digit yaitu digit 1 merupakan kode kelas enzim. Digit 2 merupakan kode sub kelas, Digit 3 merupakan kode sub-sub kelas. Digit 4 merupakan nama enzim tertentu (Baharuddin, 2011: 68).

Menurut Wirahadikusumah (1977: 51) Klasifikasi enzim secara internasional meliputi nama golongan, nomor kode, dan macam reaksi yang dikatalisisnya dan tiap golongan utama terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok enzim berdasarkan gugus substrat yang diserangnya:

1. Oksido-reduktase berperan dalam reaksi oksidasi-reduksi.
2. Transferase berperan dalam reaksi pemindahan gugus tertentu.
3. Hidrolase berperan dalam reaksi hidrolisis
4. Liase mengkatalisis reaksi adisi atau pemecahan ikatan rangkap dua
5. Isomerase mengkatalisis reaksi isomerasi
6. Ligase mengkatalisis reaksi pembentukan ikatan dengan bantuan pemecahan ikatan dalam ATP.

Di antara sejumlah enzim yang berpartisipasi di dalam metabolisme, terdapat sekelompok khusus yang dikenal sebagai enzim pengatur, yang dapat mengenali berbagai isyarat metabolik dan mengubah kecepatan katalitiknya sesuai dengan isyarat yang diterima melalui aktivitasnya, sistem enzim terkordinasi dengan baik,

menghasilkan suatu hubungan yang harmonis di antara sejumlah aktivitas metabolik yang berbeda, yang diperlukan untuk menunjang kehidupan (Lehninger, 1982: 235).

Terdapat lebih dari 2.500 macam reaksi biokimia dengan enzim spesifik yang membantu peningkatan laju reaksi. Spesies organisme yang berbeda memproduksi variasi struktur enzim yang berbeda pula, sehingga jumlah macam protein enzim dalam seluruh sistem biologis adalah lebih dari 106. Setiap enzim dikarakterisasi oleh spesifisitas substrat kimia (reaktan) serta molekul lain yang mengatur aktivitasnya. Molekul lain ini disebut efektor, yang bisa merupakan aktivator, inhibitor, atau keduanya. Dalam enzim yang lebih kompleks, satu senyawa bisa memiliki salah satu efek, yang tergantung pada kondisi fisik atau kimia lainnya. Enzim berukuran mulai dari kompleks subunit banyak yang besar (disebut enzim multimer,  $M_r=10^6$ ) sampai bentuk subunit tunggal yang kecil (Ngili, 2009: 262).

Sebagai suatu katalis, suatu enzim tidak dirusak dalam suatu reaksi dan karena itu tetap tidak berubah dan dapat digunakan kembali. Suatu ciri yang menonjol dari enzim sebagai katalis adalah spesifisitas substrat, yang menentukan fungsi biologinya. Banyak enzim hanya memiliki satu substrat biologi (spesifisitas substrat absolut) yang lain memiliki spesifisitas yang lebih luas dan menggunakan suatu (gugusan spesifisitas relatif). Ciri biologi kritis lain dari reaksi enzim adalah bahwa substrat dan spesifisitas katalitiknya menjamin sintesis hanya dari produk biomolekuler spesifik tanpa produksi serentak dari produk-samping, sebagai kontras dengan banyak reaksi dalam kimia organik (Armstrong, 1995: 100).

Menurut Iswari dan Ari (2006: 39-40) lokasi enzim di dalam sel tersebar di seluruh komponennya dan memberi petunjuk tentang fungsi komponen sel tersebut. Contoh dari hubungan lokasi enzim dengan fungsinya :

1. Enzim yang terdapat di dalam inti pada umumnya terlibat dalam proses untuk mempertahankan, menyusun dan melindungi materi genetik.
2. Enzim yang terdapat di dalam mitokondria pada umumnya ada kaitannya dengan proses oksidasi.
3. Enzim mikrosom bertanggung jawab terhadap reaksi hidrosilasi termasuk biosintesis hormon steroid, metabolisme obat atau proses yang menjadikan obat tidak aktif.
4. Enzim yang terdapat di dalam lisosom berfungsi memecah dan menghidrolisis suatu substansi sehingga dapat dicerna oleh sel.
5. Enzim yang berkaitan dengan Badan golgi penting untuk sekresi protein.
6. Enzim yang terdapat di dalam sitoplasma pada umumnya mengkatalisis proses metabolisme karbohidrat yang dikenal sebagai glikolii dan biosintesis asam lemak.
7. Enzim yang terdapat di dalam membran atau yang berkaitan dengan membran pada umumnya berkaitan dengan proses transportasi nutrien dan kerja hormon.

Untuk memperoleh enzim yang murni, maka enzim harus diisolasi dari jaringan dengan cara mengisolasi sel atau jaringan, sehingga komponen sel dapat dipisah-pisahkan disesuaikan dengan lokasi enzim yang diinginkan. Untuk mengukur jumlah enzim di dalam ekstrak jaringan atau cairan tubuh yang diukur adalah kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi yang diukur sesuai dengan jumlah enzim yang

ada. Satuan kecepatan reaksi dinyatakan dalam unit. Satu unit adalah menyatakan jumlah enzim yang mengubah 1m mol per menit pada kondisi tertentu (Iswari dan Ari, 2006: 40).

Cara kerja (daya) enzim, sesungguhnya menyusun ikatan-ikatan yang terbentuk selama reaksi berjalan. Mempunyai daya reaksi aktif dan disebut ikatan sampingan enzim substrat yang usianya sangat pendek. Dalam keadaan seperti ini, maka substratnya mempunyai daya reaksi yang aktif. Dengan adanya perubahan (pergeseran) muatan saja sudah cukup menyebabkan reaksi. Setelah terjadi reaksi dan perubahan dalam zat-zat, maka aktivitas koenzim itu akan dilepaskan untuk memulai lagi proses reaksi-reaksi tersebut, sehingga terjadilah suatu proses berantai (Kusnawidjaja, 1987: 139).

Menurut Iswari dan Ari (2006: 38-39) pada umumnya terdapat 2 mekanisme kerja enzim dalam mempengaruhi reaksi katalisis, yaitu

1. Enzim meningkatkan kemungkinan molekul-molekul yang bereaksi saling bertemu dengan permukaan yang saling berorientasi. Hal ini terjadi sebab : enzim mempunyai suatu afinitas yang tinggi terhadap substrat dan mempunyai kemampuan mengikat substrat walaupun bersifat sementara. Penyatuan antara substrat dengan enzim tidak seenaknya, melainkan substrat terorientasi secara tepat untuk terjadi reaksi.
2. Pembentukan ikatan yang sementara (biasanya ikatan nonkovalen) antara substrat dengan enzim menimbulkan penyebaran elektron dalam molekul substrat dan penyebaran ini menyebabkan suatu regangan pada ikatan kovalen spesifik dalam



molekul substrat sehingga ikatan kovalen tersebut menjadi mudah terpecah. Para ahli biokimia menamakan keadaan dimana terjadi regangan ikatan molekul substrat setelah berinteraksi dengan enzim disebut : pengaktifan substrat.

Suatu enzim bekerja secara khas terhadap suatu substrat tertentu. Kekhasan inilah ciri suatu enzim. Ini sangat berbeda dengan katalis lain (bukan enzim) yang dapat bekerja terhadap berbagai macam reaksi. Enzim urease hanya bekerja terhadap lebih dari satu substrat namun enzim tersebut tidak mempunyai kekhasan tertentu. Misalnya enzim esterase dapat menghidrolisis beberapa ester asam lemak, tetapi tidak dapat menghidrolisis substrat lain yang bukan ester. Suatu contoh tentang kekhasan ini misalnya enzim arginase bekerja terhadap L-arginin dan tidak terhadap D-arginin. Suatu enzim dikatakan mempunyai kekhasan nisbi apabila ia dapat bekerja terhadap beberapa substrat misalnya esterase dan D-asam amino oksidase yang dapat bekerja D-asam amino dan L-asam amino tetapi berbeda kecepatannya. (Poedjadi dan Titin, 2005: 142).

Menurut Page (1997: 82) Sebagai katalis, enzim adalah satu-satunya dibanding dengan katalis-katalis anorganik atau organik sederhana. Sifat-sifat katalitik khas dari enzim termasuk hal-hal berikut :

1. Enzim meningkatkan laju reaksi pada kondisi biasa (fisiologik) dari tekanan, suhu, dan pH. Hal ini merupakan keadaan yang jarang dengan katalis-katalis lain.
2. Enzim berfungsi dengan selektivitas atau spesifisitas bertingkat luar biasa tinggi terhadap reaktan yang dikerjakan dan jenis reaksi yang dikatalisasikan. maka

reaksi-reaksi yang bersaing dan reaksi-reaksi sampingan tidak teramati dalam katalis enzim.

3. Enzim memberikan peningkatan laju reaksi yang luar biasa dibanding dengan katalis biasa.

Beberapa enzim dirujuk sebagai protein sederhana karena hanya memerlukan struktur protein untuk aktivitas katalitik. Enzim lain merupakan protein terkonjugasi karena masing-masing memerlukan suatu komponen nonprotein, disebut suatu kofaktor, untuk aktivitasnya. Enzim yang memerlukan kofaktor logam contohnya,  $Mg^{2+}$ ,  $Fe^{2+}$ , atau  $Zn^{2+}$ , disebut metaloenzim. Enzim lain memiliki biomolekul organik, koenzim, sebagai kofaktor. Jika suatu kofaktor (ion logam atau koenzim) berikatan kuat dengan suatu enzim, maka ia disebut sebagai suatu gugusan prostetik. Kompleks yang terdiri dari suatu apoenzim (bagian protein dari suatu enzim) dan kofaktornya disebut suatu holoenzim (Armstrong, 1995: 100-101).

Beberapa enzim hanya terdiri dari polipeptida dan tidak mengandung gugus kimiawi selain residu asam amino contohnya adalah ribonuklease pankreas. Akan tetapi, enzim lain, memerlukan tambahan komponen kimia bagi aktivitasnya komponen ini, disebut kofaktor. Kofaktor mungkin suatu molekul anorganik seperti ion  $Fe^{2+}$ ,  $Mn^{2+}$ , atau  $Zn^{2+}$  atau mungkin juga suatu molekul organik kompleks yang disebut koenzim. Beberapa enzim membutuhkan baik koenzim maupun satu atau lebih ion logam bagi aktivitasnya. Pada beberapa enzim, koenzim atau ion logam hanya terikat secara lemah atau dalam waktu sementara pada protein, tetapi, pada enzim lain, senyawa ini terikat kuat, atau terikat secara permanen yang dalam hal ini


disebut gugus prostetik. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalis, bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut holoenzim, Koenzim dan ion logam bersifat stabil sewaktu pemanasan, sedangkan bagian protein enzim, yang disebut apoenzim, terdenaturasi oleh pemanasan (Lehninger, 1982: 237).

Pada umumnya daya yang mengikat enzim dengan substratnya bukan ikatan kovalen. Tetapi ikatan hidrogen, ikatan ion dan daya tarik antara gugus hidrofobik dari dua molekul itu akan secara sendiri-sendiri atau bersama mengikat substrat pada enzim. Kebanyakan dari interaksi ini bersifat lemah, terutama jika atom-atom yang bersangkutan tidak berada di dalam jarak yang amat dekat. Karena itu, agar ikatan antara substrat dan enzim itu cukup kuat, kedua molekul harus sangat berdekatan dan meliputi suatu area yang cukup luas agar sejumlah daya tarik yang lemah ini dapat beroperasi. Jadi molekul substrat harus cocok dengan suatu permukaan komplementer molekul enzim seperti sebuah kunci dengan lubang kunci (Kimball, 1983: 133).


Menurut Baharuddin (2011: 68-69) mekanisme reaksi enzimatik dapat digambarkan dengan beberapa metode :

1. Model Fischer (model kaku) / model kunci dan gembok. model kunci dan anak kunci mengumpamakan pasangan enzim-substrat berupa gembok dan anak kuncinya. Berarti tidak sembarang anak kunci dipergunakan membuka dan menutup gembok. Hal ini dikemukakan oleh Emil Fischer. Hal ini menjelaskan tentang kespesifikan suatu enzim.
2. Model ketetapan induksi. Berbeda dengan model fischer, model Koshland menggambarkan bentuk molekul enzim yang lentur (fleksibel). Struktur enzim

yang fleksibel, dan sisi aktif secara terus menerus berubah bentuknya sesuai dengan interaksi antara enzim dan substrat. Akibatnya, substrat tidak berikatan dengan sisi aktif yang akurat. Orientasi rantai samping amino berubah sesuai dengan substrat sehingga enzim dapat menjalankan fungsi katalitiknya.



Gambar 2.5. Model Lock and Key dari Fischer (Iswari dan Ari, 2006: 46)



Gambar 2.6. Model induced-fit dari konshland (Iswari dan Ari, 2006: 47)

Ketika berinteraksi, baik enzim maupun substrat akan mengalami perubahan. Konsep induced fit (kecocokan pemasangan) suatu sisi aktif pada substrat menekankan adaptasi sisi aktif untuk mencocokkan gugus fungsi pada substrat. Substrat yang lemah atau inhibitor tidak memasukkan konformasi yang benar pada sisi aktif (Ngili, 2009: 274).


Untuk meneliti enzim, diperlukan suatu uji untuk mengukur aktivitas katalitik. Uji dirancang untuk mengukur kecepatan pembentukan produk atau kecepatan hilangnya substrat. Suatu uji yang mengukur pembentukan produk dipilih karena melibatkan suatu pengukuran langsung, berlawanan dengan pengukuran tidak langsung yang didapat dari suatu uji yang mengandalkan pada penentuan hilangnya

substrat. Seringkali, jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu rentang waktu yang lama diukur dalam suatu uji waktu tertentu. Cara bagaimana jumlah produk ditentukan tergantung pada sifat kimia dan fisiknya. Jika produk diwarnai atau dapat mengalami suatu reaksi untuk menghasilkan larutan yang berwarna, kemudian absorban dari cahaya pada panjang gelombang yang sesuai dapat diukur (uji kolorimetrik) dan dihubungkan dengan konsentrasi produk yang ditemukan pada saat sampling. Uji spektrofotometrik khususnya berguna karena kemajuan dalam reaksi dapat dipantau secara terus-menerus dalam uji kinetika (Armstrong, 1995: 102-104).

Enzim dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk perubahan besar pada molekul substrat. Meskipun demikian, tidak seperti pada katalis anorganik, enzim memiliki suatu spesifikasi yang terbatas, misalnya enzim hanya akan mengkatalis suatu reaksi yang memiliki nilai kecil atau pada beberapa kasus, hanya satu reaksi. Enzim hanya akan bekerja dalam kondisi yang sesuai, seperti pH, suhu, konsentrasi, kofaktor, dan sebagainya (Bintang, 2010: 49).

Dalam percobaan, pengaruh konsentrasi substrat pada laju reaksi enzim dipelajari dengan mencatat kemajuan reaksi katalis enzim, dengan menggunakan konsentrasi enzim yang tetap dan serangkaian konsentrasi substrat yang berbeda-beda (Ngili, 2009: 281). Jika konsentrasi substrat kecil, maka reaksinya ditentukan oleh substratnya, sehingga tercapai keseimbangan antara kecepatan reaksi dan konsentrasi substrat. Lain halnya jika substrat dalam keadaan berlebih, maka reaksinya tergantung pada jumlah enzim yang ada. Kecepatan reaksi enzim tidak tergantung pada konsentrasi substrat yang ada. Konsentrasi substrat kecil terdapat aktivitas

enzim yang kecil pula, tetapi jika konsentrasinya besar, aktivitas enzim tidak terbatas, tergantung pada konsentrasi enzim (Kusnawidjaja, 1987: 141).



Gambar 2.7. Hubungan antara konsentrasi substrat dengan laju reaksi (Iswari dan Ari, 2006: 49)

Kecepatan reaksi hampir semua enzim meningkat dua kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu  $10^{\circ}\text{C}$ . Pada kisaran suhu  $40\text{-}70^{\circ}\text{C}$  umumnya protein enzim akan terdenaturasi, sehingga menyebabkan kehilangan aktivitasnya. Hal ini berarti laju reaksi awal akan meningkat, sama dengan naiknya suhu sampai tidak mungkin lagi untuk mengukur aktivitasnya akibat terjadinya inaktivasi yang cepat. Dalam prakteknya, sebagian besar enzim sama sekali tidak aktif pada suhu lebih dari  $70^{\circ}\text{C}$  (Bintang, 2010: 69).

Seperti protein pada umumnya, struktur ion enzim tergantung pada pH lingkungannya. Enzim dapat berbentuk ion positif, ion negatif, atau ion bermuatan

ganda. Dengan demikian perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian akhir enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Disamping pengaruh terhadap struktur ion pada enzim, pH rendah atau pH tinggi dapat pula menyebabkan terjadinya proses denaturasi dan ini akan mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim (Poedjadi dan Titin, 2005: 162).

Dalam praktek, bisa saja diinginkan untuk menemukan nilai pH ketika enzim paling efisien mengkatalis reaksi, yakni pH optimum. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh pH pada kinetika reaksi enzimatik dapat mengarah pada pemahaman mengenai gugus-gugus fungsi apa saja dalam enzim atau substrat yang mungkin terlibat dalam pengikatan atau katalisis (Ngili, 2009: 294).

Pengaruh pH yang mungkin terjadi yakni mengubah keadaan ionisasi dari (1) gugus-gugus yang terlibat katalis, (2) gugus-gugus yang terlibat dalam pengikatan substrat, (3) gugus-gugus yang terlibat dalam pengikatan sisi-sisi selain sisi aktif (disebut sisi efektor alosterik), dan (4) gugus-gugus pada substrat. Keadaan bermuatan yang telah berubah ini akan mempengaruhi afinitas enzim terhadap substratnya, serta mempengaruhi laju katalisis (Ngili, 2009: 295).

Aktivitas enzim di dalam sel juga diatur dengan ketat oleh kebutuhan. Jika hasil dari suatu seri reaksi enzim (yaitu asam amino) mulai menumpuk di dalam sel, maka kerja enzim pertama yang terlihat di dalam sintesis tersebut secara khusus dihambat. Dengan demikian produksi asam amino dihentikan untuk sementara. Fenomena ini disebut inhibisi umpan balik (feedback inhibition). Di lain pihak akumulasi suatu zat di dalam sel dapat secara khusus mengaktifkan suatu enzim yang



mulai menggerakkan suatu rangkaian reaksi di mana zat itu menjadi substrat awal. Kejadian ini disebut aktivitas prekursor menurunkan konsentrasi substrat awal tadi sampai tingkat normal (Kimball, 1983: 138).

Enzim selain dapat dihambat, juga dapat diaktifkan oleh berbagai faktor dan senyawa. Ada senyawa yang dapat menghambat kerja enzim dan senyawa seperti itu dinamai sebagai penghambat atau inhibitor. Sebaliknya, ada juga senyawa yang berperan mengaktifkan enzim dan dinamakan aktivator (Sadikin, 2002: 159). Peningkatan laju reaksi yang disebabkan oleh suatu aktivator adalah kebalikan dari efek inhibitor (Ngili, 2009: 283).

Menurut Bintang (2010: 63-64) beberapa senyawa bereaksi dengan enzim dan mengurangi nilai aktivitasnya. Tiga tipe klasik cara penghambatan yang dikenal yaitu kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif.

1. *Penghambatan kompetitif*. Dalam kasus ini, inhibitor bereaksi dengan enzim secara kompetitif terhadap substrat mengikat sisi aktif dari enzim. Tingkat penghambatan tergantung pada konsentrasi relatif substrat dan inhibitor, dan sebagian besar kecepatan maksimum reaksi dapat dicapai dengan adanya inhibitor jika konsentrasi substrat cukup tinggi. Penghambatan kadang-kadang bersifat irreversibel dan substrat tidak dapat melepaskan ikatan inhibitor yang telah ada. Kasus ini terjadi pada beberapa inhibitor organofosforus untuk kolin esterase. Penghambatan kompetitif juga ditemukan ketika inhibitor berikatan disuatu sisi yang cukup dekat dengan pusat aktif, sehingga mengurangi afinitas substrat dan enzim. inhibitor kompetitif memiliki struktur kimia yang mirip dengan substrat

alami dan bersifat sangat spesifik. Hal ini terdapat pada enzim suksinat dehidrogenase yang mengkatalis perubahan suksinat ke fumarat. Malonat dan malat keduanya bekerja sebagai inhibitor pada enzim ini. Contoh yang sering digunakan sebagai inhibitor kompetitif adalah acarbose yang dapat menghambat kerja enzim  $\alpha$ -glukosidase di usus, sebagai obat anti diabetes melitus.


2. *Penghambatan non-kompetitif*. Jenis penghambatan non-kompetitif merupakan ikatan inhibitor dengan enzim bukan pada sisi aktif, sehingga enzim dapat mengikat substrat serta inhibitor pada saat yang bersamaan. Sisi pengikatan inhibitor biasanya cukup jauh dari pusat aktif, sehingga pengikatan substrat tidak terpengaruh. Kompleks enzim substrat-inhibitor yang terbentuk tidak dapat diuraikan, dan efek hambatan terjadi dengan mengurangi jumlah enzim yang digunakan. Peningkatan konsentrasi substrat tidak berpengaruh terhadap tingkat hambatan. Sebagian besar inhibitor non-kompetitif tidak memiliki ikatan secara kimia dengan substrat dan inhibitor yang sama, yang mungkin dapat mempengaruhi sejumlah enzim. Contoh dari inhibitor non-kompetitif adalah golongan senyawa penghambat tiol seperti *p*-kloromerkuribenzoat, ion-ion logam berat seperti  $Mg^{2+}$  dan  $Cu^{2+}$ , serta reaksi sianida dengan besi-enzim porfirin.
3. *Penghambatan unkompetitif*. Jenis penghambatan unkompetitif merupakan ikatan yang terjadi bila suatu enzim telah berikatan dengan substrat [ES], sehingga tidak dapat menghasilkan produk. Pengaruh penghambatan secara unkompetitif akan menurunkan nilai  $V_{maks}$  dan  $K_m$ ,  $K_m$  merupakan suatu ukuran afinitas substrat terhadap enzim,  $K_m$  yang rendah berhubungan dengan afinitas yang lebih tinggi.

Karena inhibitor berikatan dengan kompleks [ES], maka akan terjadi penurunan konsentrasi kompleks [ES]. (Bintang, 2010: 63-64).

### ***E. Tinjauan Enzim L-Asparaginase***

L-Asparaginase (L-asparagin amidohidrolase, E.C.3.5.1.1) adalah enzim yang menghidrolisis L-Asparagin menjadi L-aspartat dan ammonia (Youseff and Al-Omar, 2008). Enzim ini telah banyak dimanfaatkan dalam terapi leukemia, terutama pada anak-anak (*Acute Lymphoblastic Leukemia*) (Kotzia and Labrou, 2005).

Berdasarkan penelitian (Kotzia and Labrou, 2005). diketahui bahwa L-Asparaginase yang berasal dari bakteri *Erwinia sp* lebih tidak menimbulkan reaksi alergi dan memiliki spesifitas yang lebih baik dibanding dengan yang berasal dari *E. coli*. L-Asparaginase yang berasal dari *Erwinia chrysanthemi* mempunyai spesifitas dan efisiensi katalitik yang lebih baik terhadap L-Asparagin.



Gambar 2.8. Reaksi hidrolisis enzim L-Asparaginase (El-Bessoumy dkk., 2004)

Enzim L-Asparaginase terdiri atas dua jenis, yaitu enzim L-Asparaginase tipe I dan enzim L-Asparaginase tipe II. Perbedaan utama antara enzim L-Asparaginase

tipe I dan enzim L-Asparaginase tipe II adalah bentuk konformasi dan afinitas. Enzim L-Asparaginase tipe I memiliki konformasi dimer dan memiliki afinitas yang rendah untuk menghasilkan L-asparagin serta bersifat konstitutif, sedangkan enzim L-Asparaginase tipe II memiliki konformasi tetramer dengan 326 residu asam amino serta memiliki afinitas yang tinggi untuk menghasilkan L-Asparagin. Enzim L-Asparaginase tipe II disekresikan sebagai respon terhadap kekurangan nitrogen (Youseff and Al-Omair, 2008)

Enzim L-Asparaginase tipe I dan tipe II juga dibedakan berdasarkan lokasi di dalam sel, solubilitas di dalam ammonium sulfat, sensitivitas terhadap inaktivasi suhu, kondisi untuk ekspresi, afinitas terhadap substrat L-Asparagin. Enzim L-Asparaginase tipe I merupakan enzim sitoplasmik, sedangkan enzim L-Asparaginase tipe II bersifat periplasmik (Yano dkk., 2008).

Enzim L-Asparaginase adalah enzim yang telah umum digunakan di bidang klinis karena enzim ini dapat melawan kanker. Sel-sel kanker adalah sel-sel yang telah kehilangan daya aturnya. Untuk pertumbuhan selnya, sel kanker membutuhkan asam amino asparagin. Karena sel kanker tidak mempunyai enzim sintetase asparagin yang berfungsi untuk mensintesis asparagin dari asam aspartat, maka sel kanker mengambil asparagin dalam darah. Asparaginase yang diberikan akan menghambat sintesis protein sel kanker dengan menguraikan asparagin menjadi asam aspartat dan ammonia sehingga sel kanker akan kekurangan asparagin yang berakibat kematian sel ini (Herawati, 2001).


L-Asparagin dihasilkan di dalam sel oleh enzim asparagin sintetase atau dapat diserap dari lingkungan luar, yaitu dari sumber makanan. Sel leukimia membutuhkan L-Asparagin dalam jumlah banyak untuk menjaga pertumbuhan sel malignan. Oleh karena itu, kemoterapi dengan menggunakan enzim L-Asparaginase dapat menghambat pertumbuhan sel leukimia karena konsentrasi enzim L-Asparagin berkurang. Sel leukimia memiliki sifat defisiensi terhadap aktivitas L-Asparagin sintetase, sehingga mencegah kemampuan sel leukimia untuk mensintesis L-Asparagin. Oleh karena itu, pertumbuhan sel leukimia sangat tergantung dari L-Asparagin yang bersirkulasi di plasma darah (Manikandan dkk, 2010). Hal tersebut berbeda dengan sel normal yang dapat menghasilkan L-Asparagin dari L-Asparagin sintetase untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sel (Verma dkk., 2007).

#### ***F. Tinjauan L-Asparagin***

L-Asparagin adalah asam amino non-esensial yang dapat disintesis oleh tubuh melalui mekanisme biokimia yang rumit. Umumnya biosintesis asam-asam amino non esensial ini diatur oleh ketersediaan asam amino tersebut dalam makanan. Pada manusia L-Asparagin dapat disintesis pada jumlah yang cukup. L-Asparagin dalam tubuh untuk menjamin pertumbuhan yang optimum pada anak-anak dan mempertahankan keseimbangan nitrogen (Doroty, 1992 dalam Patta, 2013).

Reaksi biosintesis L-Asparagin dikatalis oleh L-Asparagin sintetase. Dalam tubuh L-Asparagin terdapat dalam beberapa jaringan dan di dalam sel kanker L-Asparagin terdapat dalam jumlah yang sedikit. Keberadaan L-Asparagin yang

berlebih dalam sel kanker akan menyebabkan pertumbuhan sel ini tidak dapat dikendalikan (Doroty, 1992 dalam Patta, 2013).




Gambar 2.9. Asparagin

L-Asparagin diperlukan oleh sistem saraf untuk menjaga kesetimbangan dalam transformasi asam amino. Berperan pula dalam sintesis amonia. Asparagin yang berasal dari luar (dari rebung asparagus) bersifat sebagai pengurai asparagin yang diproduksi oleh tubuh. Hasil uraiannya menjadi asam aspartat dan ammoniak. Sifat seperti ini adalah sifat Asparaginase, suatu enzim yang aktif melawan tumor/kanker. Sementara itu sel kanker memanfaatkan asparagin sebagai makanannya. Karena adanya penguraian. Akibatnya sel kanker berhenti tumbuh, atau kehilangan kapasitas untuk mensintesis asparagin. Akhirnya sel kanker akan mati cepat atau lambat. Fungsi lain dari asparagin adalah memperlancar keluarnya air seni atau bersifat diuretic. Karena sifat ini, semua zat buangan dari dalam tubuh dapat ikut hanyut keluar melalui air seni. Karena diuretic dan proses pengeluaran tersebut terjadi pada ginjal, maka otomatis asparagin juga dapat merawat ginjal dan sekaligus mencegah

timbulnya gangguan ginjal. Jika zat buangan terus menumpuk di ginjal, maka akan mengganggu fungsi organ lain dalam tubuh (Winardiana, 2014).

### G. Kerangka Pikir



### H. Hipotesis

Konsentrasi L-Asparagin yang berbeda dapat mempengaruhi bakteri *Pseudomonas putida* dalam menghasilkan enzim kasar L-Asparaginase.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimen untuk mengetahui tingkat optimasi substrat L-Asparagin dari bakteri *Pseudomonas putida* yang menghasilkan enzim kasar L-Asparaginase.

#### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2014 di Laboratorium Mikrobiologi Lantai II Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

#### ***C. Variable Penelitian***

Penelitian ini memiliki 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah konsentrasi L-Asparagin sedangkan variabel terikat adalah aktivitas Enzim L-Asparaginase.

#### ***D. Defenisi Operasional Variabel***

Adapun rumusan definisi operasional penelitian ini adalah :

1. Bakteri *Pseudomonas putida* adalah bakteri hidrokarbonoklastik yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon.



2. Enzim L-Asparaginase adalah salah satu jenis enzim hidrolase yang mengkatalis reaksi hidrolisis L-Asparagin menjadi asam aspartat dan amonia dengan memutus ikatan amida.
3. L-Asparagin adalah asam amino non-esensial yang dapat disintesis oleh tubuh melalui mekanisme biokimia.

### ***E. Instrument Penelitian***

#### 1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah incubator shaker, erlemeyer, cuved, spektrofotometer, thermos box, jarum ose, cawan petri, hot plate dan stirrer, batang pengaduk, botol semprot, botol reagen, pipet tetes, timbangan, autoclav, gelas kimia, labu ukur, sentrifuge, mikropipet, neraca analitik, bunsen, tabung reaksi, rak tabung, gelas ukur, oven, spoid,

#### 2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain isolat bakteri *Pseudomonas putida*,  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ,  $\text{NaCl}$ , L-Asparagin,  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CaCl}_2$  0,1 M, Glukosa 20%, agar,  $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , indikator fenol merah, larutan trikloroasetat 1,5 M, buffer Tris-HCl 0,05 M pH 8,6, ammonium klorida, KI,  $\text{HgCl}_2$ , NaOH, aluminium foil, aquadest, kapas, cotton bud, spiritus.

## ***F. Prosedur Kerja***

### 1. Sterilisasi Alat dan Bahan

Alat-alat yang akan digunakan dicuci dengan deterjen hingga bersih lalu dibilas dengan air suling, kemudian alat-alat gelas disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu  $180^{\circ}\text{C}$  selama 2 jam. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan menggunakan lampu spiritus. Alat-alat plastik disterilkan dalam autoklaf pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$  tekanan 2 atm selama 15 menit.

### 2. Peremajaan Bakteri *Pseudomonas putida*

Peremajaan bakteri *Pseudomonas putida* dilakukan dengan menumbuhkan stok bakteri dari penelitian (Masri, 2014) ke dalam plate pertumbuhan. Komponen medium yaitu :  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  0,75 g/L, L-Asparagin 10 g/L, NaCl 0,5 g/L,  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  1,0 g/L,  $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  1,0 g/L, glukosa 3 g/L, agar 20 g/L, dan indikator fenol merah 0,05 g/L, diinkubasi selama 24 jam pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$ . Komponen medium tersebut merupakan media selektif M-9 produksi L-Asparaginase yang telah dimodifikasi (Gulati dan Gupta, 1997, Moorthy, 2010, dan Ghasemi, 2008).

### 3. Penentuan Konsentrasi Substrat L-Asparagin dan Waktu Inkubasi Optimum Produksi Enzim L-Asparaginase

Penentuan konsentrasi optimum substrat L-Asparagin dilakukan dengan membiakkan isolat ke dalam 50 mL medium kultur dalam labu Erlenmeyer 250 mL. Komposisi media kultur adalah :  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  0,3 g/mL,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  0,15 g/mL, NaCl 0,025 g/mL,  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  0,1 g/mL,  $\text{CaCl}_2$  0,1 M 0,00055 g/mL, glukosa 20 % 0,1 g/mL (pH 7,0). Kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi (produksi

enzim). Selanjutnya inokulum diinkubasi pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$  dalam shaker inkubator selama 24 jam dengan kecepatan 200 rpm, lalu diambil sebanyak 5 mL untuk diinokulasikan kedalam 100 mL media produksi. Produksi L-Asparagin dibuat dalam medium produksi dengan variasi konsentrasi substrat L-Asparagin 0,6 g/mL, 0,8 g/mL, 1,0 g/mL, 1,2 g/mL, dan 1,4 g/mL. Komposisi medium produksi L-Asparaginase adalah :  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  0,6 g/mL,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  0,3 g/mL, NaCl 0,05 g/mL,  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  0,2 g/mL,  $\text{CaCl}_2$  0,1 M 0,0011 g/mL, glukosa 20 % 0,2 g/mL (pH 7,0). Selanjutnya dilakukan pengukuran pertumbuhan mikroba atau yang disebut OD (Optical Density) setiap 12 jam hingga waktu inkubasi 72 jam dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 646 nm.

#### 4. Uji Aktivitas Enzim L-Asparaginase

Karakterisasi enzim dilakukan dengan membuat larutan standar amoniak dari ammonium klorida dan pengukuran aktivitas enzim dengan metode nessler (Sihaloho, 2009 dalam Masri, 2014).

##### a. Pembuatan Larutan Nesler dilakukan dengan cara

- 1) Menimbang NaOH sebanyak 16 g kemudian melarutkan dengan aquadest hingga larut lalu memasukkan ke dalam labu ukur 100 mL.
- 2) Melarutkan KI 7 g dalam aquadest.
- 3) Melarutkan  $\text{HgCl}_2$  10 g dalam aquadest.
- 4) Memasukkan campuran KI dan  $\text{HgCl}_2$  ke dalam larutan NaOH dalam labu ukur 100 mL.
- 5) Menambahkan aquadest hingga garis batas kalibrasi.

6) Menghomogenkan dan menyimpan dalam botol reagen berwarna gelap.

b. Pembuatan larutan standar induk amoniak 1 M, 0,1 M (100  $\mu\text{mol/mL}$ ) dan deret standar amoniak 0,0 M, 0,02 M, 0,04 M, 0,06 M, 0,08 M, dan 0,1 M.

1) Mengeringkan Kristal garam ammonium klorida pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$  di dalam oven hingga bobot konstan.

2) Menimbang Amonium klorida 3 gram kemudian melarutkan dengan akuades hingga 1000 mL dalam labu ukur akan diperoleh larutan induk amoniak 1 M (1000  $\mu\text{mol/mL}$ ).

3) Larutan induk amoniak 0,1 M (100  $\mu\text{mol/mL}$ ) dibuat dengan memipet 10 mL larutan standar amoniak 1000  $\mu\text{mol/mL}$ ) kemudian mengencerkan dengan akuades hingga garis batas kalibrasi dalam labu ukur 100 mL.

4) Pembuatan deret standar amoniak 0,0  $\mu\text{mol/mL}$ , 20  $\mu\text{mol/mL}$ , 40  $\mu\text{mol/mL}$ , 60  $\mu\text{mol/mL}$ , 80  $\mu\text{mol/mL}$ , dan 100  $\mu\text{mol/mL}$  dibuat dengan memipet masing-masing ke dalam deret labu ukur 100 mL masing-masing secara berurutan 0 mL, 20 mL, 40 mL, 60 mL, 80 mL, dan 100 mL larutan induk amoniak 100  $\mu\text{mol/L}$  kemudian menambahkan dengan akuades hingga garis batas kalibrasi (Ahmad, A. dkk., 2013 dalam Masri, 2014).

c. Penentuan Aktivitas L-Asparaginase

Pengukuran laju aktivitas enzim L-Asparaginase dilakukan dengan mensentrifuge media pertumbuhan yang telah diinkubasi setiap 12 jam dari waktu pengamatan. Pengujian dilakukan dengan cara menginkubasi campuran reaksi terdiri atas 0,1 mL ekstrak enzim kasar, 0,2 mL buffer Tris-HCl 0,05 M pH 8,6

dan 1,7 mL L-Asparagin 0,01 M pada suhu optimum selama 10 menit. Reaksi dihentikan oleh penambahan 0,5 mL larutan trikloroasetat 1,5 M. Setelah sentrifugasi 5.000 rpm, lalu mengencerkan 0,5 mL supernatan dengan 7 mL akuades kemudian menambahkan 1 mL reagen Nessler. Amoniak yang dilepaskan direaksikan dengan reagen Nessler. Dan ditentukan kadarnya menggunakan standar ammonium klorida. Aktivitas L-Asparaginase ditentukan secara kolorimetri berdasarkan metode Wriston dan Yellin (1973) pada suhu 37°C menggunakan spektrofotometer UV-Visible dengan mengukur jumlah amoniak yang dihasilkan dari katalisis asparaginase menggunakan reagen nessler.

### **G. Analisis Data**

Satu unit L-Asparaginase (IU) didefinisikan sebagai jumlah enzim L-Asparaginase yang mengkatalisis pembentukan 1 μmol amoniak permenit pada kondisi pengujian. Nilai aktivitas L-Asparaginase diperoleh dengan menggunakan persamaan (Harnanik, 2000 dalam Kurnia, 2010) :

$$\text{Aktivitas Enzim (IU/mL)} = \frac{(y-a)}{b} \times \frac{V. \text{ Total}}{V. \text{ Analisis}} \times \frac{1}{V. \text{ Enzim}} \times \frac{1}{t. \text{ Inkubasi}}$$

Dimana :

Y = Absorbansi

a = Slope

b = intersept

V. Total = Volume enzim + substrat + buffer + TCA (2,5 mL)

V. Analisis = Volume total yang dianalisis (0,5 mL)

V. Enzim = Volume enzim yang dianalisis (0,1 mL)

t inkubasi = Waktu inkubasi enzim (10 menit)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**


**A. Hasil Penelitian**

Penentuan laju pertumbuhan bakteri *Pseudomonas putida* yang memproduksi enzim kasar L-Asparaginase dilakukan dengan mengukur *Optical Density* atau kepekatan sel (turbiditas) menggunakan spektrofotometer.

Tabel 4.1. Data hasil pengukuran pertumbuhan bakteri *Pseudomonas putida* pada berbagai konsentrasi substrat L-Asparagin.

Konsentrasi L-Asparagin	Waktu Inkubasi (Jam)					
	12	24	36	48	60	72
0,6 g/ml	0.93	1.26	1.37	1.33	1.29	1.28
0,8 g/ml	0.83	1.16	1.32	1.22	1.24	1.19
1,0 g/ml	1.10	1.47	1.53	1.49	1.50	1.50
1,2 g/ml	1.01	1.37	1.39	1.33	1.35	1.36
1,4 g/ml	0.98	1.34	1.36	1.31	1.23	1.18

Gambar 4.1. Grafik pertumbuhan bakteri *Pseudomonas putida* pada berbagai konsentrasi substrat L-Asparagin.




Penentuan laju aktivitas enzim kasar L-Asparaginase yang dihasilkan oleh bakteri *Pseudomonas putida* dilakukan dengan metode Nessler kemudian dilakukan pengukuran *Optical Density* menggunakan spektrofotometer.

Tabel 4.2. Data hasil pengukuran aktivitas enzim kasar L-Asparaginase pada berbagai konsentrasi substrat L-Asparagin

Konsentrasi	Aktivitas Enzim pada waktu inkubasi (Jam) (IU/mL)					
	12	24	36	48	60	72
0,6 g/ml	0,62	0,74	1,07	1,19	1,03	1,01
0,8 g/ml	0,62	0,67	1,05	1,24	1,27	0,97
1,0 g/ml	0,57	0,75	1,24	1,68	1,55	1,44
1,2 g/ml	0,56	0,75	1,19	1,38	1,37	1,43
1,4 g/ml	0,67	0,74	1,18	1,45	1,49	1,22



Gambar 4.2. Grafik aktivitas enzim kasar L-Asparaginase pada berbagai konsentrasi substrat L-Asparagin



### B. Pembahasan

Pada penelitian ini menggunakan bakteri *Pseudomonas putida* yang berasal dari stok bakteri pada penelitian (Masri, 2014) dalam memproduksi enzim L-Asparaginase. Media pertumbuhan dengan komposisi yang telah dimodifikasi serta beberapa variasi substrat L-Asparagin diharapkan akan menginduksi bakteri agar dapat memproduksi enzim L-Asparaginase ekstraseluler.

Menurut Atlas (1993) media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri penghasil enzim L-Asparaginase adalah media selektif M-9. Media M-9 adalah suatu media yang mengandung 6 g/L  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ , 3 g/L  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ , 10 g/L  $\text{NH}_4\text{Cl}$ , 0,5 g/L  $\text{NaCl}$ , 10 g/L L-Asparagin, 1,0 g/L  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ , 1,0 g/L  $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  0,1 M, 3

g/L glukosa, 20 g/L agar dan 0,05 g/L indikator fenol merah dengan pH optimal 7.0 sehingga semua bakteri penghasil enzim L-Asparaginase dapat tumbuh dengan baik pada media tersebut.

Bakteri *Pseudomonas putida* ditumbuhkan dalam medium cair yang telah dimodifikasi agar dapat menghasilkan enzim kasar L-Asparaginase. Pertumbuhan mikroba dapat ditentukan secara kuantitatif dengan metode langsung maupun tidak langsung. Pengukuran pertumbuhan secara langsung dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya dengan menghitung jumlah sel menggunakan *Petrof Hausser Bacteria Counter* atau *Hemasitome*, atau dengan mengukur kepekatan (turbiditas) selnya menggunakan spektrofotometer. Jumlah sel dapat dihitung secara langsung jika mikroba tersebut ditumbuhkan dalam medium cair. Dalam perhitungan secara langsung semacam ini, yang terhitung adalah jumlah total jasad renik baik yang masih hidup maupun yang sudah mati (Yuwono, 2005: 19).

#### 1. Penentuan Konsentrasi Substrat L-Asparagin dan Waktu Inkubasi Optimum Produksi Enzim L-Asparaginase

Berdasarkan alur penelitian yang dilakukan, bakteri *Pseudomonas putida* diinokulasikan sebanyak 5 mL pada media produksi Enzim dengan variasi substrat L-Asparagin yang berbeda-beda. Kemudian media produksi diinkubasi selama 72 jam di incubator shaker dengan kecepatan 200 rpm pada suhu 37°C. Kemudian mengukur OD (*Optical Density*) setiap 12 jam menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 646 nm sehingga diperoleh hasil pengamatan bahwa pada pengamatan pertama untuk waktu inkubasi 12 jam nilai rata-rata OD pada konsentrasi L-

Asparagin 0,6 g/ml, 0,8 g/ml, 1,0 g/ml, 1,2 g/ml, dan 1,4 g/ml berturut-turut adalah 0.93, 0.83, 1.10, 1.01, dan 0.98. Pada waktu inkubasi 0 jam sampai 12 jam bakteri yang diinokulasikan mengalami fase lag. Pada awal pertumbuhan, sel akan beradaptasi terlebih dahulu dengan medium pertumbuhannya. Fase pertumbuhan ini disebut fase lag (fase adaptasi). Panjang fase lag tergantung pada macam jasad renik dan kondisi pertumbuhannya, misalnya komposisi medium, faktor lingkungan, dan sebagainya (Yuwono, 2005: 19).

Pada pengamatan kedua dengan waktu inkubasi 24 jam nilai rata-rata OD yang diperoleh adalah 1.26, 1.16, 1.47, 1.37, dan 1.34. Selanjutnya, pengamatan ketiga dengan waktu inkubasi 36 jam nilai rata-rata OD yang diperoleh adalah 1.37, 1.32, 1.53, 1.39, dan 1.36. Berdasarkan Gambar 4.1 waktu inkubasi 12 jam sampai 36 jam menunjukkan bakteri mengalami fase pertumbuhan yang lebih cepat yang disebut fase logaritmik (fase eksponensial). Dalam fase ini jasad renik sudah dapat beradaptasi secara baik dengan lingkungan pertumbuhannya sehingga mempunyai waktu penggandaan (*doubling time*) yang lebih singkat dibanding dengan fase sebelumnya. Waktu penggandaan adalah waktu yang diperlukan oleh sel untuk tumbuh menjadi dua kali lipat jumlahnya (Yuwono, 2005: 19). Pada waktu inkubasi 36 jam dari kelima variasi media L-Asparagin menunjukkan bakteri mengalami laju pertumbuhan yang optimum untuk setiap media pertumbuhannya.

Selanjutnya pengamatan keempat dengan waktu inkubasi 48 jam nilai rata-rata OD yang diperoleh adalah 1.33, 1.22, 1.49, 1.33, dan 1.31. Kemudian pada pengamatan kelima dengan waktu inkubasi 60 jam nilai rata-rata OD yang diperoleh

adalah 1.29, 1.24, 1.50, 1.35, dan 1.23. Dari data kurva pertumbuhan untuk waktu inkubasi 36 jam sampai 60 jam menunjukkan bakteri mengalami penurunan laju pertumbuhan. Oleh karena medium digunakan terus menerus untuk pertumbuhan sel, maka konsentrasi nutrisi yang ada akan semakin berkurang sehingga akhirnya pertumbuhan sel menjadi lambat. Sel kemudian akan memasuki fase pertumbuhan stasioner. Dalam fase ini jumlah sel yang hidup seimbang dengan jumlah sel yang mati (Yuwono, 2005: 19-20).

Pada Pengamatan terakhir, waktu inkubasi 72 jam nilai rata-rata OD yang diperoleh adalah 1.28, 1.19, 1.50, 1.36, dan 1.18. Sehingga diakhir pengamatan ini laju pertumbuhan bakteri yang dialami terus mengalami penurunan. Jika fase ini diteruskan maka jumlah sel yang mati akan menjadi lebih besar dibandingkan jumlah sel yang hidup sehingga sel akan memasuki fase kematian (Yuwono, 2005: 19-20).

Setelah mengamati laju pertumbuhan bakteri *Pseudomonas putida* yang menghasilkan enzim kasar L-Asparaginase pada beberapa variasi media L-Asparagin maka diperoleh hasil bahwa konsentrasi optimum terpilih adalah media L-Asparagin dengan konsentrasi 1,0 g/ml yang menunjukkan nilai OD tertinggi yaitu 1.53 dengan waktu inkubasi selama 36 jam.

#### 1. Penentuan Aktivitas Enzim Terhadap Optimasi Konsentrasi Substrat L-Asparagin

Aktivitas L-Asparaginase ditentukan dengan metode Nessler. Banyaknya amoniak yang dihasilkan dari katalisis substrat asam amino L-Asparagin oleh enzim L-Asparaginase dinyatakan sebagai aktivitasnya (Siddalingeshwara dan Linggapa,

2011). Amoniak yang dilepaskan oleh hidrolisis enzim L-Asparaginase bereaksi dengan reagen nessler. Lalu ditentukan kadarnya menggunakan standar amonium klorida. Satu unit L-Asparaginase (IU) didefinisikan sebagai jumlah enzim L-Asparaginase yang mengkatalisis pembentukan satu  $\mu\text{mol}$  amoniak per menit pada kondisi pengujian (Basha dkk., 2009 dalam Patta, 2013).

Pereaksi Nessler sensitif ( $\text{K}_2\text{HgI}_4 / \text{K}_2\text{HgCl}_4$ ) bila bereaksi dengan amonium dalam larutan basa akan membentuk dispersi koloid kompleks berwarna kuning coklat. Reaksi menghasilkan larutan berwarna kuning coklat yang mengikuti hukum Lambert-beer. Intensitas warna ada dalam sampel yang kemudian ditentukan secara spektrofotometri (Sihaloha, 2009 dalam Patta, 2013).

Aktivitas L-Asparaginase ditentukan secara kolorimetri berdasarkan metode Wriston dan Yellin (1973) pada suhu  $37^\circ\text{C}$  menggunakan spektrofotometer UV-Visible dengan mengukur jumlah amoniak yang dihasilkan dari katalisis asparaginase menggunakan reagen nessler. Campuran reaksi terdiri atas 0,1 mL ekstrak enzim kasar, 0,2 mL buffer Tris-HCl 0,05 M pH 8,6 dan 1,7 mL L-Asparagin 0,01 M diinkubasi pada suhu optimum selama 10 menit. Reaksi dihentikan oleh penambahan 0,5 mL larutan trikloroasetat 1,5 M. Setelah sentrifugasi 5000 rpm, 0,5 mL supernatan diencerkan dengan 7 mL akuades kemudian ditambahkan 1 mL reagen Nessler. Amoniak yang dilepaskan direaksikan dengan reagen Nessler. Dan ditentukan kadarnya menggunakan standar ammonium klorida (Masri, 2014).

Berdasarkan alur penelitian yang dilakukan dalam menentukan aktivitas enzim L-Asparaginase yang diukur dengan spektrofotometer dengan panjang

gelombang 450 nm maka diperoleh hasil pengamatan pertama untuk nilai aktivitas enzim dari ekstrak enzim kasar L-Asparaginase yang diinkubasi selama 12 jam dengan konsentrasi L-Asparagin berturut-turut 0,6 g/ml, 0,8 g/ml, 1,0 g/ml, 1,2 g/ml, dan 1,4 g/ml adalah 0.62 IU/mL, 0.62 IU/mL, 0.57 IU/mL, 0.56 IU/mL, dan 0.67 IU/mL. Diawal pengamatan ini laju aktivitas enzim yang dihasilkan masih berada pada titik minimum. Untuk dapat terjadi kompleks enzim substrat diperlukan adanya kontak antara enzim dengan substrat. Kontak ini terjadi pada suatu tempat atau bagian enzim yang disebut bagian aktif. Pada konsentrasi substrat rendah, bagian aktif enzim ini hanya menampung substrat sedikit (Poedjiadi, 2005: 159).

Pada pengamatan kedua dari ekstrak enzim kasar L-Asparaginase yang diinkubasi selama 24 jam diperoleh nilai aktivitas enzim berturut-turut 0.74 IU/mL, 0.67 IU/mL, 0.75 IU/mL, 0.75 IU/mL, dan 0.74 IU/mL. Selanjutnya pada pengamatan ketiga dengan waktu inkubasi selama 36 jam diperoleh nilai aktivitas enzim berturut-turut 1.07 IU/mL, 1.05 IU/mL, 1.24 IU/mL, 1.19 IU/mL, dan 1.18 IU/mL. Waktu inkubasi 24 jam sampai 36 jam menunjukkan aktivitas ekstrak enzim kasar yang dihasilkan mengalami peningkatan aktivitas enzim terhadap konsentrasi media L-Asparagin. Bila konsentrasi substrat diperbesar, makin banyak substrat yang dapat berhubungan dengan enzim pada bagian aktif enzim tersebut. Dengan demikian konsentrasi kompleks enzim substrat makin besar dan hal ini menyebabkan makin besarnya kecepatan reaksi (Poedjiadi, 2005: 159).

Selanjutnya pada pengamatan keempat dari ekstrak enzim kasar L-Asparaginase yang diinkubasi selama 48 jam diperoleh nilai aktivitas enzim berturut-

turut 1.19 IU/mL, 1.24 IU/mL, 1.68 IU/mL, 1.38 IU/mL, dan 1,45 IU/mL. Waktu inkubasi 48 jam menunjukkan titik optimum pada tiga konsentrasi media yaitu 0,6 g/ml, 1,0 g/ml dan 1,2 g/ml. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan konsentrasi enzim yang tetap, maka penambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi (Poedjiadi, 2005: 159).

Pada pengamatan kelima dari ekstrak enzim kasar L-Asparaginase yang diinkubasi selama 60 jam diperoleh nilai aktivitas enzim berturut-turut 1.03 IU/mL, 1.27 IU/mL, 1.55 IU/mL, 1.37 IU/mL, dan 1.49 IU/mL. Waktu inkubasi 60 jam menunjukkan konsentrasi pada media 0,6 g/ml dan 1,0 g/ml mengalami titik penurunan aktivitas enzim. Sedangkan pada media dengan konsentrasi 0,8 g/ml dan 1,4 g/ml telah mencapai titik optimum dari laju aktivitas enzimnya. Pada batas konsentrasi tertentu, tidak terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat diperbesar (Poedjiadi, 2005: 159).

Pengamatan terakhir dari ekstrak enzim kasar L-Asparaginase yang diinkubasi selama 72 jam diperoleh nilai aktivitas enzim 1.01 IU/mL, 0.97 IU/mL, 1.44 IU/mL, 1.43 IU/mL, dan 1.22 IU/mL. Waktu inkubasi 72 jam menunjukkan konsentrasi pada media 0,6 g/ml, dan 1,0 g/ml terus mengalami penurunan aktivitas enzim. Sedangkan pada konsentrasi 0,8 g/ml dan 1,4 g/ml baru mengalami titik penurunan aktivitas enzim. Akan tetapi konsentrasi media 1,2 g/ml baru menuju titik optimum dari aktivitas enzim. Pada suatu batas konsentrasi substrat tertentu, semua bagian aktif telah dipenuhi oleh substrat atau telah jenuh dengan substrat. Dalam keadaan ini, bertambah besarnya konsentrasi substrat tidak menyebabkan bertambah besarnya

konsentrasi kompleks enzim substrat, sehingga jumlah hasil reaksinya pun tidak bertambah besar (Poedjiadi, 2005: 159).

Sehingga pada penelitian ini menunjukkan waktu inkubasi optimum yang dibutuhkan untuk menghasilkan aktivitas enzim L-Asparaginase adalah 48 jam dengan nilai aktivitas sebesar 1.68 IU/ml yang diperoleh dari ekstrak enzim kasar dari jumlah amoniak yang dihasilkan dari hidrolisis asparagin.

Berdasarkan data hasil pengukuran konsentrasi optimum dari waktu inkubasi dan aktivitas enzim L-Asparaginase maka diperoleh hasil bahwa L-Asparagin dengan konsentrasi 1,0 g/mL adalah media yang menunjukkan titik optimum dari pertumbuhan bakteri dengan nilai *Optical Density* 1,53 pada waktu inkubasi 36 jam dan laju aktivitas enzim dengan nilai aktivitas 1,68 IU/mL pada waktu inkubasi 48 jam. Terdapat perbedaan waktu inkubasi optimum pada pengukuran laju pertumbuhan dengan aktivitas enzim dikarenakan hasil metabolit sekunder bakteri *Pseudomonas putida* dalam hal ini enzim L-Asparaginase mencapai waktu produksi optimum disaat bakteri mengalami laju pertumbuhan stasioner antara waktu inkubasi 36 – 48 jam. Sehingga metabolit sekunder yang dihasilkan saat pengujian enzim menunjukkan waktu inkubasi 48 jam sebagai titik optimum dari laju aktivitas enzimnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi substrat L-Asparagin optimum adalah konsentrasi 1,0 g/mL dengan waktu inkubasi selama 36 jam menunjukkan nilai OD (*Optical Density*) tertinggi sebesar 1,53. Laju aktivitas enzim L-Asparaginase optimum yang menghidrolisis L-Asparagin adalah konsentrasi 1,0 g/ml dengan waktu inkubasi 48 jam menunjukkan nilai aktivitas tertinggi sebesar 1.68 IU/ml.

#### ***B. Saran***

Adapun saran pada penelitian ini adalah perlunya dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang produksi enzim L-Asparaginase yang dapat dilanjutkan dengan pemurnian dan pengujian lebih lanjut dari enzim yang dihasilkan agar dapat diaplikasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA


- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury. 2006. *Shahih Muslim*. Dar Thayibah: Riyadh.
- Adam, Syamsunir. 1995. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Parasitologi*. Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- Ahmad, A., Patta, A. M., and Natsir, H., 2013. *Immobilization and Characterization of L-Asparaginase from Thermophilic Bacteria Bacillus licheniformis Strain HSA3-1a*. International Journal of Pharma and Bio Science, Vol. 4. 155-162.
- Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah. 2001. *Shahih Bukhari*. Daarut Thuqinnajah: Riyadh.
- Aprigiyonies, Fika Enri. "Kloning dan Sekuensing Gen L-Asparaginase yang berasal dari bakteri (*Erwinia raphontici*) dan (*Bacillus circulans*) Di (*E. Coli*)". *Skripsi*. Fakultas MIPA Prodi Reguler Farmasi UI. 2011.
- Armstrong, Frank B., 1995. *Biokimia*. Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- Atlas, R., and Bartha, R., 1993, *Microbial Ecology, Fundamentals and Applications*, Edisi ke-3, The Benyamin Publishing, California.
- Baharuddin, Maswati. 2011. *Biokimia Dasar*. Alauddin University Press: Makassar
- Basha, N.S., Rekha, R., Komala, M., dan Ruby, S., 2009, *Production of Extracellular Anti-Lukaeia Enzyme L-asparaginase from arine actinomycetes by Solid-State and Submerged Fermentation : Purification and Characterization*, Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 8(4), 353-360.
- Bintang, Maria. 2010. *Biokimia Teknik Penelitian*. Erlangga: Jakarta
- Budiyanto, Agus Krisno. 2011. <https://aguskrisnoblog.wordpress.com/2011/12/30/pemanfaatan-bakteri-pseudomonas-untuk-bioremediasi-akibat-pencemaran-minyak-bumi/>. Diakses tanggal 30 Oktober 2017.
- Departemen Agama. 2012. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: Departemen Agama RI.
- Dorothy, E.S., 1992, *Intisari Biokimia*, Binarupa Aksara, hlm: 331-334.

- El-Bessoumy, A.A., Sarhan, M., dan Mansour, J., 2004. *Pruduction, Isolaton, and Purification of L-Asparaginase from Pseudomonas Aeruginosa 50071 Using Solid-state Fermentation*, Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 4(37), 387-393.
- Fattah, Yasser R. A., Olama, Zakia A., 2002. *L-Asparaginase production by Pseudomonas aeruginosa in solid-state Culture: Evaluation and optimization of culture conditions using factorial design*, Process Biochemistry 38, 115-122.
- Fitriani, Hasnah Natsir, Damma Salama. “*Eksplorasi Mikroba Penghasil Enzim Protease Dari Sumber Air Panas Lejja Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*”. Indonesia Chimica Acta.
- Ghasemi, Y., Ebrahimi, A., Rasoul-Amini, S., Zarrini, G., dan Ghoshoon, MB., 2008, *An Optimized Medium for Screening of L-Asparaginase Production by Escherichia coli*, American Journal of Biochemistry an Biotechnology, 4(4), 422-424.
- Gulati, R., Saxena, R.K., & Gupta, R., 1997, *A Rapid Plate Assay for Screening L-Asparaginase, Producing Microorganisms*, Lett. Appl Microbiology, 24, 23-26
- Hafsan, 2011, Mikrobiologi Umum, Alauddin University Press: Makassar
- Harti, Agnes Sri. 2015. *Mikrobiologi Kesehatan Peran Mikrobiologi Dalam Bidang Kesehatan*, Penerbit Andi: Yogyakarta
- Hasannudin. 2017. *Peranan Bakteri dalam Kehidupan Manusia*. <http://sainsbiologi.com/peranan-bakteri-dalam-kehidupan-manusia/>. Diakses pada 15 Oktober 2017
- Herawati, 2001. *Isolasi dan Karakterisasi Enzim Asparaginase dari Aspergillus niger 6088 IFO 6341*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim. Terj. Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa. *Tafsir Ibnu Katsir*. Solo. Penerbit Insan Kamil Solo. 2016.
- Imam, Aang, 2015. *Pengertian Bakteri, Ciri-ciri, Klasifikasi, dan Contoh Peranan*. <http://www.kuliah.info/2015/12/pengertian-bakteri-ciri-ciri-klasifikasi-contoh-peranan.html>. Diakses pada 30 Oktober 2017

- Iswari, Retno Sri dan Ari Yusniastuti. 2006. *Biokimia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Kimball, John W. 1983. *Biologi Edisi Kelima Jilid I*. Erlangga: Jakarta
- Kotzia, G.A., Labrou, N.E.. 2005. *Cloning, expression, and characterization of Erwinia carotova L-asparaginase*. Journal of Biotechnology 119: 309-323.
- Kurnia, D. R. D., 2010. Studi Aktivitas Lipase dari Aspergillus niger sebagai Biokatalis pada Proses Gliserolisis untuk Menghasilkan Monoasilgliserol. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kusnawidjaja, Kurnia. 1987. *Biokimia*. P.T Alumni: Bandung
- Lehninger, Albert L. 1982. *Dasar-Dasar Biokimia*. Erlangga: Jakarta
- Manikandan, R., C.N. Pratheeba, P. Sah & S. Sah. 2010. *Optimizing of asparaginase production by Pseudomonas aeruginosa using experimental methods*. Nature and Science 8(2): 1-6.
- Masri, Mashuri. Kajian Enzim L-Asparaginase dari Bakteri Simbion Makroalga *Sargassum polycystum* : Produksi, Pemurniaan, Karakterisasi dan Aplikasi Dalam Menghambat Proliferasi Sel Kanker HeLa. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 2014.
- Moorthy, V., Ramalingan, A., Sumantha, A., and Shankaranaya, R. T., 2010, *Production, Purification and Characterization of extracellular L-Asparaginase from Soil Isolate of Bacillus sp.*, African Journal of Microbiology Research, 4(18), 1862-1867.
- Nadyah, 2011. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan*. Alauddin University Press: Makassar.
- Ngili, Yohanis. 2009. *Biokimia: Struktur & Fungsi Biomolekul*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Patta, Abdul Muis. Isolasi, Pemurnian Parsial, Amobilisasi, Dan Karakterisasi L-Asparaginase dari Bakteri Termofilik *Bacillus licheniformis* STRAIN HSA3-1A. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 2013.
- Page, David S. 1997. *Prinsip-Prinsip Biokimia*. Erlangga: Jakarta
- Poedjiadi, Anna., & Titin Supriyanti. 2005. *Dasar-Dasar Biokimia*. UI-Press: Jakarta
- Sadikin, Mohamad. 2002. *Biokimia Enzim*, Widya Medika: Jakarta

- Shinya, Hiromi. 2010. *The Miracle of Enzyme*. Penerbit Qanita: Jakarta
- Siddalingshwara, dan Lingappa, 2011, *Production and Characterization of L-Asparaginase – A Tumour inhibitor*, International Journal PharmTech Research 1(3), 314-319.
- Sihaloho, W.S., 2009, *Analisa Kandungan Amonia dari Limbah Cair Inlet dan Outlet dari beberapa Industri Kelapa Sawit*, Departemen Kimia FMIPA USU, Medan.
- Verma, N., K. Kumar, G. Kaur & S. Anand. 2007. *L-asparaginase: a promising chemotherapeutic agent*. Critical review in biotechnology 27: 45-62.
- Winardiana, Ali. 2014. *Fungsi Asam Amino Non Esensial Dan Esensial*. <http://ali-winardiana.blogspot.co.id/2014/02/fungsi-asam-amino-non-esensial-dan.html>. Diakses pada 10 November 2017
- Wirahadikusumah, Muhammad, 1977. *Biokimia*, Penerbit ITB: Bandung
- Yano, S., R. Minato, J. Thongsanit, T. Tachiki & M. Wakayama. 2008. *Overexpression of type I L-asparaginase of Bacillus subtilis in Eschericia coli, rapid purification and characterisation of recombinant type L-asparaginase*. Annals of Microbiology 58(4): 711-716.
- Youssef, M., Al-Omair, M. 2008. *Cloning, Purification, Characterization and Immobilization of L-Asparaginase II from E.coli W3110*. Asian Journal of Biochemistry., Vol. 3, 337-350.
- Yuwono, Triwibowo. 2005, *Biologi Molekuler*. Penerbit Erlangga: Jakarta


**Lampiran 1. Bagan dan Gambar Kerja Isolasi dan Produksi L-Asparaginase dari bakteri *Pseudomonas putida***




## Peremajaan Bakteri *Pseudomonas putida*




## Kultur Bakteri *Pseudomonas putida*



## Pembuatan Media Produksi Enzim L-Asparaginase





## Penentuan Konsentrasi dan Waktu Inkubasi Optimum Substrat L-Asparagin







## Lampiran 2. Bagan Kerja & Gambar Pembuatan Reagen Nessler



### Lampiran 3. Bagan Kerja & Gambar Pembuatan Larutan Standar Amoniak



#### Lampiran 4. Bagan Kerja Pembuatan Larutan Buffer Tris HCl 0.05 M pH 8




Perhitungan :

$$\text{Mr Tris HCl} = 121.14 \text{ g/mol}$$


$$\begin{aligned} \text{Gram} &= M \times \text{Mr} \times V \text{ (liter)} \\ &= 0,05 \times 121,14 \times 1 \\ &= 6.057 \text{ gram} \end{aligned}$$

Tris HCl = Tris(hidroksimetil)-aminometan (  $\text{NH}_2\text{-C-(CH}_2\text{OH)}_3$  )

## Lampiran 5. Bagan Kerja & Gambar Prosedur Uji Aktivitas L-Asparaginase



1 unit Aktivitas L-Asparaginase = jumlah enzim L-Asparaginase yang mengkatalisis pelepasan satu  $\mu\text{mol}$  amoniak permenit pada kondisi pengujian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## Lampiran 6. Komposisi Media Produksi dan Media Kultur

Bahan	Komposisi		
	1 L	100 mL	50 mL
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> .12H <sub>2</sub> O	6 g	0,6 g	0,3 g
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	3 g	0,3 g	0,15 g
NaCl	0,5 g	0,05 g	0,025 g
MgSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O	2 g	0,2 g	0,1 g
CaCl <sub>2</sub> 0,1 M 1 mL	0,011099 g	0,00111 g	0,000555 g
glukosa 20 % 10 mL	2 g	0,2 g	0,1 g

1. Untuk CaCl<sub>2</sub> 0,1 M 1 mL  
Nilai BM (Berat Molekul) = 110,99

Berapa gram CaCl<sub>2</sub> yang ditimbang untuk 1 Liter larutan

$$\begin{aligned} \text{Gr} &= \text{BM} \times \text{M} \times \text{V (Liter)} \\ &= 110,99 \times 0,1 \times 1 \text{ L} \\ &= 11,099 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk 1 mL CaCl}_2 & \\ &= 11,099 \times 1000 \\ &= 0,011099 \text{ gr} \end{aligned}$$

2. Untuk Glukosa 20%  
Glukosa 20 gr/100 mL


$$\begin{aligned} \text{Dalam 10 ml} &= \frac{20 \text{ gr}}{100 \text{ mL}} \times 10 \\ &= 2 \text{ gr} \end{aligned}$$

**Lampiran 7. Hasil Pengukuran Optical Density (absorbansi 646 nm) sebagai Laju Pertumbuhan Bakteri *Pseudomonas putida***

No.	Waktu Inkubasi	Sampel	Absorbansi 1	Absorbansi 2	Rata-Rata
1	12 jam	0.6 g/mL	0.926	0.946	0.93
		0.8 g/mL	0.820	0.855	0.83
		1.0 g/mL	1.208	1.008	1.10
		1.2 g/mL	0.976	1.056	1.01
		1.4 g/mL	0.973	1.004	0.98
2	24 jam	0.6 g/mL	1.254	1.268	1.26
		0.8 g/mL	1.156	1.180	1.16
		1.0 g/mL	1.574	1.378	1.47
		1.2 g/mL	1.329	1.425	1.37
		1.4 g/mL	1.332	1.366	1.34
3	36 jam	0.6 g/mL	1.270	1.477	1.37
		0.8 g/mL	1.357	1.301	1.32
		1.0 g/mL	1.582	1.497	1.53
		1.2 g/mL	1.388	1.398	1.39
		1.4 g/mL	1.305	1.419	1.36
4	48 jam	0.6 g/mL	1.223	1.442	1.33
		0.8 g/mL	1.204	1.252	1.22
		1.0 g/mL	1.550	1.436	1.49
		1.2 g/mL	1.317	1.356	1.33
		1.4 g/mL	1.266	1.356	1.31
5	60 jam	0.6 g/mL	1.202	1.378	1.29
		0.8 g/mL	1.188	1.296	1.24
		1.0 g/mL	1.560	1.457	1.50
		1.2 g/mL	1.308	1.411	1.35
		1.4 g/mL	1.178	1.295	1.23
6	72 jam	0.6 g/mL	1.175	1.401	1.28
		0.8 g/mL	1.168	1.220	1.19
		1.0 g/mL	1.602	1.398	1.50
		1.2 g/mL	1.336	1.384	1.36
		1.4 g/mL	1.131	1.248	1.18

**Lampiran 8. Tabel dan Grafik Kurva Standar Amoniak pada  $\lambda = 450 \text{ nm}$**

Konsentrasi ( $\mu\text{mol/mL}$ )	Absorbansi
0,1	0,163
0,2	0,318
0,4	0,478
0,6	1,368





**Lampiran 9. Hasil Penentuan Rumus Kurva Standar Amoniak pada  $\lambda = 450 \text{ nm}$**

Data Penentuan Rumus Kurva Standar Amoniak pada  $\lambda = 450 \text{ nm}$

X	Y	XY	X <sup>2</sup>
0,1	0,163	0,0163	0,01
0,2	0,318	0,0636	0,04
0,4	0,478	0,1912	0,16
0,6	1,368	0,8208	0,36
1,3	2,327	1,0919	0,57

$$\text{Slope} = a = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$a = \frac{4(1,0919) - (1,3)(2,327)}{4(0,57) - (1,69)} = \frac{1,3425}{0,59} = 2,2754$$

$$\text{Intersept} = b = \frac{\sum Y_i - (a \sum X_i)}{n}$$

$$= \frac{2,327 - (2,275)(1,3)}{4} = -0,157$$

Jadi persamaan garis kurva standar amonium sulfat adalah

$$Y = 2,2754x - 0,1578$$

## Lampiran 10. Rumus Penentuan Aktivitas Enzim L-Asparaginase

Untuk mendapatkan nilai aktivitas L-Asparaginase digunakan persamaan :

$$\text{Aktivitas Enzim (IU/mL)} = \frac{(y-a)}{b} \times \frac{V. \text{ Total}}{V. \text{ Analisis}} \times \frac{1}{V. \text{ Enzim}} \times \frac{1}{t. \text{ Inkubasi}}$$

Dimana :

- Y = Absorbansi  
a = Slope (2,2754)  
b = intersept (-0,157)  
V. Total = Volume enzim + substrat + buffer + TCA (2,5 mL)  
V. Analisis = Volume total yang dianalisis (0,5 mL)  
V. Enzim = Volume enzim yang dianalisis (0,1 mL)  
t inkubasi = Waktu inkubasi enzim (10 menit)


**Lampiran 11. Hasil Perhitungan Aktivitas Enzim L-Asparaginase pada tiap variasi konsentrasi substrat (Dari kurva standar diperoleh dimana  $Y = 2,2754x - 0,1578$ )**

Jam	Konsentrasi	y	b	a	y-b	(y-b)/a	Aktivitas (IU/mL)
12	6	0,126	-0,157	2,275	0,283	0,1244	<b>0,62</b>
	8	0,124	-0,157	2,275	0,281	0,1235	<b>0,62</b>
	10	0,104	-0,157	2,275	0,261	0,1147	<b>0,57</b>
	12	0,096	-0,157	2,275	0,253	0,1112	<b>0,56</b>
	14	0,146	-0,157	2,275	0,303	0,1332	<b>0,67</b>
24	6	0,18	-0,157	2,275	0,337	0,1481	<b>0,74</b>
	8	0,149	-0,157	2,275	0,306	0,1345	<b>0,67</b>
	10	0,183	-0,157	2,275	0,34	0,1495	<b>0,75</b>
	12	0,186	-0,157	2,275	0,343	0,1508	<b>0,75</b>
	14	0,18	-0,157	2,275	0,337	0,1481	<b>0,74</b>
36	6	0,332	-0,157	2,275	0,489	0,2149	<b>1,07</b>
	8	0,322	-0,157	2,275	0,479	0,2105	<b>1,05</b>
	10	0,407	-0,157	2,275	0,564	0,2479	<b>1,24</b>
	12	0,384	-0,157	2,275	0,541	0,2378	<b>1,19</b>
	14	0,38	-0,157	2,275	0,537	0,2360	<b>1,18</b>
48	6	0,383	-0,157	2,275	0,54	0,2374	<b>1,19</b>
	8	0,405	-0,157	2,275	0,562	0,2470	<b>1,24</b>
	10	0,606	-0,157	2,275	0,763	0,3354	<b>1,68</b>
	12	0,469	-0,157	2,275	0,626	0,2752	<b>1,38</b>
	14	0,505	-0,157	2,275	0,662	0,2910	<b>1,45</b>
60	6	0,313	-0,157	2,275	0,47	0,2066	<b>1,03</b>
	8	0,422	-0,157	2,275	0,579	0,2545	<b>1,27</b>
	10	0,549	-0,157	2,275	0,706	0,3103	<b>1,55</b>
	12	0,466	-0,157	2,275	0,623	0,2738	<b>1,37</b>
	14	0,521	-0,157	2,275	0,678	0,2980	<b>1,49</b>
72	6	0,301	-0,157	2,275	0,458	0,2013	<b>1,01</b>
	8	0,285	-0,157	2,275	0,442	0,1943	<b>0,97</b>
	10	0,499	-0,157	2,275	0,656	0,2884	<b>1,44</b>
	12	0,492	-0,157	2,275	0,649	0,2853	<b>1,43</b>
	14	0,399	-0,157	2,275	0,556	0,2444	<b>1,22</b>

**Lampiran 12. Gambar Pengamatan Pengukuran Laju Pertumbuhan Bakteri *Pseudomonas putida***



Pengukuran laju pertumbuhan bakteri



Inkubasi media produksi dalam incubator shaker


**Lampiran 13. Gambar Pengamatan Uji Aktivitas Enzim dengan Reagen Nessler**



12 jam




24 jam




36 jam



48 jam



60 jam



72 jam

## RIWAYAT HIDUP



Muh. Alamsyah lahir di Makassar, Pada tanggal 20 Juni 1992, Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1998-2004 di SDN Inpres Mangkura, Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 Makassar pada tahun 2004-2007. Selanjutnya penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Makassar pada tahun 2007-2010. Pada tahun 2010, penulis mengikuti Ujian Masuk Lokal di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dinyatakan lulus pada jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam bidang keorganisasian, penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Biologi periode 2011 sebagai pengurus HMJ. Selain itu penulis juga selama menjadi mahasiswa tercatat aktif menjadi asisten praktikum mata kuliah Mikrobiologi dan Genetika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R