

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA NY “F”
GESTASI 38– 40 MINGGU DENGAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 16 S/D 17 MEI 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
Diploma Kebidanan di Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
ALAUDDIN
SULFIANI
M A K A S S A R
NIM : 70400114053

**JURUSAN D3 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulfiani

Nim : 70400114053

Tempat,Tanggal Lahir: Pinrang, 11 Agustus 1996

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma

Alamat : Jl. Sultan Alauddin II, Lr III/II

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care pada Ny “F”
Gestasi 38 – 40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di
Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tanggal 16 S/D 17
Mei 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 30 Oktober 2017

Penyusun

Sulfiani
70400114053

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care pada Ny “F” Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpangang Baru Tanggal 16 s/d 17 Mei 2017**”, yang disusun oleh **Sulfiani NIM: 70400114053**, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin, 30 Oktober 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 30 Oktober 2017
10 Safar 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT.,SKM.,M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Firdayanti, S.Si.T, M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes** (.....)

Penguji I : **dr. Dewi Setiawati, Sp. OG.,M.kes** (.....)

Penguji II : **Dr. Sohrah, M.Ag** (.....)

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun KTI dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar”. KTI ini diajukan kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armin Nuridin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT.,S.KM.,M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb selaku pembimbing I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas.
5. Ibu dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbingku dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu dr. Dewi Setiawati, Sp.OG,.M.Kes selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibu Dr. Sohrah, M.Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiyah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan kebidanan.
9. Direktur Puskesmas Jumpang Baru dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Ucapan yang tak ternilai harganya untuk Ayahanda Guntur dan Ibunda Rahma tercinta atas doa, dukungan serta pengorbanannya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

11. Kepada Ir. Kamil Dondi Kallo dan Dra. Sitti Halijah selaku orang tua sekaligus wali selama penulis menempuh pendidikan, yang telah senantiasa memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
12. Kepada saudaraku tercinta Maryana, SKM yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
13. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2014.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Innamal a’malu bin niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, 30 Oktober 2017

Penulis

SULFIANI
70400114053

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Metode Penulisan.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsep Dasar Persalinan	14
1. Definisi Persalinan	14
2. Patofisiologi Persalinan.....	15

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan	17
4. Tahapan Persalinan.....	20
a. Kala I (Pembukaan).....	20
1. Pengertian Kala I.....	20
2. Perubahan Fisiologi Pada Kala I.....	21
3. Perubahan Psikologis Kala I	25
4. Masalah Dan Penyulit Pada Kala I.....	25
5. Partograf.....	27
b. Kala II.....	37
1. Pengertian Kala II	37
2. Tanda Dan Gejala Kala II	37
3. Mekanisme Persalinan Normal	38
4. Langkah-langkah Pertolongan Persalinan Normal.....	43
5. Komplikasi Dan Penyulit Pada Kala II.....	51
c. Kala III	52
1. Pengertian Kala III	52
2. Tanda-Tanda Lepasnya Plasenta.....	53
3. Metode Pelepasan Plasenta	53
4. Pengeluaran Plasenta.....	54
5. Pemeriksaan Plasenta	55
6. Deteksi Dan Komplikasi Kala III.....	55

d. Kala IV.....	58
1. Pemeriksaan Serviks, Vagina Dan Perineum.....	58
2. Pemantauan Dan Evaluasi Lanjut	59
3. Tanda Bahaya Kala IV	60
B. Teori Manajemen Kebidanan.....	61
C. Al-Quran Tentang Persalinan.....	71
BAB III STUDI KASUS.....	76
KALA I.....	76
A. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	76
B. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	83
C. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	91
D. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi	91
E. Langkah V. Rencana tindakan	91
F. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	93
G. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	96
KALA I.....	98
A. Data Subjektif.....	98
B. Data Objektif.....	100
C. Assesment	102
D. Planning	102

KALA II.....	106
A. Data Subjektif.....	106
B. Data Objektif.....	107
C. Assesment	107
D. Planning	107
KALA III.....	113
A. Data Subjektif.....	113
B. Data Objektif.....	114
C. Assesment	114
D. Planning	114
KALA IV	119
A. Data Subjektif.....	119
B. Data Objektif.....	120
C. Assesment	120
D. Planning	120
BAB IV PEMBAHASAN.....	125
BAB V PENUTUP.....	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Partograf (halaman depan).....	35
Gambar 2.2: Partograf (halaman belakang)	36
Gambar 2.3: Gerakan Fleksi	40
Gambar 2.4: Gerakan kepala janin pada defleksi.....	42
Gambar 2.5: Gerakan kepala janin melakukan putaran paksi luar.....	42
Gambar 2.6: Partograf kasus	124



DAFTAR TABEL

Tabel1 :Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu.....	78
Tabel2 :Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his	93
Tabel3 :Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his	104
Table 4 :Tanda-tanda vital pasca persalinan.....	121



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran II : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Wali Kota Makassar Badan Kesbang Dan Politik Hubungan Antar Lembaga.
- Lampiran III : Surat izin rekomendasi penelitian dari Wali kota Makassar/Kepala Badan Kesbang Dan Politik Hubungan Antar Lembaga kepada Pemerintahan Kota Makassar Dinas Kesehatan.
- Lampiran IV : Surat izin penelitian dari Pemerintahan Kota Makassar Dinas Kesehatan.
- Lampiran V : Surat keterangan selesai penelitian dari Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- Lampiran VI : Daftar riwayat hidup

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, OCTOBER 30, 2017

Name : Sulfiani
Student Reg. No. : 70400114053
Title : **Management of Intranatal Care Midwifery on Mrs. "F" Gestation 38-40 Sunday with Normal Birth Care at Jumpandang Baru Public Health Care on May 16-17, 2017**

Normal delivery is a fetal cleavage process that occurs in a month-long pregnancy (37-42) weeks, spontaneously born with a rear-end presentation lasting 18 hours, with no maternal or fetal complications.

This Scientific Paper is aimed at implementing the Intranatal Care Midwifery Management on Mrs. "F" Gestation 38-40 with Normal Birth Care at Jumpandang Baru Public Health Care in 2017 using a 7-step midwifery care management approach according to Helen Varney and documentation in the form of SOAP.

The result from a case study applied on Mrs. "F" with Normal Birth Care is not found obstacles in dealing with problems with Normal Birth Care. In the management of Normal Birth Care on Mrs. "F" is conducted with the provision of clean and safe care and make efforts to prevent complications, particularly postpartum hemorrhage, hypothermia, and newborn asphyxia, as well as monitoring and upbringing from stage I to stage IV.

The conclusions of the case study with the management of 7 Varney steps and documentation in the form of SOAP namely from stage I to stage IV are all normal with no complications, no complications or problems to the fetus and mother, and the state of the mother and baby both marked with signs, vital signs within normal limits.

Keywords: Normal Birth Care, 7 Varney Steps



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, 30 OKTOBER 2017

Nama : Sulfiani

Nim : 70400114053

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care pada Ny “F” Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Tanggal 16 s/d 17 Mei 2017

Persalinan normal merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42) minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care pada Ny “F” Gestasi 38-40 dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “F” dengan Asuhan Persalinan Normal yakni tidak ditemukannya kendala dalam menangani masalah dengan Asuhan Persalinan Normal. Dalam penatalaksanaan Asuhan Persalinan Normal pada Ny “F” yaitu dilakukan dengan pemberian asuhan yang bersih dan aman serta melakukan upaya pencegahan komplikasi terutama perdarahan pasca persalinan, hipotermia, dan asfiksia bayi baru lahir, serta dilakukannya pemantauan dan asuhan dari kala I sampai kala IV.

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yakni dari kala I hingga kala IV semuanya berlangsung normal tanpa ada penyulit, tidak ditemukannya komplikasi atau masalah pada janin dan ibu, serta keadaan ibu dan bayi baik yang ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Kata Kunci : Asuhan Persalinan Normal, 7 Langkah Varney.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar. Persalinan mencakup proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Nurul Jannah, 2017: 1).

Persalinan normal juga dapat dikatakan sebagai suatu fenomena alam yang mengarah pada penciptaan kehidupan baru, hal tersebut merupakan momen paling menyentuh dan spesial dalam kehidupan seorang wanita dan merupakan pengalaman unik yang bisa mereka dapatkan dan pada persalinan normal ini seorang ibu dilatih untuk menghilangkan rasa takut dan kegelisahannya dalam menghadapi persalinannya (Eun-Young Choi, dkk, 2015: 233).

Kematian dan kesakitan ibu masih merupakan masalah kesehatan yang serius di Negara berkembang. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia yaitu 289.000 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa Negara memiliki AKI cukup tinggi seperti Afrika Sub-Sahata 179.000 jiwa per 100.000 kelahiran hidup, Asia Selatan 69.000 jiwa per 100.000

kelahiran hidup, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Negara-Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 190 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 49 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 26 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Kawasan ASEAN. Pada tahun 2007, ketika AKI di Indonesia mencapai 228, AKI di Singapura hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 33 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 112 per 100.000 kelahiran hidup, serta Malaysia dan Vietnam sama-sama mencapai 160 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2012 SDKI kembali mencaat kenaikan AKI yang signifikan, yakni dari 228 menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target yang diharapkan berdasarkan *Melenium Development Goals* (MDSGs) pada tahun 2015 yaitu 102/100.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti AKI di Indonesia jauh diatas target yang ditetapkan WHO patau hampir dua kali lebih besar dari target WHO (Depkes Kesehatan Indonesia, 2015).

Tahun 2014 tercatat jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 138 kasus. Kondisi ini belum mencapai angka yang ditargetkan yaitu 101 kasus dan mengalami peningkatan sebanyak 37 kasus dari tahun sebelumnya (tahun 2013 = 108 kasus). Adapun daerah yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun

2014 adalah Kabupaten Jeneponto sebanyak 13 kasus, kemudian Kabupaten Gowa dan Bone sebanyak 12 kasus, Kabupaten Bulukumba sebanyak 11 Kasus. Sedangkan Kabupaten yang berhasil menekan jumlah kasus kematiannya adalah Kabupaten Barru dan Bantaeng sebanyak 0 kasus.

Distribusi penyebab kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tahun 2014 karena perdarahan sebanyak 44 kasus (31,88%), karena Hipertensi dalam kehamilan sebanyak 55 kasus (39,85%), karena infeksi sebanyak 3 kasus (2,17%), karena gangguan sistem peredaran darah (jantung, *stroke*, dll) sebanyak 2 kasus (1,44%) dan karena penyebab lain sebanyak 34 kasus (24,63%). Penyebab lain tersebut antara lain adalah karena penyakit jantung, ginjal, *Retensio urine*, *stroma*, gangguan pernapasan dan penyakit bawaan lainnya pada ibu hamil (Depkes Sul-Sel, 2016).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan jumlah persalinan normal yang terjadi dari tahun 2012-2016 sebanyak 4896 orang. Dimana Pada tahun 2014 jumlah persalinan normal sebanyak 1020 orang, dengan jumlah kelahiran hidup 1017 orang dan lahir mati sebanyak 3 orang. Pada tahun 2015 jumlah persalinan normal sebanyak 1010 orang dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 1007 orang dan lahir mati sebanyak 3 orang dan pada tahun 2016 di dapatkan data dengan jumlah persalinan normal sebanyak 981 orang, dengan jumlah kelahiran hidup 917 dan lahir mati sebanyak 1 orang.

Persalinan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dimana angka kematian ibu bersalin yang cukup tinggi. Keadaan ini disertai dengan komplikasi yang mungkin saja timbul selama persalinan, sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam bidang kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka kematian, kesakitan ibu dan perinatal. Persalinan sampai saat ini masih merupakan masalah dalam pelayanan kesehatan. Hal ini diakibatkan pelaksanaan dan pemantauan yang kurang maksimal dapat menyebabkan ibu mengalami berbagai masalah, bahkan dapat berlanjut pada komplikasi (Atika Purwandari, dkk, 2014: 47).

Di Afrika dan Negara berkembang lainnya penyebab tingginya angka kematian ibu dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan yang terampil dalam membantu proses persalinan sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama kematian ibu pada daerah tersebut. Dengan demikian, perawatan *intra-partum* yang meliputi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil sangat penting untuk mengurangi angka kematian pada ibu (Abdurrahman, dkk, 2016: 64).

Banyak penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa ibu-ibu di Indonesia tidak mau meminta pertolongan tenaga terlatih untuk memberikan asuhan persalinan dan melahirkan bayi. Sebagian dari mereka beralasan bahwa penolong terlatih tidak memperhatikan kebudayaan, tradisi dan keinginan pribadi para ibu dalam persalinan dan kelahiran bayinya. Penyebab lain dari utilisasi atau pemanfaatan fasilitas kesehatan adalah peraturan yang rumit dan prosedur tak bersahabat/menakutkan bagi para ibu.

Asuhan persalinan normal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui upaya yang terintegritas dan lengkap tetapi dengan intervensi, sehingga setiap intervensi yang akan di aplikasikan dalam asuhan persalinan normal mempunyai alasan dan bukti ilmiah yang kuat tentang manfaat intervensi tersebut bagi kemajuan dan keberhasilan proses persalinan. Asuhan persalinan memegang kendali penting pada ibu karena dapat membantu ibu dalam mempermudah proses persalinannya, membuat ibu lebih yakin untuk menjalani hal tersebut serta untuk mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi dan ketidaknormalan dalam proses persalinan (Aat Agustini, dkk, 2012: 2).

Maka untuk melaksanakan standar Asuhan Persalinan Normal (APN) diperlukan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ada, salah satunya upaya yaitu perlunya bidan mengikuti pelatihan APN terutama yang belum pernah mengikuti.

Hubungan antara kompetensi bidan berdasarkan sikap dengan pelaksanaan Asuhan Persalinan Normal (APN) juga dapat mempengaruhi dimana sikap bidan yang kurang mendukung dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan bidan dalam pelaksanaan asuhan persalinan normal yang dilakukan. Sikap bidan terhadap asuhan persalina normal (APN) yaitu dibuktikan dengan adanya tindakan yang sesuai saat persalinan berdasarkan 58 langkah asuhan persalinan normal yang merupakan salah satu faktor keberhasilan bidan dalam menyelamatkan ibu dan bayi dimasa kritis yaitu masa persalinan dan nifas. Maka upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APN dapat dapat dilakukan instansi kesehatan dengan menumbuhkan sikap bidan

yang mendukung terhadap pelaksanaan APN melalui kegiatan seminar, pelatihan dan pengawasan (Suyanti, 2015).

1. Standar Kompetensi Bidan

Bidan menurut *International Confederation Of Midwives* (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan *Federation of International Gynecologist Obstetrition* (FIGO) tersebut adalah: Bidan adalah seseorang yang mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas.

Memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan. Standar kompetensi bidan menurut Kepmenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007 yang berkalitan dengan persalinan terdapat pada kompetensi ke IV yaitu :

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir (Kepmenkes RI, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil kasus dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny ”F” Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini adalah Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny ”F” Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny ”F” Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan pengkajian secara komprehensif melalui pendekatan manajemen kebidanan dengan pola pikir varney yang di tuangkan dalam bentuk SOAP di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar 2017.
- b. Dilaksanakannya pengidentifikasian diagnose/masalah aktual pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny ”F” Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

- c. Dilaksanakannya pengidentifikasian diagnose/masalah potensial pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "F" Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- d. Dilaksanakannya tindakan segera pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "F" Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- e. Dilaksanakannya penyusunan rencana asuhan yang menyeluruh pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "F" Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan dengan efisien dan aman pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "F" Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- g. Dilaksanakannya evaluasi pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "F" Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- h. Didokumentasikan hasil pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "F" Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil laporan ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi perkembangan ilmu kebidanan, khususnya dalam pemberian asuhan kebidanan persalinan normal pada ibu bersalin fisiologis di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar 2017.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Institusi

Sebagai bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Penerapan Asuhan Persalinan Normal.

b. Manfaat Ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

c. Manfaat Bagi Penulis

Hal ini merupakan pengalaman yang dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan dalam penerapan pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny "F" Gestasi 38-40 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

d. Manfaat bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang Asuhan Persalinan Normal.

e. Manfaat bagi Lahan Praktik

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada Asuhan Persalinan Normal Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

f. Manfaat bagi Pasien

Pasien dapat menerima asuhan kebidanan persalinan normal yang bersih dan sehat.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan intranatal care khususnya pada Asuhan Persalinan Normal.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi : Identifikasi data dasar, identifikasi Diagnosa/ masalah aktual, Identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik :

a. Anamnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi, adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi, merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenek digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu : pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang asuhan persalinan normal, tinjauan khusus tentang asuhan persalinan normal, tinjauan persalinan menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar dalam memberikan asuhan kebidanan intranatal care dengan asuhan persalinan normal.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Persalinan

1. Definisi persalinan

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya *serviks* dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala tanpa komplikasi baik ibu dan janin (Dwi, dkk, 2012: 1).

Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan (37-42 minggu), atau hampir cukup bulan di susul dengan pengeluaran placenta dan selaput janin dari tubuh ibu atau persalinan adalah proses pengeluaran produk konsepsi yang variabel melalui jalan lahir biasa (Dewi Setiawati, 2013: 53).

Dari kesimpulan di atas dapat di kemukakan bahwa persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang cukup bulan, lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala, di susul dengan pengeluaran plasenta dan selaput ketuban dari tubuh ibu, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin,

a. Bentuk persalinan berdasarkan tehnik :

- 1) Persalinan spontan, yaitu persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir.

- 2) Persalinan buatan, yaitu persalinan dengan tenaga dari luar dengan *ekstraksi forceps*, *ekstraksi vakum* dan *section sesaria*.
- 3) Persalinan anjuran, yaitu persalinan tidak dimulai dengan sendirinya tetapi berlangsung setelah memecahkan ketuban, pemberian *pitocin prostaglandin* (Ai yeyeh, dkk, 2014: 2).

2. Patofisiologi Persalinan

a. Tanda-tanda persalinan sudah dekat

Sebelum terjadi persalinan, beberapa minggu sebelumnya wanita memasuki “bulannya” atau “minggunya” atau “harinya” yang di sebut dengan kala pendahuluan. Ini memberikan tanda-tanda sebagai berikut :

1) *Lightening*

Pada minggu ke 36 pada primigravida terjadi penurunan fundus karena kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul yang disebabkan oleh : Kontraksi *braxton hicks*, ketegangan otot, ketegangan *ligamentum rotundum* dan gaya berat janin kearah bawah.

2) Terjadinya his permulaan

Makin tua usia kehamilan pengeluaran *progesterone* dan *estrogen* semakin berkurang sehingga oksitosin dapat menimbulkan kontraksi, yang lebih sering yang disebut his palsu, sifat his palsu yaitu rasa nyeri ringan dibagian bawah, datangnya tidak teratur, tidak ada perubahan *serviks*, durasinya pendek, tidak bertambah jika beraktivitas (Ai Nursiah, dkk, 2014: 6).

b. Tanda-tanda persalinan

- 1) Timbulnya his persalinan ialah his pembukaan dengan sifat-sifatnya sebagai berikut : Nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan, teratur, makin lama makin pendek intervalnya dan makin kuat intensitasnya, jika dibawa berjalan bertambah kuat, dan mempunyai pengaruh pada pendataran atau pembukaan *serviks* (Dewi Setiawati, 2013: 54).
- 2) *Bloody show* (pengeluaran lendir disertai darah melalui vagina)
Dengan his permulaan, terjadi perubahan pada *serviks* yang menimbulkan pendataran dan pembukaan, lendir yang terdapat di *kanalis servikalis* lepas, kapiler pembuluh darah pecah, yang menjadikan darah sedikit (Ai Nursiah, dkk, 2014: 7).
- 3) Dengan pendataran dan pembukaan
Lendir dari *canalis servikalis* keluar di sertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah *segmen* bawah rahim hingga beberapa *kapiler* terputus (Dewi Setiawati, 2013: 54).
- 4) Pengeluaran cairan
Terjadi akibat pecahnya ketuban atau selaput ketuban robek. Sebagian besar ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap tetapi kadang ketuban pecah pada pembukaan kecil, hal ini di sebut dengan ketuban pecah dini (Dewi Setiawati, 2013: 54).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan

Keberhasilan proses persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ibu (*power, passage, psikologis*), faktor janin, plasenta dan air ketuban (*passenger*), dan faktor penolong persalinan. Hal ini sangat penting, mengingat beberapa kasus kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh tidak terdeteksinya secara dini adanya salah satu dari factor-faktor tersebut.

a. *Power* (Tenaga/Kekuatan)

1) His (Kontraksi Uterus)

Merupakan kekuatan kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Sifat his yang baik adalah kontraksi simetris, *fundus dominial*, terkordinasi dan relaksasi. Kontraksi ini bersifat *involunter* karena berada dibawah saraf *intrinsic*.

2) Tenaga mendedan

Setelah pembukaan lengkap dan ketuban pecah atau dipecahkan, serta sebagian presentasi sudah berada di dasar panggul, sifat kontraksinya berubah, yakni bersifat mendorong keluar dibantu dengan keinginan ibu untuk mendedan atau usaha *volunteer*. Keinginan mendedan ini di sebabkan karena, kontraksi otot-otot dinding perut yang mengakibatkan peninggian tekanan intra *abdominial* dan tekanan ini menekan uterus pada semua sisi dan menambah kekuatan untuk mendorong keluar, tenaga ini serupa dengan tenaga mendedan sewaktu buang air besar (BAB) tapi jauh lebih kuat, saat kepala sampai kedasar panggul timbul *reflex* yang mengakibatkan ibu

menutup *glotisnya*, mengkontraksikan otot-otot perut dan menekan diafragmanya kebawah, tenaga mengejan ini hanya dapat berhasil bila pembukaan sudah lengkap dan paling efektif sewaktu ada his dan tanpa tenaga mendedan bayi tidak akan lahir (Ai Nursiah, dkk, 2014: 31-32).

b. *Passage (Jalan Lahir)*

Merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, *serviks*, dan vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal (Widia, 2015: 16).

c. *Passenger (Janin, Plasenta, dan Air Ketuban)*

1) Janin

Passenger atau janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin (Ai Nursiah, dkk, 2014: 39).

2) Plasenta

Plasenta juga harus melewati jalan lahir maka dia di anggap sebagai bagian dari *passenger* yang menyertai janin. Namun plasenta jarang menghambat proses persalinan normal (Widia, 2015: 29).

3) Air ketuban

Amnion pada kehamilan aterm merupakan suatu membran yang kuat dan ulet tetapi lentur. *Amnion* adalah jaringan yang menentukan hampir semua kekuatan regangan membran janin, dengan demikian pembentukan komponen

amnion yang mencegah *ruptur* atau robekan. Penurunan ini terjadi atas 3 kekuatan yaitu salah satunya adalah tekanan dari cairan *amnion* dan juga saat terjadinya dilatasi *serviks* atau pelebaran muara dan saluran *serviks* yang terjadi di awal persalinan, dapat juga karena tekanan yang ditimbulkan oleh cairan *amnion* selama ketuban masih utuh (Widia, 2015: 29).

d. Factor Psikis (Psikologi)

Perasaan *positif* berupa kelegaan hati, seolah-olah pada saat itulah benar-benar terjadi realitas, “kewanitaan sejati” yaitu munculnya rasa bangga bisa melahirkan atau memproduksi anak.

- 1) *Psikologis* meliputi : Kondisi *psikologis* ibu sendiri, emosi dan persiapan intelektual, pengalaman melahirkan bayi sebelumnya, kebiasaan adat, dan dukungan dari orang terdekat pada kehidupan ibu.
- 2) Sikap *negative* terhadap persalinan di pengaruhi oleh : Persalinan semacam ancaman terhadap keamanan, persalinan semacam ancaman pada *self-image*, medikasi persalinan, dan nyeri persalinan dan kelahiran (Widia, 2015: 29-30).

e. Pysician (Penolong)

Peran dari penolong persalinan dalam hal ini adalah bidan, yang mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin (Widia, 2015: 30). Tidak hanya aspek tindakan yang di berikan, tetapi aspek konseling dan meberikan informasi yang jelas dibutuhkan oleh ibu bersalin utuk mengurangi tingkat kecemasan ibu dan keluarga (Ai Nursiah, dkk 2014: 48).

4. Tahapan Persalinan

a. Kala I (Pembukaan)

1. Pengertian Kala I

Persalinan kala I meliputi fase pembukaan 1-10 cm, yang di tandai dengan penipisan dan pembukaan *serviks*, kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan *serviks* (frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit), cairan lendir bercampur darah (*show*) melalui vagina. Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler serta *kanalis servikalis* karena pergeseran *serviks* mendatar dan terbuka (Ai Nursiah, dkk 2014:66).

Kala I dibagi atas 2 fase yaitu :

- a) Fase laten, dimana pembukaan *serviks* berlangsung lambat, dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap sampai 3 cm, berlangsung dalam 7-8 jam.
- b) Fase aktif (pembukaan *serviks* 4-10 cm), berlangsung selama 6 jam dan dibagi dalam 3 subfase, yaitu :
 - (1) Periode *akselerasi* : berlangsung selama 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.
 - (2) Periode *dilatasi* maksimal : berlangsung selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.
 - (3) Periode *deselerai* : berlangsung lambat, dalam 2 jam pembukaan jadi 10 cm atau lengkap (Nurul, 2017: 5-6).

Pada fase aktif persalinan, frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap (kontraksi dianggap adekuat/memadai jika terjadi 3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit, dan berlangsung selama 40 detik atau lebih) dan terjadi penurunan bagian terbawah janin. Dari pembukaan 4 hingga mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm, akan terjadi dengan kecepatan rata-rata per jam (*primipara*) atau lebih 1 cm hingga 2 cm (*multipara*) (Ai Nursiah, dkk 2014: 66).

2. Perubahan Fisiologi Kala I

Selama rentan waktu dari adanya his sampai pembukaan lengkap 10 cm terjadi beberapa perubahan yang fisiologis. Perubahan fisiologis kala I meliputi :

a) Perubahan pada *serviks*

(1) Pendataran pada *serviks/effacement*

Pendataran pada *serviks* adalah pendekatan dari *kanalis servikalis* yang semula berupa sebuah saluran panjang 1-2 cm, menjadi sebuah lubang saja dengan pinggir yang tipis.

(2) Pembukaan *serviks*

Pembukaan *serviks* disebabkan karena pembesaran *Ostium Uteri Eksternum* (OUE) karena otot yang melingkar di sekitar *ostium* meregang untuk dilewati kepala. Pada pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap, bibir *portio* tidak terba lagi.

b) Perubahan sistem *kardiovaskuler*

(1) Tekanan darah

Tekanan darah meningkat selama kontraksi uterus dengan kenaikan *sistolik* rata-rata 10-20 mmHg dan kenaikan *diastolik* rata-rata 5-10 mmHg. Diantara kontraksi tekanan darah akan turun seperti sebelum masuk persalinan dan akan naik lagi jika terjadi kontraksi. Posisi tidur terlentang selama persalinan akan mengakibatkan adanya penekanan uterus terhadap pembuluh darah besar (*aorta*), yang menyebabkan sirkulasi darah baik ibu maupun janin akan terganggu, ibu biasanya mengalami *hipotensi* dan janin mengalami asfiksia.

(2) Denyut jantung

Denyut jantung meningkat selama kontraksi. Dalam posisi terlentang denyut jantung akan menurun. Denyut jantung antara kontraksi sedikit lebih tinggi dibandingkan selama periode segera sebelum persalinan.

c) Perubahan metabolisme

Selama persalinan baik metabolisme karbohidrat *aerobik* maupun *anaerobik* akan naik secara perlahan, kenaikan ini sebagian besar disebabkan karena kecemasan serta kegiatan otot kerangka tubuh.

d) Perubahan sistem respirasi

Pada respirasi atau pernapasan terjadi kenaikan sedikit dibandingkan sebelum persalinan, hal ini disebabkan adanya rasa nyeri, kekhawatiran serta penggunaan teknik pernapasan yang tidak benar.

e) Kontraksi uterus

Kontraksi uterus terjadi karena adanya rangsangan pada otot polos uterus dan penurunan hormon *progesterone* yang menyebabkan keluarnya hormon oksitosin.

f) Pembentukan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim

Segmen Atas Rahim (SAR) dibentuk oleh *corpus* uteri yang sifatnya aktif yaitu berkontraksi, dan dinding tambah tebal dengan majunya persalinan serta mendorong anak keluar.

g) Perubahan *hematologist*

Haemoglobin akan meningkat 1,2 gram/100 ml selama persalinan dan kembali ke tingkat pra persalinan pada hari pertama setelah persalinan apabila tidak terjadi kehilangan darah selama persalinan. Jumlah sel darah putih meningkat secara *progresif* selama kala I persalinan sebesar 5000 s/d 15000 WBC sampai dengan akhir pembukaan lengkap.

h) Perubahan *renal*

Polyuri sering terjadi selama persalinan, dikarenakan oleh *kardiak out-put* yang meningkat serta disebabkan oleh *glomerulus* serta aliran *plasma* ke *renal*. *Polyuri* tidak begitu kelihatan dalam posisi terlentang yang mengurangi aliran *urine* selama kehamilan.

i) Perubahan *gastrointestinal*

Kemampuan pergerakan gastrik serta penyerapan makanan padat berkurang, menyebabkan pencernaan hampir berhenti disela persalinan dan menyebabkan konstipasi. Makanan yang masuk ke lambung selama fase pendahuluan atau fase

kemungkinan besar akan tetap berada dalam perut selama persalinan. Rasa mual-muntah bukanlah hal yang jarang, hal ini menunjukkan berakhirnya kala I persalinan.

j) Perubahan suhu badan

Suhu badan akan sedikit meningkat selama persalinan, suhu mencapai tingkat tertinggi selama persalinan dan segera setelah kelahiran. Kenaikan ini dianggap normal asal tidak melebihi $0,5 - 1^{\circ} \text{C}$. Suhu badan yang naik sedikit merupakan yang wajar namun jika keadaan ini berlangsung lama, kenaikan suhu mengindikasikan *dehidrasi*.

k) Perubahan pada *vagina* dasar panggul

Pada kala I ketuban ikut meregang, bagian atas vagina yang sejak kehamilan mengalami perubahan sedemikian rupa akan bisa dilalui bayi, setelah ketuban pecah segala perubahan terutama pada dasar panggul ditimbulkan oleh bagian depan anak, bagian depan yang maju tersebut kedasar panggul di regang menjadi saluran dengan dinding yang tipis, waktu kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap kedepan atas dan dari luar peregangan oleh bagian depan tampak pada *perineum* yang menonjol dan menjadi tipis, sedangkan anus semakin terbuka, regangan yang kuat ini dimungkinkan karena bertambahnya pembuluh darah pada bagian vagina dan dasar panggul. Tetapi saat jaringan tersebut robek, akan menimbulkan perdarahan yang banyak (Ai Nursiah, dkk 2014: 67-71).

3. Perubahan *Psikologis* kala I

Perubahan psikologi pada ibu bersalin selama kala I antara lain sebagai berikut :

- a) Memerlihatkan ketakutan atau kecemasan, yang menyebabkan wanita mengartikan ucapan pemberi perawatan atau kejadian persalinan secara *pesimistik* atau *negatif*.
- b) Mengajukan banyak pertanyaan atau sangat waspada terhadap sekelilingnya.
- c) Memerlihatkan tingkah laku saat membutuhkan.
- d) Memerlihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap pemeriksaan.
- e) Menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan pemberi perawatan.
- f) Tampak “lepas kontrol” dalam persalinan (saat nyeri hebat, menggeliat kesakitan, panik, menjerit, tidak merespon saran atau pertanyaan yang membantu).
- g) Respon “melawan atau menghindari”, yang dipicu oleh adanya bahaya fisik, ketakutan, kecemasan dan bentuk stress lainnya (Widia, 2015: 57).

4. Masalah Dan Penyulit Pada Kala I

Indikasi – indikasi untuk melakukan tindakan dan/atau rujukan segera selama kala I persalinan:

- a. Perdarahan pervaginam selain dari lender bercampur darah (“*show*”)

- b. Ketuban pecah bercampur dengan sedikit *mekonium* disertai tanda-tanda gawat janin
- c. Ketuban telah pecah (lebih dari 24 jam) atau ketuban pecah pada kehamilan kurang bulan (usia kehamilan kurang 37 minggu).
- d. Tanda-tanda atau gejala-gejala infeksi : temperature tinggi $>38^{\circ}\text{C}$, menggigil, nyeri *abdomen*, cairan ketuban yang berbau.
- e. Tekanan darah $>160/100$ dan/ atau terdapat protein urin.
- f. DJJ <100 atau >180 x/menit pada dua kali penilaian dengan jarak 5 menit.
- g. *Primipara* dalam persalinan fase aktif dengan palpasi kepala janin masih 5/5.
- h. Presentasi ganda/majemuk (adanya bagian janin, seperti lengan atau tangan, bersamaan dengan presentasi belakang kepala).
- i. Tali pusat menubung (jika tali pusat masih berdenyut)
- j. Tanda dan gejala syok : Nadi cepat, lemah (lebih dari 110 x/menit), tekanan darahnya rendah (sistolik kurang dari 90 mmHg), pucat, berkeringat atau kulit lembab, dingin, napas cepat (lebih dari 30 x/menit), cemas, bingung atau tidak sadar, dan produksi urin sedikit (kurang dari 30 ml/jam)
- k. Tanda dan gejala persalinan dengan fase laten yang memanjang dimana pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam , dan kontraksi teratur (lebih dari 2 dalam 10 menit)
- l. tanda dan gejala belum *inpartu* yaitu, kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit, berlangsung kurang dari 20 detik, tidak ada perubahan *serviks* dalam waktu satu sampai dua jam.

m. Tanda dan gejala partus lama yaitu, pembukaan *serviks* mengarah ke sebelah kanan garis waspada, pembukaan *serviks* kurang 1 cm per jam, dan kurang dari dua kontraksi dalam waktu 10 menit, masing-masing berlangsung kurang 40 detik (Ibnu Pranoto, dkk 2014: 77).

5. Partograf

Partograf adalah alat untuk mencatat informasi berdasarkan observasi, anamnesis, dan pemeriksaan fisik ibu dalam persalinan, dan sangat penting khususnya untuk membuat keputusan klinik selama kala I persalinan.

Tujuan utama penggunaan partograf adalah mengamati dan mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan *serviks* melalui pemeriksaan dalam dan menentukan normal atau tidaknya persalinan serta mendeteksi dini persalinan lama sehingga bidan dapat membuat deteksi mengenai kemungkinan persalinan lama. Partograf dapat digunakan untuk semua ibu selama fase aktif kala I persalinan ; selama persalinan dan kelahiran di semua tempat seperti rumah, puskesmas, klinik bidan swasta, rumah sakit dll.

a. Bagian Partograf

Partograf berisi ruang untuk mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan selama kala I persalinan yang mencakup kemajuan persalinan, keadaan janin, dan keadaan ibu.

1) Kemajuan Persalinan

Kemajuan persalinan yang di catat dalam partograf meliputi pembukaan *serviks*, penurunan kepala janin, dan kontraksi uterus.

2) Pencatatan Selama Fase Laten Dan Fase Aktif Persalinan

a) Pencatatan Selama Fase Laten

Fase laten ditandai dengan pembukaan *serviks* 1-3 cm. Selama fase laten persalinan, semua asuhan, pengamatan dan pemeriksaan harus dicatat terpisah dari partograf, yaitu pada catatan atau Kartu Menuju Sehat (KMS) ibu hamil. Tanggal dan waktu harus dituliskan setiap kali membuat catatan selama fase laten persalinan dan semua asuhan serta intervensi harus dicatat. Waktu penilaian, kondisi ibu, dan kondisi janin pada fase laten meliputi : Denyut jantung janin, frekuensi dan lama kontraksi uterus, nadi setiap 1 jam, pembukaan *serviks*, penurunan kepala, tekanan darah, dan suhu setiap 2 sampai 4 jam dan apabila di temui tanda penyulit, penilaian kondisi ibu dan bayi harus lebih sering dilakukan.

3) Pencatatan Dan Temuan Pada Partograf Selama Fase Aktif

Dilengkapi pada bagian awal (atas) partograf, saat memulai asuhan persalinan.

a) Kesehatan dan Kenyamanan Janin

Menilai dan mencatat setiap 30 menit (lebih sering, jika ada tanda gawat janin). Setiap kotak pada bagian tersebut menunjukkan waktu 30 menit, kisaran normal DJJ terpanjang pada partograf di antara garis tebal angka 180 dan 100. Akan tetapi, penolong harus sudah waspada bila DJJ dibawah 120 atau diatas 160.

b) Warna dan Adanya Ketuban

Warna ketuban dinilai setiap melakukan pemeriksaan dalam, selain warna air ketuban, jika pecah. Catat temuan dalam kontak yang sesuai di bawah lajur DJJ dan gunakan lambang berikut.

U = ketuban utuh (belum pecah)

J = ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih

M = ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur mekonium

D = ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur darah

K = ketuban sudah pecah dan tidak ada air ketuban (kering)

Mekonium dalam air ketuban tidak selalu menunjukkan gawat janin. Apabila terdapat mekonium, pantau DJJ secara seksama untuk mengenali tanda gawat janin (DJJ <100 atau >180 kali per menit) selama proses persalinan.

c) *Molase* (Penyusupan Kepala Janin)

Penyusupan adalah indikator penting tentang seberapa jauh bayi dapat menyesuaikan diri dengan bagian keras panggul ibu. Tulang kepala yang saling menyusup menunjukkan kemungkinan adanya disproporsi tulang panggul (*Cephalopelvic disproportion*) CPD. Setiap kali melakukan pemeriksaan dalam, nilai penyusupan kepala janin dan catat temuan dibawah lajur air ketuban dengan menggunakan lambang berikut ini.

0 = Tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpasi

1 = Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan

2 = Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih, namun masih dapat dipisahkan

3 = Tulang-tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak dapat di pisahkan.

d) Kemajuan Persalinan

Kolom dan lajur pada partograf adalah pencatatan kemajuan persalinan. Angka 0-10 pada tepi kolom paling kiri adalah besarnya dilatasi *serviks*. Skala angka 1-5 juga menunjukkan seberapa jauh penurunan janin. Masing-masing kotak di bagian ini menyatakan waktu 30 menit.

e) Pembukaan *Serviks*

Penilaian dan pencatatan pembukaan *serviks* dilakukan setiap 4 jam (lebih sering, jika terdapat tanda penyulit). Tanda “X” harus ditulis di garis waktu yang sesuai dengan laju besarnya pembukaan *serviks*. Beri tanda untuk temuan pemeriksaan dalam yang dilakukan pertama kali selama fase aktif persalinan di garis waspada. Hubungkan tanda “X” dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh (tidak terputus).

f) Penuruna Bagian Terbawah Atau Presentasi Janin

Setiap melakukan pemeriksaan dalam (4 jam atau lebih), jika terdapat tanda penyulit, catat dan nilai penurunan bagian terbawah atau presentasi janin. Kemajuan pembukaan *serviks* umumnya diikuti dengan penurunan bagian terbawah atau presentasi janin pada persalinan normal. Akan tetapi, penurunan bagian terbawah janin terkadang baru terjadi setelah pembukaan *serviks* 7 cm. Penurunan kepala bayi harus selalu diperiksa dengan memeriksa perut ibu sesaat sebelum pemeriksaan dalam dengan ukuran perlimaan diatas Pintu Atas Panggul (PAP). Beri tanda “o” pada garis waktu yang sesuai dengan garis tidak terputus

0-5 yang tertera di sisi yang samadengan pembukaan *serviks*. Hubungkan tanda “o” dari setiap pemeriksaan dengan garis tidak terputus.

g) Garis Waspada dan Garis Bertindak

Garis waspada dimulai pada pembukaan *serviks* 4 cm dan berakhir pada titik dengan pembukaan lengkap yang diharapkan terjadi jika laju pembukaan 1 cm per jam. Pencatatan selama fase aktif persalinan harus dimulai di garis waspadah. Apabila pembukaan *serviks* mengarah kesebelah kanan garis waspada, penyulit yang ada harus di pertimbngkan (misalnya fase aktif memanjang, macet dll).

h) Jam dan Waktu

Waktu dimulai fase aktif persalinan, Bagian bawah partograf (pembukaan *serviks* dan penurunan kepala janin) tertera kotak-kotak yang diberi angka 1-16. Setiap kontak menanyakan waktu satu jam sejak dimulai fase aktif persalinan. Waktu actual saat pemeriksaan dilakukan. Setiap kotak menyatakan satu jam penuh dan berkaitan dengan dua kotak waktu tiga puluh menit pada lajur kotak di atasnya atau lajur kontraksi dibawahnya. Saat ibu masuk dalam fase aktif persalinan, catatkan pembukaan *serviks* di garis waspada, lalu catatkan waktu actual pemeriksaan tersebut dikotak yang sesuai.

i) Kontraksi Uterus

Terdapat lima lajur dengan tulisan “ kontraksi setiap 10 menit “ di sebelah luar kolom paling kiri dibawah lajur waktu partograf. Setiap kotak menyatakan satu kontraksi. Tiap 30 menit, raba dan catat jumlah kontraksi dalam 10 menit dan lama satuan detik >40 detik.

j) Obat dan Cairan yang Diberikan

(1) Oksitosin

Apabila tetesan (*drips*) oksitosin telah dimulai, dokumentasikan setiap 30 menit jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan *intra vena* dan satuan tetesan per menit.

(2) Obat lain dan cairan *intra vena*

Catat semua pemberian obat tambahan dan atau cairan *intravena* dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya.

4) Kesehatan dan Kenyamanan Ibu

Bagian terakhir pada lembar depan partograf berkaitan dengan kesehatan ibu meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Nadi, tekanan darah, dan *temperature* tubuh. Catat dan nilai nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif persalinan (lebih sering jika dicurigai terdapat penyulit). Beri tanda titik (.) pada kolom pada waktu yang sesuai. Nilai tekanan darah ibu dan catatat setiap 4 jam selama fase aktif persalinan (lebih sering jika dicurigai terdapat penyulit). Beri tanda panah dalam kolom waktu yang sesuai pada partograf. Nilai dan catat juga *temperature* tubuh ibu setiap 2 jam dan catat *temperature* tubuh dalam kotak yang selesai.
- b) Volume *urine*, *protein* dan *aseton*. Ukuran catat jumlah produksi *urine* ibu sedikitnya setiap 2 jam. Apabila memungkinkan, setiap kali ibu berkemih, lakukan pemeriksaan *aseton* atau *protein* dalam *urine*.

5) Asuhan, Pengamatan Dan Keputusan Klinik Lainnya.

Catatan semua asuhan lain, hasil pengamatan, dan keputusan klinik di sisi luar kolom partograf, atau buat catatan terpisah tentang kemajuan persalinan. Cantumkan juga tanggal dan waktu saat membuat catatan persalinan. Asuhan pengamatan, dan/ atau keputusan klinik mencakup jumlah cairan *oral* yang diberikan, seperti keluhan sakit kepala atau penglihatan kabur, konsultasi dengan penolong persalinan lainnya (dokter obgin, bidan, dokter umum), persiapan sebelum melakukan rujukan dan upaya rujukan.

6) Pencatatan Pada Lembar Belakang Partograf

a) Data Dasar

Data dasar terdiri atas tanggal, nama bidan, tempat persalinan, alamat tempat persalinan, catatan alasan merujuk, tempat rujukan, dan pendamping saat merujuk.

(1) Kala I

Data kala I terdiri atas pertanyaan tentang partograf saat melewati garis waspada, masalah yang dihadapi, penatalaksanaan dan hasil penatalaksanaan tersebut.

(2) Kala II

Data kala II terdiri atas *episiotomy*, pendamping persalinan, gawat janin, distosia bahu, masalah penyerta, penatalaksanaan, dan hasilnya. Jawaban di beri tanda “√” pada kotak di samping jawaban yang sesuai.

(3) Kala III

Data kala III terdiri atas lama kala III, pemberian oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, *masase uterus*, *plasenta* lahir lengkap, *plasenta* tidak lahir >30 menit, *laserasi*, *atonia uteri*, jumlah perdarahan, masalah penyerta, penatalaksanaan dan hasilnya.

(4) Kala IV


Data kala IV terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, tinggi *fundus*, kontraksi *uterus*, kandung kemih, dan perdarahan. Pemantauan kala IV sangat penting untuk menilai resiko atau terjadi perdarahan pasca persalinan. Pemantauan kala IV dilakukan setiap 15 menit pada 1 jam pertama setelah melahirkan dan setiap 30 menit pada 1 jam berikutnya.

(5) Bayi Baru Lahir

Data bayi baru lahir tersiri dari berat dan panjang badan, jenis kelamin, penilaian kondisi bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu (ASI), masalah penyerta, penatalaksanaan terpilih, dan hasilnya (Nurul, 2017: 60-74)

PARTOGRAF

No. Register Nama Ibu : _____ Umur : _____ G. _____ P. _____ A. _____
 No. Puskesmas Tanggal : _____ Jam : _____ Alamat : _____
 Ketuban pecah Sejak jam _____ mules sejak jam _____



Gambar 2.1 Partograf (lembar depan).
 (Sumber: Nurul jannah, 2017)

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal :
2. Nama bidan :
3. Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya :
4. Alamat tempat persalinan :
5. Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
6. Alasan merujuk :
7. Tempat rujukan :
8. Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y / T
10. Masalah lain, sebutkan :
11. Penatalaksanaan masalah Tsb :
12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
 Ya, Indikasi
14. Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
 Gawat Janin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
16. Distosia bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
17. Masalah lain, sebutkan :
18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III : menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U im ?
 Ya, waktu : menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan
23. Penegangan tali pusat terkendali ?
 Ya,
 Tidak, alasan

24. Masase fundus uteri ?
 Ya,
 Tidak, alasan
25. Plasenta lahir lengkap (*intact*) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
27. Laserasi :
 Ya, dimana
28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
 Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan
29. Atoni uteri :
 Ya, tindakan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
30. Jumlah perdarahan : ml
31. Masalah lain, sebutkan
32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badan gram
35. Panjang cm
36. Jenis kelamin : L / P
37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
38. Bayi lahir :
 Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang taktil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas/ tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang taktil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan
39. Cacat bawaan, sebutkan :
 Hipotermi, tindakan :
 a.
 b.
 c.
39. Pemberian ASI
 Ya, waktu : jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan
40. Masalah lain,sebutkan :
- Hasilnya :

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1							
2							

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

Gambar 2.2 Partograf (lembar belakang)
 (Sumber: Nurul jannah, 2017)

b. Kala II (kala pengeluaran)

1. Pengertian kala II

Kala II persalinan disebut juga kala pengeluaran yang merupakan peristiwa terpenting dalam proses persalinan karena objek yang dikeluarkan adalah objek utama yaitu bayi (Widia, 2015: 128).

2. Tanda Dan Gejala Kala II

Kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, gejala dan tanda kala II adalah :

- a) Adanya pembukaan lengkap (tidak teraba lagi bibir portio), ini terjadi karena adanya dorongan bagian terbawah janin yang masuk kedalam dasar panggul karena kontraksi uterus yang kuat sehingga portio membuka secara perlahan.
- b) His yang lebih sering dan kuat (\pm 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mencedan, karena biasanya dalam hal ini bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara *reflektoris* menimbulkan rasa mencedan.
- c) Adanya pengeluaran darah bercampur lendir, di sebabkan oleh adanya robekan *serviks* yang meregang.
- d) Pecahnya kantung ketuban, karena kontraksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan yang besar antara tekanan di dalam *uterus* dan diluar *uterus* sehingga kantung ketuban tidak dapat menahan tekanan isi *uterus* akhirnya kantung ketuban pecah.

- e) Anus membuka, karena bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga menekan *rectum* dan rasa buang air besar, hal ini menyebabkan anus membuka.
- f) Vulva terbuka, perineum menonjol, karena bagian terbawah janin yang sudah masuk ke Pintu Bawah Panggul (PBP) dan di tambah pula dengan adanya his serta kekuatan mengedan menyebabkan *vulva* terbuka dan *perineum* menonjol, karena *perineum* bersifat elastis.
- g) Bagian terdepan anak kelihatan pada *vulva*, karena *labia* membuka, *perineum* menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat di *vulva*, karena ada his dan tenaga mengedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Widia, 2015: 129-130).

3. Mekanisme Persalinan Normal

Pada akhir kala 1, *segmen uterus*, *serviks*, dasar panggul, dan pintu keluar *vulva* membentuk satu jalan lahir yang *continue*. Gaya yang diperlukan untuk mengeluarkan janin berasal dari aktifitas otot uterus dan dari otot *abdomen* sekunder dan diafragma, yang memperkuat kontraksi sewaktu kepala janin melewati panggul, kepala bayi akan melakukan gerakan-gerakan utama meliputi :

- a) Turunnya kepala

Turunnya kepala di bagian dalam :

- 1) Masuknya kepala dalam Pintu Atas Panggul (PAP)/*Engagement*

Masuknya kepala kedalam PAP pada *primigravida* terjadi di bulan akhir kehamilan sedangkan pada *multigravida* biasanya terjadi pada awal persalinan. Kepala masuk ke PAP biasanya dengan *sutura sagitalis* melintang dan dengan *flexi*

yang ringan. Masuknya kepala melintasi PAP dalam kuadran *syinclitismus*, yaitu arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang PAP atau *sutura sagitalis* terdapat ditengah-tengah jalan lahir/ tepat diantara *simpisis* dan *promotorium* sehingga, dari parietal depan dan belakang sama tingginya.

Kepala yang masuk dengan keadaan *asyinclitismus* yaitu arah kepala janin miring dengan bidang PAP atau *sutura sagitalis* agak kedepan mendekati *simpisis*/agak kebelakang mendekati *promotorium*. *Asyinclitismus posterior* bila *sutura sagitalis* mendekati *simpisis* dari *parietal* biasa lebih rendah dari *parietal* depan, atau apabila arah sumbu kepala membuat sudut lancip kebelakang dengan PAP. *Asyinclitismus anterior* yaitu bila *sutura sagitalis* mendekati *promontorium* sehingga *parietal* depan lebih rendah dari *parietal* belakang, atau apabila arah sumbu kepala membuat sudut lancip ke depan PAP.


2) Majunya kepala

Pada *primigravida* majunya kepala terjadi setelah kepala masuk kerongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala II. Pada *multipara* majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi secara bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan fleksi, putaran faksi dalam, dan *extensi*. Penyebab majunya kepala : Meningkatnya cairan *intra uterin*, tekanan langsung oleh fundus pada bokong, kekuatan mengedan, melurusnya badan anak oleh pelurusan bentuk rahim.

3) Flexi

Dengan majunya kepala, biasanya flexi juga bertambah hingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Keuntungan dari bertambahnya flexi ialah bahwa ukuran kepala yang lebih kecil melalui jalan lahir : diameter *sub occipito bregmatika* (9,5 cm) menggantikan *sub occipito frontalis* (11 cm).

Penyebab flexi yaitu dikarenakan anak didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir pintu atas panggul, *cerviks*, dinding panggul atau dasar panggul, akibat sumbu kepala janin yang eksentrik atau tidak simetris dengan sumbu mendekati *sub occiput*, tahanan oleh jaringan dibawahnya terhadap kepala anak akan menurun/menurut hukum Koppel.



Gambar 2.3 Gerakan fleksi, dagu dibawah lebih dekat kearah dada janin. (Google Image)

4) Putaran paksi dalam

Yang dimaksud putaran paksi dalam ialah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar kedepan kebawah *symfisis*. Pada presentasi belakang kepala bagian yang terendah ialah daerah ubun-ubun kecil dan bagian inilah yang memutar kedepan kebawah *symfisis*.

Putaran paksi dalam mutlak perlu untuk kelahiran kepala karena putaran paksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dan bentuk jalan lahir

khususnya bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Putaran paksi dalam tidak terjadi tersendiri, tetapi selalu bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai hodge III, kadang-kadang baru setelah kepala sampai didasar panggul.

Penyebab putaran paksi dalam yaitu dikarenakan, pada letak fleksi bagian belakang kepala merupakan bagian terendah dari kepala, bagian terendah dari kepala ini mencari tahanan yang paling sedikit terdapat sebelah depan atas dimana terdapat hiatus genitalis, m. levator ani kiri dan kanandan ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter *anteroposterior*.

5) Ekstensi

Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai didasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah kedepan dan atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya. Pada kepala terjadi dua kekuatan, yang satu mendesaknya kebawah dan satunya disebabkan tahanan dasar panggul yang menolaknya keatas. Resultannya ialah kekuatan kearah depan atas.


Setelah *subociput* tertahan pada pinggir bawah *symfisis* maka yang dapat maju karena kekuatan tersebut diatas bagian yang berhadapan dengan *subociput*, maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas *perineum* ubun-ubn besar, dahi hidung, mulut dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. *Subociput* yang menjadi pusat pemutaran disebut *hypomochilion*.



Gambar 2.4 Gerakan kepala janin pada defleksi
(*Google Image*).

6) Putaran Paksi Luar

Setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Gerakan ini disebut putaran retribusi (putaran balasan). Selanjutnya putaran dilanjutkan hingga belakang kepala berhadapan dengan *tuber ischiadicum* sepihak (disisi kiri). Gerakan yang terakhir ini adalah putaran paksi luar yang sebenarnya dan disebabkan karena ukuran bahu menempatkan diri dalam diameter *anteroposterior* dari pintu bawah panggul.



Gambar 2.5 Gerakan kepala janin melakukan
putaran paksi luar (*Google Image*).

7) Ekspulsi

Setelah putaran paksi luar bahu depan sampai dibawah *symphysis* dan menjadi *hypomochilion* dan kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah dengan paksi jalan lahir (Ai Nurasiah, dkk 2014: 144).

4. Langkah-langkah Pertolongan Persalinan

a. Mengenali Gejala dan Tanda Kala II

- 1) Mendengar dan melihat tanda gejala kala II
 - a) Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran (doran)
 - b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan vagina (teknus)
 - c) *Perineum* tampak menonjol (perjol)
 - d) *Vulva* dan *singter ani* membuka (vulka)

b. Menyiapkan pertolongan persalinan

- 2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolon persalinan dan menatalaksanakan komplikasi ibu dan BBL.
- 3) Pakai celemek palastik
- 4) Mencuci tangan (sekitar 15 detik) dan keringkan dengan *tissue*/handuk.
- 5) Pakai sarung tangan DDT pada tangan yang digunakan untuk PD.
- 6) Masukkan oksitosin kedalam *sputit* (gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT/steril, pastikan tidak terjadi kontaminasi pada *sputit*).

c. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik

- 7) Membersihkan *vulva* dan *perineum*, mengusapnya dengan hati-hati dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas DTT.
- 8) Lakukan pemeriksaan dalam (PD) untuk memastikan pembukaan lengkap (bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, lakukan *amniotomi*).
- 9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
- 10) Periksa DJJ setelah kontraksi/ saat relaksasi *uterus* bahwa DJJ dalam batas normal (120-160x/menit).

d. Menyiapkan Ibu dan Keluarga Untuk Membantu Proses Bimbingan Meneran

- 11) Beritahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya.
- 12) Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran (Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu keposisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman).
- 13) Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran
 - a) Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan aktif.

- b) Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai;
 - c) Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi terlentang dalam waktu yang lama; Anjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi;
 - d) Anjurkan keluarga memberi dukungandan semangat untuk ibu; Berikan asupan peroral yang cukup;
 - e) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai; Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 120 menit meneran (primigravida) atau 60 menit meneran (multigravida).
- 14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.
- e. Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi**
- 15) Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka *vulva* dengan diameter 5-6 cm.
 - 16) Letakkan kain bersih yang di lipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu.
 - 17) Buka tutup *partus set* dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.
 - 18) Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.

f. Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi**Lahirnya Kepala Bayi**

- 19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi *perineum* dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering.
- 20) Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.
- 21) Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Lahirnya Bahu

- 22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara *biparietal*.

Lahirnya Badan dan Tungkai

- 23) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah kearah *perineum* ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas.
- 24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut kepinggung, bokong, tungkai dan kaki serta pegang masing-masing kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya.

g. Penanganan Bayi Baru Lahir

- 25) Lakukan penilaian selintas
 - a) Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan ?
 - b) Apakah bayi bergerak aktif ?

Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas atau mengap-mengap lakukan langkah *resusitasi* (lanjut kelangkah *resusitasi* pada asfiksia BBL).

26) Keringkan tubuh bayi

Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan *vernix caseosa*. Ganti handuk yang basah dengan handuk kering. Biarkan bayi di atas perut ibu.

27) Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus (hamil tunggal)

28) Beritahu ibu bahwa ia akan di suntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha atas bagian *distal lateral* (lakukan aspirasi sebelum menuntikkan oksitosin).

30) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong tali pusat kearah *distal* (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm *distal* dari klem pertama.

31) Pemotongan dan pengikatan tali pusat.

- a) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi) dan lakukan pengguntikan tali pusat diantara 2 klem tersebut.
- b) Ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci dengan sisi lainnya.

- c) Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah di sediakan.
- 32) Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi, letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada/perut ibu. Usahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting *payudara* ibu.
- 33) Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi dikepala bayi.

h. Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala III

- 34) Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari *vulva*.
- 35) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, ditepi atas simpisis, untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat.
- 36) Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang-atas (*dorso cranial*) secara hati-hati (untuk mencegah *inversion uteri*).
- a) Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregang tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur diatas.
- b) Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu.

Mengeluarkan Plasenta

- 37) Lakukan pegangan tali pusat dan dorongan *dorso carnial* hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti proses jalan lahir (tetap melakukan tekanan *dorso cranial*)

- a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari *vulva* dan lahirkan plasenta.
- b) Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat :
- (1) Beri dosis ulang oksitosin 10 unit IM
 - (2) Lakukan kateterisasi (*aseptic*) jika kandung kemih parah.
 - (3) Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan
 - (4) Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya.
 - (5) Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi perdarahan segera lakukan plasenta manual.
- 38) Saat plasenta muncul di *introitus vagina*, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpelin kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah di sediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT/steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal.
- Rangsangan Taktil (*Masase*) Uterus**
- 39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di undus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras).

i. Menilai perdarahan.

- 40) Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik dan tempat khusus.
- 41) Evaluasi kemungkinan *laserasi* pada *vagina* dan *perineum*. Lakukan penjahitan bila *laserasi* menimbulkan perdarahan aktif segera lakukan penjahitan.

j. Melakukan prosedur pasca persalinan.

- 42) Pastikan *uterus* berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan *pervaginam*.
- 43) Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dada ibu paling sedikit 1 jam.
- 44) Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran bayi, beri tetes mata *antibiotic profilaksis* dan vitamin K 1 mg IM di paha kiri *antero lateral*.
- 45) Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan *imunisasi Hepatitis B* dipaha kanan *antero lateral*.

k. Evaluasi

- 46) Lanjutkan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan *pervaginam*
- 47) Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan *masase uterus* dan menilai kontraksi.
- 48) Evaluasi dan estimulasi jumlah kehilangan darah.
- 49) Memeriksa nadi ibu dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

- 50) Periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik (40-60 x/menit) serta suhu tubuh normal ($36,5-37,5^0$ C)

l. Kebersihan dan Keamanan

- 51) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan clorin 0,5 % untuk dekontaminasi.
- 52) Buang bahan – bahan yang terkontaminasi ke tempat yang sesuai.
- 53) Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.
- 54) Pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan.
- 55) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5 %
- 56) Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5 %, balik bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5 % selama 10 menit.
- 57) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.

m. Dokumentasi

- 58) Lengkapi partograf (halaman delapan dan belakang), periksa tanda-tanda vital dan asuhan kala IV (Widia, 2015: 152-161).

5. Komplikasi dan Penyulit Persalinan Kala II

a. Distosia Bahu

Distosia bahu (bahu macet) yaitu kelahiran kepala janin dengan bahu anterior macet di atas simfisis pubis dan tidak dapat masuk melalui pintu bawah pangul, bahu menjadi tidak dapat digerakkan. Bahu *posterior* juga dapat macet di atas

promotorium sacral, walau pun jarang terjadi. Distosia bahu umumnya terjadi pada bayi yang *makrosomia*, yakni suatu keadaan yang di tandai oleh ukuran badan bayi yang relative lebih besar dari ukuran kepala dan bukan semata-mata berat bayi yang >4000 gram.

Penanganan distosia bahu, yaitu dengan melakukan *Manuver McRobert* (posisi lutut-dada) dengan cara ambil posisi jongkok lebar atau posisi *litotomi* berlebihan dengan paha menyentuh dada dan ibu dalam posisi setengah duduk. Posisi ini memungkinkan *Outlet* panggul bertambah lebar. Fleksi yang berlebihan dari kaki akan meluruskan *sacrum* relative terhadap lumbar tulang punggung. Fleksi yang berlebihan dari panggul dan dengkul akan meluruskan dan memungkinkan sudut panggul untuk menampung diameter yang lebih besar dari bahu (Lailiyana, dkk, 2012: 62-63).

c. Kala III (kala uri)

1. Pengertian Kala III

Kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Partus kala III disebut juga kala uri. Kala III merupakan periode waktu dimana penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Oleh karena tempat perlekatan menjadi kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding *uterus* (Ina Kuswanti, dkk 2014: 199).

2. Tanda – Tanda Lepasnya Plasenta

a. Berubahan Bentuk dan Tinggi Fundus

Setelah bayi lahir dan sebelum *miometrium* mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya dibawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong kebawah, uterus berbentuk segi tiga, atau seperti buah pir atau alpukat dan fundus berada diatas pusat (sering kali mengarah ke sisi kanan).

b. Tali pusat memanjang

Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva (tanda *ahfeld*)

c. Semburan darah yang mendadak dan singkat.

Darah yang terkumpul dibelakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah (*retroplacenta pooling*) dalam ruang diantara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungnya, darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang lepas (Ai Nursiah, dkk 2014: 154-155).

3. Metode Pelepasan Plasenta

a. Metode *Scultze*

Metode yang lebih umum terjadi adalah plasenta terlepas dari satu titik dan merosot ke vagina melalui lubang dalam kanton amnion, permukaan fetal plasenta muncul pada vulva dengan selaput ketuban yang mengikuti dibelakang seperti payung terbalik saat terkelupas dari dinding uterus.

b) Metode *Matthews Duncan*

Plasenta turun melalui bagian samping dan masuk ke *vulva* dengan pembatas *lateral* terlebih dahulu seperti kancing yang memasuki lubang baju, sehingga sebagian plasenta tidak berada dalam kantong. Walaupun demikian sebagian selaput ketuban berpotensi tertinggal dengan metode ini karena selaput ketuban tidak terkelupas semua selengkap metode *Schultze*. Metode ini berkaitan dengan plasenta letak rendah didalam uterus. Proses pelepasan berlangsung lebih lam dan darah yang hilang sangat banyak karena hanya sedikit serat oblik dibagian bawah segmen (Nurul Jannah, 2017: 144-145).

4. Pengeluaran Plasenta

Plasenta yang sudah lepas dan menempati segmen bawah rahim, kemudian melalui *serviks*, vagina dan dikeluarkan ke *introitus vagina* (Ina Kuswanti, dkk 2014).

Dari tempat ini plasenta di dorong keluar oleh tenaga mengejan, 20% secara spontan dan selebihnya memerlukan pertolongan. Plasenta dikeluarkan dengan melakukan tindakan manual apabila : Perdarahan lebih dari 400 sampai 500 cc, terjadi restensio plasenta, bersamaan dengan tindakan yang di sertai *narkosa*, dari anamnese terdapat perdarahan *hibitualis*.

Lahirnya plasenta lebih baik dengan bantuan penolong dengan sedikit tekanan pada fundus uteri setelah plasenta lepas. Tetapi pengeluaran plasenta jangan dipaksakan sebelum terjadi pelepasan karena di khawatirkan menyebabkan *inversio uteri*. Traksi pada tali pusat tidak boleh digunakan untuk menarik plasenta keluar dari

uterus. Pada saat *korpus* di tekan, tali pusat tetap di regangkan. *Maneuver* ini diulangi sampai plasenta mencapai *introitus*, setelah *introitus* penekanan dilepaskan.

Tindakan hati-hati diperlukan untuk mencegah membran tidak terputus dan tertinggal jika membrane robek pegang robekan tersebut dengan klem dan tarik perlahan. Periksa plasenta secara hati-hati untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal (Ai Nursiah, 2014: 157-158).

5. Pemeriksaan Plasenta

Pemeriksaan plasenta meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Selaput ketuban utuh atau tidak
- b. Plasenta (ukuran plasenta) yang terdiri atas : Bagian maternal, jumlah *kotiledon*, keutuhan pinggir *kotiledon*, bagian *fetal*, utuh atau tidak.
- c. Tali pusat, meliputi : Jumlah *arteri* dan *vena*, adakah *arteri* atau *vena* yang terputus untuk mendeteksi plasenta *suksenturia*, dan *insersi* tali pusat apakah *sentral*, *marginal*, panjang tali pusat (Nurul Jannah, 2017: 149).

6. Deteksi dan Komplikasi Kala III

- a. Perdarahan kala III

Perdarahan pasca persalinan adalah perdarahan atau hilangnya darah 500 cc atau lebih yang terjadi setelah anak lahir. Perdarahan dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah lahirnya plasenta. Perdarahan menurut waktunya dibagi atas :

- 1) perdarahan post partum primer (*early postpartum hemorrhage*) yang terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir.

- 2) Perdarahan postpartum skunder (*late postpartum hemorrhage*) yang terjadi antara 24 jam dan 6 minggu setelah anak lahir (Widia, 2015: 204-205).
- 3) Penyebab perdarahan kala III yaitu :

a) *Atonia Uteri*

Atonia uteri didefinisikan sebagai suatu kondisi kegagalan berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Pada kondisi tertentu, otot rahim tersebut tidak mampu berkontraksi atau walaupun ada, kontraksi tersebut kurang kuat. Akibatnya perdarahan yang terjadi dari tempat implantasi plasenta tidak akan berhenti sehingga kondisi tersebut sangat membahayakan ibu.

(1) Penyebab *Atonia Uteri*

Penyebab *atonia uteri* belum diketahui secara pasti, akan tetapi terdapat beberapa faktor *predisposisi atonia uteri* yaitu terjadinya distensi rahim yang berlebihan, pemanjangan masa persalinan atau partus lama, *grandemultipara* (paritas 5 atau lebih), kehamilan dengan mioma uteri dan Factor predisposisi lain adalah persalinan buatan (*section caesarea, forsep*, dan *ekstraksi vakum*), persalinan lewat waktu dan *korioamnionitis*.

(2) Tanda dan Gejala

Mengenal tanda dan gejala sangat penting dalam penentuan diagnosis dan penatalaksanaanya. Tanda dan gejala tersebut meliputi perdarahan pervaginam, konsistensi rahim lunak, *fundus uteri* naik dan syok.

b) Laserasi Jalan Lahir atau Robekan *Perineum*

Robekan *perineum* terjadi hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Akan tetapi, hal tersebut dapat di hindari atau dikurangi dengan cara mencegah kepala janin melewati dasar panggul dengan cepat.

c) *Retensio Plasenta*

Retensio plasenta adalah keadaan plasenta yang tertahan atau belum lahir hingga melebihi waktu 30 menit setelah bayi lahir. Plasenta biasanya terlepas dari tempat implantasinya pada keadaan normal 15 menit setelah bayi lahir. Penyebab dari *Retensio Plasenta* yaitu :

- 1) Plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena tubuh terlalu melekat lebih dalam. Berdasarkan tingkat perlekatannya, kondisi plasenta menjadi :
 - (a) *Plasenta adhesif*, yang melekat pada *desidua endometrium* lebih dalam.
 - (b) *Plasenta akreta*, imlantasi jorjot korion memasuki sebagian *miometrium*.
 - (c) *Plasenta inkreta*, implantasi menembus hingga *miometrium*.
 - (d) *Plasenta parkreta*, menembus sampai *serosa* atau *peritoneum* dinding rahim.
- 2) Plasenta telah lepas, tetapi belum keluar karena :
 - (a) *Atonia uteri*, yang dapat menyebabkan perdarahan.
 - (b) Terdapat lingkaran kontraksi pada bagian rahim akibat kesalahan penanganan kala III sehingga menghalangi plasenta untuk keluar (*plasenta inkarserata*).

d) Kelainan Pembekuan Darah

Perdarahan yang telah di jelaskan sebelumnya umumnya terjadi akibat pembekuan darah *intravascular* merata dan kelainan bawaan pada mekanisme pembekuan darah. Penyakit kelainan pembekuan darah seperti amfibrinogenemia atau hipofibrinogenemia sangat membahayakan jiwa ibu, bila tidak cepat di tangulangi(Nurul Jannah, 2017: 151-156).

d. Kala IV (Kala pemantauan)

Kala IV ditetapkan sebagai waktu dua jam setelah plasenta lahir lengkap, hal ini dimaksudkan agar dokter, bidan atau penolong persalinan masih mendampingi anita setelah persalinan selama 2 jam (2 jam *post partum*). Dengan cara ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena perdarahan postpartum dapat dikurangi atau dihindarkan (Dwi Asri,dkk 2012: 95).

Setelah kelahiran plasenta, periksa kelengkapan dari plasenta dan selaput ketuban. Jika masih ada sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dalam uterus akan mengganggu kontraksi uterus sehingga menyebabkan perdarahan. Jika dalam waktu 15 menit uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka akan terjadi atonia uteri. Oleh karena itu, diperlukan tindakan rangsangan taktil (*masase fundus uteri*, dan bila perlu dilakukan *kompresi bimanual* (Widia, 2014: 226).

1. Pemeriksaan *Serviks, Vagina* dan *Perineum*

Untuk mengetahui apakah ada tidaknya robekan jalan lahir, periksa darah *perineum, vagina* dan *vulva*. Setelah bayi lahir, *vagina* akan mengalami peregangan, oleh kemungkinan *edema* dan lecet. *Introitus vagina* juga akan tampak terluka dan

terbuka. Sedangkan vulva bisa berwarna merah, bengkak dan mengalami lecet (Ai Nursiah, dkk 2014: 181).

2. Pemantauan dan Evaluasi Lanjut

Sebagian besar kematian ibu pada periode pasca persalinan terjadi pada 6 jam pertama setelah persalinan. Kematian ini disebabkan oleh infeksi, perdarahan dan eklampsia. Oleh karena itu pemantauan selama dua jam pertama persalinan postpartum sangat penting (Ai Nursiah, dkk 2014: 182)

Pemantauan dan evaluasi lanjut dapat berupa :

a. Tanda Vital

Pemantauan dan evaluasi lanjut tanda vital meliputi usaha untuk memastikan bahwa uterus berkontraksi dengan baik, tidak terjadi perdarahan vagina atau alat genitalia lainnya, plasenta dan selaput ketuban telah lahir lengkap, kandung kemih kosong, luka pada *perineum* terawat baik dan tidak terjadi *hematoma*. Selain itu ibu dan bayi berada dalam keadaan baik.

Tanda syok pada ibu harus diperhatikan seperti nadi cepat dan lemah (110 kali/menit), tekanan darah rendah sistolik kurang dari 90 mmHg, pucat, berkeringat, dingin kulit lembab, napas cepat, kesadaran menurun, dan protein urin sangat sedikit. Perhatikan pula tanda dehidrasi, gejala infeksi, gejala *preeklamsi* hingga *eklamsi* dan pemantauan suhu tubuh untuk mencurigai terjadinya infeksi.

b. Kontraksi Uterus

Kontraksi uterus yang baik pada uterus adalah bahwa uterus teraba keras dan tidak lembek dan tinggi fundus uteri berada 1-2 jari dibawah pusat setelah

melahirkan. Pemeriksaan kontraksi dilakukan 15 menit pada satu jam pertama pascapartum, dan 30 menit satu jam kedua pasca *post partum*.

c. *Lokea*

Selama beberapa hari persalinan, *lokea* tampak merah kerana ditemukan eritrosit atau disebut juga *lokea rubra*. Setelah 3 sampai 4 hari, *lokea* menjadi pucat atau *lokea serosa*, dan hari ke 10, *lokea* tampak putih atau putih kekuning-kuningan atau *lokea alba*. *Lokea* yang berbau busuk menjadi indikasi dugaan *endometrosis*.

d. Kandung Kemih

Kandung kemih harus terus dipertahankan dalam keadaan kosong, kandung kemih yang penuh dapat menghalangi kontraksi maksimal sehingga perdarahan dapat terjadi. Pemantauan kontraksi selama satu jam pertama dilakukan empat kali dalam 15 menit dan pada jam kedua, dua kali dalam 30 detik.

e. *Perineum*

Setelah persalinan, keadaan *perineum* harus juga menjadi perhatian. Apabila terjadi luka jahit, perlu diperhatikan tanda-tanda infeksi, menjaga kebersihan area luka jahitan. Kebersihan luka yang tidak terjaga dapat memicu infeksi (Nurul Janna, 2017: 169-171).

3. Tanda Bahaya Kala IV

Selama kala IV, bidan harus memberitahu ibu dan keluarga tentang tanda bahaya : Demam, perdarahan aktif, pembekuan darah banyak, bau busuk dari vagina, pusing, lemas luar biasa, kesulitan dalam menyusui, nyeri panggul atau *abdomen* yang lebih dari kram uterus biasa (Widia, 2015: 239)

B. Teori Manajemen Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan (*Midwifery Management*) adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi (Mudillah dkk, 2012: 110).

2. Tahapan dalam Manajemen kebidanan

Langkah – langkah asuhan kebidanan menurut varney (1997), yaitu sebagai berikut :

a. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien/orang yang meminta asuhan. Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung, data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang akurat dan ekonomis, yang di sebut sebagai sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data skunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain dan anggota keluarga.

Tekhnik pengumpulan data ada tiga yaitu ; **Observasi**, dimana pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi nafas), penciuman (bau nafas, bau luka), perdaban

(suhu badan, nadi). **Wawancara**, dimana pembicaraan terarah yang umumnya dilakukan pada pertemuan tatap muka. Dalam wawancara yang penting di perhatikan adalah data yang ditanyakan di arahkan data yang relefan, dan **Pemeriksaan**, dimana pengumpulan data yang dilakukan dengan memakai instrument/alat mengukur. Dengan tujuan untuk memastikan batas dimensi angka, irama kuantitas. Misalnya pengukuran tinggi badan dengan meteran, berat badan dengan timbangan, tekanan darah dengan tensimeter.

Data secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subyektif dan data obyektif. Pada waktu mengumpulkan data subyektif harus mengembangkan hubungan antar personal yang efektif dengan pasien/klien/ yang diwawancarai, lebih diperhatikan hal-hal yang menjadi keluhan utama pasien dan mencemaskan, berupa pendapatan data/fakta yang sangat bermakna dalam kaitan dengan masalah pasien (Mufdillah, dkk 2012: 111-113).

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara, anamneses dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh data meliputi : riwayat kesehatan, riwayat reproduksi : riwayat haid, riwayat obstetri, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi. Dan pemeriksaan fisik, yang meliputi keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses

interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

Pada persalinan kala I umumnya klien akan mengeluh tentang keadaannya dimana klien merasakan mules pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, dan klien juga mengatakan bahwa terdapat pengeluaran lender bercampur dengan darah, serta sifat nyeri yang dirasakan semakin lama semakin sering dan bertambah kuat. Pada persalinan kala II umumnya ibu akan merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran, adanya tekanan pada anus dan tampak *perineum* menonjol, *vulva*, dan *spingter ani* membuka.

Pada persalinan kala III akan tampak pengeluaran plasenta dimana tali pusat akan bertambah panjang yang di sertai dengan adanya semburan darah dan terjadi perubahan bentuk dan tinggi *fundus uteri*. Serta pada persalinan kala IV atau kala obserfasi akan di tandai dengan kontraksi uterus yang baik, dan tanda-tanda vital dalam batas normal pada 2 jam *post partum*, dengan pemantauan 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua post partum.

b. Langkah II : Interpretasi Diagnosa atau Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnose atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data - data yang di kumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan di interpretasikan sehingga di temukan masalah atau diagnose yang spesifik. Langkah awal dari perumusan

masalah/diagnose kebidanan adalah pengelolaan/analisa data yang menggabungkan dan menghubungkan satu dengan lainnya sehingga tergambar fakta (Mufdillah, dkk 2012: 113).

Pada kala I persalinan, lama pembukaan yang berlangsung pada primigravida yaitu berlangsung selama 12 jam sedangkan pada multigravida berlangsung selama 8 jam yang dimulai dari pembukaan 0 cm sampai pembukaan 10 cm. Pada fase laten persalinan yang dimulai sejak awal kontraksi menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap yang berlangsung hingga *serviks* membuka kurang dari 4 cm yang umumnya berlangsung selama 8 jam.

Kemudian pada fase aktif persalinan frekuensi dan kontraksi uterus meningkat secara bertahap (kontraksi dianggap adekuat/memadai jika terjadi tiga kali atau lebih dalam 10 menit, dan berlangsung selama 40 detik atau lebih), dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan 10 cm dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam pada multigravida dan primigravida, atau lebih dari 1 sampai 2 cm multigravida. Pada kala I persalinan juga perlu adanya pemeriksaan tanda-tanda vital sekitar 2 atau 3 jam dan memperhatikan agar kandung kemih selalu kosong, serta pemantauan denyut jantung janin $\frac{1}{2}$ jam sampai 1 jam.

Pada kala II persalinan, dimulai dari pembukaan *serviks* sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi, pada kala II his menjadi lebih kuat, lebih sering dan semakin lama. Proses ini berlangsung selama $\pm 1,5$ jam pada primigravida dan $\pm 0,5$ jam pada multigravida. Ibu akan merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran bersama dengan adanya kontraksi, adanya tekanan pada anus dan tampak

perineum menonjol, vulva dan sfingter ani membuka, serta meningkatnya produksi pengeluaran lender bercampur darah. tanda pasti kala II di tentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina.

Pada kala III persalinan, dimulai sejak lahirnya bayi hingga lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit setelah penyuntikan oksitosin. Pada manajemen aktif kala III ini bertujuan untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga mencegah terjadinya perdarahan dan mengurangi kehilangan darah. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu terjadinya perubahan bentuk dan tinggi fundus, tali pusat memanjang, dan terjadinya semburan darah secara mendadak dan singkat.

Pada kala IV persalinan, dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post partum, dimana pemantauan dilakukan dengan mengobservasi tanda-tanda vital pasien, kontraksi uterus, perdarahan dan kandung kemih pada 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua *post partum*.

c. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnose Atau Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnose yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan diharapkan dapat bersiap – siap bila diagnose/masalah potensial ini benar – benar terjadi (Mufdillah, dkk 2012: 117).

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap bila diagnose/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman.

Dalam mengidentifikasi diagnose atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada kala I yaitu terjadinya kala I lama, peningkatan atau penurunan tanda-tanda vital, DJJ kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali/menit, terjadinya perdarahan pervaginam selain dari lender dan darah, ketuban pecah yang bercampur dengan mekonium kental yang di sertai dengan tanda gawat janin, kontraksi uterus kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit dan berlangsung kurang dari 20 detik serta tidak di temukan perubahan serviks dalam 1-2 jam, pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada pada partograf.

Pada kala II persalinan, kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu, terjadinya kala II lama yang di sertai dengan partus macet/kasep, dimana partograf melewati garis waspada, terjadinya distosia bahu, kontraksi tidak teratur dan kurang, tanda-tanda vital meningkat, dan ibu tampak kelelahan. Pada manajemen aktif Kala III persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu diantaranya terjadinya perdarahan pervaginam dikarenakan terjadinya laserasi jalan lahir, atonia uteri karena kontraksi uterus yang tidak baik, dan terjadinya retensio plasenta dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir.

Dan pada Kala IV persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya perdarahan pervaginam dengan pembekuan darah yang banyak, tanda-tanda vital melawati batas normal dimana tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kontraksi uterus yang tidak baik.

d. Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan Kebutuhan Yang Memerlukan Penanganan Segera.

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan (Mufdillah, dkk 2012: 117-178).

Dalam persalinan tindakan yang memerlukan penanganan segera diantaranya: Pada kala I persalinan yaitu terjadinya kala I lama yang mengakibatkan tanda gawat janin, ketuban pecah yang bercampur mekonium kental, dan kontraksi uterus kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit dan berlangsung dari 20 detik serta tidak di temukan perubahan serviks dalam 1-2 jam atau pembukaan *serviks* mengarah ke sebelah kanan garis waspada pada partograf.

Pada kala II persalinan, kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu, terjadinya kala II lama yang di sertai dengan partus macet/kasep, dimana partograf melewati garis waspada, terjadinya distosia bahu, kontraksi tidak teratur dan kurang, tanda-tanda vital meningkat, dan ibu tampak kelelahan. Pada manajemen aktif Kala

III persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu diantaranya terjadinya perdarahan *pervaginam* dikarenakan terjadinya laserasi jalan lahir, *atonia uteri* karena kontraksi *uterus* yang tidak baik, dan terjadinya *retensio* plasenta dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir.

Dan pada Kala IV persalinan masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya perdarahan *pervaginam* dengan pembekuan darah yang banyak, tanda-tanda vital melawati batas normal dimana tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kontraksi uterus yang tidak baik.

e. Langkah V : Merencanakan Asuhan Yang Komprehensif/Menyeluruh

Pada langkah ini di rencanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnose atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap di lengkapi (Mufdillah, dkk 2012).

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Rencana yang dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta *evidence* terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

Adapun penatalaksanaan yang diberikan pada persalinan normal yaitu, memantau perubahan tubuh ibu untuk menentukan apakah persalinan dalam kemajuan yang normal, memeriksa perasaan ibu dan respon fisik terhadap persalinan, membantu ibu memahami apa yang sedang terjadi sehingga ia berperan serta aktif

dalam menentukan asuhan. Membantu keluarga dalam merawat ibu selama persalinan, menolong kelahiran dan memberikan asuhan pasca persalinana dini, dan mengenali masalah secepatnya dan mengambil keputusan yang tepat guna dan tepat waktu (efektif dan efisien).

Perencanaan asuhan tindakan yang perlu dilakukan juga dapat berupa, pemantauan terus menerus kemajuan persalinan menggunakan partograf, pemantauan TTV ibu dan keadaan janin, memenuhi kebutuhan nutrisi dan dehidrasi ibu, menganjurkan ibu perubahan ambulasi dan posisi ibu, menganjurkan tindakan yang memberikan pada rasa nyaman, serta menganjurkan keluarga member dukungan.

f. Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah ke 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar – benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnose. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedangkan sebagian belum efektif (Mufdillah, dkk 2012: 118-119).

3. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif yang meliputi diagnosis, antisipasi diagnosis atau masalah potensial serta konseling untuk tindak lanjut.

a. Data Subjektif

Merupakan data yang berisi informasi dari klien. Informasi tersebut dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa.

b. Data Objektif

Data yang diperoleh dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan pada waktu pemeriksaan laboratorium, USG, dll. Apa yang dapat di observasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnose yang akan di tegakkan.

c. *Assessment*

Merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan.

d. *Planning*/Perencanaan

Merupakan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan kesimpulan yang dibuat (Ai Nursiah, 2014: 234).

C. Al-Quran Tentang Persalinan

1. Al-Quran tentang persalinan

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang persalinan umumnya terkait dengan tanda-tanda adanya Allah, kebesaran dan kekuasaan-Nya. Diantaranya, Al-Qur'an surah Maryam ayat 23 - 26.

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِمْ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي
 مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ دَسِيًّا مَنَسِيًّا ﴾ ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
 ﴾ ﴿ وَهَزِيءَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حَبِيًّا ﴾ ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا
 تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾

Artinya :

“(22) Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh,(23) Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan". (24). Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. (25) Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. (26) Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini “ (Q.S Maryam ayat, 22-26).

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa proses yang terjadi pada saat kelahiran merupakan proses yang memakan waktu lebih lama dari masa mengucapkan kalimat *kun fayakun*. Ayat ini hanya mengisyaratkan bahwa setelah kehamilan itu terdapat tanda-tanda persalinan yang sulit disembunyikan. Desakan

janin untuk keluar mengakibatkan pergerakan anak dalam perut dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit. Dari sini, kata tersebut dapat dipahami dalam arti *sakit yang mendahului kelahiran anak*.

Pada ayat diatas dijelaskan juga bahwa buah kurma merupakan makanan yang sangat baik bagi wanita yang sedang dalam masa nifas/selesai melahirkan karena ia mudah dicerna, lezat, lagi mengandung kalori yang tinggi. Dalam ayat ini terlihat bagaimana Maryam yang dalam keadaan lemah itu masih diperintahkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk menggerakkan pohon guna memperoleh rezeki, walaupun boleh jadi pohon itu tdak dapat bergerak karena lemahnya fisik maryam setelah melahirkandan walaupun suasana ketika itu adalah suasana suprarasional. Ini sebagai isyarat kepada semua pihak untuk tidak berpangku tangan menanti datangnya rezeki, tetapi berusaha dan terus berusaha sepanjang kemampuan yang dimiliki (M. Quraish Shihab, 2002 : 429-433).

2. Keterkaitan Antara Q.S Maryam Ayat 22-26 Dengan Persalinan

Keterkaitan ayat tersebut dengan persalinan normal sangat berkaitan erat dimana dapat dijelaskan bahwa dalam menjalani proses persalinan dibutuhkan tempat yang tenang karena melahirkan merupakan suatu proses yang kompleks, dimana diperlukan kesiapan mental dan semangat yang kuat untuk dapat melahirkan bayi secara alami dan dalam hal ini ibu yang mengalami proses persalinan, harus tenang karena seseorang yang merasa tenang akan menyebabkan lancarnya aliran darah dan menyebabkan tubuh dan fisiknya menjadi kuat.

Rasa nyeri pada persalinan biasanya disebabkan oleh ketakutan dan pemikiran yang bermacam-macam saat persalinan, namun dengan adanya sugesti kalimat-kalimat positif maka rasa nyeri (sakit) tersebut dapat dikurangi. Jika seorang ibu khawatir atau takut selama persalinan, maka tubuh akan di banjiri *adrenalin* (hormon stres). *Adrenalin* mengurangi aliran darah ke rahim dan sistem pencernaan. Sebaliknya, darah mengalir lebih mudah menuju otot-otot besar di tungkai akibatnya, otot-otot rahim bekerja kurang baik karena kekurangan darah dan oksigen. Hal ini dapat membuat proses persalinan menjadi lebih susah dan lebih lama. Pasokan oksigen untuk bayi yang ada di dalam rahim juga bisa berkurang.

Sebagai seorang perempuan yang akan melahirkan anak secara normal, Maryam merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun, di saat mengalami sakit yang memuncak, Allah malah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma untuk mendapatkan kurma matang yang berguna buat kekuatannya. Pohon kurma bukanlah pohon yang kecil ia tinggi dan kokoh dan Maryam, dalam keadaan lemah dan sakit karena ingin melahirkan (bahkan ia berkeinginan untuk mati), disuruh Jibril (atas perintah Allah) untuk menggoyangkan pohon tersebut agar buahnya berguguran.

Tindakan tersebut merupakan bentuk pengalih perhatian agar Maryam tidak fokus pada nyerinya persalinan, melainkan melakukan kegiatan yang membuat pikiran bisa tenang, sehingga secara otomatis tubuh mengeluarkan hormon-hormon yang bermanfaat mengurangi, bahkan menghilangkan rasa sakit. Maryam diperintahkan Allah melalui Jibril menggoyang pohon kurma. Selain merupakan

anjaran untuk berusaha walau di saat rasa sakit dan kesulitan mendera. Perempuan yang akan melahirkan perlu tetap bergerak.

Saat kontraksi belum memuncak, dan menurut medis ibu yang masih memiliki waktu sebelum melahirkan atau ibu yang belum mengalami pembukaan lengkap, dianjurkan untuk memanfaatkan waktu dengan berjalan-jalan kecil (bergerak-gerak kecil). Hal ini dapat membantu ibu mempercepat dan memperlancar proses persalinan, karena dengan aktif bergerak maupun berjalan-jalan akan memicu janin terdorong masuk ke jalan lahir dengan posisi tepat atau *optimal fetal positioning* (OFP).

Posisi yang tepat ini adalah posisi wajah janin menghadap ke arah bokong saat kepalanya sudah berada di jalan lahir dengan kepala janin yang berdiameter rata-rata 9,5 cm masuk ke dalam jalan lahir yang berdiameter sekitar 11,5 cm secara benar, hal inilah yang membuat proses persalinan akan menjadi mudah, lancar, dan cepat. Bahkan, disarankan untuk seminggu atau 2 minggu sebelum hari persalinan yang telah ditentukan, membiasakan melakukan gerakan jongkok berdiri secara teratur setiap hari.

Makan dan minum yang bergizi merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar di dalam mempertahankan kesehatan kita, apalagi buat seorang ibu yang akan melahirkan. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan Maryam yang masih dalam keadaan lemah karena melahirkan untuk segera makan dan minum yang bergizi. Makanan yang sangat bergizi adalah kurma, dan minuman yang sangat bermanfaat adalah air yang bersih dan jernih yang berasal dari sumber air dalam

tanah. Karena buah kurma memiliki sejumlah manfaat baik untuk ibu yang sedang hamil maupun ibu yang sedang menjalani masa menyusui. Kurma mengandung beberapa jenis nutrisi ibu hamil. Manfaat kurma bagi wanita dalam masa hamil, melahirkan dan menyusui adalah sebagai berikut :

Pertama, buah kurma dapat mengecilkan rahim, di dalam buah kurma terdapat zat semacam hormon yang disebut potuchsin yang memiliki khasiat untuk mengecilkan pembuluh-pembuluh darah pada rahim. Zat ini kemudian yang membuat rahim mengecil usai melahirkan. Selain itu, zat ini juga dapat mencegah pendarahan pasca persalinan khususnya persalinan normal. Manfaat yang kedua dari buah kurma adalah dapat memperlancar produksi ASI. Kandungan zat besi dan kalsium pada buah kurma akan sangat berperan besar dalam hal kuantitas dan kualitas ASI.

Adapun manfaat buah kurma lainnya adalah dapat memulihkan tenaga se usai proses persalinan. Satu butir buah kurma diperkirakan mengandung 1,8% hingga 2% protein, 2 sampai 4 % serat, dan 50-57 % zat glukosa. Kandungan beberapa zat ini, menurut penelitian, dapat mengembalikan tenaga yang sempat hilang dan menurun pada saat proses persalinan.

BAB III

STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA NY "F"
GESTASI 38– 40 MINGGU DENGAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 16 S/D 17 MEI 2017**

No. Register : 0517xx
Tanggal Masuk : 16 Mei 2017 Pukul 22.05 Wita
Tanggal Pengkajian : 16 Mei 2017 Pukul 22.15 Wita
Tanggal Partus : 17 Mei 2017 Pukul 02.30 Wita
Nama pengkaji : Sulfiani

KALA I

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny "F" / Tn "S"
Umur : 32 Tahun / 36 Tahun
Nikah/Lamanya : 1 X / 15 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jl. Sultan Abdullah Raya No. 171

2. Data Biologis/Fisiologis

a) Keluhan Utama

Nyeri perut tembus ke belakang yang di sertai pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 16 Mei 2017 pukul 21.00 Wita

b) Riwayat Keluhan Utama

Ibu merasakan nyeri perut tembus ke belakang sejak tanggal 16 Mei 2017 pukul 16.00 Wita, dan terdapat pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 16 Mei 2017 pukul 21.00 Wita. Sifat nyeri yang dirasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan tidak ada pengeluaran air dari jalan lahir. Serta usaha klien untuk mengatasi keluhannya adalah dengan mengelus-ngelus perut dan pinggangnya.

3. Riwayat Menstruasi

Ibu mengatakan pertama kali haid pada usia 13 tahun, dengan siklus haid 28-30 hari, lamanya 5-6 hari, banyaknya 2-3 kali ganti pembalut per hari, sifat darah haidnya encer dan ibu merasakan nyeri haid pada hari pertama.

4. Riwayat Kehamilan Sekarang

Ini merupakan kehamilan ibu yang lima, dan ibu tidak pernah mengalami keguguran, hari pertama haid terakhir tanggal 20 Agustus 2016, ibu mengatakan hari tafsiran persalinan tanggal 27 Mei 2017, ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil, ibu merasakan pergerakan janinnya kuat, di bagian sebelah kiri dan dirasakan sejak usia kehamilan 5 bulan, menurut ibu umur kehamilannya sudah \pm 9 bulan.

Ibu memeriksakan kehamilannya secara teratur, sebanyak 6 kali di BPS yaitu trimester I sebanyak 2x , trimester II sebanyak 2x, trimester III sebanyak 2x dan ibu telah mendapatkan suntikan Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 2 kali di BPS yaitu imunisasi TT I tanggal 17 januari 2017 dan imunisasi TT II tanggal 27 april 2017.

Ibu mengatakan keluhan-keluhan selama hamil yaitu pada trimester I ibu mengalami mual muntah di pagi hari, trimester II tidak ada keluhan dan pada trimester III ibu mengeluhkan sering kencing dan nyeri perut bagian bawah.

5. Riwayat Kehamilan, dan Persalinan yang Lalu

Anak ke	Tahun lahir	Usia kehamilan	Jenis persalinan	Penolong persalinan	Tempat bersalin	BBL	JK	Keadaan anak
I	2003	Aterm	Spontan	Bidan	Pkm jumpandang baru	2.500 gram	♂	Hidup
II	2004	Aterm	Spontan	Bidan	Pkm jumpandang baru	2.800 gram	♂	Hidup
III	2010	Aterm	Spontan	Bidan	Pkm jumpandang baru	2.800 gram	♂	Hidup
IV	2014	Aterm	Spontan	Bidan	Pkm jumpandang baru	3000 gram	♀	Hidup

6. Riwayat Nifas yang Lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertamanya sampai anak keempat secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan keatas.

7. Riwayat yang Sekarang Dan Lalu

Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, asma, diabetes militus, ibu tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti *Tubercuolosis* (TBC), malaria, hepatitis, dan penyakit menular seksual (PMS). Ibu mengatakan tidak ada riwayat alergi terhadap makanan maupun obat-obatan dan ibu tidak mempunyai riwayat operasi, dan sebelumnya ibu juga tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas karena penyakit yang serius.

8. Riwayat Sosial, Ekonomi, Psikososial Dan Spiritual

Ibu mengatakan kebutuhan biaya sehari-hari dalam keluarganya mencukupi, ibu menikah 1 kali dengan suami yang sekarang dan sudah 15 tahun lamanya, ibu dan keluarga bahagia dengan kehamilannya dan ibu akan melahirkan di puskesmas jumpandang baru, pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami serta ibu dan suaminya rajin beribadah.

9. Riwayat KB

Sejak kelahiran anak pertama yaitu pada tahun 2003 ibu mulai menjadi akseptor KB depo progestin/ suntik 3 bulan dan berhenti pada bulan Januari tahun 2016 dengan alasan ingin hamil lagi.

10. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

a) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan:

- 1) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- 2) Frekuensi : 3 kali sehari
- 3) Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu:

- 1) Ibu makan, tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

b) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

- 1) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amoniak.
- 2) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu:

- 1) BAK : Ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok
- 2) BAB : Ibu belum BAB (ibu terakhir BAB jam 6.00 di rumahnya)

c) Personal hygiene

Kebiasaan:

- 1) Mandi, 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- 2) Sikat gigi, 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi
- 3) Keramas, 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo
- 4) Ganti pakaian, 2 kali sehari

Selama inpartu:

- 1) Ibu belum mandi dan sikat gigi
- d) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan

- 1) Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu

- 1) Ibu tidak pernah tidur

11. Pemeriksaan Fisik

- a) Keadaan umum baik
- b) Kesadaran composmentis
- c) Tanda-tanda vital

TD	: 110/70 mmHg	S	: 36.7° C
N	: 80 x/Menit	P	: 20 x/menit

- d) Inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi

- 1) Kepala : rambut hitam, panjang, lurus, keadaan kulit kepala bersih, tidak ada ketombe, benjolan dan nyeri tekan
- 2) Wajah : tidak ada cloasma, tidak ada pembengkakan, oedema dan nyeri tekan.
- 3) Mata : konjungtiva merah muda, sclera putih dan tidak ikhterus.
- 4) Mulut : bibir lembab, keadaan mulut bersih, tidak ada caries pada gigi, dan keadaan gigi lengkap.
- 5) Telinga : tidak ada serumen, pembengkakan dan nyeri tekan.

- 6) Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, dan vena jugularis.
- 7) Payudara : simetris kiri/kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae, tidak ada benjolan, nyeri tekan dan terdapat kolostrum apabila puting susu dipencet.
- 8) Abdomen : tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak linea nigra, dan *stiae albican*, tonus otot perut tampak kendur.

Pemeriksaan Leopold

Leopold I : TFU 3 jrbpx, 39 cm, teraba bokong di fundus

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

LP : 99 cm

TBJ : $TFU \times LP = 39 \times 99 = 3861$ gram

HIS : 3 kali dalam 10 menit, dengan durasi 30 – 35 detik

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 138 x/menit.

- 9) Ekstremitas : keadaan kaki dan tangan lengkap, simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema pada tungkai, tidak ada varises, tidak ada nyeri tekan dan terdapat reflex patella kiri dan kanan.

- 10) Genitalia : keadaan genitalia bersih, tidak ada varises, tidak ada oedema, tidak ada pembesaran kelenjar batholin, dan tampak pengeluaran lendir dan darah.

Pemeriksaan dalam tanggal 16 Mei 2017 pukul 22.15 wita, oleh mahasiswa “S”

- 1) Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
- 2) Portio : Lunak dan Tipis
- 3) Pembukaan : 6 cm
- 4) Ketuban : Utuh
- 5) Presentase : Uzun-uzun kecil kanan lintang
- 6) Penurunan : Hodge II
- 7) Molase : Tidak ada
- 8) Penumbungan : Tidak ada
- 9) Kesan panggul : Normal
- 10) Pelepasan : Lendir dan darah

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH AKTUAL

GVPIVA0, gestasi 38 minggu 3 hari, Pu-ka, Presentase kepala, Situs memanjang, Bergerak Dalam Panggul (BDP), Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu baik, keadaan janin baik, Inpartu Kala 1 fase aktif.

1. GVPIVA0

Data Dasar :

DS : ibu mengatakan ini kehamilannya yang kelima, dan tidak pernah sebelumnya, ibu merasakan adanya pergerakan janin pada usia kehamilan 5 bulan.

DO : tampak pembesaran perut yang sesuai dengan usia kehamilan, tampak linea nigra, striae livide, terdapat denyut jantung janin dan, otot perut telah kendur, dan pada pemeriksaan Leopold di dapatkan hasil :

Leopold I : TFU 3 jrbpx, 39 cm, teraba bokong di fundus

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 138 x/menit

Analisis dan interpretasi data

Pada pemeriksaan kulit perut tampak adanya linea nigra, striae livide yang menandakan kehamilan yang kelima, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat di palpasi hal ini merupakan merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan, serta dan otot perutsudah kendur menandakan perut ibu sudah pernah mengalami peregangan sebelumnya (prawirohardjo, 2014 : 179).

2. Gestasi 38 minggu 3 hari

Data Dasar :

DS : HPHT Tanggal 20 Agustus 2016

DO : pemeriksaan leopold I, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah *processus xiphoideus*, dan hari tafsiran persalinan tanggal 27 Mei 2017 berdasarkan rumus Neagle.

Analisis dan interpretasi data

Dari hasil pemeriksaan dilihat dengan menggunakan rumus negle mulai dari HPHT tanggal 20 Agustus 2016 sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 38 minggu 3 hari (Prawirohardjo, 2014 : 279).

3. Intrauterin

Data Dasar :

DS : ibu merasakan janinnya bergerak dengan kuat dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya.

DO : ibu tidak merasakan nyeri perut ketika dipalpasi, TFU sesuai umur kehamilan, dan pada palpasi leopold teraba bagian-bagian janin yaitu :

Leopold I : TFU 3 jrbpx, 39 cm, teraba bokong di fundus

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

Analisis dan interpretasi data

Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah *kavum uteri* dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan *intrauterin* (Baety, 2012:9).

4. Situs Memanjang

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat pada bagian sebelah kiri perut ibu.

DO : pada palpasi Leopold didapatkan hasil :

Leopold I : TFU 3 jrbpx, 39 cm, teraba bokong di fundus

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 138 x/menit

Analisis dan interpertasi data

Dengan teraba bagian besar janin yaitu bokong di fundus dan kepala pada bagian terendah, DJJ terdengar jelas pada kuadran kanan bawah dan gerakan janin yang dirasakan ibu pada salah satu sisi perut ibu menunjukkan bahwa sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu (Prawirohardjo, 2014 : 205-206).

5. Tunggal

Data Dasar :

DS : ibu merasakan pergerakan janinnya kuat pada satu sisi perut yaitu sisi perut bagian sebelah kiri.

DO : pada palpasi abdomen di dapatkan hasil leopard dimana pada

Leopold I : teraba bokong di fundus yang bulat dan lunak serta tidak melenting,

Leopold II : teraba punggung kanan

Leopold III : teraba bagian bulat dan melenting (kepala)

Pada auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 kali per menit, serta tinggi fundus uteri sesuai dengan umur kehamilan.

Analisis dan interpretasi data

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesara perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11).

6. Hidup

Data Dasar :

DS : ibu merasakan pergerakan janinnya aktif, dan kuat pada usia kehamilan 5 bulan sampai sekarang, dan ibu merasakan pergerakan janinnya 12 kali dalam sehari.

DO : Pada auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan perut ibu, dengan frekuensi 140 x/menit.

Analisis dan interpretasi data

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

7. Keadaan ibu baik

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit

DO : Tanda-tanda vital dalam batas normal, dengan konjungtiva berwarna merah muda, sklera putih dan tidak ikhterus, serta tidak ada oedema pada wajah dan tungkai.

Analisi dan interpretasi data

Pada pemeriksaan fisik di dapat hasil pemeriksaan dimana tidak adanya tanda preklamsi atau eklamsi, anemia, hiperemesis gravidarum, dimana TTV dalam batas normal, konjungtiva merah muda, tidak ada oedema pada wajah dan tungkai menandakan ibu dalam keadaan baik.

8. Keadaan janin baik

Data Dasar :

DS : ibu merasakan pergerakan janin kuat dan biasanya bergerak 12 kali dalam sehari.

DO : Denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 kali per menit.

Analisis dan interpretasi data

Pergerakan janin yang kuat dan sering serta denyut jantung janin (DJJ) yang terdengar jelas, kuat dan teratur dengan frekuensi 138 x/menit, menandakan keadaan janin dalam keadaan baik, dimana di dinilai dari normal DJJ yaitu 120-160 x/menit (Prawirohardjo, 2014 : 222).

9. Inpartu kala I fase aktif

Data Dasar :

DS : Ibu mengatakan nyeri perut tembus ke belakang dirasakan sejak tanggal 16 Mei 2017 pukul 16.00 wita, dan ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dan darah sejak pukul 21.00 wita.

DO : Tampak pengeluaran lender dan darah sejak tanggal 16 Mei 2017 pukul 21.00 Wita, Kontraksi uterus 3 x 10 menit, dengan durasi 30 – 35 detik.

Hasil pemeriksaan dalam tanggal 16 Mei 2017 pukul 22.30 wita, oleh mahasiswa “S”

- 1) Portio : Lunak dan tipis
- 2) Pembukaan : 6 cm
- 3) Presentase : Ubun-ubun kecil kanan lintang
- 4) Penurunan : Hodge II
- 5) Pelepasan : Lendir dan darah

Analisis dan interpretasi data

Nyeri perut yang terjadi karena terbukanya mulut rahim di sertai peregangan otot polos rahim yang menimbulkan nyeri karena adanya penekanan pada ujung syaraf sewaktu uterus berkontraksi. Kontraksi uterus yang terjadi secara teratur dan teraba portio lunak dan tipis serta pembukaan 6 cm merupakan inpartu kala I fase aktif yang dimulai dari pembukaan 4-10 cm (Widia, 2015 : 4).

C. LANGKAH III. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Potensial terjadinya infeksi jalan lahir

DS : Ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dan darah

DO : tampak pelepasan lendir dan darah

Analisa dan interpretasi data

Dengan adanya pelepasan lender dan darah,serta tebukanya jalan lahir memungkinkan masuknya mikroorganisme patologis yang merupakan penyebab infeksi jalan lahir.

D. LANGKAH IV. IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI.

a. Mandiri : Tidak ada

b. Kolaborasi : Tidak ada

c. Merujuk : Tidak ada

E. LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN

Tanggal 16 Mei 2017 pukul 22.40 wita

1. Beritahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu dan janinnya dalam keadaan baik.

Rasional : Agar ibu dan keluarga mengetahui keadaan ibu dan janinnya, ibu dan keluarga merasa tenang dalam menghadapi proses persalinannya dan kecemasan ibu berkurang, serta keluarga dapat memberikan dukungan psikologis yang dapat mengurangi kecemasan ibu dan siap menghadapi persalinan.

2. Observasi tanda-tanda vital, dan VT setiap 2-4 jam (kecuali nadi tiap 30 menit).

Rasional :Observasi tanda-tanda vital dan VT untuk memantau keadaan ibu dan kemajuan persalinan, serta mempermudah dalam melakukan tindakan.

3. Observasi DJJ setiap 30 menit.

Rasional :Saat ada kontraksi, DJJ bisa berubah sesaat, sehingga apabila ada perubahan dapat diketahui dengan cepat dan dapat bertindak secara cepat dan tepat.

4. Observasi His setiap 30 menit.

Rasional : Karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saat sehingga mempengaruhi turunnya kepala dan dilatasi serviks.

5. Ajarkan ibu teknik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat kontraksi, ibu menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi.

Rasional : Teknik relaksasi memberikan rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri dan memberikan suplai oksigen yang cukup kejanin.

6. Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya secara rutin selama persalinan.

Rasional :Kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar, dan menghalangi penurunan kepala bayi serta memberikan perasaan yang tidak nyaman pada ibu.

7. Memberikan intake minuman dan makanan pada ibu

Rasional :Agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran.

8. Persiapan perlengkapan, bahan-bahan dan obat-obatan yang diperlukan untuk menolong persalinan serta tempat penerangan dan lingkungan BBL.

Rasional :Agar penolong lebih mudah dalam mengambil dan menggunakan alat saat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menolong persalinan.

9. Mendokumentasikan hasil pemantauan Kala I dalam partograf

Rasional :Merupakan Standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan klinik.

10. Observasi tanda dan gejala kala II

Rasional :Untuk mengetahui kapan ibu memasuki tahap kala II persalinan.

F. LANGKAH VI. PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 16 Mei 2017 pukul 22.40 wita

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga.
2. Mengobservasi Tanda-tanda vital
3. Mengobservasi DJJ, Nadi dan his setiap 30 menit.

No	Jam (Wita)	DJJ (X/Menit)	Nadi (X/Menit)	His	
				F (X/Menit)	Durasi (Detik)
1	22.15	136 X/Menit	80 X/Menit	3 X 10	30 - 35
2	22.30	136 X/Menit	78 X/Menit	3 X 10	30 - 35
3	23.15	140 X/Menit	80 X/Menit	3 X 10	30 - 35
4	23.30	140 X/Menit	80 X/Menit	4 X 10	35 - 40
5	00.15	142 X/Menit	78 X/Menit	4 X 10	35 - 40
6	00.30	142 X/Menit	80 X/Menit	4 X 10	35 - 40
7	01.15	146 X/Menit	82 X/Menit	5 X 10	40 - 45
8	01.30	146 X/Menit	82 X/Menit	5 X 10	40 - 45
9	02.15	150 X/Menit	80 X/Menit	5 X 10	40 - 45

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 17 Mei 2017 pukul 02.15 wita oleh mahasiswa "S"

- a) Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
- b) Portio : Tipis
- c) Pembukaan : 10 cm
- d) Ketuban : Pecah
- e) Presentase : Ubun-ubun kecil dibawah simpisis
- f) Penurunan : Hodge IV
- g) Molase : Tidak ada
- h) Penumbungan : Tidak ada
- i) Kesan panggul : Normal
- j) Pelepasan : Lendir, darah bercampur dengan ketuban

4. Mengajarkan ibu teknik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat kontraksi, ibu menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi.
5. Mengajarkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya secara rutin selama persalinan.
6. Memberikan intake minuman dan makanan pada ibu
7. Persiapan perlengkapan, bahan-bahan dan obat-obatan yang diperlukan untuk menolong persalinan serta tempat penerangan dan lingkungan BBL, meliputi :
 - a) Alat Perlindungan Diri (APD) : Penutup kepala, masker, kaca mata, celemek, sepatu tertutup (sepatu *boot*)
 - b) Partus Set : *Handscoon* steril, 2 buah klem kocher, $\frac{1}{2}$ kocher, 1 buah gunting episiotomy, 1 buah gunting tali pusat, 1 buah kateter nelaton, Kassa steril, pengisap lender, penjepit tali pusat.
 - c) On steril : 2 buah handuk kering dan bersih, pakaian bersih ibu dan bayi meliputi baju, pembalut, sarung, celana dalam, pakaian bayi, popok, topi/tutup kepala, sarung tangan/kaki, kain selimut untuk membedong.
 - d) Heacting set : 1 buah pinset sirurgik, 1 buah pinset antomi, nal pudar, 2 buah jarum (1 jarum circle dan 1 jarum V1 circle), gunting benang, benang cromatic, 1 pasang sarung tangan steril
 - e) Obat-obatan esensial : Lidocain 1 ampul, oksytosin 10 IU 1 ampul, cairan RL, Infus set 5.1, spoit 3 cc dan spoit 1 cc, meteregin 1 ampul

- f) Peralatan lain : Larutan Clorin 0,5 %, air DTT, kantong plastic, tempat sampah kering dan basah, safety box, bengkok, was lap, dan tempat plasenta.

Menyiapkan tempat, penerangan dan lingkungan untuk kelahiran bayi, dengan memastikan ruangan sesuai kebutuhan bayi baru lahir , meliputi ruangan bersih, hangat, pencahayaan cukup dan bebas dari tiupan angin.

8. Mendokumentasikan hasil pemantauan Kala I dalam partograf

9. Mengobservasi tanda dan gejala kala II

- a) Ibu merasakan dorongan untuk meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi.
- b) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rectum dan atau vaginanya.
- c) Perineum menonjol.
- d) Vulva vagina dan *sfincter ani* membuka.
- e) Meningkatnya pengeluaran lender bercampur dengan darah.
- f) Tampak rambut bayi pada vulva

G. LANGKAH VII. EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 17 Mei 2017 pukul 02.19 wita

1. Ibu mengerti bahwa keadaannya dan janinnya saat ini dalam keadaan baik, sehingga ibu lebih tenang dan kecemasan ibu berkurang.
2. keadaan ibu dan janin baik yang ditandai dengan :
 - a) Tanda – tanda vital dalam batas normal :

TD	: 110/70 mmHg	S	: 36.7° C
N	: 82 x/menit	P	: 20 x/menit
 - b) DJJ 150 x/menit, yang terdengar jelas kuat dan teratur

- c) Ibu sudah makan, jenis roti 1 potong dan minum air putih dan air teh 1 gelas.
 - d) Ibu mengerti dan sudah mampu melakukan tehnik relaksasi.
 - e) Ibu tidak ingin berkemih dan kandung kemih ibu kosong.
3. Peralatan, bahan – bahan, obat-obatan sudah disiapkan dan tempat serta penerangan untuk bayi telah disiapkan.
 4. Kala I fase aktif berlangsung ditandai dengan :
 - a) His yang adekuat 5 x 10 dalam 10 menit dengan durasi 40 – 45 detik
 - b) Adanya tekanan pada anus, rectum, dan vagina, perineum menonjol, sfingter ani membuka, dan terdapat pengeluaran air ketuban.
 - c) Dinding vagina licin, portio tidak teraba, pembukaan lengkap 10 cm ± 1 jam setelah VT pertama, dan penurunan kepala Hodge IV UUK searah jam 12, air ketuban jernih, dan tidak ada molase.
 5. Tidak ada tanda-tanda infeksi.
 6. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan di partograf.

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA NY "F"
 GESTASI 38– 40 MINGGU DENGAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL
 DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR
 TANGGAL 16 S/D 17 MEI 2017

No. Register : 0517xx
 Tanggal Masuk : 16 Mei 2017 Pukul 22.05 Wita
 Tanggal Pengkajian : 16 Mei 2017 Pukul 22.15 Wita
 Tanggal Partus : 17 Mei 2017 Pukul 02.30 Wita
 Nama pengkaji : Sulfiani

KALA I

Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny "F" / Tn "S"
 Umur : 32 Tahun / 36 Tahun
 Nikah/Lamanya : 1 X / 15 Tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SD / SMP
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
 Alamat : Jl. Sultan Abdullah Raya No. 171

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ini kehamilan yang kelima dan tidak pernah keguguran sebelumnya.
2. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 20 Agustus 2016

3. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil
4. Ibu mengatakan telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali di BPS, 2x pada trimester I, 2x pada trimester II, dan 2x pada trimester III
5. Ibu mengatakan umur kehamilannya \pm 9 bulan
6. Ibu mengatakan selama hamil ibu mengkonsumsi tablet Fe
7. Ibu mengatakan nafsu makan baik dan tidak ada pantangan
8. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit serius
9. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, asma, diabetes militus, dan penyakit menular lainnya seperti *Tubercuolosis* (TBC), malaria, hepatitis, dan penyakit menular seksual (PMS)
10. Ibu mengatakan tidak pernah di rawat di puskesmas dan di rumah sakit karena penyakit yang serius.
11. Ibu mengatakan sakit perut tembus kebelakang sejak tanggal 16 mei 2017 pukul 16.00 wita
12. Ibu mengatakan sakit yang di rasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering.
13. Ibu menatakan adanya pelepasan lender dan darah sejak tanggal 16 mei 2017 pukul 21.00 wita
14. Ibu mengatakan tidak ada pengeluaran air dari jalan lahir.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran *composmentis*
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal

TD = 100/70 mmHg S = 36.7°C

N = 80 x/menit P = 20 x/menit

4. Pemeriksaan fisik

- a. Kepala : rambut hitam, panjang, luruskeadaan kulit kepala bersih, tidak ada ketombe, benjolan dan nyeri tekan.
- b. Wajah : tidak ada cloasma, tidak ada pembengkakan, edema dan nyeri tekan.
- c. Mata : konjungtiva merah muda, sclera putih dan tidak ikhterus.
- d. Mulut : bibir lembab, keadaan mulut bersih, tidak ada caries pada gigi, dan keadaan gigi lengkap.
- e. Telinga : tidak ada serumen, pembengkakan dan nyeri tekan.
- f. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, dan vena jugularis.
- g. Payudara : simetris kiri / kanan, puting susu menonjol, tampak *hiperpigmentasi* pada *areola mammae*, tidak ada benjolan, nyeri tekan dan terdapat kolostrum apabila puting susu dipencet.
- h. Abdomen : tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak *linea nigra*, dan *stiae albican*, tonus otot perut kendur.

Pemeriksaan Leopold

Leopold I : TFU 3 jrbpx, 39 cm, teraba bokong di fundus

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

LP : 99 cm

TBJ : $TFU \times LP = 39 \times 99 = 3861$ gram

HIS : 3 kali dalam 10 menit, dengan durasi 30 – 35 detik

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 138 x/menit.

- i. Ekstremitas : keadaan kaki dan tangan lengkap, simetris kiri dan kanan, tidak ada *oedema* pada tungkai, tidak ada varises, tidak ada nyeri tekan dan terdapat *reflex patella* kiri dan kanan.
- j. Genitalia : keadaan genitalia bersih, tidak ada varises, tidak ada *oedema*, tidak ada pembesaran kelenjar batholin, dan tampak pengeluaran lendir dan darah.

Pemeriksaan dalam tanggal 16 Mei 2017 pukul 22.15 wita, oleh mahasiswa “S”

- (1) Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
- (2) Portio : Tipis dan Lunak
- (3) Pembukaan : 6 cm
- (4) Ketuban : Utuh
- (5) Presentase : Ubun-ubun kecil kanan lintang
- (6) Penurunan : Hodge II
- (7) Molase : Tidak ada
- (8) Penumbungan : Tidak ada
- (9) Kesan panggul : Normal
- (10) Pelepasan : Lendir dan darah

Assesment (A)

Diagnosa : G1P0A0, gestasi 38 minggu 3 hari, Pu-ka, Presentase kepala, situs memanjang Bergerak Dalam Panggul (BDP), Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu dan janin baik, Inpartu Kala 1 fase aktif.

Masalah potensial : antisipasi terjadinya infeksi jalan lahir

Planning (P)

1. Menjelaskan pada ibu penyebab nyeri yang dirasakan yaitu adanya penekanan pada ujung-ujung syaraf dan ketegangan uterus saat berkontraksi.

Hasil : telah di jelaskan dan ibu mengerti

2. Mengajarkan ibu teknik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat kontraksi dengan cara ibu menarik nafas panjang melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk miring ke kiri agar suplai oksigen ke janin menjadi lancar.

Hasil : ibu bersedia melakukannya yaitu dengan mengambil posisi miring ke kiri.

4. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum di sela-sela kontraksi agar ibu memiliki tenaga untuk mengedan.

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang di berikan dan ibu makan dan minum di sela-sela kontraksi.

5. Mengobservasi His, Nadi, DJJ setiap 30 menit, dan mengobservasi VT setiap 2-4 jam atau jika ada indikasi.

Hasil :

No	Jam (Wita)	DJJ (X/Menit)	Nadi (X/Menit)	His	
				F (X/Menit)	Durasi (Detik)
1	22.15	136 X/Menit	80 X/Menit	3 X 10	30 - 35
2	22.30	136 X/Menit	78 X/Menit	3 X 10	30 - 35
3	23.15	140 X/Menit	80 X/Menit	3 X 10	30 - 35
4	23.30	140 X/Menit	80 X/Menit	4 X 10	35 - 40
5	00.15	142 X/Menit	78 X/Menit	4 X 10	35 - 40
6	00.30	142 X/Menit	80 X/Menit	4 X 10	35 - 40
7	01.15	146 X/Menit	82 X/Menit	5 X 10	40 - 45
8	01.30	146 X/Menit	82 X/Menit	5 X 10	40 - 45
9	02.15	150 X/Menit	80 X/Menit	5 X 10	40 - 45

Melakukan pemeriksaan dalam tangga 17 Mei 2017 pukul 02.15 wita oleh mahasiswa "S"

- 1) Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
- 2) Portio : Melesap dan tidak teraba
- 3) Pembukaan : 10 cm
- 4) Ketuban : Pecah
- 5) Presentase : Uzun-uzun kecil dibawah simpisis
- 6) Penurunan : Hodge IV
- 7) Molase : Tidak ada
- 8) Penumbungan : Tidak ada
- 9) Kesan panggul : Normal
- 10) Pelepasan : Lendir, darah bercampur dengan ketuban

6. Menyiapkan alat dan bahan penolong persalinan

- a. Alat Perlindungan Diri (APD) : Penutup kepala, masker, kaca mata, celemek, sepatu tertutup (sepatu *boot*)
- b. Partus Set : *Handscoon* steril, 2 buah klem kocher, ½ kocher, 1 buah gunting episiotomy, 1 buah gunting tali pusat, 1 buah kateter nelaton, Kassa steril, pengisap lender, penjepit tali pusat.
- c. On steril : 2 buah handuk kering dan bersih, pakaian bersih ibu dan bayi meliputi baju, pembalut, sarung, celana dalam, pakaian bayi, popok, topi/tutup kepala, sarung tangan/kaki, kain selimut untuk membedong.
- d. Heacting set : 1 buah pinset sirurgik, 1 buah pinset antomi, nal puder, 2 buah jarum (1 jarum circle dan 1 jarum V1 circle), gunting benang, benang cromatic, 1 pasang sarung tangan steril.
- e. Obat-obatan esensial : Lidocain 1 ampul, oksytosin 10 IU 1 ampul, cairan RL, Infus set 5.1, spoit 3 cc dan spoit 1 cc, meteregin 1 ampul
- f. Peralatan lain : Larutan Clorin 0,5 %, air DTT, kantong plastic, tempat sampah kering dan basah, safety box, bengkok, was lap, dan tempat plasenta.

Menyiapkan tempat, penerangan dan lingkungan untuk kelahiran bayi, dengan memastikan ruangan sesuai kebutuhan bayi baru lahir, meliputi ruangan bersih, hangat, pencahayaan cukup dan bebas dari tiupan angin.

Hasil : alat dan bahan penolong persalinan telah di siapkan

7. Mendokumentasikan hasil di partograf

Hasil : telah di dokumentasikan di partograf

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA NY "F"
GESTASI 38– 40 MINGGU DENGAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 16 S/D 17 MEI 2017

No. Register : 0517xx

Tanggal Masuk : 16 Mei 2017 Pukul 22.05 Wita

Tanggal Pengkajian : 16 Mei 2017 Pukul 22.15 Wita

Tanggal Partus : 17 Mei 2017 Pukul 02.30 Wita

Nama pengkaji : Sulfiani

KALA II

Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny "F" / Tn "S"

Umur : 32 Tahun / 36 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 X / 15 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Sultan Abdullah Raya No. 171

KALA II

Data Subyektif (S)

1. Ibu mengatakan sakit yang dirasakan semakin kuat
2. Ibu mengatakan ingin BAB dan ibu merasakan adanya tekanan pada anus

3. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk meneran
4. Ibu mengatakan sakitnya bertambah kuat dan tembus kebelakang

Data Obyektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Kontraksi uterus 5 x 10 menit, dengan durasi 40-45 detik.
4. Frekuensi DJJ 150 x/menit.

5. Tanda-tanda vital

TD : 110/70 mmHg S : 36.7° C

N : 82 x/menit P : 20 x/menit

6. Tampak tanda dan gejala kala II dimana tampak :
 - a. Tampak Perineum menonjol.
 - b. Vulva vagina dan sfingter ani membuka.
 - c. Meningkatnya pengeluaran lender bercampur dengan darah.
 - d. Tampak rambut bayi pada vulva

Assessment (A)

Diagnosa actual : perlangsungan kala II

Diagnosa potensial : antisipasi terjadinya kala II lama dan distosia bahu

Planning (P)

Tanggal 17 Mei 2017 pukul 02.20 wita

1. Melihat tanda dan gejala kala II

Hasil : tampak tanda dan gejala kala II

- Adanya dorongan kuat untuk meneran
 - Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan vagina
 - Perineum menonjol
 - Vulva, vagina dan spingter ani membuka
2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partus set.
- Hasil : alat dan bahan telah siap
3. Memakai celemek plastic
- Hasil : celemek telah di pakai
4. Melepas semua perhiasan yang dipakai di tangan, lalu mencuci tangan di bawah air mengalir dengan tehnik 7 langkah
- Hasil : tangan telah di cuci
5. Menggunakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.
- Hasil : sarung tangan telah dipakai
6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.
- Hasil : spoit telah di isi dengan oksitosin dan telah di letakkan kembali di wadah partus set
7. Membersihkan vulva dan perineum, mengusapnya dengan hati-hati dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas DTT.

Hasil : vulva dan perineum telah dibersihkan

8. Lakukan pemeriksaan dalam (PD) untuk memastikan pembukaan lengkap (bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi).

Hasil : pemeriksaan dalam tanggal 17 Mei 2017 pukul 02.20 wita oleh mahasiswa "S"

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Pecah

Presentase : Ubun-ubun kecil dibawah simpisis

Penurunan : Hodge IV

Pelepasan : Lendir, darah bercampur dengan air ketuban

9. Mendekontaminasi sarung tangan kotor kedalam larutan clorin 0,5 % dan membukanya secara terbalik, lalu rendam selama 10 menit

Hasil : sarung tangan telah dibuka secara terbalik dan didekontaminasi di larutan clorin 0,5 % selama 10 menit.

10. Memeriksa DJJ setelah kontraksi, untuk memastikan DJJ dalam batas normal yaitu 120-160 x/menit

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 150 x/menit.

11. Beritahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin serta ibudalam keadaan baik.

Hasil : ibu dan keluarga telah di beritahu

12. Minta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran (Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu keposisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman).

Hasil : keluarga bersedia membantu

13. Lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran, diantaranya : bimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran, berikan dukungan dan semangat atas usaha ibu untuk meneran, anjurkan ibu beristirahat diantara kontraksi dan anjurkan ibu untuk minum di sela-sela kontaksi.

Hasil : telah dilakukan pimpinan meneran, ibu beristirahat dan minum diantara kontraski, serta ibu telah diberi semangat.

14. Jika ibu tidak memiliki keinginan untuk meneran, anjurkan ibu untuk berjalan, jongko, atau mengambil posisi yang dianggap nyaman.

Hasil : ibu telah memilih posisi yang nyaman yaitu dengan posisi miring kiri

15. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih diatas perut ibu.

Hasil : handuk bersih telah di letakkan diatas perut ibu

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu

Hasil : telah dilakukan

17. Membuka partus set untuk memastikan kelengkapan alat dan bahan.

Hasil : alat dan bahan telah lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan

Hasil : sarung tangan steril telah dipakai

19. Setelah kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lakukan penyokongan dengan melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, kemudian letakkan tangan yang lain pada kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut untuk mencegah terjadinya gerakan difleksi maksimal.

Hasil : telah dilakukan penyokongan dan kepala bayi telah lahir.

20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.

Hasil : tidak terjadi lilitan tali pusat

21. Tunggu kepala sampai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Hasil : kepala telah melakukan putaran paksi luar secara spontan

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar secara spontan, lakukan pegangan secara biparietal, dengan menempatkan kedua tangan pada sisi muka bayi. Anjurkan ibu menerang pada kontraksi berikutnya, dengan lembut tarik bayi kebawah untuk mengeluarkan bahu depan, kemudian tarik keatas untuk mengeluarkan bahu belakang.

Hasil : pegangan biparietal telah dilakukan, dan kedua bahu telah lahir.

23. Setelah kedua bahu bayi lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah, Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas.

Hasil : telah dilakukan bahu dan lengan bayi telah lahir.

24. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki serta pegang masing-masing kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya.

Hasil : telah dilakukan, dan bayi lahir spontan tanggal 17 Mei 2017 pukul 02.30 wita dengan jenis kelamin perempuan.

25. Lakukan penilaian sepintas, dengan menilai apakah bayi menangis kuat, bernafas tanpa kesulitan, bayi bergerak aktif dan bagaimana warna kulitnya.

Hasil : bayi lahir segera menangis, bernafas tanpa kesulitan, bergerak aktif dan kulit tubuh kemerahan.

26. Bersihkan dan keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks caseosa. Ganti handuk yang basah dengan handuk kering dan biarkan bayi di atas perut ibu.

Hasil : bayi telah dibersihkan dan di keringkan

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA NY “F”
GESTASI 38– 40 MINGGU DENGAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 16 S/D 17 MEI 2017

No. Register : 0517xx

Tanggal Masuk : 16 Mei 2017 Pukul 22.05 Wita

Tanggal Pengkajian : 16 Mei 2017 Pukul 22.15 Wita

Tanggal Partus : 17 Mei 2017 Pukul 02.30 Wita

Nama pengkaji : Sulfiani

KALA III

Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny “F” / Tn “S”

Umur : 32 Tahun / 36 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 X / 15 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Sultan Abdullah Raya No. 171

Data Subyektif (S)

1. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah
2. Ibu tampak senang dengan kelahiran bayinya.
3. Ibu mengatakan plasenta atau ari-arinya belum lahir.

Data Obyektif (O)

1. Bayi lahir spontan segera menangis, tanggal 17 Mei 2017 pukul 02.30 wita, dengan jenis kelamin perempuan, BBL = 3350 gram, PBL = 49 cm, A/S = 8/10
2. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.
4. Plasenta belum lahir
5. Kandung kemih ibu kosong

Assesmen (A)

Diagnosa : perlangsunan kala III

Masalah potensial :antisipasi terjadinya retensio plasenta

Planning (P)

1. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Hasil : ibu hamil tunggal

2. Memberitahu ibu bahwa ia akan oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Hasil : ibu telah di beritahu dan ibu bersedia di suntik

3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menuntikkan oksitosin).

Hasil : oksitosin telah disuntikkan

4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dengan mendorong tali pusat kearah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Hasil : tali pusat telah diklem

5. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Hasil : tali pusat telah digunting

6. Lakukan pengikatan tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Atau dilakukan penjepitan tali pusat dengan penjepit tali pusat.

Hasil : tali pusat telah di ikat dengan benang steril.

7. Letakkan bayi secara tengkurap di dada ibu agar ada kontak kulit ibu dan bayi, Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada/perut ibu. Usahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu.

Hasil : telah dilakukan

8. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan bersih lalu pasangh topi dikepala bayi.

Hasil : bayi dan ibu telah di selimuti dengan kain hangat dan bayi telah di pasangkan topi

9. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.

Hasil : klem telah di pindahkan

10. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : telah dilakukan

11. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus kearah belakang-atas (dorso cranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversion uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Hasil :telah dilakukan dorongan dorso cranial

12. Melakukan peregang dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorsokranial).

Hasil : telah dilakukan

13. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Hasil : palsenta telah lahir 5 menit setelah bayi lahir pada tanggal 17 mei 2017

pukul 02.35 wita

14. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras).

Hasil : telah dilakukan masase uterus

15. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Hasil : plasenta lahir lengkap kotiledon dan selaput ketubannya.

16. Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Hasil : telah dilakukan, dan tidak terjadi laserasi pada perineum.

17. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Hasil : telah dilakukan, dan uterus berkontraksi dengan baik teraba bundar dan keras.

18. Biarkan bayi melakukan kontak kulit dengan ibu paling sedikit 1 jam

Hasil : telah dilakukan, dengan membiarkan bayi melakukan kontak kulit selam 1 jam.

19. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral.

Hasil : bayi telah di beri tetes mata/salep mata antibiotic profilaksis, dan telah di suntikkan vitamin K secara intramuskuler di paha kiri anterolateral.

- Hasil penimbangan/pengukuran

BBL= 3350 gram

PBL = 49 cm

LK = 33 cm

LD = 33 cm

LP = 31 cm

20. Setelah satu jam pemberian suntikkan vitamin K, lakukan penyuntikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan antero lateral secara intramuscular.

Hasil : telah dilakukan penyuntikkan hepatitis B di paha kanan antero lateral secara *intramuscular*.

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA NY "F"
 GESTASI 38– 40 MINGGU DENGAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL
 DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR
 TANGGAL 16 S/D 17 MEI 2017

No. Register : xx0517

Tanggal Masuk : 16 Mei 2017 Pukul 22.05 Wita

Tanggal Pengkajian : 16 Mei 2017 Pukul 22.15 Wita

Tanggal Partus : 17 Mei 2017 Pukul 02.30 Wita

Nama pengkaji : Sulfiani

KALA IV

Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny "F" / Tn "S"

Umur : 32 Tahun / 36 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 X / 15 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Sultan Abdullah Raya No. 171

Data Subyektif (S)

1. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah, setelah melahirkan.
2. Ibu mengatakan nyeri pada luka jahitan
3. Ibu mengatakan belum BAB setelah melahirkan dan sudah BAK

Data Obyektif (O)

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal

TD	= 100/80 mmHg	S	= 36.6° C
----	---------------	---	-----------

N	= 80 x/menit	P	= 20 x/menit
---	--------------	---	--------------

4. Plasenta dan selaput ketuban telah lahir lengkap
5. Ibu tampak kelelahan setelah proses persalinan
6. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
7. Tidak terdapat robekan jalan lahir dan jumlah perdarahan \pm 250 cc

Assesment (A)

Diagnosa : Perlangsunan kala IV

Masalah potensial : ibu merasa kelelahan

Planning (P)

1. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan pervaginam, 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, dan 30 menit pada jam kedua pasca persalinan

Hasil : telah dilakukan pemantauan dan tidak terjadi perdarahan pervaginam, serta kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras.

2. Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

Hasil : telah dilakukan dan ibu mengerti yang diajarkan.

3. Mengevaluasi dan mengstimulasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan, dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

Hasil : jumlah perdarahan tanggal 17 mei 2017 pada pukul 02.50 wita adalah 250 cc

4. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan.

Hasil :

Jam	Waktu (wita)	TD (mmHg)	Nadi (x/menit)	Suhu	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi uterus	Kandung kemih	perdarahan
I	02.50 wita	100/80	80 x/i	36.6° C	1 Jrbpst	baik	Kosong	50 cc
	03.05 wita	100/80	80 x/i		1 Jrbpst	baik	Kosong	50 cc
	03.20 wita	100/80	80 x/i		1 Jrbpst	baik	Kosong	50 cc
	03.35 wita	100/80	80 x/i		1 Jrbpst	baik	100 cc	40 cc
II	04.05 wita	100/80	80 x/i	36.6° C	2 Jrbpst	baik	Kosong	30 cc
	04.35 wita	100/80	80 x/i		2 Jrbpst	baik	50 cc	30 cc

5. Periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik (40-60 x/menit) serta suhu tubuh normal yaitu (36.5°c - 37.5°c)

Hasil : telah dilakukan pemeriksaan dan bayi bernafas normal dengan pernapasan 50 x/menit dan suhu tubuh normal yaitu 36.8°c.

6. Tempatkan semua peralatan bekas pakai kedalam larutan klorin 0.5 % untuk didekontaminasi (selama 10 menit). Cuci dan bilas setelah didekontaminasi.

Hasil : telah dilakukan, dan peralatan telah direndam dilarutan klorin untuk didekontaminasi.

7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi kedalam tempat sampah yang sesuai.

Hasil : telah dilakukan

8. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. dan bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu telah dibersihkan, dan ibu telah memakai pakaian bersih dan kering.

9. Pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Bantu ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya, dan anjurkan keluarga untuk member ibu minuman dan makanan yang diinginkan.

Hasil : ibu telah merasa nyaman, ibu telah menyusui bayinya, dan ibu telah makan dan minum di bantu oleh keluarga.

10. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0.5 %

Hasil : telah dilakukan

11. Celupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0.5 %, dan buka secara terbalik dengan bagian dalam ke luar, lalu rendam dalam larutan klorin 0.5 % selama 10 menit.

Hasil : telah dilakukan

12. Cuci kedua tangan dengan sabun dibawah air mengalir dengan menggunakan teknik cuci tangan 7 langkah.

Hasil : telah dilakukan dan tangan telah di cuci.

13. Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang)

Hasil : partograf telah di lengkapi.



CATATAN PERSALINAN

- Tanggal : 16 Mei 2017
- Nama bidan :
- Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya :
- Alamat tempat persalinan :
- Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
- Alasan merujuk :
- Tempat rujukan :
- Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

- Partogram melewati garis waspada : Y / T
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah Tsb :
- Hasilnya :

KALA II

- Episiotomi :
 Ya, Indikasi
 Tidak
- Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
- Gawat Janin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
- Distosia bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah tersebut :
- Hasilnya :

KALA III

- Lama kala III : ± 5 menit
- Pemberian Oksitosin 10 U im ?
 Ya, waktu : 2 menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan
- Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan
 Tidak
- Penegangan tali pusat terkendali ?
 Ya,
 Tidak, alasan

- Masase fundus uteri ?
 Ya.
 Tidak, alasan
- Plasenta lahir lengkap (intact) (Ya) Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
- Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya (Tidak)
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
- Laserasi :
 Ya, dimana
 Tidak.
- Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
 Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan
- Atoni uteri :
 Ya, tindakan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
- Jumlah perdarahan : 250 ml
- Masalah lain, sebutkan
- Penatalaksanaan masalah tersebut :
- Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

- Berat badan : 3350 gram
- Panjang : 49 cm
- Jenis kelamin : L / P
- Penilaian bayi baru lahir : (baik) ada penyulit
- Bayi lahir :
 Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang taktil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas/tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang taktil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan
- Cacat bawaan, sebutkan :
- Hipotermi, tindakan :
 a.
 b.
 c.
- Pemberian ASI
 Ya, waktu : segera jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan
- Masalah lain,sebutkan :
- Hasilnya :

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi		Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	02.30 wita	100/80 mmHg	80 x/i	36.6° C	1 jrbpst	baik	kosong	50 cc
	03.05 wita	100/80 mmHg	80 x/i		1 jrbpst	baik	kosong	50 cc
	03.20 wita	100/80 mmHg	80 x/i		1 jrbpst	baik	kosong	50 cc
	03.35 wita	100/80 mmHg	80 x/i		1 jrbpst	baik	100 cc	40 cc
2	04.05 wita	100/80 mmHg	80 x/i	36.6° C	2 jrbpst	baik	kosong	30 cc
	04.35 wita	100/80 mmHg	80 x/i		2 jrbpst	baik	50 cc	30 cc

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada Ny “F” dengan persalinan normal di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar. Asuhan ini dilakukan selama satu hari yang dimulai saat pasien masuk di puskesmas sampai pasien pindah keruangan nifas, dimana asuhan yang dilakukan berlanjut pada proses pengakhiran kehamilan yang mencakup kala I-IV persalinan.

Dalam hal ini, pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yaitu : pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien secara lengkap. Dimana data yang dikumpulkan berupa keluhan klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal secara lengkap (Betty mangkuji dkk, 2014 : 5).

Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. Pasien adalah sumber informasi yang paling akurat dan ekonomis yang disebut dengan sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data sekunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain, dan anggota keluarga.

Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu, 1) Observasi, 2) Wawancara 3) Pemeriksaan. Observasi adalah pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi nafas), penciuman (bau nafas, bau luka), perabaan (suhu badan, nadi). Wawancara, dimana pembicaraan terarah yang umumnya dilakukan pada pertemuan tatap muka. Dalam wawancara yang penting diperhatikan adalah data yang ditanyakan di arahkan data yang relevan. Dan Pemeriksaan, dimana pengumpulan data yang dilakukan dengan memakai instrument/alat mengukur. Dengan tujuan untuk memastikan batas dimensi angka, irama kuantitas. Misalnya pengukuran tinggi badan dengan meteran, berat badan dengan timbangan, tekanan darah dengan tensimeter (Dwi Asri, 2012 : 27-28).

Dalam tahapan pengkajian, penulis tidak mendapat hambatan. Hal ini dapat dilihat dari profesi ibu yang dapat menerima kehadiran penulis saat pengumpulan data sampai tindakan yang diberikan. Ibu menunjukkan sikap terbuka dan menerima

anjuan serta saran yang diberikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan.

Tindakan yang pertama kali dilakukan di Puskesmas Jumpandang Baru yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk ke puskesmas, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data secara objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), dan pemeriksaan dalam.

Ny "F" usia 32 tahun, GVPIVA0, datang kepuskesmas pada pukul 22.05 wita dengan keluhan nyeri pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, yang di sertai dengan adanya pelepasan lendir bercampur dengan darah sejak tanggal 16 mei 2017 pukul 21.00 wita, dan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan bertambah kuat, pasien mengatakan selama hamil pergerakan janinnya kuat dan bergerak pada bagian sebelah kiri perut ibu, pasien mengatakan melakukan kunjungan *antenatal care* (ANC) sebanyak 6x di Bidan praktik swasta (BPS), pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 20 agustus 2016, dan usia kehamilannya sekarang sudah mencapai ± 9 bulan, pasien mengatakan selama hamil ia tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat.

Pasien tidak pernah mengalami trauma selama kehamilan yang sekarang maupun kehamilan yang lalu, pasien tidak pernah mengalami penyulit dan trauma

selama persalinan dan nifas yang lalu, pasien tidak memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, asma jantung, diabetes dan penyakit menular lainnya, pasien tidak memiliki riwayat mengonsumsi obat-obatan selama hamil tanpa resep dari bidan/dokter, pasien mengatakan pernah menggunakan alat kontrasepsi berupa suntik 3 bulan mulai dari anak pertama sampai anak keempat, dan pasien berhenti berKB karena ingin hamil, Pasien tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan tidak pernah dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas, Selama hamil, nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, istirahat cukup, aktivitas pasien tetap melakukan pekerjaan rumah tangga, melakukan hubungan seksual 2 minggu yang lalu.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,7°C. Ekspresi wajah tampak cemas, tidak tenang dan meringis menahan sakit serta tidak ada edema dan pembengkakan pada wajah, kedua konjungtiva mata tidak anemis dan tidak ikterik, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis, payudara tampak simetris, hiperpigmentasi pada areola mammae. Pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) 3 jari dibawah *Prosesus Xipioideus*, 39 cm, teraba bokong dan sesuai usia kehamilan 38 minggu, punggung kanan, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP) dengan penurunan bagian terbawah janin 3/5, pada auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 138 x/menit, janin intrauterine, tunggal dan hidup.

Pada pemeriksaan dalam pertama tanggal 16 mei 2017 pukul 22.15 wita yaitu, tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio lunak dan tipis, terdapat pembukaan 6 cm, ketuban masih utuh, presentase kepala yaitu ubun-ubun kecil kanan lintang, penurunan hodge II, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal. Pemeriksaan dalam kedua tanggal 17 mei 2017 pukul 02.15 di dapatkan hasil tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio lunak dan tipis, terdapat pembukaan 10 cm, ketuban sudah pecah dengan warna air ketuban jernih, presentase kepala yaitu ubun-ubun kecil sudah dibawah simpisis, penurunan hodge IV, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal.

Hasil pemeriksaan usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 38 minggu 3 hari (Prawirohardjo, 2014 : 279). Pada pemeriksaan abdomen, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendur, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (prawirohardjo, 2014 : 179).

Pada pemeriksaan leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada saat uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu setengah duduk, lalu mulai melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas simpisis pubis dan puncak fundus uteri hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk menentukan presentasi janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran,

dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dikatakan sebagai presentasi bokong karena kepala janin berada pada bagian fundus atau jika pada bagian fundus uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentasi kepala (Ai Nursiah, dkk, 2014 : 75-76).

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada diatas symphysis dan dapat diukur dengan lima jari tangan (per lima an), bagian diatas symphysis adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul (PAP) dan sisanya telah memasuki pintu atas panggul (PAP) (Widia, 2015 : 64).

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11). Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

Pada persalinan kala I yang ditandai dengan adanya his atau kontraksi dimana mempunyai ciri seperti, pinggang terasa sakit yang menjalar kedepan, his yang bersifat teratur, interval semakin pendek dan kekuatannya semakin besar, mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks. Selain his, persalinan juga ditandai

dengan adanya pengeluaran lendir dari kanalis servikalis karena terjadi pembukaan dan pengeluaran darah dikarenakan kapiler pembuluh darah pecah.

Persalinan juga dapat disebabkan oleh pengeluaran cairan ketuban yang sebagian besar baru pecah menjelang pembukaan lengkap dan tanda *in partu*, meliputi adanya *bloody show*, peningkatan rasa sakit, perubahan bentuk serviks, pendataran serviks, pembukaan serviks (dilatasi), pengeluaran cairan yang banyak atau selaput ketuban yang pecah dengan sendirinya (Nurul jannah, 2017 : 3).

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kala I persalinan normal. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kala II yang telah di dapatkan pada kasus Ny "F" didapatkan data subjektif Ibu merasakan adanya desakan untuk mendorong yang tidak bisa lagi ditahan-tahan, dimana ibu mulai mengatur napas dengan lebih banyak menahan atau menggumam selama kontraksi, kontraksi sudah tidak begitu sering dirasakan, namun setiap kontraksi yang tersisa sangat kuat dan semakin kuat, suasana hati ibu sudah mulai berubah dimana ibu merasa mengantuk dan kelelahan dan ia juga mulai fokus pada persalinannya, ibu merasakan adanya tekanan pada anus dan ibu merasakan kepala bayinya seperti mulai menyembul mau keluar lewat vaginanya.

Data objektif pada kasus Ny "F" yang didapat dimana tampak perineum menonjol, vulva-vagina dan sfingter ani mulai membuka, meningkatnya produksi pengeluaran lendir bercampur dengan darah dan pada pemeriksaan tanda pasti kala II

di tentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina. Sedangkan teori menerangkan bahwa Kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, gejala dan tanda kala II yaitu dimana kontraksi uterus menjadi lebih kuat dan sering (\pm 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mencedan, dimana air ketuban yang keluar membuat dinding uterus menjadi lebih dekat dengan fetus, sehingga kekuatan kontraksi lebih intensif untuk mendorong keluar fetus, dan juga vagina yang merenggang karena turunnya kepala bayi akan membuat kontraksi menjadi lebih baik.

Tanda dan gejala kala II juga ditandai dengan adanya pembukaan lengkap (tidak teraba lagi bibir porsio), ini terjadi karena adanya dorongan bagian terbawah janin yang masuk ke dalam dasar panggul karena kontraksi uterus yang kuat sehingga porsio membuka secara perlahan, his yang lebih sering dan kuat (\pm 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mencedan, karena biasanya dalam hal ini bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara *reflektoris* menimbulkan rasa mencedan,

Adanya pengeluaran darah bercampur lendir, disebabkan oleh adanya robekan serviks yang merenggang, pecahnya kantung ketuban, karena kontraksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan yang besar antara tekanan di dalam uterus dan diluar uterus sehingga kantung ketuban tidak dapat menahan tekanan isi uterus akhirnya kantung ketuban pecah, anus membuka, karena bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga menekan rectum dan rasa buang air besar, hal ini menyebabkan anus membuka, vulva terbuka, perineum menonjol, karena bagian

terbawah janin yang sudah masuk PBP dan di tambah pula dengan adanya his serta kekuatan mengedan menyebabkan vulva terbuka dan perineum menonjol, karena perineum bersifat elastic, bagian terdepan anak kelihatan pada vulva, karena labia membuka, perineum menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat divulva, karena ada his dan tenaga mengedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Widia, 2015: 129-130).

Berdasarkan pengkajian yang di lakukan pada Ny "F" di kala II tidak di temukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Berdasarkan pengkajian data asuhan kebidanan perlangsungan kala III pada kasus Ny "F" didapatkan data subjektif ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri pada perut bagian bawah, dan pada data objektif didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 17 mei 2017, jam 02.30 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) tinggi fundus uteri setinggi pusat perdarahan \pm 250 cc, kala II berlangsung selama \pm 15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva.

Pada teori menjelaskan bahwa Kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Partus kala III disebut juga kala uri. Kala III merupakan periode waktu dimana penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlengketan plasenta. Oleh karena tempat perlengketan menjadi kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus (Ina Kuswanti, dkk 2014: 199).

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny "F" di kala III tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Dan berdasarkan data pengkajian asuhan kebidanan pada kasus Ny "F" dengan perlangsungan kala IV didapatkan data subjektif ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah dan pada data objektif didapatkan hasil kala III berlangsung ± 5 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 17 Mei 2017 jam 02.35 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 200 cc dan kandung kemih kosong.

Teori menjelaskan Kala IV ditetapkan sebagai waktu dua jam setelah plasenta lahir lengkap, hal ini dimaksudkan agar dokter, bidan atau penolong persalinan masih mendampingi wanita setelah persalinan selama 2 jam (2 jam post partum). Dengan cara ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena perdarahan postpartum dapat dikurangi atau dihindarkan (Dwi Asri, dkk 2012: 95). Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny "F" di kala IV tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus nyata

Berdasarkan uraian di atas yang dimulai dari kala I persalinan sampai kala IV persalinan, terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus persalinan normal. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosis atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada monoklatur standar diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan hasil pengkajian (Betty Mangkuji dkk, 2014 : 5).

Hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis inpartu kala I fase aktif dimana pasien datang pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 22.05 wita, dengan keluhan nyeri pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, yang disertai dengan adanya pelepasan lendir bercampur dengan darah sejak tanggal 16 Mei 2017 pukul 21.00 wita dan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan bertambah kuat, kehamilan ibu adalah kehamilan yang kelima dan tidak pernah keguguran sebelumnya, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang sudah mencapai ±9 bulan.

Riwayat kesehatan yang lalu, Ny" F" tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan dirawat di rumah sakit ataupun di puskesmas. Pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) 3 jari dibawah *Prosesus Xipoides* dan 39 cm sesuai usia kehamilan 38 minggu, punggung kanan, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP), terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 138 x/menit, janin intrauterine, tunggal dan hidup. Pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan, keadaan portio lunak dan tipis, terdapat pembukaan

6 cm, ketuban masih utuh, presentase kepala yaitu ubun-ubun kecil kanan lintang, penurunan hodge II, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal.

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa persalinan normal merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar atau persalinan dan kelahiran normal merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Nurul jannah, 2017 : 1).

Umumnya pasien *in partu* akan mengeluh nyeri perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, hal tersebut terjadi dimana adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya penipisan atau dilatasi serviks (Prawirohardjo, 2014 : 297). Selain adanya kontraksi atau his, persalinan juga ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dari kanalis servikalis karena terjadi pembukaan dan pengeluaran darah dikarenakan kapiler pembuluh darah pecah (Frisca Tresnawati, 2012 : 11).

Pada pemeriksaan abdomen, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendur, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (prawirohardjo, 2014 : 179).

Pada pemeriksaan leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada saat uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu setengah duduk, lalu mulai melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas simfisis pubis dan puncak fundus uteri hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus

uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk menentukan presentasi janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran, dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dikatakan sebagai presentasi bokong karena kepala janin berada pada bagian fundus atau jika pada bagian fundus uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentasi bokong (Ai Nursiah, dkk, 2014 : 75-76).

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada diatas shympisis dan dapat diukur dnegan lima jari tangan (per lima), bagian diatas shympisi adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul (PAP) dan sisanya telah memasuki pintu atas panggul (PAP) (Widia, 2015 : 64).

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesara perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 : 10-11). Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014 : 285).

Pada persalinana kala I yang di tandai dengan adanya his atau kontraksi dimana mempunyai ciri seperti, pinggang terasa sakit yang menjalar kedepan, his

yang bersifat teratur, interval semakin pendek dan kekuatannya semakin besar, mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks. Selain his, persalinan juga ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dari kanalis servikalis karena terjadi pembukaan dan pengeluaran darah dikarena kapiler pembuluh darah pecah.

Persalinan juga dapat disebabkan oleh pengeluaran cairan ketuban yang sebagian besar baru pecah menjelang pembukaan lengkap dan tanda *in partu*, meliputi adanya *bloody show*, peningkatan rasa sakit, perubahan bentuk serviks, pendataran serviks, pembukaan serviks (dilatasi), pengeluaran cairan yang banyak atau selaput ketuban yang pecah dengan sendirinya (Nurul jannah, 2017 : 3).

Berdasarkan uraian diatas maka diagnosis pada kasus kala I tersebut adalah GVPIVA0, gestasi 38 – 40 minggu, presentase kepala, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP), intrauterin, tunggal, hidup, dengan kala I fase aktif.

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kala II yang telah di dapatkan pada kasus Ny “F” didapatkan data subjektif Ibu merasakan adanya desakan untuk mendorong yang tidak bisa lagi ditahan-tahan, dimana ibu mulai mengatur napas dengan lebih banyak menahan atau menggumam selama kontraksi, kontraksi sudah tidak begitu sering dirasakan, namun setiap kontraksi yang tersisa sangat kuat dan semakin kuat, suasana hati ibu sudah mulai berubah dimana ibu merasa mengantuk dan kelelahan dan ia juga mulai fokus pada persalinannya, ibu merasakan adanya tekanan pada anus dan ibu merasakan kepala bayinya seperti mulai menyembul mau keluar lewat vaginanya.

Data objektif pada kasus Ny “F” yang didapat dimana tampak perineum menonjol, vulva-vagina dan sfingter ani mulai membuka, meningkatnya produksi pengeluaran lendir bercampur dengan darah dan pada pemeriksaan tanda pasti kala II di tentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina. Sedangkan teori menerangkan bahwa Kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, gejala dan tanda kala II yaitu dimana kontraksi uterus menjadi lebih kuat dan sering (\pm 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mencedan, dimana air ketuban yang keluar membuat dinding uterus menjadi lebih dekat dengan fetus, sehingga kekuatan kontraksi lebih intensif untu mendorong keluar fetus, dan juga vagina yang merengang karena turunnya kepala bayi akan membuat kotraksi menjadi lebih baik.

Tanda dan gejala kala II juga di tandai dengan adanya pembukaan lengkap (tidak teraba lagi bibir porsio), ini terjadi karena adanya dorongan bagian terbawah janin yang masuk kedalam dasar panggul karena kontraksi uterus yang kuat sehingga porsio membuka secara perlahan, his yang lebih sering dan kuat (\pm 2-3 menit 1 kali) dan timbul rasa mencedan, karena biasanya dalam hal ini bagian terbawah janin masuk ke dasar panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara *reflektoris* menimbulkan rasa mencedan,

Adanya pengeluaran darah bercampur lendir, di sebabkan oleh adanya robekan serviks yang merengang, pecahnya kantung ketuban, karena kontraksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan yang besar antara tekanan di dalam uterus dan diluar uterus sehingga kantung ketuban tidak dapat menahan tekanan isi

uterus akhirnya kantung ketuban pecah, anus membuka, karena bagian terbawah janin masuk kedasar panggul sehingga menekan rectum dan rasa buang air besar, hal ini menyebabkan anus membuka, vulva terbuka, perineum menonjol, karena bagian terbawah janin yang sudah masuk PBP dan di tambah pula dengan adanya his serta kekuatan mengedan menyebabkan vulva terbuka dan perineum menonjol, karena perineum bersifat elastic, bagian terdepan anak kelihatan pada vulva, karena labia membuka, perineum menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat divulva, karena ada his dan tenaga mengedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Widia, 2015: 129-130).

Berdasarkan uraian diatas maka diagnosis pada kasus kala II tersebut adalah GVPIVA0, gestasi 38 – 40 minggu, dengan Perlangsungan kala II.

Berdasarkan pengkajian data asuhan kebidanan perlangsungan kala III pada kasus Ny “F” didapatkan data subjektif ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri pada perut bagian bawah, dan pada data objektif didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 17 mei 2017, jam 02.30 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) tinggi fundus uteri setinggi pusat perdarahan \pm 250 cc, kala II berlangsung selama \pm 15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva.

Pada teori menjelaskan bahwa Kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Partus kala III disebut juga kala uri. Kala III merupakan periode waktu dimana penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlengketan

plasenta. Oleh karena tempat perlekungan menjadi kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus (Ina Kuswanti, dkk 2014: 199).

Berdasarkan uraian kasus Ny "F" diatas maka diagnosis pada kasus kala III tersebut adalah GVPIVA0, dengan Perlangsungan kala III.

Dan berdasarkan data pengkajian asuhan kebidanan pada kasus Ny" F" dengan perlangsungan kala IV didapatkan data subjektif ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah dan pada data objektif di dapatkan hasil kala III berlangsung ± 5 menit ,plasenta lahir lengkap tanggal 17 mei 2017 jam 02.35 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 200 cc dan kandung kemih kosong.

Teori menjelaskan Kala IV ditetapkan sebagai waktu dua jam setelah plasenta lahir lengkap, hal ini dimaksudkan agar dokter, bidan atau penolong persalinan masih mendampingi wanita setelah persalinan selama 2 jam (2 jam post partum). Dengan cara ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena perdarahan postpartum dapat dikurangi atau dihindarkan (Dwi Asri, dkk 2012: 95). Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny "F" di kala IV maka diagnosis pada kasus kala IV tersebut adalah GVPIVA0, dengan Perlangsungan kala IV.

Berdasarkan uraian diatas maka diagnosis pada kasus tersebut adalah GVPIVA0, gestasi 38-40 minggu, intrauterin, dengan persalinan normal. Demikian penerapan tinjauan pustaka dan kasus pada Ny "F" secara garis besar tampak adanya

persamaan antar teori dengan diagnosis actual yang ditegakkan sehingga memudahkan memberikan tindakan selanjutnya.

C. Langkah III. Antisipasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap bila diagnose/ masalah potensial ini benar-benar terjadi (Frisca Tresnawati, 2012 : 3-4).

Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman.

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap bila diagnose/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman.

Dalam mengidentifikasi diagnose atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada kala I yaitu terjadinya kala I lama, peningkatan atau penurunan tanda-tanda vital, DJJ kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali/menit, terjadinya perdarahan pervaginam selain dari lendir dan darah, ketuban pecah yang bercampur dengan mekonium kental yang di sertai dengan

tanda gawat janin, kontraksi uterus kurang dari 2 kontraksi dalam 10 menit dan berlangsung kurang dari 20 detik serta tidak di temukan perubahan serviks dalam 1-2 jam, pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada pada partograf, dan dapat mengakibatkan terjadinya infeksi jalan lahir dikarenakan jalan lahir terbuka, maka dapat terjadi infeksi pada ibu apabila terlalu sering dilakukan pemeriksaan dalam.

Dan berdasarkan pengkajian hasil asuhan kebidanan pada Ny “F” tidak di dapatkan data penunjang terjadinya diagnosa potensial dimana pada kasus Ny “F” didapatkan data objektif berdasarkan pemeriksaan yang di lakukan di dapatkan hasil Usia gestasi 38 minggu 3 hari , Tanda-tanda vital, Tekanan darah 110/70 mmHg, Suhu 36,7 °C, Nadi 80 x/menit, Pernapasan 20 x/menit, dan pada saat di lakukan pemeriksaan fisik terfokus di dapatkan hasil pda pemeriksaan abdomen leopold I (3 jrbpx ,32 cm,teraba bokong), leopold II (Puka), leopold III (teraba kepala), leopold IV (bdp dengan penurunan bagian terbawah janin 3/5), DJJ 138 x/menit ,dan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam (VT 1) pada tanggal 16 mei 2017 pada jam 22.05 wita di dapatkan hasil vulva dan vagina dalam keadaan normal, porsio menipis, pembukaan 6 cm, ketuban masih utuh, presentase ubun-ubun kecil kanan lintang penurunan hogde II kesan panggul normal, dan terdapat pelepasan lendir dan darah , Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaaan dalam (VT II) pada tanggal 17 mei 2017 pukul 02.15 wita, di dapatkan hasil di dapatkan hasil vulva dan vagina dalam keadaan normal , porsio Melesap ,pembukaan 10 cm, ketuban sudah pecah dengan warna air

ketuban jernih, presentase kepala di bawah sympis ,penurunan hogde IV kesan panggul normal, dan terdapat pelepasan lendir, air dan darah.

Pada kala II persalinan, kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu, terjadinya kala II lama yang di sertai dengan partus macet/kasep, dimana partograf melewati garis waspada, terjadinya distosia bahu, kontraksi tidak teratur dan kurang, tanda-tanda vital meningkat, dan ibu tampak kelelahan. . Pada kasus Ny “F” tidak di dapatkan data penunjang terjadinya diagnosa petensial tersebut dimana pada kasus Ny “F” bayi lahir spontan, segera menangis 15 menit setelah pembukaan lengkap pada tanggal 17 mei 2017 pukul 02.30 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) , tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat masih nampak pada vulva.

Pada manajemen aktif Kala III persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu diantaranya terjadinya perdarahan pervaginam dikarenakan terjadinya laserasi jalan lahir, atonia uteri karena kontraksi uterus yang tidak baik, dan terjadinya retensio plasenta dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir. Pada kasus Ny “F” tidak terdapat data yang menunjang terjadinya diagnosa potensial tersebut dimana pada kasus Ny “F” di dapatkan data objektif yaitu plasenta lahir \pm 5 menit setelah bayi lahir pada tanggal 17 mei 2017 pukul 02.35 wita tanpa ada penyulit, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat, perdarahan \pm 200 cc.

Dan pada Kala IV persalinan, masalah yang dapat terjadi yaitu terjadinya perdarahan pervaginam dengan pembekuan darah yang banyak, tanda-tanda vital melawati batas normal dimana tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kontraksi

uterus yang tidak baik. Pada kasus Ny “F” tidak terdapat data yang menunjang terjadinya diagnosa potensial pada kala IV dimana pada kasus Ny “F” di dapatkan data objektif yaitu kala IV berlangsung setelah 15 menit pelepasan plasenta, dengan pemantauan yang dilakukan selama 2 jam pasca persalinan, dimana pemantauan dilakukan tiap 15 menit pada jam pertama, dan pemantauan dilanjutkan tiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Pada kala IV, kasus Ny “F” berlangsung dengan normal dimana ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 x/menit, suhu 36.6°C, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat, kandung kemih kosong, dan perdarahan \pm 200 cc.

Pada kasus Ny “F”, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau kelainan komplikasi pada ibu maupun janin yang mungkin akan terjadi pada kala I sampai dengan kala IV, karena penanganan yang dilakukan pada ibu bersalin telah sesuai dengan teori sehingga tidak ada diagnosa potensial yang terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

D. Langkah IV. Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/ Kolaborasi

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh memerukan tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi (Betty Mangkuji, 2014 : 6)

Langkah keempat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan yang terjadi dalam kondisi darurat. Kondisi darurat dapat terjadi pada saat mengelola ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Kondisi darurat merupakan kondisi yang membutuhkan tindakan dengan segera untuk menangani diagnosis maupun masalah darurat yang terjadi apabila tidak segera dilakukan tindakan segera, selain diatas bisa juga berupa observasi/pemeriksaan.

Pada penjelasan diatas menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosis/masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan darurat /segera yang harus dirumuskan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Dalam rumusan ini, termasuk tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri atau bersifat rujukan (Rita Yulifah, 2013 : 134).

Pada studi kasus Ny “F” tidak ada tindakan segera yang perlu dilakukan karena dalam pemantauan persalinan tidak ada tindakan yang membutuhkan penanganan segera.

E. Langkah V. Rencana Tindakan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi/data dasar yang tidaklengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi-kondisi

klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan social-ekonomi, cultural atau masalah psikologis (Th. Endang, dkk, 2014 :137)

Adapun sasaran/target dalam rencana asuhan pada kasus ini berfokus untuk mencegah terjadinya komplikasi selama persalinan dan setelah bayi baru lahir yang dapat mengurangi kematian dan kesakitan pada ibu dan bayi baru lahir (Prawirohardjo, 2014 : 334). Bila diagnosis asuhan peralihan normal ditegakkan, rencana asuhan yang akan diberikan adalah memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan, melakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf, memantau tanda-tanda vital ibu, memantau keadaan bayi, (DJJ, dan gerakan bayi, memenuhi kebutuhan hidrasi ibu, memberikan asuhan sayang ibu selama persalinan dimana menghadirkan orang-orang yang dianggap penting oleh ibu dan memberikan dukunagn psikologis pada ibu, menjaga privasi dan kebersihan ibu, serta mempertahankan kandung kemih agar tetap kosong (Nurul Jannah, 2017 : 59).

Penatalaksanaan pada kasus persalinan normal yaitu dilakukan secara konsisten dan sistematis menggunakan praktik pencegahan infeksi, memberikan asuhan secara rutin dan pemantauan selama persalinan dan setelah bayi lahir termasuk dalam penggunaan partograf, memberikan asuhan sayang ibu secara rutin selama persalinan, termasuk menjelaskan kepada ibu dan keluarganya mengenai proses kelahiran bayi dan meminta suami ibu atau keluarga lainnya ikut berpartisipasi

dalam proses persalinan dan kelahiran bayi, memberikan asuhan bayi baru lahir, termasuk mengeringkan dan menghangatkan tubuh bayi, member ASI secara dini, mengenal sejak dini komplikasi dan melakukan tindakan yang bermanfaat secara rutin, memberikan asuhan dan pemantauan ibu dan bayi baru lahir termasuk pada masa nifas secara rutin (Prawirohardjo, 2014 : 335).

Rencana asuhan pada kasus Ny "F" disusun berdasarkan teori dengan melihat kondisi dan kebutuhan pasien. Hasil pengkajian anamnesis, pemeriksaan fisik dan pada pasien yaitu Ny "F" datang dengan keluhan nyeri pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, yang di sertai dengan adanya pelepasan lendir bercampur dengan darah sejak tanggal 16 mei 2017 pukul 21.00 wita, dan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan bertambah kuat, pasien mengatakan selama hamil pergerakan janinnya kuat dan bergerak pada bagian sebelah kiri perut ibu, dan usia kehamilannya sekarang sudah mencapai ± 9 bulan.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,7°C. Ekspresi wajah tampak cemas, tidak tenang dan meringis menahan sakit serta tidak ada edema dan pembengkakan pada wajah, kedua konjungtiva mata tidak anemis dan tidak ikterik, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis, payudara tampak simetris, hiperpigmentasi pada areola mammae. Pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) 3 jari dibawah *Prosesus Xipoides*, 39 cm, teraba bokong dan sesuai usia kehamilan 38

minggu, punggung kanan, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP) dengan penurunan bagian terbawah janin 3/5, pada auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 138 x/menit, janin intrauterine, tunggal dan hidup.

Pada pemeriksaan dalam pertama tanggal 16 mei 2017 pukul 22.15 wita yaitu, tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio lunak dan tipis, terdapat pembukaan 6 cm, ketuban masih utuh, presentase kepala yaitu ubun-ubun kecil kanan lintang, penurunan hodge II, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal. Pemeriksaan dalam kedua tanggal 17 mei 2017 pukul 02.15 di dapatkan hasil tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio lunak dan tipis, terdapat pembukaan 10 cm, ketuban sudah pecah dengan warna air ketuban jernih, presentase kepala yaitu ubun-ubun kecil sudah dibawah simpisis, penurunan hodge IV, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal.

Rencana tindakan yang telah disusun yaitu: sapa ibu dan keluarga untuk meningkatkan rasa percaya sehingga ibu menjadi lebih kooperatif dengan petugas, beritahu hasil pemeriksaan, menganjurkan keluarga untuk memberikan support dan semangat kepada ibu, berikan KIE tentang persalinan normal, minta persetujuan ibu dan keluarga untuk melakukan tindakan dengan inform consent, laksanakan tindakan sesuai dengan penerapan asuhan persalinan normal. Dampingi ibu dalam proses persalinan dan lanjutkan asuhan kebidanan Kala I, II, III dan IV persalinan.

Rencana tindakan dalam pemantauan kala I adalah memantau kemajuan persalinan dengan mengobservasi his dan pembukaan serviks. Rencana yang akan

diberikan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa pembukaan telah lengkap dan ketuban sudah pecah, menjelaskan penyebab nyeri, mendampingi ibu selama persalinan, menganjurkan ibu untuk miring ke salah satu sisi untuk tehnik relaksasi, mengajarkan ibu tehnik relaksasi dengan menarik nafas lewat hidung dan mengeluarkan lewat mulut, menganjurkan keluarga untuk memberi intake, support dan motivasi pada ibu saat his berkurang, mengobservasi his, melakukan pemeriksaan dalam, menganjurkan kepada ibu dan keluarga untuk senantiasa berdo'a kepada Allah swt dan diberikan kesabaran serta kemudahan dalam proses persalinan, mengajarkan ibu meneran pada saat his, menyiapkan peralatan pertolongan persalinan.

Rencana tindakan selanjutnya pada kala II bertujuan agar ibu melahirkan bayi tanpa komplikasi dan mencegah terjadinya robekan pada vagina dan perineum. Rencana tindakan yang akan diberikan adalah melakukan pimpinan persalinan dengan membimbing Ibu untuk meneran, melakukan pengecekan fundus untuk memastikan tidak ada lagi bayi, memberitahu Ibu bahwa penolong akan menyuntikkan oksitosin, menyuntikkan oksitosin 10 IU di 1/3 paha atas distal lateral secara IM, menjepit dan memotong tali pusat.

Rencana selanjutnya pada kala III bertujuan agar plasenta lahir utuh tanpa terjadi komplikasi pada ibu. Rencana tindakan yang akan diberikan adalah melakukan manajemen aktif kala III (PTT, melahirkan plasenta, masase fundus uteri), mengevaluasi perdarahan dan memeriksa robekan pada vagina dan perineum serta melakukan katerisasi.

Rencana tindakan selanjutnya pada kala IV bertujuan untuk memastikan tidak terjadi perdarahan dengan melakukan pemantauan kala IV. Rencana tindakan yang akan diberikan adalah menjelaskan pada ibu tentang kondisinya saat ini dan keluhan yang dialami adalah normal pasca persalinan, melakukan pemantauan 2 jam post partum.

Rencana selanjutnya adalah meminta keluarga untuk selalu menemani ibu dan memenuhi kebutuhan ibu, mengajarkan ibu dan keluarga untuk memantau kontraksi uterus, jumlah darah yang keluar dan tanda-tanda bahaya, memberikan KIE tentang persiapan prakonsepsi dan masa subur, memberikan dukungan pada ibu dan keluarga untuk senantiasa berdo'a kepada Allah swt agar dikaruniakan keturunan yang baik dan sholeh, memindahkan ibu ke ruang nifas.

Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dengan manajemen Asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

F. Langkah VI. Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh klien, atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan penatalaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana) (Dwi Asri, dkk. 2012 : 31).

Pada studi kasus Ny'F'' dengan persalinan normal, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Seperti menyampaikan hasil pemeriksaan dengan baik, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bersama, memberikan dukungan moril kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan penting dengan membesarkan hati ibu dan keluarga bahwa janin dapat lahir melewati jalan lahir secara normal. Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga memutuskan janinnya akan dilahirkan secara normal, memberikan dukungan psikologis pada ibu dan keluarga, serta memenuhi kebutuhan cairan ibu yaitu memberi ibu minum.

Pemantauan selanjutnya, yaitu pada kala I persalinan ibu merasakan nyeri perut tembus belakang yang semakin terasa dan terdapat pelepasan lendir dan darah, keadaan umum ibu baik, tampak meringis menahan sakit, tanda-tanda vital dalam batas normal, his: 5x dalam 10 menit (durasi 40-45 detik), pemeriksaan dalam (VT pukul 02.15 wita) dengan portio melesap, pembukaan 10 cm, ketuban pecah, presentasi kepala, penurunan hodge IV, pengeluaran lendir, darah, dan air ketuban.

Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan pada Kala I yaitu menjelaskan penyebab nyeri, menganjurkan ibu untuk miring ke salah satu sisi untuk tehnik relaksasi, mengajarkan ibu tehnik relaksasi, menganjurkan pada keluarga untuk memberi intake, support dan motivasi pada ibu saat his berkurang, mengobservasi his pada pukul 02.15 wita, his : 5x dalam 10 menit (durasi 40-45 detik), melakukan pemeriksaan dalam pada pukul 02.15 wita dengan hasil portio melesap, pembukaan lengkap, ketuban pecah, jernih, presentasi kepala, UUK kanan

depan, penurunan Hodge IV, molase dan penumbungan tidak ada, kesan panggul cukup, pelepasan lendir darah dan air ketuban. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam, menganjurkan kepada ibu dan keluarga untuk senantiasa berdo'a kepada Allah swt dan memohon diberi kesabaran serta kemudahan dalam proses persalinan, mengajarkan ibu meneran pada saat his, menyiapkan peralatan pertolongan persalinan.

Pemantauan selanjutnya, yaitu pada kala II persalinan. Kala II dipastikan dengan adanya tanda dan gejala kala II yaitu ibu merasakan nyeri perut yang semakin timbul, ada dorongan untuk meneran, dan merasa seperti ingin buang air besar, perineum menonjol, vulva dan anus membuka. Hasil pemeriksaan dalam yaitu pembukaan lengkap pada pukul 02.15 wita dan selaput ketuban pecah pukul 02.10 wita. Tindakan asuhan yang dilakukan pada kala II adalah melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran pada pukul 02.15 wita, pimpinan meneran \pm 15 menit, bayi lahir spontan dengan presentasi belakang kepala tanggal 16 Mei 2017 pukul 12.30 wita dengan jenis kelamin perempuan, hidup, dan tidak terdapat kelainan pada bagian wajah dan badan. Berat badan 3350 gram, panjang badan 48 cm.

Setelah bayi lahir melakukan pengecekan fundus dan tidak ada lagi bayi dalam uterus, kemudian memberitahu ibu dan menyuntikkan oksitosin dan suntikan oksitosin, dan menjepit dan memotong tali pusat. Pemantauan selanjutnya, yaitu pada kala III persalinan. Kala III dimulai setelah bayi lahir pukul 02.30 wita, dan ditandai dengan adanya semburan darah tiba-tiba serta tali pusat bertambah panjang. Tindakan

yang dilakukan pada saat kala III yaitu melakukan manajemen aktif kala III: plasenta dan selaput ketuban lahir spontan pukul 02.35 wita kontraksi uteru baik dan TFU 1 jari di bawah pusat. Lama kala III adalah 5 menit, plasenta dan selaput keuban lahir kesan lengkap, perdarahan \pm 250 cc dan tidak terjadi robekan pada vagina dan perineum. Melakukan katerisasi dengan jumlah urin yaitu \pm 100 cc.

Pemantauan dilanjutkan pada kala IV persalinan. Kala IV persalinan dimulai setelah plasenta lahir. Ibu merasakan lega setelah melahirkan dan masih sedikit mules, keadaan umum ibu baik, ibu tampak kelelahan, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah : 100/80 mmHg, Nadi : 80x/i, Suhu : 36.7 °C, Pernafasan : 20 x/i, kontraksi uterus baik, TFU 1 jari dibawah pusat. Tindakan yang dilakukan yaitu menjelaskan pada ibu tentang kondisinya saat ini dan keluhan yang dialami adalah normal pasca persalinan. Tindakan selanjutnya adalah pemantauan 2 jam post partum. Pukul 02. 50 wita didapatkan tekanan darah ibu tidak meningkat dari jam pertama pukul 02. 50 wita tekanan darah 110/80 mmHg, pada jam kedua tetap menjadi 100/80 mmHg. Setelah itu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya, seperti tekanan darah: 100/80 mmHg, nadi: 80x/i, suhu: 36,6 °C, pernafasan: 20x/i.

Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, meminta keluarga agar selalu menemani dan memenuhi kebutuhan ibu, mengajarkan ibu dan keluarga cara memantau kontraksi uterus, memberikan KIE tentang persiapan prakonsepsi dan masa subur, menganjurkan ibu dan keluarga untuk senantiasa berdo'a kepada Allah swt agar dikaruniakan keturunan yang baik dan sholeh, memindahkan ibu ke ruang perawatan pada pukul 05.35 wita.

Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

G. Langkah VII. Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Adapun evaluasi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan tujuan kriteria yang diberikan kepada Ny "F" di Puskesmas Jumpandang Baru pada tanggal 16 s/d 17 Mei 2017 yaitu pada kala I berlangsung tidak lebih dari 7 jam, keadaan ibu dan janin baik, dan tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi.

Selanjutnya yaitu kala II juga berlangsung normal tanpa ada penyulit, bayi lahir spontan tanggal 17 Mei 2017, jam 02.30 wita, menangis kuat, bernapas tanpa bantuan serta bergerak aktif. Pada kala III, tidak ada penyulit dan berlangsung normal, berlangsung ± 5 menit, kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 17 Mei 2017, jam 21.35 wita, TFU setinggi pusat, perdarahan ± 250 cc, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), serta keadaan ibu dan bayi baik. Terakhir yaitu kala IV atau kala pengawasan, pada kala IV kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), jumlah perdarahan ± 200 cc, kandung kemih kosong dan keadaan ibu dan bayi baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari kala I sampai dengan kala IV, semuanya berlangsung normal, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.

H. Pendokumentasian

Tindakan yang pertama kali dilakukan di Puskesmas Jumpandang Baru yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk ke puskesmas, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data secara objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), dan pemeriksaan dalam.

Pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 22.05 wita, ibu datang ke Puskesmas Jumpandang Baru dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang yang disertai dengan pelepasan lendir bercampur dengan darah, sifat nyeri yang dirasakan ibu yaitu semakin lama semakin sering dan bertambah kuat. Hari pertama haid terakhir tanggal 20 Agustus 2016, tafsiran persalinan tanggal 27 Mei 2017, usia kehamilan ibu yaitu 38 minggu 3 hari. Ini merupakan kehamilan ibu yang kelima dan tidak pernah keguguran sebelumnya.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) 3 jari dibawah *Prosesus Xiploideus*, 39 cm, teraba bokong dan sesuai usia kehamilan 38 minggu, punggung kanan, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP) dengan penurunan bagian terbawah janin 3/5, pada

auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 138 x/menit, janin intrauterine, tunggal dan hidup.

Pada pemeriksaan dalam pertama tanggal 16 mei 2017 pukul 22.15 wita yaitu, tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio lunak dan tipis, terdapat pembukaan 6 cm, ketuban masih utuh, presentase kepala yaitu ubun-ubun kecil kanan lintang, penurunan hodge II, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal. Pemeriksaan dalam kedua tanggal 17 mei 2017 pukul 02.15 di dapatkan hasil tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio lunak dan tipis, terdapat pembukaan 10 cm, ketuban sudah pecah dengan warna air ketuban jernih, presentase kepala yaitu ubun-ubun kecil sudah dibawah simpisis, penurunan hodge IV, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal. Dari hasil pemeriksaan pada Ny "F" didapatkan hasil pengkajian yaitu inpartu kala I fase aktif.

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kala II yang telah di dapatkan pada kasus Ny "F" didapatkan data subjektif yaitu Ibu merasakan adanya dorongan yang kuat untuk mengedan, ibu merasakan adanya tekanan pada anus dan ibu merasakan kepala bayinya seperti mulai menyembul mau keluar lewat vaginanya. Data objektif pada kasus Ny "F" yang didapat dimana tampak perineum menonjol, vulva-vagina dan sfingter ani mulai membuka, meningkatnya produksi pengeluaran lendir bercampur dengan darah dan pada pemeriksaan tanda pasti kala II di tentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina. Pada hasil pengkajian Kala II pada kasus Ny "F" di dapatkan hasil yaitu bayi lahir spontan segera menangis pada

tanggal 17 Mei 2017 pukul 02.30 wita dengan jenis kelamin perempuan, BBL = 3350 gram, PBL = 48 cm, dan A/S = 8/10.

Berdasarkan pengkajian data asuhan kebidanan perlangsungan kala III pada kasus Ny "F" didapatkan data subjektif ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri pada perut bagian bawah, dan pada data objektif didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu kala III berlangsung \pm 5 menit setelah bayi lahir, dan plasenta lahir kesan lengkap pada pukul 02.35 wita.

Dan berdasarkan data pengkajian asuhan kebidanan pada kasus Ny "F" dengan perlangsungan kala IV didapatkan data subjektif ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah dan pada data objektif didapatkan hasil pemantauan selama 2 jam post partum dengan dilakukannya pemantauan pada tanda-tanda vital ibu, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih dan perdarahan.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “F” dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Jumpandang Baru, maka bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan


1. Asuhan kebidanan pada Ny “F” dengan Asuhan Persalinan Normal dilakukan dengan teknik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian dan analisa data dasar, pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, mulai dari anamnesis riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan keterangan tambahan yang menyangkut atau yang berhubungan dengan kondisi klien.
2. Diagnosa Ny “F” dengan Asuhan Persalinan Normal ditegakkan berdasarkan adanya keluhan yaitu nyeri pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, yang disertai dengan adanya pelepasan lendir bercampur dengan darah, dan sifat nyeri yang dirasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan kuat, serta pada pemeriksaan dalam di dapatkan pembukaan serviks 6 cm.
3. Pada Ny “F” masalah yang mungkin muncul yaitu pada kala I kemungkinan terjadinya infeksi jalan lahir yang disebabkan karena adanya pembukaan

serviks dan pemeriksaan dalam yang terlalu sering, pada kala II yaitu terjadinya kala II lama dimana garis pembukaan mendekati garis waspada, dan kemungkinan terjadinya distosia bahu, pada kala III persalinan kemungkinan masalah yang bisa terjadi yaitu terjadinya retensio plasenta, dan pada kala IV kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu kontraksi uterus yang kurang baik.

4. Pada Ny “F” diperlukan tindakan segera, kolaborasi atau rujukan apabila terjadi masalah dalam persalinan tersebut.
5. Rencana tindakan yang telah disusun pada Ny “F” bertujuan agar ibu mendapatkan penanganan yang bersih dan aman, sesuai dengan kondisinya dan mencegah terjadinya komplikasi serta mencegah terjadinya trauma berat pada ibudanbayinya.
6. Tindakan yang dilakukan bertujuan agar rencana yang disusun tercapai dengan adanya kerjasama antara bidan dengan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pasien.
7. Tindakan evaluasi pada Ny “F” dengan AsuhanPersalinan Normal telah diberikan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.
8. Pendokumentasian dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 s/d 17 Mei 2017 di Puskesmas Jumpandang Baru. Pengkajian dilakukan mulai dari pasien datang sampai proses persalinan dari Kala I-IV persalinan.

B. Saran

1. Bagi klien
 - a. Menganjurkan kepada ibu agar banyak beristirahat.
 - b. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya secara ondemand.
 - c. Menganjurkan ibu untuk selalu memperhatikan keadaan bayinya.
 - d. Menganjurkan kepada ibu untuk untuk mengomsumsi makanan dengan gizi seimbang.
 - e. Menganjurkan kepada ibu untuk mengomsumsi obat secara teratur sesuai instruksi yang diberikan.
 - f. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan organ genetaliaanya.
 - g. Menganjurkan ibu untuk berKB
2. Saran untukbidan
 - a. Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang professional sehingga dapat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian perinatal (AKP). Oleh karena itu bidan harus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, melalui program pendidikan, pelatihan-pelatihan, seminar agar menjadi bidan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEK
 - b. Bidan harus memberikan asuhan sesuai wewenang untuk itu manajemen kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang mendasari bagi bidan untuk memecahkan masalah klien dan berbagai kasus.

- c. Seorang bidan hendaknya menganggap bahwa semua ibu hamil mempunyai resiko untuk komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu dan janin, oleh karena itu bidan diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya tanda-tanda bahaya kehamilan dan menganjurkan ibu dan keluarga segera ke pelayanan kesehatan bila mengalami hal tersebut.
3. Saran untuk institusi kebidanan
 - a. Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang professional untuk menunjang pelaksanaan tugas.
 - b. Untuk pelayanan yang lebih berkualitas sesuai dengan kemajuan teknologi, sebaiknya bidan yang sudah bertugas diberi kesempatan untuk melanjutkan atau semacam pelatihan-pelatihan.
 - c. Demi mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan perlukiranya penyediaan fasilitas/ alat-alat yang memadai untuk penunjang pelaksanaan tugas-tugas kebidanan dan untuk meningkatkan keterampilan bidan.
- 

DAFTAR PUSTAKA

- Aat Agustini & Naura Rahma “*Hubungan Kompetensi Bidan Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Asuhan Persalinan Normal Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Lingung Kabupaten Majalengka Tahun 2012*“. *Jurnal Kampus Stikes YPIB Majalengka*. Vol. 2 no. 2 (Februari, 2014). <http://ejournal.stikesypib.ac.id/file.php?file=jurnal&id=532&cd.pdf> (Diakses tanggal 14 juni 2017).
- Asri, Dwi dan Cristine Clervo P. *Asuhan Persalinan Normal Plus Contoh Askeb dan Patologi Persalinan*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2012.
- Baety, Aprilia Nurul. *Kehamilan dan persalinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Depkes RI, 2015. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta. <http://www.depkes.go.id/resource/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2015.pdf>
- Dinas Kesehatan Sulawesi-Selatan, 2016.
- Eun-Young Choi, dkk. “*Primipara and Multipara Simulated a Normal Birth Experience for Content Analysis year 2015*”. *International Journal of Bio-Science and Bio-Technology*. Vol. 8, No.5. <http://www.sersc.org/Journals/IJBSBT/vol8 no5/21.pdf> (Diakses tanggal 17 juni 2017)
- Ilmiah, Widia Shofa. *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2015.
- Google Images .“*Gambar Mekanisme Persalinan Normal*”. https://images.google.com/mekanisme+persalinan+normal&oq=mekanisme+persalinan+normal&gs_l=img.3. (Diakses tanggal 17 juni 2017)
- Jannah, Nurul. *ASKEB II Persalinan Berbasis Kometensi*, Jakarta : ECG, 2017.
- Kuswanti, Ina dan Fitria Melina. *ASKEB II Persalinan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Kementrian agama RI: *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung : C.V Penerbit Diponegoro 2013

Kepmenkes RI “Standar Profesi Bidan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007“. http://ocw.usu.ac.id/course/download/1300000005-etika_profesi/def_121_slide_keputusan_menteri_kesehatan_republik_indonesia_nomor_369menkesskiii2007_tentang_standar_profesi_bidan_menteri_kesehatan_republik_indonesia.pdf. (Diakses tanggal 15 juni 2017)

Liliyana, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan*, Jakarta : ECG, 2012

Maru, Abdurrahman Suleiman, dkk “ *Exploring challenges in decreasing maternal mortality in Africa with respect to failure to achieve Millennium Development Goals (MDGs) year 2016* “. *Journal of Research in Nursing and Midwifery*. Vol. 5 no. 3 (September, 2016). <http://www.interestjournals.org/full-articles/exploring-challenges-in-decreasing-maternal-mortality-in-africa-with-respect-to-failure-to-achieve-millennium-development-goals-mdgs.pdf?view=inline>. (Diakses tanggal 18 juni 2017)

Manguji, Betty, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP*, Jakarta : ECG : 2014

Mufdillah, dkk. *Konsep Kebidanan Edisi Revisi*, Yogyakarta :NuhaMedika : 2012

Nursiah, Ai, dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014.

Pranoto, Ibnu, dkk. *Patologi Kebidanan*, Yogyakarta :Fitramaya, 2014

Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*, Jakarta : PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.

Purwandari Atik, dkk. “ *Studi Kasus Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny. D.N Dengan Persalinan Normal di Puskesmas Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado Tahun 2014* “. *Jurnal Ilmiah Bidan*. Vol 2 no. 1 (Januari – Juni 2014). <http://ejurnal.poltekkesmanado.ac.id/index.php/jib/article/view/219.pdf> (Diakses tanggal 17 juni 2017).

Purwoastuti, Th. Endang, dkk. *Konsep Kebidana*, Yogyakarta : PB, 2014

Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*, Makassar : Alauddin University Press, 2013.

Suyanti. "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Bidan dengan Pelaksanaan Asuhan Persalinan Normal (APN) di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2015". <http://ejournal.stikesypib.ac.id/file.php?file=jurnal&id=549&cd=0b2173ffad6adfb09c95001df6&name=Artikel%20Bu%20Yanti.pdf>. (Diakses tanggal 30 September 2017).

Shihab, M Quraish. Tafsir Al Mishbah, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Trisnawati, Frisca. *Asuhan Kebidanan Panduan Lengkap Menjadi Bidan Profesional*, Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2012.

WHO (*World Health Organization*) 2014. Angka kematian ibu, <http://www.who.int/healthinfo/statistics/programme/en/index.html>

Yeyeh, Ai, dkk. *Asuhan Kebidanan II Persalinan Edisi Revisi*, DKI Jakarta : CV. Trans Info Media, 2014.

Yulifah, Rita, dkk. *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*, Jakarta : SalembaMedika : 2014.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Sulfiani
- Nim : 70400114053
- Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 11 Agustus 1996
- Suku : Bugis
- Asal daerah : Pinrang
- Agama : Islam
- Alamat : Jl. Sultan Alauddin II, Lr III/II

2. Nama Orang Tua

- Ayah : Guntur
- Ibu : Rahma

B. Riwayat pendidikan

- Tamat SD : SD Negeri 62 Lanrisang tahun 2008
- Tamat SMP : SMP Negeri 1 Lanrisang tahun 2011
- Tamat SMA : SMA Negeri 10 Pinrang tahun 2014

Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan.