

**Representasi Graf Nauru dengan Menggunakan Matriks
Ketetanggaan dan Kesenarai Ketetanggaan**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)
Pada Jurusan Matematika Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Oleh

**Amrawati
NIM: 60600109002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Makassar, Februari 2014

Amrawati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada

Ayahanda tercinta Baharuddini yang mendidik dan mendorong kebijaksanaan

Ibunda tersayang suaebang yang tanpa lelah memberikan cahaya cinta tanpa batas

dan

kakak-kakakku Muh. Akbar dan Hamsina, adik-adikku Suryadi, Ricky dan (almh) Lisa yang selalu menjadi motifator dan penyemangat serta kemenakanku Dira, Dicky, Dita dan Naufal.

Serta

Sahabat-sahabatku nurfalaq dan martina, semua teman-temanku angkatan 09.

Almamaterku UIN Alauddin Makassar

May All Being Be Happy

Semoga semua makhluk berbahagia

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah Swt. karena atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul "*Representasi Graf Nauru dengan menggunakan Matriks ketetanggaan dan kesenarai Ketetanggaan*" dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam yang tak pernah terlupakan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Kedua Orang tuaku tercinta, ayahanda Baharuddini dan Ibunda Suaebang atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan serta dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan beliau. Amin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HA. Qadir Gassing HT.MS., Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. Muhammad Halifah Mustami M.Pd., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu Ermawati S.Pd., M.Si, dan Ibu Wahyuni Abidin S.Pd., M.Pd Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Wahyuni Abidin S.Pd., M.Pd dan Ibu Try Azizah Nurman S.Pd., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa sabar, mengerti dan memahami serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah bersedia membagikan dan menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
6. Untuk kakak-kakakku tercinta Muh. Akbar dan Hamsina, adik-adikku tersayang Suryadi, Ricky dan (almh) lisa serta keponakan-keponakanku Dira, Dicky, Dita dan Naufal terima kasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, dan dukungan yang berlimpah yang selalu diberikan selama saya menempuh pendidikan.
7. Kepada sahabat-sahabatku Nurfalaq dan Martina serta teman-teman angkatan FA 09 yang telah memberi semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Buat adik-adik junior angkatan 2010, 2011 dan 2012, terutama untuk beberapa orang yang telah meluangkan waktunya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril, materiil maupun spiritual bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis berdoa semoga bantuan dan sumbangsih yang telah diberikan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Swt. dan mendapatkan balasan yang setimpal. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, Februari 2014

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Batasan Masalah.....	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Teori Graf.....	10
B. Derajat.....	15
C. Lintasan.....	18
D. Sirkuit.....	19
E. Graf Khusus	20
F. Graf Nauru	25
G. Keterhubungan	27
H. Sifat-Sifat Graf	29
I. Matriks Ketetangaan Dan Kesenarai Ketetangaan.....	43
J. Matlab	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	48
a) Menggambar Graf Nauru	48
b) Mencari Matriks Dan Senarai Ketetanggaannya	
B. Pembahasan.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66


DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN (HASIL VALIDASI)

A. Program.....	68
B. Output.....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Masalah jembatan konigsberg	3
Gambar 1.2 Ilustrasi jembatan konigsberg	4
Gambar 1.3 Penyelesaian jembatan konigsberg	4
Gambar 2.1 Graf H_1	13
Gambar 2.2 Pseudograf	14
Gambar 2.3 Multigraf G_2	14
Gambar 2.4 Derajat	15
Gambar 2.5 Graf	17
Gambar 2.6 Lintasan	19
Gambar 2.7 Sirkuit	19
Gambar 2.8 Graf Teratur	20
Gambar 2.9 Graf Lengkap	21
Gambar 2.10 Graf Bipartit dan Partisinya	22
Gambar 2.11 Graf Bipartit Lengkap	23
Gambar 2.12 Graf Kubik	24
Gambar 2.13 Graf Nauru	25
Gambar 2.14 Graf G	28
Gambar 2.15 Graf G	29
Gambar 2.16 Graf	30
Gambar 2.17 Lintasan Eulerian	31
Gambar 2.18 Graf	32
Gambar 2.19 Graf G dan G'	33
Gambar 2.20 Graf Isomorfik	34
Gambar 2.21 Graf G_1 dan G_2	36
Gambar 2.22 K_4 Graf Planar	37
Gambar 2.23 K_5 bukan Graf Planar	37
Gambar 2.24 Graf Planar dan Graf Bidang	37

Gambar 2.25 Graf G_1 , G_2 , dan G_3	42
Gambar 2.26 Graf G_1 dan G_2	44
Gambar 2.27 Graf dengan Senarai Ketetanggaan.....	45
Gambar 4.1 Graf Nauru	49
Gambar 4.2 Graf Nauru G_1	49
Gambar 4.3 Graf Nauru G_2	53
Gambar 4.4 Graf Nauru G_3	57
Gambar 4.5 Graf Nauru G_4	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Amrawati

Nim : 60600109002

Judul : Representasi Graf Nauru dengan Menggunakan Matriks Ketetangaan dan Senarai Ketetangaan

Graf adalah himpunan tidak kosong yang terdiri dari elemen-elemen yang disebut titik (*vertex*) dan titik-titik tersebut dihubungkan oleh sisi (*edge*). Himpunan titik dari graf G dinotasikan dengan (V) dan himpunan sisi dari graf dinotasikan dengan (E) . Yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sifat-sifat yang berkaitan pada graf Nauru dimana graf ini merupakan suatu graf kubik yang memiliki 24 titik dan 36 sisi. Skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan representasi graf Nauru dengan menggunakan matriks ketetangaan dan senarai ketetangaan. Pada penelitian ini yang digunakan adalah kajian pustaka yaitu dengan mengumpulkan informasi dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diperoleh dalam penelitian. Dalam matriks graf Nauru dapat disimpulkan bahwa setiap kolom dan baris yang ada pada graf Nauru memiliki tiga yang bernilai 1 dan selebihnya bernilai 0 sehingga apabila ada matriks yang memiliki jumlah titik yang sama namun jumlah yang bernilai 1 di dalam setiap kolom dan baris itu lebih atau kurang dari 3 maka itu bukan merupakan graf Nauru begitupun dengan tabel senarai ketetangaan pada graf yaitu titik yang bertetangga pada tabel ada tiga sehingga apabila kurang atau lebih dari tiga maka itu bukan tabel senarai ketetangaan graf Nauru.

Kata kunci : *Graf, Graf Nauru, Matriks Ketetangaan, Senarai Ketetangaan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam semesta yang amat luas adalah ciptaan Allah Swt dan Al-Qur'an mengajak manusia untuk menyelidikinya, mengungkap keajaiban dan kegaibannya serta berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah ruah untuk kesejahteraan hidupnya. Inilah yang sesungguhnya dilakukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu mengadakan observasi lalu menarik hukum-hukum alam berdasarkan observasi dan eksperimen. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat berusaha menjelaskan firman-firman Yang Maha Pencipta baik yang bersifat kauniyah maupun kauliyah melalui observasi yang teliti dan tepat terhadap hukum-hukum yang mengatur gejala alam.

Diantara ilmu pengetahuan modern yang menjelaskan keajaiban Al-Qur'an salah satunya adalah ilmu pengetahuan matematika. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu

mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu Telah kami terangkan dengan jelas.”¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat banyak kebesaran dan keagungan Allah Swt dan kepada tanda-tanda kekuasaan-Nya nampak nyata yaitu matahari dan bulan serta peranannya dalam menghitung tahun dan menetapkan waktu. Alam semesta memuat bentuk-bentuk dan konsep matematika, meskipun alam semesta tercipta sebelum matematika itu ada. Alam semesta serta segala isinya diciptakan Allah Swt dengan ukuran-ukuran yang cermat dan teliti, dengan perhitungan-perhitungan yang mapan dan dengan rumus-rumus serta persamaan yang setimbang dan rapi. Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-Qamar ayat 49 berikut:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”²

Seandainya Allah Swt menciptakan segala sesuatu tanpa ukuran, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam alam ini. Ukuran yang diciptakan oleh Allah Swt sangat tepat sehingga alam seperti yang telah dirasakan ini benar-benar seimbang.

Matematika termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang banyak dikaji dan diterapkan pada berbagai bidang. Matematika banyak membantu dan mempermudah dalam penyelesaian permasalahan pada kajian ilmu-ilmu lain.


¹Departemen Agama RI. *Al Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Perwakilan bagian percetakan dan penerbitan Kementerian Agama). h. 226

²Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 424

Oleh sebab itu, matematika menduduki posisi yang cukup penting dalam ilmu pengetahuan.

Teori graf merupakan salah satu cabang matematika yang masih menarik untuk dibahas karena teori-teorinya masih aplikatif sampai saat ini dan dapat diterapkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengkaji dan menganalisis model atau rumusan, teori graf dapat diperlihatkan peranan dan kegunaannya dalam memecahkan berbagai masalah. Permasalahan yang dirumuskan dengan teori graf dibuat sederhana, yaitu diambil aspek-aspek yang diperlukan dan dibuang aspek-aspek lainnya.³


Makalah pertama tentang teori graph ditulis pada tahun 1736 oleh seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonard Euler. Ia menggunakan teori graf untuk menyelesaikan masalah jembatan Königsberg (sekarang, bernama Kaliningrad). Berikut adalah ilustrasi masalah tersebut :



Gambar 1.1. Masalah Jembatan Königsberg


³ Purwanto. *Matematika Diskrit* (Malang: IKIP Malang, 1998), h. 1.

Masalah yang dikemukakan Euler : Dapatkah melewati setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Berikut adalah sketsa yang mempresentasikan ilustrasi jembatan Königsberg yang ada pada gambar 1.1, himpunan titik yaitu $\{A, B, C, D\}$ merepresentasikan sebagai daratan, dan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut adalah sebagai jembatan.



Gambar 1.2 Ilustrasi jembatan Königsberg

Jawaban pertanyaan Euler adalah tidak mungkin. Agar bisa melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula maka jumlah derajat jembatan yang menghubungkan setiap daratan harus genap. Graf dari masalah jembatan Königsberg dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :



Gambar 2.3 Penyelesaian Jembatan Königsberg

Misalkan graf tersebut adalah $G(V, E)$ dengan :

$$V = \{ A, B, C, D \}$$

$$E = \{ (A, C), (A, C), (A, B), (A, B), (B, D), (A, D), (C, D) \}$$

$$= \{ e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7 \}$$

Pada graf tersebut sisi $e_1 = (A, C)$ dan sisi $e_2 = (A, C)$ dinamakan **sisi-ganda** (*multiple edges* atau *parallel edges*) karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah titik yang sama, yaitu titik A dan titik C. Begitu pun dengan sisi e_3 dan sisi e_4 . Sementara itu, pada graf di atas, tidak terdapat **gelang** (*loop*), yaitu sisi yang berawal dan berakhir pada titik yang sama.⁴

Salah satu firman Allah Swt yang membahas tentang teori graf adalah Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 1:

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖٓ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Terjemahnya:

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵

⁴ Deasy Ramadian Sari. *Aplikasi Representasi Graf*. (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2000), h. 3.

⁵Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 225

Suatu graf adalah himpunan tidak kosong yang terdiri dari elemen-elemen yang disebut titik (*vertex*) dan titik-titik tersebut dihubungkan oleh garis (*edge*). Himpunan titik dari graf G dinotasikan dengan (V) dan himpunan garis dari graf dinotasikan dengan (E).

Perjalanan Nabi Saw dari Mekkah menuju Sidrotul Muntaha ditemukan banyak tempat. Dalam teori graf, tempat yang didatangi Nabi Saw. dilambangkan sebagai titik (*vertex*) dan lintasan yang dilalui Nabi Saw. dalam perjalanan merupakan sisi (*edge*). Dapat kita katakan kisah *isra' mi'raj* Nabi Saw. terdapat himpunan titik dan sisi adalah graf . Dalam kisah *isra' Mi'raj* ini merupakan representasi sederhana dari graf siklus. Karena Nabi Saw. berangkat dari titik pertama (v_1) ke titik terakhir (v_n) di Sidrotul Muntaha, beliau kembali lagi ke titik pertama (v_1).

Pemakaian teori graf telah banyak dirasakan dalam berbagai ilmu, antara lain: optimisasi jaringan, ekonomi, psikologi, genetika, riset operasi (*OR*), dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya peradaban kehidupan manusia graf telah marak dikembangkan melalui riset-riset pada tahun 1960-an. Banyak sekali kegunaan graf dalam aplikasi pada kehidupan manusia. Pada umumnya graf digunakan untuk memodelkan suatu masalah yang direpresentasikan oleh titik dan garis agar menjadi lebih mudah dalam menganalisis dan pengambilan kesimpulan dari masalah yang bersangkutan. Misalnya, pada penggambaran jaringan koperasi, ilmu komputer, riset operasi, rangkaian listrik, senyawa kimia, algoritma, peta dan

lain-lain. Bahkan masalah penjadwalan pesawat terbang, terminal, stasiun, perjalanan dan sebagainya juga menggunakan prinsip graf.⁶

Meskipun teori graf merupakan pokok bahasan yang telah berusia tua namun masih diterapkan di banyak bidang sampai saat ini. Berbagai jenis graf beserta istilah-istilah dasarnya sering digunakan dalam pembahasan mengenai graf. Salah satu terminologi dasar dalam graf yang dikenal adalah graf Nauru (*Nauru graph*) dan graf ini sudah lama ditemukan yaitu sekitar tahun 1950-an tetapi berhasil diberi nama pada tahun 2007 dengan alasan bahwa graf ini mirip dengan bendera Republik Nauru. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Representasi Graf Nauru dengan Menggunakan Matriks Ketetanggaan dan Kesenarai Ketetanggaan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menyelesaikan representasi graf Nauru dengan menggunakan matriks ketetanggaan dan kesenarai ketetanggaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah menyelesaikan representasi graf Nauru dengan menggunakan matriks ketetanggaan dan kesenarai ketetanggaan.

⁶I Ketut Budayasa, *Teori Graph dan Aplikasinya* (Surabaya: Unesa University Press, 2007)

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan tugas akhir tentang representasi graf Nauru dengan matriks ketetanggaan dan kesenarai ketetanggaan adalah sebagai berikut :

a) Bagi Penulis

Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai sarana pengaplikasian untuk lebih mengetahui tentang graf Nauru dan juga Sebagai dasar penelitian selanjutnya.

b) Bagi Universitas Islam negeri (UIN) Alauddin Makassar

Tugas akhir ini akan menambah perbendaharaan skripsi perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan dapat di manfaatkan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan umum.

c) Bagi Pembaca

Manfaat yang dapat diperoleh bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan tentang graf Nauru dengan matriks ketetanggaan dan kesenarai ketetanggaan.

E. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tugas akhir ini tidak meluas, maka penulis membatasi objek kajian hanya pada teori graf, graf Nauru, matriks ketetanggaan dan kesenarai ketetanggaan. Dimana graf Nauru yang akan dikaji adalah graf Nauru berdasarkan bab II.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal tugas terakhir, bagian isi tugas akhir dan akhir tugas akhir.

1. Bagian awal tugas akhir

Bagian awal tugas akhir terdiri halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian isi tugas akhir

Bagian isi tugas akhir terbagi menjadi lima bab, yaitu:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam tinjauan pustaka akan dibahas teori graph, definisi tentang graf Nauru, matriks ketetanggaan dan kesenarai ketetanggaan.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini dikemukakan metode kegiatan yang berisi langkah-langkah yang ditempuh untuk memecahkan masalah, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, dan prosedur penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang representasi graf Nauru dengan menggunakan matriks ketetanggaan dan kesenarai ketetanggaan.

e. Bab V Penutup

Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian akhir tugas akhir

Bagian akhir tugas akhir berisi daftar pustaka sebagai acuan dan lampiran-lampiran yang mendukung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Teori Graf

Definisi 2.1

Graf merupakan struktur diskrit yang terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan sejumlah berhingga obyek yang disebut titik (*vertices*, *vertex*) dan himpunan sisi (*edges*) yang menghubungkan titik-titik tersebut.¹ Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf adalah pasangan $(V(G), E(G))$ dengan $V(G)$ himpunan tidak kosong dan berhingga dari objek-objek yang disebut titik, dan $E(G)$ himpunan (mungkin kosong) pasangan tak berurutan dari titik-titik berbeda di $V(G)$ yang disebut sisi.²

Graf adalah diagram yang terdiri dari noktah-noktah yang disebut titik dan dihubungkan oleh garis-garis yang disebut sisi, serta setiap sisi menghubungkan tepat dua titik.

Notasi sebuah graf adalah $G = (V, E)$, dimana :

- a. V merupakan himpunan tak kosong dari titik-titik (*vertices*), misalkan $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.
- b. E merupakan himpunan sisi-sisi (*edges*) yang menghubungkan sepasang titik, misalkan $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

¹Shofiyatul, Hasanah. *Aplikasi pewarnaan graf Terhadap penjadwalan kuliah Di jurusan matematika uin Malang*. (Malang: UIN Malang 2007), h. 9.

²Abdusakir, Nilna Niswatin Azizah dkk. *Teori graf*. (Malang: UIN Malang 2009), h. 4.

Notasi untuk himpunan titik-titik (V) dan sisi-sisi (E) pada suatu graf mengikuti nama graf. Misalkan graf K_5 , terdiri dari himpunan titik-titik ditulis $V(K_5)$ dan himpunan garis-garisnya ditulis $E(K_5)$.³

Sebuah graf terarah atau digraf G terdiri dari suatu himpunan V dari titik-titik (*verteks-verteks*) dan suatu himpunan E dari sisi-sisi yang sedemikian rupa sehingga setiap sisi $e \in E$ menghubungkan pasangan titik terurut. Jika terdapat sebuah sisi tunggal e yang menghubungkan pasangan terurut (v, w) dari titik-titik, kita tuliskan $e = (v, w)$, yang menyatakan sebuah sisi dari v ke w . sebuah sisi e dalam sebuah graf (tak terarah atau terarah) yang menghubungkan pasangan titik v dan w dikatakan *insiden* pada v dan w , serta v dan w dikatakan insiden pada e dan disebut titik-titik damping (*adjacent vertices*).⁴

Misal u dan v adalah titik-titik G dan sisi $e = (u, v)$ adalah sisi dari G . Kita katakan bahwa sisi e menghubungkan titik (u, v) . Titik u dan titik v berhubungan langsung di G . Sebuah graf G dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram dimana setiap titik G digambarkan dengan sebuah noktah dan setiap sisi yang menghubungkan dua titik di G digambarkan dengan sebuah kurva sederhana (ruas garis) dengan titik-titik akhir di kedua titik tersebut.

Sisi-sisi $E(G)$ tidaklah harus disajikan dalam bentuk garis lurus. Dalam dua titik yang sama pada suatu graf dapat dihubungkan oleh sisi lebih dari satu. Sisi-sisi tersebut didefinisikan melalui definisi berikut.

³Willy Yandi Wijaya. *Graf Petersen Dan Sifat-Sifat Yang Berkaitan*
<http://www.google.com/graf-petersen-dan-sifat-sifat-yang-berkaitan-oleh-willy-yandi-wijaya.pdf>
 (24 juni 2013)


⁴Richard Johnsonbaugh. *Matematika Diskrit jilid 2* (Jakarta : PT Prenhallindo Jakarta, 2002), h. 3.

Definisi 2.2

Dua atau lebih sisi yang menghubungkan dua titik yang sama disebut sisi-sisi paralel (*multiple edges*). Sisi yang menghubungkan titik dengan dirinya sendiri disebut gelung (*loop*). Sebuah graf yang tidak memiliki sisi-sisi paralel atau gelung disebut graf sederhana (*simple graph*).

Contoh 2.1

Diberikan graf $H_1 = (VH_1, EH_1) = (\{v_1, v_2, v_3\}, \{e_1, e_2, e_3, e_4\})$ dengan $EH_1 = \{e_1, e_2, e_3, e_4\} = \{v_1v_2, v_1v_3, v_2v_3, v_2v_3\}$, sehingga graf H_1 bukan graf sederhana karena memiliki sisi-sisi paralel yaitu sisi e_3 dan e_4 . Graf H_1 tidak mempunyai gelung. Graf H_1 dapat disajikan seperti pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Graf H_1

Pada suatu graf mungkin terdapat sisi-sisi paralel atau gelung seperti definisi berikut ini:


Definisi 2.3

Sebuah graf yang mempunyai sisi-sisi paralel dan gelung disebut pseudograf (*pseudograph*).

Graf seperti yang ditunjukkan Gambar 2.1 merupakan suatu multigraf sedangkan suatu pseudograf akan diberikan melalui contoh 2.2 berikut:

Contoh 2.2

$$\begin{aligned} \text{Graf } G_1 = (VG, EG) &= (\{v_1, v_2, v_3\}, \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}) \\ &= (\{v_1, v_2, v_3\}, \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_1, v_2v_3, v_1v_1\}) \end{aligned}$$




Gambar 2.2 pseudograf

Gambar 2.2 merupakan salah satu bentuk gambar yang dapat disajikan dari hubungan titik dan sisi graf G_1 . Graf tersebut adalah pseudograf karena memiliki sisi-sisi parallel yang menghubungkan v_1 dan v_3 yaitu e_2 dan e_4 , serta mempunyai gelung e_5 .

Contoh 2.3

Diberikan suatu graf G_2 seperti pada Gambar 2.3

Gambar 2.3 multigraf G_2

Graf G_2 pada gambar 2.3 merupakan multigraf karena mempunyai sisi-sisi parallel namun bukan suatu pseudograf karena tidak mempunyai gelung. Titik v_1 pada

graf tersebut di bedakan dengan v_2 , tetapi tidak berdekatan dengan v_3 maupun v_4 .


Sisi e_2 insiden dengan titik v_2 dan v_3 .⁵

B. Derajat (*Degree*)

Definisi 2.4

Derajat sebuah titik adalah banyaknya sisi yang terjadi pada titik tersebut. Titik ganjil adalah titik yang derajatnya ganjil. Titik genap adalah titik yang berderajat genap.⁶

Contoh 2.4



Gambar 2.4 Derajat

Dari contoh graf yang diberikan pada gambar 2.4, dapat dituliskan derajat masing-masing titiknya adalah sebagai berikut :

$$der_G a = 3, der_G b = 2, der_G c = 3, der_G d = 2$$

⁵Willy Yandi Wijaya. *Op. cit.*, h. 6.

⁶Samuel Wibisono. *Matematika Diskrit Edisi Pertama*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004). h. 127.

Teorema 2.1

Jumlah derajat titik-titik dari sebuah graf adalah sama dengan dua kali jumlah sisi.

Bukti:

Misalkan sebuah graf G memiliki n buah titik v_1, v_2, \dots, v_n dan k buah sisi e_1, e_2, \dots, e_k . Ambil sembarang sisi e_1 dan misalkan sisi e_1 ini yang menghubungkan titik v_1 dengan v_2 , maka e_1 memberikan kontribusi masing-masing 1 dalam derajat v_1 dan derajat v_2 sehingga e_1 memberikan kontribusi 2 dalam derajat total. Oleh karena e_1 dipilih sembarang berarti semua sisi dalam G memberikan kontribusi 2 dalam penghitungan derajat total atau bisa juga dikatakan derajat total $G = 2$ kali jumlah sisi dalam G , jadi terbukti.

Teorema di atas juga berlaku untuk suatu multigraf karena gelang didefinisikan mempunyai derajat dua dan dikenal sebagai lemma persalaman.

Teorema 2.2

Banyaknya titik dari suatu graf G yang berderajat ganjil adalah berjumlah genap.

Bukti:

Titik-titik pada graf dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok titik-titik yang berderajat genap x_1, x_2, \dots, x_m dan titik-titik yang berderajat ganjil y_1, y_2, \dots, y_n . Dimisalkan bahwa:

$$d_x = \text{deg } x_1 + \text{deg } x_2 + \dots + \text{deg } x_m$$

$$d_y = \text{deg } y_1 + \text{deg } y_2 + \dots + \text{deg } y_n$$

misalkan E adalah jumlah derajat semua titik yang berderajat genap, O adalah jumlah derajat semua titik yang berderajat ganjil dan T adalah derajat total graf G .

Jika $O = d(e_1) + d(e_2) + \dots + d(e_{k_1})$.

dan $E = d(e_{k+1}) + d(e_{k+2}) + \dots + d(e_k)$,

maka $T = E + O$


menurut teorema 2.1 maka T adalah bilangan genap, oleh karena $d(e_{k+1}) + d(e_{k+2}) + \dots + d(e_k)$ masing-masing berderajat genap, maka $E = d(e_{k+1}) + d(e_{k+2}) + \dots + d(e_k)$ juga merupakan bilangan genap.

Dari relasi $T = E + O$ berarti $O = T - E$. oleh karena baik T maupun E merupakan bilangan-bilangan genap, maka $O = d(e_1) + d(e_2) + \dots + d(e_{k_1})$ juga merupakan bilangan genap. Padahal menurut asumsi $d(e_1) + d(e_2) + \dots + d(e_{k_1})$ masing-masing adalah bilangan ganjil. Jadi O (bilangan genap) merupakan jumlahan dari k_1 buah bilangan ganjil. Hal itu hanya bisa terjadi bila k_1 adalah bilangan genap.

Jadi terbukti .

Contoh 2.5

Perhatikan graf berikut :



Gambar 2.5 graf

pada gambar 2.5:

$$d(P) = d(Q) = d(S) = 5, \text{ sedangkan } d(R) = 3.$$

Jumlah derajat semua titik pada suatu graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut. Jika $G = (V, E)$ merupakan suatu graf, maka dapat ditulis:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2 \cdot |E|$$

Perhatikan graf pada contoh 2.5 dimana Jumlah sisi pada graf tersebut adalah 9, sehingga jumlah derajat pada graf tersebut adalah :

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2 \cdot |E|$$

$$= 2 \cdot 9$$

$$= 18$$

Atau

$$\sum_{v \in V} d(v) = d(P) + d(Q) + d(R) + d(S)$$


$$= 5 + 5 + 5 + 3$$

$$= 18$$

Dengan demikian, jika menggambar sebuah graf dengan derajat masing-masing titik diketahui dan ternyata jumlah derajat seluruh titik tersebut adalah ganjil maka hal itu tidak mungkin.

C. Lintasan (*path*)

Lintasan yang panjangnya n dari sisi awal v_0 ke titik tujuan v_n di dalam graf G ialah barisan berselang-seling titik-titik dan sisi-sisi yang berbentuk $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ sedemikian sehingga $e_1 = (v_0, v_1), e_2 = (v_1, v_2), \dots, e_n = (v_{n-1}, v_n)$ adalah sisi-sisi dari graf G . Sebuah lintasan dikatakan lintasan sederhana (*simple path*) jika semua titiknya berbeda atau setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Lintasan yang berawal dan berakhir pada titik yang sama disebut lintasan tertutup (*closed path*) sedangkan lintasan yang memiliki titik awal dan titik akhir yang berbeda disebut lintasan terbuka (*open path*).




Gambar 2.6 lintasan

Pada gambar 2.6 lintasan v_1, v_2, v_4, v_3 merupakan lintasan sederhana yang juga lintasan terbuka. Lintasan v_1, v_2, v_4, v_3, v_1 merupakan lintasan sederhana yang juga lintasan tertutup. Sedangkan lintasan v_2, v_4, v_3, v_1, v_4 bukan merupakan lintasan sederhana, tetapi lintasan terbuka.

D. Sirkuit (*Circuit*)

Dalam satu graf terdapat suatu sirkuit apabila terdapat lintasan (*path*) yang mempunyai titik awal dan titik akhir sama .



Gambar 2.7 Sirkuit $v_1-v_2-v_3-v_1$

Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana (*simple circuit*) jika sirkuit tersebut tidak memuat/melewati sisi yang sama dua kali (setiap sisi yang dilalui hanya satu kali). Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit dasar (*elementary circuit*) jika sirkuit tersebut tidak memuat/melewati titik yang sama dua kali (setiap titik yang dilalui hanya satu kali, titik awal dan akhir boleh sama).


E. Graf Khusus

Ada banyak jenis-jenis graf yang berbeda. Pada bagian ini akan dibahas beberapa graf khusus antara lain graf teratur, graf lengkap, graf bipartit, graf biparti lengkap, graf kubik dan graf Petersen.

a) Graf teratur

Suatu graf dikatakan graf teratur (*regular graph*) apabila setiap titik pada graf mempunyai derajat yang sama. Secara khusus, apabila setiap titik pada suatu graf mempunyai derajat r , maka graf dikatakan teratur- r .

Contoh 2.6: Beberapa contoh graf teratur terlihat melalui Gambar 2.6




Gambar 2.8 graf teratur

Gambar 2.8 merupakan contoh dari graf teratur yaitu: $r = 0$ masing-masing titiknya memiliki derajat 0, $r = 1$ masing-masing titiknya memiliki derajat 1, $r = 2$ masing-masing titiknya memiliki derajat 2 begitupun dengan $r = 3$ masing-masing titiknya memiliki derajat 3.

b) Graf lengkap

Sebuah graf G adalah lengkap jika setiap titik terhubung ke setiap titik yang lain dengan tepat oleh satu garis. Graf lengkap dengan n verteks dinyatakan dengan K_n dengan n menunjukkan jumlah titik pada graf.

Contoh 2.7: Di bawah ini adalah gambar graf k_5 dan k_8



Gambar 2.9 graf lengkap

Teorema 2.3:

Graf lengkap k_n mempunyai ukuran $\frac{n(n-1)}{2}$.

Bukti:

Misalkan ukuran k_n adalah m . diketahui bahwa derajat setiap titiknya adalah $n-1$ dan terdapat n titik. Berdasarkan lemma persalaman (teorema 2.1), maka jumlah derajatnya yaitu $n(n-1) = 2m$. Akibatnya $m = \frac{n(n-1)}{2}$. Jadi, dengan


kata lain banyaknya garis atau ukuran graf lengkap k_n adalah $\frac{n(n-1)}{2}$.

c) Graf Bipartit

Sebuah graf G dikatakan bipartisi jika VG nya dapat dipartisi ke dalam dua himpunan bagian (tidak kosong) V_1 dan V_2 sedemikian sehingga setiap sisi dari G menghubungkan sebuah titik dari V_1 ke sebuah titik dari V_2 .

Contoh 2.8

Graf yang diberikan seperti pada Gambar 2.7(a) merupakan contoh graf bipartit karena dapat digambar ulang menjadi seperti Gambar 2.7(b) yang dapat dipartisi menjadi dua himpunan bagian, $V_1 = \{v_1, v_6\}$ dan $V_2 = \{v_2, v_3, v_4, v_5\}$.



Gambar 2.10 (a) graf bipartit dan (b) partisi graf bipartit


d) Graf bipartit lengkap

Graf bipartit lengkap (*complete bipartite graph*) dinotasikan dengan $K_{m,n}$ adalah graf bipartit dengan m adalah banyaknya titik pada V_1 dan n adalah banyaknya titik pada V_2 .

Contoh 2.9

Graf seperti yang digambarkan pada Gambar 2.10 merupakan graf bipartit lengkap.





Gambar 2.11 Graf bipartit lengkap

Teorema 2.4

Graf bipartit lengkap $K_{m,n}$ mempunyai ukuran mn .

Bukti:

Misalkan ukuran graf $K_{m,n}$ adalah p . Diketahui bahwa derajat setiap titiknya di V_1 adalah m , dan derajat setiap titiknya di V_2 adalah n . Sehingga jumlah derajat m titik di V_1 adalah mn , dan jumlah derajat n titik di V_2 adalah mn . Oleh karena itu jumlah derajat seluruh titiknya adalah $2mn$. Menurut Lemma Persalaman (Teorema 2.1), jumlah derajat suatu graf sama dengan dua kali jumlah titiknya, berarti $2mn = 2p$. Jadi, didapat $p = mn$.⁷


e) Graf Kubik

Graf kubik (*cubic graph*) adalah graf teratur yang berderajat tiga atau graf teratur-3.

Contoh 2.10

Graf kubik dengan empat titik dan delapan titik terlihat pada Gambar 2.12

⁷Seymour Lipschutz dan Marc Lars Lipson. *Seri Penyelesaian Soal Schaum: Matematika Diskrit 2* (Jakarta: Salemba Teknika, 2002), h.29



Gambar 2.12 Graf kubik

Teorema 2.5


Setiap graf kubik mempunyai titik genap.

Bukti:

Diketahui bahwa setiap graf kubik mempunyai derajat tiga (ganjil). Menurut Lemma Persalaman (Teorema 2.1), jumlah derajat seluruh titiknya haruslah berjumlah genap, sehingga jumlah titik yang mungkin hanyalah genap.

F. Graf Nauru

Dalam bidang matematika teori graf, graf Nauru adalah graf kubik bipartit simetris dengan 24 titik dan 36 sisi. Karena kurangnya nama yang lebih baik maka David Eppstein menyebutnya sebagai graf Nauru, karena Nauru memiliki 12 titik bintang dan sangat menyerupai salah satu bentuk standar dari graf ini. Berikut adalah beberapa gambar dari graf Nauru :



Gambar 2.13 Graf Nauru

Graf Nauru adalah graf Cayley dari grup simetris permutasi pada empat elemen. Generator sebagai graf Cayley adalah tiga cara yang berbeda untuk menukar elemen pertama dengan salah satu dari tiga bentuk. Artinya, seseorang dapat membentuk graf ini dengan membuat satu titik per permutasi, dan menghubungkan setiap titik ke tiga permutasi terbentuk dengan transposisi jenis ini. Secara umum graf Cayley dibentuk oleh transposisi dari elemen pertama, untuk kelompok simetris perintah yang berbeda, membentuk sesuatu yang baru dalam teknik listrik sebagai jaringan interkoneksi yang

mungkin untuk komputer paralel, dan disebut graf bintang. Pegg menyarankan cara yang setara dengan melihat graf Nauru: bentuk titik diberi label oleh Triple dipesan dari elemen yang berbeda dari $\{1,2,3,4\}$, dan menghubungkan dua tiga kali lipat tersebut oleh tepi setiap kali mereka berbeda dalam satu posisi.⁸

Seperti dengan semua graf Petersen umum, graf Nauru dapat diwakili oleh titik-titik dalam bidang sedemikian rupa bahwa titik yang berdekatan di unit terpisah jarak; yaitu graf satuan jarak. Graf dan prisma adalah satu-satunya bentuk umum dari graf Petersen $G(n,p)$ yang tidak dapat begitu direpresentasikan.⁹

Orang pertama yang menulis tentang graf Nauru adalah RM Foster dalam upaya untuk mengumpulkan semua graf simetris kubik. Seluruh daftar graf simetris kubik kini dinamai menurut namanya sebagai Foster Sensus dan di dalam daftar ini graf Nauru diberi nomor sebagai graf F24A tetapi tidak memiliki nama khusus. Pada tahun 1950, HSM Coxeter dikutip graf kedua kalinya, memberikan representasi Hamiltonian digunakan untuk menggambarkan artikel ini dan menggambarkannya sebagai Levi graf konfigurasi proyektif ditemukan oleh Zacharias In 2003, Ed Pegg menulis dalam kolom MAA online-nya bahwa F24A layak nama tetapi tidak mengusulkan satu. Akhirnya, pada tahun 2007, David Eppstein menggunakan nama graf Nauru karena bendera Republik Nauru memiliki bintang 12 titik

⁸Pegg, E. T.; Exoo, G. (2009), "Crossing number graphs", *Mathematica Journal* **11**

⁹Arjana Zitnik, Boris Horvat and Tomaz Pisanski (2010), *All generalized Petersen graphs are unit-distance graphs*, IMFM preprints **1109**.

yang serupa dengan salah satu yang muncul dalam pembangunan graf sebagai Petersen graf umum.¹⁰

G. Keterhubungan

Misalkan G adalah graf sedangkan u dan v adalah titik di G (yang tidak harus berbeda). Jalan $u-v$ pada graf G adalah barisan berhingga yang berselang seling

$$W: u = v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_n, v_n = v$$

antara titik dan sisi, yang dimulai dari titik dan diakhiri dengan titik, dengan

$$e_i = v_{i-1}v_i \quad i=1,2,3,\dots, n$$

adalah sisi di G . v_0 disebut titik awal, v_n disebut titik akhir, titik v_1, v_2, \dots, v_{n-1} disebut titik internal dan n menyatakan panjang dari W . Jika $v_0 \neq v_n$, maka W disebut *jalan terbuka*. Jika $v_0 = v_n$, maka W disebut *jalan tertutup*. Jalan yang tidak mempunyai sisi disebut *jalan trivial*.

Karena dalam graph dua titik hanya akan dihubungkan oleh tetap satu sisi, maka jalan $u-v$


$$W: u = v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_n, v_n = v$$

Dapat ditulis menjadi

$$W: u = v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_n = v.$$

¹⁰Eppstein. *The many faces of the Nauru graph*. On Live Journal, 2007.

Perhatikan graf G berikut:



Gambar 2.14 graf G

Maka

$$W_1 = a, b, c, a, e, d, a, d, b$$

Dan

$$W_2 = d, a, b, c, b, c, a, d$$

Adalah jalan di G . W_1 adalah jalan tertutup dan W_2 adalah jalan terbuka.

W_1 mempunyai panjang 8 dan W_2 mempunyai panjang 7.

$$W_3 = a, b, c, d, e, a$$


Bukan jalan di G karena sisi cd tidak ada di G . Demikian juga

$$W_4 = a, b, e, c, a$$

Bukan jalan di G karena be bukan sisi di G .

Jalan W yang semua sisinya berbeda disebut trail.

Perhatikan Graf G berikut:



Gambar : 2.15 graf G

Maka

$$W_1 = f, c, a, e, b, d, e, c, d, f$$

adalah jalan tertutup dan merupakan trail karena semua sisinya berbeda atau tidak ada sisi yang dilalui lebih dari satu kali.

$$W_2 = a, c, e, b, d, a, c, d, f$$

Adalah jalan terbuka, dan bukan trail karena sisi ac dilalui lebih dari satu kali, atau dengan kata lain ada sisi yang sama pada jalan W_2 .

Jalan terbuka yang semua titiknya berbeda disebut *lintasan*. Dengan demikian setiap lintasan pasti merupakan trail, tetapi tidak semua trail merupakan lintasan.

H. Sifat-Sifat Graf

a. Lintasan Eulerian

Teorema 2.5

Sebuah graph terhubung (*connected*) dengan sekurang-kurangnya dua titik-titik memiliki lintasan Eulerian jika dan hanya jika terdapat 0 atau 2 titik yang berderajat ganjil dimana lintasan itu adalah sirkuit jika dan hanya jika setiap titiknya mempunyai derajat genap serta titik awal dan akhirnya itu sama.

Bukti:


Suatu graf G dapat dikatakan sebagai graf yang memiliki jalur eulerian apabila disetiap titik pada jalur tersebut akan dilewati oleh dua sisi tepat satu kali. Apabila hanya dua titik dikedua ujung jalur tersebut berderajat ganjil berarti yang lainnya pasti berderajat genap. Jika kedua titik tersebut

berimpitan (titik ujungnya sama) berarti semua sisinya genap sehingga jalur eulerian tersebut juga merupakan sirkuit eulerian.

Untuk lebih jelasnya tentang pembuktian teorema 2.5 perhatikan contoh 2.15 dibawah ini:

Contoh 2.15


Tunjukkanlah graph pada Gambar 2.20 memiliki Eulerian path tetapi tidak memiliki Eulerian sirkuit. Tentukanlah Eulerian pada gambar berikut:



Gambar 2.20 Graf

Penyelesaian:

Karena terdapat dua titik (d dan e) yang bersisi ganjil, sesuai dengan teorema, maka terdapat sebuah lintasan Eulerian, tetapi bukan sirkuit Eulerian. Untuk menentukan lintasan Eulerian, kita harus memulai dari titik d atau e . Jika dimulai dari d , diperoleh lintasan $d, e, c, a, b, c, d, b, e$. Gambar 2.16 menunjukkan lintasan Eulerian, dengan setiap sisinya diberi label sesuai dengan jalur lintasannya.



Gambar 2.21 lintasan Eulerian.¹¹

b. Isomorfik


Dalam berbagai bidang matematika, penting diketahui apakah dua objek yang sedang dihadapi itu sama atau berbeda. Sebagai contoh bilangan 2 dan $\frac{6}{3}$ dapat dipandang sebagai dua bilangan yang bernilai sama namun tidak identik. Konsep tersebut dapat diterapkan pada dua buah graf.

Definisi 2.5

Graf G dan H dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu fungsi $f: V \rightarrow VH$ sedemikian sehingga $uv \in EG$ jika dan hanya jika $f(u)f(v) \in H$. dengan kata lain, G isomorfik dengan H ($G \cong H$) jika pemetaan f mempertahankan kedekatan dua titik. Fungsi f disebut isomorfisma.

¹¹ Willy Yandi Wijaya. *Op. cit.*, h. 39.

Contoh 2.11



Gambar 2.16 graf

Graf seperti Gambar di atas (a) isomorfik dengan graf seperti gambar (b) karena terdapat isomorfisma f yang didefinisikan sebagai berikut :

$$f(v_1) = u_1, f(v_3) = u_3, f(v_2) = u_2, f(v_5) = u_5, f(v_4) = u_4^{12}$$

Dalam geometri, dua gambar disebut kongruen jika keduanya mempunyai sifat-sifat geometri yang sama. Maka dengan cara yang sama, dua graf disebut isomorfis jika keduanya menunjukkan "bentuk" yang sama, kedua graf tersebut hanya berbeda dalam hal pemberian label titik dan garisnya saja.

Syarat dua buah graf dikatakan isomorfik, yaitu :

1. Memiliki jumlah titik yang sama
2. Memiliki jumlah sisi yang sama
3. Memiliki derajat yang sama dari titik-titiknya


Catatan : apabila dua graf yang berbeda tidak memiliki salah satu dari syarat diatas sudah pasti kedua graf tersebut tidak isomorfis, tetapi walaupun kedua

¹²Willy Yandi Wijaya. *Op. cit.*, h. 29.

graf tersebut memiliki seluruh syarat diatas belum tentu juga keduanya isomorfis. Ada 2 graf yang memenuhi ketiga syarat tersebut, tetapi keduanya tidak isomorfis.

Sebagai contoh adalah graf G dan G' pada Gambar 4.1 di bawah ini :

Contoh 2.12:



Gambar 2.17 Graf G dan G'

Dalam graf G , satu-satunya titik yang berderajat 3 adalah titik x . Titik x dihubungkan dengan 2 titik lain yang berderajat 1 (titik y dan z). Sebaliknya, dalam graf G' , satu-satunya titik yang berderajat 3 adalah c . Satu-satunya titik berderajat 1 yang dihubungkan dengan c hanyalah titik d , sehingga G tidak mungkin isomorfik dengan G' . Untuk itu ada beberapa syarat tambahan yang wajib kita penuhi apabila ingin menunjukkan apakah kedua graf tersebut isomorfik atau tidak, yaitu :


1. Graf sederhana $G_1 = (V_1, E_1)$ dan $G_2 = (V_2, E_2)$ adalah isomorfis jika ada sebuah fungsi bijektif (fungsi satu-ke-satu dan on to) dari V_1 ke V_2 dengan sifat kepemilikan bahwa jika a dan b adalah tetangga pada G_1 jika dan

hanya jika $f(a)$ dan $f(b)$ adalah tetangga di G_2 , untuk seluruh a dan b di V_1 .

2. Misalkan sisi e bersisian dengan titik u dan v di G_1 , maka sisi e' yang berkoresponden di G_2 harus bersisian dengan titik u' dan v' yang di G_2 .
3. G_1 dan G_2 adalah isomorfis jika titik-titiknya dapat diurut dengan cara sedemikian rupa sehingga matriks adjacensy M_{G_1} dan M_{G_2} adalah identik.

Berikut adalah contoh graf yang isomorfik, yaitu:

Contoh 2.13:



Gambar 2.18 graf isomorfik

Periksa apakah kedua graf tersebut isomorfik? Jika ya, tentukan titik-titik yang saling berkorespondensi antara G_1 dan G_2 ?

Jawab :

Ya, kedua graf tersebut adalah isomorfik. Terlihat graf tersebut memuat titik dimana setiap titiknya masing-masing berderajat tiga. titik yang saling berkorespondensi dari kedua graf tersebut adalah :

titik u_1 dengan titik v_1

titik u_2 dengan titik v_3

titik u_3 dengan titik v_5

titik u_4 dengan titik v_6

titik u_5 dengan titik v_4

titik u_6 dengan titik v_2

Pada dua graf yang isomorfik, kedua graf tersebut memiliki matriks ketetanggaan yang sama, tentunya setelah matriks yang berkorespondensi diurutkan dalam urutan yang sama.


Perhatikan matriks ketetanggaan dari kedua graf tersebut. Dibawah ini adalah matriks ketetanggaan dari graf G_1 dan G_2 :

$$M_{G_1} = \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{array} \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{array} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{G_2} = \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{array} \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{array} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Terlihat bahwa kedua graf tersebut memiliki matriks ketetanggaan yang sama, yaitu $M_{G_1} = M_{G_2}$.

Contoh 2.14:



Gambar 2.19 Graf G_1 dan G_2


Setelah titik-titik tersebut dikorespondensi, maka akan menghasilkan matriks bertetangga berikut:

$$G_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \qquad G_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} z & v & w & x & y \end{matrix} \\ \begin{matrix} z \\ v \\ w \\ x \\ y \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Karena kedua matriks tersebut sama, maka kedua matriks tersebut merupakan matriks isomorfik.¹³


c. Planaritas

Suatu graf disebut planar jika dapat digambarkan dalam bidang tanpa adanya ruas berpotongan jika tidak ia disebut graf tak planar.




Gambar 2.20 K_4 adalah graf planar

¹³Arafat Tarigan. Graf Isomorfik. <http://www.google.com/graf-isomorfik-oleh-arafat-tarigan.html>.(19 juni 2013)



Gambar 2.21 K_5 bukan graf planar

Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang (*plane graph*).



Gambar 2.22 Tiga buah graf planar, graf (b) dan (c) adalah graf bidang

Teorema 2.7

(Teorema Euler) Jika G adalah graf planar terhubung dengan n, m dan f berturut-turut menyatakan banyaknya titik, garis dan permukaan dari graf G , maka graf memenuhi

$$n + f = m + 2.$$

Bukti:

Teorema di atas akan dibuktikan dengan induksi matematika dan pasti benar untuk

$m = 0$ dengan $n = 1$ (G terhubung) dan $f = 1$ (yaitu permukaan tak hingga).

Andaikan teorema benar untuk G dengan $m-1$ garis sehingga persoalan selesai jika dapat dibuktikan berlakunya teorema untuk G dengan banyak garis yang sama dengan m . Apabila ditambahkan pada G satu garis baru yaitu e sehingga berlaku salah satu:

- a) Jika e merupakan gelung, maka akan timbul permukaan yang baru tetapi banyaknya titik tidak berubah.
- b) Jika e hanya insiden dengan salah satu titik, maka dalam hal ini harus ditambahkan dengan satu titik lagi. Jadi banyaknya titik dari G bertambah satu tetapi banyaknya permukaan tetap.
- c) Jika e menghubungkan dua titik yang berlainan dari G dan e tersebut mengakibatkan satu permukaan pecah menjadi dua permukaan, maka banyaknya permukaan G bertambah tetapi banyaknya titik tetap.

Teorema benar untuk G dengan banyak garis sama dengan m , maka terbukti.

Akibat 2.1

Jika G adalah graf terhubung planar dengan banyaknya titik $n(n \geq 3)$ dan banyaknya garis m , maka

$$m \leq 3n - 6.$$

Bukti :

Diketahui bahwa permukaan terbatas sekurang-kurangnya mempunyai tiga garis yang membatasi derajat dan sebuah garis membatasi paling banyak dua permukaan, sehingga didapat

$$2m \geq 3f$$

$$\text{Atau } \frac{2}{3}m \geq f.$$

Dengan mensubstitusikan $f = m - n + 2$ dari teorema Euler didapat

$$m - n + 2 \leq \frac{2}{3}m$$

$$m \leq 3n - 6$$

Contoh 2.17

Diberikan graf K_5 yang tidak planar, buktinya adalah dengan memisahkan K_5 sebagai graf planar. Diketahui bahwa K_5 mempunyai lima titik dengan sepuluh garis. K_5 tidak memenuhi akibat dari 2.1 yang berarti kontradiksi sehingga terbukti bahwa K_5 tidak planar.

Akibat 2.2

Jika G graf sederhana terhubung planar dengan banyaknya titik $n (n \geq 3)$ dan banyaknya garis m serta tidak ada segitiga, maka

$$m \leq 2n - 4.$$

Bukti :

Diketahui bahwa permukaan terbatas sekurang-kurangnya mempunyai empat sisi yang membatasi karena derajat permukaan terbatas sekurang-kurangnya

tiga dan tidak terdapat segitiga. Begitu pula sebuah sisi membatasi paling banyak dua permukaan, sehingga

$$2m \geq 4f$$

$$\text{Atau } \frac{1}{2}m \geq f$$

Dengan mensubstitusikan $f = m - n + 2$ dari teorema Euler didapat

$$m - n + 2 \leq \frac{1}{2}m$$

$$m \leq 2n - 4.$$

Contoh 2.18

Membuktikan apakah $K_{3,3}$ planar atau tidak. $K_{3,3}$ mempunyai enam titik dan Sembilan garis dan tanpa segitiga, sehingga tidak memenuhi akibat 2.2 sehingga kontradiksi jadi $K_{3,3}$ tidak planar.

Teorema 2.8

Jika G graf sederhana terhubung planar dengan banyaknya titik $n (n \geq 3)$ dan banyaknya garis m dengan siklus terpendeknya mempunyai panjang lima, maka

$$m \leq \frac{3}{5}(n - 2).$$

Bukti :

Diketahui bahwa permukaan terbatas sekurang-kurangnya mempunyai lima sisi yang membatasi karena derajat permukaan terbatas sekurang-kurangnya tiga dan diketahui bahwa siklus terpendeknya mempunyai panjang lima.

Begitu pula sebuah sisi membatasi paling banyak dua permukaan, sehingga didapat

$$2m \geq 5f$$

$$\text{Atau } \frac{2}{3}m \geq f.$$

Dengan mensubstitusikan $f = m - n + 2$ dari teorema Euler didapat

$$m - n + 2 \leq \frac{2}{3}m$$

$$m \leq \frac{5}{3}(n - 2).^{14}$$

d. Sirkuit hamiltonian

Masalah yang sama untuk mencari eulerian sirkuit adalah masalah untuk mencari hamiltonian sirkuit (*hamiltonian cycle*). Sebuah hamiltonian sirkuit adalah sebuah sirkuit pada sebuah graph yang mana setiap titiknya dilalui tepat satu kali. Sebuah graf dengan hamiltonian sirkuit maka graf tersebut akan terhubung (*connected*), tetapi tidak semua graf yang terhubung memiliki hamiltonian sirkuit.¹⁵

Definisi 2.6


Lintasan Hamilton suatu graf merupakan lintasan yang melalui setiap titik dalam graf tersebut tepat satu kali. Jika lintasan tersebut kembali ke titik awal, sehingga membentuk lintasan tertutup (sirkuit) maka lintasan ini dinamakan sirkuit Hamilton.

¹⁴Willy Yandi Wijaya. *Op. cit.*, h. 43.

¹⁵I Ketut Budayasa, *Matematika Diskrit* (Surabaya: University Press IKIP Surabaya, 1995).

Dengan demikian, sirkuit Hamilton merupakan sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang memuat sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton (*Hamiltonian graph*), sedangkan graf yang memuat lintasan Hamilton dinamakan graf semi Hamilton (*semi- Hamiltonian graph*).

Contoh 2.16:



Gambar 2.23 graf G_1 , G_2 dan G_3

Dari ketiga graf G_1 , G_2 , G_3 dapat disimpulkan:

Graf G_1 merupakan graf semi Hamilton, lintasan hamiltonya adalah :

$$d-c-a-b-c.$$

Sedangkan graf G_2 merupakan graf hamilton, sirkuit hamiltonya adalah :

$$i-e-g-f-e-h-f-i.$$

Sementara itu pada graf G_3 tidak terdapat lintasan maupun sirkuit hamilton.

Misalkan G merupakan graf sederhana dengan jumlah titiknya adalah n buah (dimana n paling sedikit tiga buah). Jika derajat setiap titiknya paling sedikit $n/2$ titik maka graf G tersebut merupakan graf Hamilton.

Beberapa hal tentang graf hamilton :

- a. Setiap graf lengkap merupakan graf Hamilton.
- b. Pada suatu graf lengkap G dengan n buah simpul ($n \geq 3$), terdapat $2^{n-1} - n$ buah sirkuit Hamilton.
- c. Pada suatu graf lengkap G dengan n buah titik ($n \geq 3$ dan n ganjil), terdapat $(n-1)/2$ buah sirkuit Hamilton yang saling lepas (tidak ada sisi yang beririsan). Jika n genap dan $n \geq 4$, maka di dalam G terdapat $(n-2)/2$ buah sirkuit Hamilton yang saling lepas.¹⁶


I. Matriks Ketetangaan dan Senarai Ketetangaan

Untuk mempermudah perhitungan pada program komputer, graf dapat direpresentasikan dengan menggunakan matriks dan salah satunya adalah matriks ketetangaan. Misalkan $G=(V, E)$ adalah sebuah graf sederhana dimana $|V| = n, n > 1$. Misalkan titik dari G adalah v_1, v_2, \dots, v_n . maka matriks ketetangaan A dari G adalah $n \times n$ matriks dimana $A=[a_{ij}]$ bernilai 1 jika titik i dan j bertetangga tetapi bernilai 0 jika tidak bertetangga.

Matriks ketetangaan dari sebuah graf mengacu pada keterurutan dari titik sehingga ada sebanyak $n!$ keterurutan yang berbeda yang terbentuk dari n simpul. Matriks ketetangaan merupakan graf sederhana yang simetris. Hal ini disebabkan oleh kedua-duanya adalah 1 ketika v_i dan v_j mempunyai sisi dan bernilai 0 jika tidak ada sisi diantaranya dan dinamakan juga sebagai matriks nol-satu. Sayangnya matriks ketetangaan nol-satu tidak dapat digunakan

¹⁶Suryanto. *Materi Pokok Pengantar Teori Graph* (Jakarta: KarunikaUniversitas terbuka, 1986), h.35

untuk merepresentasikan graf yang mempunyai sisi ganda. Untuk mengatasinya, maka elemen a_{ij} pada matriks ketetanggaan sama dengan jumlah yang berasosiasi dengan (v_i, v_j) . Matriks ketetanggaannya bukan lagi matriks nol-satu. Untuk graf semu, gelang pada titik v_i dinyatakan dengan nilai satu pada posisi (i, j) di matriks ketetanggaannya. Keuntungan representasi dengan matriks adalah, elemen matriksnya dapat diakses langsung melalui indeks. Selain itu, kita dapat mengetahui secara langsung apakah titik i dan titik j bertetangga. Berikut adalah contoh dari matriks ketetanggaan:



	1	2	3	4		1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
2	1	0	1	1	2	1	0	1	0	0
3	1	1	0	1	3	1	1	0	1	0
4	0	1	1	0	4	0	1	1	0	0
					5	0	0	0	0	0


Gambar 2.24 graf G_1 dan G_3

Pada graf G_1 di gambar 2.24 titik 1 bertetangga dengan titik 2 dan 3 karena masing-masing dihubungkan oleh sebuah sisi sehingga pada matriks 1 dan 4 bernilai 0 sedangkan 2 dan 3 bernilai 1, begitupun dengan titik 2 bertetangga

dengan titik 1, 3 dan 4, titik 3 bertetangga dengan 1,2 dan 4, sedangkan titik 4 bertetangga dengan titik 2 dan 3 begitupun selanjutnya dengan G_2 .

Kelemahan matriks ketetangaan adalah bila graf memiliki jumlah sisi relatif sedikit, karena matriksnya bersifat jarang, yaitu banyak mengandung elemen nol, sedangkan elemen yang bukan nol sedikit sehingga matriks tersebut dikatakan boros karena banyak mengandung elemen nol yang tidak perlu. Untuk mengatasinya digunakan senarai ketetangaan yang berfungsi untuk mengelompokkan titik-titik yang bertetangga dengan setiap titik di dalam graf.¹⁷

Berikut merupakan contoh dari kesenarai graf:



Gambar 2.25 Graf

¹⁷Deasy Ramadian Sari. *Aplikasi Representasi Graf*. (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2000), h. 7.

Tabel 2.1 Senarai Ketetangaan

Graf	Titik	Titik Ketetangaan
A	1	2, 3
	2	1, 3, 4
	3	1, 2, 4
	4	2, 3
B	1	2, 3
	2	1, 3
	3	1, 2, 4
	4	3
	5	
C	1	2
	2	1, 3, 4
	3	1
	4	2, 3

Dari gambar 2.25 dengan gambar a dapat dijelaskan bahwa titik 1 bertetangga dengan titik 2 dan 3, titik 2 bertetangga dengan titik 1,2 dan 3, titik 3 bertetangga dengan 1,2, dan 4, sedangkan titik 4 bertetangga dengan titik 2 dan 3. Begitupun dengan gambar b dan c titik-titik yang berdekatan terlihat jelas dalam tabelnya.

L. Matlab

Matlab merupakan bahasa pemrograman dengan performansi tinggi untuk komputasi numerik dan visualisasi. Kombinasi kemampuan, fleksibilitas, reability dan powerfull grafik membuat matlab menjadi program yang sangat cocok digunakan untuk keteknikan. Matlab merupakan suatu bahasa pemrograman sederhana dengan fasilitas yang jauh lebih hebat dan lebih mudah digunakan dari bahasa pemrograman lain, seperti basic, pascal, atau pc, melalui kemampuan grafisnya, matlab menyediakan banyak pilihan untuk visualisasi data. Matlab adalah suatu lingkungan untuk membuat aplikasi dimana anda dapat membuat antarmuka grafis dan menyediakan pendekatan visual untuk menyelesaikan program-program tertentu. Lebih dari itu Matlab menyediakan sekelompok alat penyelesaian masalah untuk problem-problem khusus, yang dinamakan Toolbox. Sebagai contoh menyediakan Control System Toolbox, Signal Processing Toolbox, Symbolix Math Toolbox dan bahkan anda dapat membuat toolbox sendiri.¹⁸

¹⁸Teguh Widiarsono, M.T, "Tutorial praktis belajar Matlab,"http://directory.umm.ac.id/Labkom_ICT/labkom/matlab/dasar2.pdf (24 Mei 2013).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu dengan mengumpulkan informasi dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diperoleh dalam penelitian. Selanjutnya, mempelajari, membahas, dan menjabarkan hasil pengamatan studi tersebut yang dituangkan dalam penulisan karya tulis berupa tugas akhir.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang memiliki buku-buku yang berkaitan dengan judul proposal di atas. Waktu Penelitian adalah dimulai dari bulan Juli sampai bulan September tahun 2013.

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian


1. Menentukan gambar graf Nauru yang akan digunakan.
2. Membuat matriks ketetanggaan setiap gambar yaitu dengan cara memberikan nilai 1 pada titik yang telah dihubungkan oleh sebuah sisi dan nilai 0 pada titik yang tidak berhubungan.
3. Membuat tabel senarai ketetanggaan yaitu dengan cara menuliskan simbol titik-titik yang ada pada graf Nauru, setelah itu meneliti titik-titik mana saja yang bertetangga kemudian titik-titik yang bertetangga dituliskan ke dalam tabel.

4. Membuat aplikasi/program yaitu dengan cara:
- a. Menuliskan clear yang berfungsi untuk menghapus secara otomatis hasil output sebelumnya.
 - b. Menuliskan input yang berfungsi untuk menginput matriks yang akan di uji.
 - c. Menuliskan n yang berfungsi untuk baris dan m untuk kolom.
 - d. Menuliskan markn 0 dan markm 0 yang berfungsi untuk memberikan nilai 0 pada titik yang tidak bertetangga.
 - e. Menuliskan if n = 24 dan if m = 24 yang berfungsi untuk membuat matriks yang memiliki baris dan kolom 24.
 - f. Menuliskan for i = 1 dan for j = 1 yang berfungsi untuk memberikan nilai 1 pada titik yang bertetangga.
 - g. Menuliskan if (baris (i) == 3) yang berfungsi sebagai jumlah angka 1 dalam baris itu harus 3 sehingga matriks tersebut merupakan matriks Nauru, jika jumlahnya kurang atau lebih dari 3 maka bukan matriks Nauru.
 - h. Menuliskan if (kolom (i) == 3) yang berfungsi sebagai jumlah angka 1 dalam kolom itu harus 3 sehingga matriks tersebut merupakan matriks Nauru, jika jumlahnya kurang atau lebih dari 3 maka bukan matriks Nauru.
 - i. Menuliskan if and (Nauru == m, Nauru == n) yang berfungsi untuk mendefinisikan bahwa matriks tersebut merupakan matriks Nauru apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan bukan matriks Nauru apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi.


BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


- a. Menggambar graf Nauru yang akan dicari Matriks Ketetangaan dan Senarai Ketetanggaannya




Gambar 4.1 Graf Nauru (G_1)



Gambar 4.2 Graf Nauru (G_2)




Gambar 4.3 Graf Nauru (G_3)



Gambar 4.4 Graf Nauru (G_4)

- b. Mencari Matriks Ketetangaan dan Senarai Ketetangaan dari Graf Nauru yang sudah ditentukan



Gambar 4.5 Graf Nauru (G_1)

Dari gambar 4.5, diperoleh bahwa:

1. Titik a bertetangga dengan titik b, x dan f sehingga dalam matriks, kolom a bernilai 1 pada baris b, x dan f sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
2. Titik b bertetangga dengan titik a, c dan q sehingga dalam matriks, kolom b bernilai 1 pada baris a, c dan q sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
3. Titik c bertetangga dengan titik b, d dan j sehingga dalam matriks, kolom c bernilai 1 pada baris b, d dan j sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
4. Titik d bertetangga dengan titik c, e dan u sehingga dalam matriks, kolom d bernilai 1 pada baris c, e dan u sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
5. Titik e bertetangga dengan titik d, f dan n sehingga dalam matriks, kolom e bernilai 1 pada baris d, f dan n sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.

6. Titik f bertetangga dengan titik e, g dan a sehingga dalam matriks, kolom f bernilai 1 pada baris e, g dan a sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
7. Titik g bertetangga dengan titik f, h dan l sehingga dalam matriks, kolom g bernilai 1 pada baris f, h dan l sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
8. Titik h bertetangga dengan titik g, i dan w sehingga dalam matriks, kolom h bernilai 1 pada baris g, i dan w sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
9. Titik i bertetangga dengan titik h, j dan p sehingga dalam matriks, kolom i bernilai 1 pada baris h, j dan p sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
10. Titik j bertetangga dengan titik i, k dan c sehingga dalam matriks, kolom j bernilai 1 pada baris i, k dan c sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
11. Titik k bertetangga dengan titik j, l dan t sehingga dalam matriks, kolom k bernilai 1 pada baris j, l dan t sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
12. Titik l bertetangga dengan titik k, m dan g sehingga dalam matriks, kolom l bernilai 1 pada baris k, m dan g sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
13. Titik m bertetangga dengan titik l, n dan r sehingga dalam matriks, kolom m bernilai 1 pada baris l, n dan r sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
14. Titik n bertetangga dengan titik m, o dan e sehingga dalam matriks, kolom n bernilai 1 pada baris m, o dan e sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
15. Titik o bertetangga dengan titik n, p dan v sehingga dalam matriks, kolom o bernilai 1 pada baris n, p dan v sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
16. Titik p bertetangga dengan titik o, q dan i sehingga dalam matriks, kolom p bernilai 1 pada baris i, q dan o sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.


17. Titik q bertetangga dengan titik p, r dan b sehingga dalam matriks, kolom q bernilai 1 pada baris p, r dan b sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
18. Titik r bertetangga dengan titik q, s dan m sehingga dalam matriks, kolom r bernilai 1 pada baris q, s dan m sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
19. Titik s bertetangga dengan titik r, t dan s sehingga dalam matriks, kolom s bernilai 1 pada baris r, t dan s sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
20. Titik t bertetangga dengan titik s, u dan k sehingga dalam matriks, kolom t bernilai 1 pada baris s, u dan k sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
21. Titik u bertetangga dengan titik t, v dan d sehingga dalam matriks, kolom u bernilai 1 pada baris t, v dan d sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
22. Titik v bertetangga dengan titik u, w dan o sehingga dalam matriks, kolom v bernilai 1 pada baris u, w dan o sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
23. Titik w bertetangga dengan titik v, x dan h sehingga dalam matriks, kolom w bernilai 1 pada baris v, x dan h sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
24. Titik x bertetangga dengan titik w, a dan h sehingga dalam matriks, kolom x bernilai 1 pada baris e, g dan a sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	
a	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
b	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
c	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
e	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
i	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
l	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
n	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
p	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
u	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
w	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Tabel 4.1 Senarai Graf Nauru (G_1)

Titik	Titik tetangga	Titik	Titik tetangga
a	b, x, f	b	a, c, q
c	b, d, j	d	c, e, u
e	d, f, n	f	e, g, a

g	f, h, l	h	g, i, w
i	h, j, p	j	i, k, c
k	j, l, t	l	k, m, g
m	l, n, r	n	m, o, e
o	n, p, v	p	o, q, i
q	p, r, b	r	q, s, m
s	r, t, x	t	s, u, k
u	t, v, d	v	u, w, k
w	v, x, h	x	w, a, h



Gambar 4.6 Graf Nauru (G_2)

Dari Gambar 4.6, diperoleh bahwa:

1. Titik a bertetangga dengan titik b, l dan m sehingga dalam matriks, kolom a bernilai 1 pada baris b, l dan m sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
2. Titik b bertetangga dengan titik c, a dan n sehingga dalam matriks, kolom b bernilai 1 pada baris c, a dan n sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
3. Titik c bertetangga dengan titik d, b dan o sehingga dalam matriks, kolom c bernilai 1 pada baris d, b dan o sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
4. Titik d bertetangga dengan titik c, e dan p sehingga dalam matriks, kolom d bernilai 1 pada baris c, e dan p sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
5. Titik e bertetangga dengan titik d, f dan q sehingga dalam matriks, kolom e bernilai 1 pada baris d, f dan q sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
6. Titik f bertetangga dengan titik e, g dan r sehingga dalam matriks, kolom f bernilai 1 pada baris e, g dan r sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
7. Titik g bertetangga dengan titik f, h dan s sehingga dalam matriks, kolom g bernilai 1 pada baris f, h dan s sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
8. Titik h bertetangga dengan titik i, g dan t sehingga dalam matriks, kolom h bernilai 1 pada baris i, g dan t sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
9. Titik i bertetangga dengan titik j, h dan u sehingga dalam matriks, kolom i bernilai 1 pada baris j, h dan u sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
10. Titik j bertetangga dengan titik i, k dan v sehingga dalam matriks, kolom j bernilai 1 pada baris i, k dan v sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.


11. Titik k bertetangga dengan titik l, j dan w sehingga dalam matriks, kolom k bernilai 1 pada baris l, j dan w sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
12. Titik l bertetangga dengan titik k, a dan x sehingga dalam matriks, kolom l bernilai 1 pada baris k, a dan x sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
13. Titik m bertetangga dengan titik a, x dan n sehingga dalam matriks, kolom m bernilai 1 pada baris a, x dan n sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
14. Titik n bertetangga dengan titik b, m dan o sehingga dalam matriks, kolom n bernilai 1 pada baris b, m dan o sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
15. Titik o bertetangga dengan titik c, n dan p sehingga dalam matriks, kolom o bernilai 1 pada baris c, n dan p sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
16. Titik p bertetangga dengan titik d, o dan q sehingga dalam matriks, kolom p bernilai 1 pada baris d, o dan q sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
17. Titik q bertetangga dengan titik e, p dan r sehingga dalam matriks, kolom q bernilai 1 pada baris e, p dan r sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
18. Titik r bertetangga dengan titik f, q dan s sehingga dalam matriks, kolom r bernilai 1 pada baris f, q dan s sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
19. Titik s bertetangga dengan titik b, r dan t sehingga dalam matriks, kolom s bernilai 1 pada baris b, r dan t sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
20. Titik t bertetangga dengan titik h, s dan u sehingga dalam matriks, kolom t bernilai 1 pada baris h, s dan u sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
21. Titik u bertetangga dengan titik i, t dan v sehingga dalam matriks, kolom u bernilai 1 pada baris i, t dan v sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.

22. Titik v bertetangga dengan titik j, w dan u sehingga dalam matriks, kolom v bernilai 1 pada baris j, w dan u sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
23. Titik w bertetangga dengan titik x, k dan v sehingga dalam matriks, kolom w bernilai 1 pada baris x, k dan v sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
24. Titik x bertetangga dengan titik m, l dan w sehingga dalam matriks, kolom x bernilai 1 pada baris m, l dan w sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
a	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
g	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
i	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
j	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
l	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
m	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
n	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
o	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
p	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
q	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
r	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
s	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
t	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Table 4.2 Senarai Graf Nauru (G_2)

Titik	Titik tetangga	Titik	Titik tetangga
a	b, l, m	b	c, a, n
c	d, b, o	d	c, e, p
e	d, f, q	f	e, g, r
g	f, h, s	h	i, g, q
i	j, h, u	j	i, k, v
k	l, j, w	l	k, a, x
m	a, x, n	n	b, m, o
o	c, n, p	p	d, o, q
q	e, p, r	r	f, q, s
s	b, r, t	t	h, s, u
u	t, v, d	v	j, w, u
w	x, k, v	x	m, l, w

**Gambar 4.7** Graf Nauru (G_3)


Dari Gambar 4.7, diperoleh bahwa:

1. Titik a bertetangga dengan titik b, p dan q sehingga dalam matriks, kolom a bernilai 1 pada baris b, p dan q sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
2. Titik b bertetangga dengan titik a, c dan v sehingga dalam matriks, kolom b bernilai 1 pada baris a, c dan v sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
3. Titik c bertetangga dengan titik b, d dan h sehingga dalam matriks, kolom c bernilai 1 pada baris b, d dan h sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
4. Titik d bertetangga dengan titik c, e dan o sehingga dalam matriks, kolom d bernilai 1 pada baris c, e dan o sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
5. Titik e bertetangga dengan titik d, f dan s sehingga dalam matriks, kolom e bernilai 1 pada baris d, f dan s sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
6. Titik f bertetangga dengan titik e, g dan x sehingga dalam matriks, kolom f bernilai 1 pada baris e, g dan x sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
7. Titik g bertetangga dengan titik f, h dan l sehingga dalam matriks, kolom g bernilai 1 pada baris f, h dan l sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
8. Titik h bertetangga dengan titik g, i dan c sehingga dalam matriks, kolom h bernilai 1 pada baris g, i dan c sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
9. Titik i bertetangga dengan titik h, j dan u sehingga dalam matriks, kolom i bernilai 1 pada baris h, j dan u sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
10. Titik j bertetangga dengan titik i, k dan r sehingga dalam matriks, kolom j bernilai 1 pada baris i, k dan r sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.

11. Titik k bertetangga dengan titik j, l dan p sehingga dalam matriks, kolom k bernilai 1 pada baris j, l dan p sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
12. Titik l bertetangga dengan titik k, m dan g sehingga dalam matriks, kolom l bernilai 1 pada baris k, m dan g sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
13. Titik m bertetangga dengan titik l, n dan w sehingga dalam matriks, kolom m bernilai 1 pada baris l, n dan w sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
14. Titik n bertetangga dengan titik m, o dan t sehingga dalam matriks, kolom n bernilai 1 pada baris m, o dan t sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
15. Titik o bertetangga dengan titik n, p dan d sehingga dalam matriks, kolom o bernilai 1 pada baris n, p dan d sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
16. Titik p bertetangga dengan titik o, a dan k sehingga dalam matriks, kolom p bernilai 1 pada baris o, a dan k sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
17. Titik q bertetangga dengan titik x, r dan a sehingga dalam matriks, kolom q bernilai 1 pada baris x, r dan a sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
18. Titik r bertetangga dengan titik q, s dan j sehingga dalam matriks, kolom r bernilai 1 pada baris q, s dan j sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
19. Titik s bertetangga dengan titik r, t dan e sehingga dalam matriks, kolom s bernilai 1 pada baris r, t dan e sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
20. Titik t bertetangga dengan titik s, u dan m sehingga dalam matriks, kolom t bernilai 1 pada baris s, u dan m sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
21. Titik u bertetangga dengan titik t, v dan i sehingga dalam matriks, kolom u bernilai 1 pada baris t, v dan i sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.

Table 4.3 Graf Nauru (G_3)

Titik	Titik tetangga	Titik	Titik tetangga
a	b, p, q	b	a, c, v
c	b, d, h	d	c, e, o
e	d, f, s	f	e, g, x
g	f, h, l	h	g, i, c
i	h, j, u	j	i, k, r
k	j, l, p	l	k, m, g
m	l, n, w	n	m, o, t
o	n, p, d	p	o, a, k
q	x, r, a	r	q, s, j
s	r, t, e	t	s, u, m
u	t, v, i	v	u, w, b
w	v, x, m	x	w, q, f



Gambar 4.8 Graf Nauru (G_4)

Dari table 4.4, diperoleh bahwa:

1. Titik a bertetangga dengan titik b, m dan l sehingga dalam matriks, kolom a bernilai 1 pada baris b, m dan l sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
2. Titik b bertetangga dengan titik a, c dan n sehingga dalam matriks, kolom b bernilai 1 pada baris a, c dan n sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
3. Titik c bertetangga dengan titik d, o dan b sehingga dalam matriks, kolom c bernilai 1 pada baris d, o dan b sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
4. Titik d bertetangga dengan titik e, c dan p sehingga dalam matriks, kolom d bernilai 1 pada baris e, c dan p sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
5. Titik e bertetangga dengan titik d, q dan f sehingga dalam matriks, kolom e bernilai 1 pada baris d, q dan f sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
6. Titik f bertetangga dengan titik e, r dan g sehingga dalam matriks, kolom f bernilai 1 pada baris e, r dan g sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.

7. Titik g bertetangga dengan titik f, h dan s sehingga dalam matriks, kolom g bernilai 1 pada baris f, h dan s sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
8. Titik h bertetangga dengan titik g, i dan t sehingga dalam matriks, kolom h bernilai 1 pada baris g, i dan t sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
9. Titik i bertetangga dengan titik j, u dan h sehingga dalam matriks, kolom i bernilai 1 pada baris j, u dan h sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
10. Titik j bertetangga dengan titik v, k dan i sehingga dalam matriks, kolom bernilai 1 pada baris v, k dan i sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
11. Titik k bertetangga dengan titik l, j dan w sehingga dalam matriks, kolom k bernilai 1 pada baris l, j dan w sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
12. Titik l bertetangga dengan titik a, k dan x sehingga dalam matriks, kolom l bernilai 1 pada baris a, k dan x sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
13. Titik m bertetangga dengan titik a, x dan n sehingga dalam matriks, kolom m bernilai 1 pada baris a, x dan n sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
14. Titik n bertetangga dengan titik m, b dan o sehingga dalam matriks, kolom n bernilai 1 pada baris m, b dan o sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
15. Titik o bertetangga dengan titik c, n dan p sehingga dalam matriks, kolom o bernilai 1 pada baris c, n dan p sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
16. Titik p bertetangga dengan titik d, o dan q sehingga dalam matriks, kolom p bernilai 1 pada baris d, o dan q sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
17. Titik q bertetangga dengan titik e, p dan r sehingga dalam matriks, kolom q bernilai 1 pada baris e, p dan r sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.

18. Titik r bertetangga dengan titik f, q dan s sehingga dalam matriks, kolom r bernilai 1 pada baris f, q dan s sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
19. Titik s bertetangga dengan titik b, r dan t sehingga dalam matriks, kolom s bernilai 1 pada baris b, r dan t sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
20. Titik t bertetangga dengan titik h, s dan u sehingga dalam matriks, kolom t bernilai 1 pada baris h, s dan u sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
21. Titik u bertetangga dengan titik t, v dan i sehingga dalam matriks, kolom u bernilai 1 pada baris t, v dan i sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
22. Titik v bertetangga dengan titik j, w dan u sehingga dalam matriks, kolom v bernilai 1 pada baris j, w dan u sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
23. Titik w bertetangga dengan titik x, k dan v sehingga dalam matriks, kolom w bernilai 1 pada baris x, k dan v sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.
24. Titik x bertetangga dengan titik m, l dan w sehingga dalam matriks, kolom x bernilai 1 pada baris m, l dan w sedangkan baris-baris yang lainnya bernilai 0.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	
a	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
g	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
h	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
i	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
j	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
l	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
m	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
n	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
q	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
r	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
s	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
t	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
u	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Tabel 4.2 Graf Nauru (G_4)

Titik	Titik tetangga	Titik	Titik tetangga
a	b, m, l	b	a, c, n
c	d, o, b	d	e, c, p
e	d, q, f	f	e, r, g
g	s, h, f	h	g, i, t
i	j, u, h	j	v, k, i

k	l, j, w	l	a, k, x
m	a, x, n	n	m, b, o
o	c, n, p	p	d, o, q
q	e, p, r	r	f, q, s
s	b, r, t	t	h, s, u
u	t, v, i	v	j, w, u
w	x, k, v	x	m, l, w

B. Pembahasan

Pada Bab IV ini akan dibahas tentang representasi graf Nauru dalam matriks ketetanggaan dan senarai ketetanggaan. Pada matriks ketetanggaan bernilai 1 ketika titik yang satu dengan titik yang lainnya dihubungkan oleh sisi dan bernilai 0 apabila tidak ada sisi diantaranya. Kelemahan matriks ketetanggaan adalah bila graf memiliki jumlah sisi yang relatif sedikit sehingga matriks tersebut dikatakan boros karena banyak mengandung elemen nol yang tidak perlu dan untuk mengatasinya digunakan senarai ketetanggaan untuk mengelompokkan titik-titik yang bertetangga dengan setiap titik di dalam graf.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam matriks graf Nauru dapat disimpulkan bahwa setiap kolom dan baris yang ada pada graf Nauru memiliki tiga yang bernilai 1 sehingga apabila ada matriks yang memiliki jumlah titik yang sama namun jumlah yang bernilai 1 di dalam setiap kolom dan baris itu lebih atau kurang dari tiga maka itu bukan merupakan graf Nauru begitupun dengan tabel senarai ketetanggaan pada graf yaitu titik yang bertetangga pada tabel ada tiga sehingga apabila kurang atau lebih dari tiga maka itu bukan tabel senarai ketetanggaan graf Nauru.

B. Saran

Melalui penulisan dan pembahasan skripsi yang telah dilakukan ini perlu dikembangkan pembahasan dan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk matriks-matriks lain yang dapat digunakan dalam graf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusakir, Nilna Niswatin Azizah dkk. *Teori graf*. Malang: UIN Malang 2009.
- Arafat Tarigan. *Graf Isomorfik*. <http://www.google.com/graf-isomorfik-oleh-arafat-tarigan.html>.(19 juni 2013)
- Budayasa, I Ketut, Ph.D. *Teori Graph dan Aplikasinya*. Surabaya: Unesa University Press. 2007
- Budayasa, I Ketut, Ph.D. *Matematika Diskrit*. Surabaya: University Press IKIP Surabaya, 1995.
- Depertemen Agama RI . *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Perwakilan bagian percetakan dan penerbitan Kementrian Agama.
- Eppstein, D., *The many faces of the Nauru graph* on LiveJournal, 2007
- Johnsonbaugh, Richard. *Matematika Diskrit jilid 2* Jakarta : PT Prenhallindo Jakarta, 2002.
- Lipschutz, Seymour dan Marc Lars Lipson. *Seri Penyelesaian Soal Schaum: Matematika Diskrit 2* Jakarta: Salemba Teknika, 2002.
- Pegg, E. T.; Exoo, G. (2009), "Crossing number graphs", *Mathematica Journal*.
- Puspita Dian Anggraini. *Teori Graf* . [http://www.google.com/teori-graf-oleh-Puspita-Dian-Anggraini .pdf](http://www.google.com/teori-graf-oleh-Puspita-Dian-Anggraini.pdf) (16 mei 2013)
- Purwanto. *Matematika Diskrit*. Malang: IKIP Malang,1998.
- Reni Tri Damayanti. *Automorfisme Graf Bintang dan Graf Lintasan*. <http://www.google.com/07610029-reni-tri-damayanti>. (15 Juni 2013)
- Shofiyatul, Hasanah. *Aplikasi pewarnaan graf Terhadap penjadwalan kuliah Di jurusan matematika uin Malang*. Malang: UIN Malang 2007.
- Samuel Wibisono. *Matematika Diskrit Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Suryanto. *Materi Pokok Pengantar Teori Graph*. Jakarta: Karunika Universitas terbuka. 1986.

Willy Yandi Wijaya. *Graf Petersen Dan Sifat-Sifat Yang Berkaitan*
<http://www.google.com/graf-petersen-dan-sifat-sifat-yang-berkaitan-oleh-willy-yandi-wijaya.pdf> (24 juni 2013)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R