

**UJI AKTIVITAS MINYAK DAUN NILAM (*Pogostemon cablin* Benth)
TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA
MENCIT JANTAN (*Mus musculus*)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AFDHALIAH

NIM. 70100113031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
M A K A S S A R
2017

**UJI AKTIVITAS MINYAK DAUN NILAM (*Pogostemon cablin* Benth)
TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA
MENCIT JANTAN (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AFDHALIAH
NIM. 70100113031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
M A K A S S A R 2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Afdhaliah
NIM : 70100113031
TempatTanggalLahir : Loci, 11Agustus 1995
Jurusan : Farmasi
Alamat : Daya, Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur, Blok
K9 No. 29
Judul : Uji Aktivitas Minyak Daun Nilam (*Pogostemon Cablin*
Benth) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat
Pada Mencit Jantan (*Mus musculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, 27 November 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM
Nur Afdhaliah
NIM. 70100113031
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Minyak Daun Nilam (*Pogostemon cablin Benth*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Mencit Jantan (*Mus musculus*)” yang disusun oleh Nur Afdhaliah : 70100113031, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 23 November 2017 M** yang bertepatan dengan **4 Rabiul Awal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 23 November 2017 M
4 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc. (.....)
Sekretaris : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing II : Afrisusnawati Rauf, S. Si., M. Si., Apt. (.....)
Penguji I : Alifia Putri Febriyanti, S.Farm.,
M.Farm.Klin., Apt. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.pd (.....)

Dekan,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19530203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada **ALLAH SWT** atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita **MUHAMMAD SAW**, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi - tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Drs. Burhanuddin, M.Pd** dan Ibunda **Dra. Dahmar** yang takhenti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat keluarga saudaraku tercinta, Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat

terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/ Ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Prof.Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
6. Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm,Klin., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis andi tenri paramitha, fitriani tamu, ika pertiwi dewi putri, ayu andari, rahbiyatul adawiyah, kiky rezki dan wirasmi. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan Farmasi Angkatan 2013 (FAR13ION) yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini.
12. Saudaraku Nur Rizki Amaliah, Farhan Hidayat , Budi Gunakan, Sri Asmawati yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, 27 November 2017

Penyusun

Nur Afdhaliah

NIM : 70100113031

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi operasional	4
D. Kajian pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Uraian Tanaman	9
B. Uraian HewanCoba	10
C. Anatomi dan Fisiologi Kulit.....	13

D. Luka.....	21
E. Luka Sayat.....	25
F. Minyak Atsiri	29
G. Metode Ekstraksi Minyak Atsiri.....	32
H. Kedudukan Obat Dalam Islam.....	35
BAB III Metodologi Penelitian.....	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Lokasi Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sampel.....	40
D. Instrumen Penelitian.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
KEPUSTAKAAN.....	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Anatomi Kulit.....	13
Gambar 2	Daun Nilam (<i>Pogostemon cablin</i> Benth).....	68
Gambar 3	Proses Pengeringan (diangin-anginkan)	68
Gambar 4	Sampel dikeringkan dilemari pengering.....	69
Gambar 5	Hasil Perajangan	69
Gambar 6	Alat Destilasi Uap air	70
Gambar 7	Sampel dimasukkan kedalam labu Destilasi	70
Gambar 8	Minyak yang didapatkan ditampung dicorong pisah.....	71
Gambar 9	Alat dan bahan yang digunakan	71
Gambar 10	Mencit yang digunakan diadaptasikan terlebih dahulu.....	72
Gambar 11	Bulu mencit dicukur.....	72
Gambar 12	Proses Penyayatan.....	73
Gambar 13	Luka Sayatan	73
Gambar 14	Luka sembuh 100%	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Alur Penelitian.	57
Lampiran 2	Skema Ekstraksi Daun Nilam (<i>Pogostemon cablin</i> Benth)	58
Lampiran 3	Skema Pengujian Efek Penyembuhan Luka Sayat	59
Lampiran 4	Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat.....	60
Lampiran 5	Presentase Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat....	61
Lampiran 6	Efek Penyembuhan Luka Sayat.....	62
Lampiran 7	Perhitungan RAL, Hubungan antar formula dan kecepatan	62
Lampiran 8	Gambar Pengamatan.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat.....	44
Tabel 2	Presentase Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat	45
Tabel 3	Hubungan antar formula dan kecepatan luka tertutup 100%	45
Tabel 4	Analisis Ragam Nilai F Tabel.....	46
Tabel 5	Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat	60
Tabel 6	Presentase Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat	61
Tabel 7	Efek Penyembuhan Luka Sayat	62
Tabel 8	Hubungan antar formula dan kecepatan luka tertutup 100%	62
Tabel 9	Analisis Ragam Nilai F Tabel.....	65
Tabel 10	RAL,BNT Hubungan antara formula dan kecepatan mulai penutupan 100%.....	67



ABSTRAK

Nama : Nur Afdhaliah
NIM : 70100113031
Judul : Uji Aktivitas Minyak Daun Nilam (*Pogostemon Cablin Benth*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Mencit (*Mus musculus*)

Luka sayat merupakan suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan tubuh yang disebabkan oleh benda tajam. Minyak Nilam memiliki kandungan senyawa patchouli alcohol, tanin, saponin dan α -bulnassen yang berperan dalam penyembuhan luka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas minyak daun nilam (*Pogostemon Cablin Benth*) dalam penyembuhan luka sayat, mengetahui konsentrasi yang paling baik dan bagaimana perspektif Islam tentang pemanfaatan daun Nilam (*Pogostemon cablin Benth*) sebagai obat penyembuh luka sayat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental laboratorium. Subjek penelitian berupa mencit yang dibagi menjadi 7 kelompok perlakuan yaitu pada kelompok I, II, III, IV, V yaitu kelompok ekstrak daun Nilam (*Pogostemon Cablin Benth*) dengan konsentrasi berturut-turut 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, kelompok VI Betadin (Povidon Iodin 10%) sebagai kontrol positif dan kelompok VII Tween 80 sebagai kontrol negatif. Pemberian dilakukan topikal dengan volume pemberian 1 ml.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak minyak daun Nilam (*Pogostemon Cablin Benth*) dapat menyembuhkan luka sayat pada punggung mencit dan konsentrasi 50% menunjukkan aktivitas terbaik dalam penyembuhan luka sayatan pada mencit (*Mus musculus*). Terdapat perbedaan yang bermakna pada penyembuhan luka sayat pada mencit yang diberi perlakuan dengan kontrol negatif, kontrol positif dan minyak daun nilam.

Kata Kunci: Minyak Nilam (*Pogostemon Cablin Benth*), Penyembuhan Luka, Mencit (*Mus musculus*)

ABSTRACT

Name : Nur Afdhaliah
Reg Number : 70100113031
Skripsi Title : The Activity Test of Patchouli oil (*Pogostemon Cablin Benth*)
Against Wound Healing in Mice (*Mus musculus*)

Wound is a form of damage or loss of body tissue caused by sharp objects. Patchouli oil contains patchouli alcohol, tannin, saponin and α -bulnassen compounds that play a role in wound healing. This study aims to know the activity of patchouli oil (*Pogostemon Cablin Benth*) in healing the wound, knowing the best concentration and how the Islamic perspective on the use of Patchouli oil (*Pogostemon cablin Benth*) as a cure wound healing.

This research uses method laboratory experimental research. Research subjects in the form of mice are divided into 7 groups of treatment that is in group I, II, III, IV, V that is group of patchouli oil extract (*Pogostemon Cablin Benth*) with concentration 10%, 20%, 30%, 40% 50%, group VI Betadin (Povidon Iodin 10%) as positive control and VII group Tween 80 as negative control. Administration is done topically with volume of 1 ml.

The results showed that patchouli oil extract (*Pogostemon Cablin Benth*) was able to heal the wound on the back of the mice and the concentration of 50% showed the best activity in healing the incision on the mice (*Mus musculus*). There were significant differences in wound healing on mice treated with negative control, positive control and patchouli oil.

Keywords: Patchouli Oil (*Pogostemon Cablin Benth*), Wound healing, Mice (*Mus musculus*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kejadian insiden luka semakin hari semakin bertambah seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas kita sehari-hari. Dalam menjalankan kegiatan, sering kita mengalami kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya luka. Baik luka ringan maupun luka berat. Luka merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan rusaknya berbagai jaringan tubuh, keadaan robek atau terkoyaknya sejumlah jaringan tubuh, baik itu jaringan kulit, jaringan otot, jaringan saraf, pembuluh darah dan limfa oleh beberapa faktor (Suryana. 2014).

Luka memiliki macam-macam jenis luka, salah satu diantaranya yaitu luka sayat. Luka sayat (*vulnus scissum*) merupakan luka yang berupa garis lurus beraturan yang ditandai dengan tepi luka. Umumnya luka sayat terjadi ketika adanya trauma atau kontak langsung dengan benda-benda tajam yang mengenai tubuh. Luka sayat sering terjadi dalam aktivitas manusia sehari-hari. Kurangnya kehati-hatian manusia terhadap benda-benda tajam di sekitarnya menjadi faktor terjadinya luka sayat (Pazry. 2017).

Pengobatan luka menjadi hal yang cukup penting. Seseorang yang terkena luka akan terhambat dalam aktivitasnya karena terganggunya fungsi kulit dan jaringan. Kita ketahui bahwa kulit merupakan organ terbesar dari tubuh, luas permukaan kulit adalah sekitar 15 % dari total berat badan orang dewasa. Kulit juga memiliki berbagai fungsi vital, termasuk perlindungan terhadap lingkungan eksternal baik lingkungan fisik, kimia, dan biologis. Kulit juga mencegah kehilangan air yang berlebihan dari tubuh serta berperan dalam termoregulasi. Ketika kulit kehilangan kontinuitasnya, maka fungsi-fungsi tersebut tidak dapat berjalan normal sebagaimana

seharusnya. Pengobatan luka yang tidak tepat dapat menghambat proses penyembuhan luka, ataupun menyebabkan area luka menjadi terinfeksi dan pada akhirnya menimbulkan luka kronik (Calais, 2014).

Pengembangan obat atau agen alternatif untuk mengobati luka telah dilakukan selama bertahun-tahun. Pengobatan luka secara alami dengan menggunakan tanaman-tanaman obat sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Saat ini, beberapa tanaman obat telah digunakan untuk mengobati luka. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga dijuluki sebagai negara *megabiodiversity*. Keanekaragaman hayati yang tinggi ini membuat alam Indonesia telah menyediakan berbagai tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati luka.

Allah swt. menumbuhkan di bumi beraneka ragam tanaman untuk kebutuhan makhluk hidup. Hal ini seiring dengan firman Allah swt. QS As-Syu'araa 26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Kementrian Agama RI, 2014).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt menciptakan tumbuhan untuk kepentingan manusia. Tetapi, manusia tidak dibenarkan hanya menikmati apa yang diciptakan Allah swt kepada mereka begitu saja, tanpa mau berfikir dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ciptaan-Nya dan mengembangkannya menjadi suatu ilmu pengetahuan. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan berbagai macam tumbuhan dimuka bumi yang bermanfaat untuk manusia karena sesungguhnya Allah swt menciptakan segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki manfaat.

Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) merupakan tanaman perdu wangi berdaun halus dan berbatang segi empat. Daun kering tanaman ini disuling untuk mendapatkan minyak (patchouli oil) yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan industri. Komponen utama yang dikandung minyak nilam adalah patchouli alkohol yang berfungsi sebagai antiradang, antiinflamasi, antidepresi,serta dekongestan.

Tanaman nilam digunakan secara empiris sebagai obat seperti luka sayatan pisau atau benda tajam lainnya dengan cara menghaluskan daunnya menjadi serbuk lalu ditempelkan pada bagian yang terkena luka.

Pada Penelitian (Ahmad 2014) menyatakan bahwa aktivitas antibakteri pada daun nilam disebabkan adanya kandungan *patchouli alcohol* yang merupakan senyawa seskuiterpen alkohol tersier siklik. Tanin diketahui memiliki kemampuan sebagai astrigen, menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi selama penyembuhan luka internal, saponin mempunyai kemampuan sebagai pembersih dan mampu memicuh (mempercepat) pembentukan kolagen yang merupakan suatu protein yang berperan dalam penyembuhan luka. Penelitian lain menyatakan bahwa senyawa α -bulnase pada daun nilam diketahui mempunyai aktivitas anti inflamasi terhadap PAF (Platelet Activating Factor) sebuah phospholipid mediator yang dihasilkan berbagai sel pada saat terkena penyakit alergi dan inflamasi. (Ying Chen, 2014).

Khasiat daun nilam dalam membantu proses penyembuhan luka belum banyak diketahui. Sedikitnya penelitian tentang penggunaan daun nilam terhadap penyembuhan luka, menjadi salah satu faktor belum diketahuinya aktivitas daun nilam dalam proses penyembuhan luka. Sampai saat ini, penelitian mengenai senyawa *patchouli alcohol*, tanin, saponin dan α -bulnase pada daun nilam dalam

kaitannya sebagai senyawa untuk mengobati luka belum pernah dilakukan dan jika melihat kegunaan dari senyawa-senyawa tersebut salah satunya adalah untuk penyembuhan luka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian tentang “Uji Aktivitas Minyak Daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada mencit Jantan (*Mus musculus*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah minyak daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) mempunyai aktivitas dalam menyembuhkan luka sayat pada mencit Jantan (*Mus musculus*)?
2. Pada konsentrasi berapakah minyak daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) memberikan aktivitas yang paling baik terhadap penyembuhan luka sayat pada mencit Jantan (*Mus musculus*)?
3. Bagaimana perspektif Islam tentang pemanfaatan daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) sebagai obat penyembuh luka sayat?

C. Definisi Operasional

1. Destilasi adalah proses pemisahan komponen suatu campuran dari dua jenis cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap dari masing-masing zat tersebut.
2. Luka sayat merupakan luka akibat sayatan yang terjadi pada kulit, yang ditandai dengan tepi luka berupa garis lurus dan beraturan.
3. Minyak nilam adalah salah satu minyak atsiri yang dihasilkan oleh daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) dari proses destilasi uap air.

4. Uji aktivitas minyak nilam (*Pogostemon cablin* Benth) adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan menelusuri aktivitas senyawa sebagai penyembuh luka sayat.

D. Kajian Pustaka

1. Agus Suprijono. Minyak nilam (*Patchouli Alcohol*) sebagai antioksidan dengan metode DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil). Aktivitas antioksidan dari minyak nilam dan mengetahui perbedaan aktivitasnya dengan baku BHT, serta untuk mengetahui konsentrasi efektif yang dinyatakan dalam nilai EC50 dengan menggunakan metode DPPH. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan larutan uji pada konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. Proses untuk memperoleh minyak nilam dilakukan dengan cara melakukan destilasi uap pada herba nilam yang telah dikeringkan. Uji identifikasi untuk mengetahui kualitas dari minyak yang dihasilkan dengan uji KLT untuk mengetahui aktivitas antioksidan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai rata-rata EC50 untuk sampel minyak nilam adalah sebesar 19,95%, sedangkan untuk baku BHT sebesar 11,93%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, di simpulkan bahwa ada aktivitas antioksidan dalam minyak nilam, dan terdapat perbedaan aktivitas antioksidan yang signifikan antara minyak nilam dengan baku BHT.

2. Reza Ovi Diyanti.2015. Sintesis senyawa organonitrogen dari Patchouli alkohol melalui reaksi ritter sebagai antimikroba. Minyak nilam yang diperoleh dari proses penyulingan daun, batang dan cabang tanaman nilam selain banyak dimanfaatkan dalam industri parfum juga banyak dimanfaatkan sebagai obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu dalam menghasilkan senyawa organonitrogen melalui reaksi ritter serta mengetahui aktivitas antimikroba dari hasil transformasi senyawa utama dalam minyak nilam yaitu patchouli alkohol.

Patchouli alkohol dapat ditransformasikan menjadi senyawa organonitrogen dalam bentuk patchouli asetamida melalui reaksi Ritter dengan reagen nitril dan asam kuat H₂SO₄ sebagai katalis. Proses reaksi pada sintesis amida (patchouli asetamida) dilakukan variasi suhu (-5) - 5°C, 27°C, dan 60°C. Hasil GC menunjukkan senyawa patchouli asetamida dengan persentase terbesar yaitu 7,49% diperoleh dari proses pada suhu (-5) - 5°C. Analisis IR menunjukkan adanya serapan pada bilangan gelombang 3302,13 cm⁻¹ yang merupakan serapan gugus N-H dan diperkuat oleh karakteristik serapan C-N pada bilangan gelombang 1111,00 cm⁻¹. Serta serapan pada bilangan gelombang 1643,35 cm⁻¹ merupakan serapan karakteristik C=O amida. Uji antimikroba dari minyak nilam awal, minyak nilam setelah destilasi, minyak nilam setelah kromatografi kolom menunjukkan hasil yang negatif terhadap *Candida albicans* tetapi positif terhadap *Escherichia coli*. Minyak nilam hasil destilasi memiliki daya hambat terbesar dengan diameter 15,22 mm. Sedangkan zat hasil sintesis menunjukkan hasil yang negatif terhadap keduanya.

3. Yuliani aisyah.2010. Peningkatan kadar patchouli alkohol minyak nilam (*pogostemon cablin* benth) dengan menggunakan membran selulosa asetat. telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kadar patchouli alkohol dalam minyak nilam dengan menggunakan membran nanofiltrasi selulosa asetat dan mengevaluasi kinerja membran yang digunakan. Membran yang digunakan adalah membran nanofiltrasi selulosa asetat tipe vivaspin 15r. Proses filtrasi minyak nilam dilakukan dengan menggunakan kecepatan sentrifugasi 212, 850, dan 1912 g serta waktu sentrifugasi 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 menit. Kadar patchouli alkohol di analisis menggunakan kromatografi gas, sedangkan kinerja membran dinyatakan sebagai permeabilitas (fluks) dan selektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filtrasi dengan menggunakan membran nanofiltrasi selulosa asetat dapat

meningkatkan kadar patchouli alkohol sebesar 2 kali (61,52 %) dari kadar Patchouli alkohol awal (30,08%) pada kecepatan sentrifugasi 1912 g dan waktu sentrifugasi 50 menit.. Kecepatan dan waktu sentrifugasi berpengaruh signifikan terhadap nilai fluks dan selektivitas membran nilai fluks tertinggi diperoleh sebesar 166,81 l/m².jam dan selektivitas membran sebesar 44,91 %.

4. Siti aisyah.2015. Pemisahan Senyawa *Patchouli Alcohol* Dari Minyak Nilam Dengan Cara Distilasi Fraksinasi. Minyak nilam merupakan jenis minyak atsiri Indonesia yang memiliki nilai ekspor tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memisahkan senyawa *patchouli alcohol* dari minyak nilam dengan menggunakan metode distilasi fraksinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan bahan baku minyak nilam, akan menghasilkan kadar *patchouli alcohol* yang cukup tinggi yaitu berkisar antara 15-43% seperti terlihat pada tabel 1. Pada analisis kadar *patchouli alcohol*, minyak nilam yang dimasukkan pada labu sebanyak 1000 ml. Pada fraksi 0 menghasilkan distilat hanya sebanyak 35 ml dan residu sebanyak 930 ml dengan kadar *patchouli alcohol* 15,791%, pada fraksi 1 juga menghasilkan distilat sebanyak 65 ml dan residu sebanyak 855 ml dengan kadar *patchouli alcohol* 25,342% sedangkan pada fraksi 2 diperoleh distilat yang cukup banyak yaitu 410 ml dan residu sebanyak 570 ml dengan kadar *patchouli alcohol* yang cukup baik yaitu 41,277% dimana kadar *patchouli alcohol* SNI 06-2385-2006 minimal 30%.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini, antara lain:


1. Mengetahui aktivitas penyembuhan luka sayat dari minyak daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) pada mencit Jantan (*Mus musculus*).

2. Mengetahui konsentrasi berapa minyak daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) memberikan aktivitas yang paling baik terhadap penyembuhan luka sayat pada mencit Jantan (*Mus musculus*).

3. Mengetahui perspektif Islam tentang pemanfaatan daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) sebagai obat penyembuh luka sayat.

F. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman nilam (*Pogostemon cablin* Benth) yang memiliki potensi tinggi dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan baku obat dalam upaya meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tanaman Nilam

1. Klasifikasi Tanaman

Tumbuhan Nilam memiliki sistematika sebagai berikut :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Labiales
Famili	: Labiales
Genus	: <i>Pogostemon</i>
Spesies	: <i>Pogostemon cablin</i> Benth

(Gembong, 2014)

2. Morfologi Tanaman

Nilam merupakan tumbuhan tropik yang termasuk dalam famili labiales, kelas Angiospermae dan divisi Spermatophyta. Tanaman nilam merupakan jenis tanaman berakar serabut, bentuk daun bervariasi dari bulat hingga lonjong dan batangnya berkayu dengan diameter berkisar antara 10 - 20 mm. Sistem percabangan banyak dan bertingkat mengelilingi batang antara (3 - 5 cabang per tingkat). Setelah tanaman berumur 6 bulan, tingginya dapat mencapai 1 meter dengan radius cabang selebar kurang lebih 60 cm. Di alam bebas, tanaman ini tumbuh secara tidak teratur dan cenderung mengarah ke datangnya sinar matahari, namun di kebun tanaman nilam tumbuhnya tegak ke atas atau merumpun pendek bila diberi penegak bambu. Di

bagian bawah daun terdapat bulu-bulu rambut sehingga warnanya tampak pucat (Sahwalita. 2016).

3. Nama daerah tanaman

Tanaman nilam memiliki nama lokal yaitu Nilam (Sumatera), rei (Sumba), pisak (Alor), ungapa (Timor) dan dilem (jawa), Nilang (Bugis) .

4. Kandungan kimia tanaman

Daun nilam memiliki kandungan minyak atsiri, flavonoida, saponin, tanin, glikosida, terpenoid dan steroid. Kandungan kimia dari minyak nilam adalah δ -elemen, α -patchoulen, β -patchoulen, cis-tujopsen, trans-kariofillen, α -guaien, γ -patchoulen, α -humulen, seychellen, valencen, germacren D, α -salinen, β -salinen, viridifloren, germacren A, α -bulnasen, 7-epi- α -selinen, longipinalol, globulol, patchouli alcohol, 1- okten-3ol (Chakrapani.P. 2013).

5. Khasiat Tanaman

Manfaat tanaman minyak daun nilam untuk terapi antara lain sifat terapeutik dari minyak nilam adalah antidepresan, antiseptik, afrodisiak, astringent, deodoran, diuretik, obat penurun panas, fungisida, insektisida, obat penenang dan tonik. Dalam aromaterapi, nilam digunakan untuk menenangkan saraf, mengontrol nafsu makan dan mengurangi depresi dan stres. Dalam dosis tinggi, dapat merangsang dan dosis yang lebih rendah itu adalah obat penenang. (Ramya. 2013).

B. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Hewan Coba

Kerajaan : Animalia
 Filum : Chordata
 Sub Filum : Vertebrata

Kelas : Mammalia
Sub Kelas : Theria
Intra Kelas : Eutheria
Ordo : Rodentia
Famili : Muridae
Genus : Mus
Spesies : *Mus musculus* (Akbar. 2010)

2. Karakteristik hewan coba

Mencit (*Mus musculus L.*) termasuk mamalia pengerat (rodensia) yang cepat berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomisnya dan fisiologisnya terkarakteristik dengan baik. Mencit yang sering digunakan dalam penelitian di laboratorium merupakan hasil perkawinan tikus putih “*inbreed*” maupun “*outbreed*”. Dari hasil perkawinan sampai generasi 20 akan dihasilkan strainstrain murni dari mencit (Akbar. 2010)

3. Anatomi

a. Mata: mencit memiliki mata berwarna gelap atau merah, tergantung pada genetik mereka. Mereka memiliki penglihatan yang buruk dan sensitif terhadap cahaya yang terang. Mereka terutama mengandalkan indera pendengaran, penciuman dan sentuhan.

b. Telinga: mencit memiliki pendengaran yang tajam dan mengandalkan indera pendengarannya untuk mendeteksi bahaya dan dalam mendengar panggilan dari mencit lain. Kemampuan mendengar mencit belum berkembang sampai berusia 11 hari. Mencit dapat mendengar dan berkomunikasi dalam rentang ultrasonik. Mereka bisa mendengar suara dari 80 Hz sampai 100 kHz dan paling sensitif pada 15

kHz sampai 20 kHz dan 50 kHz. Kemampuan mendengar pada mencit bervariasi dengan usia mereka dan genetik.

c. Hidung: meskipun mencit memiliki hidung yang kecil, indera penciuman mereka sangat tajam dan memainkan peran penting dalam kehidupan social mereka. Bau dan aroma adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh mencit untuk mengintai wilayah dan mengenali koloni mencit lainnya.

d. Tubuh: mencit kecil dan lincah. Mereka mampu masuk pada rongga yang kecil dalam upaya untuk menghindari bahaya atau bersembunyi.

e. Kaki: kaki mencit mungkin kecil, tetapi mereka dapat melompat, berlari cepat, dan memanjat dengan mudah.


f. Ekor: mencit memiliki ekor yang panjang dan kuat untuk ukuran mereka. Ekornya sangat sensitif terhadap rasa sakit. Namun, mencit dapat dipegang dibagian tengah ekornya tanpa menyebabkan ketidaknyamanan jika mereka ditangani dengan lembut. Ekornya berfungsi sebagai alat keseimbangan, serta sarana penting melepaskan panas tubuh. Jika ekornya terluka dan terpisah dari tubuh, bagian yang hilang dari ekor tidak akan tumbuh kembali (Akbar.2010).

4. Data Biologi

Mencit (*Mus musculus L.*) memiliki ciri-ciri berupa bentuk tubuh kecil, berwarna putih, memiliki siklus estrus teratur yaitu 4-5 hari. Kondisi ruang untuk pemeliharaan mencit (*Mus musculus L.*) harus senantiasa bersih, kering dan jauh dari kebisingan. Suhu ruang pemeliharaan juga harus dijaga kisarannya antara 18-19°C serta kelembaban udara antara 30-70%. Mencit betina dewasa dengan umur 35-60 hari memiliki berat badan 18-35 g. Lama hidupnya 1-2 tahun, dapat mencapai 3 tahun. Masa reproduksi mencit betina berlangsung 1,5 tahun. Mencit betina ataupun jantan dapat dikawinkan pada umur 8 minggu. Lama kebuntingan 19-20 hari. Jumlah

anak mencit rata-rata 6-15 ekor dengan berat lahir antara 0,5-1,5 g. Mencit sering digunakan dalam penelitian dengan pertimbangan hewan tersebut memiliki beberapa keuntungan yaitu daur estrusnya teratur dan dapat dideteksi, periode kebuntingannya relatif singkat, dan mempunyai anak yang banyak serta terdapat keselarasan pertumbuhan dengan kondisi manusia (Akbar. 2010).

C. Anatomi dan Fisiologi Kulit



Gambar 1. Anatomi Kulit

1. Anatomi kulit

Kulit merupakan organ tunggal dan terberat yang terletak paling luar pada tubuh manusia dengan ukuran beratnya sekitar 16% berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7 – 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 – 1,9 meter persegi. Kulit berfungsi untuk memantau lingkungan dan berbagai mekanoreseptor dengan lokasi khusus di kulit terhadap interaksi tubuh dengan objek fisik dan mekanik seperti paparan sinar matahari yang dapat menyebabkan reaksi terbakar (*sunburn*), pigmentasi, penuaan dini dan pertumbuhan tumor. (Abeng. 2016). Kulit juga merupakan organ pelindung tulang dan berfungsi sebagai proteksi terhadap berbagai macam gangguan, baik itu gangguan fisik maupun kimia. Kulit sangat rentan terhadap trauma dan terjadinya luka karena kulit merupakan organ terluar (Kawulusan. 2015).

Kulit terdiri atas tiga lapisan, yang masing-masing tersusun dari berbagai jenis sel dan fungsi yang bermacam-macam. Ketiga lapisan tersebut adalah epidermis, dermis, dan subkutan. Pada pembedahan kulit secara mikroskopis, membagi kulit menjadi tiga lapisan utama:

a. Epidermis

Epidermis Adalah bagian kulit terluar. Bagian ini tersusun dari jaringan epitel skuamosa berlapis yang mengalami kreatinisasi, jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah, dan sel-selnya sangat rapat. Bagian epidermis yang paling tebal dapat ditemukan pada telapak tangan dan telapak kaki (Eddyman.2013).

Epidermis terdiri atas lima lapisan sel penghasil keratin yaitu

1) Stratum Korneum

Merupakan lapisan epidermis yang paling atas, dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Lapisan korneum terdiri atas beberapa sel pipih, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Sebagian besar lapisan ini terdiri atas keratin yang merupakan sejenis protein tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan kimia. *Stratum korneum* dikenal dengan lapisan tanduk. Lapisan tanduk terdiri dari milyaran sel pipih yang terlepas terlepas dan digantikan sel baru setiap 4 minggu karena usia setiap sel biasanya 28 hari. Pada saat terlepas, kondisi kulit terasa sedikit kasar. Proses pembaruan lapisan ini terus berlangsung sepanjang hidup, menjadikan kulit ari memiliki *self repairing capacity* atau kemampuan memperbaiki diri. Dengan bertambahnya usia, proses keratinisasi berjalan lebih lambat, akibatnya lapisan korneum yang sudah menjadi kasar, lebih kering, tebal, serta timbul bercak putih karena melanosit bekerja lambat dan penyebaran melanin tidak lagi merata. Daya elastisitas kulit pada lapisan ini sangat kecil dan lapisan ini sangat efektif untuk

mencegah penguapan air dari lapisan kulit yang lebih dalam sehingga mampu memelihara tonus dan turgor kulit. Lapisan korneum memiliki daya serap air yang cukup besar (Mescher. 2012).

2) Stratum Lusidum

Disebut juga lapisan *barrier*, terletak tepat di bawah lapisan korneum, dan dianggap sebagai penyambung lapisan korneum dengan lapisan granulosum. Lapisan lusidum terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar (tembus cahaya). Organel dan inti tidak tampak lagi, sitoplasma terdiri atas filamen keratin padat yang berhimpitan pada dalam matriks padat-elektron. Desmosom masih tampak di antara sel-sel yang bersebelahan. Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Proses keratinisasi bermula dari lapisan lusidum (Mescher. 2012).

3) Stratum Granulosum

Terdiri atas 3-5 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul basofilik kasar yang disebut granul keratohialin. Banyaknya gugus fosfat memberikan sifat basofilik pada granul keratohialin yang tidak dilapisi membran. Struktur khas lainnya adalah granul lamela berselubung membran, yakni suatu struktur lonjong atau mirip batang kecil yang mengandung cakram-cakram berlamel yang dibentuk oleh lapisan lipid ganda. Granula-granula ini menyatu dengan membran sel dan mencurahkan isinya ke dalam ruang antar sel di *stratum granulosum*, tempat isi granula ditimbun dalam bentuk lembaran-lembaran yang mengandung lipid. Fungsi materi yang dikeluarkan ini serupa dengan materi semen antar sel, yang berfungsi sebagai sawar terhadap masuknya materi asing dan menyediakan suatu efek pelindung yang penting di kulit. (Mescher. 2012).

4) Stratum Spinosum

Disebut juga lapisan malphigi yang terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan protoplasma berbentuk kubus. Jika sel-sel lapisan saling berlepasan, maka seperti selnya bertaju. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri dari serabut protein. Sel-sel pada lapisan spinosum normal, tersusun menjadi beberapa baris. Bentuk sel berkisar antara bulat ke bersudut banyak (*polygonal*), dan makin ke arah permukaan kulit maka makin besar ukurannya. Di antara sel-sel spinosum terdapat celah antara sel halus yang berfungsi untuk peredaran cairan jaringan ekstraseluler dan pengantaran butir-butir melanin. Sel-sel pada lapisan spinosum yang lebih dalam, banyak yang berada dalam salah satu tahap mitosis. Kesatuan lapisan spinosum mempunyai susunan kimiawi yang khas, inti-inti sel dalam bagian basal lapisan spinosum mengandung kolesterol, asam amino dan *glutation*.

5) Stratum Germinativum

Merupakan lapisan paling bawah epidermis yang dibentuk oleh satu baris sel torak (silinder) dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel torak ini bergerigi dan bergabung dengan *lamina basalis* di bawahnya. *Lamina basalis* merupakan struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis. Pengaruh *lamina basalis* cukup besar terhadap pengaturan metabolisme dan fungsi-fungsi vital kulit. Di dalam lapisan ini sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergeser ke lapisan-lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel tanduk. Di dalam lapisan germinativum terdapat pula sel-sel bening (*clear cells*, melanoblas atau melanosit) pembuat pigmen melanin kulit (Mescher, 2012).

b. Dermis

Dermis merupakan lapisan jaringan ikat yang mengandung banyak serat elastin (untuk peregangan) dan serat kolagen (untuk kekuatan), serta sejumlah besar pembuluh darah dan ujung-ujung saraf khusus. Dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kantung rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan *muskulus arektor pili*. Sel-sel rambut yang berada di dasar kantung rambut, terus-menerus membelah membentuk batang rambut. Kelenjar palit yang menempel di saluran kantung rambut, menghasilkan minyak yang mencapai permukaan kulit melalui muara di kantung rambut. Lapisan dermis sering disebut kulit sebenarnya dan 95 % lapisan dermis membentuk ketebalan kulit. Ketebalan rata-rata lapisan dermis diperkirakan antara 1-2 mm dan yang paling tipis terdapat di kelopak mata serta yang paling tebal terdapat di telapak tangan dan telapak kaki (Mescher. 2012)

Keberadaan ujung saraf perasa dalam lapisan dermis, berfungsi untuk membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing saraf perasa memiliki fungsi tertentu, seperti mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan dingin. Saraf perasa juga memungkinkan segera bereaksi terhadap hal yang dapat merugikan diri kita. Jika kita mendadak menjadi sangat takut atau sangat tegang, otot penegak rambut yang menempel di kantung rambut, akan mengerut dan menjadikan bulu atau kuduk berdiri. Kelenjar palit yang menempel di kantung rambut menghasilkan minyak untuk melumasi permukaan kulit dan batang rambut. Sekresi minyaknya dikeluarkan melalui muara kantung rambut. Kelenjar keringat menghasilkan cairan keringat yang dikeluarkan ke permukaan kulit melalui pori-pori kulit. Di permukaan kulit, minyak dan keringat membentuk lapisan pelindung yang disebut *acid mantel* atau sawar asam dengan pH sekitar 5,5. Sawar asam adalah penghalang alami yang

efektif dalam mencegah berkembangbiaknya jamur, bakteri dan berbagai jasad renik lainnya di permukaan kulit. Keberadaan dan keseimbangan nilai pH, perlu terus-menerus dipertahankan dan di jaga agar tidak hilang oleh pemakaian kosmetika.

Dermis terdiri atas sekumpulan serat-serat elastis yang dapat membuat kulit berkerut dan akan kembali ke bentuk semula serta serat protein yang disebut kolagen. Serat kolagen ini disebut juga jaringan penunjang, karena fungsinya adalah membentuk jaringan-jaringan kulit yang menjaga kekeringan dan kelenturan kulit. Berkurangnya protein akan menyebabkan kulit menjadi kurang elastis dan mudah mengendur hingga timbul kerutan. Faktor lain yang menyebabkan kulit berkerut yaitu faktor usia atau kekurangan gizi. Dari fungsi ini tampak bahwa kolagen mempunyai peran penting bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Perlu diperhatikan bahwa luka yang terjadi di lapisan dermis dapat menimbulkan cacat permanen, hal ini disebabkan lapisan dermis tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri seperti yang dimiliki lapisan epidermis. Di dalam lapisan dermis terdapat dua macam kelenjar yaitu kelenjar keringat dan kelenjar palit (Mescher. 2012).

c. Jaringan Subkutan

Lapisan ini tersusun dari jaringan ikat longgar yang mengikat kulit secara longgar pada organ-organ di bawahnya, yang memungkinkan kulit bergeser di atasnya. Hipodermis sering mengandung sel-sel lemak yang jumlahnya bervariasi sesuai daerah tubuh dan ukuran yang bervariasi sesuai dengan status gizi yang bersangkutan. Lapisan ini juga disebut sebagai *fascia superficial*, jika cukup tebal disebut dengan *penikulus adiposus* (Mescher. 2012).

2. Fisiologi Kulit

Kulit berperan sebagai lapisan pelindung tubuh terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun kimia. Meskipun kulit relatif impermeable terhadap senyawa-

senyawa kimia, namun dalam keadaan tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa obat atau bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek terapeutik atau efek toksik yang bersifat lokal atau sistemik kulit juga merupakan sawar (*barrier*) fisiologik yang penting karena mampu menahan penembusan bahan gas, cair maupun padat baik yang berasal dari lingkungan luar tubuh maupun komponen yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Isriany Ismail, 2013).

Kulit mempunyai fungsi bermacam-macam untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Adapun fungsi utama kulit adalah

a. Fungsi proteksi

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanik (tarikan, gesekan, dan tekanan), gangguan kimia (zat-zat kimia yang iritan), dan gagguan bersifat panas (radiasi, sinar ultraviolet), dan gangguan infeksi luar.

b. Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut lemak. Permeabilitas kulit terhadap O₂, CO₂ dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembaban, metabolisme dan jenis vehikulum.

c. Fungsi ekskresi

Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia.

d. Fungsi persepsi

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis sehingga kulit mampu mengenali rangsangan yang diberikan. Rangsangan panas diperankan oleh badan ruffini di dermis dan subkutis, rangsangan dingin diperankan

oleh badan krause yang terletak di dermis, rangsangan rabaan diperankan oleh badan meissner yang terletak di papila dermis, dan rangsangan tekanan diperankan oleh badan paccini di epidermis.

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh (termoregulasi)

Kulit melakukan fungsi ini dengan cara mengekskresikan keringat dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit. Di waktu suhu dingin, peredaran darah di kulit berkurang guna mempertahankan suhu badan. Pada waktu suhu panas, peredaran darah di kulit meningkat dan terjadi penguapan keringat dari kelenjar keringat sehingga suhu tubuh dapat dijaga tidak terlalu panas.

f. Fungsi pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit dan jumlah serta besarnya butiran pigmen (melanosomes) menentukan warna kulit ras maupun individu.

g. Fungsi kreatinisisasi

Fungsi ini memberi perlindungan kulit terhadap infeksi secara mekanis fisiologik.

h. Fungsi pembentukan/sintesis vitamin D (Cholis.2013).

3. Absorpsi Obat Melalui Kulit

Mekanisme absorpsi obat topikal atau perkutan dari lapisan luar kulit adalah dengan difusi melewati barriert kulit yaitu 3 kompartemen kulit yang terdiri dari permukaan luar kulit, stratum korneum, dan jaringan hidup di bawahnya. Setelah diaplikasikan pada permukaan luar kulit obat akan mengalami penguapan, perubahan struktur dan komposisi yang akan menentukan bioavailabilitas obat tersebut. Tiga jalur utama penetrasi obat topikal pada kondisi stratum korneum utuh adalah jalur transeluler (menembus stratum korneum), jalur interseluler (difusi melalui matriks

lipid antar sel) dan jalur folikel rambut dan kelenjar keringat setelah absorpsi obat akan berikatan dengan target sel yang ada di permukaan kulit, didalam kulit atau berdifusi ke pembuluh darah kulit atau difusi ke hipodermis. pembuluh darah kapiler di epidermis merupakan tempat utama terjadinya absorpsi sistemik pada pemberian topikal sehingga dapat menimbulkan efek sistemik. Kemampuan dan kecepatan absorpsi obat yang di aplikasikan di kulit dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : Variasi ketebalan stratum korneum pada organ tidak sama, seperti pada skrotum, wajah, dan kulit kepala lebih permeabel daripada telapak tangan. Dalam hal ini stratum korneum membatasi difusi obat menuju epidermis dan dermis.

Pada daerah yang tipis memerlukan jumlah obat yang lebih sedikit untuk menimbulkan efek yang sama.

a. Gradien konsentrasi. Semakin tinggi gradien konsentrasi semakin tinggi pula kemampuan transfer obat per satuan waktu.

b. Stratum korneum dapat pula berfungsi sebagai reservoir beberapa obat sehingga waktu paruh lokalnya panjang dan dapat terjadi efek obat masih berlangsung walaupun aplikasi topikal sudah dihentikan. Pada kondisi seperti ini pemberian obat topikal cukup sekali sehari, misalnya kortikosteroid yang diaplikasikan sehari sekali sama efektifnya dengan aplikasi beberapa kali. Pada kondisi dimana stratum korneum abnormal dan fungsi barrier berubah. Maka akan terjadi peningkatan absorpsi percutan.

c. Sifat fisiko kimia obat : kelarutan dalam lemak akan lebih mudah untuk berdifusi, demikian juga obat yang mudah penetrasi di stratum korneum adalah dengan berat molekul ≤ 500 Da.

d. Vehikulum : vehikulum sebagai bahan pembawa obat berperan untuk mempermudah absorpsi obat yang diberikan percutan sehingga mencapai tempat

kerjanya dengan efektif. Pemilihan vehikulum yang tepat menyebabkan obat mampu Penetrasi di lapisan luar kulit dengan maksimal. Selain itu efek vehikulum yang melembabkan ataupun mengeringkan akan memberikan efek terapi (Cholis.2013).

D. Luka

Luka adalah suatu keadaan ketidaksinambungan atau terputusnya keutuhan jaringan yang disebabkan kekerasan. Kekerasan dapat bersifat mekanik (benda tumpul, benda tajam, senjata api), fisika (suhu, listrik dan petir, perubahan tekanan udara, akustik, radiasi), dan kimia (asam/basa kuat) Budiningsih. 2014).

Klasifikasi Luka dapat dibedakan menjadi akut dan kronis berdasarkan lama penyembuhannya. Luka akut adalah penyembuhan luka yang terjadi dalam 2-3 minggu. Sedangkan luka kronis adalah segala jenis luka yang tidak ada tanda-tanda sembuh dalam jangka waktu lebih dari 4-6 minggu (Kartika. 2015).

1. Luka akibat benda tumpul

a. Memar

Luka memar atau disebut juga kontusio merupakan perdarahan dalam jaringan dibawah kulit akibat pecahnya kapiler dan vena. Letak, bentuk, dan luas memar dipengaruhi besarnya kekerasan, jenis benda penyebab, kondisi dan jenis jaringan, usia jenis kelamin, komposisi tubuh, corak dan warna kulit, kerapuhan pembuluh darah, dan penyakit.

b. Luka Lecet

Luka lecet terjadi akibat epidermis yang bersentuhan dengan benda yang permukaannya kasar atau runcing.

c. Luka Robek

Luka robek adalah suatu luka terbuka akibat kekerasan tumpul yang kuat sehingga melampaui elastisitas kulit atau otot. Ciri dari luka robek adalah tepi tidak

rata, bentuk tidak beraturan, akar rambut tampak hancur, dan seringkali ada luka lecet atau memar di sekitarnya (Budiningsih. 2014).

2. Luka Akibat Benda Tajam

Luka terbuka yang terjadi akibat benda dengan sisi tajam atau ujung runcing, tampak memiliki tepi dan dinding luka yang rata, berbentuk garis dan dasar luka berbentuk garis atau titik. Jenis luka benda tajam antara lain (Budiningsih. 2014).

a. Luka Bacok

Luka bacok memiliki kedalaman luka sama dengan panjang luka, arah kekerasan miring dengan kulit.

b. Luka Tusuk

Kedalaman luka lebih dari panjang luka, arah kekerasan tegak lurus dengan kulit.

c. Luka Tangkis

Akibat perlawanan korban dan lukanya terdapat di bagian ekstremitas.

d. Luka Sayat

Luka lebar dengan tepi dangkal, arah luka sejajar dengan kulit (Budiningsih. 2014)

Luka bisa diklasifikasikan berdasarkan struktur anatomis, sifat, proses penyembuhan, dan lama penyembuhan. Luka dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kontaminasi :

a. Clean Wounds (Luka bersih), yaitu luka bedah tak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan (inflamasi) dan infeksi pada sistem pernafasan, pencernaan, genital dan urinary tidak terjadi kemungkinan terjadinya infeksi luka sekitar 1% - 5%.

b. Clean-contaminated Wounds (Luka bersih terkontaminasi), merupakan luka pembedahan dimana saluran respirasi, pencernaan, genital atau perkemihan dalam kondisi terkontrol, kontaminasi tidak selalu terjadi, kemungkinan timbulnya infeksi luka adalah 3% - 11%.

c. Contaminated Wounds (Luka terkontaminasi), termasuk luka terbuka, fresh, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau atau kontaminasi dari saluran cerna, pada kategori ini juga termasuk insisi akut, inflamasi nonpurulen. Kemungkinan infeksi luka 10% - 17%.

d. Dirty or Infected Wounds (Luka kotor atau infeksi), yaitu luka yang terinfeksi oleh mikroorganisme. Kontaminasi luka pasca bedah jarang terjadi, kebanyakan kontaminasi pasca operasi terjadi selama pembedahan sehingga dapat di katakan bahwa umumnya infeksi berasal dari operasinya. Dalam hal itu, terdapat faktor penyebab dari penderita maupun dari pihak teknik penanganan. Faktor penyebab infeksi dari pihak penderita ditentukan oleh jenis operasi yang dijalani. Secara umum, resiko terjadinya infeksi luka operasi dipengaruhi oleh keterampilan dokter bedah, penyakit yang diderita pasien (contohnya diabetes, obesitas) atau usia tua, serta waktu pemberian antibiotik profilaksis yang kurang tepat (Suryana. 2014).

Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka

a. Stadium I : Luka Superfisial (“Non-Blanching Erythema) : yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit.

b. Stadium II : Luka “Partial Thickness” : yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.

c. Stadium III : Luka “Full Thickness” : yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah

tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fascia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak sekitarnya.

d. Stadium IV : Luka “Full Thickness” yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas (Suryana. 2014).

E. LUKA SAYAT

Luka sayat merupakan suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan tubuh yang disebabkan oleh benda tajam. Luka sayat merupakan jenis luka akut. Luka sayat dapat menimbulkan pendarahan yang melibatkan peran hemostatis dan akhirnya terjadi peradangan. Penyembuhan luka adalah suatu kualitas dari kehidupan jaringan hal ini juga berhubungan dengan regenerasi jaringan. Fase penyembuhan luka digambarkan seperti yang terjadi pada luka pembedahan terdiri dari fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi.

Secara umum, fisiologi penyembuhan luka dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu:

1. Tahap Inflamasi

Definisi radang ialah reaksi pertahanan jaringan hidup terhadap semua bentuk luka dengan melibatkan fungsi darah dan pembuluh darah, saraf, limfa, cairan serta sel-sel di sekitar luka. Proses ini akan memusnahkan, melarutkan atau membatasi agen-agen penyebab infeksi sekaligus merintis jalan untuk proses perbaikan atau pemulihan terhadap jaringan yang rusak. Infeksi ialah masuknya sejumlah mikroorganisme patogen pada daerah luka terutama pada luka yang terbuka sehingga menimbulkan akibat yang lebih buruk.

Pada radang akut, respon relatif singkat, berlangsung hanya beberapa jam atau hari setelah terjadinya luka. Reaksi radang biasanya diikuti dengan dengan rasa

nyeri, panas, merah, bengkak dan gangguan fungsi pada daerah sekitar luka kadang-kadang disertai juga dengan demam. Hal tersebut diakibatkan oleh 3 komponen radang yaitu : (1) perubahan penampang pembuluh darah (vasodilatasi) yang mengakibatkan peningkatan aliran darah di sekitar luka, (2) perubahan struktural pada kapiler yang memungkinkan protein plasma serta leukosit keluar dari pembuluh darah dan (3) terjadinya agregasi leukosit di daerah luka. Cairan yang kaya protein serta leukosit yang tertimbun di ruang ekstra vaskuler di daerah luka sebagai akibat reaksi radang disebut eksudat. Tahapan reaksi radang sebagai berikut:

1) Infeksi, merupakan proses masuknya sejumlah mikroorganisme patogen ke daerah luka dengan demikian keadaan luka menjadi aseptis. Sejumlah mikroorganisme patogen tersebut akan memasuki jaringan melalui daerah yang terbuka akibat luka.

2) Reaksi Sistem Komplemen, Glikoprotein permukaan sel mikroorganisme yang masuk ke daerah luka akan mengaktifkan serangkaian sistem komplemen yang berakibat:

- Diproduksinya opsonin yang akan melekatkan mikroorganisme dengan leukosit sehingga mempermudah proses fagositosis.
- Dilepaskan histamin oleh mastosit (mast sel) yang menyebabkan vasodilatasi kapiler serta meningkatkan permeabilitas membran kapiler terhadap protein, akibatnya sejumlah protein plasma dan leukosit akan keluar dari kapiler darah.
- Diproduksinya chemotmin yang akan menarik leukosit menuju daerah infeksi.
- Dihasilkannya kinin yang memiliki fungsi seperti histamin namun mampu merangsang ujung-ujung reseptor saraf (reseptor rasil sakit dan gatal).

3) pergerakan fagosit, chemotaxin yang diproduksi komplemen disekitar luka akan menuntun leukosit terutama neutrofil dan monosit untuk berdiapedesis ke daerah luka.

2. Fase Proliferasi

Fase kedua ini berlangsung dari hari ke-3 atau 4 sampai hari ke-21 setelah pembedahan. Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan menyembuhkan luka dan ditandai dengan proliferasi sel. Peran fibroblas sangat besar pada proses perbaikan, yaitu bertanggung jawab pada persiapan menghasilkan produk struktur protein yang akan digunakan selama proses rekonstruksi jaringan. Pada jaringan lunak yang normal (tanpa perlukaan), pemaparan sel fibroblas sangat jarang dan biasanya bersembunyi di matriks jaringan penunjang. Sesudah terjadi luka, fibroblas akan aktif bergerak dari jaringan sekitar luka ke dalam daerah luka, kemudian akan berkembang (proliferasi) serta mengeluarkan beberapa substansi (*kolagen, elastin, hyaluronic acid, fibronectin dan proteoglycans*) yang berperan dalam membangun (rekonstruksi) jaringan baru.

Fungsi kolagen yang lebih spesifik adalah membentuk cikal bakal jaringan baru (*connective tissue matrix*) dan dengan dikeluarkannya substrat oleh fibroblast, memberikan tanda bahwa makrofag, pembuluh darah baru dan juga fibroblas sebagai satu kesatuan unit dapat memasuki kawasan luka. Sejumlah sel dan pembuluh darah baru yang tertanam di dalam jaringan baru tersebut disebut sebagai jaringan granulasi, sedangkan proses proliferasi fibroblas dengan aktifitas sintetikanya disebut fibroplasia.

Respons yang dilakukan fibroblas terhadap proses *fibroplasia* adalah:

- a. Proliferasi
- b. Migrasi

c. Deposit jaringan matriks

d. Kontraksi luka

Angiogenesis suatu proses pembentukan pembuluh kapiler baru didalam luka, mempunyai arti penting pada proses penyembuhan luka. Kegagalan vaskuler akibat penyakit (diabetes), pengobatan (radiasi) atau obat (preparat steroid) mengakibatkan lambatnya proses sembuh karena terbentuknya ulkus yang kronis. Jaringan vaskuler yang melakukan invasi kedalam luka merupakan suatu respons untuk memberikan oksigen dan nutrisi yang cukup di daerah luka karena biasanya pada daerah luka terdapat keadaan hipoksik dan turunnya tekanan oksigen. Pada fase ini fibroplasia dan angiogenesis merupakan proses terintegrasi dan dipengaruhi oleh substansi yang dikeluarkan oleh platelet dan makrofag (*growth factors*).

Proses selanjutnya adalah epitelisasi, dimana fibroblas mengeluarkan *keratinocyte growth factor* (KGF) yang berperan dalam stimulasi mitosis sel epidermal. Keratinisasi akan dimulai dari tepi luka dan akhirnya membentuk barrier yang menutupi permukaan luka. Dengan sintesa kolagen oleh fibroblas, pembentukan lapisan dermis ini akan disempurnakan kualitasnya dengan mengatur keseimbangan jaringan granulasi dan dermis. Untuk membantu jaringan baru tersebut menutup luka, fibroblas akan merubah strukturnya menjadi myofibroblast yang mempunyai kapasitas melakukan kontraksi pada jaringan. Fungsi kontraksi akan lebih menonjol pada luka dengan defek luas dibandingkan dengan defek luka minimal. Fase proliferasi akan berakhir jika epitel dermis dan lapisan kolagen telah terbentuk, terlihat proses kontraksi dan akan dipercepat oleh berbagai growth factor yang dibentuk oleh makrofag dan platelet.

M A K A S S A R

3. Fase maturasi

Fase maturasi dimulai hari ke-21 dan berakhir 1-2 tahun setelah pembedahan. Fibroblast terus mensintesis kolagen. Kolagen menjalin dirinya, menyatukan dalam struktur yang lebih kuat. Bekas luka menjadi kecil, kehilangan elastisitas dan meninggalkan garis putih. Tujuan dari fase maturasi adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu.

Fibroblas sudah mulai meninggalkan jaringan granulasi, warna kemerahan dari jaringan mulai berkurang karena pembuluh mulai regresi dan serat fibrin dari kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan parut. Kekuatan dari jaringan parut akan mencapai puncaknya pada minggu ke-10 setelah perlukaan. Sintesa kolagen yang telah dimulai sejak fase proliferasi akan dilanjutkan pada fase maturasi. Kecuali pembentukan kolagen juga akan terjadi pemecahan kolagen oleh enzim kolagenase. Kolagen muda (*gelatinous collagen*) yang terbentuk pada fase proliferasi akan berubah menjadi kolagen yang lebih matang, yaitu lebih kuat dan struktur yang lebih baik (proses remodelling).

Untuk mencapai penyembuhan yang optimal diperlukan keseimbangan antara kolagen yang diproduksi dengan yang dipecahkan. Kolagen yang berlebihan akan terjadi penebalan jaringan parut atau *hypertrophic scar*, sebaliknya produksi yang berkurang akan menurunkan kekuatan jaringan parut dan luka akan selalu terbuka. Luka dikatakan sembuh jika terjadi kontinuitas lapisan kulit dan kekuatan jaringan kulit mampu atau tidak mengganggu untuk melakukan aktivitas yang normal. Meskipun proses penyembuhan luka sama bagi setiap penderita, namun hasil yang dicapai sangat tergantung dari kondisi biologik masing-masing individu, lokasi serta luasnya luka (Cholis. 2013).

F. Minyak Atsiri

Minyak atsiri sudah dikenal sejak 3000 tahun yang lalu dan sudah digunakan serta dipelajari sejak lama. Pada awalnya minyak atsiri digunakan oleh bangsa Mesir sebagai bahan ritual dan obat-obatan pada bidang kedokteran dan terus berkembang hingga ke berbagai negara seperti Cina, Iran dan India. Menurut sejarah minyak atsiri dihasilkan sebagai bahan dasar dari parfum pada abad ke 13 dan perkembangan teknologi dan inovasi, minyak atsiri terus berkembang sampai penggunaannya sebagai bahan dasar makanan, kosmetik dan juga obat-obatan. Minyak atsiri dikenal dengan penggunaannya sebagai bahan dasar anti mikroba dan juga aroma terapi yang digunakan dengan cara hidrodistilasi atau ekstraksi dengan menggunakan uap air, beberapa teknik dan metode untuk mengekstrak minyak nilam sudah dikenal sejak lama. Kedua metode tersebut menggunakan air sebagai pelarut yang diuapkan secara konveksi dan atau kondensasi, dan pemisahan minyak atsiri dengan air biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama dapat mencapai 10 jam, metode ini membutuhkan energi yang sangat besar dan akan 1siri pada umumnya memiliki struktur molekul yang mudah menguap atau dikenal dengan volatil yang berasal dari ikatan turunan dari beberapa tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri tersebut, memiliki lebih dari seratus aroma dan ikatan kimia yang dijadikan dasar dari karakteristik aroma alami. Tujuan dari ekstraksi minyak atsiri ini adalah memanfaatkan produk yang alami sebagai bahan dasar dalam proses pengolahan aroma pada beberapa produk olahan (Sulaiman. 2014).

Minyak atsiri juga dapat digunakan sebagai bahan dasar campuran kertas, sebagai pengharum. Minyak atsiri dapat dihasilkan dari beberapa tumbuhan baik dalam bentuk batang, daun, akar dan bunga. Seiring dengan perkembangan terutama di daerah tropis, tumbuhan minyak atsiri yang dikembangkan di dunia saat ini

mencapai 65 % yang dikembangkan oleh India, Cina, Brazil, Indonesia, Meksiko, Mesir dan Maroko. Amerika merupakan salah satu negara produsen minyak atsiri terbesar untuk bahan baku mints. Permintaan minyak atsiri saat ini terhadap industri umum sebesar 60 %, industri flavor 20 %, dan industri kedokteran 20 %. Industri minyak atsiri juga terus berkembang seiring dengan teknologi yang berkembang dan menemukan metode-metode baru dalam mengekstrak minyak atsiri untuk menghasilkan minyak yang optimum.

Berbagai metode dan cara untuk mengekstraksi minyak atsiri dari beberapa tumbuhan aromatik yang telah banyak dilakukan melalui beberapa penelitian. Adapun metode yang pernah digunakan adalah metode uap atau hidrodistilasi, dan beberapa metode yang serupa seperti ekstraksi sokhlet dengan menggunakan pelarut organik, dengan tekanan dan distilasi uap lainnya. Kehilangan beberapa ikatan volatil dalam proses ekstraksi merupakan salah satu faktor penting, lama proses ekstraksi, efisiensi ekstraksi, degradasi komponen pada saat ekstraksi dan metode ekstraksi yang tepat pada bahan baku. Pemisahan minyak atsiri dari beberapa campuran molekul yang kompleks, dapat dipisahkan dengan kromatografi distilasi, dan ekstraksi dengan pelarut.

Molekul utama adalah 95 % senyawa terpen, alkohol dan berbagai molekul organik lainnya. Minyak atsiri dapat dikelompokkan secara homogen yang sifat fisiknya sebagai berikut: keadaan cair, volatilitas, pucat kuning, indeks bias biasanya tinggi, polaritas rendah, kerentanan terhadap oksidasi, dan juga cenderung polimerisasi untuk membentuk produk resin. Minyak atsiri mengandung banyak bahan kimia yang berbeda-beda sesuai dengan proporsi asal-usulnya dan diklasifikasikan menjadi dua kelompok: hidrokarbon terpen (monoterpen,

seskuiterpen), produk oksigen sebagai senyawa aromatik (alkohol, ester, eter) jenis fenilpropanoid (Sulaiman. 2014).

Minyak atsiri yang dikenal juga dengan nama minyak eteris atau minyak terbang dihasilkan oleh tanaman. Minyak tersebut mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir, berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya, umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Minyak atsiri merupakan salah satu jenis minyak nabati multifungsi, karakteristik fisiknya berupa cairan kental yang dapat disimpan pada suhu ruang. Bahan baku minyak ini diperoleh dari berbagai tanaman seperti daun, bunga, biji, kulit biji, batang akar atau rimpang. Salah satu ciri minyak atsiri yaitu mudah menguap dan beraroma khas (Sulaiman. 2014).

Sifat-sifat minyak atsiri diantaranya:

- a. Tersusun oleh bermacam-macam komponen kimia
- b. Memiliki bau khas
- c. Bersifat tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan, baik pengaruh oksigen udara, sinar matahari dan panas karena terdiri dari bagian macam komponen penyusun.
- d. Indeks bias umumnya tinggi.
- e. Pada umumnya tidak dapat bercampur dengan air, tapi cukup dapat larut sehingga dapat memberikan baunya kepada air walaupun kelarutannya sangat kecil.
- f. Sangat mudah larut dengan pelarut organik (Sulaiman. 2014).

G. METODE EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI

1. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa dari matriks atau simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Peran ekstraksi dalam analisis fitokimia sangat penting karena sejak tahap awal hingga akhir menggunakan proses ekstraksi, termasuk fraksinasi dan pemurnian. Ada beberapa istilah yang banyak digunakan dalam ekstraksi, antara lain ekstrak (yakni, pelarut yang digunakan untuk ekstraksi), rafinat (yakni, larutan senyawa atau bahan yang akan diekstraksi), dan linarut (yakni, senyawa atau zat yang diinginkan terlarut dalam rafinat). Metode ekstraksi yang digunakan tergantung pada jenis, sifat fisik, dan sifat kimia kandungan senyawa yang akan diekstraksi (Hanani. 2015).

Ekstrak adalah sediaan cair, kental atau kering yang merupakan hasil proses ekstraksi atau penyarian suatu matriks atau simplisia menurut cara yang sesuai. Ekstrak cair diperoleh dari ekstraksi yang masih mengandung sebagian besar cairan penyari. Ekstrak kental akan didapat apabila sebagian besar cairan penyari sudah diuapkan, sedangkan ekstrak kering akan diperoleh jika sudah tidak mengandung cairan penyari (Hanani. 2015).

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung (Hanani. 2015).

2. Penyulingan (destilasi)

Secara umum penyulingan adalah pemisahan komponen-komponen suatu campuran dari dua jenis cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap dari masing-masing zat tersebut. Penyulingan minyak nilam adalah suatu proses pengambilan minyak dari terna kering dengan bantuan air, dimana minyak dan air tidak tercampur. Proses penyulingan sangat penting diketahui oleh para penghasil minyak atsiri. Pada dasarnya terdapat dua jenis penyulingan. Yang pertama penyulingan suatu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur, hingga membentuk dua fase atau dua lapisan. Keadaan ini terjadi pada pemisahan minyak atsiri dengan uap air. Penyulingan dengan uap air sering disebut juga hidrodestilasi. Pengertian umum ini memberikan gambaran bahwa penyulingan dapat dilakukan dengan cara mendidihkan bahan tanaman atau minyak atsiri dengan air. Pada proses ini akan dihasilkan uap air yang dibutuhkan oleh alat penyuling. Uap air tersebut dapat juga dihasilkan dari alat pembangkit uap air yang terpisah (Sahwalita, 2016).

Yang kedua penyulingan suatu cairan yang tercampur sempurna hingga hanya membentuk satu fasa. Pada keadaan ini pemisahan minyak atsiri menjadi beberapa komponennya, sering disebut fraksinasi, tanpa menggunakan uap air. Minyak atsiri, minyak mudah menguap, atau minyak terbang merupakan campuran dari senyawa yang berwujud cairan atau padatan yang memiliki komposisi maupun titik didih yang beragam, penyulingan dapat didefinisikan sebagai proses pemisahan komponen-komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen senyawa tersebut.

Proses penyulingan sangat penting diketahui oleh para penghasil minyak atsiri. Penyulingan suatu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling

bercampur, hingga membentuk dua fase atau dua lapisan. Keadaan ini terjadi pada pemisahan minyak atsiri dengan uap air. Penyulingan dengan uap air sering disebut *hidrodestilasi*. Pengertian umum ini memberikan gambaran bahwa penyulingan dapat dilakukan dengan cara mendidihkan bahan tanaman atau minyak atsiri dengan air. Pada proses ini akan dihasilkan uap air yang dibutuhkan oleh alat penyuling (Sahwalita. 2016).

Dalam pengertian industri minyak atsiri dibedakan tiga tipe hidrodestilasi, yaitu:

a. Penyulingan Air

Bila cara ini digunakan maka bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. bahan yang akan disuling kemungkinan mengapung di atas air atau terendam seluruhnya, tergantung pada berat jenis dan kuantitas bahan yang akan diproses. Air dapat dididihkan dengan api secara langsung. Penyulingan air ini tidak ubahnya bahan tanaman direbus secara langsung.

b. Penyulingan uap dan air

Bahan tanaman yang akan diproses secara penyulingan uap dan air ditempatkan dalam suatu tempat yang bagian bawah dan tengah berlobang-lobang yang ditopang di atas dasar alat penyulingan. Bagian bawah alat penyulingan diisi air sedikit di bawah dimana bahan ditempatkan. Bahan tanaman yang akan disuling hanya terkena uap, dan tidak terkena air yang mendidih.

c. Penyulingan uap

Uap yang digunakan lazim memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan atmosfer dan dihasilkan dari hasil penguapan air yang berasal dari suatu pembangkit uap air. Uap air yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam alat penyulingan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang menyolok pada ketiga alat

penyulingan tersebut. Namun demikian pemilihan tergantung pada cara yang digunakan, karena reaksi tertentu dapat terjadi selama penyulingan (Julianto.2016).

H. Kedudukan Obat Dalam Islam

Obat atau syifa merupakan zat yang berfungsi untuk memberikan suplemen bagi tubuh untuk meregenerasi sel yang rusak dan menyembuhkan penyakit. Perkembangan zaman juga meningkatkan jumlah penyakit yang menyerang manusia. Penyakit tertentu ada yang sudah diketahui obatnya dan ada pula yang belum diketahui. Namun, Allah tidak akan memberikan cobaan pada hamba-Nya melewati batas kemampuan mereka. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Seperti sabda Rasulullah Saw Islam sangat menganjurkan untuk memperhatikan tentang pengobatan baik dari segi keharusan berobat dan hukum bahan – bahan yang digunakan dalam berobat. Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, dengan munculnya berbagai penyakit dikalangan masyarakat maka masyarakat dituntut untuk menggunakan akal pikirannya yang juga merupakan pemberian dari sang khalik.

Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syu' araa/ 26 ayat 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Kementrian Agama RI. 2012: 368).

M A K A S S A R

Dalam Q.S. Al An'aam/6 : 99 disebutkan pula bahwa:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“ Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Kementerian Agama RI. 2012: 141).

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami adanya perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang mana dapat diartikan sebagai perintah untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan tumbuhan yang ada tersebut. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah Nilam yang bermanfaat bagi makhluk hidup, yang dapat digunakan sebagai obat luka sayat. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit dan ini merupakan anugrah Allah SWT yang harus dipelajari dan dimanfaatkan seperti disebutkan dalam Q.S Al-Qashash/ 28:57.

وَقَالُوا إِن نَّبِعِ أَهْدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمَ نُمْكِنَ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا مُّجَبِّيًا
 إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Dan mereka berkata: "Jika Kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya Kami akan diusir dari negeri kami". dan Apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam

(tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Kementrian Agama RI. 2012: 393).

Ayat diatas menyatakan bahwa sebagian diantara kaum musyrikin itu ada yang mengatakan:” Mengapa tidak diberikan kepadanya seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu dan ada juga diantara mereka berkata:” jika kami mengikuti secara bersungguh-sungguh petunjuk itu, yakni agama islam, dengan mengesahkan Allah dan meninggalkan penyembahan Tuhan yang disembah leluhur kami serta bergabung bersamamu, wahai Nabi Muhammad, yang ajaranmu sangat berbeda dengan kepercayaan masyarakat Arab,niscaya kami akan diculik, yakni ditawan dan diusir oleh orang-orang Arab itu, dari negeri kami, yakni Mekkah. Harta dan kekuasaan kami kan dirampas. Bahkan, boleh jadi kami dibunuh karena mayoritas masyarakat menentang ajaranmu, sedang kami adalah kaum lemah yang tidak mampu melawan mereka (Shihab.2002:628).

Mereka semua tahu wahai Nabi Muhammad saw., bahwa Kami melindungimu bersama pengikut-pengikutmu walau engkau membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran masyarakat Arab itu? Dan, di sisi lain, bagaimana mereka berucap demikian padahal tidakkah Kami meneguhkan buat mereka dengan peneguhan yang demikian mantap,yaitu menjadikan wilayah tempat tinggal mereka sebagai Haram, yakni tanah suci Mekkah yang aman dari penganiayaan dan pembunuhan, bahkan lebih dari itu, terus-menerus dan senantiasa sepanjang waktu dihimpun, yakni didatangkan, kesana secara khusus buah-buahan dari segala sesuatu, yakni segala macam tumbuh-tumbuhan, sebagai rezeki dari sisi Kami untuk semua yang tinggal disana kendati mereka kafir? Jika demikian, bagaimana mungkin Allah mencabut rasa aman dari mereka dan menjadikan mereka terkucil dan terbunuh apabila mereka beriman dan memeluk ajaran-Nya yang mereka sadari bahwa ajaran itu baik dan benar? Sungguh, dalih mereka tidak logis dan apa yang mereka

khawatirkan tidak akan terjadi, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Shihab.2002:628-629).

Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan-bahan obat-obatan.

Tumbuhan adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah swt dengan hikmah dan takdir-Nya. Potensi tumbuhan adalah melawan penyakit, zat perusak dan membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri sehingga mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut (Rahman. 2007:5). Dan salah satu menjadi acuan adalah daun Nilam (*Pogoestemon cablin Benth*) sebagai penyembuhan luka sayat dimana mencit sebagai hewan percobaan.

Pengetahuan yang akan menuntut manusia untuk menemukan obat-obat yang tersedia di alam, seperti obat dari tanaman. Jika manusia tidak mengembangkan ilmu pengetahuan maka tidak akan pernah mengetahui adanya obat yang berasal dari tanaman yang ada disekeliling kita.

Dalam penelitian ini, maka ditemukanlah daun nilam (*Pogostemon cablin Benth*) sebagai penyembuh luka sayat yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah eksperimen laboratorium (Siswanto. 2015).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Fitokimia UNHAS, dan laboratorium Biologi farmasi UIN Alauddin Makassar.

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia UNHAS untuk melaksanakan proses pengolahan sampel daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) sampai didapatkan minyak Nilam (*Pogostemon cablin* Benth). Kemudian peneliti juga menggunakan Laboratorium Farmasi UIN Alauddin Makassar untuk melakukan Uji Farmakologi.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Riset kualitatif adalah riset yang didasarkan pada data kualitatif dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat (Siswanto. 2015).

C. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) yang diambil di daerah Taccipi Kampung Baru, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattingge Kabupaten Bone.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan antara lain adalah alat cukur bulu[®] *Ilette*, gelas kimia[®] *Pyrex*, penggaris, pisau bedah, botol coklat, erlenmeyer[®] *Pyrex*, corong pisah[®] *Pyrex*, gunting, kondensor[®] *Pyrex*, labu destilasi[®] *Pyrex*, statif klem, silet, tisu, mantel pemanas, pompa air.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah Alkohol 70%, eter, cottonbud, hewan uji Mencit Jantan (*Mus musculus*), kain kasa, kapas, minyak nilam (*Pogostemon cablin* Benth), Tween 80, plaster, Povidon Iodin[®].

E. Metode Pengumpulan Data

1. Pemilihan dan penyiapan hewan coba

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (*Mus musculus*) yang sehat dengan bobot badan rata-rata 20-30 gram, digunakan sebanyak 21 ekor yang dibagi ke dalam 7 kelompok perlakuan, dimana tiap kelompok perlakuan terdiri dari 3 ekor mencit jantan. Terlebih dahulu diadaptasikan selama 7 hari lalu.

2. Pengolahan Sampel

a. Sampel

Daun Nilam sebanyak 5kg dicuci dengan air mengalir, dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan dilemari pengering kemudian dirajang. Distilasi minyak nilam dilakukan dengan metode distilasi air.

b. Destilasi air

Rangkai alat destilasi air. Siapkan statif dan klem, masukkan 50 gram sampel ke dalam labu, kemudian masukkan air lalu tutup bagian atas labu destilasi dengan aluminium foil. Kemudian letakkan labu destilasi pada mantel pemanas. Pasang kondensor pastikan air dingin mengalir dari bagian bawah keatas kondensor

lalu hubungkan lengan dari labu destilasi dengan kondensor. Pasang pipa penghubung atau adaptor untuk menghubungkan antara kondensor dengan wadah penampung destilat (erlenmeyer). Nyalakan pompa air agar air dingin mengalir ke kondensor. Atur suhu 40 °C pada mantel pemanas untuk menjalankan proses destilasi. Hasil destilasi (destilat) tertampung pada erlenmeyer. Hasil yang didapatkan dipisahkan antara minyak dan air dengan corong pisah.

3. Pengujian Efek Penyembuhan Luka Sayat

Pengujian efek penyembuhan luka sayat dilakukan perlakuan pada kelompok I minyak nilam 10%, kelompok II minyak nilam 20% , kelompok III minyak nilam 30%, kelompok IV minyak nilam 40%, kelompok V minyak nilam 50%, kelompok VI betadin (Povidon Iodin 10%), dan kelompok VII tween 80 dengan menggunakan hewan percobaan mencit Jantan (*Mus musculus*).

a. Pembuatan Luka Sayat

Kulit punggung mencit Jantan (*Mus musculus*) dicukur terlebih dahulu . Sebelum diberi luka sayat, kelinci dianastesi menggunakan eter dengan jalur inhalasi untuk mencegah mencit jantan memberontak dan mengeliat pada saat pemberian luka. Kemudian sebelum penyayatan dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol. Penyayatan pada punggung mencit (*Mus musculus*) dilakukan menggunakan pisau *scalpel* nomor 10 sepanjang 1 cm.

b. Uji perlakuan

Setelah pembuatan luka diberikan perlakuan pada masing-masing kelompok :

- Kelompok I : Dioleskan Minyak daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) dengan konsentrasi 10% sebanyak 1 ml.
- Kelompok II : Dioleskan Minyak daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) dengan konsentrasi 20% sebanyak 1 ml.
- Kelompok III : Dioleskan Minyak daun Nilam (*Pogostemon cablin*

Benth) dengan konsentrasi 30% sebanyak 1 ml.

- Kelompok IV: Dioleskan Minyak daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) dengan konsentrasi 40% sebanyak 1 ml.
- Kelompok V : Dioleskan Minyak daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) dengan konsentrasi 50% sebanyak 1 ml.
- Kelompok VI : Dioleskan Betadin (Povidon Iodin[®]10%) sebagai kontrol Positif sebanyak 1 ml.
- Kelompok VII : Dioleskan tween 80 sebagai kontrol negatif sebanyak 1 ml.

4. Pengolahan dan analisis Data

a. Teknik Pengolahan

Sasaran dilihat dari perubahan yang terjadi pada luka dan perubahan dari ukuran luka itu sendiri.

b. Analisis Data

Analisa data penelitian ini melalui Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan ANOVA (Analisis of Varians). Dimana RAL adalah jenis rancangan yang paling sederhana, dimana satuan percobaan yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Sedangkan ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Statistika inferensi adalah semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data (contoh) atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya (populasi).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada minyak daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) untuk penyembuhan luka sayat yang dilakukan pada punggung mencit Jantan (*Mus musculus*) diperoleh hasil:

Tabel 1. Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat (cm) Punggung Mencit Jantan Yang Diberi Ekstrak Minyak Daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) Dibandingkan Dengan Kontrol.

Hari ke	Minyak Nilam 10 %			Minyak Nilam 20 %			Minyak Nilam 30 %			Minyak Nilam 40 %			Minyak Nilam 50 %			Betadin (Povidon Iodin 10%)			Tween 80			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8	0,6	1	1	0,9	0,9
3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,9	0,9	0,8	0,8
4	0,8	0,7	0,8	0,6	0,5	0,7	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4	0,3	0,9	0,8	0,8	0,8
5	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,1	0,3	0,2	0,8	0,7	0,7	0,7
6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,2	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,3	0	0,2	0,1	0,6	0,7	0,5	0,5
7	0,5	0,4	0,5	0,4	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0	0,1	0	0,2	0	0,1	0	0,6	0,6	0,4	0,4
8	0,5	0,4	0,5	0,2	0	0,2	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,4	0,4
9	0,4	0,3	0,4	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,4	0,3	0,3
10	0,3	0,2	0,3	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,4	0,2	0,2
11	0,3	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,2	0,2
12	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,1	0,1
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. Persentase Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat (cm)

Hari ke	Minyak Nilam 10 %			Minyak Nilam 20 %			Minyak Nilam 30 %			Minyak Nilam 40 %			Minyak Nilam 50 %			Betadin (Povidon Iodin 10%)			Tween 80			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	10	10	10	20	10	100	20	10	10	20	10	10	10	20	30	20	40	0	0	10	
3	10	20	20	20	30	20	30	40	20	30	40	30	30	40	40	60	40	50	10	10	20	
4	20	30	20	40	50	30	50	60	40	50	50	40	40	50	50	70	60	70	10	20	20	
5	20	30	30	50	60	30	60	60	60	60	60	60	60	70	50	90	70	80	20	30	30	
6	30	40	40	50	80	40	80	70	60	80	60	80	80	90	70	100	80	90	40	30	50	
7	40	60	50	60	90	60	90	80	70	90	70	100	90	100	80	100	90	100	40	40	60	
8	50	60	50	80	100	80	100	90	80	100	90	100	100	100	100	100	100	100	50	50	60	
9	60	70	60	90	100	80	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	60	70	
10	70	80	70	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	60	80	
11	70	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	70	80	
12	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	90	
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	100	
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100	
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 3. Hubungan antar formula dan kecepatan luka tertutup 100%

Perlakuan	Hari Ke-n luka tertutup 100%			Jumlah	Rata-rata
	Replikasi				
	1	2	3		
Minyak Nilam 10%	13	11	12	36	12
Minyak Nilam 20%	10	8	11	29	9,6
Minyak Nilam 30%	8	9	9	26	8,6
Minyak Nilam 40%	8	9	8	25	6,3
Minyak Nilam 50%	8	7	8	23	7,6
Betadin (Povidon Iodin 10%)	6	7	8	21	7
Tween 80	14	15	13	42	14
Jumlah	67	66	69	202	67,1
Rata-rata	9,5	9,4	9,8	28,8	9,5

Tabel 4. Analisis Ragam Dengan Nilai F Tabel

Sumber Keragaman	Jumlah Kuadrat (JK)	Derajat Bebas (db)	Kuadrat Tengah (KT)	F-Hitung	F-Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	114,3	6	19,05	19,05 ^{**}	3,00	4,82
Ulangan	0,7	2	0,35	0,35 ^{ns}	3,89	6,93
Galat	12	12	1			
Total	127	20	20,4			

B. Pembahasan

Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik dan gigitan hewan. Proses penyembuhan luka yang sebenarnya adalah suatu proses yang terjadi secara normal. Artinya tubuh yang sehat mempunyai kemampuan alami untuk melindungi dan memulihkan dirinya. Peningkatan aliran darah ke daerah yang rusak, membersihkan sel dan benda asing dan perkembangan awal dari proses penyembuhan. Proses penyembuhan luka tidak hanya terbatas pada proses regenerasi yang bersifat lokal, tetapi juga sangat dipengaruhi dengan faktor umur, nutrisi dan pemakaian obat-obatan (Anik.2015).

Luka terbuka yang tidak diobati memiliki potensi untuk mengalami infeksi seperti gangren dan tetanus. Jika infeksi dibiarkan, akan menyebabkan kelumpuhan, infeksi kronik, infeksi tulang bahkan kematian. Oleh karena itu, penanganan yang tepat diperlukan untuk mengurangi terjadinya infeksi pada suatu luka. Luka infeksi merupakan penyakit yang paling sering ditemukan pada negara berkembang karena kebersihan yang buruk. Ketersediaan obat yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka masih terbatas meskipun perkembangan industri obat sudah sangat maju (Meenakshi et al. 2012).

Karakteristik luka sayat ada beberapa, yaitu luka sejajar, tidak adanya memar berdekatan tepi kulit, tidak adanya *bridging* (penghubung) jaringan memanjang dari satu sisi ke sisi lain dalam luka (Wyatt. 2011).

Metode yang dikembangkan berupa suatu produk atau stimulan terhadap proses biologis tubuh dalam mengkomposisi luka melalui beberapa tahapan: hemostatis, inflamasi, poliferasi remodelling. Penyembuhan luka menjadi hal

yang penting karena kulit memiliki fungsi spesifik bagi tubuh, yaitu protektif, sensorik, termoregulatorik, metabolik, dan sinyal seksual. Ketika terjadi luka maka fungsi-fungsi tersebut tidak dapat berjalan seperti seharusnya (Mescher, 2012).

Pada penelitian ini, sebelum diberikan perlakuan pada hewan coba, terlebih dahulu daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) dibuat dalam bentuk simplisia sebelum diolah menjadi minyak Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) kemudian dilakukan sortasi basah. Sortasi basah merupakan suatu proses pemisahan daun yang kualitasnya kurang baik seperti daun yang telah ditumbuhi jamur atau telah dimakan ulat. Setelah sortasi basah, daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) dicuci dengan air bersih dan mengalir. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel dipermukaan daun nilam. Setelah proses pencucian, rimpang ditiriskan lalu dikeringkan dijemari pengering. Salah satu tujuan pengeringan daun yaitu untuk mengurangi kadar air didalam daun, karena kadar air yang tinggi dapat membuat simplisia cepat rusak dan untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme pada simplisia.

Sampel yang kering kemudian diekstraksi dengan metode destilasi uap air, untuk menghasilkan minyak nilam sebagai zat aktif dalam penyembuhan luka. Alasan menggunakan metode destilasi uap air karena pada penelitian (Novita 2012) adalah untuk meningkatkan kualitas minyak nilam, antara lain adalah proses pembudidayaan tanaman nilam, teknik distilasi dan peralatan yang digunakan, perlakuan bahan baku, proses pemurnian minyak nilam serta pengemasan produk minyak nilam. Ada beberapa jenis metode yang bisa dilakukan untuk memisahkan atau mendapatkan minyak nilam, antara lain ekstraksi panas (destilasi uap air). Tetapi saat ini yang sering digunakan adalah penyulingan. Dari segi teknik distilasi yang digunakan, dengan menggunakan metode distilasi uap-air (*steam-hydro distillation*) dapat dihasilkan rendemen minyak nilam yang lebih bagus dibandingkan dengan metode konvensional yang menggunakan distilasi air (*water distillation*). Selain itu, diperlukan juga kondisi operasi dan desain alat yang optimal sehingga didapatkan minyak nilam yang memiliki kualitas yang baik. Penelitian (Widyastuti,

2014) untuk mendapatkan minyak nilam yang baik juga menggunakan metode destilasi uap air.

Mencit yang digunakan terlebih dahulu diadaptasikan dengan lingkungannya selama satu minggu. Mencit yang digunakan pada penelitian ini adalah mencit jantan (*Mus musculus*) karena mudah diperoleh, mudah ditangani, dan memiliki sistem hormonal yang stabil karena tidak dipengaruhi oleh adanya siklus menstruasi dan kehamilan seperti pada mencit betina (Tiesnamurti. 2016).

Sebelum pengujian kulit punggung mencit Jantan (*Mus musculus*) dicukur terlebih dahulu. Sebelum diberi luka sayat, mencit dianastesi menggunakan eter dengan jalur inhalasi untuk mencegah mencit jantan memberontak dan stress pada saat pemberian luka. Kemudian sebelum penyayatan dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol 70%. Penyayatan pada punggung mencit (*Mus musculus*) dilakukan menggunakan pisau *scalpel* nomor 10 sepanjang 1 cm sedalam 1mm.

Setelah itu dilakukan pengujian pada hewan coba dimaksudkan untuk melihat aktivitas penyembuhan luka sayat pada mencit Jantan (*Mus musculus*) yang sudah digunakan secara empiris oleh masyarakat didaerah Bone Sulawesi Selatan. Mencit Jantan (*Mus musculus*) yang digunakan memiliki berat rata-rata 20-30 gram yang terdiri 21 ekor dibagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok terdapat tiga mencit Jantan (*Mus musculus*) dan memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Kelompok pertama diberikan perlakuan minyak Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) 10%, kelompok kedua diberikan perlakuan minyak Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) 20%, kelompok ketiga diberikan perlakuan sampel minyak Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) 30%, kelompok keempat diberikan perlakuan sampel minyak Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) 40%, kelompok kelima diberikan perlakuan minyak Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) 50%, kelompok keenam diberikan betadin (Povidon iodine 10%) sebagai kontrol positif, dan kelompok ketujuh tween 80 sebagai kontrol negatif. Diberikan masing-masing 1 ml sampel pada punggung kelinci yang terlebih dahulu sudah diberikan sayatan. Setelah itu diperhatikan perubahan panjang

luka yang terjadi setiap hari. Perkembangan pengamatan diamati setiap hari sampai luka tertutup sempurna.

Dalam penelitian ini juga digunakan *Povidone iodine* sebagai kontrol positif. *Povidone iodine* merupakan salah satu pengobatan luka secara kimiawi yang sering kali digunakan dalam penyembuhan luka yang memiliki efek antimikroba, menciptakan lingkungan lembab, dan dapat menginduksi angiogenesis (Sammartino. 2012). Namun *povidone iodine* menimbulkan banyak efek samping, diantaranya iododerma dan reaksi anafilaksis (Castelain. 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan obat alternatif lain untuk pengobatan luka.

Dalam hasil pengamatan diperoleh data perubahan panjang luka sayat dengan menghitung rata-rata perubahan panjang luka sayat dengan interval waktu pengukuran setiap 24 jam.

Pengobatan luka sayat dengan menggunakan minyak nilam dilakukan secara topikal dengan frekuensi satu kali hingga terjadi kesembuhan pada luka sayat. Terjadinya kesembuhan pada luka sayat ditandai dengan merapatnya kulit, kekeringan luka dan keropeng disekitar luka terkelupas dengan sendirinya. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan hingga luka tertutup sempurna (Hillary. 2016).

Aktivitas dalam mempercepat waktu penyembuhan luka juga dipengaruhi oleh kemampuan minyak daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) menghambat bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* yang merupakan bakteri penyebab infeksi. Sehingga kemungkinan terjadinya infeksi berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma 2017 menunjukkan bahwa selama penelitian berlangsung sayatan luka yang diberi minyak zaitun lebih cepat sembuh dengan kondisi luka tanpa meninggalkan bekas luka. Namun terdapat sayatan luka yang belum sembuh dengan kondisi luka kering dan berwarna merah pucat. Sedangkan yang sayatan luka yang diberi povidone iodine lebih lama sembuh dengan meninggalkan bekas luka. Begitu juga dengan hal yang sama terdapat sayatan luka yang belum sembuh dengan kondisi luka kering tetapi berwarna coklat kehitaman. Minyak Zaitun lebih cepat penyembuhan luka sayat/robek tanpa meninggalkan bekas

luka. Kondisi tikus dengan perlakuan minyak zaitun (*Olive Oil*). Pada tikus dengan perlakuan pemberian minyak zaitun (*Olive Oil*) kulit menjadi normal pada hari ke 4 dan tikus dengan perlakuan pemberian povidone iodine menjadi normal pada hari ke 7. Minyak zaitun lebih cepat dalam penyembuhan luka dikarenakan minyak zaitun mengandung vitamin K yang membantu dalam proses pengeringan luka, vitamin C yang berperan dalam pembentukan sel darah merah, oleochantal yang berperan dalam mengurangi bekas luka dan vitamin E yang berperan dalam mengatur kelembaban kulit dan mencegah terjadinya infeksi.

Berdasarkan hasil penelitian untuk luka tertutup 100% pada penggunaan masing-masing perlakuan juga menunjukkan perbedaan waktu. Hal ini terlihat dari analisis statistik Anova secara Rancangan Acak Lengkap (RAL) hubungan antara perlakuan dan kecepatan luka tertutup 100% dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 5 % dan 1%, ini berarti terdapat perbedaan waktu penyembuhan luka 100% yang sangat berbeda nyata atau sangat signifikan dari penggunaan masing-masing perlakuan. Dan pada masing-masing ulangan dimana $F_{hitung} < F_{Tabel}$ pada taraf kepercayaan 5% dan 1% ini berarti tidak terdapat perbedaan waktu penyembuhan luka pada tiap ulangan.

Pada tabel uji BNT (Beda Nyata Terkecil) didapatkan hasil kelompok ekstrak minyak daun Nilam (*Pogoestemon cablin* Benth) 50% memberikan efek penyembuhan yang tidak berbeda nyata (Non Signifikan) terhadap pemberian Betadin (Povidon iodine 10%). Ekstrak minyak daun Nilam (*Pogoestemon cablin* Benth) 40% memberikan efek penyembuhan yang tidak berbeda nyata (Non Signifikan) terhadap pemberian ekstrak minyak nilam 50%. Ekstrak minyak daun Nilam (*Pogoestemon cablin* Benth) 30% memberikan efek penyembuhan yang tidak berbeda nyata (Non Signifikan) terhadap pemberian ekstrak minyak nilam 40%. Ekstrak minyak daun Nilam (*Pogoestemon cablin* Benth) 20% memberikan efek penyembuhan yang tidak berbeda nyata (Non Signifikan) terhadap pemberian ekstrak minyak nilam 30%. Ekstrak minyak daun Nilam (*Pogoestemon cablin* Benth) 10% memberikan efek penyembuhan sangat berbeda nyata (sangat

Signifikan) terhadap pemberian ekstrak minyak nilam 20%. Kelompok ekstrak minyak daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) 50%,40%,30%,20% tidak berbeda nyata dengan betadin (Povidon iodine 10%) tetapi sangat berbeda nyata dengan ekstrak minyak nilam (*Pogostemon cablin* Benth) 10%. Sedangkan untuk kontrol negatif (Tween 80) menunjukkan hasil berbeda nyata (Signifikan) dengan betadin (Povidon iodine 10%).

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ekstrak minyak daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) mempunyai aktivitas dalam menyembuhkan luka sayatan pada punggung mencit Jantan (*Mus musculus*) dan konsentrasi 50% ekstrak minyak daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) menunjukkan hasil terbaik dalam penyembuhan luka sayatan pada punggung mencit jantan.

Penelitian ini mengingatkan kita tentang adanya tanda-tanda kekuasaan Allah dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang memang penuh dengan tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan keperkasaan-Nya. Seperti pada hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat tanaman yang baik untuk dijadikan sebagai obat yaitu tanaman daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth) yang dapat dijadikan sebagai obat pembedahan luka sayatan.

Penelitian ini seolah menjawab firman Allah swt. Dalam QS. Thaha/ 20.53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam,” (Kementrian Agama RI. 2012: 316).

Ayat di atas menyatakan: Dia yakni Allah swt, Yang telah menjadikan bagi kamu, wahai Fir'aun dan seluruh manusia sebagai besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebageian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan

yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab.2002:604-605).

Berdasarkan ayat di atas dapat pula disimpulkan bahwa Allah swt menciptakan hamparan yang luas dengan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Allah swt telah memerintahkan manusia untuk memperhatikan bumi dan isinya serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan mempunyai banyak manfaat karena dapat digunakan sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia. Tumbuhan merupakan bahan pangan, sandang dan papan. Manusia diperintahkan untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari berbagai macam tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang berbagai macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Seperti halnya dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) dapat dimanfaatkan untuk mengobati luka sayat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Minyak daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) memiliki aktivitas penyembuhan luka sayat terhadap mencit jantan (*Mus musculus*).

2. Ekstrak Minyak daun nilam (*Pogostemon cablin* Benth) menunjukkan aktivitas terbaik dalam penyembuhan luka sayat pada punggung mencit jantan (*Mus musculus*) pada konsentrasi 50%.

3. Agama Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat sebaik mungkin, terutama minyak nilam (*Pogostemon cablin* Benth).

B. Saran

Sebaiknya penarikan Minyak nilam menggunakan alat destilasi (destilator) yang lebih modern lagi agar proses penarikan minyak tidak menggunakan waktu yang lebih lama.

KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an.
- Abeng. *Gambaran Struktur Kulit Hewan Coba Pada Beberapa Interval Waktu Postmortem*. Jurnal e-Biomedik 2016.
- Agus Suprijono. *Minyak nilam (Patchouli Alcohol) sebagai antioksidan dengan metode DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil)*: Semarang. 2016.
- Ahmad. *Characterization and Antimicrobial Activity of Patchouli Essential Oil Extracted From Pogostemon cablin Benth.* in pharmacy, University of Santo Tomas.Philippines.2014.
- Al'- Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain Baharuddin *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al- Bukhari*. Beirut: Dar Ihya al-Turats,t.th.
- Anik Maryunani. *Perawatan Luka (Modern Woundcare)*. Jakarta: Penerbit In Media. 2015.
- Budhi Akbar. *Tumbuhan dengan kandungan senyawa aktif yang berpotensi sebagai bahan antifertilitas*. Jakarta: Adabia Press.2010.
- Budiningsih, Y. *Forensik pada Kasus Perlukaan (Traumatologi)*. In C. Tanto et al., eds. *Kapita Selekta Kedokteran Jilid II*. Jakarta: Media Aesculapius. 2014.
- Calais, G. *Prevention and Management of Acute and Chronic Wounds*. Fed Bureau Clin Pract Guid..2014
- Castelain, F., dkk. *Anaphylactic Reaction to Povidone In a Skin Antiseptic. Contact Dermatitis*. 2016.
- Chakrapani.P. *Phytochemical, Pharmacological importance of Patchouli (Pogostemon cablin (Blanco) Benth) an aromatic medicinal plant*. Department of Genetics and Biotechnology, Osmania University, Hyderabad, Andhra Pradesh, India. 2013
- Cholis. *Prosiiding Dalam Terapi Dermatologi*. Malang: UB Press. 2013.
- Eddyman W, Ferial. *Anatomi Manusia. Makassar*: Tim Anatomi. 2013.
- Gembong, Tjitrosoepomo. *Taksonomi Tumbuhan*. Yogyakarta:UGM. 2014.
- Hanani. *Analisis Fitokimia*. Jakarta EGC. 2015
- Hillary. *Efek Berbagai Dosis Ekstrak Etanol Daun Mimba (Azadirachta Indica A. Juss) terhadap Penyembuhan Luka Insisi pada Mencit Swiss Webster Jantan*. Bandung: UKM Press. 2016.
- Irma nurdiantini. *Perbedaan Efek Penggunaan Povidone Iodine 10% Dengan Minyak Zaitun Terhadap Penyembuhan Luka Robek (Lacerated Wound)*. Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. 2017
- Ismail, Isriany. *Formulasi Kosmetik*. Makassar: Alauddin Press. 2013.
- Julianto. *Minyak Atsiri Bunga Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Kartika, R.W. *Perawatan Luka Kronis dengan Modern Dressing*. Jakarta. 2015.

- Kawulusan, dkk. *Gambaran Reaksi Radang Luka Antemortem yang Diperiksa 1 Jam Postmortem Pada Hewan Coba*. Jurnal e-Biomedik. 2015.
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan terjemah*. Jakarta: Abyan. 2014.
- Meenakshi. *Antibacterial activity of simple ascidian ascidia sydneyensis against human pathogens*. Journal of microbiologi and biotechnology research. 2012.
- Mescher, A.L.,. *Histologi Dasar Junqueira: Teks & Atlas ed 12*. H. Hartanto, ed., Jakarta: EGC. 2012.
- Novita. *Proses Pengambilan Minyak Atsiri Dari Daun Nilam Dengan Pemanfaatan Gelombang Mikro (Microwave)*. Surabaya: ITS. 2012.
- Pazry. *Potensi Ekstrak Etanol Daun Pare (Momordica charantia L.) Sebagai Alternatif Obat Penyembuh Luka Pada Punggung Mencit Jantan (Mus musculus L.)*. Lampung: UNL.2016.
- Ramya, H. G., Palanimuthu, dkk. *An introduction to patchouli(Pogostemon cablin Benth.)—A medicinal and aromatic plant: It's importance to mankind, Agricultural Engineering International*. India: CIGR Journal,. 2013.
- Reza Ovi Diyanti. *Sintesis senyawa organonitrogen dari Patchouli alkohol melalui reaksi ritter sebagai antimikroba*: UNS. 2015.
- Sahwalita. *Tanaman Perdu Penghasil Minyak Atsiri Dan Pelatihan Budidaya Nilam Dan Produksi Minyak Atsiri*. Palembang: Deutsche Gesselschaft Fur Internationale Zusammenarbert. 2015.
- Sammartino, dkk. *Adverse reaction to irrigation with povidone-iodine after deep-impacted, lower third molar extraction*. J Biol Regul Homeost Agents. 2012Shihab M, Quraish. *Tafsir Al Misbah*, Vol. 7,9 dan 15. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Siti aisyah. *Pemisahan Senyawa Patchouli Alcohol Dari Minyak Nilam Dengan Cara Distilasi Fraksinasi*. Pontianak: PNP.2015
- Siswanto dkk. *Metode Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. Yogyakarta: Bursa Ilmu. 2015.
- Sulaiman. *Comparison of Several Methods Extraction of Patchouli Oil (Pogoestemon cablin Benth)*. Banda Aceh: JTIP. 2014.
- Suryana. *Jurnal Entropi Volume 9 Luka, Peradangan, dan Pemulihan*.Gorontalo: UNG. 2014.
- Tiesnamurti. *Penggunaan Dan Penanganan Hewan Coba Rodensia Dalam Penelitian Sesuai Dengan Kesejahteraan Hewan*. Bogor: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. 2016
- Visa Yunanda. *Aktivitas penyembuhan luka sediaan topikal ekstrak bawang merah (Allium cepa) terhadap luka sayat kulit mencit (Mus Musculus)*. Banda Aceh: Kemenristek Dikti RI S.K. No. 36a. 2016
- Ying Chen. *Dynamic accumulation of sesquiterpenes in essential oil of Pogostemon cablin*. Laboratory of Protection, Development and Utilization of Tropical

Crop Germplasm Resources of Ministry of Education, College of Horticulture and Landscape, Hainan University, Haikou, P.R. China. 2014.

Yuliani aisyah. *Peningkatan kadar patchouli alkohol minyak nilam (pogostemon cablin benth) dengan menggunakan membran selulosa asetat*. Yogyakarta : UGM. 2010.

Widyastuti. *Formulasi Gel Minyak Nilam Dan Uji Daya Hambatnya Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus*. Sumatra Barat: AFIB. 2014.



Wyatt, E., Sutter, S. H., Drake, L. A. *Dermatology Pharmacology, in Goodman and Gilman's The Pharmacological basic Of Therapeutics*, Hardman, J. G., limbird, L. E., Gilman, A. G., (editor), 10 th, 1801-1803, McGraw-hill, New York. 2011.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian



Lampiran II: Ekstraksi Daun Nilam

Lampiran III: Pengujian Efek Penyembuhan Luka Sayat



Keterangan :

Kontrol (-) : Tween 80

Kontrol (+) : Betadin[®] (povidon iodine 10%)

Lampiran IV. Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat

Tabel 5. Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat (cm)

Hari ke	Minyak Nilam 10 %			Minyak Nilam 20 %			Minyak Nilam 30 %			Minyak Nilam 40 %			Minyak Nilam 50 %			Betadin (Povidon Iodin 10%)			Tween 80			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8	0,6	1	1	0,9	
3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,9	0,9	0,8	
4	0,8	0,7	0,8	0,6	0,5	0,7	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4	0,3	0,9	0,8	0,8	
5	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,1	0,3	0,2	0,8	0,7	0,7	
6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,2	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,3	0	0,2	0,1	0,6	0,7	0,5	
7	0,5	0,4	0,5	0,4	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0	0,1	0	0,2	0	0,1	0	0,6	0,6	0,4	
8	0,5	0,4	0,5	0,2	0	0,2	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,4		
9	0,4	0,3	0,4	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,4	0,3		
10	0,3	0,2	0,3	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,4	0,2		
11	0,3	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,2		
12	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,1		
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0		
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0		
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lampiran V. Presentase Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat

Tabel 6. Presentase Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat (cm)

Hari ke	Minyak Nilam 10 %			Minyak Nilam 20 %			Minyak Nilam 30 %			Minyak Nilam 40 %			Minyak Nilam 50 %			Betadin (Povidon Iodin 10%)			Tween 80			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	10	10	10	20	10	100	20	10	10	20	10	10	10	20	30	20	40	0	0	10	
3	10	20	20	20	30	20	30	40	20	30	40	30	30	40	40	60	40	50	10	10	20	
4	20	30	20	40	50	30	50	60	40	50	50	40	40	50	50	70	60	70	10	20	20	
5	20	30	30	50	60	30	60	60	60	60	60	60	60	70	50	90	70	80	20	30	30	
6	30	40	40	50	80	40	80	70	60	80	60	80	80	90	70	100	80	90	40	30	50	
7	40	60	50	60	90	60	90	80	70	90	70	100	90	100	80	100	90	100	40	40	60	
8	50	60	50	80	100	80	100	90	80	100	90	100	100	100	100	100	100	100	50	50	60	
9	60	70	60	90	100	80	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	60	70	
10	70	80	70	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	60	80	
11	70	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	70	80	
12	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	90	
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	100	
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100	
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Lampiran VI. Efek Penyembuhan Luka Sayat

Tabel 7. Efek Penyembuhan Luka Sayat

Konsentrasi	Replikasi	Hari Ke-n
		Luka Tertutup 100 %
Minyak Nilam 10%	1	13
	2	11
	3	12
Minyak Nilam 20%	1	10
	2	8
	3	11
Minyak Nilam 30%	1	8
	2	9
	3	9
Minyak Nilam 40%	1	8
	2	9
	3	8
Minyak Nilam 50%	1	8
	2	7
	3	8
Betadin (Povidon Iodin 10%)	1	6
	2	7
	3	8
Tween 80	1	14
	2	15
	3	13

Lampiran VII. Perhitungan RAL, Hubungan antar formula dan Kecepatan Luka tertutup 100%

Tabel 8. Hubungan antar Formula dan Kecepatan Luka Tertutup 100%

Perlakuan	Hari Ke-n luka tertutup 100%			Jumlah	Rata-rata
	Replikasi				
	1	2	3		
Minyak Nilam 10%	13	11	12	36	12
Minyak Nilam 20%	10	8	11	29	9,6
Minyak Nilam 30%	8	9	9	26	8,6
Minyak Nilam 40%	8	9	8	25	6,3
Minyak Nilam 50%	8	7	8	23	7,6
Betadin (Povidon Iodin 10%)	6	7	8	21	7
Tween 80	14	15	13	42	14
Jumlah	67	66	69	202	67,1
Rata-rata	9,5	9,4	9,8	28,8	9,5

M A K A S S A R

Perhitungan Anova

Faktor kolerasi : $\frac{(Y_i)^2}{r \times t}$

$$\frac{(202)^2}{21}$$

: 1.943,0

JK Total : $\sum(Y_{ij})^2 - FK$

$$: ((13)^2 + (11)^2 + (12)^2 + (10)^2 + (8)^2 + (11)^2 + (8)^2 + (9)^2 + (9)^2 + (8)^2 + (9)^2 + (8)^2 + (8)^2 + (7)^2 + (8)^2 + (6)^2 + (7)^2 + (8)^2 + (14)^2 + (15)^2 + (13)^2 - FK$$

: 2.070 - 1.943,0

: 127

JK Perlakuan : $\frac{T_{ij}^2}{r} - FK$

$$\frac{((36)^2 + (29)^2 + (26)^2 + 25^2 + 23^2 + 21^2 + 42^2)}{3} - FK$$

: 2.057 - 1.943,0

: 114,3

JK Ulangan : $\frac{((67)^2 + (66)^2 + (69)^2)}{3} - Fk$

: 0,7

JK Galat : JK Total - JK Perlakuan - JK Ulangan

: 127 - 114,3 - 0,7

: 12

Db Total : $r \times t - 1$

: $3 \times 7 - 1$

: 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

$$\begin{aligned}
 \text{db Perlakuan} &: t - 1 \\
 &: 7 - 1 \\
 &: 6 \\
 \\
 \text{db Ulangan} &: r - 1 \\
 &: 3 - 1 \\
 &: 2 \\
 \\
 \text{db Galat} &: \text{db Total} - \text{db Perlakuan} - \text{db Ulangan} \\
 &: 20 - 6 - 2 \\
 &: 12 \\
 \\
 \text{KT Perlakuan} &: \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{db Perlakuan}} \\
 &: \frac{114,3}{6} \\
 &: 19,05 \\
 \\
 \text{KT Ulangan} &: \frac{\text{Jumlah Kuadrat Ulangan}}{\text{db Ulangan}} \\
 &: \frac{0,7}{2} \\
 &: 0,35 \\
 \\
 \text{KT Galat} &: \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{db Galat}} \\
 &: \frac{12}{12} \\
 &: 1 \\
 \\
 \text{F-Hitung Perlakuan} &: \frac{\text{KT Perlakuan}}{\text{KT Galat}} \\
 &: \frac{19,05}{1} \\
 &: 19,05 \\
 \\
 \text{F-Hitung Ulangan} &: \frac{\text{KT Ulangan}}{\text{KT Galat}} \\
 &: \frac{0,35}{1} \\
 &: 0,35
 \end{aligned}$$

Tabel 9. Analisis Ragam Dengan Nilai F Tabel

Sumber Keragaman	Jumlah Kuadrat (JK)	Derajat Bebas (db)	Kuadrat Tengah (KT)	F-Hitung	F-Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	114,3	6	19,05	19,05 ^{**}	3,00	4,82
Ulangan	0,7	2	0,35	0,35 ^{ns}	3,89	6,93
Galat	12	12	1			
Total	127	20	20,4			

Ket : NS : Tidak berbeda / tidak signifikan $F_h < F_t$

* : Berbeda / signifikan $F_h > F_t$ (0,05)

** : Sangat berbeda / sangat signifikan $F_h > F_t$ (0,05 dan 0,01)

F hitung Perlakuan > F tabel pada taraf kepercayaan 5% dan 1% (sangat Signifikan) artinya ada perbedaan yang sangat nyata dengan yang lainnya.



$$\text{Koefisien Keseragaman} : \frac{\sqrt{KTG}}{Y} \times 100 \%$$

$$: \frac{\sqrt{1}}{9,5} \times 100 \%$$

$$: 10 \%$$

Perhitungan Nilai BNT 0,05

$$\text{BNT} = t(0,05) : 12 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 1,782 \sqrt{\frac{2 \times 1}{3}}$$

$$= 1,782 \times 0,816$$

$$= 1,45$$

Perhitungan Nilai BNT 0,01

$$\text{BNT} = t(0,01) : 12 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 2,681 \sqrt{\frac{2 \times 1}{3}}$$

$$= 2,681 \times 0,816$$

$$= 2,18$$

Tabel 10. RAL,BNT Hubungan antara Formula dan kecepatan mulai penutupan 100%

Perlakuan		Betadin (Povidon 10%)	Minyak Nilam 50%	Minyak Nilam 40%	Minyak Nilam 30%	Minyak Nilam 20%	Minyak Nilam 10%	Tween 80
	Rata-rata	7	7,6	8,3	8,6	9,6	12	14
Betadin (Povidon 10%)	7	0						
Minyak Nilam 50%	7,6	0,6 ^{ns}	0					
Minyak Nilam 40%	8,3	1,3 ^{ns}	0,7 ^{ns}	0				
Minyak Nilam 30%	8,6	1,6 ^s	1 ^{ns}	0,3 ^{ns}	0			
Minyak Nilam 20%	9,6	2,6 ^{ss}	2 ^s	1,3 ^{ns}	1 ^{ns}	0		
Minyak Nilam 10%	12	5 ^{ss}	4,4 ^{ss}	3,7 ^{ss}	3,4 ^{ss}	2,4 ^{ss}	0	
Tween 80	14	7 ^{ss}	6,4 ^{ss}	5,7 ^{ss}	5,4 ^{ss}	4,4 ^{ss}	2 ^s	0

Keterangan : NS : Non Signifikan
S : Signifikan (Berbeda Nyata)
SS : Sangat Signifikan (Sangat Berbeda Nyata)

Lampiran VIII. Gambar Pengamatan



Gambar 2. Sampel daun Nilam (*Pogostemon cablin* Benth)




Gambar 3. Proses pengeringan (diangin-anginkan)

ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 4. Sampel dikeringkan dilemari pengering



Gambar 5. Hasil perajangan



Gambar 6. Alat destilasi uap air



Gambar 7. Sampel dimasukkan kedalam labu destilasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 8. Minyak yang didapatkan ditampung dicorong pisah



Gambar 9. Alat yang digunakan pada proses penyayatan

MAKASSAR



Gambar 10. Mencit diadaptasikan terlebih dahulu



Gambar 11. Bulu mencit dicukur

ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 12. Diberikan luka sayatan




Gambar 13. luka sayatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 14. luka sembuh 100%





BIOGRAFI PENULIS

Nur Afdhaliah , lahir di Loci (Bone), 11 Agustus 1995. Seorang anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Drs. Burhanuddin, M.Pd dan Dra.Dahmar. Ia mengawali sekolahnya di SDN No.241 Kadai Kabupaten Bone , Kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Mare Kabupaten Bone lalu di SMA Neg. 2 Bone Kabupaten Bone dan sekarang menjadi mahasiswi di UIN Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan program studi Farmasi angkatan 2013. Alasannya memilih UIN Alauddin Makassar untuk menempuh jenjang pendidikan kuliah yaitu karena ingin menjadi seorang yang ahli di bidang Farmasi dan menjadi seorang apoteker handal dikemudian hari yang berakhlak baik tanpa melupakan ajaran- ajaran Islam. Ia tertarik mengambil jurusan Farmasi karena menurutnya Farmasi itu menarik. Banyak hal dan ilmu yang bisa kita pelajari dari alam dan mengolahnya ke kimiawi serta rasa keingintahuannya yang besar terhadap tumbuh-tumbuhan untuk mengetahui khasiat dan manfaatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R