

**FITOREMEDIASI TANAMAN AKAR WANGI (*Vetiver zizanioides*)
TERHADAP TANAH TERCEMAR LOGAM KADMIUM
(Cd) PADA LAHAN TPA TAMANGAPA
ANTANG MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALFIA PATANDUNGAN

NIM. 60500110005

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini berupa duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2014

Penyusun

Alfia Patandangan
NIM:60500110005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Fitoremediasi Tanaman Akar Wangi (*Vetiver Zizanioides*) Terhadap Tanah Tercemar Logam Kadmium (Cd) Pada Lahan TPA Tamangapa Antang Makassar", yang disusun oleh Alfia Patundungan, NIM: 60500110005, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 bertepatan tanggal 18 Dzulhijah 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 18 September 2014
18 Dzulhijah 1435 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd	()
Sekretaris	: Dr. Andi Suarda, M.Si	()
Munaqisy I	: Dra. St. Chadijah, M.Si	()
Munaqisy II	: Asriani Ilyas, S.Si, M. Si	()
Munaqisy III	: Drs. H. M. Abdul Wahid, M. Th. I	()
Pembimbing I	: Syamsidar HS, S.T., M.Si	()
Pembimbing II	: Aisyah, S.Si, M.Si	()

Diketahui oleh:

Fakultas Sains dan Teknologi



Alauddin Makassar,

Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd
10412 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penulisan dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **"Fitoremediasi Tanaman Akar Wangi (*Vetiver zizanioides*) Terhadap Tanah Tercemar Logam Kadmium (Cd) Pada Lahan TPA Tamangapa - Antang Makassar"**. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin-nya jugalah sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat penelitian di Jurusan Kimia Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa selesainya proposal ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Segala daya dan upaya telah dicurahkan untuk memberikan bimbingan, dorongan moril serta semangat diberikan untuk penulis dalam penyelesaian proposal ini. Untuk itu penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A Khadir Gassing HT, M.S, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah membangun citra kampus UIN.
2. Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Syamsidar HS, ST., M.Si, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Aisyah, S.Si.,M.Si selaku pembimbing II, yang dengan sabar membimbing, memberi saran dan bantuan mulai dari pemelihan judul hingga nantinya penelitian ini selesai.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar atas Ilmu Yang telah diberikan selama ini.

6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
7. Orang tua, tante, kakak dan adik yang senantiasa mencurahkan segala doanya agar proposal ini dapat terselesaikan.
8. Teman Kimia 2010 dan teman-teman Kuliah Kerja Profesi (KKP) Angkatan Ke-4, terima kasih atas segala motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Dengan segala keterbatasan pribadi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak mudah untuk menghasilkan sebuah tulisan yang memenuhi syarat sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa berharap dan ikhlas menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Akhirnya penulis hanya mampu mendoakan semoga segala aktifitas kita diridhai oleh Allah SWT. Semoga segala keikhlasan dan kebaikan kita memperoleh rahmat dan barokah dari Allah SWT, Amin.

Samata-Gowa , September 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Penulis
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYTAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pencemaran Lingkungan.....	8
B. Pencemaran Tanah	
C. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	13
D. Penanganan Pencemaran Tanah.....	17
E. Kompos	18
F. Fitoremediasi	
1. Defenisi Fitoremediasi	19
2. Mekanisme Kerja Fitoremediasi	19
G. Tanaman Akar Wangi	
1. Tinjauan tanaman akar wangi (<i>Vetiveria zizanioides</i>)	22
2. Keunggulan tanaman akar wangi dalam fitoremediasi	24
H. Logam Cd	25
I. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	30

B. Alat dan Bahan	30
1. Alat yang digunakan	30
2. Bahan yang digunakan	30
C. Prosedur Kerja.....	31
1. Teknik Sampling	31
2. Tahap Aklimatisasi Tanaman.....	31
3. Analisis Cd Pada media Tanah	31
4. Analisis Cd Pada Tanaman Akar Wangi.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan.....	36
1. Mekanisme akumulasi Cd oleh tanaman akar wangi (<i>vetiver zizanioides</i>)	37
2. Pengaruh Penambahan Kompos Terhadap Penyerapan Cd Pada Tanaman Akar wangi (<i>vetiver zizanioides</i>)	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Rekapitulasi volume pembuangan sampah dikota makassar	14
2.2 Komposisi Sampah di TPA Tamangapa Makassar	14
4.1 Konsentrasi Cd pada tanaman kontrol (100% tanah tercemar)	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. TPA Tamangapa Antang Makassar	13
2.2 Akar Wangi (<i>Vetiver Zizanioides</i>).	21
4.1 Grafik penyerapan Cd pada tanaman Akar Wangi	35
4.2 Struktur fitokelatin	38



ABSTRAK

Nama : Alfia Patandungan
Nim : 60500110005
Judul skripsi : Fitoremediasi Tanaman Akar Wangi (*vetiver zizanioides*) Terhadap Tanah Tercemar Logam Kadmium (Cd) pada Lahan TPA Tamangapa Antang Makassar

Salah satu contoh pencemaran tanah yaitu pada lahan pembuangan sampah akhir (TPA) kota Makassar. Salah satu metode penanggulangan lahan tercemar adalah fitoremediasi. Dalam penelitian ini akan diteliti kemampuan tanaman akar wangi (*Vetiver zizanioides*) dalam mereduksi kadar Cd dalam tanah. Untuk meningkatkan potensi tanaman tersebut meremediasi Cd, maka tanah tempat tumbuh tanaman akan dikombinasi dengan kompos dengan tujuan bakteri pada kompos dapat membantu penyerapan Cd. Media tanam yang digunakan adalah tanah murni TPA Tamangapa Makassar dan kompos. Penelitian dilakukan selama 28 hari dengan variasi penelitian. Komposisi media yaitu tanah tercemar (TT) logam kadmium (Cd) dan kompos (K) dengan perbandingan 100% (TT) : 0 K, 5 (TT) : 1(K), 4,5 (TT) : 1,5(K) dan 4 (TT) : 2 (K). Dari hasil penelitian diperoleh tanaman akar wangi mampu menyerap Cd sebesar 0,298 mg/Kg sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi media tanam dengan kombinasi kompos kurang signifikan karena kombinasi tanah tercemar dengan kompos yang kurang tepat dalam membantu tanaman akar wangi mengakumulasi atau mengurangi pencemaran logam kadmium pada tanah tercemar TPA Tamangapa Antang Makassar.

Kata kunci : Fitoremediasi, kombinasi kompos, kadmium, tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides)

ABSTRACT

Name : Alfia Patandungan
NIM : 60500110005
Thesis Title : Phytoremediation Plants Akar Wangi (*Vetiver zizanioides*) Against Metal Contaminated Soil Cadmium (Cd) on Land Tamangapa Antang Makassar

One example of soil contamination on land landfill (TPA) Makassar. One method of prevention is phytoremediation contaminated land. In this study examined the ability of the plant will vetiver (*Vetiver zizanioides*) in reducing the levels of Cd in the soil. To increase the potential of these plants remediate Cd, the soil where the plants grow to be combined with compost with the aim of bacteria in compost can help the absorption of Cd. Planting medium used is pure soil and compost Tamangapa Makassar. Research carried out for 28 days with a variation of the study. The composition of the media that the contaminated soil (TT) metal kadmium (Cd) and compost (K) with a ratio of 100% (TT): 0 K, 5 (TT): 1 (K), 4.5 (TT): 1.5 (K) and 4 (TT): 2 (K). The results were obtained vetiver plants are able to absorb Cd of 0,298 mg/Kg so it can be concluded that the composition of the planting medium with a combination of compost less significant because the combination of the contaminated soil with compost are less precise in helping vetiver plants accumulate or reduce metal pollution cadmium in contaminated soil Tamangapa Antang Makassar.

Keywords: *phytoremediation, a combination of compost, cadmium, plant vetiver (Vetiveria zizanioides)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kekayaan Indonesia adalah memiliki tanah yang subur, namun seiring perkembangan zaman kesuburan tanah di Indonesia sebagian besar telah tercemar disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia yang menimbulkan efek berupa limbah sehingga mencemari tanah. Penyebab pencemaran tanah diakibatkan oleh pesatnya perkembangan industri, pembangunan perumahan, pembangunan hotel dan lain sebagainya yang menghasilkan polutan/pencemar bagi tanah, air maupun udara.

Sebagian besar penyebab pencemaran tanah diakibatkan oleh sampah baik sampah yang berasal dari rumah tangga, limbah industri, limbah jasa (toko/pasar) dan lain-lain. Sampah terbagi atas dua macam yaitu sampah organik yang dapat diuraikan oleh mikroba dalam tanah seperti sampah dapur, dedaunan dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik tidak dapat diuraikan oleh mikroba dalam tanah misalnya, plastik, logam-logam, kaleng dan lain-lain yang terus menerus tetap akan berada dalam tanah.

Pencemaran tanah merupakan masuk atau dimasukannya zat atau sesuatu ke dalam tanah baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang merusak tatanan kimia tanah sehingga berubah dari kondisi awalnya. Salah satu contoh kasus pencemaran tanah terjadi pada lahan TPA Tamangapa-Antang Makassar, selain merusak tatanan kimia tanah, pencemaran juga berdampak pada masyarakat sekitar lahan TPA

Tamangapa-Antang Makassar yang menimbulkan bau yang kurang sedap dari dampak penumpukan sampah tersebut sehingga memerlukan suatu alternatif untuk mengurangi pencemaran tanah utamanya pencemaran dari berbagai logam berat.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Zubair dan Haeruddin, 2012: 6) di TPA Tamangapa makassar diketahui bahwa komponen sampah yang terbesar adalah jenis sampah organik mencapai 80,71% sedangkan komponen sampah anorganik sebesar 9,23%. Sampah organik merupakan segala jenis sampah yang mudah diuraikan oleh mikroba dalam tanah seperti limbah dapur, dedaunan dan dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik merupakan segala jenis sampah/limbah yang tidak mudah terurai oleh mikroba dalam tanah sehingga akan terus menerus berada dalam lapisan tanah sehingga merusak sifat kimia tanah. Contoh sampah anorganik berupa plastik, besi, baterai, logam-logam dan lain-lain. Keberadaan sampah anorganik ini berdampak pada pencemaran lingkungan oleh berbagai logam berat utamanya kadmium (Cd) karena sulit diuraikan oleh mikroorganisme.

Manusia diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan dilarang berbuat kerusakan di muka bumi, salah satunya dengan menghindari pencemaran lingkungan dalam bentuk apapun karena Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, sebagaimana dalam firman Allah Swt Q.S Ar-Ruum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahan: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1989: 647)

Pada ayat 41 firmanNya berbunyi (ظهر) “tampak”. Maksudnya adalah pada mulanya kata ini berarti *terjadi sesuatu di permukaan bumi*, sehingga karena dia di permukaan, maka menjadi Nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawan dari kata ini adalah (بطن) yang berarti *terjadinya sesuatu di perut bumi*, sehingga tidak tampak. Demikian al-Ashfahani dalam *Maqayis-nya*. Kata *zhahara* pada ayat di atas *banyak dan tersebar*. Kata (الفساد) menurut al-Ashfahani adalah *keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit atau banyak*. Kata ini di gunakan menunjuk apa, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Ia juga diartikan sebagai antonym dari (الصلاة) *As-shalah* yang berarti *manfaat atau berguna* (Shihab, 2002: 76).

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, yang hasilnya keseimbangan lingkungan menjadi kacau (Shihab, 2002: 76).

Berdasarkan ayat di atas, kita diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam fikih lingkungan hidup dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya kewajiban Pemerintah tetapi menjadi *Fardu Kifayah* (kewajiban bersama) semua pihak (Sukarni, M.Ag, 2011). Beberapa alternatif untuk penanggulangan pencemaran tanah diantaranya penanggulangan pencegahan pencemaran terdiri atas *reduce* (mengurangi penggunaan), *reuse* (pemakaian kembali), *recycle* (daur ulang), fitoremediasi dan bioremediasi (pemanfaatan

mikroorganisme). Salah satu metode yang efektif untuk penanggulangan pencemaran pada lahan TPA Tamangapa Makassar yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu metode penggunaan tanaman untuk membersihkan, mengurangi, memindahkan polutan dalam tanah.

Beberapa tanaman yang mampu dijadikan sebagai tanaman hiperakumulator diantaranya: Kenaf (*hibiscus cannabinus L.*), typha (*typha spp.*), vetiver (*vetiver zizanioides*), canna (*canna x generalis*), cyathula (*altemanthera ficoidea cv. "songuinea"*) (Wang yan, 2005: 5). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tanaman akar wangi (*vetiver zizanioides*). Keunggulan tanaman akar wangi sebagai hiperkaumulator yaitu mampu tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan, mudah ditemukan dan biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai tanaman liar yang belum diketahui manfaatnya. Penambahan kompos dalam penelitian ini berfungsi bagi tanaman dengan kandungan unsur makro dan mikro dalam kompos sehingga daya serap unsur haranya tinggi. Selain itu mikroba yang ada dalam kompos dapat membantu dalam proses fitoremediasi. Mikroba-mikroba tersebut akan berada disekitar akar tanaman berasosiasi dengan logam-logam berat seperti Cd sehingga mendekati akar tanaman kemudian senyawa pengkhelat (fitokhelatin) yang dikeluarkan oleh tanaman akan mengikat logam-logam tersebut bersama dengan unsur hara lainnya kemudian diteruskan ke bagian lain tanaman.

Logam Cd merupakan salah satu logam berat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Dampak dari toksisitas logam Cd seperti terganggunya fungsi ginjal yang dapat mengakibatkan gejala glikosuria, proteinuria, aciduria dan hiperkalsiuria

sehingga bila gejala tersebut berlanjut akan menyebabkan gagalnya fungsi ginjal dan mengakibatkan kematian (Darmono, 1999: 28).

Manfaat berbagai tanaman yang diciptakan oleh Allah Swt untuk dapat di olah dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya sebagai bukti kekuasaan Allah Swt, dijelaskan dalam al qur'an (Q.S Al-Lukman:10)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسِي ۚ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ۚ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahan: “Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1989: 654).

Dari wujud kecintaan kita kepada Allah Swt maka kita dapat memanfaatkan berbagai macam tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt dengan berbagai manfaatnya. Salah satunya adalah tanaman akar wangi yang dapat digunakan dalam mereduksi berbagai logam berat yang mencemari lingkungan.

Atas dasar uraian tersebut di atas, bahwa lingkungan TPA Tamangapa Makassar berisiko tinggi terhadap pencemaran berbagai polutan termasuk logam berat Cd, maka peneliti berminat untuk meremediasi lahan TPA Tamangapa Antang Makassar yang tercemar oleh logam berat khususnya Cd dengan bantuan tanaman akar wangi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kemampuan tanaman akar wangi (*Vetiver zizanioides*) dalam mengurangi pencemaran logam Cd pada lahan TPA Tamangapa Antang Makassar ?
2. Apakah penambahan kompos sebagai stimulan akan mempengaruhi penurunan logam Cd dalam tanah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kemampuan tanaman akar wangi (*Vetiver zizanioides*) dalam mengurangi pencemaran logam Cd pada lahan TPA Tamangapa Antang Makassar .
2. Mengetahui pengaruh penambahan kompos sebagai stimulan dalam penurunan logam Cd dalam tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dan wawasan terutama mengenai kemampuan tanaman akar wangi dalam mereduksi logam Cd sehingga dapat mengurangi pencemaran tanah.
2. Hasil penelitian ini dapat diterapkan langsung oleh masyarakat untuk mengurangi pencemaran tanah dengan menanam tanaman akar wangi

(*Vetiveria zizanioides*) di lingkungan rumah maupun lingkungan yang tercemar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan keadaan dimana masuknya bahan kimia, limbah dan komponen lain yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh zat pencemar yang disebut dengan polutan. Zat pencemar yang masuk ke dalam lingkungan bersifat *toksik* (racun) sehingga merugikan makhluk hidup dalam lingkungan termasuk manusia. Salah satu syarat sesuatu dikatakan sebagai zat pencemar adalah apabila keberadaannya telah melampaui ambang batas yang kemudian merusak tatanan lingkungan.

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh alam.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh lingkungan merupakan pencemaran yang terjadi secara alamiah disebabkan oleh faktor alam. Misalnya: meletusnya gunung merapi yang berdampak pada semua makhluk hidup akibat paparan asap dan awan panas yang dikeluarkan.

2. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Pencemaran ini diakibatkan oleh ulah tangan manusia, misalnya: pembuangan limbah secara sembarangan akibat maraknya pembangunan industri (Bahtiar, 2007: 3-4).

Lingkungan dapat dikatakan tercemar jika di masuki oleh zat pencemar yang dapat merusak lingkungan serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Zat pencemar (polutan) yang masuk ke dalam lingkungan dapat berdampak secara akut (keracunan dalam waktu yang singkat) dan kronis (keracunan dalam waktu yang cukup lama) bagi hewan, tumbuhan maupun manusia.

B. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah merupakan masuk atau dimasukkannya sesuatu/zat ke dalam tanah baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan rusaknya sifat kimia tanah sehingga tidak lagi berfungsi sebagaimana awalnya. Pencemaran tanah sebagian besar disebabkan oleh limbah padat berupa sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah-sampah ini kemudian masuk menyerap ke dalam tanah hingga beratus-ratus tahun lamanya karena tidak dapat terurai dalam tanah sedangkan yang dapat terurai kemudian akan menjadi tanah humus. Polutan yang terus menerus dalam tanah akan masuk ke dalam rantai makanan melalui tumbuhan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas organisme (Bahtiar, 2007: 6).

Sampah merupakan segala sesuatu yang tidak memiliki nilai guna dan tidak lagi difungsikan baik bersumber dari hasil limbah rumah tangga maupun dari hasil samping produksi sedangkan menurut Badan Standarisasi Nasional No. 19-2454-2002 sampah diartikan sebagai hasil samping dari aktivitas manusia yang bersifat padat terdiri dari limbah organik atau anorganik yang tidak lagi berguna dan harus dikelola agar tidak merusak lingkungan dan pembangunan. Kurangnya

kepedulian masyarakat terhadap berbagai permasalahan sampah dapat berdampak menurunnya kualitas lingkungan sehingga memberikan suatu ketidaknyamanan bagi makhluk hidup.

Sampah digolongkan ke dalam berbagai golongan berdasarkan atas beberapa tinjauan, yakni:

- a. Berdasarkan jenis dibagi atas dua macam yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti limbah dapur dan sisa-sisa tumbuhan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroba dalam tanah seperti limbah industri, plastik dan logam-logam.
- b. Berdasarkan tingkat kelapukan. Sampah jenis ini dibagi atas dua yaitu sampah lapuk (*garbage*) dan sampah sulit lapuk atau tidak lapuk. Sampah lapuk merupakan jenis sampah yang mudah terurai oleh mikroorganisme sedangkan sampah sulit lapuk dan tidak lapuk merupakan jenis sampah yang sulit mengalami pelapukan membutuhkan waktu yang cukup lama seperti kaleng.
- c. Berdasarkan bentuk. Sampah jenis ini terbagi atas, sampah padat, sampah cair dan gas. Sampah padat merupakan jenis sampah yang berbentuk padat, misalnya sampah organik. Sampah cair merupakan jenis sampah yang bersifat cair biasanya bersumber dari limbah rumah tangga, industri sedangkan sampah jenis gas merupakan jenis sampah yang bersifat gas. Misalnya efek dari pembakaran.

- d. Berdasarkan sumber. Sampah jenis ini terbagi atas sampah rumah tangga (limbah rumah tangga), sampah industri (limbah industri) dan sampah pertanian (limbah dari kawasan pertanian) (Tobing, 2005: 4-6).

Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional No. 19-24-54-2002 dikenal pula istilah timbulan sampah. Timbulan sampah diartikan sebagai banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan dari masyarakat dalam satuan per kapita perhari. Pertambahan timbulan sampah berbanding lurus dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk.

Teknik pengelolaan sampah menurut Badan Standarisasi Nasional No. 19-2454-2002 terbagi atas beberapa metode yaitu:

a. Pengomposan

Pengomposan merupakan proses pengolahan sampah organik dengan cara fermentasi dengan bantuan mikroorganisme sehingga membentuk kompos. Proses pengomposan terbagi atas dua yaitu:

1. Berdasarkan kapasitas (individual, komunal dan skala lingkungan)

Pewadahan individual merupakan cara penanganan sampah secara individu pada wadah khusus sampai padah waktu tertentu. Pewadahan komunal merupakan cara penanganan sampah secara bersama untuk ditampung dalam wadah khusus yang bersumber dari berbagai macam tempat.

2. Berdasarkan proses (alami, dengan cacing dan mikroorganisme)

b. Insenerasi yang berwawasan lingkungan

Insenerasi merupakan cara pengolahan sampah dengan bantuan alat insinerator dengan tujuan untuk mengurangi jumlah sampah dengan cara membakar sampah pada suhu 700°C pada tungku pembakar dan 200°C pada cerobong.

c. Daur ulang

Metode ini dilakukan dengan cara mengolah kembali limbah sehingga menghasilkan produk baru. Sampah anorganik dikelola sesuai dengan jenis sampahnya dan sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.

d. Pengurangan volume sampah dengan pencacahan atau pemadatan.

Pemadatan sampah ini dilakukan dengan cara manual atau mekanis sehingga proses pengangkutan sampah lebih efisien.

e. Biogasifikasi (pemanfaatan energi hasil pengolahan sampah)

Proses pengolahan daur ulang sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah dengan jalan mengolah sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali. Pengolahan sampah organik berbeda dengan sampah anorganik. Sampah organik dikelola kembali dalam berbagai bentuk misalnya pembuatan kompos, pakan ternak sedangkan untuk pengolahan daur ulang sampah anorganik dilakukan dengan berbagai cara yakni:

a. *Reduce* (mengurangi penggunaan)

Reduce adalah usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan produksi sampah. Misalnya membawa keranjang belanja ke pasar sehingga tidak memerlukan penggunaan kantong plastik.

b. *Reuse* (pakaian kembali)

Reuse adalah usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Misalnya memanfaatkan botol/kaleng bekas sebagai wadah.

c. *Recycle* (daur ulang)

Recycle adalah usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus. Contohnya, plastik-plastik bekas bisa didaur ulang menjadi ember, gantungan baju, pot tanaman dll (Zubair dan Haeruddin, 2012, hal: 3-4).

C. Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah

TPA merupakan tempat terakhir yang digunakan untuk menampung berbagai jenis sampah yang dikumpulkan dari berbagai tempat. Tujuan penampungan adalah untuk memusnahkan atau meminimalkan jumlah sampah dengan cara tertentu sehingga dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Pemilihan lokasi TPA sampah di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Standar Nasional Indonesia SNI 03-3241-1994 yaitu:

1. Kelayakan regional untuk menentukan zone layak atau zone tidak layak.
2. Kelayakan penyisih untuk menentukan tingkat kesesuaian dari beberapa alternatif lokasi yang telah diperoleh pada penilaian tahap pertama.
3. Kelayakan rekomendasi untuk menetapkan lokasi terbaik dari beberapa alternatif lokasi yang disetujui oleh pemerintah setempat.

Upaya pemerintah dalam membantu penanggulangan sampah adalah menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan menetapkan lokasi TPA dengan kebijakan daerah setempat (Tobing, 2005: 3). Namun hal ini saja tidak dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran sampah. Selain merusak sifat kimia tanah, penampungan sampah juga merusak tatanan lingkungan dan bau yang kurang sedap yang ditimbulkan dari penumpukan sampah tersebut. Oleh karena itu diperlukan alternatif untuk mengurangi pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah terutama sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroba dalam tanah.

Seperti halnya pada TPA Tamangapa Makassar, kerusakan atau pencemaran tanah juga terjadi akibat berbagai zat pencemar yang tidak dapat diuraikan oleh mikroba dalam tanah. TPA Tamangapa Makassar merupakan pusat tempat pembuangan akhir sampah bagi seluruh wilayah di Makassar. Luas lahan TPA Tamangapa Makassar yaitu 14,3 Ha. Timbulan sampah pada TPA Tamangapa Makassar ini sebagian besar sulit atau tidak dapat diuraikan oleh mikroba dalam tanah. Zat pencemar ini berupa berbagai logam berat yang merusak atau mencemari tanah. Salah satu logam berat yang ada dalam sampah yaitu logam Cd yang beresiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa jenis sampah yang mengandung logam Cd seperti plastik, kaleng-kaleng dan berbagai logam-logam yang tidak dapat terurai oleh mikroba tanah.



Gambar 2.1. TPA Tamangapa Antang Makassar

Jumlah penduduk kota Makassar mencapai 1,3 juta jiwa dan menghasilkan sampah 3800 m³ sampah perkotaan setiap harinya sedangkan kapasitas maksimum TPA Tamangapa hanya sekitar 2800 m³ sampah perkotaan setiap harinya sehingga memerlukan penambahan 1000 m³. Sebagian besar sampah berasal dari aktivitas penduduk seperti di pasar, pusat perdagangan, rumah makan, dan hotel. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zubair dan Haeruddin (2012: 8) diketahui bahwa sekitar 87% sampah di Makassar merupakan sampah organik dan sekitar 13% adalah sampah anorganik, seperti plastik dan lain-lain. Sedangkan jumlah timbulan sampah di TPA tamangapa antang makassar sebesar 517,70 ton/hari.

Berdasarkan survei rekapitulasi volume pembuangan sampah dikota makassar sebagai berikut:

M A K A S S A R

Tabel 2.1. Volume sampah di TPA Makassar

Periode	Volume (m³)
Tahun 2006	131.421.349
Tahun 2007	168.204.324
Tahun 2008	144.329.233
Tahun 2009	170.257.215
Tahun 2010	194.471.569
Tahun 2011	193.405.111
Tahun 2012	203.419.001

Sumber: (Dinas Kebersihan Kota Makassar, 2013)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zubair dan Haeruddin (2012) karakteristik timbulan sampah dan komposisi sampah yang ada di TPA Tamangapa Makassar terdiri :

Tabel 2.2. Komposisi Sampah di TPA Tamangapa Makassar

Komposisi Sampah	Komposisi Sampah (%)	Timbulan Sampah (ton)
Organik	80,71	417,85
Plastik	9,23	47,77
Kertas	7,03	36,38
Kain	0,03	0,13
Kayu	0,17	0,86
Kaca	0,22	1,14
Kaleng / besi	2,12	10,97
Karet	0,50	2,60
Jumlah	100	517,70

D. Penanganan pencemaran tanah

Dalam penanganan pencemaran tanah terdapat 2 metode, yakni:

a. Fitoremediasi

Fitoremediasi merupakan metode pembersihan lahan yang tercemar dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai hiperakumulator. Fitoremediasi ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara *in situ* (langsung di tempat) dan *ex situ* (Amzani, 2012: 9)

Upaya mengatasi pencemaran logam berat pada lahan TPA-Antang Makassar dengan fitoremediasi merupakan suatu cara yang efektif karena tidak memerlukan biaya yang cukup mahal dan caranya pun secara alami yaitu dapat diterapkan secara langsung pada lahan yang tercemar. Dari beberapa penelitian sebelumnya teknik fitoremediasi ini sangat efektif diterapkan walaupun pada lahan yang telah terkontaminasi berat dengan berbagai macam polutan. Hal ini disebabkan karena beberapa tanaman tidak hanya mampu menyerap satu jenis polutan tetapi lebih dari satu polutan.

b. Bioremediasi

Bioremediasi merupakan metode pembersihan lahan tercemar dengan bantuan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan dari dalam tanah sehingga tidak bersifat toksik bagi lingkungan (Amzani, 2012: 10).

E. Kompos

Kompos merupakan hasil dari penguraian bahan-bahan organik dengan bantuan mikroorganisme baik secara aerob maupun anaerob. Manfaat kompos selain menambah unsur hara tanah bagi tanaman, menggemburkan tanah sehingga menguntungkan bagi akar tanaman maupun mikroorganisme tanah, meningkatkan populasi mikroorganisme dalam tanah serta mempertinggi daya serap dan daya simpan air dan unsur hara dalam tanah.

Sumber-sumber bahan dasar kompos antara lain: limbah ternak dan manusia, limbah pertanian, pupuk hijau, sampah perkotaan atau pemukiman, limbah agro industri dan limbah hasil laut (Mujab, 2011: 26). Keunggulan kompos adalah kandungan unsur hara makro maupun mikronya yang lengkap. Unsur hara makro yang terkandung dalam kompos antara lain *N, P, K, Ca, Mg*, dan *S*, sedang 19 kandungan unsur mikronya antara lain *Fe, Mn, Zn, Cl, Cu, Mo, Na B* (Yulianto, dkk, 2009: 3).

Dalam proses fitoremediasi, penyerapan logam berat oleh tanaman di pengaruhi oleh jenis tanaman, kelembaban tanah, interaksi yang kompleks antara tanah, tanaman dan logam yang dikendalikan oleh iklim (Priyambada, 2006: 118).

Untuk mengetahui pengaruh pupuk organik pada penyerapan logam Cd oleh tanaman akar wangi, maka digunakan organik, yakni jenis pupuk organik yang berasal dari tanaman (kompos). Disamping jenis pupuk organik, faktor lain yang juga menentukan kemampuan penyerapan logam berat oleh tanaman adalah takaran atau dosis pupuk, penentuan takaran pupuk organik yang dapat mencegah atau

terserap ke dalam jaringan tanaman maka dicobakan beberapa kombinasi kompos dengan tanah tercemar dengan beberapa perlakuan.

F. Fitoremediasi

1. Pengertian fitoremediasi

Fitoremediasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phyto* yang berarti tumbuhan/tanaman dan *remediation* yang berarti memperbaiki, mengurangi ataupun memulihkan. Jadi fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk memperbaiki, mengurangi ataupun memulihkan lahan tercemar berbagai polutan. Keunggulan menggunakan tanaman dalam fitoremediasi adalah tanaman lebih tahan lama dibandingkan mikroorganisme pada konsentrasi dan kontaminan yang cukup tinggi dan mampu menyerap serta mengurangi toksitas logam berat jauh lebih cepat tanpa merusak pertumbuhan dari tanaman. Metode fitoremediasi ini mengalami perkembangan pesat karena terbukti lebih relatif ekonomis dibanding dengan metode lainnya. Dari beberapa penelitian sebelumnya metode fitoremediasi ini sangat tepat digunakan pada lahan TPA dengan penanaman tanaman hiperakumulator pada lapisan terakhir TPA ataupun menggunakan sistem *wetland* (lahan basah) bagi air limbah (Irawanto, 2010, hal: 2).

2. Mekanisme kerja fitoremediasi

Mekanisme kerja fitoremediasi terdiri dari beberapa tahapan dalam mereduksi berbagai zat pencemar/polutan diantaranya:

- a. *Phytoaccumulation (phytoextraction)* merupakan proses tumbuhan/tanaman dalam menarik zat kontaminan dalam tanah dan diakumulasikan di sekitar akar tumbuhan kemudian meneruskan senyawa tersebut ke bagian tumbuhan seperti, akar, batang dan daun tanaman. Kontaminan dihilangkan dengan cara memanen tanaman.
- b. *Rhizofiltration (rhizo: akar)* merupakan proses akar tumbuhan dalam mengadsorpsi zat kontaminan untuk menempel pada akar.
- c. *Phytostabilization* merupakan proses tumbuhan dalam menarik zat-zat kontaminan tertentu ke bagian akar tanaman karena tidak dapat diteruskan ke bagian lain tanaman..Zat-zat tersebut menempel erat (stabil) pada akar sehingga tidak akan terbawa oleh aliran air dalam media.
- d. *Rhizodegradation* merupakan proses tumbuhan dalam menguraikan zat-zat kontaminan dengan aktivitas mikroba yang berada di sekitar akar tumbuhan.
- e. *Phytodegradation (phyto transformation)* merupakan proses penyerapan polutan oleh tumbuhan untuk proses metabolisme tanaman. Proses ini berlangsung pada daun, batang, akar ataupun di luar sekitar akar dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu sendiri.
- f. *Phytovolatilization* merupakan proses penyerapan polutan oleh tumbuhan dan merubahnya menjadi bersifat volatil agar tidak berbahaya lagi untuk selanjutnya diupkan ke atmosfer (Irawanto, 2010: 3).

Mekanisme penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tanaman dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Penyerapan oleh akar tanaman

Dalam proses penyerapan polutan oleh tanaman, polutan-polutan tersebut harus berbentuk larutan agar dapat diserap oleh akar tanaman. Senyawa-senyawa yang dapat larut dalam air akan diserap oleh akar bersama dengan air sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik diserap oleh permukaan tanaman itu sendiri.

2. Translokasi logam dari akar ke bagian tanaman lain.

Dalam proses ini, setelah polutan menembus lapisan endodermis akar tanaman kemudian diteruskan ke bagian atas tanaman melalui jaringan pengangkut (*xilem dan floem*) ke bagian tanaman lainnya.

3. Lokalisasi logam pada sel dan jaringan

Dalam proses ini tanaman berusaha untuk mencegah keracunan logam terhadap selnya dengan menimbun logam di dalam organ tertentu seperti pada akar agar tidak menghambat proses metabolisme tanaman (Setyaningsih dalam Handayani, dkk, 2013: 4).

Salah satu syarat dalam fitoremediasi adalah tanaman hiperkumulator harus mampu tumbuh pada kondisi lahan manapun, memiliki tingkat toleransi terhadap zat kontaminan, mampu meremediasi lebih dari satu polutan, cepat tumbuh serta mampu mengkonsumsi air dalam jumlah banyak pada waktu yang singkat.

Salah satu tanaman yang efektif sebagai hiperakumulator adalah tanaman akar wangi (*Vetiveria zizanioides*). Akar tanaman akar wangi diketahui dapat menembus lapisan tanah setebal 15 cm walaupun pada lapisan yang sangat keras misalnya pada

lereng keras dan berbatu. Akar tanaman akar wangi ini mampu menembus lapisan tekstur tanah dengan cara seperti jangkar yang kuat kemudian menahan partikel-partikel tanah melalui akar serabutnya (Gunawan dan kusumaningrum, 2012: 6).

G. Tanaman Akar Wangi (*Vetiveria zizanioides*)

1. Tinjauan tanaman akar wangi (*Vetiveria zizanioides*)

Vetiver zizanioides dikenal dengan tanaman akar wangi atau usar (*vetiver nigritana*) merupakan sejenis rerumputan yang tumbuh lebat dengan berbagai keistimewaan. Di Indonesia tanaman akar wangi ini kebanyakan dimanfaatkan sebagai penghasil minyak akar wangi karena memiliki akar yang menghasilkan aroma harum namun di mancanegara *vetiver* lebih banyak dimanfaatkan dalam keperluan ekologis dan fitoremediasi seperti mencegah erosi, penahan abrasi pantai dan untuk rehabilitasi lahan tercemar melalui teknologi *vetiver grass technology (VGT)* atau *vetiver system (VS)* yang telah dikembangkan selama 20 tahun di India (Gunawan dan kusumaningrum, 2011: 6)

Vetiver system merupakan metode penerapan rumput *vetiver* (akar wangi). Metode ini pertama kali dikembangkan oleh bank dunia untuk konservasi air dan tanah di India pada tahun 1980. Penerapan metode VS ini sangat sederhana, murah, efektif dalam konservasi tanah dan air, stabilisasi tanah, rehabilitasi atau perbaikan tanah. Keunggulan dari tanaman akar wangi ini dibandingkan dengan jenis tanaman lain adalah memiliki sistem perakaran yang tebal, cepat tumbuh dan juga sangat toleran terhadap kekeringan (*Truong, Van dan Pinnars, 2011: 10*).



Gambar 2.2. Tanaman akar wangi (*Vetiveria zizanioides*)

Klasifikasi *Vetiveria zizanioides* adalah sebagai berikut :

Kerajaan	: <i>Plantae</i>
Divisi	: <i>Magnoliophyta</i>
Kelas	: <i>Liliopsida</i>
Ordo	: <i>Poales</i>
Famili	: <i>Poaceae</i>
Genus	: <i>Vetiveria</i>
Spesies	: <i>V. zizanioides</i>

Tanaman akar wangi masuk dalam keluarga *Graminae* yang berumpun lebat dengan memiliki akar serabut yang bercabang. Ciri-ciri dari akar tanaman akar wangi ini berwarna kuning pucat atau abu-abu hingga berwarna merah tua. Perkembangbiakan tanaman ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara vegetatif dengan perbanyakan melalui anak rumpun sedangkan secara generatif dilakukan dengan melalui biji tanaman.

Tanaman akar wangi dikenal terbagi atas dua macam yaitu tanaman akar wangi tipe India utara (tumbuh liar dan berbiji) dan tipe India Selatan (tidak berbiji atau steril). Namun di Queensland (Australia) ditemukan varietas akar wangi yang

dapat menghasilkan bunga, sehingga jika ingin dibiakkan dilakukan secara vegetatif. (Seswita dan Hadipoentyanti, 2010: 27-28).

2. Keunggulan tanaman akar wangi dalam fitoremediasi

Keunggulan dari tanaman akar wangi selain mampu mengurangi pencemaran pada lahan tercemar logam berat dapat pula menurunkan tingkat erosi tanah, toleran terhadap banjir dan kekeringan, pH tanah yang cukup tinggi dan tumbuh pada daerah dataran rendah maupun daerah dataran tinggi. Daun dari tanaman akar wangi ini dapat dijadikan pakan ternak, mulsa, menekan rumput liar. Selain itu tanaman akar wangi ini dapat pula menghasilkan kerajinan tangan seperti, atap anyaman, Pembuatan batu bata lumpur dari daun akar wangi, tali dan pengikat, ornamen serta akarnya dapat menghasilkan minyak akar wangi (Pinnars, 2011: 106-124).

Kemampuan tanaman akar wangi (*vetiveria zizanioides*) dalam menahan erosi lereng gunung, stabilisasi tebing, penahan abrasi pantai, remediasi tanah tercemar logam berat disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Sistem perakarannya yang rimbun dan mampu menembus ke dalam tanah hingga beberapa meter.
- b. Memiliki akar yang tebal sehingga dapat mengikat tanah sehingga tumbuh secara kuat dalam tanah.
- c. Dapat dijadikan sebagai tanaman pagar dengan pertumbuhan yang merata.
- d. Mampu tumbuh kembali setelah mengalami kemarau panjang, banjir, kebakaran ataupun pada kondisi tanah lainnya.

- e. Sangat toleran terhadap keasaman, alkalinitas, salinitas, soldisitas dan magnesium dalam tingkat menengah tinggi.
- f. Sangat toleran terhadap Al, Mn dan logam berat seperti As, Cd, Cr, Ni, Pb dan Hg.
- g. Toleran terhadap beragam pH tanah dari 3.3 sampai 12.5 (Paul Troung, 2011: 11).

H. Logam Cd

Logam Cd merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik dengan lambang Cd berwarna putih kebiruan, berat molekul 112.41 g/mol, densitas 8,642 g/cm³, titik didih 765⁰C, titik lebur 320,9⁰C dan tekanan uap 1 torr (ATSDR, 1993: 1). Logam Cd adalah elemen alam yang langka yang tersebar luas di kerak bumi dalam jumlah yang sangat kecil. Dalam bentuk murni, kadmium adalah lembut, logam putih kebiruan, tapi yang sering ditemukan di alam dikombinasikan dengan unsur kimia lainnya (misalnya sulfur dan seng) dalam berbagai senyawa kimia. Senyawa kadmium juga dapat diproduksi secara komersial sebagai padatan bubuk, misalnya kadmium hidroksida berupa bubuk putih dan kadmium sulfida berupa bubuk kuning cerah.


Logam Cd merupakan logam yang lunak dan relatif jarang ditemukan di lingkungan. Sebagian logam kadmium dapat larut dalam air dan sebagian lainnya seperti oksida kadmium dan kadmium sulfida hampir tidak larut. Uap dari logam Cd jika menguap ke atmosfer akan secepatnya teroksidasi sedangkan yang berada dalam

tanah kemudian diserap oleh tanaman dan memasuki rantai makanan tergantung dari jumlah ketersediaan logam Cd dalam tanah (World Bank Group, 1998: 1).

Masuknya logam berat Cd ke dalam lingkungan menyebabkan logam berat Cd masuk ke dalam rantai makanan dan masuk ke dalam makhluk hidup khususnya manusia menyebabkan terganggunya sistem fisiologi tubuh manusia berupa sistem sirkulasi darah dan jantung, sistem respirasi (pernafasan), sistem urin, kerusakan pada sistem reproduksi, sistem syaraf dan kerapuhan tulang. Berdasarkan data badan Standarisasi Nasional yang mengacu pada S.K Dirjen BPOM No. 03725/B/SK/VII/89 tentang ambang batas maksimum cemaran logam Cd dalam makanan adalah 0,2 mg/kg.

Logam Cd masuk ke dalam jaringan tanaman dari dalam tanah melalui akar tanaman kemudian diteruskan ke bagian lainnya termasuk ditimbun pada daun. Sedangkan logam Cd yang berasal dari udara seperti asap kendaraan akan tertimbun pada permukaan daun tanaman. Jumlah logam Cd ini dalam jaringan tanaman sangat bervariasi tergantung dari jenis dan kemampuan tanaman dalam menyerap logam.

Masuknya logam Cd ke dalam tubuh dapat melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan dan kulit yang kemudian terakumulasi di bagian hati dan ginjal manusia terikat pada *metalotionein*. Kemungkinan besar pengaruh toksisitas Cd disebabkan oleh interaksi antara Cd dan protein tersebut, sehingga menimbulkan hambatan terhadap aktivitas kerja enzim dalam tubuh. Secara jelas digambarkan melalui skema berikut (Sudarwin, 2008: 54).



Gambar 2.3. Skema Toksisitas Cd

I. Spektrofotometer serapan atom (AAS)

Spektrofotometer serapan atom (AAS) merupakan metode analisis kuantitatif untuk menganalisis logam dan beberapa metaloid. Peristiwa serapan atom pertama kali ditemukan oleh Fraunhofer. Pada saat ini Fraunhofer mengamati garis-garis hitam pada spektrum matahari. Garis-garis ini kemudian dikenal dengan garis Fraunhofer. Garis Fraunhofer merupakan garis-garis yang berada dalam spektrum matahari yang lebih dingin yang disebabkan oleh absorpsi atom dalam selubung matahari. Akan tetapi yang pertama kali menerapkan metode serapan atom ini dalam dunia analisis adalah ilmuwan yang bernama Alan Walsh pada tahun 1955 (Khopkar, 1990: 287).

Prinsip spektrofotometer serapan atom berdasarkan atas penyerapan energi radiasi yang diserap oleh atom-atom pada keadaan dasar berdasarkan pada unsurnya dan panjang gelombangnya sehingga tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sumber radiasi ini dikenal dengan lampu katoda berongga (*hallow cathoda lamp*). Instrumen AAS ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Sumber radiasi (*Hallow cathode lamp*)

Syarat sumber radiasi yang digunakan yaitu mampu memancarkan sinar berdasarkan pada spektrum atom yang ditentukan. Spektrum atom yang dipancarkan harus terdiri dari garis tajam yang mempunyai setengah lebar yang sama dengan garis serapan yang dibutuhkan oleh atom–atom dalam contoh. Sumber sinar yang lazim dipakai adalah lampu katoda berongga (*hallow cathode lamp*). Untuk penetapan apa saja yang diminta, lampu katoda berongga yang digunakan mempunyai suatu katoda pemancar yang terbuat dari unsur yang sama yang akan dipelajari dalam nyala ini.

2. Nyala

Nyala api yang digunakan harus mampu mengubah sampel menjadi bentuk atomnya atau dikenal dengan proses atomisasi.

3. Nebulizer (sistem pembakar)

Berfungsi untuk mengubah larutan uji dalam bentuk gas.

4. Monokromator

Dalam spektrofotometer serapan atom fungsi monokromator adalah untuk memisahkan garis resonansi dari sejumlah garis yang tak diserap dipancarkan oleh sumber radiasi. Dalam kebanyakan instrument komersial digunakan kisi difraksi karena sebaran yang dilakukan oleh kisi sebaran seragam daripada yang dilakukan oleh prisma dan akibatnya instrument kisi dapat memelihara daya pisah yang lebih tinggi disepanjang jangka panjang gelombang yang lebih besar.

5. Detektor

Detektor berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik.

6. Read out (sistem pembacaan)

Read out merupakan sistem pencatatan hasil. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu recorder yang menggambarkan absorptansi atau intensitas emisi (Cahyady, 2009: 32-35).



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2014 di Laboratorium Kimia Anorganik, Laboratorium Biokimia, Laboratorium Riset dan Laboratorium Analitik UIN Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spektrofotometer serapam atom (SSA) varian AA240ES, oven, penangas listrik, neraca analitik, cawan penguap/cawan porselin, desikator, pot plastik (ukuran sedang) dan alat gelas yang umum digunakan di laboratorium.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman akar wangi (*Vetiveria zizanioides*), aquabidest (H_2O), asam nitrat (HNO_3) p.a, $HClO_4$ (asam perklorat) p.a, aluminium foil, kertas saring, media tanam (tanah tercemar TPA Tamangapa), kompos dan tissu.

C. *Prosedur Kerja*

1. Teknik Sampling

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan berasal dari TPA Tamangapa Antang makassar. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari beberapa titik berdasarkan tingkat pelapukan sampah yaitu terdiri atas pelapukan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun agar representatif.

2. Tahap Aklimatisasi Tanaman

Aklimatisasi bertujuan agar tanaman uji tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tempat percobaan dan media tanamnya sehingga dapat hidup sampai akhir percobaan. Komposisi media tanam berupa perbandingan tanah tercemar (TT) dan kompos (K) yaitu 5 (TT) : 1 (K), 4,5 (TT) : 1,5 (K), 4 (TT) : 2 (K) dan sebagai tanaman kontrol 100 % (TT). Penanaman sampel menggunakan pot (ukuran sedang) dengan berat media tanam 6 Kg dengan komposisi media tanam sesuai dengan perlakuan. Tanaman dikatakan stabil apabila tanaman dapat tumbuh subur dan tidak mengalami kematian serta muncul tunas baru.

3. Analisa logam Cd pada media tanah

- a. Menimbang ± 5 gram sampel kemudian ditambahkan 5 mL HNO_3 p.a dan 1 mL HClO_4 p.a dan didiamkan semalaman.
- b. Memanaskan diatas hot plate pada suhu 100°C selama 1 jam 30 menit hingga terbentuk endapan putih atau sisa larutan jernih sekitar 1 mL.

- c. Filtrat didinginkan kemudian diencerkan dengan aquabidest menjadi 10 mL kemudian dihomogenkan sampai tanda batas miniskus pada labu takar 100 mL.

4. Pengamatan terhadap penurunan konsentrasi Cd.

a. Penentuan konsentrasi Cd tanaman dengan AAS

1. Mengambil 2-3 bonggol ruas dalam setiap tanaman uji.
2. Bagian akar, batang dan daun dibersihkan kemudian dipotong kecil-kecil.
3. Memanaskan dalam oven pada suhu $105^{\circ}\text{C} \pm 2$ jam hingga bobot konstan.
4. Menimbang kembali untuk mengetahui bobot konstannya.
5. Menimbang sampel kering sebanyak ± 5 gram pada neraca analitik.
6. Menambahkan aquabidest 25 mL dan HNO_3 pekat 5 mL
7. Memanaskan hingga volumenya 10 mL hingga terbentuk endapan putih.
8. Menambahkan 1 mL HClO_4 pekat
9. Menyaring ke dalam labu takar 100 mL kemudian menghimpitkan dengan aquabidest hingga tanda batas miniskus.
10. Larutan siap diukur dengan SSA.

b. Analisis morfologi tanaman.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis persamaan regresi linear dari kurva baku kadmium (Cd) menggunakan hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Bentuk umum dari persamaan garis linear yaitu:

$$y = a + bx$$

Dimana:

y = absorbansi sampel

x = konsentrasi kadmium (Cd) dalam sampel

a = slope

b = intersep

Nilai b dan a diperoleh dengan persamaan:

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a = \frac{\sum y_i}{n} - b \frac{\sum x_i}{n}$$

Nilai korelasi dapat dihitung dengan persamaan:

$$r_{x,y} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{((n \sum x_i^2) - (\sum x_i)^2)((n \sum y_i^2) - (\sum y_i)^2)}}$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*) mampu mengakumulasi logam berat kadmium (Cd) yang bersumber dari tanah tercemar pada lahan TPA Tamangapa Makassar. Analisis pendahuluan terhadap sampel tanah tercemar menunjukkan konsentrasi logam Cd yang terkandung pada sampel tanah TPA Tamangapa Makassar sebesar 0,116 mg/Kg.

Pengamatan dilanjutkan dengan analisis konsentrasi Cd pada lahan TPA Tamangapa Makassar menggunakan tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*) dengan penambahan kompos melalui beberapa perbandingan sebagai stimulan untuk penyerapan logam berat Cd. Adapun perbandingan tanah tercemar dengan kompos yang digunakan dalam penelitian ini yaitu [5 : 1], [4,5 :1,5], [4 : 2] dan sebagai tanaman kontrol tanpa penambahan kompos. Pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali selama 28 hari. Adapun konsentrasi Kadmium (Cd) yang mampu diserap oleh tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*) tanpa penambahan kompos dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1 Konsentrasi Cd pada tanaman kontrol (100% tanah tercemar)

Hari	Absorbansi Cd (mg/L)		Absorbansi Cd rata-rata (mg/L)	Konsentrasi Cd (mg/L)	Konsentrasi Cd (mg/Kg)	Ket.
	1	2				
0	0,0093	0,0069	0,0081	0,0058	0,116	Tanah
7	0,0089	0,0091	0,009	0,00746	0,25	Tanaman Akar wangi (<i>vetiver zizanioides</i>)
14	0,0059	0,0046	0,0052	0,01197	0,24	
21	0,0069	0,0066	0,0067	0,01513	0,302	
28	0,0047	0,0064	0,00555	0,02066	0,414	


(5 : 1) = (TT : K)

(4,5 : 1,5) = (TT : K)

(4 : 2) = (TT : K)

Ket : Tabel terdapat pada lampiran

Konsentrasi kadmium yang mampu diserap oleh tanaman Akar Wangi dapat terlihat pada grafik 4.1 berikut:

**Gambar 4.1** Grafik penyerapan Cd pada tanaman Akar Wangi

Gambar Grafik 4.1 diatas menunjukkan kemampuan tanaman akar wangi (*vetiver zizanioides*) dalam melakukan penyerapan terhadap tanah tercemar logam Cd. Penyerapan pada tanaman kontrol tertinggi terjadi pada hari ke-28 yakni sebesar

0,298 mg/Kg, dimana penyerapan konsentrasi Cd seakan meningkat seiring dengan lamanya waktu kontak. Pada perbandingan [5:1] dan [4:2] sama-sama mengalami fluktuasi. Sedangkan untuk perbandingan [4,5:1,5] penyerapannya meningkat hingga minggu ke-3 kemudian menurun pada minggu berikutnya.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini sampel tanah tercemar logam Cd yang digunakan bersumber dari TPA Tamangapa Makassar dengan menggunakan kompos sebagai stimulan untuk mengetahui daya serap dari tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*). Perbandingan tanah tercemar (TT) dan kompos (K) digunakan beberapa perbandingan yaitu 5 (TT) : 1 (K), 4,5 (TT) : 1,5 (K), 4 (TT) : 2 (K) dan sebagai tanaman kontrol 100 % (TT). Tujuan penambahan kompos ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos dalam proses adsorpsi tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*) terhadap logam berat Cd. Penelitian ini dilakukan selama 28 hari dan analisis tanaman dilakukan setiap 7 hari sekali.


Sampel tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*) yang akan dianalisis terlebih dahulu dibersihkan kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya dihilangkan kadar airnya dengan cara mengoven selama ± 2 jam pada suhu 105°C . Sampel kering ± 5 gram tersebut kemudian didekstruksi basah. Fungsi dari dekstruksi ini adalah untuk memutuskan ikatan senyawa organik dengan logam yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini digunakan dekstruksi basah karena dekstruksi basah dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur dengan konsentrasi rendah, selain itu

dekstruksi kering dapat merusak jaringan tanaman. Selanjutnya sampel kering tersebut ditambahkan aqua bidestilat untuk mencegah terjadinya letupan kecil (*bumping*) ketika penambahan asam nitrat (HNO_3) dan asam perklorat (HClO_4). Fungsi penambahan asam nitrat (HNO_3) adalah untuk merombak senyawa-senyawa organik dalam sampel serta mengikat logam yang akan dianalisis dan fungsi dari asam perklorat (HClO_4) sebagai oksidator untuk menghilangkan senyawa pengganggu menyempurnakan pada sampel Akar wangi (*vetiver zizanioides*).

1. Mekanisme akumulasi logam Cd oleh tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*)

Kemampuan tanaman dalam beradaptasi pada lingkungan tercemar logam berat serta kemampuan dalam mengakumulasi logam berat tidak dimiliki oleh semua tumbuhan. Beberapa tumbuhan yang mengakumulasi logam berat yang memiliki sensitivitas kemampuan yang berbeda-beda. Seperti halnya tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*). Dalam mengakumulasi Logam berat seperti kadmium (Cd) diserap oleh akar tumbuhan dalam bentuk ion-ion yang larut dalam air seperti unsur hara yang ikut masuk bersama aliran air. Dalam menyerap logam berat, tumbuhan membentuk suatu enzim reduktase di membran akarnya yang berfungsi mereduksi logam. Dari akar kemudian kadmium (Cd^{2+}) diangkat melalui jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem, ke bagian lain tumbuhan. Untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan, logam diikat oleh molekul khelat (molekul pengikat) (Gosh dan Singh dalam Triastuti, 2011: 9). Setelah itu, kadmium diakumulasikan di seluruh bagian tanaman akar wangi (*Vetiveria zizanioides*) pada bagian akar, batang, dan daun.

Logam berat seperti Cd akan terakumulasi oleh tanaman akar wangi (*vetiver zizanioides*) setelah membentuk senyawa kompleks dengan unsur dan senyawa lain seperti fitokhelatin yang tersusun dari beberapa asam amino seperti sistein dan glisin. Fikokelatin berfungsi membentuk senyawa kompleks dengan logam berat dalam tubuh tumbuhan dan berfungsi sebagai detoksifikasi terhadap tumbuhan dari logam berat, jika tumbuhan itu tidak bisa mensintesis fikokelatin menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan berujung pada kematian.



Gambar 4.2. Senyawa Kompleks Fitokhelatin dan Cd^{2+}

Tanaman hiperakumulator dalam mengakumulasi logam berat jika mengalami keracunan dapat mengakibatkan tanaman mengalami klorosis, nekrosis dan pertumbuhan tanaman yang kerdil. Seperti halnya tanaman akar wangi (*vetiver zizanioides*). Klorosis yaitu daun yang kehilangan klorofil yang ditandai dengan menguningnya daun tanaman. Nekrosis yaitu gejala kematian pada sel tanaman yang ditandai dengan menggulungnya daun tanaman serta keriput.

2. Pengaruh penambahan kompos terhadap penyerapan logam Cd pada tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*)

Dalam proses fitoremediasi dengan menambahkan kompos sebagai stimulan untuk penyerapan logam berat Cd maka tumbuhan menstimulasi aktivitas mikroba yang berada pada kompos maupun tanah untuk mendegradasikan logam-logam. Peranan tumbuhan mengeluarkan protein, asam organik maupun senyawa lain yang dibutuhkan oleh mikroba pada akar yang disebut eksudat. Eksudat inilah yang menarik mikroba-mikroba dalam tanah sehingga mendekati akar tanaman yang dikenal dengan istilah kemotaksis sehingga logam-logam yang diserap dapat diteruskan ke jaringan lain tanaman seperti batang dan daun tanaman (Widyati, 2008: 7).

Hasil analisa terhadap akumulasi logam Cd pada tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*) dengan penambahan kompos sebagai stimulan mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan bahwa penambahan kompos sebagai stimulan kurang signifikan meningkatkan proses fitoremediasi. Seperti pada perbandingan 5 (TT) : 1 (K) dan perbandingan 4 (TT) : 2 (K). Hal ini menandakan bahwa tanaman telah mengalami keracunan yang ditandai dengan gejala klorosis dan nekrosis, dapat dilihat perbedaannya dengan jelas pada tanaman akar wangi tanpa penambahan kompos (kontrol). Klorosis merupakan keracunan pada tanaman yang ditandai dengan gejala menguningnya daun tanaman karena kehilangan klorofil sedangkan nekrosis merupakan gejala kematian sel tanaman yang ditandai dengan daun yang menggulung dan daun yang keriput/berparut sehingga proses fisiologis tanaman terganggu dan menyebabkan ketidakmampuan tanaman menyerap logam dalam jumlah yang besar (Rismawati, 2012: 5). Kemudian setelah penyerapan tanaman mengalami penurunan,

tanaman melakukan penyerapan kembali. Hal ini disebabkan oleh kemampuan tanaman melakukan mekanisme detoksifikasi melalui sintesis fitokhelatin oleh tanaman akar wangi (*vetiver zizanioides*) dalam jumlah yang lebih banyak sehingga tanaman masih bisa bertahan hidup dan mampu mengakumulasi logam Cd dan ditimbun pada vakuola sehingga penyerapannya meningkat (raya dan ramlah, 2012: 3). Kemudian tanaman juga memiliki kemampuan dalam detoksifikasi ekstraseluler yang diakibatkan oleh interaksi antara logam Cd dengan gugus hidroksil pada selulosa yang melapisi dinding sel tanaman. Penyerapan logam Cd oleh dinding sel berfungsi untuk mencegah Cd masuk ke dalam sel atau mengurangi jumlah Cd yang masuk ke dalam sel sehingga akan mengurangi tingkat keracunan tanaman akar wangi (*vetiver zizanioides*) sehingga tetap tumbuh (Fauziah, 2011: 50).

Sedangkan perbandingan 4,5 (TT) : 1,5 (K) mengalami kenaikan hingga minggu ke-3 sebesar 0,048 mg/Kg kemudian mengalami penurunan pada minggu berikutnya sebesar 0,022 mg/Kg. Hal ini disebabkan karena tanaman dalam keadaan lewat jenuh sehingga tidak mampu lagi melakukan penyerapan yang ditandai dengan gejala keracunan pada tanaman akar wangi (*vetiver zizanioides*).

Sedangkan pada tanaman kontrol (100% tanah tercemar) menunjukkan Presentase penurunan konsentrasi kadmium seakan meningkat seiring dengan semakin lamanya waktu yang digunakan proses fitoremediasi oleh tanaman untuk menyerap logam berat dalam tanah. Penyerapan konsentrasi kadmium tertinggi terjadi pada hari ke-28 yakni sebesar 0,298 mg/Kg. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kadmium (Cd) sebagai jenis logam berat yang mampu menguap ke

atmosfer, dimana polutan Cd dari dalam tanah yang diserap oleh tanaman akar wangi (*Vetiveria zizanioides*) ditransformasikan dan dikeluarkan dalam bentuk uap cair ke atmosfer dan kemudian diserap oleh daun. Proses ini yang kemudian disebut fitovolatilisasi.

Dari hasil penelitian terhadap akumulasi logam Cd pada tanaman Akar wangi (*vetiver zizanioides*) diketahui bahwa tanaman akar wangi (*vetiver zizanioides*) dapat mengakumulasi logam kadmium (Cd) dari sampel tanah tercemar TPA Tamangapa Makassar. Namun kemampuan akumulasi kadmium (Cd) pada tanaman akar wangi (*vetiver zizanioides*) belum dapat dikatakan sebagai tanaman hiperakumulator untuk logam Cd karena hanya menyerap 0,298 mg/Kg

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tanaman akar wangi (*Vetiver zizanioides*) mempunyai kemampuan dalam mengurangi pencemaran kadmium (Cd^{2+}) pada lahan TPA Tamangapa Makassar sebesar 0,298 mg/Kg.
2. Adanya penambahan kompos sebagai stimulant tidak memberikan pengaruh signifikan pada kemampuan tanaman akar wangi (*Vetiver zizanioides*) menyerap Cd.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan agar dapat menggunakan tanaman lainnya yang mampu mengakumulasi kadmium dalam tanah dengan metode yang lain seperti metode bioremediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amzani, Fuad. 2012. "Pencemaran Tanah Dan Cara Penanggulannya" Lampung: Politeknik Negeri Lampung.
- Arif, Fitriyanti, dkk. 2012. "Penanganan Sampah Permukiman Di Kawasan Pesisir Kota Makassar" Makassar: Universitas Hasanudin Makassar.
- ATSDR. 1993. "Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for Cadmium. Prepared under contract No. 205-88-0606 for: *US Department of Health and Human Services, Public Health Service*. Atlanta, GA: ATSDR.
- Bahtiar, Ayi. 2007. "Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri dan Rumah Tangga Serta Pemecahannya" Bandung: Universitas Padjajaran Bandung.
- Boybul dan Iis Haryati. 2009. "Analisis Unsur pengotor Fe, Cr dan Ni Dalam Larutan Uranil Nitrat Menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom" Yogyakarta: Pusat Teknologi Bahan Nuklir-Batan.
- Balai Penelitian Tanah. 2005. "Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk" *Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian Departemen Pertanian*. <http://balittanah.litbang.deptan.go.id> ISBN (20 Februari 2014).
- Cahyady, Bobby. 2009. "Studi Kesensitifan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) Teknik Vapour Hydride Generation Accessories (VHGA) Dibandingkan dengan SSA Nyala Pada Analisis Unsur Arsen (As) Yang Terdapat Dalam Air Minum" *Thesis*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara Medan.
- Darmono. 1999. "Kadmium (Cd) dalam Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Dan Produktivitas Ternak" *Wartazoa*, Volume 8, no. 1 : h. 28 – 32.
- Departemen Agama. 1989. "Al Quran dan Terjemahannya" Semarang: Toha Putra.
- Fauziah. 2011. "Efektivitas Penyerapan Logam Kromium (Cr) dan Kadmium (Cd) oleh *Scenedesmus dimorphus*". Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.


- Gunawan, G dan Nanny Kusmaningrum. 2012. "Penanganan Erosi Lereng Galian dan Timbunan Jalan dengan Rumput Vetiver" Bandung: *Puslitbang jalan dan Jembatan*.
- Handayani, dkk. 2013. "Efisiensi Fitoremediasi Pada Air Terkontaminasi Cu Menggunakan *Salvina Molesta Mitchel*" Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Herdiani, Henggar. 2009. "Potensi Tanaman Dalam Mengakumulasi Ligam Cu PF Pada Media Tanah Terkontaminasi Limbah Padat Industri Kertas" *Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung*. Volume 44, no. 1 : h. 27 – 40.
- Irawanto, Rony. 2010. "Fitoremediasi Lingkungan Dalam Taman Bali" *UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-LIPI*. Volume 2, no. 4 : h. 29 – 35.
- Juhaeti, Titi, dkk. 2005. "Inventarisasi Tumbuhan Potensial Untuk Fitoremediasi Lahan dan Air Terdegradasi Penambangan Emas" *Lembaga Ilmu Pengetahuan Lipi Bogor*. Volume 6, no. 1 : h. 31 – 33.
- Kusmaningrum, Nanny. 2011. "Peranan Rumput Vetiver dan bahia dalam meminimasi terjadinya erosi lereng (*the role of vetiver And bahia grass in minimizing slope erosion*)" Bandung: *Pusat Litbag Jalan dan Jembatan*.
- Khopkar, S. 2008. "Konsep Dasar Kimia Analitik" Jakarta: UI-Press.
- M, Juandi. 2009. "Analisa Pencemaran Air Tanah Berdasarkan Metode Geolistrik Studi Kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah Muara Fajar Kecamatan Rumbai" Riau: Universitas Riau.
- Mega, Puteri Litany, dkk. 2010. "Pengaruh Penambahan Ph Terhadap Removal Logam Berat Timbal (Pb) Oleh Tumbuhan Lidah Mertua (*Sansivieria Trifasciata*) Di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya". Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
- Mujab, Ahmad Saepul. 2011. "Penggunaan Biokompos Dalam Bioremediasi lahan Tercemar Limbah Lumpur Minyak Bumi" *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Raya, Indah dan Ramlah. 2012. "The Bioaccumulation of Cd(II) ions on *euchema cottoni* Seaweed Bioakumulasi Ion Cd (II) pada Rumput Laut *euchema cottoni*" Makassar: Universitas Hasanuddin, Volume 13, no.2 h. 3.
- Rismawati, Senja Ike. 2012. "Fitoremediasi Tanah Tercemar Logam Berat Zn Menggunakan Tanaman Jarak Pagar (*Jatropha curcas*)" Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.

- Rosman, Rosihan Octavia Trislawati dan Setiawan. 2013. "Pemupukan Nitrogen, Fosfor, Dan Kalium Pada Tanaman Akar Wangi". Bogor: *Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat*.
- Shihab, M. Quraish. 2002. "Tafsir Al misbah". Jakarta: Lentera Hati, h. 76.
- Seswita, Deliah dan Endang hadipoentyanti. 2010. "Pemanfaatan Plasma Nutfah Akar Wangi Dalam memperoleh Variates Unggul" Bogor: *Balai Penelitian Obat Dan Aromatik*.
- Sudarwin. 2008. "Analisis Spasial Pencemaran Logam Berat (Pb Dan Cd) Pada Sedimen Aliran Sungai Dari tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang Semarang ." *Thesis*, Semarang : Magister Kesehatan Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Standar nasional Indonesia. 2002. "Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan" *SNI 19-2454-2002* (20 Februari 2014).
- Standar nasional Indonesia. 1994. "Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Perkotaan" *SNI 03-3241-1994*.
- Syamsuddin, dkk. 2012. "The Subsurface Resistivity Studies In Gampong Jawa Waste Disposal banda Aceh". Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam. Volume 12, No. 1,2012.
- Tobing, Imran SL. 2005. "Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Manusia" Jakarta: Fakultas Biologi Universitas Nasional.
- Triastuti, Yuli. 2010. "Fitoremediasi Tanah Tercemar Merkuri (Hg^{2+}) Menggunakan Tanaman Akar Wangi (*Vetiver Zizanioides*) Pada Lahan Eks-Tpa Keputih, Surabaya" Surabaya: ITS.
- Troung, Paul. 2011. "Penerapan Sistem vetiver Ramah Lingkungan" *Indonesian Vetiver Network*.
- Tehubijuluw, Hellna, dkk. 2013. "Penentuan Kandungan Logam Cd dan Cu Dalam Produk Ikan Kemasan Kaleng Secara Spektrofotometer Serapan Atom" *Indonesian E-Journal Of Aplied Chemistry*. Ambon: State University Of Pattimura. Volume 1, No. 1.
- Pinners, Elise. 2011. "Penerapan Sistem vetiver Ramah Lingkungan" *Indonesian Vetiver Network*.
- Prijambada, D. Irfan. 2006. "Peran Mikroorganisme Pada Fitoremediasi Tanah Tercemar Logam Berat". Makalah yang disajikan pada Plenary dan Simposium PIT PERMI di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Van, Tran Van. 2011. “Penerapan Sistem vetiver Ramah Lingkungan” *Indonesian Vetiver Network*.
- Widyawati, Enny. 2008. “Peranan Mikroba Tanah pada Kegiatan Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang (*Roles of Soil Microbes in Ex-Mining Land Rehabilitation*). *Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam*, Volume V, no.2.
- World Bank Group. 1998. “Pollution Prevention and Abatement Handbook” *Project Guidelines: Pollutants*
- Yan, Wang. 2005. “Phytoremediation Of Soil Contaminated With Copper And Zinc From Pig Waste” Malaysia: University Putri Malaysia.
- Yulianto, Adi Budi. 2009. “Konversi Sampah Menjadi Kompos Berkualitas Tinggi” Jakarta: *Bank Danamon Kuningan*.
- Zubair, A, dkk. 2013. “Analisis Kualitas Air Lindi TPA Tamangapa Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan” *Universitas Hasanuddin Makassar*: h. 1 – 9.
- Zubair, Achmad dan Haeruddin. 2012. “Studi Potensi Daur Ulang Sampah Di TPA Tamangapa Kota Makassar” *Prosiding 2012 Group Teknik Sipil Universitas Hasanuddin*, Volume 6 : h. 1 – 10.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1: Skema Kerja




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN PROSEDUR KERJA


Lampiran 1 : Teknik Sampling




Lampiran 2 : Tahap Aklimatisasi Tanaman Akar wangi (*Vetiver zizanioides*)




Lampiran 3 : Uji konsentrasi logam Cd pada media tanah




Lampiran 4 : Penentuan konsentrasi Cd tanaman dengan AAS

LAMPIRAN PEMBUATAN LARUTAN


Lampiran 1 : Pembuatan Larutan Baku Logam kadmium (Cd) 100 mg/L



Lampiran 2 : Pembuatan Larutan Pengencer



Lampiran 3 : Pembuatan larutan baku (Cd) 10 mg/L



Lampiran 4 : Pembuatan Larutan Kerja Logam kadmium (Cd)

Larutan baku Cd 100 mg/L

- Dipipet sebanyak 0 ml; 0,025 ml; 0,05 ml; 0,1 ml; 0,2 ml dan 0,5 ml larutan baku Cd 10 mg/L masing-masing ke dalam labu ukur 50 ml.
- Dihimpitkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

Larutan kerja Cd

LAMPIRAN PERHITUNGAN DERET STANDAR

Lampiran 1 : Larutan Standar Cd

a. Cd konsentrasi 0,025 mg/L

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/L} = 50 \text{ mL} \times 0,025 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = \frac{1,25 \text{ mL mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0,125 \text{ mL}$$

b. Cd konsentrasi 0,05 mg/L

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/mL} = 50 \text{ mL} \times 0,05 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = \frac{2,5 \text{ mL mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0,25 \text{ mL}$$

c. Cd konsentrasi 0,1 mg/L

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/mL} = 50 \text{ mL} \times 0,1 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0,5 \text{ mL}$$

d. Cd konsentrasi 0,2 mg/L

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/mL} = 50 \text{ mL} \times 0,2 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = \frac{10 \text{ mL mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL}$$

e. Cd konsentrasi 0,5 mg/L

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/mL} = 50 \text{ mL} \times 0,5 \text{ mg/L}$$

$$V_1 = \frac{25 \text{ mL mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 2,5 \text{ mL}$$

Lampiran 2 : Larutan pengencer

HNO₃ 1,0 N 500 mL

$$N = \frac{\% \times Bj \times 1000}{BM}$$

$$N = \frac{65\% \times 1,40 \times 1000}{63}$$

$$= 14,444 \text{ grek/L}$$

$$V_1 N_1 = V_2 N_2$$

$$V_1 = \frac{0,5 \text{ L} \times 1,0 \text{ grek / L}}{14,444 \text{ grek / L}}$$

$$= 0,03462 \text{ L}$$

$$= 34,62 \text{ mL} / 35 \text{ mL}$$

LAMPIRAN GAMBAR PENELITIAN



a. Menghomogenkan tanah



b. Membuat gundukan



c. Aklimatisasi tanah



d. Penanaman akar wangi



e. Pengambilan akar wangi



f. Pemotongan sampel



g. Mengoven sampel



h. Penimbangan sampel



i. Dekstruksi sampel



j. Penyaringan



k. Filtrat



l. Analisis sampel dengan AAS



m. Gejala klorosis



n. Gejala nekrosis

LAMPIRAN PERHITUNGAN SAMPEL

Lampiran 1 : Analisa data minggu ke-1

Komposisi media tanam	Konsentrasi Cd (mg/L)	Konsentrasi Cd (mg/Kg)	Hasil Penyerapan ($x_t - x_0$)
Tanaman kontrol	0,00746 mg/L	0,25 mg/Kg	0,134 mg/Kg
[5 : 1]	0,00382 mg/L	0,127mg/Kg	0,011 mg/Kg
[4,5 : 1,5]	0,00401 mg/L	0,133 mg/Kg	0,017 mg/Kg
[4 : 2]	0,00951 mg/L	0,316mg/Kg	0,201 mg/Kg

$$Y = 0,536x + 0,005$$

1. Tanaman kontrol

$$0,009 = 0,536x + 0,005$$

$$X = \frac{0,009 - 0,005}{0,536}$$

$$= 0,00746 \text{ mg/L}$$

$$\text{Konsentrasi sampel (mg/Kg)} = \frac{0,00746 \text{ mg/L} \times 0,1 \text{ L}}{3,0007 \text{ g} \times \frac{1 \text{ Kg}}{1000 \text{ g}}}$$

$$= 0,25 \text{ mg/Kg}$$

Lampiran 2 : Analisa data minggu ke-2. $Y = 0,355x + 0,001$

Komposisi media tanam	Konsentrasi Cd (mg/L)	Konsentrasi Cd (mg/Kg)	Hasil Penyerapan ($x_t - x_0$)
Tanaman kontrol	0,01197 mg/L	0,24 mg/Kg	0,124 mg/Kg
[5 (TT) : 1 (K)]	0,00507 mg/L	0,102mg/Kg	-0,014 mg/Kg
[4,5 (TT) : 1,5(K)]	0,00676mg/L	0,136 mg/Kg	0,02 mg/Kg
[4 (TT) : 2(K)]	0,00507 mg/L	0,102 mg/Kg	-0,014 mg/Kg

Lampiran 3 : Analisa data minggu ke-3

$$Y = 0,380x + 0,001$$

Komposisi media tanam	Konsentrasi Cd (mg/L)	Konsentrasi Cd (mg/Kg)	Hasil Penyerapan ($x_t - x_0$)
Tanaman kontrol	0,01513 mg/L	0,306 mg/Kg	0,187 mg/Kg
[5 (TT) : 1 (K)]	0,01105 mg/L	0,222 mg/Kg	0,106 mg/Kg
[4,5 (TT) : 1,5(K)]	0,00816 mg/L	0,164 mg/Kg	0,048 mg/Kg
[4 (TT) : 2(K)]	0,00868 mg/L	0,174mg/Kg	0,058 mg/Kg

Lampiran 4 : Analisa data minggu ke-4

$$Y = 0,317x - 0,001$$

Komposisi media tanam	Konsentrasi Cd (mg/L)	Konsentrasi Cd (mg/Kg)	Hasil Penyerapan ($x_t - x_0$)
Tanaman kontrol	0,02066 mg/L	0,414 mg/Kg	0,298 mg/Kg
[5 (TT) : 1 (K)]	0,01073mg/L	0,214 mg/Kg	0,098 mg/Kg
[4,5 (TT) : 1,5(K)]	0,00694 mg/L	0,138 mg/Kg	0,022 mg/Kg
[4 (TT) : 2(K)]	0,00868mg/L	0,174mg/Kg	0,058 mg/Kg

LAMPIRAN ANALISA DATA

Lampiran 1 : Analisis data hari ke-7


a. Data hasil pengamatan

No.	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	0,0	0,0003
2	0,025	0,0173
3	0,05	0,0333
4	0,1	0,0610
5	0,2	0,1184
6	0,5	0,2705

b. Data kurva larutan standar

No.	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x^2	y^2	x.y
1	0	0,0003	0	0,00000009	0
2	0,025	0,0173	0,000625	0,0003	0,00043
3	0,05	0,0333	0,0025	0,00111	0,00167
4	0,1	0,0610	0,01	0,00372	0,0061
5	0,2	0,1184	0,04	0,01402	0,02368
6	0,5	0,2705	0,25	0,07317	0,13525
N = 6	N = 0,875	N = 0,5008	N = 0,303125	N = 0,09232009	N = 0,16713

c. Grafik



d. Analisa data

1. Persamaan garis linear

$$y = ax + b$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{6 \times 0,16713 - 0,875 \times 0,5008}{6 \times 0,303125 - (0,875)^2}$$

$$b = \frac{1,00278 - 0,4382}{1,81875 - 0,765625}$$

$$b = \frac{0,56458}{1,053125}$$

$$b = 0,536$$

$$a = y_{\text{rata-rata}} - b x_{\text{rata-rata}}$$

$$= 0,0834 - 0,536 \times 0,1458$$

$$a = 0,005$$

Jadi, persamaan linear yang diperoleh adalah:

$$y = a + bx$$

$$y = 0,005 + 0,536x$$

Keterangan

y = absorbansi sampel

x = konsentrasi Kadmium (Cd)

2. Nilai regresi (r^2)

$$R^2 = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{((n \sum x^2) - (\sum x)^2)((n \sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{6 \times 0,16713 - 0,875 \times 0,5008}{\sqrt{((6 \times 0,303125) - (0,875^2))((6 \times 0,09232009) - (0,5008)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{1,00278 - 0,4382}{\sqrt{(1,81875 - 0,76563)(0,55392054 - 0,25080064)}}$$

$$R^2 = \frac{0,56458}{0,565}$$

$$= 0,999$$

Lampiran 2 : Analisis Data hari ke-14


a. Data hasil pengamatan

No.	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	0,0	-0,0002
2	0,025	0,0121
3	0,05	0,0191
4	0,1	0,0367
5	0,2	0,0731
6	0,5	0,1789

b. Data kurva larutan standar

No.	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x^2	y^2	x.y
1	0	-0,0002	0	0,00000004	0
2	0,025	0,0121	0,000625	0,00014641	0,0003025
3	0,05	0,0191	0,0025	0,00036481	0,000955
4	0,1	0,0367	0,01	0,00134689	0,00367
5	0,2	0,0731	0,04	0,00534361	0,01462
6	0,5	0,1789	0,25	0,3200521	0,08945
N = 6	N = 0,875	N = 0,3197	N = 0,303125	N = 0,03920697	N = 0,1089975

c. Grafik



d. Analisa data

1. Persamaan garis linear

$$y = ax + b$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{6 \times 0,1089975 - 0,875 \times 0,3197}{6 \times 0,303125 - (0,875)^2}$$

$$b = \frac{0,3742475}{1,053125}$$

$$b = 0,355$$

$$\begin{aligned} a &= y_{\text{rata-rata}} - b x_{\text{rata-rata}} \\ &= 0,0532 - 0,355 \times 0,1458 \\ a &= 0,001 \end{aligned}$$

Jadi, persamaan linear yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned} y &= a + bx \\ y &= 0,001 + 0,355x \end{aligned}$$

Keterangan

y = absorbansi sampel

x = konsentrasi Kadmium (Cd)

2. Nilai regresi (r^2)

$$R^2 = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{((n \sum x^2) - (\sum x)^2)((n \sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{6 \times 0,1089975 - 0,875 \times 0,3197}{\sqrt{((6 \times 0,303125) - (0,875)^2)((6 \times 0,03920697) - (0,3197)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{0,65394 - 0,27974}{\sqrt{(1,81872 - 0,76563)(0,2352 - 0,10221)}}$$

$$R^2 = \frac{0,3742}{0,37423}$$

$$R^2 = 0,999$$

Lampiran 3 : Analisis Data hari ke-21


a. Data hasil pengamatan

No.	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	0,0	-0,0008
2	0,025	0,0103
3	0,05	0,0205
4	0,1	0,0411
5	0,2	0,0793
6	0,5	0,1903

b. Data kurva larutan standar

No.	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x^2	y^2	x.y
1	0	-0,0008	0	0,00000064	0
2	0,025	0,0103	0,000625	0,00010609	0,0002575
3	0,05	0,0205	0,0025	0,00042025	0,001025
4	0,1	0,0411	0,01	0,00168921	0,0411
5	0,2	0,0793	0,04	0,00628849	0,01586
6	0,5	0,1903	0,25	0,03621409	0,09515
N = 6	N = 0,875	N = 0,3407	N = 0,303125	N = 0,04471877	N = 0,1533925

c. Grafik



d. Analisa data

1. Persamaan garis linear

$$y = ax + b$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{6 \times 0,1164025 - 0,875 \times 0,3407}{6 \times 0,303125 - (0,875)^2}$$

$$b = \frac{0,698415 - 0,2981125}{1,81872 - 0,76563}$$

$$b = \frac{0,4003025}{1,05309}$$

$$b = 0,380$$

$$a = y_{\text{rata-rata}} - b x_{\text{rata-rata}}$$

$$= 0,0567 - 0,355 \times 0,1458$$

$$a = 0,001$$

Jadi, persamaan linear yang diperoleh adalah:

$$y = a + bx$$

$$y = 0,001 + 0,380x$$

Keterangan

y = absorbansi sampel

x = konsentrasi Kadmium (Cd)

2. Nilai regresi (r^2)

$$R^2 = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{((n \sum x^2) - (\sum x)^2)((n \sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{6 \times 0,1164025 - 0,875 \times 0,3407}{\sqrt{((6 \times 0,303125) - (0,875^2))(6 \times 0,04471877) - (0,3407)^2)}$$

$$R^2 = \frac{0,4003025}{\sqrt{(1,05309)(0,15223613)}}$$

$$R^2 = \frac{0,4003025}{0,4003913831}$$

$$R^2 = 0,999$$

Lampiran 4 : Analisis Data hari ke-28


a. Data hasil pengamatan

No.	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
1	0,0	-0,0002
2	0,025	0,0036
3	0,05	0,0155
4	0,1	0,0316
5	0,2	0,0647
6	0,5	0,1570

b. Data kurva larutan standar

No.	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x ²	y ²	x.y
1	0	-0,0002	0	0,00000004	0
2	0,025	0,0036	0,000625	0,00001296	0,00009
3	0,05	0,0155	0,0025	0,00024025	0,000775
4	0,1	0,0316	0,01	0,00099856	0,00316
5	0,2	0,0647	0,04	0,00418609	0,01294
6	0,5	0,1570	0,25	0,024649	0,0785
N = 6	N = 0,875	N = 0,2722	N = 0,303125	N = 0,0300869	N = 0,095465

c. Grafik



d. Analisa Data

1. Persamaan garis linear

$$y = ax + b$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{6 \times 0,095465 - 0,875 \times 0,2722}{6 \times 0,303125 - (0,875)^2}$$

$$b = \frac{0,57279 - 0,238175}{1,81875 - 0,765625}$$

$$b = \frac{0,334615}{1,053125}$$

$$b = 0,317$$

$$a = y_{\text{rata-rata}} - b x_{\text{rata-rata}}$$

$$= 0,04537 - 0,317 \times 0,1458$$

$$a = -0,001$$

Jadi, persamaan linear yang diperoleh adalah:

$$y = a + bx$$

$$y = 0,001 + 0,317x$$

Keterangan

y = absorbansi sampel

x = konsentrasi Kadmium (Cd)

2. Nilai regresi (r^2)

$$R^2 = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{((n \sum x^2) - (\sum x)^2)((n \sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{6 \times 0,1164025 - 0,875 \times 0,3407}{\sqrt{((6 \times 0,303125) - (0,875^2))(6 \times 0,04471877) - (0,3407)^2}}$$

$$R^2 = \frac{0,4003025}{\sqrt{(1,05309)(0,15223613)}}$$

$$R^2 = \frac{0,4003025}{0,4003913831}$$

$$R^2 = 0,999$$

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Alfia Patandangan lahir di Kolai Kab. Enrekang pada tanggal 18 November 1991. Penulis anak merupakan anak tunggal dari seorang ayah bernama Yusuf Patadungan dan ibu bernama Juarni.

Pendidikan pertama ditempuh di SDN No.38 Kolai Kab. Enrekang pada tahun 1997-2003, dilanjutkan pada MTS Baraka pada tahun 2003-2006. Kemudian penulis melanjutkan sekolahnya di MAN Baraka pada tahun 2006-2009. Setelah itu penulis melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R