

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “S” DENGAN
PREEKLAMPSIA RINGAN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 04 MEI – 27 MEI 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

ESI ISMALA NENGSI

NIM. 70400114018

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ESI ISMALA NENGSI
Nim : 70400114018
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 23 Juli 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Villa Samata Sejahtera Blok A/21
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “S” Dengan
Preeklamsia Ringan Di Rumah Sakit Umum Daerah
Syekh Yusuf Gowa Tanggal 04 Mei-27 Mei 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, November 2017

Penyusun

ESI ISMALA NENGSI

Nim 70400114018

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Esi Ismala Nengsi


Nim : 70400114018

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny "S" dengan
Preeklamsia Ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf
Gowa

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Samata, Oktober 2017

Pembimbing I



Firdayanti, S.SiT., M.Keb

Pembimbing II



dr. Miswani Mukani Syaib, M.Kes

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “S” dengan Preeklamsia Ringan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”, yang disusun oleh Esi Ismala Nengsi, NIM: 70400114018, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 7 November 2017 M, berdasarkan tanggal Islam 18 Shafar 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 10 November 2017 M
21 Shafar 1439 H


DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)
- Sekretaris : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si. T., SKM., M.Keb. (.....)
- Pembimbing I : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb. (.....)
- Pembimbing II : dr. Miswani Mukani Syaib, M.Kes. (.....)
- Penguji I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si. T., SKM., M.Keb. (.....)
- Penguji II : Dr. H. Supardin, M.H.I. (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan bernilai ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia dimuka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “S” Dengan Preeklamsia Ringan Di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa Tanggal 04 Mei-27 Mei 2017**. Karya Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dijumpai dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian, namun berkat bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga Karya Tulis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jusman dan Ibunda Syamsiah yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik, membina penulis dengan ikhlas dan penuh pengorbanan serta kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam shalat beliau untuk penulis. Demikian pula kepada saudara lelaki Kamriadi yang selalu memberi motivasi dan juga kepada seluruh keluargaku yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat

2. menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua.
3. Bapak prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengarahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
4. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan seluruh staf administrasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibunda Firdayanti, S.SiT., M.Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya demi membimbing, membantu, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibunda dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing serta memberikan arahan yang sifatnya membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb selaku penguji I yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Ayahanda Dr. Supardin, M.H.I selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah khususnya dibidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

10. Para Dosen dan seluruh Staf di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar .
11. Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Walikota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
12. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
13. Teman-temanku Nurmila, Desi Prianti Putri, Meylinda Octaviana, Nurjayanti, Hasra Hartina dan teman-teman seperjuangan angkatan 2014 serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, masukan ataupun kritikan yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Samata, November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Metode Penulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN TEORI.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care.....	19
C. Tinjauan Khusus Tentang Preeklamsia.....	21
D. Umum Preeklamsia pada Ibu Hamil Menurut Pandangan Agama Islam.....	37
E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	40
BAB III STUDI KASUS.....	48
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar.....	48
B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual.....	54
C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial.....	58
D. Langkah IV Tindakan Segera Atau Kolaborasi.....	59
E. Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	60

F. Langkah VI Implementasi.....	64
G. Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan	65
H. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP).....	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	85
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Kunjungan.....	93
---------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran 2 : Surat izin/rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 3 : Surat rekomendasi penelitian dari pemerintah kabupaten Gowa Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 4 : Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 5 : Surat permohonan izin pengambilan data awal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 6 : Lembar persetujuan Karya Tulis Ilmiah
- Lampiran 7 : Surat rekomendasi penelitian dari pemerintah kabupaten Gowa Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Jurusan Kebidanan
Uin Alauddin Makassar
Karya Tulis Ilmiah, November 2017

Esi Ismala Nengsi, 70400114018

“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “S” Dengan Kasus Preeklamsia Ringan Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”

Preeklamsia Ringan adalah kenaikan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan $\leq 160/110$ mmHg disertai dengan proteinuria +1 dan pembengkakan pada wajah atau tungkai serta kenaikan berat badan 1kg dalam seminggu. Preeklamsia dapat timbul pada trimester III dan dapat juga muncul sebelumnya atau diatas usia kehamilan 20 minggu dan jika muncul di bawah 20 minggu maka itu bukan preeklamsia.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Ny “S” dengan Preeklamsia Ringan di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “S” dengan Preeklamsia Ringan, tidak ditemukan hambatan pada saat penanganan kasus ini. Penanganan yang dilakukan pada Ny “” yaitu dengan menganjurkan untuk memeriksakan kehamilannya setiap minggu untuk melihat kondisi ibu dan keadaan janinnya serta pemberia obat Antihipertensi yaitu Obat Nefedifin 10 mg.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa observasi dan analisa data pada Ny “S” dengan Preeklamsia Ringan di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017 selama 2 minggu dan kunjungan rumah 2 kali maka didapatkan hasil yaitu tekanan darah sudah turun menjadi 130/90 mmHg, proteinuria Negatif serta pembengkakan pada tungkai menurun dan kehamilan berlangsung normal dan keadaan janin baik dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “S” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan antara teori dan kasus.

Daftar pustaka: 26 literatur (2012-2016)

Kata kunci : Ibu Hamil, Preeklamsia Ringan, 7 langkah varney

ABSTRACT

Midwifery Department
Alauddin State Islamic University of Makassar
Scientific Paper, November 2017

Esi Ismala Nengsi, 70400114018

Midwifery Care Management on Mrs. "S" with a Mild Preeclampsia Case at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital, on May 04-27, 2017"

Mild preeclampsia is an increase of blood pressure of $\geq 140/90$ mmHg and $\leq 160/110$ mmHg accompanied by +1 proteinuria and swelling of the face or leg and 1kg of weight gain in a week. Preeclampsia can last in the third trimester and may also appear earlier or over 20 weeks of gestation and if it appears below 20 weeks then it is not preeclampsia.

This Scientific Paper is aimed at implementing the Midwifery Care Management on Mrs. "S" with Mild Preeclampsia at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital in 2017 based on 7 Varney steps and SOAP.

The results of a case study conducted on Mrs. "S" with Mild Preeclampsia, found no obstacles at the time of handling this case. The management applied on Mrs. "S" is by advising to check her pregnancy every week to see the condition of the mother and the condition of the fetus as well as the administration of antihypertensive drug that is 10 mg Nefedifin Drug.

The conclusions from the case of 7 Varney steps and SOAP used for the process of obstetrics problem solving have been conducted in the form of observation and data analysis on Mrs. "S" with Mild Preeclampsia at Syekh Yusuf Gowa Regional Hospital in 2017 for 2 weeks and home visit 2 times then got the result that is blood pressure has dropped to 130/90 mmHg, negative proteinuria and decreased leg swelling and normal pregnancy and good fetal condition and documentation studies of all findings and actions performed on Mrs. "S" with the result of no discrepancy between theory and case.

References: 26 literatures (2012-2016)

Keywords: Pregnant Mother, Mild Preeclampsia, 7 Varney Steps



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut *Federasi Obstetri Ginekologi Internasional*(FOGI) kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Jika dihitung mulai dari fertilisasi sampai lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, dimana trimester I berlangsung selama 12 minggu, trimester II 15 minggu (minggu ke-13 sampai ke-27), dan trimester III 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40 minggu) (Prawirohardjo S, 2014: 213).

Preeklamsia/eklamsia merupakan komplikasi kehamilan dan persalinan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, proteinuria dan oedema, yang kadang-kadang disertai komplikasi sampai koma. Gejala preeklamsia ringan seperti hipertensi, oedema, dan proteinuria sering tidak diperhatikan, sehingga tanpa disadari dalam waktu singkat dapat timbul preeklamsia berat, bahkan eklamsia (Prawirohardjo S, 2014: 532).

Gejala preeklamsia dapat dicegah dan dideteksi secara dini. Pemeriksaan antenatal yang teratur dan yang secara rutin mencari tanda-tanda preeklamsia, sangat penting dalam usaha pencegahan preeklamsia berat dan eklamsia. Ibu hamil yang mengalami preeklamsia perlu ditangani dengan segera. Penanganan ini dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak (Prawirohardjo S, 2014: 543).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Dunia mencapai angka 289.000 jiwa dimana dibagi atas beberapa negara antara lain Amerika Serikat mencapai 9300 jiwa, Afrika Utara 179.000 jiwa dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu (AKI) di Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia (39/100.000 kelahiran hidup), Thailand (44/100.000 kelahiran hidup), Philipina (170/100.000 kelahiran hidup), Brunei Darussalam (60/100.000 kelahiran hidup), Vietnam (160/100.000 kelahiran hidup), serta Singapura (3/100.000 kelahiran hidup). Jumlah AKI di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara asia tenggara lainnya (WHO, 2014).

Angka Kematian Ibu di Indonesia pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun 2007. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menyatakan bahwa AKI di Indonesia adalah sebesar 359 per 100.000 KH, sedangkan tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 KH. Angka ini masih jauh dibandingkan dengan target *Millennium Development Goals* (MDGs) 2015 yaitu menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 KH (SDKI, 2014).

Menurut Profil Kesehatan Indonesia penyebab kematian ibu tertinggi pada tahun 2013 adalah perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet dan abortus. Kematian ibu di Indonesia didominasi oleh tiga penyebab utama yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (Preeklamsia) dan infeksi. Proporsi ketiga penyebab kematian ibu telah berubah, dimana perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan, sedangkan proporsi Preeklamsia semakin meningkat. Lebih dari 30% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2010 disebabkan oleh Hipertensi Dalam Kehamilan (Profil Kesehatan Indonesia, 2015).

Kementerian kesehatan menjelaskan bahwa hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya, terutama apabila terjadi pada wanita yang sedang hamil. Hal ini dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan bagi bayi yang akan dilahirkan, karena tidak ada gejala atau tanda khas sebagai peringatan dini. Kejadian ini persentasenya 12% dari kematian ibu di seluruh dunia. Kemenkes tahun 2013 menyatakan bahwa hipertensi meningkatkan angka kematian dan kesakitan pada ibu hamil (Kemenkes, 2015).

Angka Kematian Ibu maternal yang dilaporkan dari tahun 2009-2014 masih berfluktuasi yaitu tahun 2009 sebesar 78,84 per 100.000 KH menurun pada tahun 2010 menjadi 77,13 per 100.000 KH tahun 2011 meningkat menjadi 78,88 per 100.000 KH tahun 2012 meningkat secara signifikan 31,38% yaitu 110,26 per 100.000 KH tahun 2013 menurun 78,38 per 100.000 KH dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 93,20 per 10000 KH (Profil Kesehatan Provinsi Sulsel, 2015).

Angka Kematian Ibu (AKI) maternal karena preeklamsia yaitu ibu kurang mengetahui pentingnya melakukan kunjungan kehamilan (Antenatal Care) yang telah ditetapkan bahwa kunjungan kehamilan minimal dilakukan 4 kali selama kehamilan. Tujuan dilakukan kunjungan kehamilan adalah sebagai tindakan deteksi dini kelainan selama kehamilan (Profil Kesehatan Provinsi Sulsel, 2015).

Hasil dari penelitian oleh Rahayuti dan Husniawati pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa ada hubungannya preeklamsia dengan faktor pengetahuan ibu yang kurang mengetahui tentang deteksi dini terjadinya preeklamsia yaitu dengan rajin melakukan kunjungan antenatal selama trimester III ataupun trimester sebelumnya karena melakukan kunjungan antenatal yang teratur adalah langkah untuk mengetahui apakah ada kelainan selama kehamilan dan atau ada kelainan pada janin yang biasanya janin akan mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau kelahiran premature (Rahayuti, Husniawati, 2013: 5: 3).

Dari data yang diperoleh dari Rekam Medis RSUD Syech Yusuf Gowa, angka kejadian preeklamsia pada tahun 2014 sebanyak 18 orang. Angka kejadian ini meningkat pada tahun 2015 sebanyak 21 orang, namun menurun drastis pada tahun 2016 sebanyak 4 orang. Sedangkan pada tahun 2017 bulan januari sebanyak 1 orang, bulan februari sebanyak 5 orang dan bulan maret sebanyak 2 orang.

Dari data diatas angka kejadian preeklamsia memang kadang mengalami peningkatan dan kadang mengalami penurunan namun dari angka kejadian itu kita sebagai tenaga kesehatan khususnya seorang Bidan harus mampu mengurangi sepenuhnya angka kejadian preeklamsia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa seorang ibu hamil yang mengalami preeklamsia ringan akan beresiko mengalami preeklamsia berat yang dimana ibu hamil yang mengalami preeklamsia berat akan beresiko mengalami kejang dan syok dan kadang berujung kematian apabila tidak ditangani dengan cepat.

Seperti yang kita ketahui bahwa kehamilan adalah titipan dari Allah Swt yang harus kita jaga sebaik-baiknya karena manusia adalah ciptaan Allah Swt yang paling baik. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Mu'minun 23: 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (Rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik ” (Kementerian Agama RI, al-qur'an dan terjemahnya, 2013: 475-476).

Pada ayat ini Allah swt telah menjelaskan bahwa manusia terbentuk dari tanah yang kemudian menjadikannya air mani dan disimpan dalam rahim seorang ibu. Kemudian air mani dijadikan menjadi sesuatu yang melekat dan diubah menjadi segumpal daging dan kemudian dijadikan tulang yang dibungkus oleh daging dan dijadikan sebagai makhluk yang berbentuk yang yang paling baik, dan kita sebagai manusia harus menjaga dengan sebaik-baiknya ciptaan Allah swt.

Melalui proses penyatuan ini, sperma dan ovum bertemu dan menyatukan diri. Proses tersebut terjadi dengan penuh kecermatan dan ketepatan yang hanya bisa diatur oleh zat yang Mahapandai atas segala sesuatu. Keduanya bertemu, mengomunikasikan informasi yang mereka bawa dan berlanjut dalam perkembangan yang luar biasa. Dua sel manusia berlainan jenis itu menyatu kemudian membelah dan terus membelah. Tiap-tiap sel baru membentuk jalinan yang kuat di antara mereka. Setelah mulai terbentuk, sel-sel calon manusia itu mencari tempat berlabuhnya di dinding rahim sang ibu. Mereka melekat kuat dan membentuk jaringan penghubung antara si calon manusia dengan sang ibu. Jaringan penghubung ini biasa kita kenal sebagai plasenta.

Tahap inilah yang dalam dunia kedokteran modern disebut zygot. Hal ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah swt sekaligus kebenaran Al-Qur'an. Seribu empat ratus tahun yang lalu, saat kehidupan bangsa Arab berada di tepi terjauh dari peradaban, saat orang Badui menganggap bahwa bumi itu datar, Al-Qur'an menyatakan sesuatu yang baru terlihat pada abad modern ini. Sembari membangun interaksi dengan sang ibu, sel-sel baru itu terus diatur oleh Allah swt untuk membelah hingga menjadi segumpal daging kemudian membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Tangan, kaki, kepala, jantung, otak, dan semua organ terbentuk dengan bimbingan Allah swt. Setelah semua bagian

lengkap, Allah swt menyempurnakan bentuknya menjadi bentuk yang sama sekali berbeda dari saat pertama kali sperma dan ovum bertemu.

Inilah proses pembentukan seorang manusia yang diangkat Allah swt sebagai khalifah-Nya di bumi. Proses yang tersampaikan dalam Surah al-Mu'minun: 23: 12–14 ini memberi pelajaran tentang dua hal penting. Pertama, Allah swt yang mengatur penciptaan manusia. Hal ini dengan nyata terlihat dari tahapan-tahapan pembentukan manusia dalam rahim sang ibu. Bagaimana dua sel, sperma dan ovum yang setengah menit saja dibiarkan di tempat terbuka pasti rusak, dapat bertemu? Siapa yang mengarahkan pertemuan itu? Adakah sang ayah yang memberikan komando atau si ibu yang menunjukkan perjalanannya? Setelah keduanya bertemu, siapa yang memberikan daya untuk berubah dan membelah?

Sperma dan ovum itu mengetahui dengan sendirinya apa yang harus dilakukan. Allah swt yang telah membuat semua itu menjadi mungkin. Allah swt yang memberi daya sekaligus arah. Allah swt yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh dua sel lemah itu.

Pelajaran Allah swt dalam ayat ini menunjukkan bahwa hadirnya manusia di muka bumi ini diadakan oleh Allah swt tentu bukan tanpa tujuan. Tujuan hadirnya manusia untuk mengemban tugas sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Saat kita sadar tentang hal ini, kita mengetahui dari mana kita berasal dan tugas yang harus kita emban di bumi ini.

Dari data yang telah didapatkan diatas, maka dari itu peneliti tertarik berminat melakukan penelitian tentang preeklamsia ringan pada ibu hamil sebagai judul karya tulis ilmiah.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka ruang lingkup yang ingin diangkat oleh penulis adalah : “Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny”S” dengan Preeklamsia Ringan Di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat mengetahui Asuhan Kebidanan pada Ny”S” dengan Preeklamsia Ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017”

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017.
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual yang terjadi pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017.
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017.
- d. Dilakukannya identifikasi tindakan segera/kolaborasi pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang telah disusun pada ibu hamil dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017.

- g. Diketuinya hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017.
- h. Didokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa tahun 2017.

D. *Manfaat Penulisan*

Adapun manfaat penulisan pada kasus diatas adalah :

1. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di Rumah Sakit Umum Daerah Syech Yusuf Gowa dalam mencegah dan penanganan preeklamsia ringan pada ibu hamil.

2. Manfaat pengembangan Ilmu Pegetahuan

- a. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti sebagai acuan untuk penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.
- b. Pelaksanaan asuhan kebidanan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan informasi dan wawasan tentang preeklamsia ringan pada ibu hamil.

3. Manfaat Penulis

Penulisan karya ilmiah ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang preekalamsia ringan pada ibu hamil.

4. Manfaat Intitusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklamsia ringan.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi atau menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca tentang preeklamsia ringan pada ibu hamil.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Penulis memepelajari buku-buku, internet dan literature yang berhubungan dengan preekalamsia.

2. Studi Kasus

Penulis melaksanakan studi kasus pada ibu hamil dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah verney yaitu : identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah aktual, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melaksanakan tindakan asuhan kebidanan, evaluasi asuhan kebidanan serta pendokumentasian asuhan kebidanan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Anamnesis/Wawancara

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan orang tua klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis pada klien mulai dari kepala sampai kaki dengan cara pemeriksaan:

- 1) Inspeksi merupakan proses observasi menggunakan mat. Inspeksi dilakukan dengan mendeteksi tanda-tanda fisik normal ataupun tidak normal untuk melengkapi pemeriksaan fisik.
- 2) Palpasi dilakukan dengan sentuhan atau rabaan pada tubuh pasien. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada organ atau jaringan pada tubuh.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara penketukan yang hanya dilakukan pada tungkai bawah pada pemeriksaan fisik.
- 4) Auskultasi adalah metode pengkajian dengan menggunakan pendengaran.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi emosional, respon terhadap kondisi yang dialami. Serta pola interaksi terhadap keluarga, petugas kesehatan, lingkungannya/kehidupan bertetangga, dan keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta persiapan biaya untuk persalinan.

3. Studi Pendokumentasian

Membaca dan mempelajari status kesehatan yang berhubungan dengan keadaan klien yang bersumber dari catata dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium maupun hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Mengadakan tanya jawab dengan dokter dan bidan yang menangani langsung pasien tersebut serta mengadakan diskusi dengan dosen institusi atau pembimbing lahan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari pada Bab 1 Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada Bab II tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang kehamilan, tinjauan umum tentang antenatal care, tinjauan khusus tentang preeklamsia, tinjauan kehamilan menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnose/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklamsia ringan.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah dimulai dari konsepsi (bertemunya sel telur dan sel sperma) yang diikuti dengan nidasi dan implantasi beserta perubahan tubuh wanita, khususnya genitalia eksterna, genitalia interna sampai payudara, karena adanya peranan hormone estrogen, progesterone dan somatotropin dan akan berakhir dengan proses persalinan (Sukarni, ZH, 2013:61).

2. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Pada Kehamilan

Perubahan anatomi dan fisiologi pada perempuan hamil biasanya sudah terjadi setelah fertilisasi dan terus berlanjut selama kehamilan. Kebanyakan perubahan itu merupakan respon terhadap janin. Hal yang paling menakutkan adalah hampir semua yang mengalami perubahan akan kembali seperti semula setelah persalinan dan menyusui selesai.

Perubahan-perubahan tubuh atau organ-organ system reproduksi wanita yang disebabkan oleh kehamilan. Yaitu :

a. Uterus

Selama kehamilan, uterus akan beradaptasi untuk menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai persalinan. Uterus mempunyai kemampuan untuk bertambah besar selama kehamilan dan kembali seperti semula sampai beberapa minggu selesai persalinaan. Pada perempuan biasa, uterus mempunyai berat 70 gram dan kapasitas 10 ml atau kurang. Selama kehamilan, uterus akan menampung janin, plasenta dan cairan amnion rata-rata pada akhir kehamilan volume totalnya mencapai 5 liter bahkan mencapai 20 liter yang berat rata-rata 1100 gram.

Pada awal kehamilan, penebalan uterus distimulasi oleh hormon estrogen dan sedikit progesteron. Perubahan ini hampir sama dengan kehamilan ektopik. Tetapi, setelah kehamilan 12 minggu, uterus akan bertambah besar seiring dengan perkembangan janin didalam uterus. Untuk itu, pembesaran uterus dapat digunakan untuk mengetahui usia kehamilan. Adapun tafsiran kasar besarnya uterus dalah sebagai berikut :

- 1) Tidak hamil/Normal : sebesar telur ayam (± 30 gram)
- 2) Kehamilan 8 minggu : sebesar telur bebek
- 3) Kehamilan 12 minggu : sebesar telur angsa (± 3 jari di atas simfisis pubis)
- 4) Kehamilan 16 minggu : sebesar tinju orang dewasa/sekepala bayi ($\pm \frac{1}{2}$ pusat – simfisis/ pertengahan simfisis – pusat)
- 5) Kehamilan 20 minggu: \pm pinggir bawah pusat
- 6) Kehamilan 24 minggu: \pm pinggir atas pusat
- 7) Kehamilan 28 minggu: $\pm \frac{1}{2}$ prosesus xyphoideus – pusat (pertengahan pusat – xyphoid).
- 8) Kehamilan 32 minggu: pertengahan pusat – xyphoid
- 9) Kehamilan 36-42 minggu: 3 sampai 1 jari di bawah xyphoid (Sukarni, ZH, 2013: 66).

b. Vagina/Vulva

Selama kehamilan, peningkatan vaskularisasi dan hyperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan vulva, sehingga pada vagina terlihat warna keunguan yang biasa disebut dengan tanda Chadwick (Setiawati, Dewi, 2013: 53).

c. Ovarium

Sejak kehamilan 16 minggu, fungsi diambil alih oleh plasenta, terutama fungsi produksi progesterone dan estrogen. Selama kehamilan ovarium tenang. Tidak terjadi pembentukan dan pematangan folikel baru, tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi siklus hormonal menstruasi (Setiawati, Dewi 2013: 54).

d. Payudara

Pada saat hamil payudara akan semakin lunak dan membesar. Pada awal kehamilan areola akan berubah warna menjadi kehitaman dan cenderung menonjol keluar. Pada saat yang sama puting payudara akan semakin membesar dan mengeluarkan kolostrum namun belum dapat memproduksi ASI. Jadi jika payudara semakin membesar maka akan muncul striae seperti yang muncul pada perut. Besarnya payudara sebelum hamil tidak ada pengaruhnya dengan produksi ASI setelah melahirkan (Sukarni, ZH, 2013: 67).

Pada ibu hamil, bukan hanya sistem reproduksi yang berubah tapi perubahan berat badan pada tubuh ibu hamil juga akan berubah sesuai masa kehamilan. Berat badan ibu hamil meningkat normalnya sekitar 5-16kg, terutama pada pertumbuhan hasil isi konsepsi dan volume berbagai organ/cairan intrauterin. Pada intrauterin normalnya berat janin (+2,5-3,5 kg), berat plasenta (+0,5 kg), cairan amnion (+1,0 kg), berat uterus (+1,0 kg), penambahan volume sirkulasi maternal (+1,5 kg), pertumbuhan mammae (+1 kg), penumpukan cairan interstisial di pelvis dan ekstremitas (+1,0 – 1,5 kg) (Setiawati, Dewi 2013: 67).

3. Perubahan Dan Adaptasi Psikologis Pada Masa Kehamilan

Adapun perubahan dan adaptasi pada saat kehamilan adalah sebagai berikut :

a) Sistem respirasi

Pada saat hamil tubuh mengalami peningkatan oksigen sampai 20% , selain itu diafragma juga terdorong ke kranial dan kemudian terjadi hiperventilasi dangkal

(20-24x/menit) akibat kompilasi dada (*chest compliance*) menurun. Volume tidak meningkat. Volume residu paru (*functional residual capacity*) menurun. Kapasitas vital menurun (Sukarni, ZH, 2013: 67).

b) Sistem gastrointestinal

Pada saat hamil estrogen dan hCG meningkat dengan efek samping mual dan muntah-muntah, selain itu terjadi juga perubahan peristaltik dengan gejala sering kembung, konstipasi, lebih sering lapar/perasaan ingin makan terus (ngidam) dan juga peningkatan asam lambung. Pada keadaan patologi tertentu dapat terjadi mual dan muntah yang berlebihan sampai 10 kali dalam sehari (*hyperemesis gravidarum*) (Sukarni, ZH, 2013: 68).

c) Sistem sirkulasi/kardiovaskular

Perubahan fisiologi pada kehamilan normal, yang terutama adalah perubahan HEMODINAMIK maternal, meliputi :

- 1) Retensi cairan, bertambahnya volume dan curah jantung
- 2) Anemia relatif
- 3) Akibat pengaruh hormon, tahanan perifer vaskular menurun
- 4) Tekanan darah arterial menurun
- 5) Curah jantung bertambah 30-50%, maksimal akhir trimester I, menetap sampai akhir kehamilan.
- 6) Volume darah maternal keseluruhan bertambah sampai 50%
- 7) Volume plasma bertambah lebih cepat pada awal kehamilan, kemudian bertambah secara perlahan sampai akhir kehamilan.

Pada trimester pertama terjadi penambahan curah jantung, volume plasma dan volume cairan ekstraselular, disertai peningkatan aliran plasma ginjal dan laju filtrasi glomerulus. Penambahan + retensi air dan natrium yang dapat ditukar di dalam tubuh, peningkatan TBW (*Total Body Water*). Akibatnya terjadi aktivasi

sistem renin-angiotensin dan penurunan ambang osmotik untuk pelepasan mediator vasopressin dan stimulasi dahaga. Akibatnya pula terjadi penurunan konsentrasi natrium dalam plasma dan penurunan osmolalitas plasma, sehingga terjadi oedema pada 80% wanita yang hamil (Sukarni, ZH, 2013: 68).

d) Traktus urinarus

Pada saat hamil, ureter membesar tonus otot-otot saluran kemih menurun akibat pengaruh estrogen dan progesteron. Kencing lebih sering (polyuria), laju filtrasi meningkat sampai 60-150%. Ibu hamil akan sering kencing karena sistem perkemihan akan tertekan dengan pembesaran uterus dan kadar kreatinin, urea dan asam urat dalam darah mungkin menurun namun hal ini masih dianggap normal (Sukarni, ZH, 2013: 70).

e) Kulit

Peningkatan aktivitas *melanophore stimulating hormone* menyebabkan perubahan berupa hiperpigmentasi pada wajah (kloasma gravidarum), payudara, linea alba, striae livida pada perut dan sebagainya (Sukarni, ZH, 2013: 70).

f) Perubahan psikis

Sikap / penerimaan ibu terhadap keadaan hamilnya, sangat mempengaruhi juga kesehatan / keadaan umum ibu serta keadaan janin dalam kehamilannya. Umumnya kehamilan yang diinginkan akan disambut dengan gembira, diiringi dengan pola makan, perawatan tubuh dan upaya memeriksakan diri secara teratur dengan baik. Tetapi kehamilan yang tidak diinginkan, kemungkinan akan disambut dengan sikap yang tidak mendukung seperti nafsu makan berkurang, tidak ada niat untuk memeriksakan kehamilannya secara teratur dan bahkan ada ibu hamil yang tak segang-segang ingin menggugurkan kandungannya (Sukarni, ZH, 2013: 70).

g) Metabolisme

Selama hamil peningkatan metabolisme dalam tubuh meningkat sampai 15%. Kebutuhan karbohidrat selama hamil akan meningkat sampai 2300 kal/hari dan 2800 kal/hari selama menyusui. Untuk kebutuhan protein 1 g/kgbb/hari untuk kebutuhan perkembangan janin. Kadar kolesterol plasma meningkat sampai 300 g/100ml. Kebutuhan kalsium, fosfor, magnesium, cuprum meningkat. Ferrum dibutuhkan sampai kadar 800 mg, untuk pembentukan hemoglobin tambahan.

Khusus untuk metabolisme karbohidrat, pada kehamilan normal, terjadi kadar glukosa plasma ibu yang lebih rendah secara bermakna karena :

- 1) Ambilan glukosa sirkulasi plasenta meningkat
- 2) Produksi glukosa dari hati menurun
- 3) Produksi alanin (salah satu precursor gluconeogenesis menurun)
- 4) Aktifitas ekskresi ginjal meningkat

Efek hormon-hormon gestasional (*human placental lactogen, hormone-hormon plasenta lainnya, hormone ovarium, hipofisis, pancreas, adrenal, growth factors, dsb*). Selain terjadi juga perubahan metabolisme lemak dan asam amino. Terjadi juga peningkatan aktifitas enzim-enzim metabolisme pada umumnya (Sukarni, ZH, 2013: 69).

4. Diagnostik Kehamilan

a. Tanda-tanda tidak pasti hamil

Adapun tanda-tanda tidak pasti hamil yaitu :

- 1) *Amenorrhea* (tidak haid)
- 2) Mual dan muntah
- 3) Ngidam (menginginkan makanan atau minuman yang tertentu)
- 4) Payudara menjadi tegang dan membesar
- 5) Tidak ada nafsu makan

- 6) Sering kencing
- 7) Obstipasi (penurunan kerja tunos otot karena dipengaruhi hormone steroid)
- 8) Pigmentasi kulit
- 9) Epulis
- 10) Varices (Jannah Nurul, 2012: 117).

b. Tanda-tanda kemungkinan hamil

Adapun tanda-tanda kemungkinan hamil yaitu :

- 1) Uterus membesar
- 2) Tanda hegar
- 3) Tanda chadwick
- 4) Tanda piscaseck
- 5) Tanda Braxton hicks
- 6) Goodell sign
- 7) Reaksi kehamilan positif (Jannah Nurul, 2012: 120).

c. Tanda pasti hamil

Adapun tanda-tanda pasti hamil yaitu :

- 1) Terasa gerakan janin
- 2) Teraba bagian-bagian janin
- 3) Terdapat denyut jantung janin
- 4) Terlihat kerangka janin pada saat pemeriksaan rontgen
- 5) Dengan menggunakan USG terlihat gambaran janin berupa kantong janin, panjang janin dan diameter biparetalis hingga dapat diperkirakan usia kehamilan dan tafsiran persalinan (Jannah Nurul, 2012: 122).

B. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care

1. Pengertian Antenatal care

Antenatal care adalah usaha preventif program pelayanan kesehatan obstetrik untuk optimalisasikan kelainan yang terjadi pada maternal dan neonatal melalui serangkaian pemeriksaan yang dapat dilakukan selama kehamilan (PrawirohardjoS, 2014: 278).

2. Tujuan Pelayanan Antenatal Care

Adapun tujuan pelayanan pada antenatal care adalah sebagai berikut :

- a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi
- b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan sosial ibu dan bayi
- c. Mengenali secara dini ketidaknormalan atau komplikasi selama hamil termasuk riwayat penyakit sebelum hamil dan setelah hamil dan atau pernah melakukan pembedahan.
- d. Mempersiapkan persalinan setelah kehamilan cukup bulan, melahirkan dengan selamat dan normal, serta melindungi ibu maupun bayi terkena trauma pada persalinan.
- e. Mempersiapkan agar masa nifas berjalan dengan normal dan memberikan ASI eksklusif.
- f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga terhadap penerimaan bayi agar dapat tumbuh dengan normal (PudiastutiR, D, 2012: 01).

3. Kunjungan Pelayanan Antenatal Care

Kunjungan pelayanan antenatal care pada ibu hamil yang normal biasanya disingkat dengan huruf K pada buku pink yang di berikan pada saat pertama kali melakukan kunjungan. Bila kehamilan termasuk resiko tinggi maka jadwal

kunjungan akan semakin diperketat. Biasanya jadwal kunjungan pada ibu hamil minimal 4 kali kunjungan. Pemeriksaan antenatal yang lengkap adalah K1, K2, K3, K4. Hal ini berarti, minimal melakukan kunjungan sekali pada usia kehamilan kurang dari 28 minggu (Trimester I), sekali kunjungan antenatal pada usia kehamilan 28-36 minggu (Trimester II), dan minimal 2 kali kunjungan pada usia kehamilan diatas 36 minggu (Trimester III).

Selama melakukan kunjungan antenatal care, ibu akan mendapatkan serangkaian pemeriksaan yang terkait dengan upaya untuk memastikan ada tidaknya kehamilan dan pengamatan berbagai kemungkinan ada tidaknya penyulit atau gangguan kesehatan selama kehamilan yang mungkin dapat mengganggu kualitas dan luaran kehamilan. Identifikasi kehamilan diperoleh melalui pengenalan perubahan anatomic dan fisiologi kehamilan. Jika kehamilan terdapat kelainan maka akan dilakukan uji hormonal kehamilan dengan menggunakan berbagai metode pemeriksaan yang tersedia (PrawirohardjoS, 2014: 279).

4. Standar Pelayanan Antenatal Care

Standar pelayanan antenatal care 7T yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan penimbangan berat badan
- b. Melakukan pengukuran tekanan darah
- c. Melakukan pengukiran tinggi fundus uteri
- d. Pemberian imunisasi TT (*Tetanus toxoid*)
- e. Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan
- f. Tes terhadap penyakit menular seksual
- g. Temu wicara untuk rencana tindakan rujukan (Bartini, Istri, 2012: 10).

5. Kebijakan Pelayanan Antenatal Care

Kebijakan pelayanan antenatal care adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kunjungan antenatal care pada trimester I (0-13 minggu) minimal 1 kali kunjungan
- b. Melakukan kunjungan antenatal care pada trimester II (14-27 minggu) minimal 1 kali kunjungan
- c. Melakukan kunjungan antenatal care pada trimester III (28-40 minggu) minimal 2 kali kunjungan (Pernoll,. Benson, 2013: 104).

C. Tinjauan Khusus Tentang Preeklamsia

1. Defenisi

Preeklamsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, oedema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini biasanya timbul pada trimester III kehamilan tetapi dapat juga timbul sebelumnya (Marmi dkk, 2012: 66).

Preeklamsia (*toksemia gravidarum*) adalah sekumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil, bersalin dan nifas yang terdiri dari hipertensi, oedema dan proteinuria yang muncul pada kehamilan setelah 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan (Sukarni, ZH, 2013: 169).

2. Patofisiologi Preeklamsia

Hingga saat ini etiologi dan patofisiologi dari preeklamsia masih belum diketahui dengan pasti. Telah banyak hipotesis yang diajukan untuk mencari etiologi dan patofisiologinya dari kasus preeklamsia namun kini belum memuaskan sehingga preeklamsia sebagai "*the diseases of theories*". Adapun hipotesis yang diajukan diantaranya adalah :

a. Genetik

Terdapat suatu kecenderungan bahwa faktor keturunan berperan dalam patogenesis preeklamsia. Telah dilaporkan adanya peningkatan angka kejadian preeklamsia pada wanita yang dilahirkan dari ibu yang menderita preeklamsia.

Bukti yang mendukung berperannya faktor genetik pada kejadian preeklamsia adalah peningkatan *Human leukocyte antigens* (HLA) pada penderita preeklamsia. Beberapa peneliti melaporkan hubungan antara histokompatibilitas antigen HLA-DR4 dan proteinuria hipertensi. Diduga ibu dengan HLA haplotype A23/29, B 44 dan DR 7, memiliki resiko lebih tinggi terhadap perkembangan preeklamsia dan IUGR daripada ibu dengan ibu tanpa haplotype tersebut. Peneliti lain menyatakan kemungkinan preeklamsia berhubungan dengan gen resesif tunggal. Meningkatnya prevalensi preeklamsia pada anak perempuan yang lahir dengan ibu yang mengalami preeklamsia mengindikasikan adanya pengaruh genotip fetus terhadap kejadian preeklamsia. Walaupun faktor genetik nampaknya berperan pada preeklamsia tetapi manifestasinya pada penyakit ini secara jelas belum dapat diterangkan (Yulia Fauziyah, 2012: 19-20).

b. Iskemik plasenta

Pada kehamilan normal, proliferasi trofoblas akan menginvasi desidua dan myometrium dalam 2 tahap. Pertama, sel-sel trofoblas endovaskuler menginvasi arteri spiralis yaitu dengan mengganti endotel, merusak jaringan elastis pada tunika media dan jaringan otot polos dinding arteri serta mengganti dinding arteri dengan material fibrinoid. Proses ini selesai pada akhir trimester I dan pada masa ini proses tersebut telah sampai pada deciduometrial junction.

Pada usia kehamilan 14-16 minggu terjadi invasi tahap kedua dari sel trofoblas dimana sel-sel trofoblas tersebut akan menginvasi arteri spiralis lebih dalam hingga ke dalam myometrium. Selanjutnya terjadi proses seperti tahap

pertama yaitu penggantian endotel, perusakan jaringan muskulo elastis serta perubahan material fibrinoid dinding arteri. Akhir dari proses ini adalah pembuluh darah yang berdinding tipis, lemas dan berbentuk seperti kantong yang memungkinkan terjadinya dilatasi secara pasif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan aliran darah yang meningkat pada kehamilan.

Pada preeklamsia, proses presentasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh karena disebabkan 2 hal yaitu :

1. Tidak semua arteri spiralis mengalami invasi oleh sel-sel trofoblas.
2. Pada arteri spiralis yang mengalami invasi, terjadi tahap pertama invasi sel trofoblas secara normal tetapi invasi tahap kedua tidak berlangsung sehingga bagian arteri spiralis yang berada dalam myometrium tetap mempunyai dinding muskulo elastis yang relatif yang berarti masih terdapat resistensi vaskuler.

Disamping itu juga terjadi arteriosclerosis akut (lesi seperti atherosclerosis) pada arteri spiralis yang dapat menyebabkan lumen arteri bertambah kecil atau bahkan mengalami obliterasi. Hal ini akan menyebabkan penurunan aliran darah ke plasenta dan berhubungan dengan luasnya daerah infark pada plasenta.

Pada preeklamsia, adanya daerah pada arteri spiralis yang memiliki resistensi vaskular disebabkan oleh karena kegagalan invasi trofoblas ke arteri spiralis pada tahap kedua. Akibatnya, terjadi gangguan aliran darah di daerah intervili yang menyebabkan penurunan perfusi daerah ke plasenta. Hal ini dapat menimbulkan iskemik dan hipoksia di plasenta yang berakibat terganggunya pertumbuhan bayi intrauteri (IUGR) hingga kematian bayi (Yulia Fauziyah, 2012: 20-22).

c. Hipoksia pada fetus / plasenta

Hipoksia yang terjadi pada fetus atau plasenta merupakan faktor patogenik pada preeklamsia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan oksigen

akan menginduksi vasokonstriksi fetoplacenta. Pada manusia, resiko preeklamsia meningkat pada asma dan individu dengan aktivitas yang tinggi, karena akan mempengaruhi hipoksia plasenta. Aliran darah yang abnormal di uterus, dan arkuata merupakan faktor prediktor untuk preeklamsia. Lebih lanjut, pada kehamilan normal, kebutuhan oksigen meningkat, kurva disosiasi oxyhaemoglobin akan berubah ke kanan dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Kebalikan pada pasien preeklamsia, kurva disosiasi oxyhaemoglobin bergerak ke kiri. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan oksigen.

Hipoksia juga dapat menginduksi kegagalan fungsi trofoblas. Pada penelitian menggunakan media kultur menunjukkan bahwa kadar oksigen yang rendah pada media kultur akan menghambat diferensiasi sitotrofoblas pada awal kehamilan. Pada kehamilan normal, proliferasi trofoblas akan menginvasi desidua dan myometrium dalam 2 tahap. Pertama, sel-sel trofoblas endovaskuler menginvasi arteri spiralis yaitu dengan mengganti endotel, merusak jaringan elastis pada tunika media dan jaringan otot polos dinding arteri serta mengganti dinding arteri dengan material fibrinoid. Proses ini selesai pada akhir trimester I dan pada masa ini proses tersebut telah sampai pada deciduomimetrial junction (Yulia Fauziyah, 2012: 22-24).

d. Disfungsi Endotel

Saat ini salah satu teori tentang preeklamsia yang sedang berkembang adalah teori disfungsi endotel. Endotel menghasilkan zat-zat penting yang bersifat relaksasi pembuluh darah, seperti nitric oxide (NO) dan prostaglandin (PGE₂). Disfungsi endotel adalah suatu keadaan dimana didapatkan adanya ketidakseimbangan antara faktor vasodilatasi dan vasokonstriksi. Prostaglandin merupakan suatu prostaglandin yang dihasilkan di sel endotel yang berasal dari asam arakidonat dimana dalam pembuatannya dikatalisir oleh enzim

siklooksigenesis. Prostaglandin akan meningkatkan Ca^{2+} intraseluler pada sel otot polos dan trombosit dan memiliki efek vasodilator dan anti agregasi trombosit.

Tromboksan A2 dihasilkan oleh trombosit, berasal dari asam arakidonat dengan bantuan enzim siklooksigenase. Tromboksan memiliki efek vasokonstriktor dan agregasi trombosit. Prostaglandin tromboksan A2 mempunyai efek yang berlawanan dalam mekanisme yang mengatur interaksi antara trombosit dan dinding pembuluh darah. Pada kehamilan normal terjadi kenaikan prostaglandin oleh jaringan ibu, plasenta dan janin. Sedangkan pada preeklamsia terjadi penurunan produksi prostaglandin dan kenaikan tromboksan A2 sehingga terjadi peningkatan rasio tromboksan A2 dan prostaglandin.

Pada preeklamsia terjadi kerusakan sel endotel akan mengakibatkan menurunnya produksi prostaglandin karena endotel merupakan tempat pembentukan prostaglandin dan meningkatnya produksi tromboksan sebagai kompensasi tubuh terhadap kerusakan endotel tersebut. Preeklamsia berhubungan dengan adanya vasospasme dan aktivasi sistem koagulasi hemostatik. Perubahan aktifitas tromboksan memegang peranan sentral pada proses ini dimana hal ini sangat berhubungan dengan ketidakseimbangan antara tromboksan dan prostaglandin.

Kerusakan endotel vaskuler pada preeklamsia menyebabkan penurunan produksi prostaglandin, peningkatan aktivasi agregasi trombosit dan fibrinolisis yang kemudian akan diganti thrombin dan plasmin. Thrombin akan mengkonsumsi antitrombin III sehingga terjadi deposit fibrin. Aktivasi trombosit menyebabkan pelepasan tromboksan A2 dan serotonin sehingga akan terjadi vasospasme dan kerusakan endotel (Yulia Fauziah, 2012: 22-23).

e. Imunologis

Beberapa penelitian menyatakan kemungkinan adaptasi imunologis sebagai patofisiologi dari preeklamsia. Pada penderita preeklamsia terjadi penurunan

proporsi T-helper dibandingkan dengan penderita normotensi yang dimulai sejak awal trimester dua. Antribodi yang melawan sel endotel ditemukan pada 50% wanita dengan preeklamsia, sedangkan pada control hanya terdapat 15%. Malaadaptasi sistem imun dapat menyebabkan invasi yang dangkal dari arteri spiralis oleh sel sitotrofoblas endovaskuler dan disfungsi sel endotel yang dimediasi oleh peningkatan pelepasan stoking (TNF- dan IL-I), enzim proteolitik dan radikal bebas oleh desidua.

Sitokin TNF- dan IL-I berperan dalam stress oksidatif yang berhubungan dengan preeklamsia. Didalam mitokondria, TNF-akan merubah sebagian aliran electron untuk melepaskan radikal bebas oksigen yang selanjutnya akan membentuk lipid peroksida dimana hal ini dihambat oleh antioksidan. Radikal bebas yang dilepaskan oleh sel desidua akan menyebabkan kerusakan sel endotel. Radikal bebas oksigen dapat menyebabkan pembentukan lipid perioksida yang akan membuat radikal bebas lebih toksik dalam merusak sel endotel. Hal ini akan menyebabkan gangguan produksi nitrit oksida ole endotel vaskuler yang akan mempengaruhi keseimbangan prostasiklin dan tromboksan dimana terjadi peningkatan produksi tromboksan A2 plasenta dan inhibisi produksi prostasiklin dari endotel vaskuler.

Antioksidan merupakan kelompok besar zat yang ditujukan untuk mencegah terjadinya over produksi dan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Telah dikenal beberapa antioksidan yang poten terhadap efek buruk dari radikal bebas diantaranya vitamin E (tocopherol) vitamin C. zat antioksidan ini dapat digunakan untuk melawan kerusakan sel akibat pengaruh radikal bebas pada preeklamsia (Yulia Fauziyah, 2012: 23-24).

3. Klasifikasi Preeklamsia

Preeklamsia dibagi menjadi 2 golongan yaitu :

a. Preeklamsia Ringan

Preeklamsia ringan adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria setelah umur kehamilan diatas 20 minggu atau segera persalinan. Tetapi dapat juga timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu (PudiastutiR, D, 2012: 163).

b. Preeklamsia Berat

Preeklamsia berat adalah preeklamsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolic ≥ 110 mmHg disertai proteinuria lebih 5g/24 jam atau $\geq +2$ (Marmi, dkk, 2014: 68).

4. Diagnosis Preeklamsia

a. Preeklamsia Ringan

- 1) Kenaikan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan $\leq 160/110$ mmHg
- 2) Pemeriksaan tes celup urin dengan proteinuria menunjukkan ≥ 300 mg/24 jam atau +1
- 3) Kenaikan berat badan 1kg dalam seminggu
- 4) Bengkak pada wajah atau tungkai (Nugroho, Taufan, 2012: 05).

b. Preeklamsia Berat

- 1) Tekanan darah $> 160/110$ mmHg pada usia kehamilan > 20 minggu
- 2) Proteinuria > 5 gr/24 jam atau tes celup urin $\geq 2+$
- 3) Produksi urin $< 400-500$ ml/24 jam dan kenaikan kreatinin serum
- 4) Oedema paru dan sianosi
- 5) Nyeri epigastrium dan nyeri kuadran atas abdomen: penyebabnya karena teregangnya kapsula gilson. Nyerinya dapat sebagai gejala awal ruptur pada hepar.
- 6) Perubahan kesadaran, nyeri kepala, skotomata dan pandangan kabur.

- 7) Gangguan fungsi hepar.
- 8) Hemolysis mikroangiopatik
- 9) Trombositopenia berat :<100.000 sel atau penurunan trombosit dengan cepat.
- 10) Pertumbuhan janin intrauterine yang terhambat
- 11) Sindrom HELLP (*Hemolysis, Elevated Liver Enzyme, Low Platelete Count*) (Prawirohardjo,S, 2014: 545).

5. Penatalaksanaan Preeklamsia

a. Preeklamsia Ringan

Pada kasus preeklamsia ringan cukup dilakukan rawat jalan dengan menganjurkan pasien untuk melakukan kunjungan antenatal setiap minggu. Namun jika perawatan jalan tidak mengalami perubahan maka akan dilakukan rawat inap dengan kriteria bahwa setelah 2 minggu pengobatan rawat jalan tidak mengalami perubahan, kenaikan berat badan ibu 1 kg atau lebih per minggu selama 2 minggu berturut-turut, ataupun timbul salah satu atau lebih gejala preeklamsia berat.

Bila setelah 1 minggu menjalani perawatan namun tidak mengalami perubahan maka preeklamsia ringan dianggap menjadi preeklamsia berat. Bila dalam perawatan sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm maka penderita tetap dirawat selama 2 hari lagi baru dipulangkan. Perawatan akan berlanjut dengan rawat jalan (Pudiastuti, R, D, 2012: 165).

Pada preeklamsia ringan dengan umur kehamilan <37 minggu akan tetap dilanjutkan sampai aterm jika tidak ada gejala yang memburuk. Namun pada umur kehamilan >37 minggu dengan serviks yang sudah matang akan dilakukan pemecahan ketuban kemudian induksi kehamilan dengan oksitosin atau prostaglandin, namun jika serviks belum matang maka akan dilakukan

pematangan dengan prostaglandin atau keteter foley atau akan dilakukan tindakan terakhir yaitu seksio saesar (Nugroho Taufan, 2012: 06).

b. Preeklamsia Berat

Pada preeklamsia berat, pengobatan yang dapat dilakukan adalah secara medikal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Segera masuk ke rumah sakit
- 2) Tirah baring miring kesatu sisi. Tanda vital diperiksa setiap 30 menit, memeriksa refleks patella setiap jam.
- 3) Memasang infus dengan cairan dextrose 5% dimana setiap 1 liter diselingi dengan cairan infus RL (60-125cc/jam) 500cc.
- 4) Pemberian anti kejang/anti konvulsan magnesium sulfat ($MgSO_4$) sebagai pencegahan dan terapi kejang. $MgSO_4$ merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia berat dan eklamsia.

Apabila terjadi kejang pada preeklamsia berat maka akan dilakukan pencegahan :

- a. Bila terjadi kejang, perhatikan jalan nafas, pernapasan (oksigen) dan sirkulasi (cairan intravena).
- b. $MgSO_4$ diberikan secara intravena kepada ibu dengan eklamsia (sebagai tatalaksana kejang) dan preeklamsia berat (sebagai pencegahan kejang).

Adapun syarat pemberian $MgSO_4$ adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedia cairan Glukonas 10%
- 2) Ada refleks patella
- 3) Jumlah urin minimal 0,5 ml/kg BB/jam

Adapun cara pemberian MgSO₄ adalah sebagai berikut :

- a) Berikan dosis awal 4 gram MgSO₄ sesuai prosedur untuk mencegah terjadinya kejang atau kejang berulang dengan cara :
 - (1) Ambil 4 gram larutan MgSO₄ (10 ml larutan MgSO₄ 40%) dan larutkan dengan 10 ml aquades
 - (2) Berikan larutan tersebut secara perlahan-lahan secara IV selama 20 menit
 - (3) Jika IV sulit, berikan masing-masing 5 gram MgSO₄ (12,5 ml larutan MgSO₄ 40%) secara Im di bokong kiri dan kanan.
- b) Sambil menunggu rujukan, mulai dosis rumatan 6 gram MgSO₄ dalam 6 jam sesuai prosedur dengan cara : Ambil 6 gram MgSO₄ (15 ml larutan MgSO₄ 40%) dan larutkan dalam 500 ml larutan Ringer Laktat/ringer Asetat, lalu berikan secara IV dengan kecepatan 28 tetes/menit selama 6 jam, dan diulang hingga 24 jam setelah persalinan atau kejang berakhir (bila eklamsia).
- c) Melakukan pemeriksaan fisik tiap jam, meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, refleks patella dan jumlah urin.
- d) Bila frekuensi pernafasan <16x/menit, dan atau tidak didapatkan reflex tendonpatella dan atau oliguria (produksi urin <0,5 ml/kg BB/jam), segera hentikan pemberian MgSO₄.
- e) Jika terjadi depresi nafas, berikan cairan glukosa 1 gran secara IV (10 ml larutan 10 %) bolus dalam 10 menit.
- f) Selama ibu dengan preeklamsia dan eklamsia dirujuk pantau dan nilai adanya perburukan preeklamsia. Apabila terjadi eklamsia, lakukan penilaian awal dan tatalaksana kegawatdaruratan. Berikan kembali MgSO₄ 2 gram secara IV perlahan-lahan (15-20 menit). Bila setelah pemberian MgSO₄ ulang masi terdapat kejang, dapat dipertimbangkan untuk pemberian diazepam 10 mg secara IV selama 2 menit.

6. Perubahan Sistem dan Organ Pada Preeklamsia

a. Volume Plasma

Biasanya pada ibu hamil normal, volume plasma akan meningkat (Hipervolemia) untuk memenuhi kebutuhan perkembangan janin. Peningkatan tertinggi volume plasma pada hamil normal biasanya pada umur kehamilan 32-34 minggu. Namun pada wanita hamil dengan preeklamsia akan mengalami penurunan volume plasma antara 30% - 40% disbanding dengan hamil normal (Hipovolemia). Jadi, jika volume plasma menurun akan memberi dampak yang luas bagi organ-organ yang lain (PrawirohardjoS, 2014: 537).

b. Hipertensi

Pada preeklamsia peningkatan reaktivitas vascular dimulai pada umur kehamilan 20 minggu, namun hipertensi dapat dikenali pada trimester II. Tekanan darah yang tinggi pada preeklamsia bersifat normal dan mengikuti irama sirkadian normal. Pada preeklamsia ringan biasanya akan kembali normal beberapa hari pasca persalinan, namun pada preeklamsia berat, kembalinya tekanan darah yang normal dapat terjadi 2-4 minggu pasca persalinan (PrawirohardjoS, 2014: 538).

c. Fungsi Ginjal

1) Perubahan fungsi ginjal disebabkan hal-hal berikut:

- a) Menurunnya aliran darah ke ginjal akibat hipovolemia sehingga terjadi oliguria bahkan anuria.
- b) Kerusakan sel glomerulus mengakibatkan meningkatnya permeabilitas membranbasalis sehingga terjadi kebocoran dan mengakibatkan proteinuria. Proteinuria terjadi jauh sebelum persalinan, sehingga biasa terjadi preeklamsia tanpa proteinuria karena janin lebih dulu lahir.
- c) Terjadi *Glomerular Capillary Endotheliosis* akibat sel endotel glomerular membengkak disertai deposit fibril.

- d) Gagal ginjal akut terjadi akibat nekrosis tubules ginjal. Bila sebagian besar kedua korteks ginjal mengalami nekrosis maka terjadi “nekrosis korteks ginjal” yang bersifat ireversibel.
- e) Dapat terjadi kerusakan intrinsic jaringan ginjal akibat vasopasme pembuluh darah. Dapat diatasi dengan pemberian DOPAMIN agar terjadi vasodilatasi pembuluh darah ginjal.

2) Proteinuria

Jika proteinuria timbul :

- a) Sebelum hipertensi, umumnya biasanya gejala penyakit ginjal
- b) Tanpa hipertensi, maka akan dapat disimpulkan sebagai penyulit kehamilan
- c) Tanpa kenaikan tekanan darah diastol ≥ 90 mmHg, umumnya ditemukan pada infeksi saluran kencing atau anemia. Jarang ditemukan proteinuria pada tekanan darah < 90 mmHg.
- d) Proteinuria merupakan syarat mutlak untuk diagnosis preeklamsia, tetapi proteinuria muncul jauh sebelum persalinan, sehingga biasa ditemukan preeklamsia tanpa proteinuria karena janin sudah lahir lebih dulu.
- e) Pengukuran proteinuria, dapat dilakukan dengan:
 - (1) Urin dipstick: 100 mg/l atau +1, sekurang-kurangnya diperiksa 2 kali selang 6 jam.
 - (2) Pengumpulan proteinuria 24 jam. Dapat dianggap patologis jika besaran proteinuria ≥ 300 mg/24 jam. (Prawirohardjo Sarwono, 2014: 538).

3) Asam Urat Serum (*uric acid serum*)

Umunya meningkat ≥ 5 mg/cc. hal ini biasanya karena hipovolemia, dapat menyebabkan menurunnya aliran darah ginjal dan juga mengakibatkan menurunnya filtrasi glomerulus, sehingga menurunnya sekresi asam

urat. Peningkatan asam urat juga dapat terjadi akibat iskemia jaringan (PrawirohardjoS, 2014: 539).

4) Kreatinin

Kadar kreatinin plasma pada preeklamsia juga meningkat akibat hipovolemia, maka aliran darah ginjal akan menurun, mengakibatkan menurunnya filtrasi glomerulus, sehingga menurunnya sekresi kreatinin, disertai peningkatan kreatinin plasma. Dapat mencapai kadar kreatinin plasma ≥ 1 mg/cc dan biasanya terjadi pada preeklamsia berat dengan penyulit pada ginjal (PrawirohardjoS, 2014: 539).

5) Oliguria dan Anuria

Oliguria dan anuria terjadi juga karena hipovolemia sehingga aliran darah ke ginjal akan menurun yang mengakibatkan produksi urin menurun (Oliguria), bahkan dapat terjadi anuria. Berat ringannya oliguria menggambarkan berat ringannya hipovolemia. Hal ini juga dapat menggambarkan berat atau ringannya preeklamsia. Pemberian obat intravena karena oliguria tidak dapat dibenarkan (PrawirohardjoS, 2014: 539).

d. Elektrolit

Kadar elektrolit normal akan menurun pada saat hamil. Pada preeklamsia kadar elektrolit sama dengan dengan kadar pada hamil normal, kecuali jika diberi diuretikum banyak, restriksi konsumsi garam atau pemberian cairan oksitosin yang bersifat antidiuretik. Preeklamsia berat yang mengalami hipoksia dapat menimbulkan gangguan keseimbangan asam basa. Pada waktu terjadi kejang eklamsia kadar bikarbonat menurun, karena timbulnya asidosis laktat dan akibat kompensasi hilangnya karbohidrat.

Kadar natrium dan kalium pada preeklamsia sama dengan hamil normal, yaitu sesuai dengan proporsi jumlah air dalam tubuh. Karena kadar natrium dan natrium tidak berubah pada preeklamsia, maka tidak terjadi retensi natrium yang

berlebihan. Ini berarti pada preeklamsia tidak diperlukan restriksi konsumsi garam (PrawirohardjoS, 2014: 539).

e. Tekanan osmotik koloid plasma / tekanan onkotik

Osmolaritas serum dan tekanan onkotik menurun pada umur kehamilan 8 minggu. Pada preeklamsia tekanan onkotik makin menurun karena kebocoran protein dan peningkatan permeabilitas vaskular (PrawirohardjoS, 2014: 539).

f. Koagulasi dan fibrinolisis

Gangguan koagulasi pada preeklamsia, misalnya trombositopenia, jarang yang berat, tetapi sering dijumpai. Pada preeklamsia terjadi peningkatan FDP, penurunan anti thrombin III, dan peningkatan fibronektin (PrawirohardjoS, 2014: 540).

g. Viskositas darah

Viskositas darah ditemukan oleh volume plasma, molekul makro : fibrinogen dan hematokrit. Pada preeklamsia viskositas darah meningkat, mengakibatkan meningkatnya resistensi perifer dan menurunnya aliran darah ke organ (PrawirohardjoS, 2014: 540).

h. Hematokrit

Hematokrit akan menurun pada kehamilan normal karena hypervolemia, kemudian meningkat lagi pada trimester III akibat peningkatan produksi urin. Pada preeklamsia hematokrit meningkat karena hipovolemia yang menggambarkan beratnya preeklamsia (PrawirohardjoS, 2014: 540).

i. Oedema

Oedema dapat terjadi pada kehamilan normal. Oedema yang terjadi pada kehamilan mempunyai banyak interpretasi, misalnya 40 % oedema dijumpai pada hamil normal, 60% dijumpai pada kehamilan dengan hipertensi beserta dengan proteinuria (PrawirohardjoS, 2014: 540).

j. Hepar

Dasar perubahan pada hepar ialah vasopasme, iskemia dan pendarahan. Bila terjadi pendarahan pada sel periportal lobus perifer, akan terjadi nekrosis sel hepar dan peningkatan enzim hepar. Pendarahan ini dapat meluas hingga dibawah kapsula hepar dan disebut subkapsular hematoma. Subkapsular menimbulkan rasa nyeri didaerah epigastrium dan dapat menimbulkan ruptur hepar, sehingga perlu pembedahan (PrawirohardjoS, 2014: 540).

k. Neurologi

Perubahan neurologi dapat berupa :

- 1) Nyeri kepala disebabkan hiperperfusi otak, sehingga menimbulkan vasogenik oedema.
- 2) Akibat spasme arteri retina dan oedema retina dapat terjadi gangguan visus. Gangguan visus dapat berupa: pandangan kabur, skotomata, amaurosis yaitu kebutaan tanpa jelas adanya kelainan dan ablasio retina(*retinal detachment*).
- 3) Hiperrefleksi sering dijumpai pada preeklamsia berat, tetapi bukan faktor prediksi terjadinya eklamsia
- 4) Dapat timbul kejang eklamptik. Penyebabnya belum diketahui pasti. Faktor yang dapat menimbulkan kejang eklamptik ialah oedema serebri, vasopasme serebri dan iskemia serebri.
- 5) Perdarahan intrakranial meskipun jarang namun dapat terjadi pada preeklamsia berat dan eklamsia (PrawirohardjoS, 2014: 541).

l. Kardiovaskular

Perubahan kardiovaskular disebabkan peningkatan *cardiac afterload* akibat hipertensi dan penurunan *cardiac afterload* akibat hipovolemia (PrawirohardjoS, 2014: 541).

m. Paru

Pada wanita hamil dengan preeklamsia berat akan mempunyai resiko terjadinya oedema paru. Oedema paru terjadi oleh payah jantung kiri, kerusakan sel endotel pada pembuluh darah kapilar baru dan menurunnya diuresis. Penanganan oedema paru dapat dilakukan pemasangan *Central Venous Pressure* (CVP) namun tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari *pulmonary capillary wedge pressure* (PrawirohardjoS, 2014: 541).

n. Janin

Penyakit preeklamsia dan eklamsia memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan janin yang disebabkan karena menurunnya perfusi utero plasenta, hipovolemia, vasopasme, dan kerusakan sel endotel pembuluh darah plasenta (PrawirohardjoS, 2014: 541)

7. Faktor Resiko Preeklamsia

Adapun faktor resiko pada preeklamsia adalah :

- a. Primigravida atau > 10 tahun sejak kelahiran anak terakhir
- b. Kehamilan pertama dengan pasangan baru
- c. Ada riwayat preeklamsia sebelumnya
- d. Ada riwayat preeklamsia pada keluarga, khususnya pada ibu atau saudara perempuan (baik wanita hamil ataupun pasangannya).
- e. Kehamilan kembar
- f. Kondisi medis tertentu seperti hipertensi esensial, penyakit ginjal dan diabetes.
- g. Adanya proteinuria saat mendaftar untuk pemeriksaan (>1+ pada lebih dari 1 kali pemeriksaan atau >0,3 gram/4 jam).
- h. Umur \geq 40 tahun
- i. Obesitas (IMT >35)

- j. IVF (*Vertilisasi In Vivo*) (Bothamley, Boyle, 2013: 194).

8. Komplikasi Preeklamsia pada Janin

Adapun komplikasi yang dapat terjadi pada janin dengan ibu yang preeklamsia adalah sebagai berikut :

- a. Kelahiran prematur
- b. Resiko terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- c. Abrupsio plasenta
- d. Resiko terjadinya kematian bayi (Bothamley, Boyle, 2013: 194).

D. Tinjauan Umum Preeklamsia pada Ibu Hamil Menurut Pandangan Agama Islam

Dalam kasus ibu hamil dengan preeklamsia akan mengalami kelainan-kelainan selama kehamilannya yang bisa membuat tubuhnya semakin lemah. Sesuai dengan firman Allah swt pada surah Al-luqman: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَاتَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

“Dan telah Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, dan hanya kepada Ku-lah kembalimu”.

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus berbakti kepada orangtuanya, maksudnya kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya (ibunya telah mengandungnya) dengan susah payah (dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah) ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya di kala bayi (dan menyapihnya) tidak menyusuinya lagi (dalam dua tahun, hendaknya)

Kami katakan kepadanya (bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah kembalimu) yakni kamu akan kembali.

Sesuai firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013: 47).

Seorang ibu harus menyusui anaknya sampai umur dua tahun apabila menginginkannya namun setiap ibu akan mendapatkan guncangan dari Allah swt apabila tidak menyusui bayinya karena alasan yang tidak dihendaki oleh keduanya. Sesuai firman Allah dalam QS Al-Hajj ayat 2 yaitu:

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾ يَوْمَ

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى
النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“(ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusunya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras” (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013: 462).

Menurut tafsir Al-Misbah, QS Al-luqman ayat 14 : bagaikan menyatakan: Luqman menyatakan hal itu kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya, padahal Kami telah mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya menyangkut hak Kami. Thahir Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa Luqman bukan seorang Nabi, maka ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman yang lalu tentang keharusan mengesakan Allah dan mensyukuri-Nya. Allah menggambarkan betapa Dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hamba-Nya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada orang tuanya.

Di ayat 14 tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi lebih menekankan jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu berbeda dengan bapak. Di sisi lain, “peranan bapak” dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibanding dengan peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. Bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh anak, berbeda dengan peranan ibu.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia harus berbakti kepada kedua orangtuanya karena kedua orangtua sangat berkorban saat mengandungnya sampai kelak dia dewasa. Sejak dalam kandungan sampai lahir seorang ibu yang sangat berperan penting karena harus mengandung dengan susah payah dan kondisi yang lemah selama 9 bulan dan menyapihnya selama dua tahun namun tidak lepas dari itu seorang ayah juga berperan penting karena tanpa usaha seorang ayah, anak tidak akan bisa terjadi dan seorang ayah juga harus bekerja keras agar anaknya bisa hidup layak dan dapat melanjutkan pendidikan.

E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan dalam rangkaian/tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang terfokus pada klien (Jannah Nurul, 2012: 193).

2. Tahapan Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecah-pecah ke dalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien. Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut langkah vernay.

Adapun tahapan manajemen asuhan kebidanan menurut langkah vernay adalah sebagai berikut :

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Adapun pengumpulan data dasar yang lengkap untuk menilai yang menyangkut atau keadaan klien, data ini termasuk riwayat kesehatan klien,

pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium serta laporan keterangan tambahan lain hubungan dengan kondisi klien yang didapatkan melalui wawancara pada klien ataupun keluarganya.

Dari anamnesa yang didapatkan dari klien bahwa klien mengeluh dengan kenaikan tekanan darah, terjadi pembengkakan pada tungkai, kadang mengalami pusing dan sakit kepala serta mengalami penglihatan kabur kadang-kadang.

Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidan adalah kenaikan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan $\leq 160/110$ mmHg, pemeriksaan tes celup urin dengan proteinuria menunjukkan ≥ 300 mg/24 jam atau +1, kenaikan berat badan 1kg dalam seminggu bengkak pada wajah atau tungkai timbul salah satu atau lebih gejala atau tanda-tanda preeklamsia berat.

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data yang dikumpulkan. Diagnosa adalah hasil analisa dan perumusan masalah yang diputuskan dalam menegakkan diagnosa bidan dengan menggunakan pengetahuan professional sebagai dasar/arahan untuk mengambil tindakan.

Setelah melakukan pemeriksaan maka akan didapatkan kesimpulan bahwa ibu hamil yang usia kehamilannya diatas 20 minggu yang mengalami kenaikan tekanan darah $\geq 140/90$ mmhg atau lebih pada pemeriksaan selang 6 jam, oedema pada tungkai dan wajah serta proteinuria +1 maka akan didiagnosa bahwa ibu mengalami preeklamsia ringan.

c. Langkah III (Merumuskan Diagnosis/Masalah Potensial Yang Membutuhkan Antisipasi Masalah Potensial)

Identifikasi adanya diagnosa atau masalah potensial lain dilakukan antisipasi atau pencegahan bila memungkinkan serta waspada dan bersiap untuk segala sesuatu yang dapat terjadi. Pada step ini sangat vital untuk perawatan yang aman.

Pada kasus preeklamsia ringan atau berat, seorang Bidan atau tenaga kesehatan lain dapat mengantisipasi kelainan yang akan terjadi pada saat rawat jalan atau rawat inap karena pada kasus preeklamsia kemungkinan ibu akan mengalami syok atau kejang, dapat terjadi kematian ibu, kelahiran prematur dan resiko terjadi Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR).

Pada kasus preeklamsia ringan seorang Bidan atau tenaga kesehatan lain dapat mengantisipasi terjadi preeklamsia ringan menjadi preeklamsia berat dimana terjadi kenaikan tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg dengan proteinuria $>+2$ dan gejala yang ada kaitannya dengan ginjal, otak, hepar dan sistem kardiovaskuler, sakit kepala, yang parah, gangguan visual, dan hiperrefleksia.

d. Langkah IV (Penetapan Kebutuhan Tindakan Segera)

Pada langkah ini bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien dan perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Pada kasus preeklamsia ringan tidak membutuhkan tindakan segera jika tekanan darah $\leq 160/110$ mmHg, proteinuria $\leq +2$ dan atau tidak ada tanda-tanda kejang atau syok jika telah melakukan kunjungan antenatal care selama 2 minggu berturut-turut. Jika pasien telah mengalami syok atau kejang maka akan dilakukan tindakan segera dengan berkolaborasi dengan dokter dengan melakukan tindakan emergensi atau melakukan rujukan. Namun sebelum melakukan rujukan, tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan pemberian obat $MgSO_4$ pada pasien

preeklamsia atau eklamsia sebagai tindakan awal untuk mencegah terjadinya kejang atau pun kejang yang berulang.

Jika hasil pemeriksaan kondisi janin mengalami gangguan dengan umur kehamilan yang belum aterm maka melihat kondisi ibu dan janin, apakah masih bisa dilanjutkan kehamilan sampai aterm atau mengakhiri kehamilan sebelum umur kehamilan aterm dengan kondisi ibu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehamilan, dan harus mengakhiri kehamilan jika terjadi Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR). Namun ada juga kemungkinan yang dapat terjadi yaitu ibu bisa saja mengalami syok atau kejang pada ibu dengan preeklamsia berat, kematian Ibu, kelahiran prematur, resiko terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), abrupsi plasenta, resiko terjadinya kematian bayi dalam Rahim (KJDR).

e. Langkah V (Penyusunan Rencana)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya dan semua perencanaan yang dibuatkan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori *up to date*, perawatan berdasarkan bukti (*evidence based care*). Dalam menyusun rencana sebaiknya pasien dilibatkan karena pada akhirnya pengambilan keputusan dalam melaksanakan suatu rencana asuhan harus disetujui oleh pasien.

Pada kasus preeklamsia ringan cukup dilakukan rawat jalan dengan menganjurkan pasien untuk melakukan kunjungan antenatal setiap minggu. Namun jika perawatan jalan tidak mengalami perubahan maka akan dilakukan rawat inap dengan kriteria bahwa setelah 2 minggu pengobatan rawat jalan tidak mengalami perubahan, kenaikan berat badan ibu 1 kg atau lebih per minggu selama 2 minggu berturut-turut, ataupun timbul salah satu atau lebih gejala preeklamsia berat. Bila setelah 1 minggu menjalani perawatan namun tidak

mengalami perubahan maka preeklamsia ringan dianggap menjadi preeklamsia berat.

Bila dalam perawatan sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm maka penderita tetap dirawat selama 2 hari lagi baru dipulangkan. Perawatan akan berlanjut dengan rawat jalan.

Sedangkan pada ibu yang mengalami preeklamsia berat maka akan dilakukantindakan segera masuk ke rumah sakit, pemberian anti kejang/anti konvulsan magnesium sulfat ($MgSO_4$) sebagai pencegahan dan terapi kejang. $MgSO_4$ merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia berat dan eklamsia. Sambil menunggu rujukan, mulai dosis rumatan 6 gram $MgSO_4$ dalam 6 jam sesuai prosedur dengan cara : Ambil 6 gram $MgSO_4$ (15 ml larutan $MgSO_4$ 40%) dan larutkan dalam 500 ml larutan Ringer Laktat/ringer Asetat, lalu berikan secara IV dengan kecepatan 28 tetes/menit selama 6 jam, dan diulang hingga 24 jam setelah persalinan atau kejang berakhir (bila eklamsia).

Melakukan pemeriksaan fisik tiap jam, meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, refleks patella dan jumlah urin, bila frekuensi pernafasan $<16x$ /menit, dan atau tidak didapatkan reflex tendon patella dan atau oliguria (produksi urin $<0,5$ ml/kg BB/jam), segera hentikan pemberian $MgSO_4$, jika terjadi depresi nafas, berikan cairan glukosa 1 gran secara IV (10 ml larutan 10 %) bolus dalam 10 menit, selama ibu dengan preeklamsia dan eklamsia dirujuk pantau dan nilai adanya perburukan preeklamsia. Apabila terjadi eklamsia, lakukan penilaian awal dan tatalaksana kegawatdaruratan. Berikan kembali $MgSO_4$ 2 gram secara IV perlahan-lahan (15-20 menit).

Bila setelah pemberian $MgSO_4$ ulang masih terdapat kejang, dapat dipertimbangkan untuk pemberian diazepam 10 mg secara IV selama 2 menit.

f. Langkah VI (Pelaksanaan Asuhan)

Dikerjakan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilaksanakan oleh klien sendiri. Implementasi yang efektif dapat mengurangi biaya perawatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada klien.

Pada kasus ibu hamil yang mengalami preeklamsia ringan maka akan dianjurkan melakukan kunjungan antenatal setiap minggu. Namun jika selama 2 minggu menjalani rawat jalan namun tidak ada perubahan maka akan dilakukan rawat inap dengan kriteria tidak ada perubahan setelah 2 minggu menjalani rawat jalan, kenaikan berat badan ibu 1 kg atau lebih per minggu selama 2 minggu berturut-turut, ataupun timbul salah satu atau lebih gejala preeklamsia berat. Bila setelah 1 minggu menjalani perawatan namun tidak mengalami perubahan maka preeklamsia ringan dianggap menjadi preeklamsia berat. Bila dalam perawatan sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm maka penderita tetap dirawat selama 2 hari lagi baru dipulangkan. Perawatan akan berlanjut dengan rawat jalan.

Pada kasus ibu hamil yang mengalami preeklamsia berat maka akan dilakukan segera masuk ke rumah sakit, pemberian anti kejang/anti konvulsan magnesium sulfat ($MgSO_4$) sebagai pencegahan dan terapi kejang. $MgSO_4$ merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia berat dan eklamsia. Sambil menunggu rujukan, mulai dosis rumatan 6 gram $MgSO_4$ dalam 6 jam sesuai prosedur dengan cara : Ambil 6 gram $MgSO_4$ (15 ml larutan $MgSO_4$ 40%) dan larutkan dalam 500 ml larutan Ringer Laktat/ringer Asetat, lalu berikan secara IV dengan kecepatan 28 tetes/menit selama 6 jam, dan diulang hingga 24 jam setelah persalinan atau kejang berakhir (bila eklamsia).

Melakukan pemeriksaan fisik tiap jam, meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, refleks patella dan jumlah urin, bila frekuensi

pernafasan <16x/menit, dan atau tidak didapatkan refleks tendon patella dan atau oliguria (produksi urin <0,5 ml/kg BB/jam), segera hentikan pemberian MgSO₄, jika terjadi depresi nafas, berikan cairan glukosa 1 gram secara IV (10 ml larutan 10 %) bolus dalam 10 menit, selama ibu dengan preeklamsia dan eklamsia dirujuk pantau dan nilai adanya perburukan preeklamsia. Apabila terjadi eklamsia, lakukan penilaian awal dan tatalaksana kegawatdaruratan. Berikan kembali MgSO₄ 2 gram secara IV perlahan-lahan (15-20 menit). Bila setelah pemberian MgSO₄ ulang masih terdapat kejang, dapat dipertimbangkan untuk pemberian diazepam 10 mg secara IV selama 2 menit.

g. Langkah VII (Evaluasi Asuhan Kebidanan)

Evaluasi pada kenyataan adalah cara untuk mengecek apakah rencana yang telah dilaksanakan benar memenuhi kebutuhan klien, yaitu kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap penentuan diagnosa dan masalah. (Istri Bartini. 2012: 13)

3. Manajemen Asuhan Kebidanan dalam Bentuk SOAP

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran piñatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu:

a. **Data Subjektif (S)**

Data atau fakta yang merupakan informasi termasuk biodata, mencakup nama, umur, tempat tinggal, status perkawinan, pendidikan serta keluhan-keluhan, diperoleh dari hasil wawancara langsung pada pasien atau dari keluarga dan tenaga kesehatan lainnya.

b. Data Objektif (O)

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik mencakup inspeksi, palpasi, auskultasi, peserta pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radio diagnostik.

c. Assesment (A)

Merupakan keputusan yang ditegakkan dari hasil perumusan masalah yang mencakup kondisi, masalah dan prediksi terhadap kondisi tersebut. Penegakan diagnosa kebidanan dijadikan sebagai dasar tindakan dalam upaya menanggulangi ancaman keselamatan pasien / klien.

d. Planning (P)

Rencana kegiatan mencakup langkah-langkah yang akan dilakukan oleh bidan dalam melakukan intervensi untuk memecahkan masalah pasien/klien.

BAB III

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY”S” DENGAN PREEKLAMIA RINGAN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TANGGAL 04 MEI 2017 S/D 27 MEI 2017

No. register : 56xxxx

Tanggal Masuk : 04 Mei 2017 pukul 10.00 wita

Tanggal Pengkajian : 04 Mei 2017 pukul 10.00 wita

Nama Pengkaji : Esi Ismala Nengsi

LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny”S” / Tn”L”

Umur : 41 tahun/43 tahun

Nikah/lamanya : 1x/16 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SD/SD

Pekerjaan : IRT/Buruh Harian

Alamat : Jalan Anak Gowa

B. Riwayat Keluhan

1. Keluhan utama : Ibu datang dengan surat rujukan dari puskesmas masuk ke Poli KIA RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan keluhan sakit kepala, pusing dan pembengkakan pada kaki.

2. Riwayat keluhan utama

Ibu mengatakan telah mengalami pusing dan sakit kepala serta pembengkakan pada kaki sejak 2 minggu terakhir

C. Riwayat Kehamilan Sekarang

1. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang keempat dan tidak pernah keguguran
2. HPHT tanggal 04 September 2016
3. Ibu mengatakan usia kehamilan \pm 8 bulan
4. Pergerakan janin mulai dirasakan sejak bulan Januari 2017
5. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan pada perut bagian kiri ibu
6. Ibu melakukan kunjungan ANC sebanyak 4 kali dan telah mendapat imunisasi TT
 - a. Kunjungan I tanggal 20 Januari 2017 dengan keluhan ibu tidak ada, berat badan 70kg dan tekanan darah 110/90 mmHg
 - b. Kunjungan II tanggal 19 Maret 2017 dengan keluhan kadang pusing dan kadang sakit kepala, berat badan 73kg, tekanan darah 130/90 mmHg dan telah mendapat imunisasi TT I
 - c. Kunjungan III tanggal 22 April 2017 dengan keluhan sering pusing, sering mengalami sakit kepala dan pembengkakan pada kaki dengan tekanan darah 140/100 mmHg dengan berat badan 75kg dan telah mendapat imunisasi TT II.
 - d. Kunjungan IV tanggal 03 Mei 2017 dengan keluhan pusing dan bengkak pada kaki dengan tekanan darah 150/100 mmHg dan berat badan 76kg.
7. Ibu mengatakan mengkonsumsi tablet penambah darah.

D. Riwayat Menstruasi

Haid pertama ibu saat usia 14 tahun, siklus haid biasanya 28-30 hari, haid biasanya dialami 5-6 hari dan tidak pernah mengalami disminorea pada saat haid.

E. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

1. Anak pertama

Ibu melahirkan anak pertama tahun 1999 dengan kehamilan aterm dan imunisasi TT tidak pernah. Persalinan normal di rumah dan ditolong oleh dukun dengan jenis kelamin laki-laki. Tidak ada kelainan selama masa nifas dan ASI eksklusif 1 tahun

2. Anak kedua

Ibu melahirkan pada tahun 2003 dengan kehamilan aterm dan imunisasi TT lengkap. Persalinan normal ditolong oleh Bidan di puskesmas dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan lahir 2800 gram, panjang badan 48 cm. tidak ada kelainan selama masa nifas dan ASI eksklusif selama 8 bulan dan imunisasi lengkap.

3. Anak ketiga

Ibu melahirkan tahun 2009 dengan kehamilan aterm dan imunisasi TT lengkap. Persalinan normal ditolong oleh Bidan di puskesmas dengan jenis kelamin perempuan dengan berat badan lahir 3000 gram dan panjang badan 49 cm. masa nifas berjalan normal dan ASI eksklusif 6 bulan dan Imunisasi lengkap.

D. Riwayat Keluarga Berencana

Ibu pernah menjadi akseptor KB Suntik 3 bulan setelah anak ketiga lahir dan tidak kelainan selama menjadi akseptor KB.

E. Riwayat kesehatan yang lalu

Ibu tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya dan tekanan darah sebelum hamil dalam batas normal, tidak ada riwayat penyakit asma, DM dan jantung.

F. Riwayat kesehatan dan penyakit keluarga

Tidak ada riwayat keturunan kembar dan tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun.

G. Riwayat sosial budaya

Ini merupakan pernikahan yang pertama, keluarga sangat mendukung kehamilan ibu yang sekarang dan sangat diharapkan terutama suami. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami. Ibu merasa cemas dengan keadaannya dan keadaan bayinya ketika melakukan pemeriksaan kehamilan.

H. Riwayat fungsi kesehatan

1. Nutrisi

Ibu mengatakan sebelum hamil makan 3x sehari, minum 4-5 gelas/hari, komposisi nasi, sayur dan lauk, sedangkan selama hamil makan 3x/hari dengan porsi lebih banyak dari pada sebelum hamil, komposisi nasi, sayur, lauk dan minum 6-7 gelas/hari.

2. Eliminasi

Ibu mengatakan sebelum hamil dan selama hamil selalu lancar buang air besar 1x/hari dengan eksistensi lembek warna kuning, sedangkan buang air kecil sebelum hamil antara 3-4x/hari dan selama hamil 5-6x/hari dengan warna kuning jernih.

3. Istirahat/tidur

Ibu mengatakan sebelum dan selama hamil jarang tidur siang, dan tidur malam 6-8 jam/hari dan tidak ada keluhan.

4. Aktivitas

Ibu mengatakan sebelum dan selama hamil tetap melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, mengepel, memasak dll.

5. Aktivitas seksual

Ibu mengatakan sebelum hamil agak sering berhubungan dengan suami kurang lebih 3x seminggu.

6. Personal hygiene

Ibu mengatakan sebelum dan selama hamil selalu mandi 2x/hari, menggosok gigi, mencuci rambut 2 hari sekali dan ganti baju setiap setelah mandi sore.

7. Perilaku kesehatan

Ibu mengatakan sebelum dan selama hamil tidak pernah merokok dan minum minuman beralkohol.

I. Pemeriksaan fisik umum

1. Keadaan umum ibu baik

2. Kesadaran komposmentis

3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 150/100 mmHg

Nadi : 86x/menit

Pernafasan : 20x/menit

Suhu : 36,8°C

4. TB : 158 cm

5. LiLA : 26 cm

6. BB sebelum hamil 68 kg, BB sekarang 77 kg.

7. Pemeriksaan fisik head to toe

a. Wajah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : tidak ada oedema

b. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih

c. Mulut

Inspeksi : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada caries gigi

d. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi : terdapat linea nigra, striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi
Palpasi : Leopold I : TFU 1 jrbpx, 35 cm, teraba bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : kepala

Leopold IV : BAP

LP : 95 cm

TBJ : TFU x LP

: 35 x 95

: 3325 gram

Auskultasi : DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 141x/menit secara teratur

g. Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak oedema

h. Ekstremitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises

Palpasi : terdapat oedema pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kiri (+) kanan (+)

J. Pemeriksaan Laboratorium

1. Hb : 11,2 gr%

2. Albumin : +1

3. Reduksi : Negatif (-)

K. Pemeriksaan USG

Hasil USG : tunggal, hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 34-36 minggu,

jk : perempuan, TBJ: 3000 gram.

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

G4P3A0, gestasi 34-36 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklamsia ringan.

1. G4P3A0

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan hamil anak keempat dan tidak pernah keguguran

b. Data objektif

1) Tonus otot perut tampak kendur

2) Terdapat striae alba

- 3) Leopold I: 1 jrbpx, 35 cm, teraba bokong
- 4) Djj: terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 141x/menit secara teratur

Analisa dan Interpretasi Data :

Ibu mengatakan hamil keempat, pada akibat pecahnya pemeriksaan fisik tonus otot perut kendor pembuluh darah perifer pada kehamilan sebelumnya dimana perut seolah-olah retak dan warnanya berubah dan tampak pada seorang multigravida. Pada saat melakukan palpasi, teraba bokong pada bagian fundus dan teraba kepala pada bagian perut bawah ibu dan terdengar denyut jantung janin menandakan bahwa ibu sedang hamil.

2. Umur Kehamilan 34-36 minggu

a. Data Subjektif

- 1) Ibu mengatakan HPHT tanggal 04 September 2016
- 2) Ibu mengatakan umur kehamilannya sekarang ± 8 bulan

b. Data Objektif

- 1) Tanggal pengkajian 04 Mei 2017
- 2) Pembesaran perut sesuai masa kehamilan
- 3) TFU 1 jrbpx, 35 cm, teraba bokong

Analisa dan Interpretasi Data

- a) Dari HPHT tanggal 04 september 2016 sampai tanggal pengkajian tanggal 04 Mei 2017 maka usia kehamilan ibu sekarang 34 minggu 4 hari atau gestasi 34-36 minggu.
- b) Pembesaran perut disebabkan adanya pertumbuhan janin dan dibawah pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan hipertropi otot polos.

3. Situs Memanjang

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janin kuat disebelah kiri perut ibu

b. Data Objektif

- 1) Leopold I: TFU 1 jrbpx, 35 cm, teraba bokong
- 2) Leopold II: Puki
- 3) Leopold III: kepala

Analisa dan Interpretasi Data

- a) Dari palpasi didapatkan teraba bokong pada bagian fundus dan kepala pada perut bagian bawah ibu menandakan bahwa bayi dengan situs memanjang
- b) Pada saat melakukan palpasi didapatkan hasil bahwa pada bagian perut kiti ibu teraba seperti papan punggung dan terdengar denyut jantung janin berada pada bagian kuadran kiri bawah perut ibu menandakan bahwa bayi situs memanjang
- c) Pada leopold III didapatkan bagian kepala bayi menandakan bahwa bayi situs memanjang

4. Intrauteri

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin kuat terutama pada perut sebelah kiri.

b. Data Objektif

- 1) Pembesaran perut sesuai masa kehamilan
- 2) Pada saat dilakukan palpasi leopold ibu tidak merasakan nyeri

Analisa dan Interpretasi Data

Salah satu tanda kehamilan intrauteri adalah terasa gerakan janin dalam rahim, tidak terasa nyeri pada saat palpasi dan perkembangan janin sesuai dengan tuanya umur kehamilan.

5. Tunggal

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan di sebelah kiri

b. Data Objektif

- 1) Leopold I : TFU 1 jrbpx, 35 cm, teraba bokong
- 2) Leopold II : puki
- 3) Leopold III: kepala
- 4) Pada saat auskultasi : djj terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 141x/menit secara teratur

Analisa dan Interpretasi Data

Pembesaran perut sesuai masa kehamilan, teraba dua bagian besar pada lokasi yang berbeda, pada bagian kepala teraba pada kuadran bawah perut dan teraba bagian bokong pada fundus. Pada kehamilan tunggal, hanya 1 terdengar bunyi jantung janin dan teraba pada kuadran kiri bawah perut ibu.

6. Hidup

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin kuat pada perut bagian bawah disebelah kiri.

b. Data Objektif

Pada auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 141x/menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Janin bisa dikatakan hidup jika terasa adanya pergerakan janin yang hanya dapat dirasakan ibunya dan pada auskultasi DJJ yang jelas dan teratur.

7. Keadaan Janin Baik

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat terutama pada perut sebelah kiri.

b. Data Objektif

Auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 141x/menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dan bunyi jantung janin teratur dengan frekuensi 141x/menit yang menandakan bahwa janin dalam kondisi baik.

8. Preeklamsia Ringan

a. Data Subjektif

Ibu mengeluh kadang mengalami pusing dan juga sakit kepala.

b. Data Objektif

- 1) Tekanan darah 150/100 mmHg
- 2) Albumin +1
- 3) Oedema pada kedua kaki

Analisa dan Interpretasi Data

Preeklamsia ringan merupakan timbulnya hipertensi disertai proteinuria setelah umur kehamilan diatas 20 minggu atau segera persalinan .Tetapi dapat juga timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu (Pudiastuti R, D, 2012: 163). Ditandai dengan ibu hamil mengalami kenaikan tekanan darah diatas normal yaitu $\geq 140/90$ mmHg dan $\leq 160/110$ mmHg, pemeriksaan tes celup urin dengan proteinuria menunjukkan ≥ 300 mg/24 jam atau +1, dan terjadi pembengkakan pada kaki (Nugroho, Taufan, 2012 : 05).

LANGKAH III: MERUMUSKAN DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial preeklamsia pada masa kehamilan akan mengakibatkan terjadinya kelahiran prematur, resiko terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), abrupsi plasenta, resiko terajdinya kematian bayi (KJDR) dan apabila

preeklamsia ringan tidak tertangani dengan cepat maka preeklamsia berada di tingkat berat atau menjadi preeklamsia berat (Bothamley, Boyle, 2013: 194).

a. Data Subjektif

Ibu mengeluh sakit kepala dan pusing

b. Data Objektif

1. Tekanan darah 150/100 mmHg
2. Albumin +1
3. Oedema pada kedua kaki

Analisa dan Interpretasi Data

- a) Pencegahan dan pengobatan preeklamsia ringan yang tidak tertangani dengan baik akan mengarah ke preeklamsia berat.
- b) Peningkatan dan tanda preeklamsia seperti tekanan sistolik 160 mmHg atau lebih, atau tekanan diastol 110 mmHg atau lebih, proteinuria $>5\text{gr}/24$ jam atau tes celup urin $\geq 2+$ pada pemeriksaan kualitatif, adanya keluhan subjektif perubahan kesadaran, nyeri kepala, skotomata dan pandangan kabur menandakan preeklamsia sudah berada di tingkat yang berat (Pudiastuti, R, D, 2012: 165).

LANGKAH IV: PERLUNYA TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Pada kasus preeklamsia ringan tidak membutuhkan tindakan segera jika tekanan darah $\leq 160/110$ mmHg, proteinuria $\leq +2$ dan atau tidak ada tanda-tanda kejang atau syok jika telah melakukan kunjungan antenatal care selama 2 minggu berturut-turut. Jika pasien telah mengalami syok atau kejang maka akan dilakukan tindakan segera dengan berkolaborasi dengan dokter dengan melakukan tindakan emergency atau melakukan rujukan. Namun sebelum melakukan rujukan, tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan pemberian obat MgSO_4 pada pasien

preeklamsia atau eklamsia sebagai tindakan awal untuk mencegah terjadinya kejang atau pun kejang yang berulang.

LANGKAH V: RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya asuhan atau tindakan kepada ibu agar kehamilan berlangsung normal dan keadaan ibu dan janin baik serta preeklamsia ringan dapat diatasi dan tidak terjadi preeklamsia berat.

2. Kriteria

- a. Kehamilan aterm dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu
 - b. Keadaan ibu baik
 - c. Tanda-tanda vital normal
 - 1) Tekanan darah : Sistolik 100-130 mmHg
Diastolik 60-90 mmHg
 - 2) Nadi : 60-100x/menit
 - 3) Pernafasan : 16-24x/menit
 - 4) Suhu : 36,5-37,5°C
 - d. DJJ dalam batas normal antara 120-160x/menit
 - e. Tidak ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan
 - f. Peningkatan berat badan dalam batas normal 0,45 kg/minggu
 - g. Albumin dan oedema negatif (-)
 - h. Keluhan ibu yang merasakan sakit kepala dan pusing dapat berkurang atau hilang.
- ### 3. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan
- a. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan jelaskan hal-hal yang dianggap perlu seperti : peningkatan tekanan darah, proteinurine dan oedema

Rasional:

Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pemeriksaan antenatal yang berkualitas.

- b. Berikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.

Rasional:

Dukungan psikologis dan keterlibatan suami dan keluarga merupakan psikoterapi dalam perawatan klien sehingga dapat memberikan semangat dan membantu dalam proses penyembuhan. Disamping itu agar ibu lebih optimis menghadapi kehamilannya dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Memberikan HE pada Ibu tentang:

- 1) Istirahat yang cukup

Rasional:

Adanya peningkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh diperlukan istirahat yang cukup untuk memberikan relaksasi yang cukup pada otot serta mengurangi beban kerja jantung.

- 2) Diet seimbang dalam kehamilan terhadap makanan yang tinggi protein, rendah lemak, dan garam tidak perlu dikurangi.

Rasional:

Ibu hamil dengan preeklamsia ringan tetap membutuhkan makanan yang bergizi, diet makanan tinggi protein, rendah lemak, dan pembatasan cairan dan garam tidak bisa mencegah hipertensi dalam kehamilan.

3) Menjaga personal hygiene dalam kehamilan

Rasional:

Menjaga personal hygiene sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu

- d. Memberikan pendidikan kesehatan tentang preeklamsia ringan dan cara mengatasi dan memantau preeklamsia ringan

Rasional:

Dengan ibu telah mengetahui tentang preeklamsia ringan maka ibu dapat mengerti dengan kondisi yang sekarang dialaminya dan cara mengatasi apabila ada tanda-tanda mengarah preeklamsia berat.

- e. Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan bayinya.

Rasional:

Dengan mengajarkan ibu cara menghitung gerakan janinnya ibu dapat memantau sendiri kondisi janinnya secara objektif sekaligus meningkatkan pengetahuan ibu tentang kehamilan.

- f. Ajarkan ibu untuk memantau tanda-tanda terjadi preeklamsia berat yaitu sakit kepala, rasa nyeri pada daerah perut, penglihatan kabur, mual dan muntah serta gangguan kesadaran.

Rasional:

Agar ibu mengerti dan dapat mengambil keputusan klinik yang tepat jika muncul tanda-tanda preeklamsia berat.

- g. Jelaskan pada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan

Rasional:

Dengan memberitahu ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan, ibu akan mengerti dan melaksanakan anjuran bidan sehingga jika ibu mengalami salah

satu dari 9 tanda bahaya pada kehamilan itu, ibu dapat segera ke tenaga kesehatan terdekat sehingga ibu bisa mendapatkan pertolongan pertama dan segala hal yang mengancam keselamatan ibu dan janinnya.

- h. Diskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya.

Rasional:

Dengan adanya diskusi antara ibu dan keluarga baik secara fisik maupun psikis dan finansial akan siap menghadapi persalinan dan kelahiran bayinya tanpa rasa cemas yang berlebihan

- i. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG

Rasional:

Ultrasonografi (USG) merupakan suatu metode diagnostic dengan menggunakan gelombang ultrasonik, untuk mempelajari struktur jaringan berdasarkan gambaran ultrasonik yang dipantulkan oleh jaringan, yang manfaatnya untuk memantau keadaan janin.

- j. Pemberian obat nefedipin 10 ml (2x1)

Rasional:

Obat nefedifin adalah obat anti hipertensi yang aman bagi ibu hamil dan tidak mengganggu pertumbuhan janin.

- k. Anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur dan datang kembali untuk memeriksakan kehamilannya minggu depan yaitu tanggal 09 Mei 2017 dan bila ada tanda-tanda bahaya kehamilan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Rasional:

ANC yang teratur dapat mendeteksi adanya komplikasi yang memperburuk keadaan ibu hamil. Di samping itu dengan menganjurkan ibu datang minggu depan ibu dapat mengetahui keadaannya serta keadaan janinnya sehingga bila

ada hal-hal yang membahayakan ibu dan janinnya dapat segera diberi pertolongan.

LANGKAH VI: IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 04 Mei 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan preeklamsia ringan
2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.
3. Memberikan HE pada ibu tentang:
 - a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan pada malam hari minimal 7 jam.
 - b. Menganjurkan pada ibu untuk diet seimbang dalam kehamilan yaitu dengan makan makanan yang tinggi protein, rendah lemak, dan garam tidak perlu di kurangi seperti banyak makan ikan, tahu, tempe, dan banyak minum air putih.
 - c. Hygine dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam tiap kali lembab
4. Memberikan ibu pendidikan kesehatan tentang preeklamsia ringan
5. Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janin.
 - a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari
 - b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam.
 - c. Ibu harus segera memberitahu bidan/dokter jika gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam
6. Menganjurkan pada ibu untuk memantau tanda-tanda terjadinya preeklamsia berat, yaitu sakit kepala, rasa nyeri didaerah perut, penglihatan kabur, mual dan muntah serta gangguan kesadaran.

7. Menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya pada kehamilan
 - a. Sakit kepala yang menetap
 - b. Gangguan penglihatan
 - c. Oedema pada wajah dan tungkai
 - d. Mual dan muntah yang berlebihan
 - e. Nyeri perut yang hebat
 - f. Penurunan gerakan janin
 - g. Pendarahan pervaginaam
 - h. Demam yang hebat
 - i. Kejang
8. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya
Pemilihan tempat persalinan, penolong persalinan, biaya persalinan, kendaraan saat menuju tempat persalinan, dan pendamping pada saat persalinan dan pakaian ibu dan bayinya.
9. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG
10. Memberikan obat nefedipin 10 ml (2x1)
11. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur serta menganjurkan ibu untuk datang memeriksakan kehamilannya tanggal 11 Mei 2017 dan bila ada tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.

LANGKAH VII: EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 04 Mei 2017

1. Keadaan ibu dengan preeklamsia ringan belum teratasi dan keadaan janin baik ditandai dengan
 - a. Tekanan darah : 150/100 mmHg

- b. Oedema : pada kedua kaki
 - c. Albumin : +1
 - d. Djj : terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 141x/menit secara teratur.
2. Ibu telah merasa tenang dengan kehamilan yang dialaminya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 3. *Health Education* telah diberikan pada ibu
 4. Ibu telah mengerti apa itu preeklamsia ringan yang sedang dialaminya
 5. Ibu telah mengerti cara menghitung pergerakan janinnya
 6. Ibu telah mengerti tanda-tanda bahaya pada kehamilan
 7. Tidak terjadi preeklamsia berat yang ditandai dengan
- a. Tekanan darah : 150/100 mmHg
 - b. Albumin : +1
8. Ibu telah mempersiapkan semua peralatan untuk persalinan dan peralatan bayinya.
 9. Ibu telah melakukan USG
 10. Ibu telah mendapat obat Nefedifin
 11. Ibu mau melakukan kunjungan ANC secara teratur dan akan memeriksakan kehamilannya tanggal 11 mei 2017

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY”S” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 04 MEI 2017**

No. register : 56xxxx

Tanggal Masuk : 04 Mei 2017 pukul 10.00 wita

Tanggal Pengkajian : 04 Mei 2017 pukul 10.00 wita

Nama Pengkaji : Esi Ismala Nengsi

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”S” / Tn”L”

Umur : 41 tahun/43 tahun

Nikah/lamanya : 1x/16 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SD/SD

Pekerjaan : IRT/Buruh Harian

Alamat : Jalan Anak Gowa

A. Data Subjektif

1. Ibu mengatakan HPHT tanggal 04 september 2016
2. Ibu mengatakan hamil keempat dan tidak pernah keguguran
3. Ibu mengatakan umur kehamilannya sekarang ± 8 bulan
4. Ibu mengatakan mulai merasakan pergerakan janinnya sejak bulan januari
5. Ibu mengatakan merasakan pergerakan janinnya kuat di sebelah kiri

6. Ibu mengatakan selama hamil tidak ada nyeri perut
7. Ibu mengatakan telah mendapat imunisasi TT 2x selama kehamilannya di puskesmas
8. Ibu mengeluh kadang mengalami pusing dan sakit kepala
9. Ibu mengatakan khawatir dengan kehamilannya
10. Ibu tidak ada riwayat hipertensi, asma, jantung, DM, penyakit menurun ataupun penyakit menular

B. Data Objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HTP 11 juni 2017
4. Gestasi 34 minggu 4 hari
5. Tinggi badan : 158 cm
6. Berat badan sebelum hamil : 68 kg
7. Berat badan sekarang : 77 kg
8. Lila : 26 cm
9. Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 150/100 mmHg
 - Nadi : 86x/menit
 - Pernafasan : 20x/menit
 - Suhu : 36,8°C
10. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah
 - Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada cloasma gravidarum
 - Palpasi : tidak ada oedema

b. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih

c. Mulut

Inspeksi: bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada caries gigi

d. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, hyperpigmentasi pada areola mammae, putting susu menonjol

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi : terdapat linea nigra, striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi
Palpasi : Leopold I : TFU 1 jrbpx, 35 cm, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : kepala

Leopold IV : BAP

LP : 95 cm

TBJ : TFU x LP

: 35 x 95

: 3325 gram

Auskultasi : DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 141x/menit secara teratur

g. Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak oedema

h. Ekstremitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises

Palpasi : terdapat oedema pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kiri (+) kanan (+)

11. Pemeriksaan Laboratorium

a. Hb : 11,2 gr%

b. Albumin : +1

c. Reduksi : Negatif (-)

12. Pemeriksaan USG

Hasil USG : tunggal, hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 34-36 minggu, jk : perempuan, TBJ: 3000 gram.

C. Assessment

Diagnosa Aktual : G4P3A0, gestasi 34-36 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklamsia ringan.

Diagnosa Potensial : Antisipasi terjadinya preeklamsia berat

D. Planning

Tanggal 04 Mei 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga bahwa kehamilannya sekarang dengan preeklamsia ringan
Hasil: ibu telah mengerti dengan penjelasan yang diberikan
2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga

Hasil: ibu merasa tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Memberikan HE pada ibu tentang:

- a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan malam hari minimal 7 jam
- b. Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, rendah lemak dan garam tidak perlu dikurangi misalnya banyak makan ikan, tahu, tempe dan banyak minum air putih.
- c. Hygiene dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam apabila lembab

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk menghitung gerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya

- a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari
- b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam
- c. Ibu harus memberitahu bidan/dokter apabila gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mengerti cara menghitung gerakan janinnya dalam sehari.

5. Menganjurkan ibu untuk memantau tanda-tanda terjadinya preeklamsia berat yaitu sakit kepala, rasa nyeri di daerah perut, penglihatan kabur, mual sampai muntah dan gangguan kesadaran

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mau ke fasilitas kesehatan terdekat apabila terjadi tanda-tanda preeklamsia berat.

6. Menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya pada kehamilan seperti:

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Gangguan penglihatan
- c. Oedema pada wajah dan tungkai
- d. Mual dan muntah yang berlebihan
- e. Nyeri perut yang hebat
- f. Penurunan gerakan janin
- g. Pendarahan pervaginaam
- h. Demam yang hebat
- i. Kejang

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

7. Mendiskusikan pada ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya

Hasil: ibu telah mempersiapkan semua perlengkapan persalinan dan perlengkapan bayinya.

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG

Hasil: ibu telah melakukan pemeriksaan USG

9. Memberikan ibu obat nefedipin 10 ml (2x1) dan menganjurkan ibu untuk meminum setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah di resepkan sesuai jadwal yang telah diberikan.

10. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur dan menganjurkan ibu untuk datang melakukan pemeriksaan kehamilan pada tanggal 11 Mei 2017 dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat.

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang pada tanggal 09 Mei 2017 dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera ke fasilitas kesehatan terdekat



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY”S” DENGAN PREEKLAMSI RINGAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 11 MEI 2017**

No. register : 56xxxx

Tanggal Masuk : 11 Mei 2017 pukul 10.25 wita

Tanggal Pengkajian : 11 Mei 2017 pukul 10.25 wita

Nama Pengkaji : Esi Ismala Nengsi

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengeluh masih merasakan sedikit pusing dan sakit kepala
2. Ibu mengatakan HPHT tanggal 04 september 2016
3. Ibu mengatakan ini kehamilan yang keempat dan tidak pernah keguguran
4. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat
5. Ibu mengatakan sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi sesuai anjuran yang telah diberikan
6. Ibu mengatakan tidak melakukan aktivitas yang berat.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. G4P3A0
4. HTP 11 juni 2017
5. Gestasi 35 minggu 5 hari
6. Tanda-tanda vital

Tekanan darah: 150/90 mmHg

Nadi : 86x/ menit

Pernafasan : 19x/ menit

Suhu : 36,8°C

7. Berat badan : 78 kg

8. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Palpasi : tidak oedema

b. Mata

Inspeksi: konjungtiva merah muda dan sklera putih

c. Abdomen

Inspeksi: terdapat line nigra dan striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi.

Palpasi: Leopold I : TFU 1 jrbpx, 36 cm, teraba bokong

Leopold II : puki

Leopold III : kepala

Leopold IV : BAP

LP : 97 cm

TBJ : TFU x LP

: 36 x 97

: 3492 gram

Auskultasi: Djj terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/ menit secara teratur

d. Eksremitas

Inspeksi: tidak ada varises

Palpasi : terdapat oedema pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kanan (+) kiri (+)

Assessment (A)

Diagnosa Aktual : G4P3A0, gestasi 34-36 minggu, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklamsia ringan.

Diagnosa Potensial : antisipasi terjadinya preeklamsia berat

Planning (P)

Tanggal 11 Mei 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada Ibu bahwa ibu masih mengalami preeklamsia ringan dan keadaan janin baik menunjukkan bahwa Djj dalam batas normal
Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
2. Mengingatkan ibu untuk tetap melaksanakan HE (*Health education*)
 - a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas sehari-hari dan menganjurkan tidur siang minimal 1 jam
 - b. Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan banyak mengkonsumsi makanan seperti tempe dan tahu.
 - c. Hygiene dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam apabila lembab
Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mau melaksanakan anjuran yang diberikan.
3. Mengingatkan ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan dan menganjurkan ibu ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan
Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk rajin mengkonsumsi obat yang telah diberikan sesuai jadwal dan aturan minum yang telah dijelaskan

Hasil: ibu bersedia melakukannya untuk kesehatan dirinya dan janinnya.

5. Mengajukan ibu untuk ke fasilitas kesehatan apabila terjadi kelainan pada kehamilannya

Hasil: ibu bersedia melakukannya



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY”S” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN DI RUMAH
KLIEN DI JALAN ANAK GOWA
TANGGAL 19 MEI 2017**

Tanggal Kunjungan : 19 Mei 2017 pukul 15.30 wita

Tanggal Pengkajian : 19 Mei 2017 pukul 15.30 wita

Nama Pengkaji : Esi Ismala Nengsi

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sakit kepala yang sering dirasakan sudah berkurang dan sudah tidak merasakan pusing lagi
2. Ibu mengatakan sudah melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak melakukan aktivitas yang berat
3. Ibu mengatakan sudah tidur nyenyak pada malam hari meskipun masih merasakan sakit kepala

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 36 minggu 6 hari
4. Tanda-tanda vital
Tekanan darah : 140/90 mmHg
Nadi : 88x/ menit
Pernafasan : 20x/menit
Suhu : 36,7°C
5. Berat badan: 78 kg
6. Lila: 26,5 cm
7. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Palpasi : tidak oedema

b. Mata

Inspeksi: konjungtiva merah muda dan sklera putih

c. Abdomen

Inspeksi: terdapat line nigra dan striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi.

Palpasi: Leopold I : TFU 2 jrbpx, 34 cm, teraba bokong

Leopold II : puki

Leopold III : kepala

Leopold IV : BAP

LP : 99 cm

TBJ : TFU x LP

: 33 x 99

: 3366 gram

Auskultasi: Djj terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 144x/ menit secara teratur

d. Eksremitas

Inspeksi: tidak ada varises

Palpasi : terdapat oedema pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kanan (+) kiri (+)

Assessment (A)

Diagnosa Aktual : G4P3A0, gestasi 36-38 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklamsia ringan.

Planning (P)

Tanggal 19 Mei 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya normal dan keadaan janinnya dalam kondisi baik

Hasil: mengerti dengan penjelasan yang diberikan

2. Melakukan follow up tentang HE (*Health Education*)

- a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan jangan melakukan pekerjaan berat
- b. Menganjurkan ibu tetap makan makanan yang bergizi untuk kesehatan janin dan juga ibu
- c. Menganjurkan ibu tetap menjaga personal hygiene dan mengganti pakaian dalam apabila sudah merasa lembab atau basah.

Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

3. Menjelaskan pada ibu tentang tanda-tanda persalinan

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk ke fasilitas kesehatan apabila sudah mengalami tanda-tanda persalinan

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian untuk bayinya

Hasil: ibu sudah menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya.

6. Mengingatkan pada ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan dan segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami salah satu tanda bahaya pada kehamilan

Hasil: ibu bersedia melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY”S” DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN DI RUMAH
KLIEN DI JALAN ANAK GOWA
TANGGAL 27 MEI 2017**

Tanggal Kunjungan : 27 Mei 2017 pukul 15.20 wita

Tanggal Pengkajian : 27 Mei 2017 pukul 15.20 wita

Nama Pengkaji : Esi Ismala Nengsi

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan sakit kepala dan pusing lagi
2. Ibu mengatakan sudah merasakan nyeri perut tembus belakang sejak pukul 10.00 wita
3. Ibu mengatakan belum ada pengeluaran lendir dan darah
4. Ibu mengatakan belum ada pengeluaran air
5. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat di perut sebelah kiri

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 38 minggu
4. Tanda-tanda vital
Tekanan darah : 130/90 mmHg
Nadi : 84x/ menit
Pernafasan : 20x/menit
Suhu : 36,6°C
5. Berat badan: 78 kg
6. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Palpasi : tidak oedema

b. Mata

Inspeksi: konjungtiva merah muda dan sklera putih

c. Abdomen

Inspeksi: terdapat line nigra dan striae alba dan tidak terdapat luka bekas operasi.

Palpasi: Leopold I : TFU 3 jrbpx, 31 cm, teraba bokong

Leopold II : puki

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 5/5

LP : 100 cm

TBJ : TFU x LP

: 32 x 100

: 3200 gram

Auskultasi: Djj terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/ menit secara teratur

d. Eksremitas

Inspeksi: tidak ada varises

Palpasi : terdapat oedema pada kedua kaki

Perkusi : refleks patella kanan (+) kiri (+)

Assessment (A)

Diagnosa Aktual : G4P3A0, gestasi 38-40 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan preeklamsia ringan.

Planning (P)

Tanggal 27 mei 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya normal dan keadaan janinnya baik
Hasil: ibu mengerti dan bahagia atas kondisinya sekarang
2. Menganjurkan ibu atau keluarga menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
Hasil: ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
3. Menganjurkan kepada ibu untuk ke fasilitas kesehatan terdekat apabila nyeri perutnya semakin bertambah dan atau ada pengeluaran air
Hasil: ibu bersedia melakukannya
4. Menganjurkan ibu tidak memikirkan persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdia kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya
Hasil: ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mengingatkan ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan
Hasil: ibu mengerti
6. Menganjurkan ibu untuk segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami pusing, sakit kepala, dan penglihatan kabur
Hasil: ibu mengerti dan mau melakukannya

Tabel 1.1 Daftar Kunjungan

No	Tekanan Darah	Berat Badan	Usia Kehamilan (Menurut HPHT)	Usia Kehamilan (Menurut TFU)	Ket
1	150/100 mmHg	77 kg	34 minggu 4 hari	1 jrbpx, 35 cm	Rumah Sakit
2	150/90 mmHg	78 kg	35 minggu 5 hari	1 jrbpx, 36 cm	Rumah Sakit
3	140/90 mmHg	78 kg	36 minggu 6 hari	2 jrbpx, 34 cm	Rumah Klien
4	130/90 mmHg	78 kg	38 minggu	3 jrbpx, 31 cm	Rumah Klien

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa selama 2 minggu berturut-turut dan dilanjutkan dengan kunjungan rumah sebanyak 2 kali kunjungan selama 2 minggu berturut-turut dan kemudian melakukan 1 kali kunjungan kembali di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa.

Penulis akan menguraikan secara narasi berdasarkan SOAP dan & langkah Vernay. Pada bab ini, penulis akan membandingkan antara tinjauan kasus pada Ny”S” dengan Preeklamsia Ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa dengan teori tentang preeklamsia ringan.

Pembahasan ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah, yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, melaksanakan tindakan segera/kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Dalam penerapan proses manajemen asuhan kebidanan pada Ny”S” dengan kasus Preeklamsia Ringan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual (Nurhayati dkk, 2013). Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut saya dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang/ laboratorium

Pengkajian data dasar pada kasus preeklamsia ringan pada masa kehamilan dilakukan pada saat pengamatan pertama kali ketika pasien datang puskesmas. Pengkajian meliputi anamnesis langsung yang diperoleh dari pasien, dan keluarga pasien. Pengkajian ini berupa identitas pasien, data biologis/fisiologis yang meliputi: keluhan utama, riwayat keluhan utama, riwayat kehamilan sekarang, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat kesehatan dan penyakit keluarga, riwayat sosial budaya, dan riwayat fungsi kesehatan. Pengkajian data objektif di peroleh melalui pemeriksaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik serta di tegakkan dengan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan USG. Pada langkah awal dikumpulkan semua informasi yang akurat dan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien.

Tanggal 04 mei 2017 Ny”S”, usia 41 tahun, G4P3A0 datang di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf sebagai pasien rujukan dari puskesmas dengan keluhan sakit kepala, sering pusing dan pembengkakan pada kedua kaki. Ibu merasakan keluhannya semenjak 2 minggu terakhir dan ibu mengatakan khawatir dengan kondisinya dan kondisi janinnya.

Sesuai dengan hasil penelitian (Yogi, dkk. 2014) mengatakan bahwa ibu hamil yang usianya ≥ 35 tahun mengalami banyak komplikasi, karena pada usia tersebut kelemahan fisik dan terjadi perubahan pada jaringan dan alat kandungan serta jalan lahir tidak lentur lagi. Salah satu penyakit yang timbul pada usia tersebut biasanya hipertensi dan juga hampir semua ibu hamil mengalami preeklamsia ringan dengan usia ≥ 35 tahun.

Pasien mengalami Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) pada tanggal 04 September 2016 dengan taksiran persalinan tanggal 11 Juni 2017. Usia kehamilan yang didapatkan dari perhitungan dengan rumus neegle didapatkan usia kehamilan

34 minggu 4 hari. Ibu tidak pernah mengalami trauma selama hamil, tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya, tidak ada riwayat asma, jantung, DM dan tidak ada riwayat mengkonsumsi obat-obatan dan minum minuman beralkohol. Selama hamil nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, istirahat cukup, aktivitas pasien tetap melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-harinya.

Pada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya lebih signifikan mengalami preeklamsia pada kehamilan berikutnya karena seorang ibu hamil yang tidak mengetahui bahwa keadaannya sudah mengalami tanda-tanda preeklamsia ringan seperti tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg disertai pembengkakan pada wajah atau tungkai dan pemeriksaan penunjang ditemukan proteinuria (Sutrimah dkk. 2015 vol 6 No 2).

Kunjungan pertama ibu pada tanggal 04 Mei 2017 di RSUD Syekh Yusuf Gowa, hasil pemeriksaan dengan Berat Badan ibu 77 kg, pemeriksaan fisik dengan hasil kesadaran komposmentis, keadaan umum ibu baik, tekanan darah 150/100 mmHg, nadi 86x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu 36,8°C, tidak ada cloasma gravidarum, tidak oedema, kedua konjungtiva merah muda, sclera putih, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, kelenjer tiroid dan vena jugularis, payudara tampak hyperpigmentasi pada areola mammae.

Pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu Tinggi Fundus Uteri (TFU) 1 jrbpx, 35 cm, teraba bokong sesuai dengan usia kehamilan yaitu 34 minggu 4 hari (34-36 minggu), punggung kanan, presentasi kepala, terdengar jelas dan kuat denyut jantung janin di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 141x/menit secara teratur, dan oedema pada kedua kaki dan keadaan janin baik dan ibu dengan preeklamsia ringan. Pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil Hb 11,2 gr%, Albumin: +1, Reduksi: Negatif (-). Pemeriksaan USG yaitu: tunggal, hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 34-36 minggu, jk : perempuan, TBJ: 3000 gram.

Pada kehamilan trimester III pembesaran perut semakin meningkat. Pembesaran perut apabila diukur dari pinggir atas simpisis akan didapatkan hasil 34 cm dengan usia kehamilan 34 minggu dan apabila dikur dari pusat akan didapatkan 14cm (Prawirohardjo S. 2014). Sedangkan pada pemeriksaan penunjang pada preeklamsia biasanya dilakukan pemeriksaan proteiunuria untuk mendiagnosis bahwa ibu mengalami preeklamsia ringan apabila proteinuria +1 (Nugroho, Taufan, 2012: 10).

Kunjungan kedua dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa , hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis. Ibu mengeluh masih merasakan sedikit pusing dan sakit kepala. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ini didapatkan hasil Tekanan darah 150/90 mmHg, Nadi 86x/menit, Pernafasan 19x/ menit, Suhu 36,8°C, berat badan ibu 78 kg, pada pemeriksaan fisik terfokus didapatkan hasil tidak oedema pada wajah, konjungtiva merah muda dan sclera putih pada mata.

Pemeriksaan abdomen didapatkan TFU 1 jrbpx, 36 cm, teraba bokong dan sesuai dengan usia kehamilan yaitu 35 minggu 5 hari (34-36 minggu) dengan presentasi kepala, punggung kiri dan bergerak di ats panggul. Denyut jantung janin terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit secara teratur, dan oedema pada kedua kaki. Ibu rajin mengkonsumsi obat anti hipertensi yang baik untuk ibu hamil yang diberikan pada tanggal 04 mei 2017.

Kunjungan ketiga dilakukan di rumah klien di jalan Anak Gowa dengan hasil pemeriksaan bahwa keadaan ibu baik, kesadaran kompusmentis, berat badan ibu 78 kg, dengan keluhan sakit kepala yang dirasakan sudah berkurang dan pusing yang dirasakan sudah hilang, kembali melakukan aktivitas seperti biasa namun tidak melakukan aktivitas berat dan tidurnya pada malam hari sudah nyenyak

meskipun masih merasakan sakit kepala. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 140/90 mmHg, Nadi 88x/menit, Pernafasan 20x/menit, Suhu 36,7°C.

Saat dilakukan pemeriksaan fisik terfokus didapatkan tidak terjadi oedema pada wajah, konjungtiva merah muda dan sclera putih pada mata dan pembesaran perut sesuai masa kehamilan dengan didapatkan hasil TFU 2 jrbpx, 34 cm, teraba bokong dengan usia kehamilan 36 minggu 6 hari (36-38 minggu), presentasi kepala, punggung kiri dan bergerak diatas panggul. Denyut jantung janin terdengar kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 144x/menit secara teratur dan oedema pada kedua kaki.

Kunjungan keempat dilakukan di rumah klien, hasil pemeriksaan kondisi umum klien baik, kesadaran komposmentis, berat badan 78 kg dengan keluhan Ibu mengatakan sudah tidak merasakan sakit kepala dan pusing lagi, sudah merasakan nyeri perut tembus belakang sejak pukul 10.00 wita, belum ada pengeluaran lendir dan darah dan belum ada pengeluaran air. Pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil Tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 84x/ menit, Pernafasan 20x/menit, Suhu 36, 6°C.

Pada pemeriksaan fisik terfokus tidak terjadi oedema pada wajah, konjungtiva merah muda dan sclera putih pada mata, pembesaran perut sesuai usia kehamilan dengan TFU 3 jrbpx, 31 cm, teraba bokong, dengan gestasi 38 minggu (38-40 minggu), presentasi kepala, punggung kiri dan bergerak di dalam panggul dengan denyut jantung janin terdengar kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit secara teratur dan masih terdapat oedema pada kedua kaki.

Preeklamsia adalah timbulnya hipertensi,proteinuria dan oedema setelah umur kehamilan 20 minggu. Diagnosa preeklamsia adalah apabila tekanan darah

sistolik dan diastolik $\geq 140/90$ mmHg dan proteinuria kualitatif 1 sampai kualitatif 2 (Poon, Nicolaidis. 2014: 10).

Adapun tanda dan gejala preeklamsia ringan menurut teori tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan $\leq 160/110$ mmHg, pemeriksaan tes celup urin dengan Proteinuria menunjukkan ≥ 300 mg/24 jam atau +1, kenaikan berat badan 1kg dalam seminggu, bengkak pada wajah atau tungkai sedangkan gejala yang sering timbul yaitu sakit kepala, pusing, serta penglihatan kabur atau berkunang-kunang (Purwoastuti 2015).

Sedangkan pada kasus Ny”S” setelah dilakukan pengumpulan data dan pemeriksaan didapatkan keluhan berupa ibu merasa sakit kepala dan mengeluh pusing dan pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/100 mmHg, proteinuria +1 dan terdapat oedema pada kedua kaki.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus preeklamsia ringan pada masa kehamilan, sehingga saya tidak ada hambatan yang berarti karena pada saat pengumpulan data data baik klien maupun keluarga dalam hal ini ibu selalu terbuka untuk memberikan informasi sesuai dengan data yang diperlukan yang berhubungan dengan keadaan ibu sehingga mempermudah dalam mengumpulkan data. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Langkah kedua dilakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik (Nurhayati, Aprina. 2013).

Hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis terjadi preeklamsia ringan pada kasus Ny”S”. ibu datang dengan

keluhan sakit kepala, sering pusing dan pembengkakan pada kedua kaki. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa kasus preeklamsia ringan ditandai dengan tanda dan gejala sakit kepala, sering pusing dan pembengkakan pada kedua kaki. Berdasarkan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan pada Ny”S” ditemukan hasil bahwa tekanan darah ibu 150/100 mmHg serta pembengkakan pada kedua kaki dan pemeriksaan laboratorium ditemukan bahwa proteinuria +1.

Adapun diagnosa/masalah aktual yang diidentifikasi pada Ny”S” yaitu G4P3A0, gestasi 34 minggu 4 hari (34-36 minggu), situs memanjang dengan punggung kiri, presentasi kepala, tunggal, hidup, intrauterine, kepala, BAP, keadaan janin baik, ibu dengan preeklamsia ringan dengan tekanan darah 150/100 mmHg, proteinuria +1 dan pembengkakan pada kedua kaki. Diagnosa pada Ny”S” didasarkan atas data subjektif dan objektif yang didapat dari hasil pengkajian dan analisa secara teoritis.

Berdasarkan uraian data diatas masalah aktual adalah preeklamsia ringan. Preeklamsia dalam kehamilan ialah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, oedema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini biasanya timbul pada trimester III kehamilan tetapi dapat juga timbul sebelumnya (Marmi dkk, 2012 : 66). Sedangkan preeklamsi ringan dalam kehamilan ditandai dengan kenaikan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan $\leq 160/110$ mmHg, pemeriksaan tes celup urin dengan, proteinuria menunjukkan ≥ 300 mg/24 jam atau +1, kenaikan berat badan 1kg dalam seminggu, bengkak pada wajah atau tungkai (Nugroho, Taufan, 2012: 05).

Pada anamnesa akan didapatkan keluhan sering pusing, sakit kepala dan pembengkakan pada kedua kaki. Pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosa preeklamsia ringan diantaranya anamnesa, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat keluarga, riwayat kehamilan dan persalinan yang

lalu, pemeriksaan fisik, meliputi tanda-tanda preeklamsia ringan, serta yang mendasari penyakit-penyakit tertentu penyebab anemia, pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan proteinuria.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengkajian tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu ibu mengalami preeklamsia ringan dengan tekanan darah 150/100 mmHg, proteinuria +1 dan pembengkakan pada kedua kaki. Dengan demikian secara garis besar tampak adanya persamaan antara teori dan tidak ada kesenjangan dengan diagnosa aktual yang ditegakkan sehingga memudahkan memberikan tindakan selanjutnya.

Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Manguji Betty, 2013). Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Dalam tinjauan pustaka tekanan darah yang normal ibu hamil yaitu tekanan darah $\leq 140/90$ mmHg, tidak terdapat proteinuria pada saat pemeriksaan laboratorium dan tidak terdapat oedema pada kedua kaki atau wajah. Diagnosa preeklamsia ringan apabila tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dan $\leq 160/110$ mmHg, pemeriksaan tes celup urin dengan proteinuria menunjukkan ≥ 300 mg/24 jam atau +1, kenaikan berat badan 1kg dalam seminggu, bengkak pada wajah atau tungkai.

Dampak preeklamsia pada ibu hamil dengan usia kehamilan diatas 20 minggu (Trimester III) atau sebelumnya dapat terjadi kelahiran prematur, resiko terjadinya

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), abrupsi plasenta, resiko terjadinya kematian bayi (Bothamley, Boyle, 2013: 194).

Penyebab terjadinya kelahiran prematur pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia karena pada daerah arteri spiralis yang memiliki resistensi vaskular disebabkan oleh karena kegagalan invasi trofoblas ke arteri spiralis pada tahap kedua. Akibatnya, terjadi gangguan aliran darah di daerah intervili yang menyebabkan penurunan perfusi daerah ke plasenta. Hal ini dapat menimbulkan iskemik dan hipoksia di plasenta yang berakibat terganggunya pertumbuhan bayi intrauteri (IUGR) hingga kematian bayi.

Dampak fisiologi dan patologi bisa terjadi pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia ringan diantaranya perubahan pada plasenta dan uterus yaitu menurunnya aliran darah ke plasenta yang mengakibatkan gangguan fungsi plasenta. Pada hipertensi yang agak lama, pertumbuhan janin dapat terganggu. Sedangkan pada hipertensi yang lebih pendek bisa terjadi gawat janin sampai kematian janin karena kekurangan oksigen. Sedangkan tonus uterus dan kepekaan terhadap rangsangan pada preeklamsia dan eklamsia mudah terjadi persalinan prematur (N.R, Kun Ika. 2012: 3: 2).

Preeklamsia seringkali menyebabkan terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan menyebabkan persalinan prematur. Kejadian preeklamsia akan mendorong terjadinya disfungsi pada plasenta maupun pada uterus sehingga dapat mendorong terjadinya persalinan prematur. Selain itu, diet pada ibu hamil yang menderita preeklamsia akan menurunkan jumlah konsumsi makanan akibatnya asupan nutrisi ke janin akan berkurang. Kombinasi antara menurunnya fungsi uterus dan penurunan jumlah konsumsi nutrisi inilah yang memicu terjadinya kelahiran prematur, terjadinya BBLR, abrupsi plasenta bahkan terjadinya kematian janin (N.R, Kun Ika. 2012: 3: 2).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian Ny "S" tidak ada kesenjangan masalah potensial antara teori dengan yang ditemukan pada kasus Ny" S".

Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi

Tindakan segera dan kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya, Dalam kasus ini, tidak ada indikasi yang mengharuskan ibu untuk diberikan tindakan segera, terkecuali ketika ibu datang dengan keadaan syok, tidak sadarkan diri atau pingsan maka dapat dilakukan tindakan segera untuk pemasangan oksigen.

Kunjungan pertama tanggal 04 Mei 2017 sampai kunjungan keempat tanggal 27 Mei 2017 yang dilakukan pada kasus Ny"S" didapatkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, pada saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada tanggal 04 Mei 2017 didapatkan hasil bahwa ibu mengalami preeklamsia ringan dengan tekanan darah 150/100 mmHg, proteinuria +1, terdapat pembengkakan pada kedua kaki, ibu mengeluh sakit kepala dan sering pusing. Sedangkan pada pemeriksaan tanggal 27 Mei 2017 didapatkan hasil tekanan darah 130/90 mmHg, bengkak pada kedua kaki masih ada dan ibu sudah tidak merasakan sakit kepala dan pusing lagi.

Berdasarkan tinjauan teori yang dijelaskan menurut (Pudiasuti, R, D, 2012: 165), pada kasus preeklamsia ringan cukup melakukan rawat jalan selama 2 minggu berturut-turut, namun jika selama kunjungan preeklamsia ringan tidak mengalami perubahan baik dari tekanan darah, pembengkakan pada kaki ataupun proteinuria tidak berubah atau terdapat tanda atau gejala dari preeklamsia berat maka pasien harus dilakukan rawat inap selama 1 minggu. Namun jika keadaan

pasien mengalami perubahan maka tetap melakukan kunjungan antenatal dan tetap memantau keadaan ibu dan keadaan janin.

Apabila preeklamsia ringan berubah menjadi preeklamsia berat yang ditandai dengan tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg, pembengkakan pada wajah dan tungkai serta proteinuria $\geq +2$, nyeri epigastrium, pandangan kabur, perubahan kesadaran dan nyeri kepala maka akan dilakukan rawat inap dan segera melakukan tindakan emergency yaitu segera masuk rumah sakit, tirah baring kiri, segera memasang cairan infus cairan dextrose 5% dimana setiap 1 liter diselingi dengan cairan infus RL (60-125cc/jam) 500cc, dan pemberian anti kejang/anti konvulsan magnesium sulfat ($MgSO_4$) sebagai pencegahan terjadinya kejang ataupun kejang yang berulang (Marmi, dkk, 2014: 75).

Namun pada pasien Ny”S” tidak diberikan tindakan segera karena tekanan darah masih dalam batas preeklamsia ringan dan tidak ada tanda-tanda terjadinya preeklamsia berat maka dianjurkan untuk melakukan kunjungan antenatal setiap minggu untuk mengatasi preeklamsia ringan yang dialaminya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pasien Ny”S” bahwa ibu telah melakukan kunjungan antenatal selama 2 minggu berturut-turut dan dilanjutkan dengan kunjungan rumah dengan memantau tekanan darah, berat badan, pembengkakan pada kaki dan keadaan janin. Jadi pada keadaan Ny”S” tidak memerlukan tindakan segera atau kolaborasi karena keadaan ibu sudah berubah sejak kunjungan kedua.

Langkah V: Rencana Asuhan

Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen kebidanan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Suatu rencana tindakan harus disetujui pasien dan bidan agar menjadi efektif. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan

alasan yang benar berlandaskan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, serta telah divalidasi dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan yang berisi sasaran/target dan hasil yang akan dicapai dalam penerapan asuhan kebidanan pada Ny "S" dengan preeklamsia ringan pada masa kehamilan.

Penatalaksanaan preeklamsia ringan secara umum melakukan rawat jalan dan cukup menganjurkan pasien melakukan kunjungan antenatal setiap minggu. Namun jika perawatan jalan tidak mengalami perubahan maka akan dilakukan rawat inap dengan kriteria bahwa setelah 2 minggu pengobatan rawat jalan tidak mengalami perubahan, kenaikan berat badan ibu 1 kg atau lebih per minggu selama 2 minggu berturut-turut, ataupun timbul salah satu atau lebih gejala preeklamsia berat.

Bila setelah 1 minggu menjalani perawatan namun tidak mengalami perubahan maka preeklamsia ringan dianggap menjadi preeklamsia berat. Bila dalam perawatan sudah ada perbaikan sebelum 1 minggu dan kehamilan masih preterm maka penderita tetap dirawat selama 2 hari lagi baru dipulangkan. Perawatan akan berlanjut dengan rawat jalan.

Pada masa kehamilan dilakukan kunjungan setiap dua minggu setelah pemeriksaan awal, berdasarkan kasus yang dialami klien pada rencana asuhan dilakukan kunjungan rumah untuk memastikan bahwa ibu betul-betul mengerti dengan apa yang dianjurkan pada pemberian asuhan. Ada beberapa tujuan kunjungan ulang kehamilan seperti mendeteksi komplikasi-komplikasi, mempersiapkan kelahiran, pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan, pemeriksaan fisik yang difokuskan pada pendeteksian komplikasi. Jadwal kunjungan ulang sebaiknya sampai dengan 28 minggu usia kehamilan

setiap 4 minggu, antara 28-36 minggu usia kehamilan setiap 2 minggu, antara 36 minggu sampai kelahiran setiap minggu (Kusmiyati, 2012).

Berdasarkan anamnesa yang telah dilakukan pada Ny”S” didapatkan hasil pada kunjungan pertama dengan keluhan sakit kepala, sering pusing serta pembengkakan pada kaki, dan pada pemeriksaan fisik terfokus yang dilakukan didapatkan hasil tekanan darah 150/100 mmHg, tampak pembengkakan pada kedua kaki, pembesaran perut sesuai usia kehamilan dengan Tinggi Fundus Uteri (TFU) 1 jrbpx, 35 cm, teraba bokong, presentase kepala, punggung kiri, intrauterine, tunggal ditandai dengan terdengar denyut jantung janin di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 141x/menit secara teratur dengan keadaan janin baik dan ibu dengan keadaan preeklamsia ringan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa proteinuria +1.

Pada kunjungan kedua dengan hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, pusing yang sering dirasakan sudah berkurang dan sakit kepala masih sering dirasakan. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 86x/ menit, pernafasan 19x/ menit, suhu 36,8°C, berat badan 78 kg, dengan pemeriksaan fisik terfokus pada wajah tidak terjadi pembengkakan, terdapat pembengkakan pada kedua kaki. Pada pemeriksaan abdomen, pembesaran perut sesuai usia kehamilan dengan TFU 1 jrbpx, 36 cm sesuai dengan usi kehamilan 35 minggu 5 hari (34-36 minggu) dengan presentase kepala, punggung kiri dan denyut jantung janin masih terdengar jelas dan kuat dengan frekuensi 140x/menit secara teratur.

Pada kunjungan ketiga dengan hasil pemeriksaan keadaan ibu baik, kesadaran komposmentis, sakit kepala yang dirasakan sudah berkurang, pusing yang dirasakannya sudah hilang. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 88x/ menit, pernafasan

20x/menit, suhu 36,7°C. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terfokus didapatkan hasil tidak terjadi oedema pada wajah, pembengkakan pada kaki masih ada, tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan dengan TFU 2 jrbpx, 34 cm dengan usia kehamilan 36 minggu 6 hari (36-38 minggu), teraba bokong pada fundus, presentasi kepala dengan posisi janin punggung kiri. Denyut jantung janin terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 144x/menit secara teratur.

Kunjungan keempat dengan hasil pemeriksaan keadaan ibu baik, kesadaran komposmentis dengan keluhan sakit kepala dan pusing sudah tidak dirasakannya lagi, ibu mengeluh nyeri perut tembus belakang sejak pukul 10.00 wita, dan belum ada pengeluaran lendir, darah dan air ketuban. Pada saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 84x/ menit, pernafasan 20x/menit, suhu 36, 6°C, berat badan 78 kg, tidak ada oedema pada wajah, oedema pada kedua kaki, pembesaran perut sesuai usia kehamilan dengan TFU 3 jrbpx, 31 cm, janin sudah masuk pintu atas panggul dengan usia kehamilan 38 minggu (38-40 minggu), teraba bokong pada bagian fundus, punggung kanan dan presentasi kepala. Pada pemeriksaan denyut jantung janin terdengar jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit secara teratur.

Rencana asuhan tindakan pada Ny”S” dengan kasus preeklamsia ringan dilakukan dengan menentukan tujuan asuhan yang akan diberikan. Tujuan penatalaksanaan tersebut yaitu agar dapat dilakukannya rencana asuhan kepada ibu agar kehamilan dapat berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik, dan preeklamsia ringan yang dialami dapat teratasi. Adapun kriteria keberhasilan rencana asuhan yang akan diberikan yaitu, kehamilan aterm (37-42 minggu), keadaan ibu baik, tanda-tanda vital normal, djj dalam batas normal, tidak ada

tanda bahaya pada kehamilan, keadaan janin baik, peningkatan berat badan dalam batas normal, albumin dan oedema negatif, keluhan ibu yaitu pusing dan sakit kepala berkuranga atau hilang.

Berdasarkan uraian diatas, rencana tindakan yang disusun berdasarkan tujuan yang sesuai kebutuhan pasien pada Ny”S” dengan kasus preeklamsia ringan pada masa kehamilan yaitu, dilakukan kunjungan untuk evaluasi setelah diberikan terapi rawat jalan dan pemberian obat nefedifin, memberitahu hasil pemeriksaan, pendidikan kesehatan tentang makanan yang bergizi, personal hygiene dan istirahat yang cukup, mendiskusikan tentang tanda bahaya kehamilan, mendiskusikan tentang komplikasi yang dapat terjadi pada kehamilan, mendiskusikan tentang tanda-tanda preeklamsia berat, mendiskusikan tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya. Rencana asuhan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dengan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

Langkah VI: Implementasi

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan (Mangkuji dkk, 2013).

Pada kasus ini Ny”S”, 41 tahun dengan diagnose preeklamsia ringan pada masa kehamilan. Pada kasus ini, diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaang penunjang. Penatalaksanaan asuhan pada studi kasus Ny”S” dengan preeklamsia ringan, semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik dan tidak menemukan

hambatan yang berat karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga yang kooperatif serta sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tindakan di RSUD Syekh Yusuf. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi (Mangkuji, 2013).

Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan adalah sebagai berikut. Pada pelaksanaan evaluasi tanggal 04 Mei 2017-27 Mei 2017 pada Ny”S” yaitu kehamilan berlangsung normal ditandai dengan keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tekanan darah dari 150/100 mmHg menurun menjadi 130/90 mmHg, pembesaran perut sesuai usia kehamilan dan detak jantung janin dalam batas normal. Pusing, sakit kepala, dan pembengkakan pada kedua kaki berkurang. Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang telah di berikan pada Ny”S” berhasil dengan melihat perubahan yang telah dirasakan ibu baik dari keluhan, tekanan darah, oedema pada kaki dan kehamilan berlangsung normal.

Pendokumentasian Asuhan kebidanan

Pendokumentasian pada kasus Ny”S” ini dimulai pada kontak pertama pada kunjungan antenatal di POLI KIA Rumah sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa pada tanggal 04 Mei 2017. Telah dilakukan pengumpulan data subjektif dan objektif dan berdasarkan data ditetapkan diagnosa . Berdasarkan diagnosa tersebut,

ditentukan diagnose potensial yang akan timbul. Pada kasus Ny”S” tidak didapatkan adanya data untuk tindakan emergensi. Pada kasus Ny”S”, implementasi telah dilakukan berdasarkan semua intervensi yang telah ditetapkan.

Intervensi dilakukan mulai dari kunjungan pertama dan dilanjutkan 3 kontak berikutnya. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya Preeklamsia Berat. Evaluasi dilakukan pada kontak keempat, keluhan yang sering dirasakan telah menghilang dan tekanan darah menurun, pembengkakan pada kaki juga berubah dan akan menghilang setelah beberapa minggu pasca persalinan.



BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui kasus Ny “S” dengan preeklamsia ringan umur kehamilan 38-40 minggu di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tanggal 4 Mei- 27 mei 2017, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. KESIMPULAN

1. Pengumpulan data dasar pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan pada masa kehamilan seperti tekanan darah sebelum dan setelah hamil, pembengkakan pada kaki atau wajah sejak kapan dan pemeriksaan proteinuria di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
2. Perumusan diagnosa/ masalah aktual pada Ny”S” di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan pengumpulan data seperti data tekanan darah, pemeriksaan fisik (oedema pada kaki atau wajah), dan pemeriksaan proteiuria sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada Ny “S” dengan preeklamsia ringan pada masa kehamilan.
3. Perumusan diagnosa/ masalah potensial pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 yaitu mengantisipasi terjadinya Preeklamsia Berat bahkan Eklamsia yang bisa terjadi pada Ibu dan mengantisipasi terjadinya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), gawat janin, bahkan kematian yang bisa terjadi pada janin, namun semua masalah potensial tidak akan terjadi apabila penanganan yang tepat dan cepat.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh

Yusuf Gowa tahun 2017 dengan hasil bahwa pada kasus ini tidak dilakukan tindakan kolaborasi karena tidak adanya indikasi dan data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan tersebut.

5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017, dengan hasil merencanakan asuhan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah direncanakan pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny”S” dengan preeklamsia ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai perubahan tekanan darah dari 150/100 mmHg menjadi 130/90 mmHg dan proteinuria yang awalnya +1 dan akhirnya berubah menjadi Negatif (-) dan oedema belum hilang namun sudah berkurang dan akan menghilang setelah beberapa minggu setelah persalinan

B. SARAN

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus peneliti memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

1. Untuk klien
 - a. Menganjurkan kepada ibu agar mengkomsumsi makanan yang bergizi dan diet makanan tinggi protein, tinggi lemak dan konsumsi garam jangan dikurangi.

- b. Mengajukan agar setiap ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara dini dan teratur serta dapat mengenal tanda-tanda bahaya dalam kehamilan.
- c. Mengerti dan Melaksanakan setiap anjuran dan pendidikan kesehatan yang diberikan.

2. Untuk bidan

- a. Dalam melakukan tugas sebagai bidan untuk memberikan tindakan perlu diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien dan harus dengan persetujuan klien.
- b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang baik antara klien ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
- c. Profesi bidan harus mampu mengambil suatu keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan merujuk sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi.

3. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan tenaga kesehatan yang berpotensi dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia Menurut WHO Tahun 2014..(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50561/Chapter%20I.pdf?sequence=5> . Diakses tanggal 01 mei 2017 jam 18.00 wita)
- Bothamley, J., Boyle,M. 2013. *Patofisiologi Dalam Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- Bartini, Istri. 2012. *ANC : Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil Normal (ASKEB 1) Dilengkapi Panduan Praktikum dan Senam Hamil*. Yogyakarta. Nuha Medika
- Jannah, Nurul. 2012. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan: Kehamilan*. Yogyakarta. C.V ANDI OFFSET.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2013
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia: *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Jakarta: 2013.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.*Profil Kesehatan Indonesia*. 2015
- Kusmiyati, Y. *Perawatan Ibu Hamil*. Yogyakarta: Fitramaya. 2012
- Marmi, dkk. 2014. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Manguji Betty. 2013. *Asuhan Kebidanan Tujuh Langkah Varney*. Jakarta. EGC.
- N.R, Kun Ika. 2012. "Hubungan antara BBLR, Kelahiran Prematur dan Kematian Janin Dengan Terjadinya Preeklamsia Ringandi RSUD Gambiran kota Kediri". Jurnal Ilmiah Perawatan STIKES Hang Tuah Surabaya Volume 3 Nomor 2.
- Nugroho, Taufan. 2012. *Patologi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nurhayati, Aprina. 2013. *Konsep kebidanan*. Jakarta. Penerbit salemba medika.
- Pudiasuti, R, D. 2012. *Asuhan Kebidanan Pada Hamil Normal dan Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Prawirohardjo, S. 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Edisi Keempat.

- Pernoll, L.M., Benson, C, R. 2013. *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta. EGC.Edisi 9.
- Poon, Leona C. NicolaidesKypros H. 2014.*Early Prediction of Preeclampsia*.Hindawi Publishing Corporation Obstetrics and Gynecology International.Volume 10.
- Purwoastuti, Endang. 2015. *Ilmu Obstetri Dan Ginekologi Sosial bagi Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2014/27_Sulawesi_Selatan_2014.pdf.
- Rahayuti, M, N., Husniawati, N. 2013. “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Preeklamsia Pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur*”.Jurnal Ilmiah Kesehatan.Vol 5.No. 3.
- Sukarni, Icesmi,. ZH, Margareth. 2013. *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2013.
- SDKI (*Survey Demografi Kesehatan Indonesia*). 2012. *Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia*.www.Depkes.co.idDiakses pada tanggal 28 maret 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kesorasian Al-qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati,2002.
- Yogi, dkk.2014.*Hubungan Antara Usia Dengan Preeklamsia Pada Ibu Hamil Di POLI KIA RSUD Kefamenanu kabupaten Timur Tengah Utara*. Jurnal Delima Harapan. Vol 3.No. 2.
- Yulia, Fauziyah. 2012. *Obstetri, Patologi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*.Yogyakarta :Nuha Medika.

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

1. Nama : Esi Ismala Nengsi
2. NIM : 70400114018
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba 23 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Villa Samata Sejahtera
7. Nama orang tua
 - a. Ayah : Jusman
 - b. Ibu : Syamsiah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD : SD Negeri 125 Salibang Tahun 2008
2. Tamat SMP : SMP Negeri 2 Herlang Tahun 2011
3. Tamat SMA : SMA Negeri 6 Bulukumba Tahun 2014
4. Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar Jurusan Kebidanan