

**PENGARUH PEMBERIAN *Moringa oleifera* MULTINUTRIENT BLOCK
TERHADAP KUALITAS SEMEN SEGAR SAPI BALI**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Peternakan (S.Pt)
Pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar*

Oleh:

HASTUTI
60700113010

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hastuti
NIM : 60700113010
Tempat/Tgl. Lahir : Cabiri, 18 Desember 1995
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Dg. Kuling No 9, Lorong II, Parantambung-Makassar
Judul : Pengaruh Pemberian *Moringa oleifera* Multinutrient Block terhadap Kualitas Semen Segar Sapi Bali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2017

Penyusun,

HASTUTI

NIM: 60700113010

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi saudara **HASTUTI**, NIM: 60700113010 mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Pengaruh Pemberian *Moringa oleifera* Multinutrient Block terhadap Kualitas Semen Segar Sapi Bali**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Makassar, Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ir. H. Abd. Latief Toleng, M.Sc.
NIP. 19540602 197802 1 001



Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Dr. Ir. H. Mah. Basir Paly, M.Si.
NIP. 19590712 1986 031 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Pemberian *Moringa oleifera* Multinutrient Block terhadap Kualitas Semen Segar Sapi Bali”, yang disusun oleh **HASTUTI, NIM: 60700113010**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 03 November 2017, bertepatan dengan Shafar 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, November 2017
Shafar 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Astati, S.Pt., M.Si. (.....)

Munaqisy I : Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. (.....)

Munaqisy II : Dr. M. Thahir Malloko, M.Hi. (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. H. Abd. Latif Toleng, M.Sc. (.....)

Pembimbing II: Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P. (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian *Moringa oleifera* Multinutrient Block terhadap Kualitas Semen Segar Sapi Bali”, yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insya Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, do’a, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do’a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ibunda Tuni, dan Saudaraku tercinta Hartina, Rudi, Tamsar dan Robin, yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muh. Basir Paly, M.Si. sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abd. Latief Toleng, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing pertama, dan Ibu Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P. selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. dan Bapak Dr. M. Thahir Malloko, M.Hi. selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Angkatan 2013: yang terkhusus kelas A Ilmu peternakan yang terus memberi dukungan. Teristimewa kepada senior-senior Muh. Arsan Jamili, S.Pt., Asrul S.Pt., Muhammad Nur S.Pt., Hasrin

S.Pt., Muhlis S.Pt., Safaruddin dan Imran Yambas dan adinda Mansyur dan Rustan yang banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis dikala suka maupun duka.

8. Sahabat-sahabatku, Nurmiani Syam, Nuralfianti, Nurfaila Sakir, Ervina Sulfana, Hasrawati S.Pt., Jumriani Ibrahim S.Pt., dan Rika Nurfiana S.Pt., yang tidak ada henti-hentinya memberikan masukan, saran serta solusi yang ada selama penulis menyelesaikan skripsinya.
9. Serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsi baik itu waktu sertapemikirannya dalam pelaksanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini, terimakasih kasih sebanyak-banyaknya.

Penulis berharap adanya masukan dan saran yang positif demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan khususnya masalah Reproduksi Sapi Bali. Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah swt. Amin.

Wassalamu AlaikumWr. Wb

Makassar, November 2017

HASTUTI
NIM: 60700113010

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
GAMBAR GRAFIK	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Hipotesis	3
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	4
F. Penelitian Terdahulu.....	4
G. Defenisi Operasional	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ternak Sapi	6
B. Reproduksi Sapi	9
C. Spermatogenesis.....	10
D. Daun Kelor (<i>Moringa oleifera</i>).....	23
E. Pengaruh Daun Kelor untuk Reproduksi	27
F. Multinutrient Block	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
B. Alat dan Bahan	36
C. Kandang Penelitian	39
D. Metode Penelitian	39
E. Parameter yang Diukur	41
F. Analisis Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Makroskopis.....	45
B. Uji Kualitas Mikroskopis.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	55
----------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kandungan Daun Kelor Per 100 g	25
2. Fungsi dari Berbagai Vitamin Selama Spermatogenesis	29
3. Fungsi Seng Selama Fase Berbeda dari Spermatogenesis	31
4. Komposisi Pakan Konsentrat Penelitian	37
5. Hasil Analisis Proximat Pakan Konsentrat yang Digunakan pada 2 Perlakuan	38
6. Komposisi Pakan <i>Moringa oleifera</i> Multinutrient Block	38
7. Kebutuhan Bahan Pakan <i>Moringa oleifera</i> Multinutrient Block Ternak Per Ekor/Hari	38
8. Hasil Analisis Proximat Daun Kelor (<i>Moringa oleifera</i>) yang Digunakan pada Penelitian	39
9. Pengamatan Uji Makroskopis Sebelum dan Setelah Pemberian Block	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Proses Spermatogenesis	12
2. Daun Kelor	24
3. Penimbangan Molasses	65
4. Pelarutan Garam dan urea	65
5. Pencampuran Konsentrat	65
6. Pengambilan Daun Kelor (Memisahkan dari Rantingnya)	66
7. Pengeringan Daun Kelor	66
8. Penggilingan Daun Kelor Menjadi Tepung Daun Kelor	67
9. Melarutkan Bahan-Bahan Pelengkap untuk Membuat <i>Moringa oleifera</i> Multinutrient Block	67
10. Pencampuran Semua Bahan Pembuatan <i>Moringa oleifera</i> Multinutrient Block	68
11. Pengepresan atau Pembuatan <i>Moringa oleifera</i> Multinutrient Block	68
12. Proses Penampungan Semen	69
13. Waterbath	70
14. Komputer Menganalisis Samper	70

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Motilitas Individu Spermatozoa pada Semen Sapi Bali Sebelum dan Setelah Pemberian <i>Moringa oleifera</i> Multinuatrient Block	49
2. Gerak Progresif Semen Sapi Bali Sebelum dan Setelah Pemberian <i>Moringa oleifera</i> Multinutrient Block	52



ABSTRAK

Nama : Hastuti
NIM : 60700113010
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Pengaruh Pemberian *Moringa oleifera* Multinutrient Block terhadap Kualitas Semen Segar Sapi Bali

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block terhadap kualitas semen segar sapi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juli tahun 2017. Tempat penelitian berada di Samata *Integrated Farming System* (SIFS). Metode penelitian terdiri dari kontrol (P₁), dan perlakuan (P₂). Penelitian ini menggunakan 5 ekor sapi bali. Data yang diperoleh dianalisis dengan Uji T (Paired t- Test Sample). Dari data hasil analisis motilitas individu spermatozoa menunjukkan bahwa rata-rata 38.20% dan 28.67% (P₁) dan (P₂) menunjukkan rata-rata 69.48% dan 8.98%. Sedangkan data hasil analisis progresivitas spermatozoa menunjukkan rata-rata 27.00% dan 21.80% (P₁) dan (P₂) menunjukkan rata-rata 52.48% dan 8.96%. Disimpulkan bahwa pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block secara nyata meningkatkan kualitas motilitas dan progresifitas semen segar sapi Bali.

Kata Kunci : Sapi Bali, Spermatozoa, dan *Moringa oleifera* multrinutrient block

ABSTRACT

Name : Hastuti
NIM : 60700113010
Major : Ilmu Peternakan
Title : **The Effect of *Moringa oleifera* Multinutrient Block on the Quality of Balinese Cattle Fresh Sperm**

The aim of this study is to determine the effect of *Moringa oleifera* multinutrient block on the quality of the fresh sperm. This research conducted on May - July 2017. The research place is at Samata Integrated Farming System (SIFS). The research method consisted of control (P₁), and treatment (P₂). This research used 5 cows as the samples. The data obtained were analyzed by T-test (Paired t-Test Sample). The result analysis of spermatozoa individual motility showed that average 38.20% and 28.67% (P₁). Then (P₂) showed average 69.48% and 8.98%. While the data of spermatozoa progressivity analysis showed that average 27.00% and 21.80% (P₁) and (P₂) showed mean 52.48% and 8.96%. It is concluded that *Moringa oleifera* multinutrient block significantly improved the quality of fresh cement of Balinese cattle.

Key words : Balinese cattle, Spermatozoa, and *Moringa oleifera* multinutrient block

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sapi Bali merupakan salah satu jenis ternak asli Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dan memiliki karakteristik yang khas dan nilai ekonomis yang tinggi. Sapi Bali mempunyai kelebihan antara lain daya tahannya terhadap kondisi lingkungan dan mampu memanfaatkan hijauan yang bermutu rendah dan memiliki tingkat fertilitas yang tinggi, selain kelebihan sapi Bali juga mempunyai kekurangan antara lain pertumbuhannya lambat dan peka terhadap penyakit (Murtijo B.A., 1990).

Kondisi peternakan sapi potong di Indonesia saat ini masih mengalami kekurangan populasi ternak, karena penambahan populasi tidak seimbang dengan kebutuhan nasional (Putu, *dkk.*, 1997). Kebutuhan daging sapi potong secara nasional setiap tahun terjadi peningkatan, akan membawa dampak negatif terhadap kemampuan produksi dan perkembangan populasinya. Kemampuan produksi daging sapi potong per tahun mencapai 290,56 ribu ton, sementara kebutuhan daging sapi mencapai 410,9 ribu ton dengan tingkat konsumsi sebesar 1,84 kg/ kapita/ tahun (Direktorat Jendral Peternakan, 2013).

Rendahnya populasi sapi merupakan salah satu faktor penyebab volume produksi daging masih rendah. Pada umumnya, selama ini dinegara kita sebagian besar sapi potong yang dipelihara oleh peternak masih dalam skala kecil. Sugeng (2007) menyatakan bahwa Kebutuhan daging sapi secara nasional tidak dapat

mengimbangi permintaan kerana beberapa hal, salah satunya adalah rendahnya produktivitas ternak yang disebabkan oleh kualitas semen yang semakin rendah.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat reproduksi adalah rendahnya kualitas semen, baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk beku. Salah satu penyebab kualitas semen rendah adalah rendahnya kualitas pakan. Mathevon (1998) menyatakan bahwa kualitas pakan sangat mempengaruhi kualitas semen sapi potong. Oleh karena itu, pemberian pakan yang memiliki nilai nutrisi yang baik dan mampu meningkatkan produktivitas ternak meningkatkan kualitas semen.

Pakan yang memiliki nilai nutrisi yang seimbang dapat menunjang produktivitas ternak. Daun kelor merupakan tanaman tahunan yang memiliki kandungan nutrisi esensial yang seimbang, sehingga daun kelor memiliki harapan di masa mendatang sebagai sumber suplemen alternative pakan ternak. Pakan suplemen pada ternak dapat berupa pakan lengkap yang terdiri dari hijauan yang berkualitas (Supriadi, 2009).

Daun kelor mengandung mineral Zn sebesar 31.03 mg/kg (Moyo dkk., 2011) atau 0.6 mg/100g daun segar (Krisnadi, 2014). Berbagai penelitian telah dilakukan dengan memanfaatkan daun kelor sebagai bahan pakan dengan tujuan meningkatkan libido dan dan kualitas semen. Abu dkk., (2013) berhasil meningkatkan kualitas sperma epididimis kelinci pejantan. Hasil penelitian Andi Syarifuddin (2015) menunjukkan bahwa, suplementasi daun kelor secara signifikan meningkatkan libido dan motilitas sperma sapi Bali.

Kekurangan hijauan segar sebagai pakan ternak sudah lama dirasakan oleh peternak di Indonesia. Salah satu pakan alternative yang sangat berguna untuk tetap menggunakan materi tanaman dengan kualitas nutrisi yang tinggi sebagai pakan ternak di sepanjang waktu, tidak hanya untuk musim kemarau adalah menjadikan pakan dalam bentuk blok (Tillman, 2010). Hal inilah yang melatar belakangi penelitian tentang pengaruh pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block terhadap kualitas semen segar sapi Bali.

B. Rumusan Masalah

Kualitas semen sapi Bali rendah, khususnya semen segar (sebelum dibekukan). Salah satu penyebabnya adalah kualitas nutrisi rendah. Pemberian daun kelor juga dapat meningkatkan kualitas semen sapi Bali. Namun pemberian daun kelor segar mempunyai sejumlah kelemahan, antara lain tidak bisa disimpan lama. Penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block terhadap kualitas semen segar sapi Bali.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block terhadap kualitas semen segar sapi Bali.

D. Hipotesis

Pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block berpengaruh positif terhadap kualitas semen segar sapi Bali.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peternak dan peneliti tentang pengaruh pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block terhadap kualitas semen sapi Bali. Pakan daun kelor yang mempunyai kandungan nutrisi tinggi dapat meningkatkan performans reproduksi ternak pejantan, dengan demikian akan menghasilkan sapi pejantan unggul yang dapat digunakan baik sebagai pemacek maupun sebagai penghasil semen yang berkualitas untuk IB.

F. Penelitian Terdahulu

Jamili (2016), “Mengetahui Pengaruh Suplementasi Daun Kelor Terhadap Ukuran Lingkar Skrotum, Libido, dan Kualitas Semen Sapi Bali”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh daun kelor terhadap libido tidak berpengaruh pada tujuh periode awal penelitian ($P>0,05$), akan tetapi setelah periode tersebut (minggu 8-13) terdapat pengaruh yang sangat signifikan ($P>0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suplemen daun kelor dapat meningkatkan ukuran lingkar skrotum, libido, dan kualitas semen sapi Bali.

G. Defenisi Operasional

1. Sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia yang ciri-cirinya khas dan berbeda dari bangsa sapi lainnya.
2. Semen merupakan zat cair yang keluar dari tubuh melalui penis sewaktu kopulasi.
3. Semen segar adalah zat cair yang diperoleh dari ternak jantan yang langsung digunakan.

4. Daun Kelor adalah sejenis tumbuhan dari suku *Moringaceae*. Tumbuhan ini memiliki ketinggian batang 7-11 meter, daun kelor berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai, dapat dibuat sayur atau obat.
5. *Moringa oleifera* multinutrient block adalah daun kelor yang telah ditambahkan *molasses* dan dibuat dalam bentuk padat atau block.
6. Kualitas semen adalah mutu atau jumlah semen yang dihasilkan oleh ternak jantan dengan melalui pemeriksaan semen, baik secara makroskopis maupun mikroskopis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ternak Sapi

Sapi potong (pedaging) merupakan salah satu penghasil daging yang yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Ternak sapi potong sebagai salah satu sumber protein berupa daging, produktivitasnya masih sangat memperhatikan karena volumenya masih jauh dari target yang diperlukan konsumen (Sugeng, 2007).

Sapi sebagai hewan ruminansia, merupakan salah satu jenis hewan ternak yang banyak digemari oleh peternak. Dalam Ipteknet (2000) dijelaskan, sapi lebih banyak dipilih untuk ternak jika dibandingkan dengan kambing, domba, kuda, babi dan hewan ternak lainnya karena menghasilkan sekitar 45-55% kebutuhan daging dunia, 95% kebutuhan susu dan 85% kebutuhan kulit, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al- Mu'minun/23:21 sebagai berikut:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya :

“Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan” (Kementrian Agama, RI : 2012).

Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dijelaskan bahwa *Al-an'âm* yaitu binatang ternak diantaranya unta, sapi dan domba. Masing-masing ciptaan tersebut telah Allah bagi peran dan karakternya, dimana hal itu mengandung pelajaran bagi yang melihatnya dengan hati dan indra yang terbuka, serta mengambil hikmah dari ciptaan tersebut (Quthub, 1996). Bahkan Allah menjelaskan secara khusus tentang sapi di dalam Al-Qur'an dengan menjadikan surah tersendiri yaitu *Al-Baqarah* yang merupakan surah terpanjang diantara surah-surah lain di dalam Al-Qur'an. Surah *Al-Baqarah* itu sendiri menjelaskan tentang kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil. Hal yang lebih menjadikan surah *Al-Baqarah* sebagai *Fusthaatul Qur'an* (puncak Al-Qur'an), karena dalam surah ini memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah lain (DEPAG, 1989).

Sapi Bali adalah tipe sapi kecil dengan kemampuan reproduksi yang baik dan daya adaptasi yang sangat baik pada pemeliharaan intensif maupun ekstensif di padang penggembalaan (Talib dkk., 2002). Sapi Bali merupakan sapi yang paling banyak dipelihara pada peternakan kecil karena fertilitasnya baik dan angka kematian yang rendah (Purwantara dkk., 2012). Abidin (2002) juga menyatakan bahwa kemampuan reproduksi sapi bali merupakan yang terbaik diantara sapi-sapi lokal. Dibanding dengan sapi potong lokal lain, sapi bali mempunyai performans produksi yang lebih efisien, dengan angka kebuntingan dan angka kelahiran yang tinggi (80 %), penambahan bobot badan dengan pakan yang baik dapat mencapai 0,7 kg/hari (jantan dewasa) dan 0,6kg/hari (betina dewasa) (Pane, 1991).

Populasi sapi dan kerbau pada 1 Mei 2013 mencapai 14,2 juta ekor atau mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan hasil pendataan sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Populasi sapi dan kerbau hasil sensus ternak mencapai 16,7 juta ekor. Populasi mengalami penurunan pada tahun 2013 mencapai 2,5 juta ekor atau sekitar 15% bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2012 (Badan Pusat Statistika, 2013).

Kebutuhan daging sapi didalam negeri belum mampu dicukupi oleh peternak di Indonesia sebagai produsen lokal. Produksi daging sapi di Indonesia hingga tahun 2012 mencapai 485.330 ton, sedangkan populasi sapi potong di Indonesia hingga tahun 2012 hanya mencapai 14.824.370 ekor (Departemen Pertanian, 2012). Kondisi ini menyebabkan Indonesia melakukan impor daging sapi maupun ternak sapi, selain itu banyak terjadi pemotongan ternak produktif untuk memenuhi permintaan daging sapi, yang akhirnya dapat menyebabkan populasi ternak sapi makin menurun, oleh karena itu peningkatan populasi sapi potong perlu dilakukan (Yuliati, dkk., 2014).

Hardjosubroto (1994) mengemukakan bahwa produktivitas dan reproduksi ternak dipengaruhi oleh faktor genetik 30% dan lingkungan 70%. Kemampuan aktivitas reproduksi yang dicapai sapi potong muda dan dewasa memberikan hasil yang berbeda, untuk sapi dewasa lebih mempunyai kemampuan yang tinggi terhadap kualitas dan kuantitas semen.

B. Reproduksi Sapi

Reproduksi merupakan suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan, setiap individu organisme ada sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu seksual dan aseksual. Dalam reproduksi aseksual, suatu individu dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan individu lain dari spesies yang sama. Reproduksi seksual membutuhkan keterlibatan dua individu, dengan dari jenis kelamin yang berbeda (Heru, 2012).

Hardjosubroto (1994) mengemukakan bahwa produktivitas dan reproduksi ternak dipengaruhi oleh faktor genetik 30% dan lingkungan 70%. Kemampuan aktivitas reproduksi yang dicapai sapi potong muda dan dewasa memberikan hasil yang berbeda, untuk sapi dewasa lebih mempunyai kemampuan yang tinggi terhadap kualitas dan kuantitas semen.

Penurunan efisiensi reproduksi dipengaruhi juga oleh faktor manajemen perkawinan yang tidak sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekitarnya. Hal ini diindikasikan oleh terjadinya kawin berulang (*Repeat breeding*) pada induk sapi potong di tingkat peternakan rakyat sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kebuntingan dan panjangnya jarak beranak. Diperlukan suatu cara atau teknik reproduksi yang tepat berdasar pada potensi atau kehidupan sosial masyarakat pedesaan, yakni teknik pengamatan birahi setelah beranak, pemberian pakan yang cukup, pemanfaatan hormon reproduksi (Herdis, 2000).

C. Spermatogenesis

Menurut Isnaeni (2006), spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma (gamet jantan) yang terjadi dalam testis, tepatnya pada *Tubulus seminiferus*. Testis mamalia tersusun atas ratusan *Tubulus seminiferus*, yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembentukan sperma. Bagian yang terdekat dengan dinding *Tubulus seminiferus*, terdapat spermatogonia, yang merupakan sel diploid pembentuk sperma, yang belum terdiferensiasi. Tahapan pembentukan sperma (spermatogenesis) diawali dari pembentukan spermatogonium tipe A, spermatogonium 1n, spermatogonium tipe B, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan yang terakhir adalah spermatozoa.

Spermatozoa dibentuk didalam testis melalui proses yang disebut spermatogenesis, tetapi mengalami pematangan lebih lanjut di dalam epididimis dimana sperma disimpan sampai ejakulasi. Spermatozoa terbentuk di dalam tubuli seminiferi dari sel-sel induk spermatozoa yang diploid, terletak pada membran basalis. Spermatogenesis merupakan suatu proses kompleks yang meliputi pembelahan dan diferensiasi sel (Feradis, 2010).

Spermatozoa yang normal memiliki kepala, leher, badan dan ekor. Bagian depan dinding kepala (yang mengandung asam *Dioxyribonucleik*, di dalam *Kromosom*), tampak sekitar 2/3 bagian tertutup *Acrosom*. Tempat sambungan dasar *Acrosom* dan kepala disebut cincin *Nucleus*. Diantara kepala dan badan terdapat sambungan pendek, yaitu leher yang berisi *Centriole proximal*, yang kadang-kadang dinyatakan sebagai pusat genetik aktivitas spermatozoa. Bagian badan dimulai dari leher dan berlanjut ke cincin *Centriole*. Bagian badan dan ekor


mampu bergerak bebas, meskipun tanpa kepala. Ekor berupa cambuk, membantu mendorong *Spermatozoa* untuk bergerak maju (Salisbury, 1985).

Menurut Hardjopranjoto (1995), sel mani diproduksi oleh *Tubulus seminiferus* dari testis. Sel mani berkembang dari sel spermatogonia pada epitel germinatif dari *Tubulus seminiferus* dengan jalan pembelahan. Proses spermatogenesis pada hewan mamalia dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap proliferasi, tahap ini dimulai pada testis hewan sejak belum lahir sampai beberapa waktu setelah lahir. Bakat sel kelamin yang ada pada lapisan basal dari *Tubulus seminiferus* melepaskan diri dan membelah secara mitosis sampai dihasilkan banyak sel spermatogonia.

Semua proses spermatogenesis dikontrol oleh sistem *Endokrin* yaitu hormon *Gonadotropin* yang dihasilkan oleh kelenjar *Hipofosa anterior*, misalnya FSH (*Folicle stimulating hormone*) mendorong proses spermatogenesis pada hewan jantan. Hormon ICSH (*Interstitial cell stimulating hormone*) atau LH (*Luteinizing hormone*) dari kelenjar *Hipofosa anterior* mempengaruhi produksi hormon *Testosteron* oleh sel-sel *leydig* dari testis. Hormon *Testosteron* mempunyai fungsi mengatur kelakuan birahi hewan jantan, dan secara tidak langsung mendorong proses spermatogenesis bersama-sama dengan FSH. Hormon jantan juga mempengaruhi fungsi terhadap epididimis, *Ductus deferens*, dan produksi kelenjar asesoris (Hardjopranjoto, 1995).

Menurut Isnaeni (2006), pengeluaran FSH dirangsang oleh GnRH (*Gonadotropin Releasing Hormone*), yaitu hormon pelepas *Gonadotropin* dan *Hipotalamus*. *Gonadotropin* meliputi FSH dan LH. FSH merangsang sel

spermatogenik untuk membelah secara mitosis beberapa kali, dan diakhiri dengan pembelahan meiosis sehingga dihasilkan spermatid yang bersifat haploid. FSH juga merangsang sel sertoli untuk melepaskan zat tertentu yang dapat merangsang dimulainya Spermatogenesis (diferensiasi spermatid menjadi sperma). Sel sertoli juga dirangsang oleh *Testosteron* atau *Androgen* (hormon yang dikeluarkan oleh sel leydig). *Testosteron* merupakan hormon yang juga penting untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi serta ciri seks sekunder pada hewan jantan. Pelepasan testosteron dikendalikan oleh hormon pituitari anterior yang lain, yaitu LH (*Luteinizing hormone*), yang pengeluarannya juga dikendalikan oleh GnRH. Proses spermatogenesis dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Proses spermatogenesis (Junqueira dkk., 2007)

1. Kualitas Semen

Menurut Partodihardjo (1992), semen dalam Ilmu Reproduksi Hewan adalah zat cair yang keluar dari tubuh melalui penis sewaktu kopulasi, yang terdiri atas bagian yang berupa sel dan bagian yang tidak bersel. Sel-sel itu hidup dan

bergerak disebut spermatozoa, sedangkan zat cair tempat sel itu berenang disebut *Seminal plasma*. Dalam Al-Qur'an surah Al Insan/76:2 sebagai berikut:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat” (Kementrian Agama, RI : 2012).

Menurut Yahya (2005) kalimat *Nuthfatin amsyaj* berarti semen. Cairan ini tersusun dari campuran berbagai cairan yang berlainan. Cairan-cairan ini mempunyai fungsi-fungsi semisal mengandung gula yang diperlukan untuk menyediakan energi bagi spermatozoa, menetralkan asam di pintu masuk rahim, dan melicinkan lingkungan agar memudahkan pergerakan spermatozoa.

Semen adalah sekresi kelamin jantan dan epididimis serta kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap (kelenjar *Vesikularis*) yang terdiri dari Spermatozoa dan plasma semen yang secara normal di ejakulasi ke dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula di tampung dengan berbagai cara untuk keperluan inseminasi buatan (Toelihere, 1985). Selanjutnya Toelihere (1993) menyatakan spermatozoa adalah sel atau benih yang berasal dari sistem reproduksi jantan, sedangkan plasma adalah air mani yang digunakan oleh spermatozoa untuk tetap bergerak. Pada semen terdapat plasma dan spermatozoa fungsi utama plasma semen adalah sebagai medium pembawa spermatozoa dari saluran reproduksi hewan jantan ke dalam saluran reproduksi hewan betina.

Menurut Toelihere (1993), menyatakan bahwa pemeriksaan dan evaluasi harus meliputi keadaan umum contoh semen, volume, konsentrasi dan motilitas atau daya gerak. Observasi ini perlu untuk penentuan kualitas semen dan daya reproduksi pejantan dan lebih khusus lagi, untuk menentukan kadar pengenceran semen. Pemeriksaan lebih lanjut meliputi perhitungan jumlah sel-sel abnormal, pewarnaan diferensial untuk menentukan sperma yang hidup dan yang mati.

a. Penampungan Semen

Beberapa cara penampungan semen sapi untuk tujuan IB telah berkembang, diantaranya dengan vagina buatan dan *Electro-ejakulator*. Penggunaan vagina buatan untuk menampung semen sapi telah dipakai secara luas. Pejantan akan menaiki sapi betina pemancing dan akan berejakulasi pada waktu penis dimasukkan ke dalam vagina buatan. Vagina buatan terdiri dari silinder karet tebal dan keras, di dalamnya dilapisi silinder karet tipis dan merupakan kantung yang dapat diisi air panas. Salah satu ujung vagina buatan dipasang karet berbentuk corong untuk menampung semen. Vagina buatan yang telah diisi air panas dan di bagian dalam diberi pelicin, akan berfungsi untuk menampung semen (Salisbury Van Demark, 1985).

Sterilisasi dalam pelaksanaan penampungan semen sangat diperlukan demi menjaga kebersihan semen. Perlakuan yang baik dan hati-hati terhadap pejantan diperlukan untuk memberikan rangsangan sebagai persiapan sebelumnya karena rangsangan ini akan dapat menaikkan kuantitas dan kualitas semen yang ditampung. Bila hewan pemancing tidak menimbulkan nafsu kawin bagi pejantan, maka hewan pemancing dan suasana lingkungan perlu diganti. Fasilitas yang

cukup untuk menguasai pejantan dan hewan pemancing harus dilakukan supaya bahaya kecelakaan bagi penampung maupun bagi hewan itu sendiri dapat dihindari (Toelihere, 1985).

b. Evaluasi Semen Makroskopis

Evaluasi makroskopis meliputi volume, warna, konsistensi, dan bau. Volume semen dalam uji ini mencapai (2-10 ml), semen yang normal berwarna putih kekuningan, sedangkan yang abnormal berwarna kuning atau coklat, dan Semen memiliki bau yang spesifik. Uji mikroskopis terdiri dari motilitas massa dan individu, viabilitas, konsentrasi dan abnormalitas (Hunter, 1982).

1. Volume

Volume semen yang tertampung dapat langsung terbaca pada tabung penampung semen yang berskala. Semen sapi dan domba mempunyai volume rendah tetapi konsentrasi sperma tinggi sehingga memperlihatkan warna krem atau warna susu. Semen kuda dan babi merupakan cairan yang lebih voluminous dan lebih putih karena konsentrasi spermatozoa rendah. Volume semen per ejakulat berbeda menurut bangsa, umur, ukuran badan, tingkatan makanan, frekuensi penampungan dan berbagai faktor lain. Pada umumnya, hewan muda yang berukuran kecil dalam satu spesies menghasilkan volume semen yang rendah. Ejakulasi yang sering menyebabkan penurunan volume dan apabila dua ejakulat diperoleh berturut-turut dalam waktu singkat maka umumnya ejakulat yang kedua mempunyai volume yang lebih rendah (Feradis, 2010). Volume semen sapi antara 5-8 ml, domba 0,8-1,2 ml, babi 150-200 ml, dan kuda 60-100

ml. Volume rendah tidak merugikan tetapi apabila disertai dengan konsentrasi yang rendah akan membatasi jumlah spermatozoa yang tersedia (Feradis, 2010).

2. Warna

Semen sapi normal berwarna seperti susu atau krem keputih-putihan dan keruh. Kira-kira 10% sapi menghasilkan semen yang normal dengan warna kekuning-kuningan, yang disebabkan oleh *Riboflavin* yang dibawa oleh satu gen autosom resesif dan tidak mempunyai pengaruh terhadap fertilitas (Feradis, 2010). Adanya kuman-kuman *Pseudomonas aeruginosa* di dalam semen sapi dapat menyebabkan warna hijau kekuning-kuningan apabila semen dibiarkan di suhu kamar. Gumpalan-gumpalan, bekuan dan kepingan-kepingan di dalam semen menunjukkan adanya nanah yang umumnya berasal dari kelenjar-kelenjar pelengkap dari ampula. Semen yang berwarna gelap sampai merah muda menandakan adanya darah segar dalam jumlah berbeda dan berasal dari saluran kelamin urethra atau penis. Warna kecoklatan menunjukkan adanya darah yang telah mengalami dekomposisi. Warna coklat muda atau warna kehijau-hijauan menunjukkan kemungkinan kontaminasi dengan feses (Feradis, 2010).

3. pH

Pada umumnya, sperma sangat aktif dan tahan hidup lama pada pH sekitar 7,0. Motilitas partial dapat dipertahankan pada pH antara 5 sampai 10. Walaupun sperma segera dimobiliser oleh kondisi-kondisi asam, pada beberapa spesies dapat dipulihkan kembali apabila pH dikembalikan ke netral dalam waktu satu jam. Sperma sapi dan domba yang menghasilkan asam laktat dalam jumlah yang tinggi dan metabolisme fruktosa plasma seminalis, sehingga penting untuk

memberikan unsur penyangga seperti garam fosfat, sitrat bikarbonat di dalam medium (Toelihere, 1985).

4. Kekentalan

Konsistensi atau derajat kekentalan dapat diperiksa dengan menggoyangkan tabung berisi semen secara perlahan (Toelihere, 1979). Ternak sapi dan domba mempunyai konsistensi 1.000×10^6 juta sampai 2.000×10^6 atau lebih sel spermatozoa/ mL, konsistensi encer berwarna susu memiliki konsentrasi 500×10^6 sampai 600×10^6 juta sel spermatozoa/ mL, semen yang cair berawan atau sedikit memiliki konsentrasi sekitar 100×10^6 sel spermatozoa/ mL dan yang jernih seperti air kurang dari 50×10^6 sel spermatozoa/ mL (Toelihere, 1993).

c. Evaluasi Semen Mikroskopis

Konsentrasi digabung dengan volume dan persentase spermatozoa motil memberikan jumlah spermatozoa motil per ejakulat, yaitu kuantitas yang menentukan berapa betina yang dapat diinseminasi dengan ejakulat (Feradis, 2010). Metode perhitungan konsentrasi spermatozoa, yaitu menghitung jarak antar kepala sperma. Menurut Feradis (2010) cara ini adalah yang paling praktis dan sederhana untuk pemeriksaan rutin di lapangan yang dilakukan tanpa alat selain mikroskop dengan memperkirakan jarak antara dua kepala spermatozoa di bawah mikroskop dengan pembesaran 45×10 dengan penilaian sebagai berikut:

1. *Densum* (D) atau padat, jika jarak antara dua kepala spermatozoa kurang dari panjang satu kepala; konsentrasi ditaksir lebih kurang 1000 juta sampai 2000 juta sel per ml semen.

2. *Semidensum* (SD) atau sedang, jika jarak antara dua kepala spermatozoa sama dengan panjang satu sampai 1,5 kepala; konsentrasi ditaksir lebih kurang 500 juta sampai 1000 juta sel per ml semen.
3. *Rarum* (R) atau jarang, jika jarak antara dua kepala spermatozoa melebihi panjang satu kepala atau sama dengan panjang seluruh spermatozoa, konsentrasi ditaksir lebih kurang 200 juta sampai 500 juta sel per ml semen.
4. Oligospermia (OS) atau sedikit spermatozoa, jika jarak antara dua kepala spermatozoa melebihi panjang seluruh spermatozoa; konsentrasi ditaksir kurang 200 juta sel per ml semen.
5. Aspermia (A) atau tidak ada spermatozoa, bila sama sekali tidak terdapat spermatozoa di dalam semen.

Motilitas umumnya digunakan sebagai parameter kesanggupan membuahi. Penilaian secara visual terhadap motilitas merupakan penilaian yang subjektif. Perkiraan secara visual dipengaruhi oleh konsentrasi semen, kecuali pada semen yang sditambah bahan pengencer lain (Partodiharjo,1992).

Energi yang digunakan untuk motilitas spermatozoa berasal dari perombakan ATP di dalam selubung mitochondria melalui reaksi-reaksi penguraiannya menjadi ADP (*Adenosin diphosphat*) dan AMP (*Adenosine monophosphat*). Dalam semen terdapat empat bahan organik yang dapat dipakai secara langsung maupun tidak langsung oleh spermatozoa sebagai sumber energi untuk kelangsungan hidup dan motilitas spermatozoa. (Toelihere,1993).

Menurut Toilehere (1993), yang menyatakan bahwa penilaian semen berdasarkan penilaian motilitas massa dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Sangat baik (+++), jika terlihat adanya gelombang-gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif gumpalan awan hitam dekat waktu hujan yang bergerak cepat berpindah-pindah tempat.
2. Baik (++), bila terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban.
3. Lumayan (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan gerakan individual aktif progresif.
4. Buruk (0), bila hanya sedikit atau ada gerakan-gerakan individual.

Penilaian gerakan individual spermatozoa menggunakan mikroskop dan melihat pola pergerakan progresif atau gerakan aktif maju ke depan merupakan gerakan terbaik. Gerakan melingkar atau gerakan mundur merupakan tanda *Cold shock* atau media yang kurang isotonik terhadap Semen. Gerakan berayun dan berputar-putar di tempat biasanya terlihat pada Semen yang sudah tua dan apabila kebanyakan spermatozoa berhenti bergerak dan dianggap mati. Motilitas spermatozoa dipengaruhi oleh kemampuan metabolisme spermatozoa yang ditunjang oleh lingkungan yaitu suhu dan komponen-komponen yang terdapat di dalam medium (Toelihere,1993).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Semen

Semen segar yang diproduksi oleh tiap pejantan berbeda-beda kualitas dan kuantitasnya (Lestari dkk., 2013). Hasil review Ramsiyati dkk, (2004)

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas semen antara lain adalah faktor umur, bangsa, pakan dan ukuran tubuh.

a. Umur

Faktor yang mempengaruhi kualitas semen salah satunya adalah umur pejantan karena perkembangan testis dan spermatogenesis dipengaruhi oleh umur. spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam *Tubuli seminiferi*. Proses spermatogenesis pada sapi berlangsung selama 55 hari dan berlangsung pertama kali ketika sapi berumur 10 sampai 12 bulan (Nuryadi, 2000).

Menurut Mathevon dkk., (1998) bahwa volume, konsentrasi, motilitas dan total spermatozoa sapi jantan dewasa lebih banyak daripada sapi jantan muda. Volume, konsentrasi dan jumlah spermatozoa motil per ejakulat cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur pejantan mencapai 5 tahun.

Pejantan yang terlalu muda (umur kurang dari 1 tahun) atau terlalu tua menghasilkan semen yang lebih sedikit. Susilawati dkk. (1993) menyatakan bahwa pejantan yang berumur 2 sampai 7 tahun dapat menghasilkan semen terbaik dengan angka kebuntingan yang tinggi pada betina yang dikawini dibandingkan dengan pejantan yang berumur diluar interval tersebut. Umur sangat berpengaruh pada sapi jantan muda saat penampungan, karena perubahan fisiologis yang terjadi seperti dewasa kelamin. Volume dan konsentrasi dari satu ejakulat meningkat sampai umur 11 tahun (Siratskii, 1990).

b. Bangsa

Bangsa sapi *Bos taurus* mengalami dewasa kelamin lebih cepat bila dibandingkan dengan sapi *Bos indicus*. Persilangan dari dua bangsa sapi tersebut akan mencapai pubertas pada umur yang sama dengan induknya (Sprot dkk., 1998). Bangsa sapi perah mempunyai libido lebih tinggi dan menghasilkan spermatozoa yang lebih banyak dibandingkan dengan sapi potong (Hafez, 2000). Coulter dkk., (1997) dan Sprot dkk., (1998) menyatakan bahwa bangsa juga berpengaruh terhadap lingkaran skrotum yang berkorelasi positif dengan produksi dan berpengaruh terhadap lingkaran skrotum yang berkorelasi positif dengan produksi dan kualitas spermatozoa.

Chandolia dkk., (1999) menyatakan bahwa pengaruh *Heat shock* pada persentase spermatozoa yang motil pada Sapi *Holstein* lebih rendah dibandingkan bangsa sapi yang lain.

c. Lingkungan

Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi organ reproduksi ternak jantan. Hal ini menyebabkan fungsi *Thermoregulatoris* skrotum terganggu sehingga terjadi kegagalan pembentukan spermatozoa dan penurunan produksi spermatozoa. Pejantan yang ditempatkan pada ruangan yang panas mempunyai tingkat fertilitas yang rendah. Hal ini disebabkan karena memburuknya kualitas semen dan didapatkan 10% spermatozoa yang *Abnormal* (Susilawati dkk., 1993). Pond dan Pond (1999) menyatakan jika suhu lingkungan terlalu panas spermatozoa yang diproduksi tidak dapat bertahan hidup dan menyebabkan *Sterilitas* sapi jantan,

Musim dapat mempengaruhi kualitas semen pada ternak-ternak yang berada di daerah sub *Tropis*. Di Indonesia, musim kurang berpengaruh karena perbedaan lama penyinaran hampir tidak ada (Susilawati dkk., 1993). Perubahan musim karena perbedaan lamanya siang hari atau lamanya penyinaran dapat menghambat produksi FSH yang dapat menghambat produksi spermatozoa oleh testis (Hafez, 2000). Hasil penelitian Mathevon dkk., (1998) menyatakan bahwa konsentrasi, jumlah semen dan motilitas per ejakulat pada pejantan *Holstein* lebih baik pada musim dingin dan semi dibandingkan pada musim gugur. Musim saat penampungan dilaksanakan tidak mempengaruhi persentase spermatozoa motil pada sapi jantan dewasa.

d. Pakan

Nutrisi sangat penting selama perkembangan sistem reproduksi sapi jantan muda. Meningkatkan jumlah nutrisi akan mempercepat pubertas dan pertumbuhan tubuh (Sprot dkk., 1998). Makanan berpengaruh terhadap ukuran testis pada ternak jantan. Makanan yang diberikan terlalu sedikit terutama pada periode sebelum masa pubertas dicapai dapat menyebabkan perkembangan testis dan kelenjar-kelenjar aksesoris terhambat dan dapat memperlambat dewasa kelamin. Pada ternak dewasa, kekurangan makanan dapat mengakibatkan gangguan fungsi fisiologis, baik pada testes maupun pada kelenjar aksesorisnya dan dapat menurunkan libido sehingga produksi semen turun (Susilawati dkk., 1993).

Coulter dkk., (1998) menyatakan bahwa pemberian 100% hijauan pada Sapi Angus, Hereford dan Simmental setelah disapih mempunyai lingkaran skrotum, produksi semen harian dan spermatozoa motil progresif lebih besar dari pada pakan dengan energi tinggi (80% konsentrat dan 20% hijauan).

Oleh karena itu apabila ternak ruminansia hanya diberi pakan sumber hijauan berkualitas rendah, misalnya jerami padi atau sumber hijauan dari limbah pertanian lainnya yang berkualitas rendah dan tidak mampu memasok glukosa atau bakalannya dalam jumlah memadai, maka ternak tersebut sulit untuk meningkat atau bahkan mempertahankan bobot badannya. Kondisi ini akan memperparah cekaman pada ternak terutama jika selain suhu udara luar panas juga diikuti dengan kelembaban udara tinggi, sehingga potensi enersi yang dimiliki oleh asam asetat menjadi terbuang sebagai panas yang dilepaskan (*Heat dissipation*) atau bahkan panas justru tidak dapat dilepaskan sehingga produktivitas ternak menjadi menurun karena enersi yang tersedia lebih banyak digunakan untuk melawan cekaman panas tersebut. (Soetanto, 1991).

D. Daun Kelor (*Moringa oleifera*)

Kelor (*Moringa oleifera*) tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai di ketinggian ± 1000 dpl. Kelor banyak ditanam sebagai tapal batas atau pagar di halaman rumah atau ladang. Daun kelor dapat dipanen setelah tanaman tumbuh 1,5 hingga 2 meter yang biasanya memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Namun dalam budidaya intensif yang bertujuan untuk produksi daunnya, kelor dipelihara dengan ketinggian tidak lebih dari 1 meter. Daun kelor di Indonesia dikonsumsi sebagai sayuran dengan rasa yang khas, yang

memiliki rasa langu dan juga digunakan untuk pakan ternak karena dapat meningkatkan perkembangbiakan ternak khususnya unggas. (Kurniasih, 2014).

Kelor dapat tumbuh pada semua jenis tanah, dari asam sampai alkaline (Duke, 1983). Toleran terhadap kekeringan dan tumbuh selama enam bulan musim kemarau. Produksi bahan kering yang tinggi, 15 ton/ha/tahun (Sa´nchez dkk., 2005). *Moringa* (*Moringa oleifera*, *Moringaceae*) mempunyai kadar air yang rendah, persentase fenol juga rendah (3-4%), tinggi kandungan protein (13-14%) dan jumlah mineral (11-13%). Daun juga tinggi kalsium (2,9-3%), kalium (1%) dan besi (50-80mg/100g daun kering) (Juliani dkk., 2008).

Beberapa Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai pakan suplemen. Raji and Njidda (2014) melaporkan bahwa suplemntasi kelor sebanyak 50% dapat meningkatkan motilitas sperma kambing. Sedangkan pemberian daun kelor pada kelinci jantan sampai batas 15% tidak memberikan efek yang merugikan pada perubahan ukuran dan bentuk testes serta kualitas sperma (Abu dkk., 2013).



Gambar 2. Daun Kelor

1. Komposisi Zat Gizi Daun Kelor

Menurut Simbolan dkk., (2007), kandungan kimia yang dimiliki daun kelor yakni asam amino yang berbentuk asam *Aspartat*, asam *Glutamat*, *Alanin*, *Valin*, *Leusin*, *Isoleusin*, *Histidin*, *Lisin*, *Arginin*, *Venilalanin*, dan *Methionin*. Daun kelor juga mengandung makro elemen seperti *Potasium*, *Kalsium*, *Magnesium*, *Sodium*, dan *Fosfor*. Daun kelor merupakan sumber pro-vitamin A, vitamin B, Vitamin C, mineral terutama zat besi. Akar, batang dan kulit batang kelor mengandung saponin dan polifenol. Selain itu kelor juga mengandung alkaloida, tannin, steroid, flavonoid, gula tereduksi dan minyak atsiri. Sementara biji kelor mengandung minyak dan lemak (Utami dan Puspaningtyas, 2013).

Tabel 1. Kandungan Daun Kelor Per 100 g

Komponen	Komposisi (g/Kkl)
Air	75
Energi	29
Protein	6.8
Lemak	1.7
Karbohidrat	12.5
Serat	0.9
Kalsium	440
Potasium	259
Fosfor	70
Besi	7
Zinc	0.16
β-karoten	6.78
Tiamin (vitamin B1)	0.06
Riboflavin (vitamin B2)	0.05
Niacin (vitamin B3)	0.8
Vitamin C	220

Sumber : Fuglie (2001)

2. Manfaat Daun Kelor

Daun kelor merupakan tanaman yang sangat dihargai dan didistribusikan di banyak negara, di daerah tropis dan subtropis. Manfaat dan kandungan nutrisinya memang melebihi kandungan tanaman pada umumnya. Seluruh bagian tanaman kelor memiliki berbagai manfaat dan khasiat penyembuhan yang mengesankan dengan nilai nutrisi yang tinggi. Bagian-bagian yang berada dari tanaman kelor, mengandung profil mineral penting dan merupakan sumber protein yang baik, vitamin, β -karoten, *Fenolat* dan berbagai asam amino (Farooq Anwar dkk., 2006).

Pada Daun kelor, ada 17 jenis asam lemak yang diamati diantaranya asam α -Linolenic (44,57%) yang memiliki nilai tertinggi diikuti oleh *Heneicosanoic* (14.41%), *g-linolenat* (0.20%) *Palmitat* (0,17%) dan asam kaprat (0,07%). Isi serat adalah serat netral deterjen (NDF) (11,4%), serat deterjen asam (ADF) (8,49%), lignin deterjen asam (ADL) (1,8%) dan (selulosa deterjen asam (ADC) (4.01%). Yang kental tanin memiliki nilai 3,2%, sedangkan total polifenol yang 2,02% (Moyo dkk., 2011).

Beberapa Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai pakan suplemen. Raji and Njidda (2014) melaporkan bahwa suplemntasi kelor sebanyak 50% dapat meningkatkan motilitas sperma kambing. Sedangkan pemberian daun kelor pada kelinci jantan sampai batas 15% tidak memberikan efek yang merugikan pada perubahan ukuran dan bentuk testes serta kualitas sperma (Abu dkk., 2013).

Allah swt menciptakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dengan kandungan zat gizi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan menjadi makanan manusia dan makanan ternak. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an Surah Yunus/12:24 sebagai berikut :

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهِمْ أَتَيْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang kami turunkan dalam langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanaman-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna kelemahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanamannya yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir” (Kementrian Agama, RI : 2012).

Tafsir Al-Misbah dijelaskan, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian dari bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan kamu dan untuk binatang ternakmu (Quraish-Shihab)

E. Pengaruh Daun Kelor untuk Reproduksi

1. Komposisi Daun Kelor

a. Protein (Asam Amino)

Protein merupakan salah satu nutrisi yang memiliki peranan penting terhadap spermatogenesis. kandungan protein kasar daun kelor 30,3% dan 19 asam amino. Telah diketahui dengan baik bahwa secara nyata DNA, RNA dan pembentukan asam amino (sistein, metionin), folat merupakan mikronutrien penting untuk perkembangan sel-sel germinal (Young dkk., 2008; Ebisch dkk., 2006). Kekurangan protein memiliki dampak tidak hanya pada fungsi normal organ gonad dan spermatogenesis, tetapi juga pada atrofi tubular. Dalam sebuah studi tentang efek pembatasan protein maternal pada sistem reproduksi jantan, kekurangan protein juga menurunkan produksi gonadotropin, baik berdampak pada testesterone atau tingkat LH, juga menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan testis dan jumlah sperma yang rendah (Zambrano dkk., 2005).

Metabolisme folat sangat penting untuk ketepatan fungsi sel, jalur abnormal metabolisme, folat dapat menyebabkan situasi yang salah, seperti abnormal pemisahan kromosom dan kerusakan untaian DNA. Akibatnya, kelainan ini berdampak negatif terhadap mitosis dan meiosis proses sel germinal, sehingga mengganggu proses normal spermatogenesis. Sifat-sifat kuat antioksidan dari asam folat bentuk sintetisnya, memungkinkan untuk secara efektif mengikat radikal bebas pengoksidasi yang penting untuk melindungi DNA dari stres oksidatif (Young dkk., 2008).

Beberapa penelitian melaporkan bahwa peningkatan yang signifikan dalam jumlah sperma normal pada jantan subfertile setelah mereka diberikan asam folat dengan kombinasi seng sulfat (Ebisch dkk., 2006). Folat memiliki sifat antioksidan dan meningkatkan produksi sperma, hal tersebut dapat menghambat apoptosis yang dihasilkan dari kerusakan oksidatif DNA dalam spermatozoa, dengan demikian meningkatkan kesuburan pada pejantan. Selain melindungi DNA dari ancaman oksidatif, kemungkinan fungsi lain folat selama spermatogenesis hingga saat ini belum banyak diteliti.

Arginin memainkan peran penting sebagai gizi asam amino esensial dalam spermatogenesis dan juga proses metabolisme penting lainnya. Ini adalah prekursor biokimia dalam sintesis putresin, spermidine dan spermine, yang penting untuk motilitas sperma. Peningkatan performa reproduksi ini disebabkan oleh peningkatan sintesis poliamina dan dasar Arginin yang kaya protein pada sel sperma dan berperan mengatur fungsi Arg untuk motilitas dan kapasitas sperma (Wu. G, dkk., 2009).

b. Vitamin

Vitamin dikenal baik karena pentingnya dalam proses metabolisme. Pengaruh berbagai vitamin pada kapasitas reproduksi dipelajari oleh beberapa peneliti. Vitamin E *Moringa oleifera* memiliki konsentrasi tertinggi yaitu 77 mg/100g dibandingkan *Beta-karoten*, yang memiliki 18,5 mg/100 g di daun kering (Moyo dkk., 2011).

Vitamin B12 dalam bentuk yang beragam sangat penting dalam replikasi sel, terutama RNA dan sintesis DNA. Penelitian juga menunjukkan bahwa asam retinoat, bentuk metabolit alternatif vitamin A (retinol) mengontrol diferensiasi spermatogonia dan karakteristik adhesi spermatid (Abdu dkk., 2008).

Tabel 2 . Fungsi dari Berbagai Vitamin Selama Spermatogenesis.

Vitamin	Fungsi selama spermatogenesis
1) Vit B12	Melibatkan dalam RNA dan sintesis DNA * Meningkatkan pertumbuhan yang sehat dari tubulus seminiferus *
2) Vit B9	Meningkatkan sperma yang sehat dan perkembangan tubulus seminiferus *
3) Vit A	Diferensiasi spermatogonium dan pengaturan adhesi spermatid *
4) Vit E	Meningkatkan kesehatan perkembangan organ reproduksi* Mencegah membran sel sperma dari lemak peroksidasi**
5) Vit C	Mempertahankan sperma dari peristiwa ROS terkait** Melindungi sperma dari stres oksidatif ***

Sumber : * (Abdu dkk., 2008)

** (Wang dkk., 2007)

***(Begum dkk., 2009)

Dalam pandangan kelainan histopatologi, kekurangan vitamin dalam penurunan dan kemerosotan jaringan testis. Ini adalah perubahan negatif termasuk atrofi tubulus seminiferus, kelainan struktur tubulus seminiferus, hipoplasia germinal epitel, penangkapan spermatogenik dan juga nekrosis sel-sel germinal (Abdu dkk., 2008).

Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan kerusakan organ reproduksi, seperti degenerasi spermatogonium, disfungsi testis dan penyusutan *Tubulus seminiferus*. Banyak penelitian telah menunjukkan efek yang luar biasa dari Vitamin E yang bekerja melawan stres oksidatif pada ternak. Vitamin E juga

penting dalam pemeliharaan kesehatan organ reproduksi jantan dan kelangsungan hidup spermatid. Berbagai penelitian juga menunjukkan Peran Vitamin E dalam sistem reproduksi yaitu meningkatkan perkembangan organ reproduksi dengan meningkatkan berat epididimis, ductules epididimis dan diameter tubulus seminiferus, sel-sel spermatogenik dan kepadatan sel interstitial yang sangat penting dalam kelancaran berlangsungnya spermatogenesis (Wang dkk., 2007).

c. Mineral

Zinc (Zn) berfungsi sebagai antioksidan kuat yang bertindak dengan komponen penting dari selenoproteins yang dimodifikasi oleh ekspresi mereka. Se bergabung dengan seleno-asam amino, (L-selenomethionine, L-selenocysteine) dan selenoenzymes, seperti GPxs dengan mengganti sulfur dalam proteins. Secara kritis yang mempengaruhi kualitas sperma dan kesuburan jantan adalah glutathione peroksidase 4 (GPXs4) (Beckett dkk., 2005). Oleh karena itu, spermatozoa mungkin lebih rentan terhadap stres oksidatif jika kandungan Se dalam selenoproteins rendah dan cenderung mengurangi kemungkinan terjadinya fertilisasi (Beckett dkk., 2005).

Dilaporkan bahwa GPx4 efisien melindungi membran sel dari radikal bebas dan dominan ditemukan pada germinal sel. GPx4 pertama muncul dalam tahap spermatosit pakiten VII - X selama perkembangan sperma. Ekspresinya semakin meningkat dari tahap spermatid bulat untuk spermatid memanjang (Beckett dkk., 2005). GPx4 awalnya larut dengan aktivitas peroksidase aktif dalam spermatid. Namun, karena spermatid dewasa menjadi spermatozoa, GPx4 ternyata tidak larut dan bersifat enzimatis aktif. Bentuk larut dari protein ini

berperan dalam kondensasi kromatin dengan membentuk ikatan silang disulfida dalam pematangan sperma dan kesuburan jantan.

Selain selenium, mineral Seng (Zn) memainkan beberapa peran dalam sistem reproduksi jantan, salah satunya adalah partisipasi aktivitas ribonuklease yang sangat aktif selama mitosis spermatogonium dan meiosis dari spermatosit. Fungsi seng selama spermatogenesis dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Fungsi Seng Selama Fase Berbeda dari Spermatogenesis

Spermatogenesis	Fungsi Seng
1) Awal spermatogenesis,	Melibatkan aktivitas ribonuklease *
2) Selama spermatogenesis seminiferus**	Berpartisipasi dalam pematangan Spermatozoa * Pertahankan epitel germinative tubulus
3) Akhir spermatogenesis (spermiogenesis)	Meningkatkan motilitas sperma *

Sumber : * (Hidigrotlou & knipel, 1984)

** (Mason dkk., 1982)

Menurut Egwurugwu (2013), dalam sistem reproduksi jantan, zinc sangat penting untuk kinerja optimal dan output. Zinc dalam cairan seminal membantu untuk menstabilkan membran sel dan inti kromatin spermatozoa (Chvapil, 1973 dan Kvist, 1980).

Perannya yang lain dalam reproduksi jantan meliputi peran regulasi dalam proses kapasitasasi dan reaksi akrosom (Riffo dkk, 1992), dapat melindungi testis terhadap perubahan degeneratif (Batra dkk, 2004) dan juga dapat digunakan sebagai indeks fungsi prostat (Caldamone dkk, 1979). Infertilitas pada jantan disebabkan oleh jumlah sperma abnormal rendah dapat mengambil manfaat dari suplemen zinc (Wong dkk, 2002). Kekurangan zinc menyebabkan disfungsi

gonad, menurunkan berat testis, dan menyebabkan penyusutan tubulus seminiferus (Bedwal dan Bahuguna, 1994) .

Zinc (Zn) memiliki banyak interaksi biologis yang signifikan dengan hormon (Abdella dkk., 2011). Bishop dkk., (1996) mengamati bahwa zinc memiliki peran dalam produksi, penyimpanan dan sekresi hormon individual maupun dalam efektivitas situs reseptor dan kemampuan reaksi organ akhir. Di antara efek yang paling menonjol dari defisiensi Zn pada produksi hormon dan sekresinya adalah yang berkaitan dengan hormon testosteron, insulin dan kortikosteroid adrenal, spermatogenesis dan perkembangan organ seks primer dan sekunder pada jantan dan semua tahapan proses reproduksi pada betina dapat terpengaruh oleh defisiensi Zn (Insler dan Lunenfeld, 1993).

Tingkat asupan seng yang rendah akan menimbulkan keterlambatan perkembangan testis dan penghentian spermatogenesis. Percobaan Oliveira C.E.A *et. al* (2004), menunjukkan bahwa hewan yang diberi ZnO menghasilkan volume spermatozoa yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Sedangkan kekurangan Se pada pakan akan mempengaruhi fertilitas (Beckett dkk., 2005).

Jenis logam lain yang memainkan peran kecil dalam spermatogenesis adalah nikel (Ni) (Yokoi dkk., 2003) dan mangan (Mn) (Lee dkk., 2006). Hal ini dilaporkan dalam studi sebelumnya bahwa, kekurangan nikel menyebabkan cacat pada fungsi reproduksi. Disebutkan bahwa pengaruh saluran nikel nukleotida siklik gated (CNG) dapat ditemukan dalam sistem reproduksi dengan kepekaan siklik guanosin monofosfat (cGMP) saluran kation gated atau sebaliknya (Yokoi dkk., 2003).

Namun, konsentrasi nikel yang akurat menguntungkan atau merugikan terhadap kinerja reproduksi jantan tidak disebutkan dalam penelitian ini. Selain itu, pemberian $MnCl_2$ 25 mg/kg dosis mempercepat spermatogenesis dengan peningkatan yang signifikan produksi sperma harian dan efisiensi spermatogenesis dapat diamati pada percobaan ini. Meskipun Mn disarankan sebagai stimulator perkembangan pubertas, logam ini dapat menyebabkan perkembangan pubertas jantan terlalu cepat jika mendapat Mn yang cukup tinggi yang terlalu dini dalam hidupnya (Lee dkk., 2006).

F. *Multinutrient Block*

Urea Multinutrient Block (UMB) merupakan pakan tambahan (suplemen) untuk ternak ruminansia, berbentuk padat yang kaya dengan zat-zat makanan sehingga di jadikan formulasi ransum ternak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan zat nutrisi yang diperlukan oleh ternak dalam jumlah yang cukup atau lebih besar dan relatif lebih murah hingga dapat mendukung pertumbuhan, perkembangan dan kegiatan mikroba secara efisien di dalam rumen serta efektif untuk memenuhi target kinerja dan produksi. Selanjutnya produktifitas hewan dapat ditingkatkan dengan memberikan sumber N protein dan atau non protein serta mineral tertentu. Suplementasi secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik melalui peningkatan protein microbial, peningkatan daya cerna dan peningkatan konsumsi pakan hingga diperoleh keseimbangan yang lebih baik antara amino dan energi di dalam zat-zat makanan yang terserap (Basya S, 1981).

Bentuk bahan pakan ini dapat diatur sesuai dengan selera pembuatnya, dapat dibuat berbentuk kotak persegi empat, berbentuk bulat (mangkuk) atau bentuk-bentuk lain menurut cetakan yang digunakan dalam proses pemadatan. Oleh karena itu bahan pakan ini berbentuk padatan dan keras, maka untuk mengkonsumsinya ternak akan menjilati UMB tersebut, sehingga ternak memperoleh zat-zat makanan sedikit demi sedikit namun secara kontiniu (Anggordi, 1994).

UMB dibuat dari bahan-bahan sebagai berikut, yaitu : *Molasses* (tetes), *Wheat polar*, dedak padi, tepung daun kelor kering, bungkil kelapa, bungkil biji kapuk, urea, campuran mineral, garam dapur serta semen sebagai senyawa pengikat sehingga tekstur UMMB menjadi keras untuk mencegah konsumsi yang berlebihan. Formula UMMB dapat disusun sesuai kebutuhan ternak. Proses pembuatannya adalah seluruh bahan pada formula yang dicampur, kecuali molasses. Setelah bahan-bahan dicampur secara merata. Kemudian *Molasses* ditambahkan kedalam campuran dan diaduk sampai tidak ada gumpalan. Selanjutnya adonan dicetak dalam wadah atau cetakan (Tillman dkk., 1991).

Menurut Wawang (2010) yang menyatakan bahwa tujuan pemberian UMB adalah penambahan suplemen pada ternak, membentuk asam amino yang dibutuhkan oleh sapi juga untuk membantu meningkatkan pencernaan pakan yang sulit dicerna dengan cara menstabilkan kondisi keasaman (pH) di dalam rumen. Manfaat UMMB suplementasi pakan secara keseluruhan yaitu meningkatkan produksi dan kinerja reproduksi dan memperbaiki nilai gizi pakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan Juli 2017 bertempat di *Samata Integrated Farming System (SIFS)*. Untuk analisis sampel dilakukan di laboratorium Processing Sperma UNHAS.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu timbangan digital untuk menimbang bobot badan sapi, timbangan gantung kapasitas 25 kg dengan skala jarum 0,1 kg untuk menimbang bahan pakan, timbangan analitik 5 kg dengan skala 0,01 untuk menimbang daun kelor, pipet micrometer untuk mengambil sampel, vagina buatan dengan tabung skala untuk penampungan semen, termos untuk menyimpan air panas, ember tempat air bersih, coolbox tempat sperma yang sudah di tampung, spatula digunakan untuk mengolesi bibir vagina buatan menggunakan vaselin, waterbath digunakan untuk menetralisasi suhu semen dengan suhu 37⁰C, deck gelas, objek gelas, pabrik alat untuk menggiling kelor, serta CASA (Computer Assisted Sperem Analysis) dengan aplikasi Sperma Vision Versi 3.7.5 yang digunakan untuk menganalisis sampel spermatozoa.

2. Bahan

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pakan penyusun konsentrat diantaranya ampas tahu, dedak, mineral, garam, molasses, urea dan pakan suplemen yang berupa daun kelor, *Moringa oleifera* multinutrien block dengan bahan penyusun daun kelor, *Molasses*, garam, mineral, semen, dan urea, hijauan, vaselin, air panas 40⁰C, es batu, pulpen, buku tulis, label, tisu dan lab kasar.

Bahan penyusun ransum diperoleh dari sekitaran samata yang terdiri dari daun kelor, *Molasses*, mineral mix, garam, urea dan semen. Daun kelor tersebut di dapatkan di sekitaran Samata, Antang, BTP, Panakkukang, Soppeng, Pinrang, dan Jeneponto, sedangkan garam didapatkan di Jeneponto, *Molases* didapatkan dipabrik gula di Takalar, dan mineral mix didapatkan di poultry shop, garam didapatkan disekitaran samata dan semen didapatkan di sekitaran samata.

Komposisi bahan pakan penyusun konsentrat yang digunakan dan kandungan nutrisinya dapat dilihat masing-masing pada Tabel 4 dan 5. Pemberian konsentrat diberikan 2 kali sehari.

Tabel 4. Komposisi Pakan Konsentrat Penelitian

No	Bahan Pakan	Jumlah (%)
1	Dedak	43
2	Ampas Tahu	43
3	Molasses	6
4	Garam	4
5	Urea	2
6	Mineral Mix	2
Total		100

Tabe 5. Hasil Analisis Proximat Pakan Konsentrat yang Digunakan pada 2 Perlakuan

No	Bahan Pakan	Jumlah (%)
1	Protein Kasar	11.30 %
2	Lemak Kasar	3.63 %
3	Energi Metabolisme	2169 Kkal/Kg
4	Kadar Air	42.41 %
5	Abu	24.54 %
6	TDN	74.85 %
Total		100

Sumber: Laboratorium Kimia Nutris Ternak Fakultas Peternakan Unhas 2016

Tabel 6. Kebutuhan Pakan *Moringa oleifera* Multinutrient Block

No	Bahan Pakan	Jumlah (%)
1	Daun kelor	50
2	Molasses	35
3	Garam	5
4	Urea	4
5	Mineral Mix	3
6	Semen	3
Total		100 %

Tabel 7. Komposisi Bahan Pakan *Moringa oleifera* Multinutrient Block Ternak Per Ekor/Hari

No	Bahan Pakan	Jumlah (gr)
1	Tepung Daun Kelor	250
2	Molasses	175
3	Urea	25
4	Garam	20
5	Mineral	15
6	Semen	15
Total		500

Tabel 8. Hasil Analisis Proximat Daun Kelor (*Moringa oleifera*) yang Digunakan pada Penelitian

No	Bahan Pakan	Komposisi (%)
1	Kadar Air	11,84
2	Protein Kasar	25,70
3	Lemak	10,20
4	Serat Kasar	9,48
5	BETN	41,56
6	Abu	74,85 %
7	Ca	3,34
8	P	0,39
9	Zn	2,563
Total		100

Sumber: Laboratorium Kimia Makanan Ternak Fakultas Peternakan UNHAS

C. Kandang Penelitian

Kandang yang digunakan adalah sistem semi monitor yang terbuat dari kayu dengan ukuran 20x5 masing-masing dilengkapi dengan tempat makan dan tempat minum, serta lampu yang berdaya 25 watt yang digunakan sebagai penerangan.

D. Metode Penelitian

Terdiri dari 2 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan
 - a. Penomoran Ternak

Setiap ternak dilakukan penomoran dengan cara ditulis menggunakan spidol, tujuan dari penomoran yaitu agar lebih mudah mengenali ternak sapi dan penomoran dilakukan secara berurutan berdasarkan urutan kandang.
 - b. Adaptasi ternak, yaitu melakukan pembiasaan pada ternak yang bertujuan agar ternak tetap tenang ketika dilakukan pengamatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan 5 ekor sapi Bali dengan pakan *Moringa oleifera* multinutrien block. Penelitian ini dilakukan dengan 2 perlakuan masing-masing periode terdiri dari 6 minggu. Periode pertama, sebagai kontrol atau tanpa pemberian *Moringa oleifera* multinutrien block (P_1) dan periode kedua sebagai perlakuan atau pemberian *Moringa oleifera* multinutrien block (P_2). Block yang terdiri dari campuran daun kelor, *Molasses*, garam, mineral, urea dan semen yang diperoleh menjadi Block. Pemberian Block sebanyak 500 gram/ekor/hari.

a. Pengeringan dan Penggilingan Daun Kelor

Daun kelor yang sudah diambil dari batangnya dan memisahkan daun dari ranting-ranting kecil. Kemudian daun kelor dikeringkan tanpa sinar matahari atau didalam ruangan, karena sinar matahari dapat menurunkan kadar nutrisi pada daun kelor, dikeringkan 1 sampai 4 hari. Setelah itu, daun kelor yang sudah kering digiling atau membuat daun kelor menjadi tepung dengan menggunakan mesin penggiling.

b. Pembuatan Block

Menimbang semua bahan yaitu tepung daun kelor, *Molasses*, urea, garam, mineral dan semen bangunan menggunakan timbangan analitik 5 kg dengan skala 0,01 sesuai dengan kebutuhan. Setelah semua bahan selesai ditimbang, kemudian melarutkan bahan garam, urea dan semen dalam satu wadah dengan menambahkan air secukupnya agar bahan tersebut mudah larut. Setelah ketiga bahan tersebut larut dan tercampur rata kemudian bahan tersebut

ditumpahkan kedalam wadah yang sudah terisi dengan *Molasses* dan mineral, diaduk sampai semua bahan tercampur rata menggunakan kayu atau tangan. Setelah semua bahan tersebut tercampur rata kemudian bahan tersebut ditumpahkan ketumpukan tepung daun kelor dalam karpet, diaduk menggunakan tangan sehingga semua bahan bisa tercampur rata. Menimbang bahan yang sudah tercampur dengan berat 500 gram/block. Terakhir membentuk block menggunakan cetakan bulat dari pipa.

c. Penampungan Semen

Sebelum melakukan penampungan, mula-mula sapi terlebih dahulu dibersihkan alat kelamin jantan kemudian menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk penampungan semen, seperti vagina buatan, air panas, vaselin, thermometer dan lainnya. Penampungan semen dilakukan sekali seminggu, pengambilan semen dilakukan pada pagi hari. Pejantan dibawa ke kandang kawin dan dipertemukan dengan betina pemancing untuk memberi rangsangan libido kepada pejantan yang akan ditampung semennya. Vagina buatan yang telah disiapkan diberi pelicin, apabila terdapat tanda-tanda pejantan akan menaiki betina pemancing, maka vagina buatan diarahkan pada penis untuk menampung semen saat berejakulasi. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan makroskopis yang dilakukan ditempat penampungan dan sedangkan pemeriksaan mikroskopis dilakukan di laboratorium.

E. Parameter yang Diukur

1. Kualitas Makroskopis :

- a. Volume semen yang tertampung dapat langsung terbaca pada tabung penampungan semen yang berskala (Partodiharjo, 1989).
- b. Kekentalan dapat diperiksa dengan menggoyangkan tabung berisi semen secara perlahan (Toeliher, 1993). Kekentalan berkorelasi dengan penilaian ada kental, encer dan agak kental.
- c. Warna semen yang normal yaitu warna susu, krem dan kekuning-kuningan (Feradis, 2010).

2. Kualitas Mikroskopis :

a. Motilitas Sperma

Motilitas dilihat dibawah mikroskop elektrik berdasarkan gerakan spermatozoa yang hidup (Motilitas maju dan Motilitas progresif). Data diperoleh dengan cara meneteskan sampel semen pada gelas obyek kemudian ditutup dengan cover glass lalu diamati di bawah mikroskop yang dihubungkan dengan personal komputer menggunakan aplikasi Sperm Vision Versi 3.7.5.

b. Evaluasi gerakan massa mengikuti prosedur Toelihere (1993) antara lain :

1. Sangat baik (+++), jika terlihat adanya gelombang-gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif gumpalan awan hitam dekat waktu hujan yang bergerak cepat berpindah-pindah tempat.
2. Baik (++), bila terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban.

3. Lumayan (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan gerakan individual aktif progresif.
4. Buruk (0), bila hanya sedikit atau ada gerakan-gerakan individual.

c. Evaluasi gerakan individu

Dibawah pembesaran pandangan 45x10 pada selapis tipis semen di atas gelas objek yang ditutupi gelas penutup akan terlihat gerakan-gerakan individual spermatozoa. Pada umumnya dan yang terbaik adalah pergerakan progresif atau gerakan aktif maju ke depan. Gerakan melingkar dan gerakan mundur sering merupakan tanda-tanda *Cold shock* atau media yang tidak isotonik dengan semen. Gerakan berayun atau berputar di tempat sering terlihat pada semen yang tua, apabila kebanyakan spermatozoa telah berhenti bergerak maka dianggap mati (Feradis, 2010).

Menurut Toelihere (1993), penilaian gerakan individual spermatozoa mempunyai nilai 0 sampai 5, sebagai berikut:

- 0 : spermatozoa immotil atau tidak bergerak;
- 1 : pergerakan berputar di tempat;
- 2 : gerakan berayun melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif dan tidak ada gelombang;
- 3 : antara 50 sampai 80% spermatozoa bergerak progresif dan menghasilkan gerakan massa;
- 4 : pergerakan progresif yang gesit dan segera membentuk gelombang dengan 90% sperma motil;

5 : gerakan yang sangat progresif, gelombang yang sangat cepat, menunjukkan 100% motil aktif.

F. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS versi 16 dengan rancangan *Paired sample T-Test* (steel dan Torrie, 1993).

Rumus :

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} - 2r \left(\frac{s_1}{\sqrt{n_1}}\right) \left(\frac{s_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$$

Keterangan :

X_1 = Rata-rata sampel sebelum pemberian daun kelor

X_2 = Rata-rata sampel setelah pemberian daun kelor

S_1 = Simpangan baku sebelum pemberian daun kelor

S_2 = Simpangan baku setelah pemberian daun kelor

n_1 = Jumlah sampel sebelum pemberian daun kelor

n_2 = jumlah sample setelah pemberian daun kelor

r = korelasi antara sebelum dan setelah pemberian kelo

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas semen segar pada sapi Bali pada kontrol (sebelum pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block), dan perlakuan (setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block). Pemeriksaan makroskopis meliputi volume, warna dan kekentalan. Pemeriksaan mikroskopis meliputi motilitas spermatozoa (massa dan individu) dan progresif sperma.

A. Uji Kualitas Makroskopis

Tabel 9. Pengamatan Uji Makroskopis Sebelum dan Setelah Pemberian Block

Parameter	Kontrol	Perlakuan
Volume (ml/ejakulasi)	3,5 - 7 mL	4,33 - 7,6 mL
Warna	Krem	Krem
Kekentalan	Encer	Encer dan Sedang

Kontrol (Sebelum Pemberian Moringa oleifera Multinutrient Block)

Perlakuan (Setelah Pemberian Moringa oleifera Multinutrient Block)

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block pada pejantan sapi Bali memiliki rata-rata volume semen pada enam kali penampungan berkisar 5,5 - 7 mL, volume ini menunjukkan kisaran yang normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Toelihere (1985), bahwa volume semen sapi bervariasi antara 1 – 15 ml. Adanya perbedaan volume semen setiap ejakulasi disebabkan oleh perbedaan bangsa, umur, ukuran badan, pakan, frekuensi penampungan dan berbagai faktor lain.

Semen adalah sekresi kelamin pejantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula

ditampung untuk keperluan IB. Volume semen yang tertampung dapat langsung terbaca pada tabung penampungan semen yang berskala. Volume dapat juga digunakan dalam menentukan jumlah sperma per ejakulasi bila dikalikan dengan konsentrasi (Sorensen, 1979).

Warna semen segar yang diperoleh dari penelitian ini adalah semen yang berwarna krem, ini menunjukkan bahwa semen tersebut memiliki kualitas yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Toelihere (1985), bahwa semen sapi normal berwarna susu atau krem dan keruh. Hal ini didukung oleh Partodihardjo (1992), bahwa warna semen yang dihasilkan yaitu warna krem keputih-putihan, jika berwarna hijau kekuning-kuningan berarti mengandung kuman *Pseudomonas aeruginosa*, semen yang berwarna merah berarti mengandung darah dan semen yang berwarna coklat berarti semen tersebut mengandung darah yang telah membusuk.

Konsistensi semen yang ditampung dari sapi sebelum pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block memiliki konsistensi yang encer. Sedangkan setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block memiliki konsistensi sedang/kental. Menurut Dewi (2012), salah satu faktor yang mempengaruhi kekentalan semen yaitu kualitas pakan yang diberikan. Semakin baik kualitas pakan yang diberikan, maka akan menghasilkan semen yang kental begitupun sebaliknya. Pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block terbukti mampu meningkatkan konsistensi sperma dibanding dengan sebelum pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block.

Penelitian Ratnawati, dkk., (2008) dengan menggunakan suplementasi jamu tradisional (telur ayam, madu, temu kunci, dan vitamin E) menunjukkan bahwa volume semen sebanyak 5,6 mL, dengan konsistensi sedang-kental, dan warna krem-putih susu, gerakan masa “++” dan pH 6,5-6,9. Secara umum, hasil tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan yang didapatkan pada penelitian ini yang menggunakan *Moringa oleifera* multinutrient block, karena pada dasarnya sebagian besar kandungan jamu tradisional tersebut juga ada dalam daun kelor.


Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi volume semen perejakulasi. Menurut Partodihardjo (1992) faktor-faktor yang mempengaruhi volume semen sapi yaitu umur pejantan, ras hewan, besar dan beratnya hewan, frekuensi penampungan serta yang paling penting adalah kandungan nutrisi pakan yang diberikan. Konsistensi semen yang berbeda sebelum dan setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block berhubungan dengan warna semen.

Asupan nutrisi yang diberikan akan berdampak pada kualitas semen. Daun kelor memiliki nutrisi yang baik karena mengandung protein, mineral, vitamin dan komponen nutrisi lainnya sehingga mampu memperbaiki kualitas semen. Daun kelor mengandung mineral Zn sebesar 31.03 mg/kg (Moyo dkk., 2011) atau 0.6 mg/100g daun segar (Krisnadi, 2014). Berbagai penelitian telah dilakukan dengan memanfaatkan daun kelor sebagai bahan pakan dengan tujuan meningkatkan libido dan dan kualitas semen. Abu dkk., (2013) berhasil meningkatkan kualitas sperma epididimis kelinci pejantan. Hasil penelitian Andi Syarifuddin (2015) menunjukkan bahwa, suplementasi daun kelor secara signifikan meningkatkan libido dan motilitas sperma sapi Bali.

B. Uji Kualitas Mikroskopis

1. Motilitas Individu

Uji kualitas mikroskopis semen sebelum dan setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.



Grafik 1. Motilitas Individu Spermatozoa pada Semen Sapi Bali Sebelum dan Setelah Pemberian *Moringa oleifera* Multinutrient Block.

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block pada pejantan sapi Bali menunjukkan peningkatan kualitas semen pejantan. Periode (minggu) 1 sampai 6 adalah kontrol (sebelum pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block), sedangkan periode (minggu) 7 sampai 14 adalah perlakuan (setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block). Pada minggu 1 dan 2 menunjukkan pergerakan yang tidak berbeda jauh, dan pada minggu ke 3 meningkat yang sangat jauh dari 2 minggu sebelumnya, kemudian pada minggu 4 dan 5 menurun sampai pada minggu ke 6. Pada minggu ke 7 meningkat sampai minggu ke 8 dan pada minggu ke 9 menurun sampai minggu ke 10 dan 11. Pada minggu ke 12, 13 dan 14 melaju normal.

Motilitas individu setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block berbeda nyata ($P < 0,05$). Rata-rata motilitas semen setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block yaitu $69.48 \pm 8.98\%$, lebih tinggi daripada motilitas individu sebelum pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block yaitu $38.20 \pm 28.67\%$. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dengan pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block sesuai dengan pendapat Sarastina, dkk. (2006) bahwa rata-rata motilitas semua bangsa sapi yaitu diatas 80%.

Motilitas adalah perbandingan antara jumlah spermatozoa yang bergerak baik dengan jumlah total keseluruhan sperma yang terdapat pada hasil pengamatan dalam satuan persen (%). Motilitas juga digunakan sebagai ukuran kesanggupan spermatozoa untuk membuahi (Toelihere 1993). Selanjutnya Garner dan Hafez (2000) menyatakan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi tingkat motilitas spermatozoa, yaitu faktor endogen (usia, maturasi spermatozoa, ketersediaan energi, dan kemampuan bertahan terhadap benda asing) dan faktor eksogen (lingkungan, stimulant, dan inhibitor).


Adanya perbedaan yang signifikan membuktikan bahwa kandungan nutrisi dari daun kelor sangat baik untuk motilitas sperma. Menurut Yunsang Cheah dan Wanxi Yang (2011), menjelaskan bahwa beberapa nutrisi yang mempengaruhi motilitas sperma diantaranya Zeng, Selenium, Vitamin C dan E, Kalsium dan Nikel. Sementara itu, menurut Moyo dkk., dan Kathryn (2011), bahwa daun kelor mengandung semua unsur nutrisi tersebut, sehingga mampu meningkatkan motilitas semen sapi Bali dari standar yang ditetapkan.

Diantara faktor lain yang mempengaruhi motilitas spermatozoa adalah faktor makanan. Menurut Toelihere (1993), jumlah makanan yang kurang akan menghambat kelancaran fungsi reproduksi melalui pengaruhnya terhadap sekresi hormon-hormon gonadotropin. Sullivan (1978) dalam Rahayu (2001) menambahkan bahwa motilitas spermatozoa memiliki hubungan dengan energi yang berasal dari pakan dan kematangan spermatozoa. Kematangan spermatozoa dipengaruhi oleh interval penampungan yang teratur dan jumlah ejakulasi tiap penampungan yang tetap.

Selain itu, aktifitas gerakan spermatozoa juga dipengaruhi oleh bentuk anatomis. Spermatozoa yang memiliki kelainan pada ekor, kepala dan leher tidak mampu untuk bergerak secara normal (Iksan, 1992). Sesuai dengan bentuk morfologi spermatozoa dan pola metaboliknya yang khusus dengan dasar produksi energi, spermatozoa hidup dapat mendorong dirinya sendiri maju ke depan dalam lingkungan zat cair (Salisbury dan Vandenmark, 1985). Menurut Toelihere (1981) sekurang-kurangnya ditemukan empat bahan organik di dalam semen yang dapat dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh spermatozoa sebagai energi untuk kelangsungan hidup dan motilitasnya, bahan-bahan tersebut adalah fruktosa, serbitol, GPC dan plasmalogen. Sebagian bahan-bahan tersebut terkandung dalam seminal plasma. Kualitas bahan-bahan organik yang digunakan sebagai sumber energi spermatozoa tergantung dari kondisi kelenjar-kelenjar yang mengeksresikan bahan-bahan tersebut.

2. Progresivitas Spermatozoa

Uji kualitas mikroskopis semen sebelum dan setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.



Grafik 2. Gerak Progresif Semen Sapi Bali Sebelum dan Setelah Pemberian *Moringa oleifera* Multinutrient Block.

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block pada pejantan sapi Bali menunjukkan peningkatan kualitas semen pejantan. Periode (minggu) 1 sampai 6 adalah kontrol (sebelum pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block), sedangkan periode (minggu) 7 sampai 14 adalah perlakuan (setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block). Pada minggu 1 dan 2 menunjukkan pergerakan yang tidak berbeda jauh, dan pada minggu ke 3 meningkat yang sangat jauh dari 2 minggu sebelumnya, kemudian pada minggu 4 dan 5 menurun sampai pada minggu ke 6. Pada minggu ke 7 meningkat sampai minggu ke 8 dan pada minggu ke 9 menurun sampai minggu ke 10 dan 11. Pada minggu ke 12, 13 dan 14 melaju normal.

Pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block progresif pada perlakuan setelah pemberian pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block berbeda nyata ($P < 0,05$). Progresif setelah pemberian pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block yaitu $52.48 \pm 8.96\%$ dan sebelum pemberian pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block adalah $27.00 \pm 21.80\%$. Motilitas progresif berperan penting untuk keberhasilan fertilisasi (pembuahan). Menurut Feradis (2010), menyatakan bahwa pejantan fertil mempunyai sperma motil progresif 50-80%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pejantan sapi Bali yang digunakan adalah sapi pejantan yang fertil dan pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block dapat meningkatkan fertilitas spermanya.

Progresifitas spermatozoa merupakan pergerakan aktif sperma menuju kedepan untuk menembus sel telur. Menurut Sarastina (2006), bahwa standar minimal progresifitas yang baik yaitu 60%. Berdasarkan hal tersebut, maka motilitas progresif spermatozoa sapi setelah pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block menunjukkan hasil yang sangat baik karena melebihi angka standar.

Zhou dkk., (2007) menunjukkan bahwa suplementasi dengan karnitin meningkatkan kualitas sperma atau kuantitas dalam testis tikus kerusakan fisik, seperti panas dan radiasi sinar X. Spermatozoa matang dilindungi oleh karnitin oleh penyerapan kelebihan acetyl-CoA dari mitokondria dan menyimpannya dalam bentuk L-asetil-karnitin.

3. Pergerakan Massa Spermatozoa

Pergerakan massa sendiri memegang peranan penting sewaktu pertemuannya dengan ovum. Spermatozoa dalam suatu kelompok memiliki kecenderungan untuk bergerak bersama-sama ke satu arah dan membentuk gelombang-gelombang yang tebal atau tipis, bergerak cepat atau lambat bergantung pada konsentrasi sperma hidup di dalamnya. Semakin besar pergerakan gelombang yang terjadi, semakin tinggi motilitas dan konsentrasi spermatozoa. Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan perbedaan pada gerakan massa sperma. Gerakan massa pada kedua kelompok adalah positif + dan positif ++ dan positif +++. Dari 5 ekor kontrol gerakan massa positif + sebanyak satu ekor, selebihnya positif ++. sedangkan pada kelompok Perlakuan (*Moringa oleifera* multinutrient block) gerakan massa positif +++ sebanyak dua ekor, selebihnya positif ++. Terdapat kriteria gerakan massa +++ artinya jika gelombang massa tebal dan cepat berpindah tempat, gerakan massa ++ berupa gerakan gelombang massa tebal tetapi lambat berpindah tempat dan gelombang massa sedang tetapi cepat berpindah tempat, dan gerakan massa positif + artinya jika gelombang massa tipis dan lambat berpindah tempat (Toelihere, 1993).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block secara nyata meningkatkan kualitas (motilitas dan progresifitas) semen segar sapi Bali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka, saran yang dapat diberikan bahwa untuk meningkatkan kualitas semen dapat dilakukan dengan pemberian *Moringa oleifera* multinutrient block.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2002. *Penggemukan Sapi Potong*. PT.Agro Media Pustaka. Jakarta.
- Abdella, A.M., B.H. Dkk. 2011. *In vivo Study on Lead, Cadmium and Zinc Supplementations on Spermatogenesis in Albino Rats*. Journal of Pharmacology and Toxicology, 6: 141-148.
- Abdu, S.B. 2008. *Effect of Vitamins Deficiencies on the Histological Structure of the Testis of Albino Mice Mus Musculus*. Saudi Journal of Biological Sciences, 15, 269- 278.
- Abu, dkk. 2013. *The Testicular Morphometry and Sperm Quality of Rubbit Bwoks Fed Graded Levels of Moringa oleifera Leaf Meal (MOLM)*. Agrosearch.
- Anggorodi. 1994. *Ilmu Makanan Ternak Umum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Badan Pusat Statistika. 2013. *Luas Panen dan Produksi Tanaman Jagung Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan*. Makassar.
- Basya S. 1981. *Penggunaan dan Pemberian Urea Sebagai Bahan Makanan Ternak*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- Batra, N., B. dkk. 2004. *Reproductive Potential of Male Portan Rats Exposed to Various Levels of Lead With Regard to Zinc Status*. Br. J. Nutr., 91: 387-391.
- Beckett, G.J. dkk. 2005. *Selenium and Endo-Crine Systems*. Journal of Endocrinology, 84, 455-465. doi:10.1677/joe.1.05971
- Bedwal, R.S. and Bahugana, A. 1994. *Zinc, Copper and Selenium in Reproduction*. Experientia, 50:626-640.
- Begum, H., Moniruddin, A.B.M. and Nahar, K. 2009. *Environmental and nutritional aspect in male infertility*. Journal of Medicine, 10, 16-19.
- Bishop, dkk. 1996. *Clinical Chemistry, Principle, Procedure, Correlation*. 3rd Edn. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, New York. USA, pp: 279-288.
- Caldamone, dkk. 1979. *Seminal Zinc and Male Infertility*. Urology 13: 280-281

- Chandolia, R. K., E. M. Reinersten dan P. J. Hansen. 1999. *Lack of breed differences in responses of bovine spermatozoa to heat shock*. J. Dairy Sci. 82 : 2617-2619.
- Chvapil, M. 1973. *New Aspects in the Biological Role of Zinc a Stabilizer of Macromolecules and Biological Membranes*. Life Sci 13: 1041-1049.
- Coulter, G. H., R. B. Cook dan J. P. Kastelic. 1997. *Effects of Dietary Energy on Scrotal Surface Temperature, Seminal Quality and Sperm Production in Young Beef Bulls*. J. Animal Science 75 (6) : 1048-1052.
- _____. 1998. *Effects of Dietary Energy on Scrotal Surface Temperature Seminal Quality and Sperm Production in Young Beef Bulls*. J. Animal Science: USA.
- DEPAG RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Lubuk Agung.
- Dewi. 2012. *Kualitas Semen Berdasarkan Umur Pada Sapi Jantan Jawa*. Animal Agriculture Journal.
- Ditjennak. 2013. *Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian.
- Ebisch, dkk. 2006. *Homo-Cysteine, Glutathione and Related Thiols Affect Fertility Pa-Rameters in the (Sub) Fertile Couple*. Human Reproduction, 21, 1725-1733. doi.org/10.1093/humrep/del081
- Egwurugwu. 2013. *Effects of Zinc on Male Sex Hormones and Semen Quality in Rats*. Physiological Society of Nigeria. Niger. J. Physiol. Sci. 28 017 – 022.
- Feradis. 2010. *Bioteknologi Reproduksi pada Ternak*. Alfabeta. Bandung.
- Fuglie. L. J. 2001. *The Miracle Tree: The Multiple Attributes of Moringa*. Cta-CWS. Dakkar-Senegal.
- Hafez. 2000. *Reproduction in Farm Animals*. Seventh Edition, Lea and Febiger, Philadelphia.
- Hardjopranjoto, S. 1995. *Ilmu Kemajiran pada Ternak*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Hardjosubroto, W. 1994. *Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapang*. Cetakan pertama. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.

- Herdis. dkk. 2003. *Inseminasi Buatan Teknologi Tepat Guna Solusi dalam meningkatkan populasi ternak Akibat Krisis Ekonomi*. Deptan.
- Heru. 2012. *Sistem Reproduksi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hidiroglou, M. and Knipfel, J.E. 1984. *Zinc in mam-malian sperm: A review. Journal of Dairy Science*. 67, 1147-1156. doi:10.3168/jds.S0022-0302(84)81416-2
- Hunter, R.H.F. 1995. *Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Hewan Betina Domestik*. ITB. Bandung.
- _____.1995. *Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Hewan Betina Domestik*. ITB. Bandung.
- Insler, V. and B. Lunenfeld, 1993. *Infertility: Male and Female*. 2nd Edn., Charchill Livingstone, UK., London, pp: 739.
- Isnaeni. 2006. *Fisiologi Hewan*. Penerbit Kanisius : Yogyakarta.
- Ipteknet. 2000. *Budidaya Ternak Sapi Perah*. Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan: Bappenas,
- Jamal, H. 2008. *Strategi Pengembangan Ternak Kerbau*. PT Gramedia. Jakarta.
- Jamili, M.A. 2016. *Mengetahui Pengaruh Suplementasi Daun Kelor terhadap Ukuran Lingkar Skrotum, Libido dan Kualitas Semen Sapi Bali*. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Jalaluddin Imam, AM dan Jalaluddin Imam, AS. 2010. *Terjemahan Tafsir Jalalain*. Sinar Baru Algensindo Offset. Bandung.
- Juliani, H. R., dkk. 2008. *Nutritional Value of Moringa oleifera Leaves From Senegal*. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines (AJTCAM), Abstracts Of The World Congress On Medicinal And Aromatic Plants.
- Krisnadi, A.D. 2014. *Kelor Super Nutrisi*. Kelorina.com. Pusat Informasi dan Pengembangan Tanaman Kelor Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat - Media Peduli Lingkungan (LSM-MEPELING). Kunduran Blora.
- Kvist U. 1980. *Importance of Spermatozoal Zinc as Temporary Inhibitor of Sperm Nuclear Chromatin Decondensation Ability in Man*. Acta Physiologica Scandinava Vol.109 (1): 79-84.

- Lee, dkk. 2006. *Manganese Acts Centrally To Acti-Vate Reproductive Hormone Secretion and Pubertal Development in Male Rats*. *Reproductive Toxicology*, 22, 580- 585. doi:10.1016/j.reprotox.2006.03.011
- Lestari, S., dkk. 2013. *Profil Kualitas Semen Segar Sapi Pejantan Limousin dengan Umur yang Berbeda Di Balai Inseminasi Buatan*. *Jurnal Ilmiah Peternakan: Lembang Jawa Barat*.
- Mathevon, M., M. Buhr and J. C. M. Dekkers. 1998. *Environmental, Management and Genetic Factors Affecting Semen Production in Holstein Bulls*. *Journal Dairy Science: USA*.
- Mason, K.E., Burns, W.A. and Smith Jr., J.C. 1982. *Testicular damage associated with zinc deficiency in pre- and postpubertal rats: Response to zinc repletion*. *The Journal of Nutrition*, 112, 1019-1028.
- Moyo, B., dkk. 2011. *Nutritional characterization of Moringa (Moringa oleifera Lam.) Leaves*. *African Journal of Biotechnology* Vol. 10 (60) : 12925-12933. Online at <http://www.academicjournals.org/AJB>, DOI: 10.5897/AJB10.1599.
- Murti, W,T dan Gatot C. 1988. *Kerbau perah dan kerbau kerja*. Mediyatama Sarana Perkasa. Jakarta.
- Murtidjo. 1992. *Beternak Sapi Potong*. Kanisius: Yogyakarta.
- Nuryadi. 2000. *Penampilan Reproduksi Sapi Peranakan Ongole dan Peranakan Limousin di Kabupaten Malang*. *J Ternak Tropika* 12(1):76-81.
- Pane, I. 1991. *Produktivitas dan breeding sapi Bali*. Proc. Seminar Nasional Sapi Bali 2-3 September. hlm: 50.
- Partodihardjo, S. 1992. *Ilmu Reproduksi Hewan*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Pipiet, O. 2007. *Perkembangan Populasi Ternak Kerbau Di Kabupaten Tanah Toraja*. Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Pond, K. dan W. Pond. 1999. *Introduction to Animal Science*. John Willey & Sons, Inc: USA.
- Purwantara B, Noor RR, Andersson G, and Rodriguez-Martinez H. 2012. *Banteng and Bali Cattle in Indonesia: Status and Forecasts*. *Reprod Dom Anim* 47 (Suppl. 1), 2-6

- Putu, I.G., Dewyanto, P. Sitepu, T.D. Soedjana, 1997. *Ketersediaan dan Kebutuhan Teknologi Produksi Sapi Potong. Proceeding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner*. Bogor.
- Quthub, Sayyid. 1996. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Vol 4*. Kairo : Daru As-Syuruq.
- Ramsiyati, D.T., dkk. 2004. *Evaluasi Kualitas Semen Sapi Potong pada Berbagai Umur di Peternakan Rakyat*. Prosiding Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- Ratnawati, D. 2008. *Pengaruh Pemberian Suplemen Tradisional terhadap Kualitas Semen Pejantan Sapi Bali*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner "Inovasi Teknologi Mendukung Pengembangan Agribisnis Peternakan Ramah Lingkungan". Bogor.
- Riffo, dkk. 1992. *Effect of Zinc on Human Sperm Motility and the Acrosome Reaction*. Int J Androl. 15: 229 -237.
- Sa'nchez, N. R., E. Spöndly, I. Ledin. 2005. *Effect of Feeding Different Levels of Foliage of Moringa oleifera to Creole Dairy Cows on Intake, Digestibility, Milk Production and Composition*. LIVSCI-02810; No 1 - 8 doi:10.1016/j.livprodsci.2005.09.010
- Salisbury, G.W and VanDemark. 1985. *Fisiologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan pada Sapi*. Gadjah Mada. University Press. Yogyakarta.
- Sarastina., dkk. 2006. *Analisa Beberapa Parameter Motilitas Spermatozoa pada Berbagai Bangsa Sapi Menggunakan Computer Assisted Semen Analysis (CASA)*. J. Ternak Tropika Vol. 6. No.2: 1-12.
- Simbolan. JM. M. Simbolan. N. Katharina. 2007. *Cegah Malnutrisi dengan Kelor*. Kanisius, Yogyakarta.
- Siratskii, I. Z. 1990. *Inheritance of Reproductive Ability of Bulls*. Tsitol: Genet.
- Soetanto, H., 1991. *Glucose Metabolism in Ruminants Consuming Low Quality Straw*. Ph.D. Thesis University of Queensland: Australia.
- _____. 2008. *Effect Of Supplementation With Molasses Block Containing Gliricidia Or Moringa Leaves On In Vitro Gas Production And Microbial Protein Synthesis*. Word Conference on Animal Production: Australia.
- Sorensen, A. M. 1979. *Animal Reproduction principles and practice*. McGraw-Hill. United State of America.

- Sprott, L. R., T.A. Thirft dan B.b Carpenter. 1998. *Breeding Soundness of Bulss Agricultural Communications*. The Texas A & M University System. www.jas.faas.org.
- Steel, R. G. D. dan J.H. Torrie. 1993. *Prinsip dan Prosedur Statistika (Pendekatan Biometrik)*. Penerjemah B. Sumantri. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sudardjat, S dan Rachmat, P. 2003. *Peduli Peternak Rakyat*. Yayasan Agrindo Mandiri. Jakarta
- Sugeng, Y. B. 2007. *Sapi potong*. Penebar Swadaya. Bogor.
- Susilawati, T., P. Srianto, Hermanto dan E. Yuliani. 1993. *Kualitas Semen Sapi Fries Holland dan Sapi Bali pada Berbagai Umur dan Berat Badan*. Laporan Penelitian. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang.
- Supriadi. 2009. *Pengantar Fisiologi Reproduksi*. LUW Animal Husbandry Project Universitas Brawijaya. Malang.
- Talib, C., chalijah, dan A.R. Siregar. 2002. *Progesterone Pattern of Bali Cattle at Gowa*. South Sulawesi. Inpress.
- Tillman, A.D.S. dkk. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar Cetakan ke-5*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Toelihere, M. R. 1979. *Fisiologi Reproduksi Ternak*. Angkasa. Bandung.
- _____. 1985. *Fisiologi Reproduksi pada Ternak*. Fakultas Kedokteran Hewan. IPB. Penerbit Angkasa. Bandung.
- _____. 1993. *Inseminasi Buatan pada Ternak*. Fakultas Kedokteran Hewan. IPB. Penerbit Angkasa. Bandung.
- Yokoi, dkk. 2003. *Nickel Deficiency Diminishes Sperm Quantity and Movement in Rats*. Biological Trace Element Research, 93, 141-153. doi:10.1385/BTER:93:1-3:141
- Young, S.S., dkk. 2008. *The Association of Folate, Zinc and Antioxidant Intake With Sperm Aneuploidy in Healthy Non-Smoking Men*. Human Reproduction, 23, 1014-1022. doi:10.1093/humrep/den036

- Wang, S., dkk. 2007. *Beneficial Effects of Vitamin E in Sperm Functions in the Rat After Spinal Cord Injury*. *Journal of Andrology*, 28, 334-341. doi:10.2164/jandrol.106.001164
- Wawang, A. 2010. *Mengenal Sapi Bali*. Bisnis Indonesia. Bogor.
- Wong WY, Merkus HM, Thomas CM. 2002. *Effects of folic acid and zinc sulfate on male factor subfertility: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial*. *FertilSteril* ;77:491–8.
- Wu, G., dkk. 2009. *Arginine Metabolism and Nutrition in Growth, Health and Disease*. *Amino Acids*, 37, 153-168. doi:10.1196/annals.1320.017
- Zambrano, dkk. 2005. *A Maternal Low Protein Diet During Pregnancy and Lactation in the Rat Im-Pairs Male Reproductive Development*. *Journal of Physiology*, 563, 275-284.
- Zhou, X., Liu, F. and Zhai, S. 2007. *Effect of L-carnitine and/or L-acetylcarnitine in Nutrition Treatment for Male Infertility; A Systematic Review*. *Asia Pacific of Jurnal Clinical Nutrition*, 16, 383-390.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Data Hasil Analisis Uji-T (Paired t-test Sample) Makroskopis Semen Segar

1. Warna

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	4.2188	8	2.83296	1.00160
	Setelah	5.6600	8	1.06211	.37551

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Setelah	8	.286	.492

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum – Setelah	-1.44125	2.72623	.96387	-3.72043	.83793	-1.495	7	.178

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

2. Volume

Kontrol	5.5 mL	3.5 mL	7 mL	7 mL	5.75 mL	5 mL		
Perlakuan	6 mL	7.6 mL	6 mL	6 mL	5.6 mL	4.25 mL	4.33 mL	5.5 mL

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	4.2188	8	2.83296	1.00160
	Setelah	5.6600	8	1.06211	.37551

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Setelah	8	.286	.492

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum – Setelah	-1.44125	2.72623	.96387	-3.72043	.83793	-1.495	7	.178

3. Kekentalan

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum	.8750	8	.64087	.22658
Setelah	1.5000	8	.53452	.18898

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & Setelah	8	-.209	.620

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum – Setelah	-.62500	.91613	.32390	-1.39090	.14090	-1.930	7	.095

**Lampiran 2 Data Hasil Analisis Uji-T (Paired t-test Sample) Mikroskopis
Semen Segar**

1. Motilitas Individu

Kontrol	38	42	77	63	59	24		
Perlakuan	59	83	58	66	64	77	77	76

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	38.2088	8	28.67654	10.13869
	Setelah	69.4637	8	8.98761	3.17760

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Setelah	8	-.531	.176

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum - Setelah	-3.12550 E1	34.30560	12.12886	-59.93520	-2.57480	-2.577	7	.037

2. Progresifitas Spermatozoa

Kontrol	29	31	61	51	24	18		
Perlakuan	42	65	39	50	47	62	50	54

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum	27.0075	8	21.80092	7.70779
Setelah	51.4838	8	8.96413	3.16930

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & Setelah	8	-.385	.346

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum – Setelah	-2.44762	26.57223	9.39470	-46.69119	-2.26131	-2.605	7	.035

Lampiran 3 Pembuatan Pakan Konsentrat



Gambar 1. Penimbangan molasses



Gambar 2. Pelarutan garam dan urea



Gambar 3. Pencampuran konsentrat

Lampiran 4 Pengambilan dan Pengeringan Daun Kelor



Gambar 4. Pengambilan daun kelor (Memisahkan dari rantingnya)



Gambar. 5 Pengeringan daun Kelor

Lampiran 5 Penggilingan dan Pembuatan *Moringa Olifera* multinutrient block



Gambar 6. Penggilingan daun kelor menjadi tepung daun kelor



Gambar 7. Melarutkan bahan bahan pelengkap untuk membuat *Moringa olifera* multinutrient block



Gambar. 7 Pencampuran semua bahan pembuatan *Moringa olifera* multnutrient block



Gambar 8. Pengepresan atau pembuatan *Moringa olifera* multnutrient block

Lampiran 6 Penampungan Semen



Gambar 9. Proses Penampungan Semen



Lampiran 7 Alat yang Digunakan Di Laboratorium



Gambar 10. waterbath



Gambar 11. Komputer menganalisis Sampel

RIWAYAT HIDUP



Hastuti dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1995 di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Asis dan Tuni. Pada tahun 2002 penulis memulai pendidikan di SD Inpres No 24 Bontoramba dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 3 Bontoramba, tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Tamalatea pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan lulus melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.